

ভর্তি
পরীক্ষার
সর্বোত্তম
No-1

অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ ও মেধাবী কৃষিবিদদের সমন্বিত প্রয়াসে রচিত

জয়কলি
www.joykoly.com

কৃষি বিচিত্রা

— ছাত্রদের ১ম চয়ন —

শুচ পদ্ধতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম Text Book

Golden Edition : 2023-24



কৃষি ভর্তির বিগত
৬ দশকের সর্বোত্তম বই



সর্বাধিক প্রশ্ন কমনের নিশ্চয়তা



নির্ভুল উত্তর ও সঠিক তথ্য প্রদান



প্রশ্ন কমনের বিরল রেকর্ড প্রমাণ ৩৯ পৃষ্ঠায়
কৃষি বিচিত্রা বইটি থেকে সমন্বিত কৃষিতে হুবহু ২৭টি ও অনুরূপ/
সাদৃশ্যপূর্ণ ৬৬টি প্রশ্নসহ মোট ৯৩টি প্রশ্ন কমনের বিরল রেকর্ড।



JOYKOLY
PUBLICATIONS LTD.

HSC পরীক্ষার পরে নয়; বরং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি থেকেই জয়কলি'র ১সেট বই নিয়ে Advance ভর্তি প্রস্তুতি নাও, চাল নিশ্চিত।

অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ ও মেধাবী কৃষিবিদদের সমন্বিত প্রয়াসে রচিত

কৃষি বিচিত্রা

ছাত্রদের ১ম চয়ন-

শুচ্ছ পদ্ধতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম Text Book

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা পরিষদ

- | মোঃ শফিকুল ইসলাম বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস. (জেনেটিক্স ও প্রাণট ব্রিডিং), বাকুবি।
- | নজরুল ইসলাম নাহিদ বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস. (এগ্রোনোমি), বাকুবি।
- | অর্ণব ভৌমিক বি.এস.সি. (এজি অনার্স), শেখুবি।
- | তানিয়া সুলতানা পপি এম.এস. (কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান), শেখুবি।
- | ছন্দা সরকার বি.এস.সি. (এজি অনার্স), এম.এস. (বায়োটেকনোলজি), শেখুবি।
- | হুমায়ন আহমেদ হিমেল বিএসসি অনার্স ইন ফিশারিজ, হাবিগ্রবি।
- | সুজন মিত্র বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (পদার্থবিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
- | মোঃ সুজাউদদৌলাহ (সুজন) বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (পদার্থবিজ্ঞান), রাবি।
- | চিরঞ্জিত কুমার সাহা বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (বসায়ন), জাবি।
- | বিশ্বজিৎ কুমার কর্মকার বিএসসি (সম্মান) [বসায়ন বিভাগ], ঢাবি।
- | মিত্তক বিশ্বাস বিএসসি (সম্মান) [বসায়ন বিভাগ], ঢাবি।
- | মোঃ রফিকুল ইসলাম বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (গণিত), রাবি।
- | সৌমিত্র দেবনাথ বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফলিত গণিত বিভাগ), রাবি।
- | বিভাষ বাউড়ি বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (প্রাণিবিদ্যা), জাবি।
- | জ্যোতিশ অমর বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (মলিকুলার বায়োলজি), ঢাবি।
- | সুবর্ণা হালদার বিএ (সম্মান), এমএ (ইংরেজি), ঢাবি।
- | জাকের হোসেন বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (অর্থনীতি), ঢাবি।

প্রয়োজনে : ০১৬৭৮-৩৪৩৪৫২

জয়কলির ১সেট বই নিয়ে
অনলাইনে ফ্রি ক্লাস করুন-
www.joykolyacademy.com

প্রধান সম্পাদক

অজয় সরকার

প্রকাশনা

 JOYKOLY
PUBLICATIONS LTD.

১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫

☎ ০২-৪৮১১৭১৮৯ ☎ ০১৬৭৮-৩৪৩৪৫২

www.joykoly.com ✉ info@joykoly.com f/joykoly

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি তোমার হাতের মুঠোয়
প্রয়োজন সঠিক গাইডলাইন + জয়কলির ১সেট বই + নিয়মিত অধ্যয়ন।

সূচিপত্র

পার্ট-১ : প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিগত প্রশ্ন

■ বিষয় ও অধ্যয়নভিত্তিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ	১৭	■ বিগত প্রশ্ন, MCQ, Self Test ... -এর গুরুত্ব	২১
■ পাঠকের জিজ্ঞাসা	১৯	■ টেকনিক পার্ট	২৩
■ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন ও উত্তর	২০	■ প্রশ্নব্যাংক (কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার সর্বশেষ ৪ বছর)	৩৯

পার্ট-২ : বিষয় ও অধ্যয়নভিত্তিক আলোচনা

অধ্যায়	পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র	পৃষ্ঠা
১ম	ভৌতজগৎ ও পরিমাপ	৬৬	১ম	তাপগতিবিদ্যা	১৬৮
২য়	ভেক্টর	৭২	২য়	স্থির তড়িৎ	১৮৩
৩য়	গতিবিদ্যা	৮২	৩য়	চল তড়িৎ	১৯৩
৪র্থ	নিউটনিয়ান বলবিদ্যা	৯৩	৪র্থ	তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব	২০৮
৫ম	কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা	১০৬	৫ম	তড়িৎচৌম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ	২১৬
৬ষ্ঠ	মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ	১১৫	৬ষ্ঠ	জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান	২২২
৭ম	পদার্থের গাঠনিক ধর্ম	১২৪	৭ম	ভৌত আলোকবিজ্ঞান	২৩৮
৮ম	পর্যাবৃত্তিক গতি	১৩৬	৮ম	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা	২৪৮
৯ম	তরঙ্গ	১৪৪	৯ম	পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান	২৫৮
১০ম	আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব	১৫৮	১০ম	সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স	২৬৯
			১১তম	জ্যোতির্বিজ্ঞান	২৭৯

অধ্যায়	রসায়ন প্রথম পত্র	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	রসায়ন দ্বিতীয় পত্র	পৃষ্ঠা
১ম	ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার	২৮৪	১ম	পরিবেশ রসায়ন	৩৫৬
২য়	গুণগত রসায়ন	২৯০	২য়	জৈব রসায়ন	৩৭১
৩য়	মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন	৩০৮	৩য়	পরিমাণগত রসায়ন	৪০৪
৪র্থ	রাসায়নিক পরিবর্তন	৩৩০	৪র্থ	তড়িৎ রসায়ন	৪২২
৫ম	কর্মমুখী রসায়ন	৩৪৯	৫ম	অর্থনৈতিক রসায়ন	৪৩১

অধ্যায়	গণিত প্রথম পত্র	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	গণিত দ্বিতীয় পত্র	পৃষ্ঠা
১ম	ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক	৪৩৭	১ম	বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা	৫৪৮
২য়	ভেক্টর	৪৪৬	২য়	যোগাত্মকী প্রোথ্যাম	৫৫৩
৩য়	সরলরেখা	৪৫৩	৩য়	জটিল সংখ্যা	৫৫৬
৪র্থ	বৃত্ত	৪৭২	৪র্থ	বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ	৫৬৩
৫ম	বিন্যাস ও সমাবেশ	৪৮১	৫ম	দ্বিপদী বিস্তৃতি	৫৭২
৬ষ্ঠ	ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	৪৯১	৬ষ্ঠ	কনিক	৫৭৯
৭ম	সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	৪৯৬	৭ম	বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ	৫৮৮
৮ম	ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র	৫০৭	৮ম	স্থিতিবিদ্যা	৫৯৬
৯ম	অন্তরীকরণ	৫১৫	৯ম	সমতলে বহুভুজের গতি	৬০৩
১০ম	যোগজীকরণ	৫৩৪	১০ম	বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা	৬১৩

অধ্যায়	জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র	পৃষ্ঠা
১ম	জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা	৬২১	১ম	প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস	৭৫৬
২য়	কোষ ও এর গঠন	৬২৮	২য়	প্রাণীর পরিচিতি	৭৬৮
৩য়	কোষ বিভাজন	৬৪৫	৩য়	মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ	৭৭৯
৪র্থ	কোষ রসায়ন	৬৫২	৪র্থ	মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন	৭৯৫
৫ম	অণুজীব	৬৬০	৫ম	মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া	৮০৫
৬ষ্ঠ	শৈবাল ও ছত্রাক	৬৭৩	৬ষ্ঠ	মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন	৮০৭
৭ম	ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা	৬৮৩	৭ম	মানব শারীরতত্ত্ব : চলন ও অঙ্গচালনা	৮১৭
৮ম	নম্রবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৬৮৮	৮ম	মানব শারীরতত্ত্ব : সময় ও নিয়ন্ত্রণ	৮২১
৯ম	টিস্যু ও টিস্যুতত্ত্ব	৭০৩	৯ম	মানবজীবনের ধারাবাহিকতা	৮৩৭
১০ম	উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	৭১৩	১০ম	মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)	৮৪১
১১তম	উদ্ভিদ প্রজনন	৭২৮	১১তম	দ্বিনতত্ত্ব ও বিবর্তন	৮৪৫
১২তম	জীবপ্রযুক্তি	৭৩৬	১২তম	প্রাণীর আচরণ	৮৬৫
১৩তম	জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ	৭৪৫			

Chapter	ENGLISH	Page	VOICE	Page
NOUN		৮৬৬	NARRATION	৮৯১
NUMBER		৮৬৮	CORRECTION	৮৯৫
ADJECTIVE		৮৭০	SYNONYM & ANTONYM	৯০১
VERB		৮৭২	SPELLING	৯০৫
SUBJECT-VERB AGREEMENT		৮৭৬	PHRASE & IDIOM	৯১৫
PREPOSITION		৮৭৮	TRANSLATION & PROVERB	৯১৫
SENTENCE		৮৮১	ONE WORD SUBSTITUTION	৯২২
TENSE		৮৮৫	LITERATURE	৯২২
RIGHT FORM OF VERB		৮৯০		

মডেল টেস্ট (ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ) ৯২৬

জয়কলি'র ১ সেট বই থেকে বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমনের গ্যারান্টি প্রদান।

প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস


Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১৬ প্রাণীর বিভিন্নতা ও প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal diversity):

পৃথিবীর মাটি, বায়ু ও পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত, আন্তঃপ্রজাতিগত বা বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal diversity) বলে।


৬. আণিবৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰকাৰভেদ :



১১. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি : ভ্রূণস্থর, প্রতিসাম্য, সিলোম, নটোকর্ড

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য আকৃতি, গঠন, দৈহিক প্রতিসাম্য, দেহের খণ্ডকায়ন, দেহগহ্বর, লিঙ্গ, জীবনচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনে প্রাণিদেহের এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রধান্য দেওয়া হয়। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিসমূহ হলো :

৬ শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিসমূহ :



✍️ **প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের নীতি :**

১. শ্রেণিবিন্যাস স্তর বা ধাপ (Taxonomic categories)	ক্যারোলাস লিনিয়াস 1753 সালে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ছয়টি স্তর বা ট্যাক্সার বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সাতটি ধাপ ব্যবহার করা হয়।
২. প্রাণীর প্রজাতি ও উপপ্রজাতি (Species & Sub-species)	• প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন ধাপ ও মৌলিক একক হলো প্রজাতি। • জন রে (John Ray, 1686) সর্বপ্রথম species শব্দটি ব্যবহার করেন। [Ref: আলীম]
৩. প্রাণীর নামকরণ	প্রাণীর নামকরণ দু'প্রকার। যথা- (ক) দ্বিপদ নামকরণ (খ) ত্রিপদ নামকরণ • সুইডিশ শ্রেণিতত্ত্ববিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস 1758 সালে দ্বিপদ নামকরণ প্রবর্তন করেন। • জার্মান পাখি বিশারদ হারমেন শ্বেজেল 1844 সালে প্রাণীর ত্রিপদ নামকরণ প্রবর্তন করেন যা ICZN দ্বারা স্বীকৃত।


১) বিভিন্ন পর্বের নাম, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

পর্বের নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
পরিফেরা (স্পঞ্জ/ছিদ্রাল প্রাণী)	- অস্টিয়া, নালিতন্ত্র, স্পিকিউল, স্পঞ্জিন, কোয়ানোসাইট, স্পঞ্জোসিল, অসক্যুলাম। টিস্যুতন্ত্র নাই। - অ্যাক্সিব্রাস্টলা অথবা প্যারেনকাইমা লার্ভা।	<i>Spongilla locustris</i> (মিঠা পানির স্পঞ্জ) <i>Cliona celata</i> (লাল স্পঞ্জ) <i>Scypha gelatinosum</i> (সিলিয়াযুক্ত স্পঞ্জ)
নিডারিয়া (সমুদ্রের Rain forest বা সমুদ্রের ফুল)	- মেসোগ্রিয়া, সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোডাক্টুলার গহ্বর, পলিপ ও মেডুসা দশা, নেমাটোসিস্ট, Plannula লার্ভা, নিডোসাইট। - সামুদ্রিক প্রজাতির ২৫% প্রবাল প্রাচীর তৈরি করে এবং ২০% প্রজাতি স্বাদু পানিতে বাস করে।	<i>Hydra viridis</i> (হাইড্রা) <i>Aurelia aurita</i> (জেলিফিস) <i>physalia sp.</i> (ফাইসেলিয়া)
প্রাটিহেলমিনথেস (চ্যান্টা কৃমি)	শিখা কোষ (Flame cell), সিনোসাইটিক, চোষক অথবা হুক, ত্রিভ্রু প্যারেনকাইমা টিস্যু।	<i>Fasciola hepatica</i> (যকৃৎ কৃমি) <i>Taenia solium</i> (ফিতাকৃমি)

(Ref : আজমল + আলীম)

এরা সকলেই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের তলদেশে একক (Solitary) বা কলোনি গঠন (Colonial) করে বাস করে। কিছু প্রজাতি সাইফন দিয়ে সজোরে পানি উৎসারিত করে বলে এরা সামুদ্রিক ফোয়ারা (Sea squirt, Tail chordate) বা টিউনিকেট (Tunicate) নামে পরিচিত। এ উপপর্বের প্রজাতি সংখ্যা ৩০০০।

- ১। পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে না, লার্ভা দশায় কেবল লেজে নটোকর্ড থাকে।
- ২। দেহ সেলুলোজ নির্মিত চিউনিক বা টেস্ট নামক আচ্ছাদনে আবৃত থাকে।
- ৩। সকলেই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের তলদেশে একক বা কলোনি গঠন করে বাস করে।
- ৪। লার্ভা দশা মুক্তজীবী, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিশ্চল।
- ৫। গলবিলে অসংখ্য ফলকা ছিদ্র বা স্টিগমাটা দেখা যায়।




নাম	উদাহরণ
Class 1 : Ascidacea	<i>Ascidia mentula</i> , <i>Molgula tubifera</i>
Class 2 : Thaliacea	<i>Salpa maxima</i> , <i>Doliolum rarum</i>
Class 3 : Larvacea	<i>Oikopleura albicans</i> , <i>Appendicularia</i>


Chordata পর্বের Vertebrata উপপর্বের প্রাণীরা সবচেয়ে উন্নত প্রাণী, কারণ এদের মাঝে কর্ডেটের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কিছু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এদের অভিমুখ বা তরুণাভিমুখ ক্রেনিয়াম (cranium) থাকায় এদের ক্রেনিয়াটা (craniata) বলা হয়। এ উপপর্বের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৬৫,৭৮৯।

১। জ্ঞান অবস্থায় নটোকর্ক উপস্থিত। কিন্তু পরিণত অবস্থায় মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। তাই এদের মেরুদণ্ডী বা ভার্টিব্রাটা বলে।

- ২। গলবিলীয় ফুলকারবন্ধ (৫ - ১৫ জোড়া) থাকে।
- ৩। মস্তিষ্ক করোটিকা দ্বারা সুরক্ষিত।

জেনে নাও Vertebrata উপপর্বের অধিশ্রেণির নাম ও উদাহরণ : Vertebrata





১১. সুতাপায়ীরা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে উন্নত/আলাদা :

৩ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- **লোমাবৃত দেহ :** অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর দেহ লোম বা ফার দ্বারা আবৃত থাকে যা এদের উষ্ণ রক্তে উচ্চ বিপাকীয় হারের নিয়ন্ত্রণে নিঃশ্চয়তা দেয়।
- **কার্যকরী স্তন্যগ্রন্থি :** স্ত্রী স্তন্যপায়ীদের কার্যকরী স্তন্যগ্রন্থি থাকে যা এদের বাচ্চাদের পুষ্টিকর দুধের নিঃশ্চয়তা দেয়। অন্য কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এ বৈশিষ্ট্য থাকে না।
- **এক অস্থি বিশিষ্ট নিম্ন চোয়াল :** স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিম্নচোয়াল মাত্র একটি ডেন্টারি হাড় (dentary bone) দ্বারা গঠিত যা সরাসরি করোটির সাথে যুক্ত থাকে।
- **দাঁতের এক প্রতিস্থাপন :** স্তন্যপায়ীদের ডিফায়েন্ট প্রকৃতির দাঁত থাকে অর্থাৎ বাচ্চাদের মুখে বিদ্যমান দুধ দাঁত (milk teeth) পরিণত বয়সে ক্রমান্বয়ে স্থায়ী দাঁত (Permanent teeth) দ্বারা একবার প্রতিস্থাপিত হয়।
- **কর্ণগ্রন্থি :** অন্তঃকর্ণে বিদ্যমান তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি (মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস) স্তন্যপায়ীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।
- **ডায়াফ্রাম :** স্তন্যপায়ীদের দেহগহ্বরে মাংসল ডায়াফ্রাম পর্দার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে পাখি ও সরীসৃপের চেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করে।
- **চার প্রকাণ্ডবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড :** প্রাণিজগতে কেবল পাখি ও স্তন্যপায়ীদের সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত চার প্রকাণ্ডবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড রয়েছে যা এদের অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনহীন রক্তের অমিশ্রণের নিশ্চয়তা দেয়। আর একারণেই এসব প্রাণীতে উচ্চমাত্রার শারীরিক ও বিপাক ক্রিয়া দেখা যায়। [Ref: আলীম]

প্রাণীর পরিচিতি

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

Hydra নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বের একটি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী যা সাধারণত 'স্বাদুপানির পলিপ' নামে পরিচিত। প্রাণিজগতের Cnidaria ও Ctenophora (টিনোফোরা) পর্ব দুটির অন্তর্গত প্রাণীরা দ্বিস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) নামে পরিচিত।

Kingdom : Animalia (প্রাণী)

Kingdom : Animalia (প্রাণী)

Phylum : Cnidaria (নিডোসাইট ও সিলেন্টেরন উপস্থিত)

Class : Hydrozoa (অবিভক্ত সিলেন্টেরন)

Order : Hydroida (পলিপ দশা প্রধান)

Family : Hydridae (এককভাবে বসবাস করে)

Genus : *Hydra* (পুনরুৎপত্তি, ক্ষমতাসম্পন্ন)

Species : *Hydra vulgaris*

৬ বাংলাদেশে পাওয়া যায় এরূপ কয়েকটি প্রজাতি :

হাইড্রার প্রজাতি	কর্ষিকার সংখ্যা	বর্ণ
<i>Hydra viridissima</i> (<i>Hydra viridis</i> , <i>Chlorohydra viridissima</i>)	৪-৮টি	সবুজ বর্ণের
<i>Hydra gangetica</i>	৬টি	সাদা বা হালকা গোলাপি বর্ণের
<i>Hydra oligactis</i> (<i>Hydra fusca</i>)	৬টি	বাদামি বর্ণের (এক লিঙ্গিক)
<i>Hydra vulgaris</i> (বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়)	৬-১০টি	প্রায় বর্ণহীন বা স্বচ্ছ বা হালকা হলুদ-বাদামি বর্ণের (উভয় লিঙ্গিক)

- পেশি আবরণী কোষ- সারা দেহে থাকে।

- উনটাবসিটিশিয়াল কোষ- পনরুৎপাদন ক্ষমতা।

- সায় কোষ- সংবেদ বহন।

- পলি কাস - সিউকাস মূলতঃ

- গ্রাহ্য কোষ- নিউক্লিয়াস

- ### হাফ্‌ড্রার আদর্শ নিডোব্রাস্ট :


- জনন কোষ- ডিম্বাণু, শুক্রাণু।

- নিভোসাইট- আত্মরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ, শিকার।

- সংবেদী কোষ- সংবেদ গ্রহণ

Hydra র পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকায় এদের বেশি পাওয়া যায়। এরা গোলাকার; ডিম্বাকার, পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসযুক্ত। প্রতিটি কোষ দুটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে নিডোব্লাস্ট কোষ (Cnidoblast cell) বলে।

৬. ক নজরে নিডোব্লাস্ট বা নেমাটোসিস্ট কোষ :



হাইড্রার মেসোগ্রিয়া ও সিলেন্টরন :

৬ হাইড্রার সিলেন্টরন :

১১. হাইড্রার চলন (Locomotion) :

Hydra-য় নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের চলন দেখতে পাওয়া যায় :

২. হাইড্রার মিথোজীবিতা (Symbiosis of Hydra) :

১। শৈবালের প্রাপ্ত উপকার :

২। Hydra-র প্রাপ্ত উপকার :

(iv) বর্জ্য নিক্ষেপন

[illegible][illegible][illegible]



গুচ্ছ পদ্ধতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম Text Book

[illegible]

গুচ্ছ পদ্ধতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম Text Book

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

গুচ্ছ পদ্ধতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম Text Book

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]


- কপাটিকা- ৩টি। যথা :
 - i. সাইনো-অ্যাক্সিয়াল কপাটিকা।
 - ii. অ্যাক্সিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা।
 - iii. ভেন্ট্রিকুলো-বাল্বাস কপাটিকা।

অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের হৃৎপিণ্ডটিও দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। একটি অ্যাক্ট্রিয়াম এবং অন্যটি ভেন্ট্রিকল। এছাড়া সাইনাস ভেনোসাস নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ রয়েছে। নিচে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো :

নাম	বর্ণনা
সাইনাস ভেনোসাস	পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট উপপ্রকোষ্ঠ যা হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং সাইনো-অ্যাদ্রিয়াল ছিদ্রপথে অ্যাদ্রিয়ামের সাথে যুক্ত। এ পথে শিরা থেকে সংগৃহীত CO ₂ সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাদ্রিয়ামে প্রবেশ করে।
অ্যাদ্রিয়াম	এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের সম্মুখ পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ। এটি একদিকে সাইনাস ভেনোসাস অন্যদিকে অ্যাদ্রিওভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথে ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত।
ভেন্ট্রিকুল	এটি হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ। পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অক্ষীয় দেশে অবস্থিত এ প্রকোষ্ঠটির প্রাচীর পুরু ও মাংসল এবং সম্মুখে বাল্বাস আর্টারিওসাস এ উন্মুক্ত।
বাল্বাস আর্টারিওসাস	রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোনাস আর্টারিওসাস নেই। তার পরিবর্তে বাল্বাস আর্টারিওসাস নামক একটি গঠন দেখা যায় যা মূলত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্ফীত হওয়া গোড়া বা মূল। এটি হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

রুই মাছের পৌষ্টিক নালি এবং বৃক্কের মাঝে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ থলির মতো গঠন বিদ্যমান থাকে। একে বায়ুথলি/সাঁতার থলি/ বায়ু পটকা বলে। এটির ভেতর বিভিন্ন গ্যাস বিদ্যমান (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড) ভর্তি থাকে।

- বায়ুখলি পৌষ্টিক নালির পৃষ্ঠীয় প্রাচীর থেকে উৎপত্তি লাভ করে।
- সিলিয়াকো মেসেন্টারিক ধমনির শাখা বায়ুখলিতে রক্ত সরবরাহ করে।
- সকল কঠিনাঙ্ঘ্রি আছে এ বায়ুখলি পাওয়া যায়।
- থ্রাসনালি ও বায়ুখলির মাঝে অবস্থিত সংযোগকারী নালিকে ডাক্টাস নিউ



- বায়ুখলির উভয় প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়াম সংলগ্ন একটি করে লাল বর্ণের একটি গ্যাস গ্রন্থি থাকে। এর নাম রেটি মিরাবিলিয়া।

কুই মার্চের বায়ুখলির কাজ	
- উদস্থিতিয় অঙ্গ (Hydrostatic organ) - অভিযোজনক্ষম ভাসাল (Adjustable float) - যথাযথ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র রক্ষা (Maintain Proper Center of gravity) - শ্বসন (Respiration) - প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী অঙ্গ (Resonator) - শব্দ উৎপাদন (Sound Production)	- শব্দতরঙ্গ বায়ুখলির মাধ্যমে ওয়েবেরিয়ান ওসিকলের মাধ্যমে অঙ্গকর্ষণে প্রবেশ করে। - পূর্বতা রক্ষাকারী অঙ্গ - আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ - অক্সিজেনের আধার - চাপ সংগ্রাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। - ভাসাল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের পরিস্ফুটন বা পরিবর্তনগুলোকে ৩টি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) জন্মীয় পরিবর্তন বা লার্ভা পূর্ব পরিবর্তন, (খ) লার্ভা দশার পরিবর্তন, (গ) লার্ভার পরবর্তী পরিবর্তন।

- ক্রই মাছের ডিম থেকে সদ্য-নির্গত বয়স থেকে শুরু করে ৭২ ঘণ্টা বয়স পর্যন্ত পোনাকে রেণু পোনা বলে। এটি দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ ৭ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।
- ক্রই মাছের ডিমগুলো নিষেকের পর পানিতে ডুবে যায় বলে এদের ডিমারসাল ডিম।
- ক্রই মাছের ডিম পাড়ার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব হলে পরিপক্ব ডিমগুলো এদের দেহ কর্তৃক শোষিত হওয়ায় অ্যাটারেশিয়া বলে।

সময়	লার্ভা দশার পরিবর্তন	সময়	লার্ভা দশার পরিবর্তন
৬ ঘণ্টার লার্ভা	- কুসুমথলির আকার বেশ বড় এবং এর দুপ্রান্ত সুরু হয়। - কুসুমথলির সামনে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে।	৩৬ ঘণ্টার লার্ভা	পরিপাকনালির উপস্থিতি দেখা যায়।
		৪৮ ঘণ্টার পর-লার্ভা	মুখ একটি সরুছিদ্রের ন্যায় দেখায়। ফুলকা আর্চ স্পষ্ট হয় এবং বায়ুথলি ডিম্বাকৃতি ধারণ করে।
১২ ঘণ্টার লার্ভা	- লার্ভার চোখে ক্রোমাটোফোর উদ্ভব হয়। - কুসুম থলিটি আকারে বড় হয়। - নটোকর্ড দীর্ঘ এবং পুচ্ছ পাখনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।	৭২ ঘণ্টার লার্ভা	- এ সময় দেহের সব অঙ্গই স্পষ্ট হয়ে উঠলেও কার্যকর হয় না। - পুরো লার্ভাটি উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের দেখায়। - লার্ভা দশার সমাপ্তি।
২৪ ঘণ্টার লার্ভা	- নটোকর্ড পেছনের দিকে বাঁকা এবং পুচ্ছ পাখনা আরো বড় হয়। - পায়ু পাখনা স্পষ্ট হয়। - ফুলকায় ফুলকাদণ্ডের উদ্ভব হয়।	৯৬ ঘণ্টার লার্ভা	- এ সময় মুখ স্পষ্ট হয়ে খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। - কুসুমথলি প্রায় মিলিয়ে যায়। - এ সময় পর এটি ধানি পোনা হিসেবে পরিচিত হয়।

At a glance [Most Important Information]

- আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় কাটার মতো বার্ব থাকে- ৩টি
 - খাদ্যদ্রব্য সিঁচিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে- গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাস
 - এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যেকোনো কোষ গঠন- ইন্টারসিটিয়াল কোষ
 - সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা স্থানান্তর করে- স্নায়ুকোষ
 - গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন সম্পাদিত হয় তাকে- অযৌন জনন বলে
 - শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে- স্পার্মাটোজেনেসিস
 - ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে- ওওজেনেসিস
 - আত্মরক্ষা, শিকার ধরা, চলন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়- কর্ণিকাসমূহ
 - বিভিন্ন প্রজাতির *Hydra*র মধ্যে বাংলাদেশে সুলভ- *Hydra vulgaris*.
 - *Hydra* ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শ্বসন ও রেচন সম্পন্ন করে- দেহপ্রাচীরের মাধ্যমে
 - *Hydra*-র খাদ্য গৃহীত ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয়- মুখছিদ্রপথে
 - হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদ-চাকতির ওপর পর্যন্ত অংশটি- দেহকাণ্ড
 - চাকতির ক্ষণপদ গঠনকারী কোষের সাহায্যে সম্পন্ন হয়- গ্রাইডিং চলন
 - পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে- সংবেদী কোষ
 - ক্ষরণকারী দানাবিশিষ্ট পরিবর্তিত লম্বাকার এপিডার্মাল কোষ হলো- গ্রন্থিকোষ
 - পৃথিবীতে ঘাসফড়িং শনাক্ত করা হয়েছে প্রায়- বিশ হাজার
 - ম্যাক্সিলার স্টাইপসের অগ্রভাগে নখের মতো অংশটি- ল্যাসিনিয়া
 - ম্যাক্সিলার গ্যালিয়ার পার্শে পাঁচ অংশবিশিষ্ট- ম্যাক্সিলারি পাল্প রয়েছে
 - অগ্রবক্ষের টার্গামের বড়, চওড়া প্রসারিত অংশটি- প্রোনোটা
 - স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের স্ত্রীজননরন্ধ্র ধারণ করে- ৯ম স্টার্নাম
 - ক্রিস্টালাইন কোণের নিচে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রলম্বিত অংশটি- র‍্যাবডোম
 - ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার ওপর অবস্থান করে সেটি- ভিস্তিপর্দা
 - ওমাটিডিয়ামে মাধ্যমে গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে- স্নায়ুতন্ত্র
 - প্রতিটি ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর পৃথক রাখে- রেটিনাল সিথ
 - ঘাসফড়িং নিম্ন থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিণত হতে খোলস ত্যাগ করে- ৫বার
 - কানকোর শেষভাগ থেকে পান্য পর্যন্ত দেহের মধ্য অংশটি- দেহকাণ্ড
 - পাখনার ভিতরে সমান্তরালভাবে সজ্জিত অন্তঃকক্ষালকে বলে- পাখনা রশ্মি
 - রুই মাছের হৃৎপিণ্ড যে আবরণে আবৃত- পেরিকার্ডিয়াম
 - হিমোলিফের কাজ নয়- শ্বসনের সহায়তা করা
 - ঘাসফড়িংকে যে শ্রেণিভুক্ত সদস্য বা পতঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়- Insecta.
 - উজ্জ্বল নীল-হলুদ রঙের ঘাসফড়িং- *Poecilocerus pictus*.
 - ঘাসফড়িং - এর মস্তক দেখতে- নাশপাতি আকৃতির
 - মস্তকের বহিঃকক্ষালের নাম- হেড ক্যাপসুল বা এপিফ্রেনিয়াম
 - ঘাসফড়িং-এর স্পাইরাকুল বা শ্বাসরন্ধ্র- ১০ জোড়া
 - ম্যালপিজিয়ান নালিকার ভেতরের গহ্বরকে বলে- লুমেন
 - একটি স্ত্রী ফড়িং ২০০টি ডিম পাড়ে- ১০টি শুচ্ছে
 - পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডের স্টার্নাম গঠন করে- সাবজেনিটাল প্রোট
 - পরিণত প্রাণীতে যে গহ্বর দেখা যায় তা- ব্লাস্টোসিল
 - ইলিয়ামের পেছনে অবস্থিত সরু নলাকার অংশটি- কোলন
 - নিম্ন দশায় গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়- জুভেনাইল হরমোন
 - ধমনির গোড়া ক্ষীত হয়ে গঠন করে- বাম্বাস আর্টারিওসাস
 - অক্ষীয় মহাধমনি সৃষ্টি হয়- বাম্বাস আর্টারিওসাস থেকে
 - রুই মাছের ফুলকাকে বলা হয়- হলোব্রাঙ্ক
 - বায়ুথলির নিউম্যাটিক নালি যুক্ত থাকে- গ্রাসনালি বা অন্ননালির সাথে
 - বায়ুথলি অন্তঃকর্ণের- ওয়েবেরিয়ান অসিকলের সঙ্গে যুক্ত থাকে
 - যে প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টুলা গঠিত হয় সেটি- ব্লাস্টুলেশন
 - যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলা থেকে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয়- অর্গানোজেনেসিস
 - রুই মাছ Cypriniformes বর্গের যে গোত্রভুক্ত প্রজাতি- cyprinidae
 - রুই মাছের মুখের দুপাশে বার্বেল দেখা যায়- ১৫ দিন পর
 - দেহ প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে- প্যারাইটাল ধমনি
 - রুই মাছের ফুলকা দেখতে সুতার মতো এবং একেকটি- হলোব্রাঙ্ক
 - আর্চের অন্তঃকিনারা প্রসারিত হয়ে গঠন করে- ফুলকা রেকার
 - রুই মাছে কত ধরনের যুগ্ম পাখনা- ২ ধরনের (বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা)
 - ভেন্ট্রিকল কোথায় উন্মুক্ত হয়- বাম্বাস আর্টারিওসাস
 - রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে সঠিক- CO₂ যুক্ত রক্ত পাম্প করে
 - ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির গোড়া ক্ষীত হয়ে গঠন করে- বাম্বাস আর্টারিওসাস
 - ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার প্রতি পাশ থেকে ধমনি বের হয়- ৪টি

- [Ref : আজমল]

01. মিথোজীবিতার উদাহরণ কোনটি? [BAU: 18-19]
 (A) সবুজ হাইড্রা ও জুওক্সেলেলা (B) হাইড্রা ও ছত্রাক
 (C) মশা ও মানুষ (D) সবগুলো
- Solve** যখন দুইটি জীব একত্রে বসবাস করার ফলে পরস্পর উপকৃত হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবন ধারণ করে তখন তাকে মিথোজীবিতা বলে।
02. আর্থ্রোপোডার দেহ গহ্বরকে কী বলা হয়? [BAU: 18-19]
 (A) সিলোম (B) হিমোসিল
 (C) গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার (D) অল্‌নারালি
- Solve** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :
 • সিলোম – Nematoda এবং Mollusca পর্বের প্রাণীদের দেহগহ্বর।
 • হিমোসিল – আর্থ্রোপোডার দেহ গহ্বর।
03. কোন ঋতুতে Hydra-এর যৌন প্রজনন ঘটে? [BAU: 17-18]
 (A) শীত (B) বসন্ত (C) শরৎ (D) বর্ষা
- Solve** প্রধানত শরৎকালে খাদ্যের অপ্রতুলতার মতো প্রতিকূল পরিবেশে এদের দেহে অস্থায়ী জননাস্রের সৃষ্টি হয় এবং যৌন জনন ঘটে। [Ref: আজমল]

04. হাইড্রা কোন জাতীয় খাদ্য পরিপাকে অক্ষম? [BAU : 15-16]
 (A) শর্করা (B) শ্লেহ (C) আমিষ (D) স্টার্চ
 **Solve** Hydra আমিষ, শ্লেহ ও কিছু সরল শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে কিন্তু স্টার্চ (জটিল শর্করা) জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে না। [Ref: আজমল]
05. Hydra-এর কোষের ভিতরে হিপনোটিক্সিন নামক বিষাক্ত তরলে পূর্ণ ক্যাপসুলটিকে কী বলে? [BAU : 09-10]
 (A) নেমাটোসিস্ট (B) সাইটোসিস্ট (C) নিডোসিল (D) অপারকুলাম
 **Solve** নেমাটোসিস্টের ভিতরে আমিষ ও ফেনলে গঠিত বিষাক্ত তরল পদার্থকে হিপনোটিক্সিন বলে।
06. হাইড্রার অমরত্বের ব্যাখ্যা দেন যে বিজ্ঞানী তাঁর নাম- [BAU : 09-10]
 (A) কুঁড়িয়ে (B) হাসেক (C) ব্রাইন (D) ট্রিশলে (Ans: D)
07. বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক করে কোন প্রাণী? [BAU : 08-09]
 (A) কাঁকড়া (B) কেঁচো (C) মাছ (D) হাইড্রা
 **Solve** হাইড্রা বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাকে অংশ নেয়।
08. হাইড্রার নিডোব্লাস্টের কোন অংশটি ট্রিগারের মতো কাজ করে? [BAU : 08-09]
 (A) নেমাটোসিস্ট (B) অপারকুলাম (C) নিডোসিল (D) পেশিসূত্র
 **Solve** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :
 • হাইড্রার নিডোব্লাস্ট-এর নিডোসিল অংশটি ট্রিগারের মতো কাজ করে।
 • এ অংশ থেকে ল্যাসো নামক একটি অভিক্ষেপ বের হয় যা শিকারে সহায়তা করে।
09. হিপনোটিক্সিন হাইড্রার কোথায় থাকে? [BAU : 08-09]
 (A) নেমাটোসিস্টে (B) বক্ষে (C) নিউক্লিয়াসে (D) পায়ে
 **Solve** একটি আদর্শ নেমাটোসিস্ট দুটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত, যথা : ক্যাপসিউল যা তরল পদার্থ পূর্ণ থলি এবং সূত্রক। থলির ভেতরের তরল পদার্থকে হিপনোটিক্সিন বলে।
10. হাইড্রার নেমাটোসিস্টে যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তার নাম কী? [BAU : 06-07]
 (A) নিউরোটক্সিন (B) আইপোটক্সিন
 (C) হাইপোটক্সিন (D) হিপনোটক্সিন
 **Solve** হিপনোটক্সিন ফেনল ও আমিষের সমন্বয়ে গঠিত।
11. মিথোজীবিতা নিচের কোন প্রাণীতে দেখা যায়? [BAU : 02-03]
 (A) মশা (B) অ্যামিবা (C) হাইড্রা (D) কেচোঁকুমি
 **Solve** মশা পরজীবী, অ্যামিবা একটি এককোষী জীব। অপরদিকে, কেচোঁকুমি Annelida পর্বের প্রাণী কিন্তু হাইড্রা মিথোজীবী প্রাণী।
12. কোন নেমাটোসিস্টে হিপনোটক্সিন থাকে? [BAU : 01-02]
 (A) সিনোটিল (B) ডলভেন্ট
 (C) স্ট্রিপটোলিন (D) স্টেরিওলিন গুটিন্যান্ট
 **Solve**

About Nematocyst	
নিম্যাটোসিস্ট	কাজ
স্ট্রেপটোলিন থুটিন্যান্ট	এক প্রকার আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার ধরতে সাহায্য করে।
স্টেরিওলিন থুটিন্যান্ট	এক প্রকার আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার রাখতে সাহায্য করে।
স্টিনোটিল	শিকারের দেহে সূত্রক বিদ্ধ করে বিষাক্ত হিপনোটস্ট্রিন প্রবেশ করিয়ে তাকে অবশ করে ফেলে।
ডলভেন্ট	শিকার জড়িয়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

- বিজ্ঞানী ভার্গার ১৯৬৫ সালে নিডেরিয়া জাতীয় প্রাণীদের দেহে ২৩ প্রকার নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেন।
- নেমাটোসিস্ট ক্যাপসুলটি আমিষ ও ফেনলে গঠিত হিপনোটক্সিন নামক বিষাক্ত তরলে পূর্ণ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. রুইমাছ লার্ভা দশায় কতক্ষণ পর ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়? [SAU : 18-19]
 A ৬ ঘণ্টা B ৯ ঘণ্টা C ২৪ ঘণ্টা D ৪৮ ঘণ্টা
Solve ২৪ ঘণ্টা পর লার্ভায় ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর লার্ভার মাথায় ক্রোমোটোফোর উৎপন্ন হওয়ার ফলে মাথা কালো বর্ণ ধারণ করে। ফুলকা আর্চ স্পষ্ট হয় এবং দেহ ফ্যাকাশে হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়। [Ref: মাজমল]
02. হিমোসিলের হিমোসিলফের আন্দোলনের দ্বারা ম্যালপিজিয়ান নালিকা ঘাসফড়িং এর কোন কাজটি করে থাকে? [SAU : 17-18]
 A রক্ত সংবহন B শ্বসন C রেচন D বিপাক
Solve ঘাসফড়িং-এর ওভিপজিটর কী কাজে ব্যবহৃত হয়? [SAU : 15-16]
 A নালী ক্ষরণে B শ্বসন কার্যে C ডিম্ব ত্যাগে D বর্জ্য নিষ্কাশনে
Solve ঘাসফড়িং-এর ওভিপজিটর ডিম্ব ত্যাগের কাজে ব্যবহৃত হয়। [Ref: আজমল]
04. অ্যালারি পেশির সাথে সম্পৃক্ত অঙ্গ হলো- [SAU : 14-15]
 A পাকস্থলি B বৃক্ক C হৃদযন্ত্র D ফুসফুস
Solve শিকারকে জড়িয়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে কোন ধরনের নেমাটোসিস্ট? [SAU : 13-14]
 A স্টেরিওলিন গুটিন্যান্ট B স্ট্রেপটোলিন গুটিন্যান্ট
 C ডলভেন্ট D স্টিনোটিল
Solve হাইড্রার চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট হলো ডলভেন্ট যা শিকার বা খাদ্য বস্তুকে আকড়ে ধরে। [Ref: আজমল]
06. কোন প্রাণীতে হিপনোটক্সিন নামক বিষাক্ত রস থাকে? [SAU : 12-13]
 A আরশোলা B হাইড্রা C ম্যালেরিয়া জীবাণু D গোলকুমি
Solve হিপনোটক্সিন : এক প্রকার বিষাক্ত রস যা হাইড্রার স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট নামক নেমাটোসিস্টে পাওয়া যায়। হিপনোটক্সিন শিকারকে অবশ করতে ব্যবহৃত হয়।
07. কোনটিতে নেফ্রিডিয়া নেই? [SAU : 11-12]
 A কেঁচো B জোক C নৈরিস D আরশোলা
Solve A, B ও C অপশনের প্রাণীগুলোতে নেফ্রিডিয়া বিদ্যমান। তবে D অপশনের প্রাণীতে নেফ্রিডিয়া নেই। [Ref: আজমল]
08. কোনটি হাইড্রার সাথে মিথোজীবিতায় অংশ নেয়? [SAU : 04-05]
 A Hydrochlorella B Zoochlorella
 C Chara D Vallisneria
Solve মিথোজীবিতা (Symbiosis) : যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীব দুটিকে মিথোজীবী বলা হয়। হাইড্রা ও Zoochlorella নামক শৈবালের মধ্যে এ সম্পর্ক দেখা যায়।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. Hydra-এর গ্যাস্ট্রোডার্মিসে কোন কোষটি দেখা যায় না? [SylAU : 18-19]
 A Sensory Cell B Interstitial Cell
 C Germ Cell D Gland Cell
Solve Hydra এর গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পুষ্টি কোষ, গ্রন্থি কোষ, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, সংবেদী কোষ, এবং স্নায়ুকোষ দেখা যায়। [Ref: আজমল]
02. ঘাসফড়িং-এর ম্যালপিজিয়ান নালিকা কোথায় বিস্তৃত থাকে? [SylAU : 18-19]
 A হিমোসিলে B ট্রাকিয়াতে C ইউটেরাসে D নিডোসিলে
Solve মধ্য ও পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো ম্যালপিজিয়ান নালিকা হিমোসিলে বিস্তৃত থাকে। এগুলোর মুক্ত প্রান্ত বদ্ধ এবং হিমোসিল গহ্বরে হিমোসিলফের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। [Ref: আজমল]
03. কোথায় সার্কুলি দেখা যায়? [SylAU : 16-17]
 A পাখনায় B ত্বকে C চোখে D আইশে
Solve রুইমাছের দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় সাইক্রয়েড ধরনের আইশে আবৃত। আইশের কেন্দ্র ফোকাস এবং উঁচু আলের মত কতগুলো রেখা থাকে এগুলোকে সার্কুলাস (বহুবচনে সার্কুলি) বা বৃদ্ধি রেখা বলে। [Ref: আজমল]
04. রুই মাছে কত জোড়া ফুলকা আছে? [SylAU : 16-17]
 A ৩ B ৪ C ৫ D ৬
Solve রুই মাছ একটি অস্থিযুক্ত মাছ। এ মাছের চার জোড়া ফুলকা শ্বসন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। [Ref: আজমল]
05. কোনটি দ্বিধ্রুববিশিষ্ট প্রাণী? [SylAU : 16-17]
 A কেঁচো B হাইড্রা C মাছ D ব্যাঙ
Solve যেসকল প্রাণী এন্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম জগীয় স্তর থেকে তৈরি হয় তারাই দ্বিধ্রুবী প্রাণী। যেমন: হাইড্রা। [Ref: আজমল]
06. পদ্মপাল হলো এক ধরনের- [SylAU : 16-17]
 A মশা B গঙ্গাফড়িং
 C ঘাসফড়িং D মৌমাছি
Solve আরশোলার মতো ঘাসফড়িংও একটি অতি পরিচিত পতঙ্গ। ঘাসফড়িং একা বা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। ঘাসফড়িং এর কিছু প্রজাতিতে পদ্মপাল বলা হয়। [Ref: আজমল]
07. মাছের হৃৎপিণ্ডে কতটি অলিন্দ আছে? [SylAU : 15-16]
 A ১ টি B ২ টি C ৩ টি D ৪ টি
Solve মাছের হৃৎপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। একটি অলিন্দ বা অ্যাক্ট্রিয়াম এবং অন্যটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল। [Ref: আজমল]
08. কোন প্রাণীতে মুকুলোদগম পদ্ধতিতে প্রজনন হয়? [SylAU : 15-16]
 A কেঁচো B হাইড্রা
 C আরশোলা D অ্যামিবা
Solve গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন হয় তাকে অযৌন জনন বলে। হাইড্রা দুভাবে অযৌন জনন সম্পন্ন করে যথা- মুকুলোদগম ও বিভাজন। [Ref: আজমল]
09. রুই মাছের আইশ কোন ধরনের? [SylAU : 14-15]
 A সাইক্রয়েড B টিনয়েড
 C প্র্যাকয়েড D গ্যানয়েড
Solve রুইমাছের আইশ সাইক্রয়েড ধরনের। কৈ মাছের আইশ টিনয়েড ধরনের। হাঙর মাছের আইশ প্র্যাকয়েড ধরনের। [Ref: আজমল]
10. শিকারকে জড়িয়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে কোন ধরনের নেমাটোসিস্ট? [SylAU : 14-15]
 A স্টেরিওলিন গুটিন্যান্ট B স্ট্রেপটোলিন গুটিন্যান্ট
 C ডলভেন্ট D স্টিনোটিল
Solve হাইড্রাতে চার ধরনের নেমাটোসিস্ট রয়েছে। যার মধ্যে ডলভেন্ট অপেক্ষাকৃত ছোট যা শিকার বা কোনো বস্তুকে আকড়ে ধরে রাখে। [Ref: আজমল]
11. Hydra এর এপিডার্মিসে কোন কোষটি দেখা যায় না? [SylAU : 13-14]
 A Sensory cell B Flame cell C Gland cell D Germ cell
Solve হাইড্রার এপিডার্মিস :
 ১. পেশি আবরণী কোষ ২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
 ৩. সংবেদী কোষ ৪. স্নায়ুকোষ
 ৫. গ্রন্থি কোষ ৬. জনন কোষ
 ৭. নিডোসাইট কোষ। [Ref: আজমল]
12. সিলেটেরনের অপর নাম কী? [SylAU : 10-11]
 A রেচন-সংবহন গহ্বর B পানি-সংবহন গহ্বর
 C পরিপাক-সংবহন গহ্বর D শ্বসন-সংবহন গহ্বর
Solve সিলেটেরনের অপর নাম পরিপাক-সংবহন গহ্বর। Hydra-র দেহের কেন্দ্রে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেটেরন বলে। [Ref: আজমল]
13. হাইড্রার হিপনোটক্সিন কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত? [SylAU : 09-10]
 A প্রোটিন ও ফেনল B কার্বহাইড্রেট ও এসিটোন
 C লিপিড ও ফরমালডিহাইড D কোনোটিই নয়
Solve হাইড্রাতে চার ধরনের নেমাটোসিস্ট রয়েছে। যার স্টিনোটিল নেমাটোসিস্ট হিপনোটক্সিন নিঃসরণ করে। হিপনোটক্সিন প্রোটিন ও ফেনল দিয়ে গঠিত। [Ref: আজমল]

মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System) :


পৌষ্টিকতন্ত্র : যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। মানুষের পরিপাকতন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা : পৌষ্টিক নালি ও পৌষ্টিক গ্রন্থি।

খাদ্য পরিপাকের স্থান :

মানুষের পৌষ্টিক নালির অন্তর্গত মুখবিবর, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রই হলো খাদ্য পরিপাকের স্থান। মানুষের পৌষ্টিক নালির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। নিচে খাদ্য পরিপাকের স্থান এবং কী ধরনের খাদ্য পরিপাক হয় তা ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

স্থানের নাম	কী ধরনের খাদ্য পরিপাক হয়	স্থানের নাম	কী ধরনের খাদ্য পরিপাক হয়
মুখবিবর	শর্করা (লালায় মল্টেজ ও টায়ালিন)	ক্ষুদ্রান্ত্র	সব ধরনের খাদ্য পরিপাক হবে।
পাকস্থলী	শুধু প্রোটিন ও সামান্য লিপিড (পেরিস্ট্যালিসিস প্রক্রিয়ায়)	বৃহদন্ত্র	ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে পাচন হয়।

পরিপাকতন্ত্র এর বিভিন্ন অংশের নাম : নিচে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :



- ট্রিপসিন → প্রোটিন পরিপাক
- অ্যামাইলেজ → শর্করা পরিপাক
- লাইপেজ → লিপিড পরিপাক

- আলফা কোষ → গ্লুকোজ
- বিটা কোষ → ইনসুলিন
- ডেলটা কোষ → সোম্যাটোস্ট্যাটিন
- গামা P.P → পলিপেপটাইড

[Ref : অজমল + মাজেদা]

মানুষের দন্ত সংকেত (Dental formula) :

দন্ত সংকেত (Dental formula) : যে সংকেতের সাহায্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দাঁতের সংখ্যা, ধরন ও বিন্যাস বা অবস্থান প্রকাশ করা হয়, তাকে দন্ত সংকেত বলে। বিভিন্ন দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা দাঁতের ধরণ বোঝানো হয়। মানুষের মুখবিবরে উপর ও নিম্ন চোয়ালে বিদ্যমান শক্ত, শৃঙ্গায়িত গঠনকে দাঁত (teeth) বলে।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপরের নিচের চোয়ালে ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানুষের দন্ত সংকেত $\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$ টি

Must to know:

(ক) দুধ দাঁতের সংকেত = $\frac{I_2C_1M(Deciduous)_2}{I_2C_1M(Deciduous)_2} = \frac{5 \times 2}{5 \times 2} = \text{Total 20 টি (2-2.5 বছর বয়স)}$

(খ) ১৪ বছর বয়স = $\frac{I_2C_1Pm_2M_2}{I_2C_1Pm_2M_2} = \frac{7 \times 2}{7 \times 2} = \frac{14}{14} = \text{Total 28 টি}$

(গ) স্থায়ী দাঁতের সংকেত = $\frac{I_2C_1Pm_2M_3}{I_2C_1Pm_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = \frac{16}{16} = 32$ টি।

লালাগ্রন্থি (Saliva) :

লালা : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে লালা বা লালারস বলে। লালা সামান্য অম্লধর্মী (pH:6.2-7.4); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002-1.012; ফ্রিজিং বিন্দু : 0.07 - 0.34°C।



চিত্র : মানুষের বিভিন্ন ধরনের দাঁতের বিন্যাস

পরিপাকস্থল	পরিপাকস্থি ও পরিপাকরস	পরিপাকরস এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লালারস	কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী : ১. টায়ালিন ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	১. স্টার্চ ও গ্রাইকোজেন ২. মল্টোজ	১. মল্টোজ ২. গ্লুকোজ
পাকস্থলী	গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি নিঃসৃত পাচকরস	প্রোটিন পরিপাককারী : ১. পেপসিন ২. জিলেটিনেজ ৩. রেনিন	১. প্রোটিন ২. জিলেটিন ৩. দুগ্ধ কেসিন	১. প্রোটিন ও পেপটোন ২. পেপটোন ও পলিপেপটাইড ৩. প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী : ১. লাইপেজ	১. লিপিড	১. ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল
দুদ্রা	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত অগ্ন্যাশয় রস	প্রোটিন পরিপাককারী : ১. ট্রিপসিন ২. ক্রিমোট্রিপসিন ৩. কার্বোপেপটাইডেজ ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ ৬. ডাইপেপটাইডেজ ৭. কোলাজিনেজ	১. প্রোটিন ও পেপটোন ২. প্রোটিন ও পেপটোন ৩. পলিপেপটাইডের প্রাণীকৃত লিগেজ ৪. পলিপেপটাইড ৫. ট্রাইপেপটাইড ৬. ডাইপেপটাইড ৭. কোলাজেন	১. পলিপেপটাইড ২. পলিপেপটাইড ৩. ডাইপেপটাইড ও অ্যামিনো অ্যাসিড ৪. অ্যামিনো অ্যাসিড ৫. অ্যামিনো অ্যাসিড ৬. অ্যামিনো অ্যাসিড ৭. সরল পেপটাইড
		শর্করা পরিপাককারী : ১. অ্যামাইলেজ ২. মল্টেজ	১. স্টার্চ ও গ্রাইকোজেন ২. মল্টোজ	১. মল্টোজ ২. গ্লুকোজ
		লিপিড পরিপাককারী : ১. লাইপেজ ২. ফসফোলাইপেজ ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	১. চর্বি (লিপিড) ২. ফসফোলিপিড ৩. কোলেস্টেরল এস্টার	১. ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ২. ফ্যাটি এসিড ৩. ফ্যাটি এসিড
		প্রোটিন পরিপাককারী : ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	১. পেপটাইড অণু	১. অ্যামিনো অ্যাসিড
		লিপিড পরিপাককারী : ১. লাইপেজ ২. অ্যালকোলাইন ফসফেটেজ	১. ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড ২. ফসফোলিপিড	১. মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড ২. গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন- কোলিন)
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ (মেমব্রেন এনজাইম)	কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী : ১. ল্যাক্টেজ ২. মল্টেজ ৩. সুক্রোজ ৪. অ্যামাইলেজ	১. ল্যাক্টোজ ২. মল্টোজ ৩. সুক্রোজ ৪. স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	১. গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ ২. গ্লুকোজ ৩. গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ ৪. সরল শর্করা
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী : ১. নিউক্লিয়েডেস ২. নিউক্লিওটাইডেজ ৩. নিউক্লিওসাইডেজ	১. নিউক্লিক এসিড ২. নিউক্লিওটাইড ৩. নিউক্লিওসাইড	১. মনোনিউক্লিওটাইড ২. নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ ৩. পেটোজ সুগার ও নাইট্রোজেন বেস

৬ যকৃৎকের রোগ : নিচে ছক আকারে যকৃৎকের বিভিন্ন প্রকার রোগের নাম ও বর্ণনা দেওয়া হলো :

রোগের নাম	বর্ণনা
হেপাটাইটিস (Hepatitis)	যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলে। সাধারণত যকৃৎ কোষে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এ রোগ হয় এবং হেপাটাইটিস A, B, C, D ও E নামে চিহ্নিত করা হয়।
হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (Hepatic encephalopathy)	যকৃৎ রক্তের বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে অক্ষম হলে সেগুলো রক্তে জমে গিয়ে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি সৃষ্টি করে। এর কারণে মানুষ কোমায় চলে যায় অথবা মৃত্যুবরণ করে।
বাড-কায়ারি সিনড্রোম (Budd-Chiari syndrome)	যকৃতে রক্ত সরবরাহকারী হেপাটিক শিরায় ব্লক সৃষ্টি হলে তাকে বাড-কায়ারি সিনড্রোম বলে।
প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস (Primary biliary cirrhosis)	এটি যকৃতের একটি অটোইমিউন রোগ।
হেপাটোমেগালি (Hepatomegaly)	যকৃৎ অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে যাওয়াকে হেপাটোমেগালি বলে।

১১) গ্যাসদ্বিকথ্যি ও আদ্রিকথ্যি :

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি : পাকস্থলী একটি থলিসদৃশ পেশিবহল অঙ্গ। পাকস্থলীর অন্তর্গতের মিউকোসা স্তর কলামনার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়ামে আবৃত, যাতে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন গ্যাস্ট্রিক পিট বিদ্যমান। এসকল পিটে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে।

আম্রিক গ্রন্থি : অঙ্গের প্রাচীরের মিউকোসা ও সাবমিউকোসা স্তরে যথাক্রমে ক্রিপ্টস অব লিবারকুন (Crypts of liberkuhn) এবং ব্রনার গ্রন্থি (Gland of brunner) নামক দু'ধরনের আম্রিক গ্রন্থি থাকে। ক্রিপ্টস অব লিবারকুন গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, ব্রাশ কোষ ও আরজেনটাফিন কোষ নিয়ে গঠিত। ব্রনার গ্রন্থিগুলো ক্রিপ্টস অব লিবারকুন এ যুক্ত।

৬ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থির নাম :

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির নাম	আন্ত্রিক গ্রন্থির নাম
• মিউকাস কোষ • গবলেট কোষ • প্যারাইটাল কোষ • কার্ডিয়াক গ্রন্থি • জি-কোষ	• ব্রাশকোষ • গবলেট কোষ • প্যানেথ কোষ • আরজেনট্যাফিন কোষ • লিবারকুন - এর গ্রন্থি • ক্রনার - এর গ্রন্থি
☛ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত রস → গ্যাস্ট্রিক রস (gastric juice) ☛ আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত রস → আন্ত্রিক রস/ সাক্রাস ইন্টেরিকাস (Intestinal juice/Succus entericus)	

১১ খাদ্যপরিপাকের সহায়তাকারী হরমোনের ভূমিকা :

খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব হরমোন ক্ষরণ ব্যাহত হলে পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা ঘটে। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (GI) হরমোন নামে পরিচিত।

হরমোন	উৎস	লক্ষ্য অঙ্গ	কাজ
গ্যাসট্রিন	পাকস্থলীর পাইলোরিক অঞ্চল	পাকস্থলী	গ্যাস্ট্রিক এনজাইম উদ্দীপিত করে গ্যাস্ট্রিক জুস এবং পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণ করে।
সিক্রেটিন	ডিওডেনাম	অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ এবং পাকস্থলী	অগ্ন্যাশয় রসে বাইকার্বনেট মুক্ত করে, পিত্ত ক্ষরণ বৃদ্ধি করে এবং গ্যাস্ট্রিক ক্ষরণ হ্রাস করে।
এন্টারো-গ্যাস্ট্রিন	ডিওডেনাম	পাকস্থলী	পাকস্থলীর বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে।
কোলেসিস্টো-কাইনিন/CCK	সুদ্রা	পিত্তথলি ও অগ্ন্যাশয়	পিত্তথলিকে পিত্ত ক্ষরণে এবং অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।
এন্টারোক্রাইনিন	সুদ্রা	সুদ্রা	লিবারকুন এনজাইম উদ্দীপিত করে আক্টিক রসে এনজাইম নিঃসরণ করে।
ডিওক্রাইনিন	ডিওডেনাম	ডিওডেনাম	ক্রনারের এনজাইম উদ্দীপিত করে আক্টিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।
প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড	প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ	অগ্ন্যাশয়	অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।
ভিলিকাইনিন	সুদ্রা	সুদ্রা	ড্রাই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

৬ BMI এর মান নির্দেশিকা :

ব্যক্তির মোট ওজনকে (কিলোগ্রাম) তার উচ্চতার (মিটার) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে দেহভর সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স বা BMI (Body

Mass Index) বলে । $BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (kg)}}{\text{দেহের উচ্চতা (m}^2\text{)}}$, BMI এর মান নির্দেশিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি	ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1.	$< 18.5 \text{ kg/m}^2$	শরীরের কম	4.	$30.0 - 34.9 \text{ kg/m}^2$	হুলতার ১ম স্তর
2.	$18.5 - 24.9 \text{ kg/m}^2$	স্বাভাবিক	5.	$35.0 - 39.9 \text{ kg/m}^2$	হুলতার ২য় স্তর
3.	$25.0 - 29.9 \text{ kg/m}^2$	অতিরিক্ত	6.	$\geq 40.0 \text{ kg/m}^2$	হুলতার ৩য় স্তর

টায়ালিন ও মল্টোজ এনজাইম ক্ষরণ করে- সেরাস কোষ
প্রাণবয়স্ক পুরুষ মানুষে যকৃতের ওজন প্রায়- ১.৫ - ২.০০ কেজি
গ্রাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে- ইনসুলিন
একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পানি গ্রহণ আবশ্যিক- (২ - ৩) লিটার
মানুষের পৌষ্টিক নালিতে পরিপাক সম্পন্ন হয়- আট ধাপে
মানুষের পৌষ্টিক নালি লম্বায়- (৮ - ১০) মিটার
মুখগহ্বরের জিহ্বার তলায় অবস্থিত- সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি
জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে অবস্থিত- আলজিহ্বা
নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে- HCl
“U” আকৃতির ২৫ - ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশটি- ডিওডেনাম
লালাগ্রন্থির ক্ষরণ পানি ধারণ করে শতকরা- ৯৯.৫০ ভাগ
লালাগ্রন্থির ক্ষরণ ইলেকট্রোলাইট ও প্রোটিন ধারা করে শতকরা - ৫০ ভাগ
অ্যাসিড ও বেসকে প্রশমন (বাফার) করতে সাহায্য করে- লালা
দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে লালার- বাইকার্বোনেট
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে- লাইসোজাইম এনজাইম
যকৃৎ রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে প্রায়- ১৫০০ ঘন সে.মি
হিমের লৌহ অংশ যকৃতে জমা থাকে- ফেরিটিন হিসেবে
অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণ- ডিঅ্যামিনেশন
চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K কে শোষণে সহায়তা করে- পিঙ্গলবর্ণ
যকৃতে প্রায় - ৫০০ ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়
আইলেটস অব ল্যাক্সারহ্যান্সে কোষগুচ্ছের সংখ্যা- ১০ লাখ
জিহ্বার পিছনের অংশের স্বাদকোরক সাহায্য করে- তিক্ততা অনুভবে
গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটার পেপটাইড বলা হয়- এন্টারোগ্যাস্ট্রোনকে
ভিলাই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে- ভিল্লিকাইনি
মানুষের অন্ত্রে ভিলাই থাকে প্রায়- ৫০,০০০
ফ্লুক্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ শোষিত হয়- ব্যাপন প্রক্রিয়ায়
স্যালিভারি এন্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ- ইমানোগ্লোবুলিন
পানি শোষণের প্রধান স্থান- ক্ষুদ্রান্ত্র
খাদ্যের ভিটামিন A, D, E, K শোষিত হয়- ক্ষুদ্রান্ত্রে
যকৃৎ ও পিঠিতে গ্রাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে- গ্রুকেজ

- মাইক্রোভিলাইসমূহ একত্রিত হয়ে তৈরি করে- ব্রাশ বর্ডার
- ক্ষুদ্রাঙ্গে পানি শোষণ হয়- অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়
- মিসেলি ক্ষুদ্রাঙ্গে আবরণী কলায় শোষিত হয়- ব্যাপন প্রক্রিয়ায়
- কাইলোমাইক্রোনের উপাদান- প্রোটিন ও লিপিড
- খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ঘটে- বৃহদন্ত্রে
- বৃহদন্ত্রে মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির সংখ্যা- ৫০০
- পরিপাক বর্জ্যে বিদ্যমান পানির কতভাগ কোলনে পুনঃশোষিত হয়- ৮০%
- মল নিষ্কাশিত হওয়ার পূর্বে কোলনে জমা থাকতে পারে- ৩৬ ঘন্টা
- গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে পরিশোষিত হয়- জেজুনায়ে
- প্রাজমা মেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়- ফ্যাটি অ্যাসিড
- বৃহদন্ত্রের পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশকে বলে- মলাশয়
- মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে- গবলেট কোষ
- নিম্নমাত্রার ওজন ধরা হয় BMI এর মান- ১৮.৫ এর নিচে হলে
- ভিলিকাইনিন হরমোন ক্ষরিত হয়- ক্ষুদ্রাঙ্গের ভিলাই থেকে
- প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ বস্তুর বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে- কর্টিসল
- ইমালসিফিকেশনে ভূমিকা রাখে- পিণ্ডরস
- ল্যাকটেজ এনজাইম কোন খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত- শর্করা
- জেজুনায়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে- আত্মিক রস
- ক্ষুদ্রাঙ্গে গবলেট কোষ থাকে- মিউকোসা করে
- মানুষের অঙ্গে ভিলাই থাকে- ৫০ হাজার
- অ্যামিনো অ্যাসিড পরিশোষণে সাহায্য করে- ভিটামিন B₆
- বৃহদন্ত্রে উৎপন্নকারী ভিটামিন হলো- K ও ফলিক অ্যাসিড
- বৃহদন্ত্রে প্রতিদিন কত গ্রাম আর্দ্র মল তৈরি হয়- ১৩৫ গ্রাম
- BMI এর মাত্রা ৫০ - ১০০ হলে এই স্থূলতাকে বলে - মরবিড স্থূলতা
- প্রতিবার গর্ভধারণে নারীদেহে ওজন বেড়ে যায়- ৪ - ৬ পাউন্ড
- নারীদেহে স্থূলতার একটি প্রধান কারণ- পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম
- পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে বাধা দেয়- সিক্রেটিন
- পিণ্ডথলিকে সংকুচিত করে- কোলেসিস্টোকাইনিন
- পেরিস্ট্যালিসিস নিয়ন্ত্রণ করে- মায়োটেরিক প্লেক্সাস

Part 3

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান

গুচ্ছভুক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. পাকস্থলির কোন-কোষ হতে HCl স্রবিত হয়? [Agri Cluster : 22-23]
 A মিউকাস B প্যারাটাল C জি কোষ D পেপটিক কোষ
B Solve • পাকস্থলির প্যারাটাল কোষ হতে HCl স্রবিত হয়।
 • এটি অক্সিনটিক কোষ নামেও পরিচিত।
02. টায়ালিন নিঃসৃত হয় কোন অঙ্গ থেকে? [Agri Cluster : 21-22]
 A পাকস্থলি B লালগ্রন্থি C যকৃৎ D অগ্ন্যাশয়
B Solve • মানুষের মুখের তিনজোড়া লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত
 একপ্রকার বর্ণহীন জলীয় দ্রবণের নাম লাল। যা থেকে টায়ালিন নিঃসৃত হয়।
 • লালায় অবস্থিত মিউসিন খাদ্য দ্রব্যকে নরম ও পিচ্ছিল করে এবং টায়ালিন ও
 মস্টেজ এনজাইম শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে।
03. ল্যাক্টেজ এনজাইম কোন ধরনের খাদ্য পরিপাক করে? [Agri Cluster : 21-22]
 A চর্বি B ভিটামিন C আমিষ D শর্করা
D Solve • ল্যাক্টেজ এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে।
 • ল্যাক্টেজ এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙ্গে এক
 অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।
 • ল্যাক্টোজ + পানি $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ ১ অণু গ্লুকোজ + ১ অণু গ্যালাক্টোজ

04. মানব শরীরে সবচেয়ে বড় গ্রন্থিটির নাম কী? [Agri Cluster : 21-22]

- (A) যকৃৎ
 (B) অগ্ন্যাশয়
 (C) থাইরয়েড
 (D) পিটুইটারি

Solve • মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃৎ যা দেহের ওজনের প্রায় ৩-৫%।

- যকুৎ দেহের প্রধান সংখ্যক কেন্দ্র।

- ক্ষুদ্রাঙ্গ থেকে পরিশোধিত সরল খাদ্য উপাদানসমূহ পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকতে প্রবেশ করে।

05. ইনসুলিন নিঃসরণকারী গ্রন্থির নাম হলো- [Agri Cluster : 20-21]

- (A) যক্ষ
 (B) ফুসফুস
 (C) প্রীহ
 (D) আইলেটস অব ল্যাক্সারহ্যান্স

Solve অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রহি। আইলেটস অব ল্যান্ডারহ্যাপ চার ধরনের কোষে গঠিত। যথা :

- i. আলফা কোষ : থ্রুকাগন i. বিটা কোষ : ইনসুলিন
iii. ডেল্টা কোষ : সোম্যাটোস্ট্যাটিন

- iv. PP কোষ : প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড । (Ref: আজমল)

[illegible]

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

12. কোনটি আমিষ পরিপাকে অংশগ্রহণ করে না? [SylAU : 10-11]
 (A) লাইপেজ (B) ট্রিপসিন (C) পেপসিন (D) কার্বক্সিপেপটাইডেজ
-  **Solve** B, C, ও D অপশনের এনজাইমগুলো আমিষ বা প্রোটিন পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। A অপশনের এনজাইমটি লিপিড বা শ্বেদ জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। [Ref: আজমল]
13. ইউরিয়া তৈরি হয় কোন অঙ্গে? [SylAU : 10-11]
 (A) ত্বক (B) বৃক্ক (C) যকৃৎ (D) মূত্রথলি
-  **Solve** ইউরিয়া হলো নাইট্রোজেনযুক্ত দূষিত পদার্থ। অরনিফিক প্রক্রিয়ায় মানবদেহের যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয়। [Ref: আজমল]

 পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

- [illegible]

11. প্রাণীদেহের মাংসপেশিতে সঞ্চিত শর্করার নাম- [PSTU : 00-01]
 (A) গ্লাইকোজেন (B) স্টার্চ (C) সেলুলোজ (D) কোনোটিই নয়
-  **Solve** প্রাণীদেহের মাংসপেশিতে সঞ্চিত শর্করা হলো গ্লাইকোজেন।
 গ্লাইকোজেন বেশি জমা হয় যকৃতে। [Ref: আজমল]

১.৬ মিটার উচ্চতা ও ৭৪ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির BMI কত?

- $$\text{BMI} = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার^2)}} = \frac{98}{(1.6)^2}$$
- $$= 28.90 \approx 29$$

02. প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত প্রতি 18.6 ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে কত গ্রাম চর্বি জমা হয়? [JGVC : 19-20]

03. দুধের আমিষকে কী বলা হয়? [JGVC : 19-20]
- (A) ফুক্টোজ (B) ভাইটেলিন (C) ল্যাক্টোজ (D) কেসিন

- কেসিন (দুগ্ধ প্রোটিন) + পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন

06. নিচের কোনটি মিশ্র গ্রহি? [JGVC : 18-19]
 (A) লালগ্রহি (B) আভিনাল গ্রহি (C) অগ্ন্যাশয় (D) পিটুইটারি

৩৭. Bile salt (পিস্ত লবণ) কোনটি? [JGVC : 18-19]
- Ⓐ সোডিয়াম গাইকোকোলেট Ⓑ সোডিয়াম টারটারেট

- (i) পানি (৯৭% - ৯৮%) (ii) অজৈব লবণ : সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বোনেট ও ফসফেট (০.৫%), (iii) পিণ্ডলবণ: সোডিয়াম টেট্রাকোলেট ও সোডিয়াম গ্রাইকোকোলেট (০.৮%) (iv) পিণ্ড রন্ধক: বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন (০.২%) (v) কোলেস্টেরল (০.৩৮%) এবং (vi) ফ্যাট (০.৮%) [Ref: আজমল]

পাল্যহস্তি থেকে নিঃসৃত মাল্যবাসে কী কী থাকে? [C'VASU : 18-19]

- JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- (A) হরমোন (B) এনজাইম (C) অ্যাসিড (D) পিণ্ড রঞ্জক
 মানবের পর্বাপাক নালিতে নিম্নসত সিক্রেটিন হলো হরমোন।

03. পিস্তরস কোথায় উৎপন্ন হয়? [CVASU: 16-17]
 (A) অন্ত্রে (B) যকতে (C) পিত্তথলিতে (D) অগ্ন্যাশয়ে

04. কোনাট মানবদেহে পাওয়া যায় না? [CVASU: 16-17]
- (A) চুল (B) নখ (C) হোমোডন্ট দাঁত (D) স্যাক্রাম

06. গ্লাইকোজেন কোথায় বেশি সঞ্চিত হয়? [CVASU: 16-17]

07. কোন ধরনের খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়? [CVASU: 15-16]
 (A) আমিষ (B) শর্করা (C) চর্বি (D) ভিটামিন

08. লালহাঙ্গি থেকে কোন এনজাইম নিঃসৃত হয়? [CVASU: 15-16]
- ☐ A পেপসিন ☒ B ট্রিপসিন ☐ C মকোজ ☐ D টায়ালিন

09. অগ্ন্যাশয় রসে কোন উৎসেচক (enzyme) থাকে? [CVASU: 14-15]

- Solve** অগ্ন্যাশয় রসে অ্যামাইলেজ, মট্টেজ, ট্রিপসিন, লাইপেজ
প্রভৃতি এনজাইম থাকে। [Ref: আজমল]

যকতের ওজন মানব দেহের কত ভাগ? [SGVC : 19-20]

- Solve** পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃতের 1.5-2 কেজি বা দেহের মোট ওজনের 3-5%।

বিত্তন বিবাবিন্যাস-গ্নের কৃষি অনুবদ

- (A) Glucose (B) Fructose (C) Glycogen (D) Sucrose
-  অতিরিক্ত গ্লুকোজকে লিভার ও মাংসপেশি গ্লাইকোজেন

- (A) যকৃতে (B) অগ্ন্যাশয়ে (C) ক্ষুদ্রান্ত্রে (D) বৃহদন্ত্রে
 পোর্টাল শিরা দিয়ে অতিক্রান্ত রক্ত যকৃতের কাপফার কোষ

- (A) ভিটামিন (B) প্রোটিন (C) লিপিড (D) কোনোটিই নয়
 **Solve** লালারসে শুধু শরীরবিশেষী ট্রেনার

- (A) লাল এম্বি (B) অগ্ন্যাশয় (C) মূত্রাশয় (D) যকৃৎ

- সামান্যভাবে সিঙায়ে জমা হয়। [Ref: মাজেদা]

Part 4

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

01. লালারসের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
 (A) কিছুটা অম্লীয় (B) কিছুটা ক্ষারীয়
 (C) তীব্র অম্লীয় (D) তীব্র ক্ষারীয় (Ans A)
 02. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে উৎসচক কোনটি?
 (A) অ্যামাইলেজ (B) পেপসিন
 (C) লাইপেজ (D) মল্টেজ (Ans B)
 03. পাকস্থলীতে HCl তৈরি করে কোন কোষ?
 (A) গবলেট (B) প্যারাইটাল
 (C) মিউকাস (D) কোনোটিই নয় (Ans B)
 04. ইনসুলিন নিঃসরণকারী গ্রন্থির নাম হলো-
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয়
 (C) প্রিহা (D) আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Ans D)
 05. মানবদেহের কোথায় জিলেটিনেজ এনজাইম পাওয়া যায়?
 (A) লালারসে (B) পাকস্থলীরসে
 (C) অগ্ন্যাশয়েরসে (D) আন্ত্রিকরসে (Ans B)
 06. কোথায় অ্যামাইলেজ ও মল্টেজ এনজাইম পাওয়া যায়?
 (A) আন্ত্রিক রসে (B) লালারসে
 (C) অগ্ন্যাশয় রসে (D) পাকস্থলীতে (Ans C)
 07. কোন এনজাইম আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে?
 (A) Pepsin (B) Lipase
 (C) Lactase (D) Trypsin (Ans D)
 08. মানুষে রেনিন (Renin) তৈরি হয় কোন অঙ্গে?
 (A) Stomach (B) Intestine
 (C) Kidney (D) Liver (Ans C)
 09. কোনটি পাকস্থলি হতে নিঃসৃত হয় না?
 (A) ট্রিপসিন (B) পেপসিন
 (C) HCl (D) কোনোটিই নয় (Ans A)
 10. কোন জাতীয় পদার্থের আর্দ্র বিশ্লেষণে অ্যামাইলেজ এনজাইমটি ব্যবহৃত হয়?
 (A) স্টার্চ (B) চর্বি
 (C) সেলুলোজ (D) আমিষ (Ans A)
 11. পাকস্থলির প্রচ্ছদে কয়টি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত?
 (A) তিনটি (B) চারটি
 (C) পাঁচটি (D) দুইটি (Ans C)
 12. যকৃতের বাইরের দিক আবৃতকারী পর্দার নাম কোনটি?
 (A) কোয়াড্রেট (B) কডেট
 (C) গ্রিনস ক্যাপসুল (D) ডানখন্ড (Ans C)
 13. কোন খাদ্য পরিপাকে পিত্তরস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
 (A) শর্করা (B) আমিষ
 (C) লিপিড (D) খনিজ লবণ (Ans C)
 14. অ্যাপেনডিক্স নিচের কোনটির অংশ?
 (A) সিকাম (B) রেঙ্কাম
 (C) সিগময়েড কোলন (D) ডিওডেনাম (Ans A)
 15. রক্তস্রোতে থাকা অতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে যকৃতে সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড হলো-
 (A) সেলুলোজ (B) সুক্রোজ
 (C) স্টার্চ (D) গ্রাইকোজেন (Ans D)
 16. পাকস্থলির পাচক রসে নিচের কোনটি অনুপস্থিত?
 (A) পেপসিন (B) অ্যামাইলেজ
 (C) লাইপেজ (D) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Ans B)
 17. ক্ষুদ্রান্ত্রের সর্বশেষ অংশকে কী বলে?
 (A) পিত্তথলি (B) জেজুনাম
 (C) ডিওডেনাম (D) ইলিয়াম (Ans D)
 18. মুখ গহ্বরে কোন খাদ্যটির আংশিক পরিপাক ঘটে?
 (A) ভিটামিন (B) শর্করা
 (C) আমিষ (D) ফ্যাটি অ্যাসিড (Ans B)
 19. কোন গ্রন্থি (Gland) থেকে ইনসুলিন (Insulin) নিঃসৃত হয়?
 (A) অগ্ন্যাশয় (Pancreas) (B) থাইরয়েড (Thyroid)
 (C) প্রিহা (Spleen) (D) যকৃৎ (Liver) (Ans A)
 20. পাকস্থলির সবচেয়ে বাহিরের স্তরের নাম কি?
 (A) মিউকোসা (B) সাব-মিউকোসা
 (C) মাসকিউলারিস মিউকোসা (D) সেরোসা (Ans D)
 21. গ্যাস্ট্রিক জুস (Gastric Juice) এ পানির পরিমাণ শতকরা কত?
 (A) 95.45 (B) 99.5
 (C) 99.45 (D) 99.5 (Ans C)
 22. মানুষের পিত্তরসের pH কত?
 (A) ৬.৮-৭.৮ (B) ৭.৬-৮.৬
 (C) ৮.৮-৯.৮ (D) কোনোটিই নয় (Ans B)
 23. মানুষের পৌষ্টিকনালি কত মিটার লম্বা?
 (A) ৮-১০ (B) ১০-১২
 (C) ৮-২২ (D) ১০-১৫ (Ans A)
 24. রুগী পাওয়া যায়-
 (A) অম্ল (B) পাকস্থলিতে
 (C) বৃক্ক (D) ডিফাশয়ে (Ans B)
 25. জীবাণু ধ্বংসে কার্যকরী ভূমিকা রাখে কোন ধরনের এনজাইম?
 (A) অ্যামাইলেজ (B) লাইসোসোম
 (C) অ্যান্টিবায়োটিক (D) ইনোলেজ (Ans B)
 26. লিফোসাইট সঞ্চিত থাকে-
 (A) Liver (B) Pancreas
 (C) Spleen (D) Lungs (Ans B)
 27. পিত্তরস পরিপাক তন্ত্রের কোথায় প্রবেশ করে?
 (A) ডিওডেনামে (B) জিনোমে
 (C) সিকামে (D) ইলিয়ামে (Ans A)
 28. ট্রিপসিন পাওয়া যায়-
 (A) আন্ত্রিক রস (B) পাকস্থলির রস
 (C) অগ্ন্যাশয় রস (D) বৃহদন্ত্রে (Ans C)
 29. মানবদেহ হতে সারাদিনে কী পরিমাণ পিত্তরস নিঃসৃত হয়?
 (A) ৬০০-১২০০ মিলি (B) ১০০০-২০০০ মিলি
 (C) ৫০০-১০০০ মিলি (D) ৮০০-৮০০ মিলি (Ans C)
 30. অগ্ন্যাশয় কেমন আকৃতির?
 (A) বাকযন্ত্রের মতো (B) মরিচের মতো
 (C) U আকৃতির (D) A ও B উভয় (Ans D)
 31. বিলিরুবিন কোন বর্ণের রক্তক পদার্থ?
 (A) সবুজ (B) হলুদ
 (C) লাল (D) সাদাটে (Ans B)
 32. অগ্ন্যাশয়ের ক্ষারীয় তরলে কতটি প্রধান এনজাইম থাকে?
 (A) ২টি (B) ১টি
 (C) ৪টি (D) ৩টি (Ans D)
 33. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচক রস কোনটি?
 (A) অ্যামাইলেজ (B) টায়ালিন
 (C) ল্যাক্টেজ (D) পিত্ত (Ans A)

SELF TEST

01. নিচের কোনটি মানবদেহের বৃহদন্ত্রের অংশ?
 - Ⓐ জেজুনাম
 - Ⓑ ডিওডেনাম
 - Ⓒ সিকাম
 - Ⓓ ইলিয়াম
 02. যকৃত কোন প্রোটিন সংশ্লেষ করতে পারে না-
 - Ⓐ অ্যালবুমিন
 - Ⓑ লিপোপ্রোটিন
 - Ⓒ ট্রান্সফারিন
 - Ⓓ γ -গ্লোবিউলিন
 03. জটিল শর্করা ডেসে মল্টোজে পরিণত হতে যে এনজাইম লাগে-
 - Ⓐ সুক্রোজ
 - Ⓑ টায়ালিন
 - Ⓒ মল্টেজ
 - Ⓓ লাইপেজ
 04. ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণ করে-
 - Ⓐ আলফাকোষ
 - Ⓑ বিটাকোষ
 - Ⓒ ডেল্টাকোষ
 - Ⓓ পিপি কোষ
 05. মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণতলের ক্ষেত্রফল-
 - Ⓐ 2 বর্গমিটার
 - Ⓑ 4 বর্গমিটার
 - Ⓒ 8 বর্গমিটার
 - Ⓓ 10 বর্গমিটার
 06. মানবদেহে মাংস পরিপাকে কোন এনজাইমটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে?
 - Ⓐ কাইমোট্রিপসিন
 - Ⓑ লাইপেজ
 - Ⓒ সুক্রোজ
 - Ⓓ টায়ালিন
 07. মানবদেহে গ্রাইকোজেন কোথায় জমা হয়?
 - Ⓐ গ্রীহ
 - Ⓑ কিডনি
 - Ⓒ যকৃত
 - Ⓓ ফুসফুস
 08. "অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার" কোথায় পাওয়া যায়?
 - Ⓐ যকৃত
 - Ⓑ লানাহ্রি
 - Ⓒ অগ্ন্যাশয়
 - Ⓓ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
 09. আক্লেস দাঁত কোন ধরনের দাঁত?
 - Ⓐ কর্তন
 - Ⓑ ছেদন
 - Ⓒ অগ্রপেষণ
 - Ⓓ পেষণ
 10. মানবদেহের Organic laboratory হলো-
 - Ⓐ মস্তিষ্ক
 - Ⓑ হৃৎপিণ্ড
 - Ⓒ যকৃত
 - Ⓓ অগ্ন্যাশয়
 11. মানব লালারস থেকে নিঃসৃত লালারসে কি থাকে?
 - Ⓐ পেপসিন ও রেনিন
 - Ⓑ পেপসিন ও টায়ালিন
 - Ⓒ রেনিন ও মল্টেজ
 - Ⓓ টায়ালিন ও মল্টেজ
 12. স্নানব শরীরে বাতাসিক কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট যেসব পদার্থ বিষময়তার সৃষ্টি করে, তা কোন অঙ্গদ্বারা প্রশমিত হয়?
 - Ⓐ হৃৎপিণ্ড
 - Ⓑ যকৃত
 - Ⓒ বৃক্ক
 - Ⓓ অগ্ন্যাশয়
 13. শর্করা পরিপাককারী এনজাইম কোনটি?
 - Ⓐ রেনিন
 - Ⓑ টায়ালিন
 - Ⓒ পেপসিন
 - Ⓓ প্রোরেনিন
 14. প্রোটিনাইটিক এনজাইম নিম্নের কোন খাদ্যকে পরিপাক করে?
 - Ⓐ ভাত
 - Ⓑ মাছ
 - Ⓒ মাখন
 - Ⓓ শাক
 15. কাইমোমাইক্রন যে খাবার শোষণে ভূমিকা রাখে-
 - Ⓐ শর্করা
 - Ⓑ আমিষ
 - Ⓒ চর্বি
 - Ⓓ সবগুলো সঠিক
 16. মিউসিন এক প্রকার-
 - Ⓐ গ্রাইকোপ্রোটিন
 - Ⓑ লিপোপ্রোটিন
 - Ⓒ প্রোটিন
 - Ⓓ লিপিড
 17. আইসোটস অব ল্যাক্সারহ্যান্স-এ কয় ধরনের কোষ থাকে?
 - Ⓐ 3
 - Ⓑ 4
 - Ⓒ 5
 - Ⓓ 6
 18. কোনটি অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত এনজাইম?
 - Ⓐ পেপসিন
 - Ⓑ রেনিন
 - Ⓒ কাইমোট্রিপসিন
 - Ⓓ জিলেটিনেজ
 19. পাকস্থলির সর্ব অভ্যন্তরস্থ স্তরের নাম কী?
 - Ⓐ সেরোসা
 - Ⓑ সাবমিউকোসা
 - Ⓒ মিউকোসা
 - Ⓓ মাসকিউলারিস মিউকোসা
 20. কোনটি দুধের প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম?
 - Ⓐ পেপসিন
 - Ⓑ ট্রিপসিন
 - Ⓒ ক্যাসেইন
 - Ⓓ রেনিন
 21. পাকস্থলীতে HCl ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে-
 - Ⓐ গ্যাস্ট্রিন
 - Ⓑ সিক্রেটিন
 - Ⓒ এন্টারোক্রাইনিন
 - Ⓓ পেপটাইড
 22. অ্যামিনো অ্যাসিড ও গ্লিসারল থেকে কোথায় গ্লুকোজ সংশ্লেষণ ঘটে?
 - Ⓐ পাকস্থলিতে
 - Ⓑ যকৃতে
 - Ⓒ বৃক্কে
 - Ⓓ মাংসপেশিতে
 23. মানবদেহের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থি হলো-
 - Ⓐ হৃৎপিণ্ড
 - Ⓑ ফুসফুস
 - Ⓒ পিত্ত থলি
 - Ⓓ যকৃত
 24. নিচের কোনটি খাদ্য পরিপাকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়?
 - Ⓐ ট্রিপসিন
 - Ⓑ লাইপেজ
 - Ⓒ কোলাজিনেজ
 - Ⓓ ইনসুলিন
 25. পাকস্থলির প্রাচীর হতে ক্ষরিত হরমোনের নাম কী?
 - Ⓐ টায়ালিন
 - Ⓑ রেনিন
 - Ⓒ ট্রিপসিন
 - Ⓓ গ্যাস্ট্রিন
 26. অধিকাংশ খনিজ লবণ শোষিত হয় কোথায়?
 - Ⓐ বৃহদন্ত্রের ভিলাই প্রাচীরে
 - Ⓑ ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই প্রাচীরে
 - Ⓒ জেজুনামের ভিলাই প্রাচীরে
 - Ⓓ পাকস্থলির ভিলাই প্রাচীরে
 27. অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার অগ্ন্যাশয় থেকে বের হয়ে নিচের কোন অঙ্গে প্রবেশ করে?
 - Ⓐ ডিওডেনাম
 - Ⓑ পিত্তথলি
 - Ⓒ যকৃত
 - Ⓓ পাকস্থলি
 28. খাদ্য পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম কি?
 - Ⓐ ইনসুলিন
 - Ⓑ রেনিন
 - Ⓒ সিক্রেটিন
 - Ⓓ সোমোটোস্ট্যাটিন
 29. কোনটি হরমোন-
 - Ⓐ পেপসিনোজেন
 - Ⓑ গ্যাস্ট্রিন
 - Ⓒ রেনিন
 - Ⓓ কেসিন
 30. নিচের কোন প্রক্রিয়ায় গ্লিসারল থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়?
 - Ⓐ গ্লুকোনিওজেনেসিস
 - Ⓑ গ্রাইকোজেনেসিস
 - Ⓒ গ্রাইকোজেনোলাইসিস
 - Ⓓ গ্রাইকোলাইসিস

OMR				
01.ABCD	02.ABCD	03.ABCD	04.ABCD	05.ABCD
06.ABCD	07.ABCD	08.ABCD	09.ABCD	10.ABCD
11.ABCD	12.ABCD	13.ABCD	14.ABCD	15.ABCD
16.ABCD	17.ABCD	18.ABCD	19.ABCD	20.ABCD
21.ABCD	22.ABCD	23.ABCD	24.ABCD	25.ABCD
26.ABCD	27.ABCD	29.ABCD	29.ABCD	30.ABCD

Answer										
30.A	29.B	28.C	27.A	26.B	25.D	24.D	23.D	22.B	21.A	
20.D	19.C	18.C	17.B	16.A	15.C	14.B	13.B	12.B	11.D	
10.C	09.D	08.C	07.C	06.A	05.D	04.B	03.B	02.D	01.C	

মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সংগলন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

[Ref: আজমল]

২। রক্তনালির এন্ডোথেলিয়াম প্রাচীর অত্যন্ত মসৃণ থাকায়।

৪। সক্রিয় কোয়াণ্টলেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে যুক্ত কর্তৃক সর্বদা অপসারিত হওয়ায়। [Ref: আজমল]

ফ্যাক্টর	নাম	ফ্যাক্টর	নাম	ফ্যাক্টর	নাম
I	Fibrinogen	VI	Accelerin	XI	Antihaemophilic factor C
II	Prothrombin	VII	Proconvertin	XII	Hageman factor
III	Thromboplastin	VIII	Antihaemophilic factor A	XIII	Fibrin stabilising factor
IV	Calcium ion	IX	Christmas factor		
V	Proaccelerin	X	Antihaemophilic factor B		

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্রদেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে হৃৎপিণ্ড বলে।

আবরণ: হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণ দিয়ে আবৃত। এর নাম পেরিকার্ডিয়াম।

প্রাচীর: হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশিতে গঠিত। এসব পেশি ইংলিশ বা কার্ডিয়াক পেশি নামে পরিচিত। পেশিগুলো তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। যেমন :

(ii) **এপিকার্ডিয়াম** : এটি হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে বাইরের স্তর। চর্বি লেগে থাকে এ স্তরে।

(ii) মায়োকর্ডিয়াম : এটি হৃৎপিণ্ডের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলোই হৃৎপিণ্ড সংকোচন প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(iii) এভোকার্ডিয়াম: এটি হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গত স্তর যা হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎপিণ্ড কপাটিকাগুলো ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

বিষয়	হৃৎপিণ্ড (রক্ত সংবহনতন্ত্র)
অংশ	■ ডান অ্যাড্রিয়াম (বড়, বাম-ছোট) ■ বাম অ্যাড্রিয়াম ■ ডান ভেন্ট্রিকল (বড়, বাম-ছোট) ■ বাম ভেন্ট্রিকল (প্রাচীর ৩ গুণ পুরু) ■ আন্তঃঅ্যাড্রিয়াল পর্দা ■ আন্তঃভেন্ট্রিকুলার পর্দা
আবরণ	পেরিকার্ডিয়াম : ■ পেরিকার্ডিয়ামের বাহিরের স্তর প্যারাইটাল ■ পেরিকার্ডিয়ামের ভিতরের স্তর ভিসেরাল ■ স্তর দুটির মাঝখানে : পেরিকার্ডিয়াল তরল/ফ্লুইড (হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে)
প্রাচীর	■ প্রাচীর গঠনকারী পেশি → কার্ডিয়াক পেশি ■ প্রাচীর তিনস্তরে বিভক্ত • এপিকার্ডিয়াম → চর্বি লেগে থাকে • মায়োকার্ডিয়াম → সংকোচন-প্রসারণে সাহায্য করে • এন্ডোকার্ডিয়াম → কপাটিকা গঠিত
কপাটিকা	■ বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকা- বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ে সংযোগস্থলে ■ ট্রাইকাসপিড কপাটিকা- ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে ■ অ্যাওর্টিক কপাটিকা- বাম নিলয় ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে ■ পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা- ডান নিলয় ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে ■ থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা- করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে ■ ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা- ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে
রং এবং আকৃতি	লালচে ত্রিকোণাকার
যা প্রবেশ করে	সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা, ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা → ডান অ্যাড্রিয়ামে, পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাড্রিয়ামে
যা বের হয়	অ্যাওর্টা বা মহাধমনি → বাম ভেন্ট্রিকলে, পালমোনারি ধমনি → ডান ভেন্ট্রিকলে
সংখ্যা মান	ওজন : পুরুষ → 250-390g, স্ত্রী → 200-275g
ক্ষরণ	ANF (অ্যান্টি ন্যাট্রি ইউরেটিক ফ্যাক্টর)

মাছের হৃৎপিণ্ড	মানুষের হৃৎপিণ্ড
১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২. ১টি অ্যাক্সিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।	২. ২টি অ্যাক্সিয়াম ও ২টি ভেন্ট্রিকল।
৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।	৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই।
৪. কেবল CO ₂ সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৪. O ₂ সমৃদ্ধ ও CO ₂ সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে।
৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।	৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।

- ধর্মনির উপপত্তিহীন → হৃৎপিণ্ড
- শিরার উপপত্তিহীন → কৈশিক নালি
- ফুসফুসীয় শিরার সমাপ্তিহীন → বাম অলিন্দ
- মানুষের অ্যাণ্ডটার উপপত্তিহীন → বাম নিলয়

কিছু শারীরিক উপসর্গ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করোনার হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়, যা পরবর্তী সময় চিকিৎসার ধরন ঠিক করতে সাহায্য করে। নিচে এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ করা হলো :

✍️ হৃদরোগের চিকিৎসা : পেসমেকার (Pacemaker)

☞ পেসমেকোরের সুবিধা : এটি বিপদজনক হার্টবিট Long QT Syndrome (LQTS) নিয়ন্ত্রণ করে।

At a glance [Most Important Information]

- প্রাঞ্জমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত হয়- লসিকা
- একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্ত থাকে- প্রায় ৫-৬ লিটার
- দেহের মোট ওজনের- প্রায় ৮% রক্ত
- এরিথ্রোসাইট সৃষ্টিকে বলে- এরিথ্রোপোয়েসিস
- রক্তে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপন্ন করে- লোহিত রক্তকণিকা
- গ্র্যানিউলোসাইটের নিউক্লিয়াস- (২-৭টি) ঋণযুক্ত
- অস্থিমজ্জার যে কোষ থেকে গ্র্যানিউলোসাইট উৎপন্ন হয়- মাইেলোব্লাস্ট
- অণুচক্রিকার আয়ুষ্কাল- (৫-৯) দিন
- অস্থায়ী প্রেইটলেট প্রাগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে- অণুচক্রিকা
- রক্তপাত মধুর ও বন্ধ করা হয় যে উপায়ে- হিমোস্টেসিস
- জমাট রক্ত থেকে যে হলুদ তরল বেরিয়ে আসে সেটি হলো- সিরাম
- স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্ততঞ্চনকাল হচ্ছে- (৪-৫) মিনিট
- সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা কোন প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়- বাম নিলয়
- ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলার সময় কোন শব্দের সৃষ্টি হয়- লাব সদৃশ
- মানুষের রক্তসংবহন- দ্বি-চক্রীয় সংবহন
- হৃৎস্পন্দন শুরু হয়- SAN (Sino atrial node) থেকে
- সংরক্ষিত ছন্দ নিয়ামক বলা হয়- AVN (Atrio-ventricular node)
- SAN থেকে প্রতি মিনিটে গড়ে কতটি স্পন্দন উৎপন্ন হয়- ৭২ বার
- AV Node মিনিটে স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে- ৫০ বার
- হিজের বাস্তলের স্পন্দন হার প্রতি মিনিটে- ৩৬ বার
- বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা হ্রাযী হয়- (৫-৩০) মিনিট
- অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পেশিতে পৌঁছায়- করোনারি ধমনির মাধ্যমে
- হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়- বুকের X-ray এর মাধ্যমে
- হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে- ইসিজি

শেরবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. অনুচক্রিকার কাজ নয়- [SAU : 18-19]
 A) হিমোস্ট্যাটিক প্রাণ তৈরি B) এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন
 C) হেপারিন উৎপন্ন করা D) সেরোটিনিন উৎপন্ন করা
Solve Option A, B; D অনুচক্রিকার কাজ এবং Option C শ্বেত রক্তকণিকার বেসোফিল উৎপন্ন করে, যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। [Ref: আজমল]
02. কোনটি এনজিওপ্রাস্টিট প্রকারভেদ নয়? [SAU : 18-19]
 A) করোনারি স্টেনটিং B) অ্যাথেরোস্কলিটমি
 C) বেলুন এনজিওপ্রাস্টিট D) করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং
Solve প্রাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্রাস্টিট ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এনজিওপ্রাস্টিট ৪ ধরনের। যথা: ১. বেলুন এনজিওপ্রাস্টিট ২. লেজার এনজিওপ্রাস্টিট ৩. অ্যাথেরোস্কলিটমি ও ৪. করোনারি স্টেনটিং। [Ref: আজমল]
03. হৃৎকেন্দ্র গড় সময়কাল কত সেকেন্ড? [SAU : 17-18]
 A) 0.7 B) 0.1 C) 0.8 D) 0.3 **Ans C**
04. হৃৎপিণ্ডের ডান অলিঙ্গের সাথে নিচের কোনটি যুক্ত থাকে? [SAU : 17-18]
 A) সিস্টেমিক মহাধমনি B) পালমোনারি ধমনি
 C) পালমোনারি শিরা D) উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা **Ans D**
05. RBC এর আয়ুষ্কাল কত দিন? [SAU : 16-17]
 A) 75 B) 80 C) 120 D) 150
Solve মানুষের লোহিত রক্তকণিকাকে সংক্ষেপে RBC বলে। RBC এর আয়ুষ্কাল ১২০ দিন বা চার মাস। [Ref: আজমল]
06. মানুষের হৃৎপিণ্ডের ভেতরে রক্ত প্রবেশে সাহায্য করে কোন কপাটিকা? [SAU : 16-17]
 A) সেমিলুনার কপাটিকা B) বাইকাসপিড কপাটিকা
 C) অ্যাওর্টা D) বাম পালমোনারি ধমনি
Solve হৃৎপিণ্ডের ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা হৃৎপিণ্ডের ভেতরে রক্ত প্রবেশে সাহায্য করে। [Ref: আজমল]
07. কোন কোষটি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে? [SAU : 14-15]
 A) মনোসাইট B) লিম্ফোসাইট
 C) বেসোফিল D) নিউট্রোফিল
Solve শ্বেত রক্তকণিকার অন্যতম প্রধান কণিকা হলো লিম্ফোসাইট। লিম্ফোসাইট থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। [Ref: আজমল]
08. কোন শ্বেতকণিকার নিউক্লিয়াসটি দুই লোব বিশিষ্ট? [SAU : 13-14]
 A) নিউট্রোফিল B) ইউসিনোফিল
 C) মনোসাইট D) লিম্ফোসাইট
Solve নিউট্রোফিল ২-৫টি খণ্ডে বিভক্ত। মনোসাইট সর্ববৃহৎ শ্বেতরক্তকণিকা। [Ref: আজমল]
09. কোন কোষটি হেপারিন নিঃসরণ করে? [SAU : 13-14]
 A) নিউট্রোফিল B) বেসোফিল C) ইউসিনোফিল D) লিম্ফোসাইট
Solve বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে যা রক্ত প্রবাহের মধ্যে রক্ত জমাট বাধতে বাধা দেয়। [Ref: আজমল]
10. কোনটির প্রভাবে রক্ত জমাট বাঁধে না? [SAU : 11-12]
 A) অ্যাড্রেনালিন B) বিলিরুবিন C) হেপারিন D) ইনসুলিন
Solve শ্বেতরক্তকণিকার বেসোফিল হেপারিন তৈরি করে যা রক্ত প্রবাহে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। [Ref: আজমল]
11. স্নায়ুগতির নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ কোনটি? [SAU : 09-10]
 A) নিউরন B) লোহিত রক্তকণিকা
 C) পেশিকোষ D) শ্বেত রক্তকণিকা
Solve স্নায়ুগতির প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন।
12. ব্যাঙে হেপাটিক পোর্টাল শিরা রক্ত বহন করে- [SAU : 08-09]
 A) যকৃতে B) হৃৎপিণ্ডে C) বৃক্কে D) পাকস্থলিতে
Solve ব্যাঙে হেপাটিক পোর্টাল শিরা রক্ত বহন করে যকৃতে।

13. মানবদেহে অণুচক্রিকার প্রাথমিক কাজ- [SAU : 07-08]

- A) রক্ত জমাট বাধানো B) জোড়া বাধা
 C) ডাঙন তৈরি D) খোলস বদলানো
Solve অণুচক্রিকা রক্ত তন্ত্রে অংশ নেয়। রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রহ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠনে অংশ নেয়।
14. দেহাভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন? [SAU : 05-06]
 A) রক্তে হেপারিন থাকায় B) রক্ত চলাচলের জন্য
 C) মাংস পেশির ক্রিয়ায় D) জারণ ক্রিয়ায়
Solve রক্তে হেপারিন রক্তকে দেহাভ্যন্তরে জমাট বাঁধতে দেয় না।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. স্নায়ুগতির নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ কোনটি? [SylAU : 18-19]
 A) নিউরন B) লোহিত কণিকা C) পেশিকোষ D) শ্বেত রক্তকণিকা
Solve কিছু সংখ্যক প্রকৃতকোষ, যেমন : সিড কোষ, মানুষের লোহিত রক্তকণিকা প্রভৃতিতে পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াসও থাকতে পারে যেমন : *Vaucheria*, *Botrydium*, *Sphaeroplea* ইত্যাদি শৈবাল ও *Penicillium* সহ কতিপয় ছত্রাক। [Ref: হাসান]
02. নিচের কোনটি মানবদেহের Natural pacemaker নামে পরিচিত? [SylAU : 18-19]
 A) Sino-Atrial Node B) Atrio-Ventricular Node
 C) Purkinje Fibre D) Bundle of HIS
Solve মানুষের হৃৎপিণ্ডে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড হচ্ছে পেসমেকার যা প্রাকৃতিক পেসমেকার নামে পরিচিত। অন্যটি যান্ত্রিক পেসমেকার যা অসুস্থ প্রাকৃতিক পেসমেকারকে নজরদারির মধ্যে রাখে। [Ref: আজমল]
03. মানুষের রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকার অনুপাত কত? [SylAU : 18-19]
 A) ৭০০ : ১ B) ৫০০ : ১ C) ১ : ৫০০ D) ১ : ৬০০
Solve মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৪-১১ হাজার (গড়ে ৫০০০) শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে এ সংখ্যা বেড়ে যায়। মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা :
 • জন্মদেহে : ৮০ - ৯০ লাখ
 • শিশুর দেহে : ৬০ - ৭০ লাখ
 • পূর্ণবয়স্ক পুরুষে : ৫০ লাখ
 • পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে : ৪৫ লাখ [Ref: আজমল]
04. বসা অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্পন্দন চাপ কত? [SylAU : 17-18]
 A) 15-25 mm Hg B) 30-40mm Hg
 C) 50-60 mm Hg D) 65-75mm Hg
Solve সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের পার্থক্যকে নাড়ি রক্তচাপ বলে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষে স্বাভাবিক নাড়ি রক্তচাপ ৪০ মি.মি (১২০ মি.মি - ৮০ মি.মি) পারদ চাপের সমান। [Ref: মেঘনাদ]
05. হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম কী? [SylAU : 16-17]
 A) মায়োকার্ডিয়াল ইন্ফেকশন B) হার্ট ফেইলিউর
 C) অ্যানজাইনা পেকটোরিস D) মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন
Solve হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। মায়োকার্ডিয়াল অর্থ হৃৎপেশি, আর ইনফার্কশন অর্থ অপর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহের কারণে টিস্যুর মৃত্যু। [Ref: আজমল]
06. মানুষের লোহিত রক্তকণিকা কোন ধরনের? [SylAU : 16-17]
 A) উত্তল B) দ্বিউত্তল C) দ্বিঅবতল D) সমতল
Solve মানুষের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, দ্বিঅবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো ও লাল বর্ণের। পূর্ণবয়স্ক পুরুষে ৫০ লক্ষ এবং স্ত্রীতে ৪৫ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা বিদ্যমান। [Ref: আজমল]
07. মানবদেহে লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকার অনুপাত- [SylAU : 15-16]
 A) 300 : 1 B) 400 : 1 C) 500 : 1 D) 600 : 1
Solve মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত ৬০০:১। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের রোগজীবাণু ডক্ষণ করে।

- Solve**

[Ref : আলীম]

Solve যকৃৎ ও গ্লিহাতে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে যকৃৎ ও গ্লিহাকে RBC এর কবরস্থান বলা হয়। [Ref: মাজেদা]

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

Ans D

Ans D

Ans B

Ans A

Ans (B)

Ans C

Ans C

100

100

200

PUBLICATION

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এর গড় ব্যাস আকৃতির ভিন্নতা অনুসারে $7.5-20 \mu\text{m}$ । [Ref: মাজেদা]

অ্যাড্রিয়াম। [Ref: আজমল]

হচ্ছে প্রেসার মাপার যন্ত্র।

Ans A

Ans B

Ans D

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

•

10

1

...



ANS D

Ans C

SELF TEST

18. হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামের সাথে নিচের সংযুক্ত থাকে?
 - Ⓐ পালমোনারি শিরা
 - Ⓑ পালমোনারি ধমনী
 - Ⓒ সিস্টেমিক মহাধমনী
 - Ⓓ উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা
 19. রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে কোন ফ্যাক্টরটি হেপারিনকে একেজো করে দেয়?
 - Ⓐ থ্রম্বিন
 - Ⓑ থ্রম্বোপ্লাষ্টিন
 - Ⓒ ফাইব্রিনোজেন
 - Ⓓ ক্যালসিয়াম আয়ন
 20. সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড হৃৎপিণ্ডের কোথায় অবস্থিত?
 - Ⓐ ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে
 - Ⓑ বাঁম অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে
 - Ⓒ ডান ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে
 - Ⓓ বাঁম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে
 21. রক্ত জমাটে সাহায্য করে এমন কোন ভিটামিন সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায়?
 - Ⓐ ভিটামিন-D
 - Ⓑ ভিটামিন-E
 - Ⓒ ভিটামিন-K
 - Ⓓ ভিটামিন-A
 22. কোন বানানটি সঠিক?
 - Ⓐ Sphygmonanometer
 - Ⓑ Sphygmomanometer
 - Ⓒ Sphygmometer
 - Ⓓ Sphygmomanometer
 23. মানুষের হৃৎপিণ্ডের ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটির নাম-
 - Ⓐ এপেন্ড্র
 - Ⓑ বেস
 - Ⓒ ভেন্ট্রিকল
 - Ⓓ অ্যাট্রিয়াম
 24. রক্তের অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে কোন লিউকোসাইট?
 - Ⓐ মনোসাইট
 - Ⓑ লিম্ফোসাইট
 - Ⓒ বেসোফিল
 - Ⓓ ইওসিনোফিল
 25. হৃৎচক্র সম্পন্ন করতে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের স্থিতিকাল যথাক্রমে-
 - Ⓐ 0.3s ও 0.5s
 - Ⓑ 0.3s ও 0.7s
 - Ⓒ 0.1s ও 0.7s
 - Ⓓ 0.1s ও 0.5s
 26. রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় কোন আয়ন প্রোথ্রমিনকে সক্রিয় থ্রম্বিন এ রূপান্তরে সাহায্য করে?
 - Ⓐ Fe^{2+}
 - Ⓑ Ca^{2+}
 - Ⓒ Mg^{2+}
 - Ⓓ Mn^{2+}
 27. রক্তনাশির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাসকারী রাসায়নিক পদার্থ কোনটি?
 - Ⓐ ফাইব্রিন
 - Ⓑ সেরাটেনিন
 - Ⓒ হিস্টামিন
 - Ⓓ প্রোথ্রমিন
 28. রক্তের আণুবীক্ষণিক সৈনিক কারা?
 - Ⓐ লিম্ফোসাইট
 - Ⓑ নিউট্রোফিল
 - Ⓒ মনোসাইট
 - Ⓓ ইওসিনোফিল
 29. লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ভেঙে সৃষ্টি হয়-
 - Ⓐ গ্লিসারল ও কোলিন
 - Ⓑ ভিটামিন- E ও K
 - Ⓒ ইন্টারভেজ ও ইরেপসিন
 - Ⓓ বিলিভার্ডিন ও বিলিরুবিন
 30. নিচের কোন অঙ্গে অণুচক্রিকা সঞ্চিত থাকে?
 - Ⓐ মস্তিষ্ক
 - Ⓑ যকৃৎ
 - Ⓒ ক্ষুদ্রান্ত্র
 - Ⓓ প্লীহা

Answer									
30.D	29.D	28.A	27.B	26.B	25.A	24.D	23.A	22.D	21.C
20.A	19.B	18.D	17.B	16.B	15.A	14.A	13.A	12.B	11.C
10.B	09.A	08.B	07.B	06.D	05.A	04.A	03.B	02.B	01.D

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩. হিমোগ্রোবিনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য :

- শ্বাসনালির সংক্রমণ (Respiratory tract infection) :

৬ শ্বসননালির সংক্রমণের প্রকারভেদ (V.V.I):

২. সাইনাসের নাম, অবস্থান ও প্রদাহ (Must to know):

📌 **শ্বাসনালির সমস্যা : সাইনুসাইটিস (Sinusitis)**

৩. স্থায়িত্বভেদে সাইনুসাইটিসের কারণ :

ক. যেসব অণুজীব দ্বারা সাইনুসাইটিস হয়ে থাকে :

৬ সাইনসাইটিসের লক্ষণ :

সাইনুসাইটিসের লক্ষণ :	- জ্বর জ্বর ভাব - নাক থেকে হলুদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়।
লক্ষণ	- তীব্র মাথা ব্যথা - কাশি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

... ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে ...

- ৬ সাইনুসাইটিসের প্রকারভেদ : স্থায়িত্বভেদে সাইনুসাইটিস দুই প্রকার। যথা:

শ্বাসনালির সমস্যা : ওটিটিস মিডিয়া (Otitis Media)

৬. ওটিটিস মিডিয়ায় কারণ :

৪. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল ফলে বন্ধ হয়ে গেলে।

৫. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠান্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

(i) কানে ব্যথা হয় এবং কান টানতে থাকে।

- (iii) দেহে বেশি তাপসহ (108°F) জ্বর থাকে তাই ঘুমাতে পারে না।

- (iv) নাক দিয়ে পানি ঝরে, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।

(২) মাথা ঝিম ঝিম করা এবং প্রচণ্ড মাথা ব্যথা।

- ৬ বিভিন্ন প্রকার গুটিটিস মিডিয়াৰ নাম ও জটিলতা

- | | |
|------------------------|--|
| ଅନିମିତ୍ତ ସିଦ୍ଧିହୀନ ନାମ | |
|------------------------|--|

৬ ওটিটিস মিডিয়া'র প্রকারভেদ :

৬. ওটিটিস মিডিয়া লক্ষণ অনুসারে প্রতিকার :

কান দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ার মতো অবস্থা বার বার ঘটলে নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ (ENT Specialist) চিকিৎসকের মাধ্যমে টিম্প্যানোস্টোমি টিউব নামে বিশেষ নলের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

At a glance [Most Important Information]

- বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে অবস্থিত- ডায়াফ্রাম
- লোহিত কণিকার মাধ্যমে CO_2 পরিবাহিত হয়- KHCO_3 রূপে
- লোহিত রক্তকণিকার প্রধান প্রোটিনের নাম- হিমোগ্লোবিন
- অক্সিজেন পরিবহণে প্রধান ভূমিকা পালন করে- হিমোগ্লোবিন
- হিমে লৌহের পরিমাণ- ৩৩.৩৩%
- পূর্ববয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে লৌহ থাকে- ৪-৫ গ্রাম
- শ্বাসপেশিতে স্নায়ুস্পন্দন পাঠায়- শ্বাসকেন্দ্র
- কোষে খাদ্যবস্তুর সংঘটিত হয়- জারণক্রিয়া
- খাদ্যের জারণ বেশি হয়- শর্করার
- কোষের সাইটোপ্লাজমের তরল অংশে সংঘটিত হয়- গ্লাইকোলাইসিস



সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ

01. কানের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে কী বলে? [SGVC: 19-20]

(A) Otitis Media
 (B) Sinusitis
 (C) Emphysema
 (D) Bronchitis

Solve বিভিন্ন প্রকার রোগ :

রোগ	রোগের কারণ
Otitis Media	কানের সংক্রমনজনিত প্রদাহ
Sinusitis	সাইনাসের প্রদাহ
Emphysema	ফুসফুসের প্রদাহ
Bronchitis	শ্বাসনালির সংক্রমন



বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ

01. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন প্রাক্কমায় ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়? [KU : 19-20]

(A) 0.1
 (B) 0.2
 (C) 2.0
 (D) 1.0

Solve প্রতি ১০০ মি. লি. রক্তে ০.২ মি. লি. (অর্থাৎ ০.২%) O_2 ভৌত দ্রবরূপে পরিবাহিত হয় এবং ৫ মি. লি. CO_2 (অর্থাৎ ৫%) ভৌত দ্রবরূপে পরিবাহিত হয়। [Ref: আজমল]

02. মধ্যকর্ণের Otitis media রোগ কোন জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হয়? [KU : 19-20]

Ⓐ Bacteria Ⓑ Fungus Ⓒ Protozoa Ⓓ Virus

Ans. A.B.D. Solve মধ্যকারের ওটাইটিস মিডিয়া প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে হয়ে থাকে। Respiratory Syncytial Virus (RSV), Influenza virus, Rhinovirus এবং *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে ওটাইটিস মিডিয়া রোগ হয়।

03. কোন সাইনাসের কারণে মানুষের গাল, দাঁত ও মাথায় ব্যথা হয়? [JUST : 19-20]

Ⓐ Frontal Ⓑ Maxillary Ⓒ Ethmoid Ⓓ Sphenoid

ম্যাক্সিলারি সাইনাস	গালে, দাঁতে ও মাথাব্যথা।
ফ্রন্টাল সাইনাস	চোখের উপরে ব্যথা, মাথাব্যথা।
এথময়ডাল সাইনাস	দুচোখের পিছনে ব্যথা, মাথাব্যথা।
স্ফেনয়ডাল সাইনাস	চোখের পিছনে ব্যথা

[Ref : মাজেদা]

04. মানুষের স্বরযন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো তরুণাঙ্গি কোনটি? [RU : 19-20]

(A) ক্রিকয়েড (B) এপিগ্লটিস (C) অ্যারিটনয়েড (D) অ্যাডাম'স আপল

Solve স্বরযন্ত্রের থাইরয়েড তরুণাঙ্ঘি সবচেয়ে বড়ো এবং পুরুষে এটি বাইরে থেকে দেখা যায়, যাকে Adam's apple বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে থাকা Epiglottis খাদ্যদ্রব্য শ্বাসনালিতে প্রবেশে বাধা দেয়। [Ref: আজমল]

Part 4

শুরুত্বপূর্ণ MCQ

01. ন্যাসাল সেপ্টামের সংখ্যা-
 (A) ১টি (B) ২টি (C) ৩টি (D) ৪টি (Ans: A)
 02. প্রাণী কয় স্তরবিশিষ্ট?
 (A) ১ (B) ২ (C) ৩ (D) ৪ (Ans: B)
 03. শ্বসনতন্ত্রের যে অংশটি খাদ্য গ্রাসের সময় ল্যারিংক্স [স্বরযন্ত্র] কে ঢেকে রেখে খাদ্যদ্রব্য এর ভিতরে প্রবেশে বাধা দেয় তাকে কী বলে?
 (A) ডায়াফ্রাম (B) ট্রাকিয়া (C) স্টার্নাম (D) এপিগ্লটিস (Ans: D)
 04. অ্যালভিওলাই পাওয়া যায়-
 (A) পরিপাকতন্ত্রে (B) শ্বসনতন্ত্রে (C) রেচনতন্ত্রে (D) প্রজননতন্ত্রে (Ans: B)
 05. শ্বসনতন্ত্র কোথায় তৈরি হয়?
 (A) এন্টোডার্ম (B) মেসোডার্ম (C) এন্ডোডার্ম (D) গ্যাস্ট্রোডার্ম (Ans: C)
 06. শ্বসনের পদ্ধতিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫ (Ans: C)
 07. কোনটি শ্বাসরন্ধ্রক নয়?
 (A) মায়োগ্লোবিন (B) বিলিফুবিন (C) ক্রোরোট্রনিন (D) হিমোসায়ানিন (Ans: B)
 08. স্বরযন্ত্র কতটি তরুণাঙ্ক দিয়ে সুরক্ষিত থাকে?
 (A) ১টি (B) ৩টি (C) ৪টি (D) ২টি (Ans: B)
 09. নাসাগলবিল ও আলজিহ্বার পেছনে অবস্থিত লসিকা গ্রন্থির নাম কী?
 (A) সাইনাস (B) এথময়েড (C) অ্যাডেনয়েড (D) ম্যাডিবিল (Ans: C)
 10. শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত ঝিল্লিতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণকে কী বলে?
 (A) ইম্পানি (B) ওটিটিস মিডিয়া (C) সাইনুসাইটিস (D) ব্রঙ্কাইটিস (Ans: D)
 11. এপিগ্লটিস [উপজিহ্বা] কোন নির্গমন পথ নিয়ন্ত্রণ করে?
 (A) শ্বাসনালি (Trachea) (B) স্বরযন্ত্র (Larynx) (C) গলবিল (Pharynx) (D) ব্রঙ্কাই (Bronchi) (Ans: B)
 12. অন্তঃনাসাঙ্গিহ্ন কোথায় উন্মুক্ত হয়?
 (A) নাসাগলবিল (B) Trachea (C) Larynx (D) Bronchus (Ans: A)
 13. নাসাগলবিলের পশ্চাদভাগে জিহ্বার মতো মাংসপিণ্ডকে কী বলে?
 (A) আলজিহ্বা (B) ভোকাল কর্ড (C) উপজিহ্বা (D) স্বরযন্ত্র (Ans: A)
 14. পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের বিশ্রামকালে প্রতিমিনিটে শ্বসনের হার?
 (A) ১৫-২০ বার (B) ২০-২৪ বার (C) ১৬-২০ বার (D) ১৪-১৮ বার (Ans: D)
 15. নাসাগলবিলের সাথে শ্বাসনালির সংযোগস্থলে কী অবস্থিত?
 (A) স্বরযন্ত্র (B) অল্পনালি (C) নাসাগলবিল (D) অ্যালভিওলি (Ans: A)

16. রক্তে শ্বসনতন্ত্রের মধ্যে O_2 ও CO_2 যাতায়াত হয়—
 (A) অ্যালভিওলাই এর মাধ্যমে (B) ব্রঙ্কাই এর মাধ্যমে
 (C) ট্র্যাকিয়ার মাধ্যমে (D) ব্রঙ্কিওলের মাধ্যমে (Ans A)
 17. CO_2 কয়ভাবে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়—
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৬ (Ans B)
 18. কোন তরুণাঙ্গি গলার সামনে উঁচু হয়ে 'Adams Apple' গঠন করে?
 (A) থাইরয়েড (B) ট্রিকয়েড (C) অ্যারিটিনয়েড (D) কিউনিফর্ম (Ans A)
 19. নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভেতরের অংশের নাম কি?
 (A) নাসাগহ্বর (B) ভেস্টিবিউল
 (C) পঞ্চাৎ নাসাগলবিল (D) নাসাগলবিল (Ans B)
 20. ১০০ মিলিলিটার ধমনি রক্তে কি পরিমাণ O_2 পরিবাহিত হয়?
 (A) ১০-২০ মিলি (B) ১৯-২০ মিলি
 (C) ১৪-১৫ মিলি (D) ১৬-১৮ মিলি (Ans B)
 21. ঘরত্বীয় অবস্থান হচ্ছে—
 (A) গলবিল (B) ট্র্যাকিয়া বা শ্বাসনালি (C) নাসা গহ্বর (D) ল্যারিংক্স (Ans D)
 22. স্বরযন্ত্র কয়টি কোমলাঙ্গি নিয়ে গঠিত?
 (A) 3 (B) 5 (C) ৪ (D) 9 (Ans D)
 23. মানুষের বাম ফুসফুসে কয়টি লোবিউল থাকে?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৮ (D) ১০ (Ans C)
 24. কোন পদ্ধতিতে রক্তে O_2 ও CO_2 আদান-প্রদান হয়?
 (A) অভিস্রবণ (B) ব্যাপন (C) নিউরন (D) প্রবেদন (Ans B)
 25. ফুসফুসে প্রবাহিত শিরা রক্তে O_2 এর পরিমাণ কত?
 (A) 15% (B) 20% (C) 25% (D) 30% (Ans A)
 26. ফুসফুসে কোন তরল বিদ্যমান থাকে?
 (A) সেরাস ফ্লুইড (B) সাইনোভিয়া
 (C) সেরোসোপাইনাল ফ্লুইড (D) সবগুলো (Ans A)
 27. ফুসফুসের প্রদাহকে কী বলে?
 (A) ব্রঙ্কাইটিস (B) প্রুসিস
 (C) সাইনুসাইটিস (D) নিউমোনিয়া (Ans D)
 28. প্রতিবার শ্বাসের সময় যে বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে আসে তাকে কী বলে?
 (A) টাইডাল বায়ু (B) নিষ্ক্রিয় বায়ু
 (C) রেসিডিউয়াল বায়ু (D) অবশেষ বায়ু (Ans A)
 29. পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের টাইডাল ভলিউমের পরিমাণ কত?
 (A) 500 মিলিলিটার (B) 1000 মিলিলিটার
 (C) 1500 মিলিলিটার (D) 2000 মিলিলিটার (Ans A)

SELF TEST

18. কেমোরিসেস্টর কয় ধরনের?
 - (A) 2
 - (B) 3
 - (C) 4
 - (D) 5
 19. নিচের কোনটি ফুসফুসের হাইলাম দিয়ে প্রবেশ করে না?
 - (A) ব্রঙ্কাই
 - (B) রক্তনালি
 - (C) লসিকানালি
 - (D) ট্র্যাকিয়া
 20. কোন রাসায়নিক উপাদানের কারণে ফুসফুসের ক্যাপার হয়?
 - (A) নিকোটিন
 - (B) CO
 - (C) O₂
 - (D) SO₂
 21. ওটাইটিস মিডিয়ায় লক্ষণ নয় কোনটি?
 - (A) প্রচণ্ড মাথাব্যথা
 - (B) তীব্র জ্বর
 - (C) ডায়রিয়া
 - (D) দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা
 22. ওটাইটিস মিডিয়া সংক্রমণে দায়ী নয় কোনটি?
 - (A) ভাইরাস
 - (B) ব্যাকটেরিয়া
 - (C) ছত্রাক
 - (D) কোনোটিই নয়
 23. কোনটি সাইনুসাইটিসের লক্ষণ নয়?
 - (A) রাতে তীব্র কাশি
 - (B) ক্লান্তি ও অবসন্নতা
 - (C) রক্তশূন্যতা
 - (D) ঘ্রাণশক্তিহীনতা
 24. হ্যারিভের ভিত্তিতে ওটাইটিস মিডিয়া কত প্রকারের?
 - (A) 2
 - (B) 3
 - (C) 8
 - (D) ৫
 25. ক্লিনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা সাধারণত কত সপ্তাহ ধরে চলে?
 - (A) ১-২
 - (B) ৩-৪
 - (C) ৫-৬
 - (D) ৭-৮
 26. সাইনাসে ঘা বা প্রদাহ হলে তাকে কী বলে?
 - (A) সাইনুসাইটিস
 - (B) অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস
 - (C) ক্রনিক সাইনুসাইটিস
 - (D) ওটাইটিস মিডিয়া
 27. সাইনুসাইটিস এর প্রধান লক্ষণ কোনটি?
 - (A) মাথাব্যথা
 - (B) জ্বর
 - (C) হাঁচি
 - (D) পুঁজ ক্ষরণ
 28. সাইনুসাইটিস রোগে কোন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হয়?
 - (A) Amoxicillin
 - (B) Fluroquinolones
 - (C) Tetracycline
 - (D) সবগুলো
 29. সাইনুসাইটিস শনাক্ত করার জন্য কোন পরীক্ষা করা হয়?
 - (A) X-ray
 - (B) রক্ত পরীক্ষা
 - (C) আলট্রাসোনোগ্রাম
 - (D) সবগুলো
 30. ওটাইটিস মিডিয়া প্রতিরোধে শিশুকে কোন রোগের টিকা দিতে হবে?
 - (A) নিউমোনিয়া
 - (B) মেনিনজাইটিস
 - (C) A ও B উভয়
 - (D) কোনোটিই নয়

Answer									
30.C	29.A	28.D	27.A	26.A	25.B	24.A	23.C	22.D	21.D
20.A	19.D	18.B	17.B	16.C	15.B	14.D	13.B	12.B	11.D
10.B	09.B	08.D	07.B	06.C	05.D	04.C	03.D	02.B	01.D

মানব শাৰীৰতত্ত্ব : বৰ্জ্য ও নিষ্কাশন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

📌 বৃদ্ধ : প্রাথমিক আলোচনা

বৃক্ক (Kidney) : মানুষের উদর গহ্বরের পশ্চাৎ প্রাচীর সংলগ্ন মেরুদণ্ডের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক বিদ্যমান। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে যে অপ্রতিসাম্যতার সৃষ্টি হয় তাতে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্ক থেকে কিছুটা উপরে অবস্থান করে। বৃক্কের উর্ধ্ব অংশ 11 তম ও 12 তম পর্শ্বকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

৬ বৃক্ষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য :

- আকার ও আকৃতি: নিরেট, চাপা, অনেকটা শিম বীজের মতো, লালচে রংয়ের।
• প্রস্থ: ৫ - ৬ সেমি।
• ওজন: পুরুষে → ১৫০ - ১৭০ গ্রাম, স্ত্রীদেহে → ১৩০ - ১৫০ গ্রাম।
- দৈর্ঘ্য: ১০ - ১২ সেমি।
• স্থূলতা: ৩ সেমি।
• নোফন বন্ধের গঠনগত ও কার্যকরী একক।
- বাইরে উত্তল, ভিতরে অবতল।
• অবতল অংশের ভাজ- হাইলাস।

৬ বৃক্কের ভূমিকা/কাজ (V.V.D):

১. রক্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য অপসারণ।
 ২. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, হরমোন এবং এনজাইম নিঃসরণ।
 ৩. দেহে প্রতিবিষ ও ভেজ পদার্থসমূহ দেহ থেকে অপসারণ।
 ৪. রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ।
 ৫. দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা।
 ৬. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ।
 ৭. যথাযথ আয়নিক কম্পোজিশন বজায় রাখা।

১৬. বৃক্ষের আণুবীক্ষণিক গঠন/নেফ্রন : প্রাথমিক আলোচনা

নেফ্রন (Nephron) : বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১০ লাখ থেকে ১২ লাখ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩-৫ সেন্টিমিটার। বৃক্কে থাকা নেফ্রনের অবিরত কাজের ফলে প্রতি মিনিটে প্রায় ১২৫ ঘন সে.মি. তরল রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। এর প্রায় ৯৯% পানিই বিশোধিত হয়ে আবার রক্তে ফিরে আসে। প্রকৃতপক্ষে বৃক্কের কার্যাবলি মানেই হলো সর্বস্ব নেফ্রনের কাজের সমষ্টি। মানুষের দুটি বৃক্কের ৫০% নেফ্রন সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে এবং ৫০% নেফ্রন বিশ্রামে থাকে।

৬ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের দ্বারিত পদার্থের নাম ও কাজ :

নেফ্রনের অংশ	ক্ষরিত পদার্থের নাম	কাজ	নেফ্রনের অংশ	ক্ষরিত পদার্থের নাম	কাজ
১. বোম্যাস ক্যাপসুল	রক্তের ছাঁকনকৃত পরিপূর্ণ বস্তু।	এর ভিসেরাল স্তর আন্ত্রী পরিপ্রাণক অঙ্গরূপে কাজ করে এবং পরিপূর্ণ তরল সংগ্রহ করে বৃদ্ধ নালিকায় পাঠায়।	৪. হেনলির লুপ	$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Cl}^-$, $\text{Ca}^{++}, \text{Mg}^{++}$, ইউরিয়া	সক্রিয় শোষণ
২. গ্রোমেরুলাস	প্রাজমার কোলয়েড পদার্থ ব্যতীত সকল উপাদান।	অতি সূক্ষ্ম ছাঁকন হিসেবে কাজ করে।		H_2O	নিষ্ক্রিয় শোষণ
৩. নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা	গ্রুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফসফেট Na^+, K^+	সক্রিয় শোষণ	৫. দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা	$\text{Na}^+, \text{H}_2\text{O}$	শোষণ
	$\text{Cl}^-, \text{HCO}_3^-, \text{NaHCO}_3$, পানি, সামান্য ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড	নিষ্ক্রিয় শোষণ		$\text{H}^+, \text{NH}_4^+, \text{K}^+, \text{Cl}^-$	ক্ষরণ
	জৈব অ্যাসিড, ক্ষারক, $\text{H}^+, \text{NH}_4^+$	ক্ষরণ	৬. সংগ্রাহী নালি	$\text{Na}^+, \text{Cl}^-, \text{H}_2\text{O}, \text{K}^+$, ইউরিয়া	পুনঃশোষণ
				$\text{H}^+, \text{NH}_4^+, \text{K}^+$	ক্ষরণ

৬ মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া (Mechanism of Formation of Urine) : দেহের সকল রক্ত ছাঁকনের জন্য প্রতি ৪-৫ মিনিটে একবার বৃক্ক অতিক্রম করে। স্কটিশ শারীরবিজ্ঞানী কাশনী (Cushney, 1917) এর মতে, N_2 ঘটিত বর্জ্য রক্তের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বৃক্কে প্রবেশ করে। মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া ৩ টি ধাপে সংঘটিত হয়। যথা :

ধাপের নাম	বর্ণনা
১. অক্সিডেশন / অতিপরিশ্রাবণ	- বৃক্ষের রেনাল ক্যাপসুল অতিপরিশ্রাবণরূপে কাজ করে এবং গ্লোমেরুলাসের কাছে অবস্থান করে। - গ্লোমেরুলাস রক্তের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া অন্যান্য উপাদান (পানি, লরণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি) পরিশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় ক্যাপসুলার স্পেসে জমা হয়। - পরিশ্রুত তরলকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে।
২. নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ	- প্রস্রাব্য প্যাঁচানো নালিকার কোষেই অধিকাংশ পুনঃশোষণ সংঘটিত হয়। - এ অংশে সোডিয়াম, গ্লুকোজ, ৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন ও ক্লোরাইড আয়ন শোষিত হয়। - এখানে 124 cm^3 গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট পুনঃশোষিত হয়। • এর মধ্যে ৮০% পুনঃশোষিত হয় প্রস্রাব্য প্যাঁচানো নালিকায়। - বাকি ২০% হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা ও সংগ্রাহী নালিতে শোষিত হয়। ১% মুত্র হিসাবে নির্গমন হয়।
৩. সক্রিয় ক্ষরণ	- প্রস্রাব্য প্যাঁচানো নালিকা হতে ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া ক্ষরিত হয়। - ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা হতে হাইড্রোজেন, পটাশিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন ক্ষরিত হয়।

মূত্র (Urine) :
 মূত্র : নেফ্রনের রেনাল টিউবুলসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র বাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র (Urine) বলে।

• একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ১.৫ লিটার মূত্র ত্যাগ করে।

• সাধারণত লবণাক্ত খাদ্য মূত্রের পরিমাণ বাড়ায়।

• মূত্রের পরিমাণ < 800 মিলিলিটার হলে তাকে বলে $\rightarrow$ অলিগোরিয়া

• মূত্রের পরিমাণ < 100 মিলিলিটার হলে তাকে বলে $\rightarrow$ অ্যানুরিয়া।

• দেহে দৈনিক স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মূত্র (> 2.5 লিটার) হলে তাকে বলে পলিইউরিয়া।

- কিছু রোগ, যেমন- বহুমূত্র (diabetes), বৃক্ক প্রদাহ (nephritis) ইত্যাদি মূত্রের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে।

- কিছু দ্রব্য (পানি, লবণাক্ত পানি, চা ও কফি) মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এসব দ্রব্যকে ডাইইউরেটিকস বলে।

• হাইপারইউরিকোসরিয়া (মূত্রে অতিমাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড)।

• ডিহাইড্রেশনের কারণে মূত্রের বর্ণ গাঢ় হলুদ হয়ে যায়।

১. পরিমাণ	প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্কে প্রতিদিন ০.৫-২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয় যা ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ ঘটায়।
২. বর্ণ	স্বাভাবিক মূত্র হালকা হলুদ বা খড় বর্ণের মূত্রে ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি খড় বা হালকা হলুদ বর্ণের হয়।
৩. গন্ধ	এটি ঝাঁঝালো বা অ্যারোমেটিক গন্ধবিশিষ্ট। মূত্রে ইউরিনোড (C_6H_8O) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে এরূপ গন্ধ হয়।
৪. রাসায়নিক ধর্ম	মূত্র সামান্য অম্লীয়, এর pH মান ৪.৫-৮.০ (গড় ৬.০)
৫. আপেক্ষিক গুরুত্ব	মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮-১.০৩০

৬ মৃত্ত্বের প্রধান উপাদানগুলোর নাম ও শতকরা পরিমাণ :

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩-৫%) কঠিন পদার্থ। নিচে ছক আকারে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো দেখানো হলো:

জৈব উপাদান	শতকরা হার	অজৈব উপাদান	শতকরা হার
ইউরিয়া	২	পটাশিয়াম	০.১৫
ইউরিক অ্যাসিড	০.০৫	অ্যামোনিয়াম	০.০৪
হিপপিউরিক অ্যাসিড	০.০৫	ম্যাগনেশিয়াম	০.০১
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭	ব্রোমাইড	০.৬০
কিটোন বডিস	০.০২	সালফেট	০.১৬
ক্রিয়েটিন	০.০১	ফসফেট	০.২৭
সোডিয়াম	০.৩৫	ক্যালসিয়াম	০.০৩

[Ref: আজমল]

৬ মৃত্ত্বের অগ্ন্যভাবিক কিছু উপাদান (V.V:I) :

অস্বাভাবিক উপাদান	যে রোগে নির্গত হয়	উপাদানটির উপস্থিতিকে যা বলা হয়
গ্লুকোজ	ডায়াবেটিস মেলিটাস	গ্লুকোসুরিয়া
প্রোটিন	বৃক্কের প্রদাহ, লিউকেমিয়া, লিম্ফোসারকোমা প্রভৃতি	প্রোটিনিউরিয়া
লিপিড	বৃক্কের রোগ, অ্যালকোহলের ক্রিয়া	লিপিউরিয়া
কিটোন বডি	ডায়াবেটিস, অভুক্ত থাকা প্রভৃতি	কিটোনুরিয়া
বিলিরুবিন	জন্ডিস	বিলিরুবিনিউরিয়া
রক্ত	বৃক্কের প্রদাহ, প্রস্টেট প্রদাহ, বৃক্কের আঘাত	হিমাচুরিয়া

বৃক্ষের তাৎক্ষণিক বিকল, করণীয় :

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, করণীয় :

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল : কোনো সুস্থ লোকের হঠাৎ করে বৃক্কের কার্যক্রম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিউর বলে। বৃক্কের অন্যান্য রোগের মধ্যে রয়েছে - একিউট গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস (Acute Glomerulo Nephritis – AGN), হেমাচুরিয়া (heMBBSuria) বা প্শাবে রক্ত যাওয়া, এনুরিয়া (anuria) ইত্যাদি। অনেকের মতে, রেনিन ও অ্যানজিওটেনসিন (renin angiotensin) এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল ঘটতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখার বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যাবলি ও এর রোগ নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে নেফ্রোলজি (Nephrology) বলে।

৬. বৃক্ষের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ : সূর্যের পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেলে।

(i) ডিহাইড্রেশনের (পানিশূন্যতা) কারণে দেহে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(ii) বড় কোনো ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে বৃষ্টি ঋতুতে মারাত্মক অগ্নিদগ্ধ হওয়ায়, রক্ত প্রবাহ কমে গেলে।

(iii) শর্ক, হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, ডায়াবেটিস ইত্যাদি থাকলে, পুরুষে প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে, উদরে ক্যান্সার হলে।

(iv) বৃক্ক পাথর, মূত্রনালিতে টিউমার বা জনুগত ক্রান্তি বা ক্যান্সার, স্ট্রোমাইসিন (স্ট্রেপ্টোমাইসিন), ব্যথানাশক ওষুধ (যেমন- অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন), রক্তচাপের ওষুধ (যেমন- এসিই

(v) অতিমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন- জেন্টামাইসিন, স্ট্রেপটোগ্রিসিন)

ইনহিবিটর) সেবনে। [Ref: আজমল]

৬ বৃক্ষ বিকল্পের প্রতিকার :

নিয়ন্ত্রিত আহার	ডায়ালাইসিস	বৃক্ক প্রতিস্থাপন
■ প্রোটিন কম খাওয়া ■ কম লবণ ও পানি গ্রহণ ■ কম 'K' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ। যথা : কমলা, চকোলেট, মাশরুম।	■ কৃত্রিম পরিবেশ 'রচনা' করে বর্জ্য ও অতিরিক্ত ■ ডায়ালাইসিস দুই ধরনের : i. হিমোডায়ালাইসিস ii. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস	বৃক্ক বিকলের দীর্ঘকালীন সমাধানে রোগীর দেহে ভিন্ন ব্যক্তির সুস্থ ও সঠিক বৃক্ক স্থাপনকে বৃক্ক প্রতিস্থাপন বলে। করণীয় : ■ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর দেহে স্থান ■ বৃক্কটি সুস্থ হতে হবে ■ ব্লাড গ্রুপ মিলতে হবে ■ টিস্যুর ধরন মিলতে হবে

[Ref: আদ্রমল + আলীন]

১১) বৃক্কের ওপর জিন্মাশীল হরমোনসমূহ ও তাদের ভূমিকা :

হরমোন	ক্ষরিত স্থান	ভূমিকা
ADH বা ভ্যাসোপ্রেসিন	পিটুইটারি গ্রন্থি	পানি পুনঃশোষণ ও মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন হ্রাস পেলে মানুষের ডায়াবেটিক রোগ
Angeotensin-II	যকৃৎ	- রক্তনালির সংকোচনের মাধ্যমে রক্তচাপ বৃদ্ধি করা - পিটুইটারি গ্রন্থিকে ADH ক্ষরণে উদ্দীপিত করা - সোডিয়াম পুনঃশোষণে সহায়তা করা
Aldosterone	অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি	- পানি ধরে রাখা ও বৃক্কের সোডিয়াম সংরক্ষণ করা - রক্তচাপ বৃদ্ধি করা
.Atrial Natriuretic Hormone (ANH)	হৃৎপিণ্ড	- গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হার বৃদ্ধি করা - সোডিয়াম বৃদ্ধি করা - রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন ক্ষরণে বাধা দেয়

[Ref : আজমল + মাধেদা]

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- বৃক্কের হাইলাম অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়- ইউরেটার
 - বৃক্কের মধ্যে ইউরেটারে ফানেলের মতো অংশ- পেলভিস
 - প্রতিটি বৃক্কের বেষ্টিত পর্দার নাম- পেরিটোনিয়াম পর্দা
 - বৃক্ক দেখপ্রাচীরের সঙ্গে আটকানো থাকে- মেসেন্টারি ঘারা
 - বৃক্কীয় বা রেনাল ধমনি ও শ্লেষ্ম বৃক্ক প্রবেশ করে- হাইলামের মাধ্যমে
 - ইউরেটার ও বৃক্কীয় রেনাল শিরা বৃক্ক থেকে বের হয়- হাইলামের মাধ্যমে
 - বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে টুপি মতো আচ্ছাদন করে অবস্থান করে- অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি
 - নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাসচানো নালিকায় সংঘটিত হয়- নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ
 - কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে গঠন করে- ডাক্ট অব বেলিনি
 - কটেজ-মেডুলার সংযোগস্থলের ওপর অবস্থান করে- জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন
 - প্রশ্রাবের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে- বহুমুত্র রোগ
 - দেহ তরলের অভিশ্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে- অসমোরিসেপ্টর
 - ইউরিক অ্যাসিডের রাসানিক সংকেত- $C_5H_4O_3N_4$
 - দেহের পেশির কলা ও প্রোটিনের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়- ক্রিয়েটিনিন
 - বৃক্কের রক্ত থেকে পরিশ্রুত হয়ে মূত্রের সাথে বহিঃস্রুত হয়- ক্রিয়েটিনিন
 - বৃক্কের সুস্থতা নির্ণয়ে পরিষ্কা করা হয়- ক্রিয়েটিনিনের
 - ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড রক্ত থেকে নিষ্কাশিত হয়- ছাঁকন পদ্ধতিতে
 - ইউরিয়া তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট চক্র- অরনিথিন চক্র
 - গ্রোমেরুলার ফিল্ট্রেটে থাকে না- প্রাজমা প্রোটিন (প্রোটিন)
 - রোগীর দেহে ধমনির ভেতর ঢোকানো ফাঁপা নলাকার সূচের নাম- ক্যাথেটার
 - দিনে ডায়ালাইসিস প্রতিস্থাপন করা যায়- ৩ - ৪ বার
 - রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিতা বৃক্কের হয়ে পৌছায়- ইউরিয়া
 - বৃক্কের বাইরে দিকের রেনাল ক্যাপসুল সংলগ্ন অংশ- রেনাল কটেজ
 - কটেজের বাইরের দুই তৃতীয়াংশকে বলে- সুপার ফিশিয়াল কটেজ
 - কটেজের ভেতরের এক তৃতীয়াংশকে বলে- জাক্সটামেডুলারি কটেজ
 - প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ও অ্যানজিওটেনসিন হরমোনে উৎপন্ন হয়- বৃক্ক
 - এরিথ্রোসাইট উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়- এরিথ্রোপয়েটিন
 - বৃক্কের নিচের প্রান্ত অবস্থিত- তৃতীয় লাভার কশেরুকার ওপরে
 - প্রথম বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা দেন- বোম্যান
 - বৃক্কের কটেজে অবস্থিত- রেনাল করপাসল
 - ভিসেরাল স্তরের বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষ- পোডোসাইট
 - মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত প্রবাহিত হয়- ১২০০ সিসি
 - রক্তের দ্রাব্য বস্তু পরিশ্রুত হয়- কার্যকর পরিশ্রাবণ চাপের মাধ্যমে
 - রেনাল স্তরের মাধ্যমে রেনাল পদার্থ নিষ্কাশিত হয়- ৮০%
 - বৃক্কের ওপরের প্রান্ত অবস্থিত- দ্বাদশ খোরাসিক কশেরুকার নিচে
 - দেহের রক্ত ও কোষের-কলার অভিশ্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে- বৃক্ক
 - রক্তের রক্তরস ও রক্তকণিকার পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখে- বৃক্ক
 - রক্তের প্রাজমায়ে সোডিয়ামের মাত্রা স্থির রাখে- অ্যালডোস্টেরন
 - অ্যালডোস্টেরন সক্রিয় হয়- অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কটেজ অঞ্চলে থেকে
 - দেহে বেশি উৎপন্ন হয়- অ্যাসিড
 - অ্যাসিডিটি বেড়ে যাওয়ার কারণ- কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন CO_2
 - প্রায় ৭০% কিডনি বিকলের জন্য দায়ী- ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ
 - রক্তের রেনাল বর্জ্যের বৃদ্ধি পাওয়ার নাম- অ্যাজোটিমিয়া
 - অ্যাজোটিমিয়ার কারণে মানবদেহে সৃষ্টি হয়- ইউরেমিয়া
 - বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যকারিতা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়- ডায়ালাইজার
 - পানি নিঃসরণ পথ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়- ADH এর উপস্থিতিতে

গুচ্ছভুক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কোথায় ইউরিয়া তৈরি হয়? [Agri Cluster : 21-22]

- ① যকৃতে ② বৃক্কে
③ অগ্ন্যাশয়ে ④ গ্ৰীহায়ে

Solve • যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয়।

• অরনিথিন চক্রে শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ইউরিয়া তৈরি হয়।

• ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কে মূত্ররূপে দেহ নির্গত করে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১. বৃক্কের অভ্যন্তরে মূত্র উৎপাদনের একক এর নাম কী? [BAU : 17-18]

- ① ইউরেটার ② পেলভিস
③ নেফ্রন ④ গ্রোমেরুলাস

Solve বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একককে নেফ্রন (nephron) বলে। মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। [Ref: আজমল]

২. কোন অঙ্গটি রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ করে? [BAU : 16-17]

- ① অগ্ন্যাশয় ② বৃক্ক
③ যকৃৎ ④ ফুসফুস

Solve বৃক্ক দেহে বিভিন্ন তরলের pH নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্যতা রক্ষা করে।

৩. মানুষের বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজটিকে কী বলে? [BAU : 14-15]

- ① নেফ্রন ② হাইলাস ③ মেডুসা ④ কর্টেক্স

Solve বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাস বা হাইলাস বলে। এই হাইলাসের মধ্য দিয়ে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বহির্গত হয় এবং রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে। [Ref: আজমল]

৪. মূত্র তৈরি হয় কোথায়? [BAU : 13-14]

- ① যকৃতে ② গ্ৰীহায়ে
③ বৃক্কে ④ মূত্রথলিতে

Solve মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন বর্জ্যের মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক। যকৃতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছায়। বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়। [Ref: আজমল]

৫. রেচনতন্ত্র কোন জাতীয় পদার্থ শরীর থেকে বের করে? [BAU : 09-10]

- ① O_2 ② CO_2
③ N_2 ④ হিমোগ্লোবিন

Ans: C

৬. বৃক্কের অভ্যন্তরে মূত্র উৎপাদনের এককের নাম কী? [BAU : 04-05]

- ① ইউরেটার ② পেলভিস
③ নেফ্রন ④ গ্রোমেরুলাস

Solve বৃক্কের একক নেফ্রন। যেহেতু, বৃক্কের ভেতর মূত্র উৎপন্ন হয়। সুতরাং, মূত্র উৎপাদনের এককও নেফ্রন।

৭. কোনটি বৃক্কের অংশ? [BAU : 03-04]

- ① ব্রঙ্কিওল ② সিস্টিক নালি
③ বোম্যানস ক্যাপসুল ④ ফলিকুল কোষ

Solve এখানে উল্লেখিত ব্রঙ্কিওল ফুসফুসের অংশ, সিস্টিক নালি এবং ফলিকুল কোষ হলো স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের অংশ। অপরদিকে, বোম্যানস ক্যাপসুল হলো বৃক্কের অংশ।

৮. মানব মূত্রের খড় রং-এর জন্য দায়ী কী? [BAU : 02-03]

- ① ইউরিয়া ② অ্যামোনিয়া
③ বিলিরুবিন ④ ইউরোজেনাম

Solve ইউরোজেনাম মানবদেহের মূত্রের খড় রং-এর জন্য দায়ী।

৯. কোনটি সমগোত্রীয় নয়? [BAU : 01-02]

- ① নেফ্রিডিয়া ② ম্যালপিজিয়ান
③ ইউরেনিফেরাস নালিকা ④ সেমিনিফেরাস নালিকা

Solve • নেফ্রিডিয়া, ম্যালপিজিয়ান, ইউরেনিফেরাস নালিকা এগুলো রেচন অঙ্গ কিন্তু সেমিনিফেরাস নালিকা প্রজননতন্ত্রের অংশ।

• কেঁচো, জোঁক, নেরিস প্রভৃতির রেচন অঙ্গের নাম নেফ্রিডিয়া।

• ইউরেনিফেরাস নালিকা মানুষের রেচন তন্ত্রের অংশ।

• ম্যালপিজিয়ান কনিকা মানুষের রেচন তন্ত্রের অংশ আর ম্যালপিজিয়ান নালিকা আরশোলার/কাঁকড়ার রেচন তন্ত্রের অংশ।

১০. কোনটি বৃক্কের বৈশিষ্ট্য? [BAU : 00-01]

- ① ব্রঙ্কিওল ② সিস্টিকনালি
③ ফলিকুলার কোষ ④ বোম্যানস ক্যাপসুল

Solve

ফুসফুসের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- অসংখ্য বৃক্কনালিকা বা নেফ্রন নিয়ে বৃক্ক গঠিত। নেফ্রনের অর্ধভাগে পেয়ালার মতো বোম্যানস ক্যাপসুল এবং এর মধ্যে গ্রোমেরুলাস নামক রক্তজালক থাকে।
- অ্যালভিওলাই নামক অসংখ্য বায়ু প্রকোষ্ঠ রয়েছে। অ্যালভিওলাসের চারপাশে ট্রাবেকুলী নামক ব্যবধায়ক পর্দা পাওয়া যায়।
- সিলিয়াযুক্ত অসংখ্য ব্রঙ্কিওল দেখা যায়।
- অ্যালভিওলাই ও ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে ফাঁকে ধমনি, শিরা ও স্নায়ু নালি পাওয়া যায়।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অসমোরেগুলেশনের প্রধান অঙ্গ কোনটি? [SAU : 14-15]

- ① ফুসফুস ② যকৃৎ ③ বৃক্ক ④ পাকস্থলি

Solve মানবদেহের অসমোরেগুলেশনের প্রধান অঙ্গ হলো কিডনি বা বৃক্ক। [Ref: আলীম]

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মূত্রের রং হলুদ হওয়ার জন্য দায়ী কোন পদার্থ? [SylAU : 18-19]

- ① ইউরোজেনাম ② বিলিরুবিন ③ অ্যামোনিয়া ④ ক্রিয়েটিনিন

Solve প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্কে দৈনিক ০.৫ থেকে ২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয়। এটি সামান্য অম্লীয়; pH ৫.০ - ৬.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮ - ১.০৩০। [Ref: আজমল]

০২. নেফ্রনের কোন অংশে গ্লুকোজ পরিশোধিত হয়? [SylAU : 14-15]

- ① লুপ অব হেনলি ② নিকটস্থ প্যাচানো নালিকা
③ দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা ④ সংগ্রাহক নালিকা

Solve HCO_3^- , K^+ , Glucose, HPO_4^{2-} , Amino Acid, Uric Acid প্রভৃতি নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকায় শোধিত হয়। [Ref: আলীম]

০৩. বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজকে বলে- [SylAU : 12-13]

- ① সাইনাস ② ক্যাপসুল ③ হাইলাস ④ মেডুলা

Solve বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল এবং ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাস বা হাইলাস বলে। [Ref: আজমল]

০৪. মূত্রের গাঢ় রংয়ের জন্য দায়ী উপাদান- [SylAU : 09-10]

- ① বিলিরুবিন ② ইউরোজেনাম
③ ইউরিয়া ④ ইউরিক এসিড

Solve মূত্রের বৈশিষ্ট্য :

• বৃক্কে প্রতিদিন ০.৫ থেকে ২.৫ লিটার মূত্র তৈরি হয়।

• মূত্রে ইউরোজেনাম নামক পদার্থ থাকায় এটি খড় বর্ণের হয়।

• মূত্রের pH 5 - 6.5 ও আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.08-1.03 [Ref: আলীম]

01. Erythropoietin কোথায় তৈরি হয়?
 (A) রক্তকণিকায় (B) কোষে
 (C) কিডনিতে (D) যকৃতে

02. হেনলির লুপ নেফ্রনের কোনটির অংশ?
 (A) রেনাল করপাসল (B) রেনাল টিউবুলস
 (C) গ্লোমেরুলাস (D) বোম্যানস ক্যাপসুল

03. বৃক্কে কয়টি রেনাল প্যাপিলা থাকে?
 (A) 8-18 টি (B) 2-3 টি
 (C) 8-14 টি (D) 10-25 টি

04. বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা প্রথম কে দিয়েছিলেন?
 (A) উইলিয়াম হার্ভে (B) চার্লস ডারউইন
 (C) উইলিয়ামসন (D) স্যার উইলিয়াম বোম্যান

05. বৃক্কীয় নালিকার অংশ নয় কোনটি?
 (A) হেনলির লুপ (B) গ্লোমেরুলাস
 (C) কালেক্টিং ডাক্ট (D) ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা

06. রক্তে কীসের মাত্রাকে কিডনি রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক বলা হয়?
 (A) কাইমোট্রিপসিন (B) ক্রিয়েটিনিন
 (C) অরনিথিন (D) L- আরজিনেজ

07. বৃক্কীয় নালিকায় কোনটি পুনঃশোষিত হয় না?
 (A) গ্লুকোজ (B) লবণ
 (C) পানি (D) ক্রিয়েটিনিন

08. রক্তে ইউরিক অ্যাসিড শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়-
 (A) ইউরিয়েজ (B) ইউরিকোজ
 (C) ইউরোবাইলেজ (D) উপরের সবগুলো

09. রক্তের প্রাথমিক Na^+ এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে?
 (A) অ্যালডোস্টেরন (B) প্রোজেস্টেরন
 (C) ভ্যাসোপ্রেসিন (D) ইস্ট্রোজেন

10. পোডোসাইট কোষ কোথায় পাওয়া যায়?
 (A) প্রক্সিমাল নালিকায় (B) হেনলির লুপে
 (C) ডিস্টাল নালিকায় (D) বোম্যানস ক্যাপসুলে

11. বৃক্কের অবতল অংশের ডাঁজকে কি বলে?
 (A) কটেক্স (B) মেডুলা
 (C) ক্যালিক্স (D) হাইলাস

12. রক্তচাপ বাড়ানোর প্রধান এজেন্ট কোনটি?
 (A) রেনিন (B) অ্যালডোস্টেরন
 (C) অ্যাঞ্জিওটেনসিন (D) ADH

13. মানবদেহে ইউরিয়া তৈরি হয় কোথায়?
 (A) বৃক্ক (B) যকৃৎ
 (C) ক্ষুদ্রান্ত্র (D) বৃহদন্ত্র

14. মূত্রের বর্ণের জন্য দায়ী কোনটি?
 (A) ইউরোম্যাটার (B) ইউরেনিয়াম
 (C) ইউরোক্রোম (D) নিউরোক্রোম

15. ইউরিক অ্যাসিড কোন পদার্থের বিপাকের শেষ পরিণতি?
 (A) গ্লুকোজ (B) অ্যামাইনো অ্যাসিড
 (C) পিউরিন (D) পাইরিমিডিন

16. কিডনির মাধ্যমে পানি বিশেষভাবে সহায়তা করে-
 (A) ADH (B) GH
 (C) TSH (D) সবগুলো

17. মূত্রের রঙ হলুদ হওয়ার জন্য দায়ী হলো-
 (A) অ্যামোনিয়া (B) বিলিরুবিন
 (C) ইউরোক্রোম (D) ইউরিয়া

18. রক্তের আলট্রাফিলট্রেশন কোথায় হয়?
 (A) রেনাল করপাসল (B) রেনাল টিউবিউলস
 (C) বোম্যানস ক্যাপসুল (D) সবগুলোতে

19. অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন কাজ করে-
 (A) কিডনিতে (B) মূত্রথলিতে
 (C) জরায়ুতে (D) মস্তিষ্কে

20. রেচনতন্ত্রের অংশ কোনটি?
 (A) অ্যালভিওলি (B) ইউরেটার
 (C) হৃৎপিণ্ড (D) মেনিনজেস

21. নিচের কোনটি বিপাকের কারণে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়?
 (A) অ্যামিনো অ্যাসিড (B) পিউরিন
 (C) টিস্যু প্রোটিন (D) সবগুলো

22. 'লুপ অব হেনলি' শরীরের নিম্নলিখিত কোন অঙ্গের অংশ?
 (A) যকৃৎ (B) প্লিহা
 (C) বৃক্ক (D) হৃৎপিণ্ড

23. নিচের কোন হরমোন রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে?
 (A) অ্যালডোস্টেরন (B) অ্যানজিওটেনসিন
 (C) রেনিন (D) ভেসোপ্রেসিন

24. মানবদেহের কোন স্থানে হেনলির লুপ অবস্থিত?
 (A) হৃৎপিণ্ড (B) ফুসফুস
 (C) কিডনি (D) যকৃৎ

25. বৃক্কের পার্থক্য ও কার্যিক একক হচ্ছে-
 (A) গ্লোমেরুলাস (B) বোম্যানস ক্যাপসুল
 (C) নেফ্রন (D) হেনলির লুপ

26. রেনিন কোথায় তৈরি হয়?
 (A) অঙ্গে (B) পাকস্থলীতে
 (C) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে (D) বৃক্কে

27. অসমোরেগুলেশন মানবদেহের কোন অঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে?
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয়
 (C) বৃক্ক (D) ফুসফুস

28. কোনটি মানব বৃক্কের ম্যালপিজিয়ান কণিকার অংশ?
 (A) Bowman's Capsule (B) Henle's Loop
 (C) Collecting tubule (D) Renal tubule

29. কোনটি নেফ্রনের অংশ নয়?
 (A) Renal pelvis (B) Glomerulus
 (C) Loop of Henle (D) Collecting duct

30. বৃক্কের কোন অংশে Filtration হয়?
 (A) হেনলির লুপ (B) গ্লোমেরুলাস
 (C) গোড়াদেশীয় প্যাচানো নালিকা (D) মূত্রথলি

OMR				
01. A B C D	02. A B C D	03. A B C D	04. A B C D	05. A B C D
06. A B C D	07. A B C D	08. A B C D	09. A B C D	10. A B C D
11. A B C D	12. A B C D	13. A B C D	14. A B C D	15. A B C D
16. A B C D	17. A B C D	18. A B C D	19. A B C D	20. A B C D
21. A B C D	22. A B C D	23. A B C D	24. A B C D	25. A B C D
26. A B C D	27. A B C D	29. A B C D	29. A B C D	30. A B C D

Answer									
30.B	29.A	28.A	27.C	26.D	25.C	24.C	23.A	22.C	21.B
20.B	19.A	18.A	17.B	16.A	15.C	14.C	13.B	12.D	11.D
10.D	09.A	08.B	07.D	06.B	05.B	04.D	03.D	02.B	01.C

উপাধিক কঙ্কাল (নিম্নাঙ্গ) : শ্রেণিচক্রের অস্থি (Pelvic girdle)

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শ্রোণি-অস্থিচক্র দুটি ইনোমিনেট অস্থি (innominate bone) বা নিতম্বাস্থি (hipbone) বা Os coxa নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক নিতম্বাস্থি আবার ইলিয়াম (ilium), ইশিয়াম (ischium) ও পাবিস (pubis) অস্থি নিয়ে গঠিত।

৬ শ্রোণি অস্থিচক্রের অংশসমূহ :

নাম	বর্ণনা
ইলিয়াম	- এটি পেছনে স্যাক্রামের সাথে যুক্ত থাকে। - এর উঁচু প্রান্তকে ইলিয়াম ক্রেন্ট বলে। - এতে সম্মুখ সুপিরিয়র ও পশ্চাৎ সুপিরিয়র কাঁটা থাকে। - ইলিয়ামে তিনটি গুটাল রেখা, একটি ফসা ও একটি টিউবার্কল বিদ্যমান।
ইস্টিয়াম	- দুটি বাহু ও মূলদেহ নিয়ে গঠিত। - এতে উপরের দিকে একটি কাঁটা ও নিচের দিকে একটি টিউবার্কল থাকে।
পিউবিস	- দু'পাশের দুটি পিউবিস অঙ্গীয় মধ্যরেখার মিলিত হয়ে পিউবিক সিমফাইসিস গঠন করে। - পুরুষের ক্ষেত্রে পিউবিস আর্চ 90° এর চেয়ে কম হয় এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে 90° এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

উপাঙ্গিক কক্ষাল (নিম্নাঙ্গ) : পা এর অস্থি

৬. পায়ের অস্থির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য : ১. বিভিন্ন আকৃতির ৭টি টার্সাল অস্থি গোড়ালি গঠন করে। ২. পায়ের আঙুলের অস্থিগুলো ফ্যালাংগেস। ৩. বৃদ্ধাঙ্গুল ২টি এবং বাকি আঙুলগুলো ৩টি করে ফ্যালাংগেস নিয়ে গঠিত। ৪. মোট টার্সাল নলাকার ও সামান্য লম্বা, সংখ্যায় ৫টি এবং পদতল গঠন করে।	৬. টিবিয়া-ফিবুলা এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য : ১. টিবিয়া লম্বা, মোটা ও সুগঠিত। ২. টিবিয়া ও ফিবুলা নামক পাশাপাশি অবস্থিত দুটি লম্বা অসম রঙের মতো অস্থি। ৩. টিবীয়ার অগ্রপ্রান্তে মিডিয়াল ও ল্যাটারাল কন্ডাইল, টিউবেরোসিটি এবং নিম্নপ্রান্তে মিডিয়াল ও ল্যাটারাল ম্যালিগ্লেস নামক উঁচু অংশ আছে। ৪. ফিবুলা সরু এবং দীর্ঘ অস্থি; এর অগ্রপ্রান্তে একটি মস্তক ও নিম্ন প্রান্তে সুচালো একটি ল্যাটারাল ম্যালিগ্লেস থাকে।
---	---

১১ তরুণাঙ্ঘ্রি বা কোমলাঙ্ঘ্রি (Cartilage) :

তরুণাঙ্ঘ্রির ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা কনড্রিন (chondrin) নামে এক ধরনের অর্ধকঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থে গঠিত। কনড্রিন কনড্রোমিউকয়েড (chondromucoid) ও কনড্রোঅ্যালবুনয়েড (chondroalbnoid) নামক দুধরনের প্রোটিনে গঠিত। তরুণাঙ্ঘ্রিকে কন্ড্রোসাইট (chondrocyte) বলে।

✶ বিভিন্ন প্রকার তরুণাঙ্গি যেসব ছনে পাওয়া যায় (Must to know):

তরুণাঙ্গির নাম	যে স্থানে পাওয়া যায়
স্বচ্ছ তরুণাঙ্গি	নাক, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, পৃষ্ঠকার প্রান্তভাগ, অস্থিসন্ধিস্থল, জরীয় কঙ্কাল, ব্যাঙ ও হাঙরের জ্রণে বা পরিণত দেহে।
স্থিতিস্থাপক বা পীততন্তুময় তরুণাঙ্গি	বহিস্কর্ণ বা পিনা, নাসিকার অগ্রভাগ আলজিহ্বা (Epiglottis), ইউস্টেশিয়ান নালি।
শ্বেত তন্তুময় তরুণাঙ্গি	কশেরুকাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান, অস্থি ও টেন্ডনের সংযোগস্থল, গ্লেনয়েড গহ্বর।
চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাঙ্গি	হিউমেরাস ও ফিমরের মন্তকের তরুণাঙ্গি।

👉 হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle) :

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (মানুষ) হৃৎপাণ্ডের প্রাচীর গঠনে অংশগ্রহণকারী এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশিকে হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি বলে। এ পেশি বেচ্ছায় সংকোচনশীল নয়, কিন্তু নিজে নিজে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপেশি চিহ্নিত কিন্তু অনৈচ্ছিক।

২৬. **হুৎপেশির অবস্থান :** হুৎপেশির প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তরে (মায়োকার্ডিয়াম) এ পেশি অবস্থিত। মায়োকার্ডিয়ামের বাইরের দিকে এপিকার্ডিয়াম ও ভেতরের দিকে এন্ডোকার্ডিয়াম নামক যোজক কলা নির্মিত আবরণ থাকে।

৫. হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য : হৃৎপিণ্ড গঠিত হয় হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা। নিচে হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. হৃৎপেশি অনিয়তাকার, লম্বা ও শাখা-প্রশাখায়ুক্ত কতকগুলো কোষ বা পেশিতন্তু নিয়ে গঠিত। ২. কোষ বা তন্তুগুলো অনিয়মিতভাবে পরস্পর যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠন সৃষ্টি করে। ৩. কোষগুলো প্রায় ১০০ μm লম্বা এবং ১২ – ১৫ μm প্রশস্ত। ৪. এদের কোষপ্রাচীর বা সারকোলেমা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা পাতলা। ৫. প্রতিটি কোষের কেন্দ্রভাগে কোষের একমাত্র নিউক্লিয়াসটি অবস্থান করে।	৬. কোষের অভ্যন্তরে সমান্তরাল ও লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিল অনুসূত্র থাকে যেগুলোর গায়ে আড়াআড়ি বা ডোরাকাটা দাগ থাকে। ৭. পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের সংযোগস্থলের কোষপর্দা বা সারকোলেমা মিলিত হয়ে চাকতির মতো একটি ডিস্ক সৃষ্টি করে যাকে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক বলে।
---	---

৬. হুপেশির কাজ : হুপেশির অবিরাম সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিদেহের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ পেশি কখনো অবসাদগ্রস্ত হয় না।

৬. গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেশির কাজ সম্পর্কে জেনে নেই:

গ্রুপের নাম	পেশির নাম ও উদাহরণ
ফ্লেক্সর	বাইসেপস পুরোবাহকে উর্ধ্ব বাহুর ওপর ভাঁজ হতে সহায়তা করে।
এক্সটেনসর	ট্রাইসেপস ভাঁজ করা পুরো বাহকে সোজা হতে সহায়তা করে
অ্যাডাক্টর	ডেলটয়েড হাতকে সামনে প্রসারিত করে থাকে।
অ্যাডাক্টর	ল্যাটিসিমাস ডরসি হাতকে পিছনে এবং উঠাতে সহায়তা করে।
ডিপ্রেশর	ডিপ্রেশর ম্যান্ডিবুলার নিম্ন চোয়ালকে নিচের দিকে নামতে সহায়তা করে; ফলে মুখ খুলতে পারে।
লিভেটর	ম্যাসেটর পেশি নিম্ন চোয়ালকে ওপরের দিকে উঠতে সহায়তা করে; ফলে খোলা মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
রোটেটর	পাইরিফরমিস পেশি ফিমারকে আবর্তিত হতে কাজ করে।

- ফিমারকে ঘূর্ণনে সাহায্য করে- পাইরিফরমিস পেশি
- সাধারণ অস্থিভঙ্গ সেরে যায়- ৮ সপ্তাহের মধ্যে
- হায়ালিন তরুণাঙ্গ থাকে- সিনকনড্রোসিস অস্থিসন্ধিতে
- তরুণাঙ্গ অস্থিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে- অসিফিকেশন
- প্যাটেলা নামক অস্থিটি আছে মানুষের- পায়ে
- কনুই ভাজ হওয়ার জন্য দায়ী- বাইসেপস পেশি
- সম্মুখ বাহকে প্রসারিত করে- ট্রাইসেপস পেশি
- পা- কে দেহ অক্ষের দিকে নিয়ে আসে- অ্যাডাক্টর লংগাস পেশি
- নিচের চোয়াল ওপরে তুলে মুখ বন্ধ করতে সাহায্য করে- ম্যাসিটের পেশি
- আঘাত পাওয়া জায়গা উঁচুতে রাখতে হবে- ৬ - ১০ ইঞ্চি
- দাঁত ও চোয়ালের সকেটের সন্ধি- গমফোসিস অস্থিসন্ধি
- পেশি ও অস্থির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে- টেনডন
- নিরেট অস্থির কেন্দ্রীয় নালির নাম- হ্যাভারসিয়ান নালি
- ল্যাকুনার ভেতরে অবস্থান করে- অস্থিকোষ
- নিরেট অস্থির উদাহরণ- হিউমেরাস ও ফিমার
- মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রে স্পঞ্জি অস্থির পরিমাণ- মোট ওজনের প্রায় ২০%
- প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়- লোহিত অস্থিমজ্জা থেকে
- অপরিণত অস্থি উৎপাদনকারী কোষ- অস্টিওব্লাস্ট
- অস্থির প্রান্ত বেষ্টিত থাকে- আর্টিকুলার তরুণাঙ্গ দিয়ে
- মানুষের অধিকাংশ অস্থিসন্ধি- সাইনোভিয়াল বা সচল অস্থিসন্ধি

- একটি অস্থিসন্ধিতে অবস্থিত দুটি অস্থির মধ্যে একটি সরে গেলে ঘটে- স্থানচ্যুতি
 - মচকানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে- গোড়ালিতে
 - খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মচকায়- গোড়ালি
 - হাঁটুর কজাসন্ধির মতো কাজ করে- প্রটি লিগামেন্ট
 - মচকানোর ব্যথা কমানোর জন্য খাওয়া হয়- নন-স্টেরয়ডাল ওষুধ
 - লিগামেন্টের ইনজুরিই হলো- মচকানো
 - পেশি গ্রুপে মোট পেশি তন্তু বা পেশি কোষের সংখ্যা- 25×10^5 লাখ
 - মানবদেহের সবচেয়ে বড় পেশি- পায়ের সারটোরিয়াস
 - মানবদেহের সবচেয়ে ছোট পেশি- চক্ষুর সিলিয়ারি।
 - ইলিয়াম, ইশিয়াম ও পিউবিস অস্থি নিয়ে গঠিত- শ্রোণি-অস্থিচক্র
 - ইলিয়ামের ডানার কিনারাকে বলে- ইলিয়াক ব্রুটি (ফ্রেস্ট)
 - ফিমারের প্রান্তে অবস্থিত ত্রিকোণাকার অস্থির নাম- প্যাটেলা
 - অস্থির জৈব অংশটি গঠিত- কোলাজেন ও অসিমিউকয়েড দ্বারা
 - অস্থির অজৈব অংশটিতে রয়েছে- ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট
 - মানবদেহের ভারবহনকারী শক্ত কাঠামো- কঙ্কালতন্ত্র
 - বায়ুপূর্ণ অস্থির উদাহরণ- ম্যাক্সিলা, ফ্রন্টাল, ফেনয়েড, এথময়েড
 - কনড্রিনে বিদ্যমান প্রোটিনের নাম- কনড্রোমিউকয়েড ও কনড্রোঅ্যালবুনয়েড
 - দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়- শ্বেততন্তুময় তরুণাঙ্গি
 - হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে পাওয়া যায়- চুনময়/ক্যালসিফাইড তরুণাঙ্গি

Part 3

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান



গুচ্ছভুক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে- [Agri Cluster : 22-23]
 (A) টেনডন (B) লিগামেন্ট (C) সাইনোভিয়াম (D) ফাইবার
 **Solve** • অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে টেনডন।
 • এটি শ্বেত তন্তুময় যোজক টিস্যু নির্মিত গঠন।
02. মানব শিশুর জন্মের সময় কতোটি অস্থি থাকে? [Agri Cluster : 20-21]
 (A) ৩০০টি (B) ২০০টি (C) ২০৬টি (D) ৩০৬টি
 **Solve** মানব শিশুর জন্মের সময় দেহে প্রায় ৩০০টি অস্থি থাকে।
 তবে পরিণত মানব কঙ্কাল মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত। [Ref : আজমল]
03. অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকা কয় প্রকার? [Agri Cluster : 19-20]
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
 **Solve** প্রাপ্তবয়স্কের কশেরুকা-
 i. Cervical (গ্রীবাদেশীয়) → ৭টি ii. Thoracic (বক্ষদেশীয়) → ১২টি
 iii. Lumbar (কটদেশীয়) → ৫টি iv. Sacral (শ্রোণিদেশীয়) → ১টি
 v. Coccygeal (পুচ্ছদেশীয়) → ১টি [Ref : আজমল]



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর কী ধরনের পেশি দিয়ে গঠিত? [BAU : 17-18]
 (A) অনৈচ্ছিক পেশি (B) ঐচ্ছিক পেশি
 (C) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশি (D) আবরণী কলা
- Solve** হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশিতে গঠিত। এসব পেশি হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি নামে পরিচিত। [Ref: আজমল]
02. মানবদেহের মেরুদণ্ড কয়টি কশেরুকা দিয়ে গঠিত? [BAU : 15-16]
 (A) ৩১ (B) ৩২ (C) ৩৩ (D) ৩৪
- Solve** পরিণত বয়সে স্যাট্রাল কশেরুকাগুলো একীভূত হয়ে স্যাট্রাম এবং কক্সিজিয়ালগুলো কক্সিস্প গঠন করে। ফলে সর্বমোট কশেরুকার সংখ্যা কমে গিয়ে ৩৩টির পরিবর্তে ২৬ টি হয়। [Ref: আজমল]
03. কোনটি সিসাময়েড অস্থি? [BAU : 14-15]
 (A) স্ক্যাপুলা (B) ইলিয়াম (C) প্যাটেলা (D) A ও B উভয়
- Solve** ফিমারের প্রান্তে প্যাটেলা নামে একটি ত্রিকোণাকার অস্থি অবস্থিত। প্যাটেলা একটি সিসাময়েড অস্থি, কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেনডন থেকে। প্যাটেলার পশ্চাৎভাগের উর্ধ্বাংশ ফিমারের সাথে এবং নিন্দ্রাংশ টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত। [Ref: আজমল]

04. Beauty bone বলা হয় কোন অস্থিকে? [BAU : 13-14]
 (A) শোণিতক (B) হিউমেরাস (C) ক্ল্যাভিকল (D) স্ক্যাপুলা
 (A) (C) Solve ক্ল্যাভিকল দেখতে ইটালিক 'f' অক্ষরের মতো। এ অস্থিকে কলারবোন (Collar bone) বা সৌন্দর্যের অস্থি (Beauty bone) বলা হয়।
05. তরুণাঙ্গির অস্থিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [BAU : 12-13]
 (A) ক্যালসিফিকেশন (B) ফিউশন (C) অসিফিকেশন (D) কার্বনিফিকেশন
 (A) (C) Solve দেহে অস্থির গঠন প্রক্রিয়াকে অসিফিকেশন বলে। শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ইন্ট্রামেমব্রেনাস ও এন্ডোকড্রাল অসিফিকেশনের মাধ্যমে অস্থির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। [Ref: আলীম]
06. অস্থির আবরণীকে কি বলে? [BAU : 11-12]
 (A) পেরিকড্রিয়াম (B) পেরিঅস্টিয়াম (C) পেরিনিউরিয়াম (D) পেরিমাইসিয়াম
 (A) (B) Solve • তরুণাঙ্গির আবরণ → পেরিকড্রিয়াম।
 • অস্থির আবরণ → পেরিঅস্টিয়াম।
07. প্রাণিকলা প্রধানত কত প্রকার? [BAU : 08-09]
 (A) ৮ প্রকার (B) ১২ প্রকার (C) ৪ প্রকার (D) ৩ প্রকার
 (A) (C) Solve প্রাণিকলাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
 ১. আবরণী কলা (Epithelial tissue) ২. যোজক কলা (Connective tissue)
 ৩. পেশি কলা (Muscular tissue) ৪. স্নায়ু কলা (Nervous tissue)
08. মানবদেহে লিগামেন্ট বা বন্ধনী কোথায় থাকে? [BAU : 08-09]
 (A) কলার সংযোগস্থলে (B) টেন্ডন ও পেশির সংযোগস্থল
 (C) অস্থির সংযোগস্থল (D) কোষের সংযোগস্থল
 (A) (C) Solve মানবদেহে অস্থির সংযোগস্থলে লিগামেন্ট বা বন্ধনী থাকে।
09. কোনটিতে ডেন্টয়েড রিজ থাকে? [BAU : 06-07]
 (A) ফিমারে (B) হিউমেরাসে (C) স্ক্যাপুলায় (D) আলনায়
 (A) (B) Solve হিউমেরাসের বৈশিষ্ট্য : → হিউমেরাস লম্বা ও নলাকার অস্থি।
 → ছোট-বড় টিউবার্কল এক এর মাঝখানে অ্যানাটমিক্যাল গ্রীবা নামে একটি খাঁজ আছে।
 → মূলদেহের মধ্যভাগে ডেন্টয়েড রিজ রয়েছে।
 → এর কিনারা নিম্নপ্রান্তে এসে এপিকভাইল গঠন রয়েছে। [Ref: আজমল]
10. হিউমেরাসের মস্তক কোন ধরনের কলা দিয়ে গঠিত? [BAU : 06-07]
 (A) মসৃণ পেশি কলা (B) অ্যারিওলার যোজক কলা
 (C) তরুণাঙ্গিময় যোজক কলা (D) ক্যালসিফাইড যোজক কলা
 (A) (D) Solve হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাঙ্গি পাওয়া যায়।

01. মানবদেহে বন্ধদেশীয় কশেরুকা কয়টি?
 (A) 6 (B) 8
 (C) 10 (D) 12
 02. ডেলটয়েড কোন ধরনের পেশি?
 (A) ফ্লেক্সর (B) এক্সটেনসর
 (C) অ্যাবডাক্টর (D) অ্যাডাক্টর
 03. রক্তনালি অনুপস্থিত-
 (A) পেশি কলায় (B) যোজক কলায়
 (C) আবরণী কলায় (D) স্নায়ু কলায়
 04. হাঁটুর টুপি নামে পরিচিত অস্থিকে বলা হয়-
 (A) টিবিয়া (B) প্যাটেলা
 (C) মিনিস্টিক (D) ফিবুলা
 05. আলনা কীসের অস্থি?
 (A) বক্ষের (B) বাহুর
 (C) পায়ের (D) মেরুদণ্ডের
 06. মানবদেহের বক্ষপিঞ্জরে মোট অস্থির সংখ্যা-
 (A) 22 (B) 23
 (C) 24 (D) 25
 07. শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাঙ্ঘি থাকে?
 (A) হায়ালিন (B) শ্বেত তন্তুময়
 (C) পীত তন্তুময় (D) চুনময়
 08. মানবদেহে সবচেয়ে ছোট অস্থি কোথায় অবস্থিত?
 (A) নাকে (B) কানে
 (C) মাথায় (D) হাতের আঙুলে
 09. মানবদেহের সারভাইকাল কশেরুকার সংখ্যা কয়টি?
 (A) 12 (B) 5
 (C) 7 (D) 21
 10. কোনটি করোটিকার জোড়া অস্থি নয়?
 (A) প্যারাইটাল (B) টেম্পোরাল
 (C) ফ্রন্টয়েড (D) কোনোটিই নয়
 11. মানুষের শরীরের কোন হাড়টিতে 'ডেলটয়েড টিউবারোসিটি' অঙ্ঘলটি রয়েছে?
 (A) টিবিয়া-ফিবুলা (B) ফিমার
 (C) হিউমেরাস (D) স্ক্যাপুলা
 12. নিচের কোনটি ম্যাট্রিক্সের অস্থি নয়?
 (A) অস্টিওক্লাস্ট (B) অস্টিওব্লাস্ট
 (C) পেরিঅস্টিয়াম (D) অস্টিওসাইট
 13. উর্ধ্ববাহুর প্রথম অস্থির নাম কি?
 (A) হিউমেরাস (B) ফিমার
 (C) স্ক্যাপুলা (D) স্টার্নাম
 14. কোন অস্থিটি চারকোনা প্রেটের মতো-
 (A) ফ্রন্টাল (B) প্যারাইটাল
 (C) টেম্পোরাল (D) ফ্রন্টয়েড
 15. অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস কোন অস্থির অংশ?
 (A) স্ক্যাপুলা (B) কশেরুকা
 (C) হিউমেরাস (D) ফিমার
 16. নিচের কোনটি মানুষের মুখমণ্ডলীয় অস্থি?
 (A) প্যারাইটাল (B) ফ্রন্টয়েড
 (C) ভোমার (D) এথময়েড
 17. রক্তবাহী নালি অনুপস্থিত কোন কলাতে?
 (A) আবরণী কলা (B) যোজক কলা
 (C) পেশি কলা (D) স্নায়ুকলা
 18. নিচের কোনটি স্ক্যাপুলা এর অংশ নয়?
 (A) স্পাইনাস প্রসেস (B) অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস
 (C) কোরাকয়েড প্রসেস (D) গ্রেনয়েড গহ্বর
 19. মানুষের পায়ের মোট কতটি অস্থি থাকে?
 (A) ৬০টি (B) ২০৬টি
 (C) ২৬০টি (D) ৩৬০টি
 20. সেন্ট্রাম কোন হাড়ের অংশ?
 (A) করোটির (B) কশেরুকার
 (C) হাতের (D) পায়ের
 21. মানুষের গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার সংখ্যা কতটি?
 (A) 5 (B) 6
 (C) 7 (D) 8
 22. মানব দেহের করোটিকাতে কতকগুলো অস্থি আছে?
 (A) ৮ টি (B) ১০ টি
 (C) ১২ টি (D) ১৩ টি
 23. টার্সাল অস্থি কোথায় পাওয়া যায়?
 (A) বক্ষ পিঞ্জরে (B) পায়ের
 (C) হাতে (D) শ্রোণিচক্রে
 24. রক্তনালি প্রাচীরের পেশি কোন ধরনের?
 (A) রৈখিক (B) মসৃণ
 (C) ঐচ্ছিক (D) মিশ্র
 25. হায়ালিন তরুণাঙ্ঘি পাওয়া যায়-
 (A) হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে (B) শ্বাসনালি ও স্বরযন্ত্রে
 (C) পিনা ও ইউস্টেশিয়ান নালিতে (D) কোনোটিতেই নয়
 26. পেশিকে অস্থির সাথে যুক্তকারীকে বলে-
 (A) অ্যাডাক্টর (B) অ্যাবডাক্টর
 (C) লিগামেন্ট (D) টেন্ডন
 27. পীততন্তুময় তরুণাঙ্ঘি পাওয়া যায়-
 (A) ইউস্টেশিয়ান নালিতে (B) শ্বাসনালিতে
 (C) স্বরযন্ত্রে (D) কোনোটিতেই নয়
 28. গ্রীবাদেশীয় ও কটিদেশীয় কশেরুকার সংখ্যা হলো-
 (A) ৪ এবং 7 (B) 12 এবং 5
 (C) 7 এবং 4 (D) 7 এবং 5
 29. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক পাওয়া যায়-
 (A) হৃৎপেশিতে (B) ঐচ্ছিক পেশিতে
 (C) বাইসেপস পেশিতে (D) চোখের পেশিতে
 30. মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অস্থিটির নাম কি?
 (A) স্টেপিস (B) ফিমার
 (C) ইনকাস (D) মেটাটারসাল

OMR				
01. A B C D	02. A B C D	03. A B C D	04. A B C D	05. A B C D
06. A B C D	07. A B C D	08. A B C D	09. A B C D	10. A B C D
11. A B C D	12. A B C D	13. A B C D	14. A B C D	15. A B C D
16. A B C D	17. A B C D	18. A B C D	19. A B C D	20. A B C D
21. A B C D	22. A B C D	23. A B C D	24. A B C D	25. A B C D
26. A B C D	27. A B C D	28. A B C D	29. A B C D	30. A B C D

Answer									
30.A	29.A	28.D	27.A	26.D	25.B	24.B	23.B	22.A	21.C
20.B	19.A	18.A	17.D	16.C	15.A	14.B	13.A	12.C	11.A
10.C	09.C	08.B	07.A	06.D	05.B	04.B	03.D	02.C	01.D

৬ কেন্দ্রীয় দ্বায়ত্ব ও প্রান্তীয় দ্বায়ত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

পার্শ্বকোর বিষয়	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	প্রাঙ্গণীয় (Peripheral) স্নায়ুতন্ত্র
১। সংজ্ঞা	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত সেটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।	করোটিক স্নায়ু, সুষুম্না স্নায়ু ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে এ স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।
২। উৎপত্তি স্থল	সুষুম্নাকাণ্ড।	মস্তিষ্ক।
৩। সংখ্যা	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু দুটি প্রধান অংশ।	১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।
৪। প্রতিরক্ষামূলক আবরণ	করোটিকার মধ্যে অবস্থিত। তিনটি তন্তুময় আবরণ দ্বারা গঠিত-মেনিনজেস দ্বারা আবৃত।	আবরণ নেই।
৫। গহ্বর	CSF তরলপূর্ণ কয়েকটি গহ্বর থাকে।	গহ্বর থাকে না।
৬। বিস্তৃতি	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু।	মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে।

১. মস্তিষ্ক (Brain) : গঠন ও কাজ

মস্তিষ্ক (Brain) : গঠন ও কাজ
 জগীয় বিকাশের সময় এন্ডোডার্ম থেকে স্ট্র নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ১৫০০ সিসি ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি এবং গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) নিউরন এবং ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) নিউরোগ্লিয়া কোষ থাকে।

৬. মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ : নিচে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ উপস্থাপন করা হলো-

মস্তিষ্কের অংশ	প্রধান কাজ
সেরেব্রাম	- অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ - সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ - ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ - চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তির নিয়ন্ত্রণ - বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ
থ্যালামাস	- সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন - ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ - চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা, আবেগ কেন্দ্র - ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা
হাইপোথ্যালামাস	- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র, জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি - ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, ভালোবাসা, ঘৃণা, উদ্বেগ কেন্দ্র - দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ - ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন নিউরোহরমোন স্রবণ
সেরেবেলাম	- ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ - চলাফেরার দিক নির্ধারণ - দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখা
মেডুলা অবলংগাটা	- সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি - হৃৎস্পন্দন, শ্বাসন, গলাধঃকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সংকোচন ও শালাস্রবণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ৯ম, ১০ম ও ১১শ করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল
পনস	সেরেবেলাম, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যকার রিলে স্টেশন

Ref: আজমল

☞ মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল (Ventricle of brain) :

মস্তিষ্কে মোট ৪ টি ভেন্ট্রিকল থাকে। এদের যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল বলে। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে পারস্পরিক বা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলও বলা হয়। মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলো সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal fluid, CSF) বা সুষুম্নারস দ্বারা পূর্ণ থাকে।

বিভিন্ন ভেদিকালের নাম অবস্থান এবং সংযোগকারী নালির নাম দেওয়া হলো :

নাম	অবস্থান	সংযোগকারী নালি
১. অলফ্যাক্টরি/ রাইনোসিল	অলফ্যাক্টরি লোব	
২. পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল	সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার এর অভ্যন্তর ভাগ	ফোরামেন অব মনরো
৩. ওয় ভেন্ট্রিকল/ ডায়োসিল	ডায়েনসেফালন এর অভ্যন্তর ভাগ	অ্যাকুইডাক্ট অব সিলভিয়াস (আইটার)
৪. ৪র্থ ভেন্ট্রিকল/ মেটাসিল	মেডুলা অবলংগাটার অভ্যন্তর ভাগ	সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালিতে উন্মুক্ত

 করোটিক স্নায়ু (Cranial nerve) :

মানুষের কেরোটিক শ্লাম ১২ জোড়া। এদের সম্মুখ অংশ থেকে পরপর রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা সূচিত করা হয়।

৬ মানুষের কেরোটিক স্নায়ুর নাম, উৎস, শাখা, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ :

ক্র.নং	দ্রাব্যের নাম	উৎস	শাখা (যদি থাকে)	বিস্তার	প্রকৃতি	কাজ
I	অলফ্যাক্টরি	অগ্রমস্তিষ্কের অক্সীয়দেশ	-	নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি	সংবেদী (sensory)	স্রাব অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানো
II	অপটিক	অগ্রমস্তিষ্কের অক্সীয়দেশ	-	রেটিনা	সংবেদী	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানো
III	অকুলোমোটর	মধ্যমস্তিষ্কের অক্সীয়দেশ	-	অক্ষিগোলকের পেশি, উর্ধ্ব নেত্রপল্লব, উত্তোলনকারী পেশি ও পিউপিল সংকোচনকারী পেশি	চেষ্টীয় (motor)	অক্ষিগোলকের সম্বালন
IV	ট্রিকলিয়ার	মধ্যমস্তিষ্কের পার্শ্বদেশ	পৃষ্ঠ-	-	চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি	চেষ্টীয় অক্ষিগোলকের সম্বালন

[Ref: আজমল]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

চোখের অংশ	প্রধান কাজ	চোখের অংশ	প্রধান কাজ
কর্ণিমা	- প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে। - আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে।	অন্ধবিন্দু	- অন্ধবিন্দুতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
ক্রুরা	- অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। - চোখকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।	ফোবিয়া সেন্ট্রালিস	- বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এখানেই সবচেয়ে ভালো হয়।
কোরয়েড	- অক্ষিগোলকে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিফলন রোধ করে। - অক্ষিগোলকের পুষ্টি প্রদান করে।	রড কোষ	- মৃদু আলো শোষণ করে।
আইরিশ	- পিউপিলের ছিদ্র ছোট-বড় করে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।	কোণ কোষ	- উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণ করে।
সিলিয়ারি বডি	- লেন্সের উপযোগে সহায়তা করে।	অ্যাকুয়াস হিউমার	- লেন্সের পুষ্টি জোগায়। - বিবর্ধক মাধ্যমরূপে কাজ করে।
রেটিনা	- বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	ভিট্রিয়াস হিউমার	- রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে। - অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।
লেন্স	- আলোর প্রতিসরণ ঘটায়। - আলোকরশ্মিকে রেটিনার ওপর কেন্দ্রীভূত করে।	অশ্রুগ্রন্থি	- অশ্রুক্ষরণ করে চোখকে আর্দ্র রাখা অর্থাৎ শুষ্কতা হতে রক্ষা করা। - চোখের মধ্যে প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করা।
পিউপিল	- এর মাধ্যমে চোখে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে।	নেত্রপল্লব	- চোখে ধুলোবালি প্রবেশে বাধা দেয়।
কনজাংক্টিভা	- কর্ণিয়াকে রক্ষা করে।		

কানের অংশ	কাজ	কানের অংশ	কাজ
১। পিনা (বা কর্ণছত্র)	শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কর্ণকুহরে প্রবেশে সাহায্য করে।	৮। অর্ধবৃত্তাকার নালি	ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।
২। বহিঃ অডিটরি মিটাস (বা কর্ণকুহর)	কর্ণপটহ পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ প্রেরণ করে।	৯। ক্যুপুলা	ভারসাম্য রক্ষা করে।
৩। টিমপেনিক পর্দা (বা কর্ণপটহ)	শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।	১০। ইউস্টেশিয়ান নালি	মধ্যকর্ণ ও গলবিলছ বায়ুচাপের সমতা বজায় রাখে।
৪। কর্ণাহি, ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস	শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে।	১১। ইউট্রিকুলাস	ভারসাম্য অঙ্গ
৫। ককলিয়া	শ্রবণ অনুভূতি গ্রহণ করে ও মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।	১২। স্যাকুলাস	শ্রবণ অঙ্গ
৬। অর্গান অব কর্টি	শব্দ-গ্রাহক যন্ত্ররূপে কাজ করে।	১৩। কান	শ্রবণ ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।
৭। ভেস্টিবুলার যন্ত্র	ভারসাম্য রক্ষা করে।		

ইউট্রিকুলাস ভারসাম্য অঙ্গ এর অংশসমূহ		স্যাঙ্কুলাস শ্রবণ অঙ্গ এর অংশসমূহ		
১. ৩টি অর্ধবৃত্তাকার নালি	৪. অ্যাম্পুলা	১. ককলিয়া	৪. স্ক্যালা ভেস্টিবুলি	৭. স্ক্যালা মিডিয়া
২. ওটোলিথ	৫. ক্যুপুলা	২. স্ক্যালা টিমপেনি	৫. রেসনারা বিল্লি	৮. বেসিলার বিল্লি
৩. সংবেদী কোষ	৬. রোম	৩. অর্গান অব কর্টি	৬. হেলিকোড্রিমা	

১. রেচন	অ্যালডোস্টেরন হরমোন বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা এবং K রেচন হার বৃদ্ধি করে। ইপিনেফ্রিন হরমোন মূত্র উৎপাদন হ্রাস করে।	৬. দেহের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ	মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।
২. বয়োঃসন্ধি	টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও গোনাদোট্রিকয়েড	৭. জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপন ও গর্ভাবস্থায় স্তন্যদুগ্ধের বিকাশ	প্রোজেস্টেরন
৩. স্তন্যদুগ্ধের বিকাশ	ইস্ট্রোজেন	৮. প্রোটিনের বিপাক	থাইরক্সিন, ইস্ট্রোজেন
৪. জরায়ুর সংকোচন	অক্সিটোসিন	৯. জরায়ুর প্রসারণ	রিলাক্সিন
৫. পানি শোষণ ও পানিসাম্য	ADH, গ্লুকোকর্টিকয়েড		

১. থাইরক্সিন	স্বাভাবিক মাত্রায় ক্ষরণ হলে, উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, কাজের প্রতি অনগ্রহ সৃষ্ট হয়, মনোযোগ হ্রাস পায়, অনিদ্রা, ক্লান্তি ও উৎকর্ষা বৃদ্ধি করে।	৫. ইস্ট্রোজেন	মেয়েদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথাবার্তার দক্ষতা এবং অনুধাবন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়।
২. মেলাটোনিন	মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত মেলাটোনিন হরমোন মানুষের ঘুম ও জাগ্রত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।	৬. অ্যাডরেনালিন	এ হরমোন মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে।
৩. প্যারাথরমোন	এ হরমোন উত্তেজনার মাত্রাকে বৃদ্ধি করে।	৭. ইপিনেফ্রিন	মানুষের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. টেস্টোস্টেরন	এ হরমোন ক্ষরণের ফলে মানুষের উগ্রতা বৃদ্ধি পায়।		

- JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- (A) অপটিক
 (B) অকুলোমোটর
 (C) অডিটরি
 (D) অলফ্যাক্টরি

- অপটিক স্নায়ু- দর্শানুভূতি সৃষ্টি করে।
- অকুলোমোটর- অক্ষিগোলকের সম্ভালন।
- অডিটরি- শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে।
- অলফ্যাক্টরি- ঘ্রাণ নিতে সাহায্য করে।

- (A) পিটুইটারি
 (B) পিনিয়াল
 (C) থাইমাস
 (D) প্যানক্রিয়াস

(A) সেরেব্রাম (B) হাইপোথ্যালামাস (C) থ্যালামাস (D) সেরেব্রাল পেডাকুল

(A) অপটিক (B) ফেসিয়াল
 (C) ভেস্টিবুলি ককলিয়ার স্নায়ু (D) অ্যাবডুসেন্স

করোচিক ন্যায়ের নাম	কাজ
অপটিক ন্যায়	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
ফেসিয়াল ন্যায়	বাদ গ্রহণ, চর্চণ ও গ্রীবা সম্বলন।
অ্যাবডুসেন্স	অক্ষিপোলকের সম্বলন।

- (A) ইউট্রিকুলাস (B) স্যাকুলাস (C) ম্যালিয়াস (D) ইনকাস

● স্যাকলাস → শবণ অঙ্গ।

- (C) ভ্যাসোপ্রেসিন (D) সিক্রেটিন

নাম	কাজ
অক্সিটোসিন	স্তনের পেশির সংকোচন ঘটিয়ে দুধ ফরণে সাহায্য করে ও প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচন ত্বরান্বিত করে।
ভেসোপ্রেসিন/অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন	রক্তচাপ বৃদ্ধি করে ও বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

- (A) অলফ্যাক্টরি (B) অপটিক
 (C) ট্রকলিয়ার (D) ট্রাইজেনিটাল

• অপটিক → দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।

- কক্লিয়া নামক নালি অন্তঃকর্ণের স্যাকুলাসে থাকে।

18. চোখের আলোক সংবেদী অংশ হচ্ছে- [SAU : 06-07]

19. জ্ঞান নিতে সাহায্য করে নিচের কোন স্নায়ু? [SAU : 06-07]
 (A) অপটিক

20. অ্যাম্পনের বাইরের আবরণকে বলে- [SAU: 05-06]

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে? [SylAU; 18-19]

- (A) থ্যালামাস (B) সেরেব্রাম (C) হাইপোথ্যালামাস (D) সেরেবেলাম

Solve সেরেব্রামের কাজ : ১। চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি উন্নত মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে। ২। বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। ৩। বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। [Ref: আজমল]

02. কর্নিয়া ও লেন্সের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ যে তরল পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থাকে- [SylAU : 18-19]

- (A) অ্যাকুয়াস হিউমার (B) ভিট্রিয়াস হিউমার
(C) পেরিলিফ (D) এন্ডোলিফ

AS A Solve অক্সিজেনকে তরল পদার্থ পূর্ণ তিনটি গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ আছে।
মথা: অগ্রপ্রকোষ্ঠ, পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ, ডিড্রিয়াস প্রকোষ্ঠ। অগ্রপ্রকোষ্ঠ কর্নিয়া ও
আইরিশের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ। অ্যাকুয়াস হিউমার নামক পানির মতো তরল
পদার্থ দিয়ে প্রকোষ্ঠটি পূর্ণ থাকে। [Ref: আজমল]

03. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন নয় কোনটি? [SylAU: 18-19]

- (A) ট্রাইআক্সোডোথাইরোনিন
 (B) থাইমোসিন
 (C) থাইরক্সিন
 (D) ক্যালসিটোনিন

Solve থাইমোসিন থাইমাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। [Ref: আজমল]

04. পূর্ণবয়স্কদের সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের আয়তন কত? [SylAU : 17-18]

- (A) 10-130ml
 (B) 140-270ml
 (C) 280-330ml
 (D) 340-400ml

© 288-550-1212
 কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যতন্ত্রে লসিকার পরিবর্তে Cerebrospinal Fluid
 - CSF থাকে। পূর্ববয়স্ক একজন মানুষের দেহে এর পরিমাণ প্রায় ১৪০-১৫০
 মিলিলিটার। [Ref: মাজেনা]

- পূর্ণবয়স্কদের সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের আয়তন 120 মিলিমিটার। [Ref: আলীম]

05. নিম্ন দানার কাজ কী? [SylAU : 17-18]

- (A) শর্করা সংশ্লেষণ (B) প্রোটিন সংশ্লেষণ
(C) লিপিড সংশ্লেষণ (D) DNA সংশ্লেষণ

NEW B Solve নিউরনের - সাইটোপ্লাজমকে নিউরোপ্লাজম বলে।
নিউরোপ্লাজমে অসংখ্য নিউরোফাইব্রিল ও নিসল দানা (Nissl granules)
থাকে। নিসল দানা প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। [Ref: আলীম]

06. ডায়েনসেফালনের মধ্যস্থ গহ্বরটির নাম কী? [SylAU : 17-18]

- (A) প্রথম ভেন্দ্রিকল
 (B) দ্বিতীয় ভেন্দ্রিকল
 (C) তৃতীয় ভেন্দ্রিকল
 (D) চতুর্থ ভেন্দ্রিকল

 **ভেন্ডিকল সম্পর্কিত কিছু তথ্য :**

- পার্শ্বীয় ভেনট্রিকল: ১ম, ২য় দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের কেন্দ্রীয়ভাগে অবস্থিত।

- তৃতীয় ভেন্দ্রিকল: ডায়েনসেফালনের মধ্যস্থ গহ্বরটি তৃতীয় ভেন্দ্রিকল।

- চতুর্থ ভেন্ডিক্সল: এটি পশ্চাৎ মন্ডির মধ্যে অবস্থান করে। [Ref: পায়গীন]

07. ইউস্টিশিয়ান নালি কোথায় অবস্থিত? [SylAU : 16-17]

- (A) বহিঃকর্ণে
 (B) কর্ণছত্রে
 (C) পাকস্থলিতে
 (D) মধ্যকর্ণে

Solve ইউস্টেশিয়ান নালি, কর্ণাষ্টি (ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস)
ও ছিদ্রপথ নিয়ে কর্ণের মধ্যভাগ গঠিত। [Ref: আজমল]

08. মানবদেহে কয়টি অঙ্গের কথা বলুন? [SyLAU : 16-17]

- (A) ১০টি
 (B) ১২টি
 (C) ১৪টি
 (D) ১৬টি

Solve হরমোন শুধু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষ থেকে নয় বরং দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত কতগুলো বিশেষায়িত কোষ থেকেও নিঃসৃত হয়।
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ১০ ধরনের। [Ref: আজমল]

09. চোখের পিউপিলকে সংকোচিত করে কোন স্নায়ু? [SylAU : 15-16]

- (A) অপটিক
 (C) ট্রকলিয়ার

Solve অফিগোলকের পেশি, উর্ধ্বনেত্রপ্লব উত্তোলনকারী পেশি ও
পিউগিল সংকোচনকারী পেশি হলো অকুলোমোটর পেশি। [Ref: আজমর]

10. দেহের রাসায়নিক বার্তাবাহক কোনটি? [SylAU : 15-16]

- (A) হরমোন
 (C) পানি
 (B) প্রোটিন
 (D) এনজাইম

Solve দেহের রাসায়নিক বার্তাবাহক হলো হরমোন। অন্যদিকে এনজাইম হলো বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিতকারী জৈব অণু। [Ref: আজমল]

11. সেরেব্রামের সিংহদ্বার (প্রবেশ পথ) কলা হয় কোনটিকে? [SylAU : 15-16]

- (A) হাইপোথ্যালামাস
 (C) সাইন্যাপস
 (B) থ্যালামাস
 (D) ফোরায়েন ম্যাগনাম

Solve সেরেব্রামের সিংহদ্বার হলো ফোরামেন ম্যাগনাম। ফোরামেন ম্যাগনাম করেটির পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটি বড় ছিদ্রপথ। [Ref: অভ্রমল]

12. অ্যাক্সন কোথায় বিদ্যমান থাকে? [SylAU : 15-16]

- (A) লোহিত কণিকা
 (C) শুক্রাণু

Solve স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কাজের একক হলো নিউরন। নিউরনে অ্যাক্সন বিদ্যমান। [Ref: আজমল]

13. মানব মস্তিষ্ক প্রধানত কয়ভাগে বিভক্ত? [SylAU : 14-15]

- (A) দুই ভাগে (B) তিন ভাগে
(C) চার ভাগে (D) কোনো ভাগ নেই

Solve মানব মস্তিষ্ক প্রধানত তিন প্রকার। যথা : অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ বিলিয়ন নিউরন থাকে। [Ref: আজমল]

01. লিফোসাইটের পরিপক্বতা নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?
 (A) লিফয়েড (B) অ্যাডেনয়েড
 (C) থাইমাস (D) অস্থিমজ্জা

02. অক্ষ ক্ষরণকারী গ্রন্থির নাম হলো-
 (A) সিবেরিয়াস গ্রন্থি (B) ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি
 (C) হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি (D) মিবোমিয়ার গ্রন্থি

03. বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে মস্তিষ্কের-
 (A) সেরিব্রাম (B) থ্যালামাস
 (C) সেরিবেলাম (D) পনস

04. মানবদেহের রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন?
 (A) অ্যালডোস্টেরন (B) অ্যাঞ্জিওটেনসিন
 (C) এপিনেফ্রিন (D) প্যারাথরমোন

05. প্যারাথাইরয়েড নিয়ন্ত্রণ করে-
 (A) শর্করা সঞ্চয় (B) লেহ বিপাক
 (C) ক্যালসিয়াম মাত্রা (D) পিগমেন্ট গঠন

06. মানবদেহে স্টেপিস/কর্ণাঙ্গ কয়টি?
 (A) 1 টি (B) 2 টি
 (C) 3 টি (D) 4 টি

07. কোন হরমোনটি লিফোসাইট প্রস্তুতি অ্যান্টিবডি গঠনে কাজ করে?
 (A) অক্সিটোসিন (B) থাইরক্সিন
 (C) থাইমোসিন (D) আড্রিনালিন

08. চোখের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?
 (A) ভিট্রিয়াস হিউমার (B) রড কোষ
 (C) সিলিয়ারি অঙ্গ (D) কনজাংক্টিভা

09. জিহ্বা থেকে মস্তিষ্কে স্বাদের অনুভূতি নিয়ে আসে কোন স্নায়ু?
 (A) ভেস্টিবুলার (B) ককলিয়ার
 (C) অলফ্যাক্টরি (D) ফেসিয়াল

10. নিচের কোনটি আয়োডিনযুক্ত হরমোন?
 (A) থাইরক্সিন (B) ADH
 (C) TSH (D) GTH

11. কোনটি মধ্যকর্ণের গ্রন্থি নয়?
 (A) ম্যালিয়াস (B) ইনকাস
 (C) স্টেপিস (D) অ্যাটলাস

12. পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে কোন স্নায়ু কাজ করে?
 (A) গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (B) ভেগাস স্নায়ু
 (C) ফেসিয়াল স্নায়ু (D) অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু

13. ডেনড্রাইটে কোন অঙ্গাণু পাওয়া যায় না?
 (A) অমসৃণ ER (B) রাইবোসোম
 (C) নিউরোফিলামেন্ট (D) সবগুলো

14. অগ্রমস্তিষ্কের অংশ নয়-
 (A) সেরিব্রাম (B) থ্যালামাস
 (C) হাইপোথ্যালামাস (D) মেডুলা অবলংগাটা

15. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন-
 (A) TSH (B) T₃
 (C) T₄ (D) প্যারাথরমোন

16. মানব চোখের রড কোষে থাকে-
 (A) ভিটামিন-E (B) ভিটামিন-A
 (C) ভিটামিন-D (D) ভিটামিন-K

17. চোখের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি যোগায় কোনটি?
 (A) রেটিনা (B) স্ক্লেরা
 (C) কর্নিয়া (D) কোরয়েড

18. নিচের কোনটি স্বপ্নপ্তের সংকোচনের শক্তিকে বাড়ায়?
 (A) ভেগাস (B) ইনসুলিন
 (C) প্যারাথরমোন (D) অ্যাড্রেনালিন

19. স্পাইনাল কর্ড-এ কত জোড়া স্পাইনাল নার্ভ থাকে?
 (A) ৩০ জোড়া (B) ৩১ জোড়া
 (C) ৩২ জোড়া (D) ৩৩ জোড়া

20. চোখের লেন্সে পরিমিত আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে-
 (A) কর্নিয়া (B) আইরিশ
 (C) রেটিনা (D) সিলিয়ারি বডি

21. স্নায়ুকলার কোষীয় একক কোনটি?
 (A) নেফ্রন (B) নিউরন
 (C) ব্রুকিওল (D) হেপাটোসাইট

22. পিনিয়াল গ্রন্থির অবস্থান কোথায়?
 (A) মস্তিষ্কে (B) মস্তিষ্কের ১ম প্রকোষ্ঠে
 (C) মস্তিষ্কের ২য় প্রকোষ্ঠে (D) মস্তিষ্কের ৩য় প্রকোষ্ঠে

23. রড ও কোণ কোষ কোথায় থাকে?
 (A) চোখে (B) কানে
 (C) মুখে (D) গলায়

24. ট্রিক্লিমার স্নায়ুর উৎস-
 (A) অগ্রমস্তিষ্ক (B) মধ্যমস্তিষ্ক
 (C) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (D) মেডুলা অবলংগাটা

25. স্বপ্নপ্তন মস্তিষ্কের কোন অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
 (A) সেরিবেলাম (B) মেডুলা অবলংগাটা
 (C) থ্যালামাস (D) হাইপোথ্যালামাস

26. মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে তরলে পূর্ণ গহ্বরগুলোকে কী বলে?
 (A) ভেন্ট্রিকল (B) লোবিউল
 (C) মেডুলা (D) ভেকিউল

27. পাকস্থলিতে কোন করোটিক স্নায়ুর কার্যক্রম বিদ্যমান?
 (A) অপটিক (B) অডিটরি
 (C) ভেগাস (D) অকুলোমোটর

28. নিচের কোন হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় না?
 (A) থাইরক্সিন (B) থাইমোসিন
 (C) ক্যালসিটোনিন (D) কোনোটিই নয়

29. অ্যাড্রিনালিন স্বপ্নপ্তনের হারকে?
 (A) স্বাভাবিক রাখে (B) বাড়ায়
 (C) কমায় (D) প্রভাবিত করে না

30. কোনটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার?
 (A) অ্যাড্রেনালিন (B) হিস্টামিন
 (C) পেপসিন (D) ডোপামিন

OMR				
01. A B C D	02. A B C D	03. A B C D	04. A B C D	05. A B C D
06. A B C D	07. A B C D	08. A B C D	09. A B C D	10. A B C D
11. A B C D	12. A B C D	13. A B C D	14. A B C D	15. A B C D
16. A B C D	17. A B C D	18. A B C D	19. A B C D	20. A B C D
21. A B C D	22. A B C D	23. A B C D	24. A B C D	25. A B C D
26. A B C D	27. A B C D	28. A B C D	29. A B C D	30. A B C D

Answer									
30.D	29.B	28.B	27.C	26.A	25.B	24.B	23.A	22.D	21.B
20.B	19.B	18.D	17.D	16.B	15.D	14.D	13.D	12.B	11.D
10.A	09.D	08.A	07.C	06.A	05.C	04.A	03.A	02.B	01.C

Part 1

♂ পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System):

৬ পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ এবং এদের গঠন ও কাজ :

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনাগ্ন ক্রিয়া : পুরুষ প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত হরমোন ও তাদের কাজ-

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া : পুরুষ প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত হরমোন ও তাদের কাজ-

[illegible]

ডিম্বাণুর প্রকারভেদ : কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ৩ প্রকার

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুম থাকে না বা খুবই নগণ্য পরিমাণে থাকে, তাই কুসুম না থাকলে অ্যালেসিথাল আর থাকলেও তা সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে, তাই মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু বলে।

এটি একটি ফিটোমেটোরনাল অঙ্গ। এর অধিকাংশই জ্রণের কোরিওনিক ভিলাই থেকে গঠিত হয়। মানুষের অমরা বেশ বড় ও চাকাতর আকৃতির। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পর (বা প্রায় ৪ মাসে) প্রাসেন্টা গঠিত হয়। নিষেকের ৮ সপ্তাহের (বা ২ মাস) মধ্যে জ্রণ মানুষের সকল অবস্থান লাভ করে অর্থাৎ এতে হাত, পা, মাথা, শ্রীবা ইত্যাদি সকল কিছুই আবির্ভূত হয়। জ্রণের এ অবস্থাকে ফিটাস (Foetus) বলে। একটি লম্বা (40-50 cm) অ্যাখিলিকাল কর্ড বা নাভিরজু দ্বারা অমরা ফিটাসের সাথে যুক্ত থাকে। এই রজুর মধ্যে অবস্থিত শিরা ও ধমনির সাহায্যে মাতৃদেহ ও জ্রণ দেহের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু আদান-প্রদান ঘটে। এসব কারণে অমরাকে জৈব সেতু বলা হয়।

৬. আমরা থেকে প্রোজেক্টেরন ও রি-গার্মিং ...
৭. সকল জীবাত্মকে সত্যের উপায় : সত্যদেহ থেকে যে সকল জীবাত্ম আমাদের মাধ্যমে যেতে পারে (হৃদ : হাসিব এই বেলা)...

৬ অমরার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আদান-প্রদান :

জন্ম ও ফিটাসের বিকাশ (Development of Embryo and Foetus) :

জরায়ুতে ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ ঘটে। জরায়ুতে ফিটাস আরও ৩৩-৩৬ দিন

পরিস্ফরণের খাপ	
১। জাইগোট	এককোষী নিষিক্ত ডিম্বাণু।
২। মক্ৰলা	বহুকোষী ফাঁপা বলের মতো দশা।
৩। ব্লাস্টুলা	একস্তরবিশিষ্ট ব্লাস্টোসিল গহ্বরযুক্ত দশা।
৪। গ্যাস্ট্রুলা	ত্রিস্তরবিশিষ্ট আর্কেটেরন গহ্বরযুক্ত দশা।
৫। জ্রণের প্রথম অবস্থা (৩ সপ্তাহ)	ছোট মটরদানার মতো জীবন্ত জ্রণ।
৬। ৫ম সপ্তাহের জ্রণ	জ্রণ আকারে কিছুটা বড় হয়, রক্তবাহ ও হৃৎপিণ্ড গঠিত হয়।
৭। পরিণত অবস্থা (৮ সপ্তাহ)	মানুষের জ্রণের আকার ধারণ করে, হাত-পা গঠিত হয়।
৮। পরিপূর্ণ জ্রণ (শিশু)	৪০ সপ্তাহে জ্রণ সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় এবং জন্মলাভ করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

05. পলিমেসিথাল ডিমাণু কোন প্রজাতির মধ্যে পাওয়া যায়? [BAU : 05-06]

- 
 পলিলেসিখাল ডিম্বাণু মাছ, সরিসৃপ; পাখি এবং
 Monotremata ভুক্ত স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে পাওয়া যায়।

- (A) 8টি
 (C) ৩টি
 (B) ২টি
 (D) ১টি

- স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় একটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি শুক্রাণু তৈরি হয়।

- (A) দুই অংশে
 (B) তিন অংশে
 (C) পাঁচ অংশে
 (D) চার অংশে

(A) তিনটি
 (B) দুইটি
 (C) তিনটি
 (D) চারটি

(A) পার্থেনোজেনেসিস
 (B) ফার্টাইলাইজেশন
 (C) গ্যামেটোজেনেসিস
 (D) ডাইটেলোজেনেসিস

(A) ডিম্বাণুকে ধারণ করে (B) শুক্রাণুকে ধারণ করে
 (C) লাইটিক এনজাইম নিঃসরণ করে (D) প্রজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে

(A) শুক্রাণু
 (B) ডিম্বাণু
 (C) শুক্রাশয়
 (D) ডিম্বাশয়

(A) 2টি (B) 3টি (C) 4টি (D) 5টি **Ans C**



শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(A) ক্রোয়েকা
 (B) হুথপিও
 (C) দাঁতের ডেন্টিন
 (D) ট্রাকিয়া

Solve তিনটি দ্রবীয স্তরের পারিণতির হক :

- পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষের নিউক্লিয়াসের মিলনকে ফার্টিলাইজেশন বলে।

Solve মাতৃদুগ্ধে প্রোটিনের পরিমাণ 1.63%। [Ref: আজমলা]

05. জগীয় কোন স্তর থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর রক্ত সংবহনতন্ত্রের উৎপত্তি হয়? [SylAU: 11-12]

SELF TEST

18. জন্মীয় স্তরের কোন অংশ থেকে ডেন্টিন তৈরি হয়?
 (A) এক্টোডার্ম (B) এন্ডোডার্ম
 (C) মেসোডার্ম (D) সবগুলো।
 19. কোনটি শুক্রাণু তৈরি করে?
 (A) স্পার্মাটোগোনিয়া (B) স্ট্রোমাম
 (C) অ্যানাফেজ-১ (D) প্রোস্টেট গ্রন্থি
 20. জাইগোট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলে?
 (A) ইমপ্র্যাগেশন (B) গ্যাস্ট্রুলেশন
 (C) ফার্টলাইজেশন (D) অর্গানোজেনেসিস
 21. শ্নায়ুতন্ত্র কোন জন্মীয় স্তর থেকে উৎপন্ন হয়?
 (A) এক্টোডার্ম (B) মেসোগ্লিয়া
 (C) মেসোডার্ম (D) এক্টোডার্ম
 22. সিফিলিসের জীবাণুর গণ কোনটি?
 (A) *Treponema* (B) *Neisseria*
 (C) *Plasmodium* (D) *Vibrio*
 23. কেন্দ্রীয় শ্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয় — থেকে।
 (A) এক্টোডার্ম (B) এন্ডোডার্ম
 (C) মেসোডার্ম (D) এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম
 24. কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হয়—
 (A) জরায়ুতে (B) বৃক্কে
 (C) ডিম্বাশয়ে (D) স্তন্যগ্রন্থিতে
 25. ফার্টলাইজিন নিঃসৃত হয় কোথা থেকে?
 (A) লিভার (B) ফুসফুস
 (C) ডিম্বাণু (D) কিডনি
 26. জন্মীয় মেসোডার্ম থেকে কোন অঙ্গটি গঠিত হয়?
 (A) এপিডার্মিস, শ্নায়ুতন্ত্র (B) কঙ্কালতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র
 (C) পৌষ্টিকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র (D) এপিডার্মিস, পেশিতন্ত্র
 27. কোন হরমোনের উৎস পিটুইটারি গ্রন্থি নয়?
 (A) ভ্যাসোপ্রেসিন (B) প্রোজেক্টেরিন
 (C) প্রোলাক্টিন (D) অক্সিটসিন
 28. নিচের কোনটি শুক্রাণু তৈরি করে?
 (A) স্পার্মাটোগোনিয়া (B) স্ট্রোমাম
 (C) ইপিডিডাইমিস (D) প্রোস্টেট গ্রন্থি
 29. লিউটিনাইজিং হরমোন যে কাজকে প্রভাবিত করে—
 (A) অস্থি বৃদ্ধি (B) খাদ্যের বিপাক
 (C) রক্তচাপ (D) যৌন হরমোনের কাজ
 30. মানুষের দেহে কোনটি টেস্টোস্টেরন তৈরি করে?
 (A) স্ট্রোমাম (B) ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
 (C) এপিডিডাইমিস (D) স্পার্মাটোগোনিয়া

OMR				
01.ABCD	02.ABCD	03.ABCD	04.ABCD	05.ABCD
06.ABCD	07.ABCD	08.ABCD	09.ABCD	10.ABCD
11.ABCD	12.ABCD	13.ABCD	14.ABCD	15.ABCD
16.ABCD	17.ABCD	18.ABCD	19.ABCD	20.ABCD
21.ABCD	22.ABCD	23.ABCD	24.ABCD	25.ABCD
26.ABCD	27.ABCD	28.ABCD	29.ABCD	30.ABCD

Answer									
30.B	29.D	28.A	27.B	26.B	25.C	24.C	23.A	22.A	21.D
20.C	19.A	18.C	17.B	16.D	15.B	14.C	13.C	12.D	11.B
10.D	09.B	08.B	07.A	06.C	05.D	04.C	03.A	02.B	01.C

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

যেসব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন (Immunogen) বলে। হাঙ্গেরিয়ান অণুজীব বিজ্ঞানী Ladislaus Deutsch (1903) সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন।

नामावलि

১১. টিকা বা ভ্যাকসিন (Vaccine) : প্রাথমিক আলোচনা

৬. টিকা কাহিনি : ■ গুটি বসন্ত : ড. অ্যাডওয়ার্ড জেনার (১৭৯৬) গো-বসন্তের ভাইরাস থেকে তৈরি করেন।

- **HIV (এইডস)**, হেপাটাইটিস-C এর টিকা এখনো আবিষ্কার হয়নি।

৭ জীবাণুঘটিত কয়েকটি রোগের ড্যাকসিন, তাদের জীবাণু ও প্রকৃতি :

[Ref : মাজেদা]

At a glance [Most Important Information]

- [illegible]

01. মানবদেহের ক্ষেত্রে কতটি প্রতিরক্ষা স্তর কাজ করে?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫ (Ans) B
 02. নিচের কোনটি ১ম প্রতিরক্ষা স্তরের রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে?
 (A) পরিপাকতন্ত্র (B) ত্বক (C) অশ্রু লাইসোজাইম (D) নাক (Ans) C
 03. ত্বকের কতটি কার্যকরী স্তর রয়েছে?
 (A) ৩ (B) ৪ (C) ৫ (D) ২ (Ans) A
 04. দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি?
 (A) পাকস্থলী (B) যকৃৎ (C) ত্বক (D) কোনোটিই নয় (Ans) C
 05. ত্বকের কোন স্তরের ওপর সমগ্র ত্বকতন্ত্র অবস্থিত?
 (A) এপিডার্মিস (B) হাইপোডার্মিস (C) ডার্মিস (D) কোনোটিই নয় (Ans) A
 06. দেহে HCl অ্যাসিডের উৎপাদন কম হলে কোন অণুপুষ্টির শোষণ বাধাগ্রস্ত হয় না?
 (A) জিংক (B) ভিটামিন-সি (C) ফলিক এসিড (D) ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (Ans) B
 07. পাকস্থলির অভ্যন্তরে pH কত?
 (A) ১-২ (B) ৩-৪ (C) ২-৩ (D) ৩-৫ (Ans) A
 08. রক্তের কোন কণিকার ওপর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভরশীল?
 (A) লোহিত রক্তকণিকা (B) শ্বেত রক্তকণিকা (C) অণুচক্রিকা (D) কোনোটিই নয় (Ans) B
 09. কোন প্রতিরক্ষাস্তরটি নন-স্পেসিফিক অস্তিত্ব প্রতিবন্ধক হিসেবে পরিচিত?
 (A) প্রথম স্তর (B) দ্বিতীয় স্তর (C) তৃতীয় স্তর (D) কোনোটিই নয় (Ans) B
 10. দেহে প্রতিষ্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে কয় ধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ কাজ করে?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫ (Ans) A
 11. নিচের কোনটি দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়?
 (A) টিস্যু (B) রক্তবাহিকা (C) ফ্যাগোসাইট (D) থ্রম্বোসাইট (Ans) D
 12. নিচের কোনটিতে ম্যাক্রোফেজ স্থায়ীভাবে অবস্থান করে?
 (A) প্লিহা (B) অ্যাপেনডিক্স (C) টনসিল (D) সবগুলো (Ans) D
 13. নিচের কোনটিতে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী নয়?
 (A) হাম (B) পোলিও (C) গুটিবসন্ত (D) ইনফ্লুয়েঞ্জা (Ans) D
 14. অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কত প্রকার?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫ (Ans) A
 15. পাকস্থলির প্রাচীর থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নিঃসরণ কমে গেলে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়?
 (A) বদহজম (B) ডায়রিয়া (C) বুক জ্বালাপোড়া (D) সবগুলো (Ans) D
 16. প্রাজমা প্রোটিনের শতকরা কত ভাগ কমপ্লিমেন্ট তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত?
 (A) ১০% (B) ২০% (C) ৪০% (D) ৫০% (Ans) A
 17. সেরুমিনাস গ্রন্থির অবস্থান কোথায়?
 (A) বহিঃকর্ণ (B) অন্তঃকর্ণ (C) মধ্যকর্ণ (D) কর্ণিয়া (Ans) A
 18. অ্যান্টিবডি তৈরি করে-
 (A) T লিম্ফোসাইট (B) B লিম্ফোসাইট (C) মনোসাইট (D) নিউট্রোফিল (Ans) B
 19. ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া কতটি ধাপে সম্পন্ন হয়?
 (A) ২টি (B) ৩টি (C) ৪টি (D) ৭টি (Ans) D
 20. কোষের সুইসাইডাল ফোয়াড থাকে কীভাবে?
 (A) লাইসোসোম (B) সেন্ট্রিওল (C) ক্রোমোপ্লাস্ট (D) সেন্ট্রোসোম (Ans) A
 21. উৎপাদনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে অ্যান্ট্রিন কত প্রকার?
 (A) ৬ (B) ৪ (C) ৫ (D) ৩ (Ans) C
 22. লাইসোজাইম নিচের কোনটি ধ্বংস করে?
 (A) Streptococcus (B) Bacillus (C) Staphylococcus (D) সবগুলো (Ans) D
 23. প্যারাটপ নিচের কোনটির অংশ?
 (A) অ্যান্টিজেন (B) অ্যান্টিবডি (C) জিন (D) কোষ (Ans) B
 24. নিচের কোনটি ব্যাক্টেরিয়ানাশক?
 (A) সেরুমেন (B) স্পার্মিন (C) HCl (D) সবগুলো (Ans) B
 25. ইন্টারফেরন নিঃসৃত হয় কোন ধরনের রক্তকণিকা থেকে?
 (A) লোহিত রক্তকণিকা (B) শ্বেত রক্তকণিকা (C) অণুচক্রিকা (D) কোনোটিই নয় (Ans) B
 26. নিচের কোনটি ব্যাক্টেরিয়ানাশক নয়?
 (A) সেবাম (B) রক্ত (C) স্পার্মিন (D) সবগুলো (Ans) B
 27. কত ধরনের লিম্ফোসাইট নিয়ে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫ (Ans) A
 28. মানবদেহে কি পরিমাণ অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে?
 (A) ১০০ মিলিয়ন (B) ১০০ বিলিয়ন (C) ১০০ কোটি (D) কোনোটিই নয় (Ans) A
 29. ইমিউনোগ্লোবুলিন কোন জাতীয় পদার্থ?
 (A) কার্বোহাইড্রেট (B) প্রোটিন (C) গ্রাইকোজেন (D) স্নেহ (Ans) B
 30. নিচের কোনটিতে ইমিউনোগ্লোবুলিন A(IgA) উপস্থিত?
 (A) অশ্রু (B) পরিপাক রস (C) শ্বসন তরল রক্ত (D) সবগুলো (Ans) D
 31. অ্যান্টিবডির বড় ভারী শিকলে কতটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে?
 (A) ৪৪০ (B) ২২০ (C) ৫১০ (D) ৩৬০ (Ans) A
 32. অ্যান্টিবডির ভারী শৃঙ্খলের আণবিক ওজন কত?
 (A) ৫০-৭০ KD (B) ২৩ KD (C) ৩০-৪০ KD (D) ২০-৫০ KD (Ans) A
 33. প্রাণিদেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কত দিন সময় লাগে?
 (A) ২-১০ দিন (B) ৫-৭ দিন (C) ৩-১৪ দিন (D) ৬-১৫ দিন (Ans) A
 34. অ্যালার্জির ক্ষেত্রে কোন জাতীয় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়?
 (A) হিস্টামিন (B) প্রোটামিন (C) প্রোলিন (D) কোনোটিই নয় (Ans) B
 35. বিসিজি (BCG) টিকা কোন রোগের জন্য দেওয়া হয়?
 (A) পোলিও (B) হুপিংকাশি (C) ধনুষ্ঠকার (D) যক্ষ্মা (Ans) C
 36. স্টেমকোষ কোনটির মাধ্যমে রক্ত সংবহনতন্ত্রে পৌঁছায়?
 (A) থাইমাস (B) লসিকাপর্ব (C) রুথপিণ্ড (D) সবগুলো (Ans) D
 37. মানুষের রক্তে শতকরা কত ভাগ IgG অ্যান্টিবডি বিদ্যমান?
 (A) ১৫ - ২০% (B) ৩০ - ৫০% (C) ৭০ - ৭৫% (D) ২০ - ৪০% (Ans) C
 38. ফ্যাগোসাইটকে বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত সহযোগিতা করে কে?
 (A) কমপ্লিমেন্ট (B) অপসোনি (C) হিস্টামিন (D) ইন্টারফেরন (Ans) B

SELF TEST

- | OMR | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 01.ABCD | 02.ABCD | 03.ABCD | 04.ABCD | 05.ABCD | | | | | |
| 06.ABCD | 07.ABCD | 08.ABCD | 09.ABCD | 10.ABCD | | | | | |
| 11.ABCD | 12.ABCD | 13.ABCD | 14.ABCD | 15.ABCD | | | | | |
| 16.ABCD | 17.ABCD | 18.ABCD | 19.ABCD | 20.ABCD | | | | | |
| 21.ABCD | 22.ABCD | 23.ABCD | 24.ABCD | 25.ABCD | | | | | |
| 26.ABCD | 27.ABCD | 28.ABCD | 29.ABCD | 30.ABCD | | | | | |
| Answer | | | | | | | | | |
| 30.C | 29.A | 28.A | 27.B | 26.A | 25.B | 24.B | 23.D | 22.A | 21.B |
| 20.A | 19.A | 18.B | 17.B | 16.A | 15.C | 14.D | 13.C | 12.D | 11.B |
| 10.A | 09.B | 08.B | 07.C | 06.D | 05.B | 04.A | 03.A | 02.C | 01.C |

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- প্রকট এপিষ্টাসিসের ওপর পরীক্ষা করেন- বেটসেন ও পানেট
 - প্রোটিন বা গ্রাইকোপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ- অ্যান্টিজেন-
 - সর্বপ্রথম Evolution শব্দটি ব্যবহার করেন- হার্বার্ট স্পেন্সার
 - প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের প্রবক্তা- চার্লস রবার্ট ডারউইন
 - সুসংগঠিত জৈব বিবর্তনবাদের প্রথম প্রবক্তা- ল্যামার্ক
 - অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদের প্রবক্তা- ল্যামার্ক
 - প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে- পপুলেশন পর্যায়ে
 - সমবৃত্তি অঙ্গের উদাহরণ- পাখির ডানা, প্রজাপতির ডানা
 - পুনরাবৃত্তি মতবাদের প্রবক্তা- আর্নেস্ট হেক্সেল
 - বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্য- জীবাশ্ম
 - সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে- মেলানিন
 - অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে বলা হয়- ইন্টারমিডিয়েট জিন
 - মানুষের সেন্স-লিংকড জিন পাওয়া যায়- ৬০টি
 - অপটিক নার্ভের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা যায়- অপটিক এড্রফি রোগ
 - মাথার চুল আংশিক সাদা হওয়া- হোয়াইট ফোরলক
 - অসম্পূর্ণ প্রকটতা আবিষ্কার করেন- কার্ল করেল
 - মেঙ্গেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন যে রক্তে থাকে তাকে বলে- Rh⁺ রক্ত
 - মেঙ্গেলীয় প্রচ্ছন্ন অ্যান্টিজেন যে রক্তে থাকে তাকে বলে- Rh⁻ রক্ত
 - অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায়- সন্ধ্যামালতী, তুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে
 - পলিজিন নামকরণ করেন- K. Mather, ১৯৫৪ সালে
 - পলিজিনের বৈশিষ্ট্য- ক্রমবর্ধিষ্ণু (Cumulative)
 - নিম্নো ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিয়ে হলে সন্তানের গায়ের বর্ণ- মিউল্যাটো
 - প্রথম হিমোফিলিয়া রোগ আবিষ্কার করেন- John Conrad Oho
 - হিমোফিলিয়া A হওয়ার প্রবণতা- ৮০%
 - মানবদেহে অ্যান্টিজেন রয়েছে- ৪০০ ধরনের
 - অ্যাগ্রুটিনোজেন/আইসোঅ্যাগ্রুটিনোজেন বলা হয়- অ্যান্টিজেনকে
 - জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়- অ্যান্টিজেন
 - অ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়- অ্যান্টিজেন
 - মানুষের Y জিন নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য- কানের সোম
 - লাল সবুজ বর্ণান্ধতা রোগটি শনাক্ত করা যায়- ইশিহারা কালার টেস্ট দ্বারা
 - হিমোফিলিয়া রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে- পুরুষরা
 - অধিকাংশ হিমোফিলিক ব্যক্তি আক্রান্ত হয়- হিমোফিলিয়া-A রোগে
 - মাসকুলার ডিসট্রফি বেশি হয়- ছেলে শিশুদের
 - ভয়াবহতম ডিসট্রফি - ডুশেনি মাসকুলার ডিসট্রফি
 - ক্রম অবনয়ন উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে- অ্যান্টিজেন
 - Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট জটিলতা- রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা
 - একটি জিনের সংখ্যা বেশি হলে গায়ের রং-এর- গাঢ়ত্ব বেড়ে যাবে
 - পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়- ভুট্টা বা গমের দানার রঙ
 - মাসকুলার ডিসট্রফির জন্য দায়ী জিন- ডিসট্রফিন জিন
 - মানবদেহে পেশি প্রোটিন রয়েছে- প্রায় ৩ হাজার
 - একাধিক জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়- মেঙ্গেলের প্রথম সূত্র
 - কোনো জীবের জিনোটাইপ নির্ধারণ করা যায়- টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে
 - প্রকৃতিতে সকল হলুদ বর্ণের ইঁদুরের প্রকৃতি- হেটারোজাইগাস
 - ৫০% এর বেশি জীব মারা যায়- সেমিলিখাল জিনের প্রভাবে
 - ৫০% এর কমসংখ্যক জীব মারা যায়- সাবডাইটাল জিনের প্রভাবে
 - মানুষে হিমোফিলিয়া রোগ সৃষ্টিকারী লিখাল জিন- সেমিলিখাল ধরনের
 - ডুশেনি মাসকুলার ডিসট্রফি রোগ দেখা যায়- পঞ্চাশ হাজারে মাত্র একজন
 - আর্কিওপটেরিফ্ল -এর আবির্ভাব হয়েছিল- জুরাসিক যুগে
 - মারসুপিয়াল নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া যায়- অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে
 - বছরে ৬০০বার প্রজনন ঘটাতে সক্ষম- প্যারামেসিয়াম
 - নয়া-ডারউইনবাদের প্রধান প্রবক্তা- অগাস্ট ভাইজম্যান
 - ভাইজম্যান জার্মপ্রাজম মতবাদ প্রকাশ করেন- ১৮৯৫ সালে
 - ল্যামার্কের 'অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার' তত্ত্বের বিরোধিতা করেন - ভাইজম্যান
 - জার্মপ্রাজম-সোমোটোপ্রাজম তত্ত্বের প্রবক্তা- অগাস্ট ভাইজম্যান
 - সর্বপ্রথম উভচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে- প্যালিওজয়িক মহাযুগে
 - আদি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়- প্রোটোজোয়িক মহাযুগে

Part 3

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান

গুচ্ছভুক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোন F₁ জীবকে তার প্যারেন্টের সাথে ক্রস করানোর নাম- [Agri Cluster : 22-23].
 (A) টেস্ট ক্রস (B) ব্যাক ক্রস
 (C) মনোহাইব্রিড ক্রস (D) ডাইহাইব্রিড ক্রস
-  **Solve** F₁ জানুর একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃ-বংশীয় এক সদস্যের সঙ্গে সংকরায়নকে ব্যাক ক্রস বলে।
02. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস এর অনুপাত হলো- [Agri Cluster : 22-23]
 (A) ১৩:৩ (B) ৯:৭
 (C) ১:২:১ (D) ১:৪:৬:৪:১
-  **Solve** • দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস এর অনুপাত হলো ৯:৭।
 • এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।
03. রডিন জিন থাকা সত্ত্বেও হোয়াইট লেগহর্ন মুরগীর পালক সাদা হয় কেন? [Agri Cluster : 22-23]
 (A) সমপ্রকটতা (B) পরিপূরক জিন
 (C) প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস (D) একট এপিষ্ট্যাসিস
-  **Solve** • রডিন জিন থাকা সত্ত্বেও হোয়াইট লেগহর্ন মুরগীর পালক সাদা হয় একট এপিষ্ট্যাসিসর জন্য।
 • বেটসন এবং পানোট লেগহর্ন মুরগীর উপর পরীক্ষায় এটি প্রমাণ করেন।

04. ঘাসফড়িং-এর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি কোনটি? [Agri Cluster : 22-23]
 (A) XX-XY ~ (B) XX-XO
 (C) ZZX-ZO (D) ZZ-ZW
-  **Solve** • ঘাসফড়িং-এর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি XX-XO ।
 • ড্রসোফিলা-এর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি XX-XY ।
05. প্রচ্ছন্ন লিখাল জিন কোন অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়? [Agri Cluster : 22-23]
 (A) হোমোজাইগাস (B) হেটারোজাইগাস
 (C) হেমিজাইগাস (D) মনোজাইগাস
-  **Solve** • প্রচ্ছন্ন লিখাল জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটে ।
 • হেটারোজাইগাস হলে জীব মারা যায় না ।
06. দৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাটিস-এর উদাহরণ কোনটি? [Agri Cluster : 22-23]
 (A) মুক-বধিরতা (B) থ্যালাসেমিয়া
 (C) রাতকানা (D) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা
-  **Solve** • দৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাটিস এর উদাহরণ : মুক-বধিরতা ।
 • দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত এপিষ্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এর জন্য দায়ী ।
07. জীবন্ত জীবাশ্ম কোনটি? [Agri Cluster : 22-23]
 (A) Peripatus (B) Platypus (C) Eohippus (D) Equus
-  **Solve** • Platypus, Peripatus জীবন্ত জীবাশ্ম ।
 • Equus, ঘোড়ার বিবর্তনের Modern Stage । [Ref: মাজেদা]

Part 4

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

01. মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে বলে-
 (A) পৃথকীকরণ সূত্র (B) অসম্পূর্ণ প্রকটতার সূত্র
 (C) স্বাধীন মিলনের সূত্র (D) এপিষ্ট্যাসিসের সূত্র (Ans C)
 02. মেডেলের গবেষণা কর্ম প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল-
 (A) ১৯৩৩ সালে (B) ১৮৫৫ সালে.
 (C) ১৮৬৬ সালে (D) ১৮৯৯ সালে (Ans C)
 03. কোনো F₁ জীবকে তার প্রকৃত প্রচ্ছন্ন প্যারেন্টের সাথে ক্রস করা হলে তাকে বলে-
 (A) ব্যাক ক্রস (B) টেস্ট ক্রস
 (C) মনোহাইব্রিড ক্রস (D) F₁ ক্রস (Ans B)
 04. কোন জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের গঠনকে বলা হয়-
 (A) জিনোটাইপ (B) অ্যালিল
 (C) ফ্যাক্টর (D) ফিনোটাইপ (Ans B)
 05. F₁ ও F₂ জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস নাকি হেটেরোজাইগাস তা জানার প্রক্রিয়া-
 (A) ব্যাক ক্রস (B) টেস্ট ক্রস
 (C) মনোহাইব্রিড ক্রস (D) ডাইহাইব্রিড (Ans B)
 06. কোনটিতে হোমোগ্যামেটিক জিনোটাইপ থাকে?
 (A) নারী (B) পুরুষ
 (C) A ও B উভয়ই (D) কোনোটিই নয় (Ans C)
 07. সমপ্রকটতার ফিনোটাইপিক অনুপাত কত?
 (A) ৩ : ১ (B) ২ : ১
 (C) ১ : ২ : ১ (D) ৯ : ৩ : ৩ : ১ (Ans C)
 08. ক্রমবর্ধমান দ্বিত্ব জিনের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত কত?
 (A) ১ : ২ : ১ (B) ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১
 (C) ৯ : ৩ : ৩ : ১ (D) কোনোটিই নয় (Ans B)
 09. কোন জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি অসমপ্রকৃতির হলে তাকে কী বলে?
 (A) হোমোজাইগাস (B) হেটেরোজাইগাস
 (C) জিনোটাইপ (D) ফিনোটাইপ (Ans B)
 10. F₂ জনুর কোন অনুপাতটি মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের পরিচায়ক?
 (A) ৩ : ১ (B) ৯ : ৩ : ৩ : ১.
 (C) ৯ : ৩ (D) ৩ : ২ : ১ (Ans B)
 11. রাজা মৌমাছির ক্রোমোসোম সংখ্যা রানি মৌমাছির ক্রোমোসোম সংখ্যার কত গুণ?
 (A) অর্ধেক (B) সমান (C) দ্বিগুন (D) তিনগুন (Ans A)
 12. 'জিন' শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
 (A) মেডেল (B) ওয়াটসন
 (C) জোহানসেন (D) ডারউইন (Ans C)
 13. F₁ জনুর উদ্ভিদকে প্রচ্ছন্ন প্যারেন্টের সাথে ক্রস করাকে বলা হয়-
 (A) ব্যাক ক্রস (B) টেস্ট ক্রস
 (C) মনোহাইব্রিড ক্রস (D) ডাইহাইব্রিড ক্রস (Ans B)
 14. F₂ জনুতে ১:২:১ ফিনোটাইপিক অনুপাত প্রাপ্তির কারণ-
 (A) অসম্পূর্ণ প্রকটতা (B) ঘাতক জিন
 (C) পরিপূরক জিন (D) এপিষ্ট্যাসিস (Ans A)
 15. F₂ জনুতে ৯:৩ ফিনোটাইপিক অনুপাত প্রাপ্তির কারণ-
 (A) অসম্পূর্ণ প্রকটতা (B) ঘাতক জিন
 (C) পরিপূরক জিন (D) এপিষ্ট্যাসিস (Ans C)
 16. F₂ জনুতে ১২:৩:১ ফিনোটাইপিক অনুপাত প্রাপ্তির কারণ-
 (A) অসম্পূর্ণ প্রকটতা (B) ঘাতক জিন
 (C) পরিপূরক জিন (D) এপিষ্ট্যাসিস (Ans D)
 17. F₁ এর জীবের সাথে মাতা-পিতার যে কোনো সদস্যের ক্রসকে বলে-
 (A) মনোহাইব্রিড ক্রস (B) ডাইহাইব্রিড ক্রস
 (C) টেস্ট ক্রস (D) ব্যাক ক্রস (Ans D)
 18. বংশগতিতে পুনঃআবির্ভাব-
 (A) ১৮৮০ (B) ১৯২০
 (C) ১৯৬৫ (D) ১৯০০ (Ans D)
 19. একাধিক জিন থাকে যেখানে-
 (A) সেন্ট্রোসোম (B) লাইসোসোম
 (C) ক্রোমোসোম (D) সেন্ট্রোমিয়ার (Ans C)
 20. কোনটি হোমোজাইগাস জিনোটাইপ?
 (A) RrYy (B) RRYy
 (C) rrYy (D) RRYy (Ans B)
 21. মটরগুটির বৈজ্ঞানিক নাম কী?
 (A) Pisum sativum (B) Pisum sativum
 (C) Peium sativum (D) Pasum sativum (Ans A)
 22. এক সংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রসে ২য় অপত্য বংশে জিনোটাইপ অনুপাত কত?
 (A) ১ : ২ : ১ (B) ৩ : ১
 (C) ৯ : ৩ : ৩ : ১ (D) ৪ : ১ (Ans A)
 23. কোন প্রাণীতে দুটি ভিন্ন রকম ক্রোমোসোম রয়েছে?
 (A) তেলাপোকা (B) ঘাসফড়িং
 (C) কেঁচো (D) কুই মাছ (Ans B)
 24. কোনটি বংশ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি?
 (A) নিউক্লিয়াস (B) ক্রোমোসোম
 (C) DNA (D) জিনোম (Ans C)
 25. কত সালে মেডেল তার কাগজপত্র 'জেন ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটি' তে জমা দেন?
 (A) ১৮২২ (B) ১৮৬৫
 (C) ১৮৫৭ (D) ১৯০২ (Ans B)
 26. হোমোজাইগাস রিসেসিভ কোনটি-
 (A) tT (B) Tt
 (C) TT (D) tt (Ans D)
 27. নিচের কোনটি Sex linked inheritance?
 (A) বর্ণান্ধতা (B) এইডস
 (C) ব্লাড ক্যান্সার (D) যৌনবাহিত রোগ (Ans A)
 28. হিমোফিলিয়া কোন ধরনের ব্যাধি?
 (A) অটোসোমাল (B) সেক্স-লিঙ্কড
 (C) ট্রাইসোমি (D) টেরাটোজেনিক (Ans B)
 29. ডাউন সিনড্রোম কোন ধরনের ব্যাধি?
 (A) ভাইরাসজনিত (B) সেক্স-লিঙ্কড
 (C) ট্রাইসোমি (D) টেরাটোজেনিক (Ans C)
 30. ফ্রাজাইল-X সিনড্রোম কোন ধরনের ব্যাধি?
 (A) অটোসোমাল (B) সেক্স-লিঙ্কড
 (C) ট্রাইসোমি (D) টেরাটোজেনিক (Ans B)
 31. "Ontogeny Repeats Phylogeny"- এটি কার মতবাদ?
 (A) চার্লস ডারউইন (B) ভাইজম্যান
 (C) দ্যাভিস (D) আর্নেস্ট হেকেল (Ans D)
 32. কোনটি সেক্স-লিঙ্কড ইনহেরিটেন্স এর উদাহরণ?
 (A) মুক বধিরতা (B) থ্যালাসেমিয়া
 (C) হিমোফিলিয়া (D) বহুমূত্র (Ans C)
 33. নিচের কোনটি সেক্স-লিঙ্কড রোগ নয়?
 (A) বর্ণান্ধতা (B) রাতকানা
 (C) হিমোফিলিয়া (D) মাথার টাক (Ans D)
 34. স্বাভাবিক ছেলে ও মেয়ে সন্তানে রয়েছে যথাক্রমে-
 (A) XX, XY (B) XY, XX
 (C) YY, XX (D) XX, XY ক্রোমোসোম (Ans B)
 35. কোন বৈশিষ্ট্য পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না?
 (A) ওজন (B) উচ্চতা
 (C) বুদ্ধিমত্তা (D) আকৃতি (Ans D)
 36. কোন প্রাণীতে XX-XY টাইপে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়?
 (A) আরশোলা (B) ইদুর
 (C) গরু (D) ড্রোসোফিলা (Ans D)
 37. রক্ততত্ত্বের কত নম্বর ফ্যাক্টর অনুপ্রস্থিত থাকলে খ্রিস্টমাস ডিজিজ নামক রোগ হয়?
 (A) VIII (B) IX
 (C) X (D) XII (Ans B)

SELF TEST

01. মানুষের রক্তের গ্রুপিং এর জন্য দায়ী পদার্থ হলো-
 A) অ্যান্টিবডি B) অ্যান্টিজেন
 C) বিলিভারিন D) বিলিভারডিন

02. নিচের কোনটি ঐক-প্রচ্ছন্ন এপিষ্টাসিস অনুপাত-
 A) 7:9 B) 9:7 C) 13:3 D) 13:7

03. প্রকট এপিষ্টাসিস এর অনুপাত হলো-
 A) 2:1 B) 3:1 C) 9:7 D) 13:3

04. "O" রক্ত গ্রুপযুক্ত একজন ব্যক্তি নিচের কোন গ্রুপের সদস্যের নিকট হতে রক্ত নিতে পারবে না?
 A) A B) B C) AB D) সবগুলো

05. "অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশাণুক্রম" মতবাদটি কোন বিজ্ঞানীর দেয়া?
 A) ডারউইন B) মেন্ডেল
 C) ল্যামার্ক D) হগো ডা ভ্রিস

06. 1:2:1 অনুপাতটি নির্দেশ করে-
 A) সমপ্রকটতা B) অসম্পূর্ণ প্রকটতা
 C) উভয়টিকেই D) কোনোটিই নয়

07. কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে জুগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন?
 A) কার্ল ভন বেরার B) চার্লস ডারউইন
 C) ল্যামার্ক D) থেরার মেন্ডেল

08. বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল কোন রোগ X ক্রোমোসোমের একটি প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিনের কারণে হয়?
 A) রক্তশূন্যতা B) হিমোফিলিয়া
 C) অটিজম D) HIV

09. কোনটি জীকণ্ট জীবাশ্ম নয়?
 A) Archaeopteryx B) Latimaria
 C) Platypus D) Limulus

10. মেডেল পরীক্ষার জন্য মটর গাছ কেন বেছে নিয়েছিলেন?
 A) ফুলের অবস্থান B) স্বপরাগী ফুল
 C) বীজের আকার D) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য

11. Archaeopteryx কে কোন কোন প্রাণীর যোগসূত্র বলা হয়?
 A) উভচর ও পাখি, B) উভচর ও সরীসৃপ
 C) সরীসৃপ ও পাখি D) পাখি ও স্তন্যপায়ী

12. কোন জিনের কারণে মোরগ-মুরগির পালক সাদা বর্ণের হয়?
 A) সেমিলিথাল জিন B) এপিষ্ট্যাটিক জিন
 C) হাইপোস্ট্যাটিক জিন D) নন-অ্যালিলিক জিন

13. জীবের জিন মিউটেশনের ফলে কোন ধরনের বিবর্তন ঘটে?
 A) ম্যাক্রো B) মাইক্রো
 C) মেগা D) ন্যানো

14. "প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটি নিজস্ব সত্তা আছে" উক্তিটি কোন বিজ্ঞানীর?
 A) সাটন B) বেটসন
 C) বোভারী D) মেন্ডেল

15. নিচের কোনটি সেক্স-লিংকড জিনের উদাহরণ নয়?
 A) বর্ণান্ধতা B) জুভেনাইল গ্রুকোমা
 C) মায়োপিয়া D) মায়োকার্ডিয়াল ডিজঅর্ডার

16. ফিনোটাইপিক অনুপাত হবে কোনটি?
 A) 3:1 B) 1:2:1
 C) 13:3 D) 1:1

17. লিথাল জিন এর কারণে মেডেলের প্রথম সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত (3:1) নিম্নরূপে পরিবর্তিত হয়-
 A) 1:1 B) 2:1
 C) 4:1 D) 5:1

18. F₁ জন্মের একটি হেটেরোজাইগাস জীবের টেস্ট ক্রস ঘটলে প্রাপ্ত ফিনোটাইপিক অনুপাত হবে কোনটি?
 A) 3:1 B) 1:2:1
 C) 13:3 D) 1:1

19. নিচের কোন বৈশিষ্ট্য 'X' জিন (Sex chromosomal gene) নিয়ন্ত্রিত নয়?
 A) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা B) হিমোফিলিয়া-এ
 C) ডুসেন মাস্কুলার ডিস্ট্রফি D) কানের লোম

20. যে জিন অন্য জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে কী বলে?
 A) এপিষ্ট্যাটিক জিন B) হাইপোস্ট্যাটিক জিন
 C) লিথাল জিন D) কমপ্লিমেন্টারি জিন

21. কোনো জীবের দুটি ভিন্নধর্মী অ্যালিল থাকলে তাকে বলা হয়-
 A) হোমোজাইগাস B) হেটেরোজাইগাস
 C) মাল্টিপল অ্যালিল D) প্রকট

22. পুরুষ হারপোকার কয়টি ক্রোমোসোম থাকে?
 A) 13টি B) 18টি C) 20টি D) 22টি

23. মানুষের Y-ক্রোমোসোমে জিনের সংখ্যা-
 A) 321 B) 231
 C) 820 D) 285

24. কোনটি সেক্সলিংকড রোগ নয়?
 A) মায়োপিয়া B) জুভেনাইল গ্রুকোমা
 C) হিমোফিলিয়া D) থ্যালাসেমিয়া

25. কোনটি লিথাল জিনের কারণে হয় না?
 A) ক্রিপার মুরগি B) পা-বিহীন বাছুর
 C) হিমোফিলিয়া D) অস্টিওপেরসিস

26. ড্রোসোফিলা মাছির লুণ্ঠপ্রায় ডানা সৃষ্টিকারী জিনটি নিচের কোন ধরনের?
 A) সেমিলিথাল জিন B) সাবলিথাল জিন
 C) সাব ভাইটাল জিন D) পরিপূরক জিন

27. "পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবের স্বভাব ও দৈহিক পরিবর্তন ঘটে" মতবাদটি দেন বিজ্ঞানী-
 A) চার্লস রবার্ট ডারউইন B) ল্যামার্ক
 C) প্রো. জো. মেন্ডেল D) প্যাভলভ

28. Genetics শব্দটি প্রথম কে প্রয়োগ করেন?
 A) মেন্ডেল B) লিনিয়াস
 C) বেটসন D) হার্ডে

29. "পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবের স্বভাব ও দৈহিক পরিবর্তন ঘটে" মতবাদটি দেন বিজ্ঞানী-
 A) ডারউইন B) ল্যামার্ক C) মেন্ডেল D) প্যাভলভ

30. অটিজম কোন ধরনের ব্যাধি?
 A) অটোসোমাল B) সেক্স-লিংকড
 C) ট্রাইসোমি D) টেরাটোজেনিক

প্রাণীর আচরণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍️ আচরণ ও আচরণের প্রকৃতি : প্রাথমিক আলোচনা

বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণিদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশকে আচরণ বলে। প্রখ্যাত প্রাণী আচরণবিদ Manning (1972) এর মতে “প্রাণীর আচরণের মধ্যে সেসব প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত যাদের মাধ্যমে প্রাণী তার বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, দেহের অভ্যন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং তার চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করে”।

৬. প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান :


বিজ্ঞানীর নাম	অবদান	বিজ্ঞানীর নাম	অবদান
অ্যারিস্টটল	প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত প্রথম তথ্য উপস্থাপন করেন।	অগাস্ট কোথ	সর্বপ্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন।
উইলিয়াম হার্ভে	পাখির প্রজননকালীন আচরণ ও অপত্য লালনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।	কার্ল ডন ফ্রিস	মৌমাছির নৃত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন।

👉 **সহজাত আচরণ (Innate Behaviour) :** প্রাথমিক আলোচনা

সহজাত আচরণ : অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় (reflex action) সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট (Species specific), শিক্ষণবিহীন ও বংশগত আচরণই হলো সহজাত আচরণ। যেমন- পাখির বাসা বাঁধা, মাকড়সার জাল বোনা, মৌমাছির চাক তৈরি, শিশুর স্তন পান, ছাগল বা গরুর বাচ্চা জন্মের পর ছোট্টাছুটি ইত্যাদি। এসব আচরণ সহজাতভাবে একই প্রজাতির প্রত্যেক প্রাণীতে একইভাবে বিরাজমান থাকে। কনরাড লরেঞ্জ এর মতে, 'সহজাত আচরণ হলো- Unlearned species specific motor pattern'.

৬ সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য :

- ১। সহজাত আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট।
 - ২। সহজাত আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত।
 - ৩। জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না।
 - ৪। সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।
 - ৫। অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে সহজাত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে।



 সহজাত আচরণের উদাহরণ : ট্যাক্সিস

সহজাত আচরণ বা ট্যাক্সিস : উদ্দীপনার প্রভাবে কোনো বাহ্যিক লক্ষ্য সংক্রান্ত বা গতিপথ সংক্রান্ত (directional) জীবদেহের সামগ্রিক চলনই হলো ট্যাক্সিস। অর্থাৎ ট্যাক্সিস হলো উদ্দীপকের প্রভাবে জীবের অবিরত সুনির্দিষ্টভাবে মিয়ক্টিত স্থানিক চলন বা ওরিয়েন্টেশন। ট্যাক্সিসের প্রধান শর্ত হলো প্রাণীর স্থান পরিবর্তন। এটি অন্যতম সহজাত আচরণ এবং অভিযোজনযোগ্য। Herter, Cellyot, Tinbergen প্রমুখ প্রাণিবিদ প্রাণীর ট্যাক্সিস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

৬ ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য:

- একটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া।
 - একটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না।
 - প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষারূদ্ধ নয়।
 - খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।
 - দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ দেহ জড়িত থাকে।
 - দিকমুখি চলন সরাসরি উদ্দীপনা শক্তির সমানপাতিক।

৬ ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ :

☞ দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে :

ট্যাক্সিসের নাম	ধরন
ধনাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্ভীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।
ঋণাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্ভীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

[Ref: আজমল]


• উদ্দীপনার উৎসের ভিত্তিতে :

[Ref: আলীম]

 Pavlov-এর তত্ত্ব (Theory of Pavlov) :

Pavlov এর মতবাদের মূল কথা হলো - 'পূর্বে যে প্রতিক্রিয়াটি একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হতো, স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে একটি সাপেক্ষ জুড়ে দেওয়ার ফলে সাপেক্ষ উদ্দীপকটিও ওই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।'


৬ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ : Pavlov এর প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করেন-



প্রাণীর সহজাত আচরন যাচাই : শীতের পাখির মাইগ্রেশন

Nikolsky এর মতে, অভিপ্রয়াণ হলো প্রাচুর্যতার দিকে খাপ খাওয়ানোর একটি পদ্ধতি বা অভিযোজন (migration is an adaptation towards abundance)।

৬ অভিপ্রাণের কারণ : পাখির অভিপ্রাণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বিভিন্ন পাখি বিশারদ এ প্রসঙ্গে কতগুলো কারণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন-



৬ বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি শীতকালীন পাখির নাম :

[illegible]

১৬) **ধানীর সহজাত আচরণ যাচাই :** মাকড়শার জাল

বিজ্ঞানী Hans peters (1939) সর্বপ্রথম মাকডসার জাল-বোনার কৌশল লক্ষ্য করেন। মাকডসার জাল বোনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য :

- মাকড়সা **Arachnida** শ্রেণির সন্ধিপদী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের একটি বিশেষ সহজাত আচরণ হলো এরা জীবনকাল ব্যাপী বিশেষ ধরনের রেশম (silk) উৎপাদন করে। প্রায় ৩৮ কোটি বছর যাবৎ মাকড়সাতে এই বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সম্ভারিত হয়।
 - এর রাসায়নিক উপাদান **ফাইব্রাইন ফ্রোথোপ্রোটিন** নামক প্রোটিন।
 - মাকড়সার উদরের নিচের দিকে সাত জোড়া স্পিনারেট নামক অঙ্গ থেকে ফ্রোথোপ্রোটিন নামক প্রোটিন তরল অবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং বায়ুর সংস্পর্শে শক্ত হয়ে যায়।
 - মাকড়সার জাল ইম্পাতের চেয়ে শক্ত এবং নাইলনের চেয়ে দৃষ্টান্ত ছাড়াই শক্ত।
 - অধিকাংশ মাকড়সার জালই দৃষ্টিনন্দন জ্যামিতিক গোলক-জাল।
 - প্রাণিজগতের মধ্যে **Araneae** বর্গের প্রকৃত মাকড়সাই সবচেয়ে বড় শিকারি গোষ্ঠী।
 - মাকড়সার জালে রয়েছে —
 - এগ্রেগেট
 - ফ্রেজেলিফর্ম
 - টিউবুলিফর্ম
 } কীটপতঙ্গ সহজেই আটকে যায়
 → ডিমকে আটকে রাখে

১৫. অপত্যের প্রতি যত্ন : মাছ, ব্যাঙ, পাখি

মাছ, উভচর, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অপত্যের প্রতি যত্ন পরিলক্ষিত হয়।


মাছের অপত্য যত্ন	• তিনকাটা স্টিকলব্যাক মাছে এ ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। • পুরুষ মাছ Zig-Zag নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে স্ত্রী মাছকে আকৃষ্ট করে।
ব্যাঙের অপত্য যত্ন	• গ্রুডিয়েটর ব্যাঙ এ ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। • স্ত্রী ব্যাঙ ১০ মিনিটে প্রায় ৩০০০ ডিম ছাড়ে।
পাখির অপত্য যত্ন	• কাউবার্ড ও ফোকিল ব্যতীত সকল পাখিতে অপত্য যত্ন পরিলক্ষিত হয়। • বাংলাদেশে পানকৌড়ির জননকাল মে-অক্টোবর।

১১ সামাজিক আচরণ : মৌমাছির প্রজাতি ও জাত

৬ বাংলাদেশে (তিন প্রজাতির) ও ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি :

বাংলাদেশে তিন প্রজাতির মৌমাছি			ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি	
(i) <i>Apis indica</i>	(ii) <i>Apis dorsata</i>	(iii) <i>Apis florea</i>	(i) <i>Apis mellifera</i>	(ii) <i>Apis adamsoni</i>

৬ মৌমাছির জাত : একটি মৌচাকে তিন জাতের বা কাস্টের (caste) সদস্য মৌমাছি দেখা যায়। যেমন - একটি রানি (Queen), কয়েকশত পুরুষ (drone) এবং কয়েক হাজার কর্মী বা শ্রমিক (worker)। শ্রমবণ্টনের ভিত্তিতে এদের দৈহিক গঠনের পার্থক্য দেখা যায়।



৬ মৌমাছির বিভিন্ন জাতের কাজ :

মৌমাছির নাম	কাজ	মৌমাছির নাম	কাজ
রানি মৌমাছি	- ডিম পাড়া। - কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা। - ফেরোমনের (Oxydecanoic acid) → অক্সিডিকেনইক অ্যাসিড সাহায্যে মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংযুক্ত রাখা। - এরা অবিরাম বাচ্চা উৎপাদন করে কলোনির আকৃতি সমৃদ্ধ করে।	কর্মী মৌমাছি	- মৌচাক পাহারা দেওয়া ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করা। - মৌচাকের তাপমাত্রা ও অর্দ্রতা বজায় রাখা। - রানির পরিচর্যা করা। - ক্রডের বিভিন্ন সদস্যদের যত্ন নেওয়া, খাদ্য প্রদান করা, মোম উৎপাদন ও চাক গঠন করা। - খাদ্যের অনুসন্ধান। - নেকটার, পানি, রেণু ইত্যাদির সাহায্যে মধু সৃষ্টি করা। - পরিস্ফুটি অনুযায়ী অন্য কর্মী মৌমাছিকে হত্যা করা। - প্রোপোলিস উৎপাদন করা।
পুরুষ মৌমাছি	- সঙ্গম উদ্ভবনে অংশগ্রহণ করা। - প্রজাতির বংশ রক্ষা করা। - কলোনির তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে।		

৬ বয়সভেদে শমিক মৌমাছির কাজের তালিকা :

বয়স (দিনে)	পালনীয় কর্তব্য	বয়স (দিনে)	পালনীয় কর্তব্য
১-৩	কুঠুরি পরিষ্কার	১২-১৫	খাদ্য সংগ্রাহক মৌমাছি থেকে মকরন্দ বা পুষ্পসুধা গ্রহণ
৩-৬	বয়স্ক লার্ভার খাদ্য সরবরাহ	১৬-১৮	মৌমা উৎপাদন ও মৌচাক নির্মাণে অংশগ্রহণ করা
৬-১৫	তরুণ লার্ভার খাদ্য সরবরাহ	২০ ও তদূর্ধ্ব	খাদ্য সংগ্রহ
১০-২৩	চাক পরিষ্কার ও অন্যান্য গৃহকাজ	২৪ ও তদূর্ধ্ব	পাহারার দায়িত্ব
১০ ও তদূর্ধ্ব	চাক থেকে প্রথম উড্ডয়ন		

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

- ## Part 4

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

- খিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ

14. ট্যাক্সিসের দিকমুখিতার ভিত্তিতে আচরণ কয় রকম?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৭ (Ans) A
 15. দূরে অবস্থানকারী সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কোন ধরনের উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়?
 (A) রাসায়নিক (B) শব্দ (C) দর্শন (D) স্পর্শ (Ans) B
 16. কোন প্রাণী স্পর্শ উদ্দীপকের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে?
 (A) চিকা (B) জেলি ফিশ (C) মৌমাছি (D) সবগুলো (Ans) D
 17. কোন ধরনের রিসেপ্ট্রে সৃষ্টি সাড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়?
 (A) টোনিক (B) ফেজিক (C) পজিটিভ (D) নেগেটিভ (Ans) A
 18. মেনোট্যাক্সিসে প্রাণীর দিকমুখিতা কোন ধরনের?
 (A) কৌণিক (B) বৃত্তাকার (C) আয়তাকার (D) চক্রাকার (Ans) B
 19. মাছের উকুনে কোন ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়?
 (A) মেনোট্যাক্সিস (B) নেমোট্যাক্সিস (C) টেলে ট্যাক্সিস (D) ট্রোপোট্যাক্সিস (Ans) D
 20. কোন বিজ্ঞানী প্রাণীর আচরণের ওপর জিনের প্রভাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন?
 (A) লরেঞ্জ (B) ভিলজার (C) ডারউইন (D) পান্ডলভ (Ans) B
 21. প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টির জন্য নিচের কোনটি দায়ী?
 (A) Brain (B) Spinal cord (C) Neuron (D) Axon (Ans) B
 22. কোন প্রাণী শিকার করে দলের অন্য সদস্যদের জন্য খাবার নিয়ে যায়?
 (A) হায়েনা (B) হুইরেল (C) বানর (D) বেজি (Ans) A
 23. কোনো সদস্য খাবার খেতে ব্যর্থ হলে কোন প্রাণী ঐ সদস্যদের রক্ত উদগীরণ করে খাওয়ায়?
 (A) মৌমাছি (B) বেজি (C) রক্তচোষা বাদুড় (D) হুইরেল (Ans) C
 24. কোন প্রজাতির মাকড়সার মা তার বাচ্চাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে?
 (A) জাপানি ফোলিয়েজ (B) থাউড হুইরেল (C) আফ্রিকান মিরক্যাট (D) কোনোটিই নয় (Ans) A
 25. মাছ ও উভচর প্রাণীর মধ্যে কোন ধরনের সহজাত আচরণ পরিলক্ষিত হয়?
 (A) বাৎসল আচরণ (B) সঙ্ঘর আচরণ (C) অভিপ্রয়াণ আচরণ (D) সবগুলো (Ans) D
 26. সহজাত আচরণের ক্ষেত্রে কোন বাক্যটি সঠিক?
 (A) পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্তিত (B) প্রজাতি সুনির্দিষ্ট (C) শিখনবিহীন (D) সবগুলো (Ans) D

