

পাঠ্যসূচি

পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুযায়ী বিষয় বিন্যাস

স্টেপ-০১		কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রাথমিক কথা		পৃষ্ঠা নং	
১	সাফল্য টনিকঃ সফল প্রকৃতির আসল কথা			01-04	
২	কৃষি ভর্তি পরীক্ষায় নেটওয়ার্ক বইয়ের গুরুত্ব			05-15	
৩	গাণিতিক সমস্যার মৌলিক জ্ঞান			16-20	
স্টেপ-০২		সাম্প্রতিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ			
সমন্বিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (২০২২-২৩)				21-41	
স্টেপ-০৩		বিষয়ভিত্তিক CONCEPT আলোচনা ও প্রশ্ন বিশ্লেষণ			
সার্ভে টেবিল				42-46	
পদার্থবিজ্ঞান		পাঠ্যসূচী-০১: পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস		47-229	
১ম পত্র		পাঠ্যসূচী-০২: সংক্ষিপ্ত সিলেবাস		২য় পত্র	
০২	ভেক্টর	53-65	০১	তাপগতিবিদ্যা	139-151
০৪	নিউটনিয়ান বলবিদ্যা	66-79	০২	স্থির তড়িৎ	152-161
০৫	কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	80-88	০৩	চল তড়িৎ	162-176
০৬	মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ	89-97	০৭	ভৌত আলোকবিজ্ঞান	177-185
০৭	পদার্থের গাঠনিক ধর্ম	98-107	০৮	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা	186-195
০৮	পর্যাবৃত্ত গতি	108-117	০৯	পরমাণুর মডেল এবং নিউ. পদার্থবিজ্ঞান	196-204
১০	আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব	118-127	১০	সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স	205-214
রসায়ন		পাঠ্যসূচী-০১: পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস		230-399	
১ম পত্র		পাঠ্যসূচী-০২: সংক্ষিপ্ত সিলেবাস		২য় পত্র	
০২	গুণগত রসায়ন	230-249	০১	পরিবেশ রসায়ন	306-322
০৩	মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন	250-276	০২	জৈব রসায়ন	323-364
০৪	রাসায়নিক পরিবর্তন	277-295	০৩	পরিমাণগত রসায়ন	365-387
০৫	কর্মমুখী রসায়ন	296-304	০৪	তড়িৎ রসায়ন	388-397
গণিত		পাঠ্যসূচী-০১: পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস		400-553	
১ম পত্র		পাঠ্যসূচী-০২: সংক্ষিপ্ত সিলেবাস		২য় পত্র	
০১	ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক	400-407	০৩	জটিল সংখ্যা	492-498
০৩	সরলরেখা	408-425	০৪	বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ	499-507
০৪	বৃত্ত	426-434	০৬	কণিক	508-516
০৭	সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	435-445	০৭	বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রি. সমীকরণ	517-525
০৯	অন্তরীকরণ	446-464	০৮	স্থিতিবিদ্যা	526-531
১০	যোগজীকরণ	465-477	০৯	সমতলে বস্তু কণার গতি	532-539
জীববিজ্ঞান		পাঠ্যসূচী-০১: পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস		554-713	
১ম পত্র		পাঠ্যসূচী-০২: সংক্ষিপ্ত সিলেবাস		২য় পত্র	
০১	কোষ ও এর গঠন	560-574	০১	প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস	649-655
০২	কোষ বিভাজন	575-580	০২	প্রাণীর পরিচিতি	656-663
০৪	অণুজীব	581-591	০৩	পরিপাক ও শোষণ	664-671
০৭	নয়নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ	592-603	০৪	রক্ত ও সঞ্চালন	672-679
০৮	টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র	604-611	০৫	শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া	680-683
০৯	উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	612-622	০৭	চলন ও অঙ্গচালনা	684-690
১১	জীব প্রযুক্তি	623-929	১১	জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন	691-698
ইংরেজি				714-794	
স্টেপ-০৪		বিগত বছরের ফ্রেশ প্রশ্ন ও সমাধান (২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩)		795-809	
স্টেপ-০৫		মডেল টেস্ট		810-812	



ઉપરિક આલોચના

♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK

কোষপ্রাচীর

দ্বিতীয় কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য ।

কৃষ্ণাচীরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান সেলুলোজ।

কোন কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না।

এই প্রাচীরে 40% সেলুলোজ, 20% হেমিসেলুলোজ, 30% পেকটিন ও 10% গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে।

হোপার্ডাকে পিট মেমব্রেন বলে।

Hyloglucan নামক হেমিসেলুলোজ প্রাচীর গঠনে ট্রান্স লিংক হিসেবে কাজ করে।

পাশাপাশি কোষের প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে নলাকার সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হয় একে প্লাজমোডেসমাটা বলে।

৩. ত্বরে বিভক্ত: মধ্যপর্দা/পিটমেমব্রেন (পেকটিক এসিড থাকে), প্রাথমিক প্রাচীর (গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে), সেকেন্ডারী প্রাচীর (সুবেরিন থাকে)।

কৃষ্ণ প্রাচীরের সূক্ষ্ম গঠন: সেলুলোজ অণু $\xrightarrow{১০০০-৩০০০}$ সেলুলোজ চেইন $\xrightarrow{১০০}$ মাইসেলি $\xrightarrow{২০}$ মাইক্রোফাইব্রিল $\xrightarrow{২৫০}$ ম্যাক্রোফাইব্রিল $\rightarrow$ কোষপ্রাচীর।

কোষবিদ্বি


কিছির অন্যান্য নাম: সেলমেমব্রেন, বায়োমেমব্রেন, সাইটোমেমব্রেন, প্লাজমামেমব্রেন, প্লাজমালেমা, অর্ধভেদ্য ঝিল্লি/বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি, প্রভেদক ভেদ্য ঝিল্লি, অর্ধচলক ভেদ্য ঝিল্লি, Semipermeable membrane।

কৃষিক্ষেত্র বন্ধ অঙ্গারুর নাম: মা এ ভবের পাগল- মা → মা → মাইটোকন্ড্রিয়া; এ → এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম; ড → ডায়কুওল; বে → ভেনিকুল; র → রাইবোসোম (যুত); পা → প্রাস্টিড + পার অক্সিসোম; গ → গলগিবন্ত; ল → লাইসোসোম।

১০. অস্বাভাবিক গঠনের মতবাদ:

মতবাদের নাম	প্রবক্তা
প্রোটিন ক্রিস্টাল মডেল	Vanderkoff ও Green (1970)
একক পর্দা হাইপোথিসিস	রবার্টসন (1959)
হাইসেলার মডেল	Hiller ও Hoffman (1953)
Sandwitch model (সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত মডেল)	Danielli & Davson, দ্বিতরী (1935)
Fluid Mosaic model/ আইসবার্গ মডেল	Singer ও Nicholson, দ্বিতরী- সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য (1966)
Benson Model	(1966)
Lenard Q. & Singer model	(1966)


। दोष विहीन गठनः



প্রাস্টিড

হীনা ও গ্রানা সমৃদ্ধ এবং লিপোপ্রোটিন বিল্লি দ্বারা সীমিত সাইটোপ্রাজম সহ সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম প্রাণ্ডিড। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল, স্লাইম স্তর ইত্যাদি কোষে প্রাণ্ডিড থাকে না। ইউগ্লিনাতে, ক্রাইসামিবাতে প্রাণ্ডিড পাওয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের পরিণত কোষে ২৫-৬০টি প্রাণ্ডিড থাকে।

শ্রেণিবিভাগঃ



(i) লিউকোপ্লাস্ট $\xrightarrow{\text{আলো}}$ ক্রোমোপ্লাস্ট, ক্রোরোপ্লাস্ট। (ii) ক্রোরোপ্লাস্ট $\xrightarrow{\text{আলোর অনুপস্থিতিতে}}$ লিউকোপ্লাস্ট। (iii) ক্রোরোপ্লাস্ট $\xrightarrow{\text{আলো}}$ ক্রোমোপ্লাস্ট।

- ক্লোরোফ্লাস্টের রাসায়নিক উপাদান: ৭৫% ক্লোরোফিল-*a* এবং ২৫% ক্লোরোফিল-*b* থাকে। এছাড়াও ক্যারোটিনয়েড ও নিউক্লিক এসিড থাকে। শুষ্ক ওজনের ১০-২০% লিপি।
- আকৃতি: উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষে লেন্সের মত হয়। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ কোষে বিভিন্ন রকম হয়-

আকৃতি	পেয়ালাকৃতি	সর্পিলাকার	জালিকাকার	তারকাকার	বেল্ট/ফিতা/আংটি/গার্ডল আকৃতি	গোলাকার
উদাহরণ	Chlamydomonas	Spirogyra	Oedogonium	Zygnema	Ulothrix	Pithophora

মাইটোকন্ড্রিয়া

- RBC-তে থাকে না। ১০০/৭০ প্রকারের এনজাইম ও কো-এনজাইম রয়েছে।
- শক্তি ঘর বা Power House বলা হয়।

- মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা:

অবস্থান	সংখ্যা	অবস্থান	সংখ্যা
উদ্ভিদ কোষ	৩০০-৪০০টি	যকৃত	১০০০ বা ততোধিক
প্রাণিকোষ	২০০-৩০০টি	অ্যামিবা	যকৃতির চেয়ে বেশি

- মাইটোকন্ড্রিয়ার ভৌত গঠন: DR. Capsol : D-DNA, R-Ribosome, C-Cristi, A-Aboroni, ATP-Synthases, P- প্রকোষ্ঠ

- মাইটোকন্ড্রিয়ায় সংঘটিত বিক্রিয়া সমূহ: **Mnemonic:** First Try To Cover Last Respiration-

First	Try	C	Ov	Er	Last Respiration
ফসফোরাইলেশন	TCA চক্র	ক্রেবস চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র	অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন	ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র/ETS	শ্বসনের শেষ পর্যায়ের বিক্রিয়া

- কাজ:
- | | | | | |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| শ্ব | শরের | শ্লেহের | প্রবীন | ডাক্তার |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| শ্বসন | শক্তির উৎপাদন | শ্লেহবিপাকে সাহায্য করা | প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করা | DNA, RNA তৈরি |

এন্ডোপ্রাজমিক জালিকা

- পরিণত লোহিত কণিকা ও আদিকোষ ছাড়া প্রায় সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে থাকে।
- প্রকারভেদ: অমসৃণ/ দানাদার, মসৃণ/ অদানাদার।

□ গঠন: সিভেট-—

সি → সিস্টার্নি (শাখাহীন)	ট → টিউবিউলস (শাখাবিত)
ভে → ভেসিকল (বর্তলাকার)	• 60-70 ভাগ প্রোটিন এবং 30-40 ভাগ লিপিড দিয়ে গঠিত।

- **কাজ:** এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে, অসম্পূর্ণ রেটিকুলামে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়, এটি লিপিড ও প্রোটিনের অন্তঃবাহক হিসেবে কাজ করে, ফলে এতে কোষপ্রাচীরের জন্য সেললোজ তৈরি হয়।

রাইবোসোম

সাইটোপ্লাজমের মুক্ত অবস্থায় বিরাজমান অথবা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে অবস্থিত যে গোলাকার কণায় প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে তাকে রাইবোসোম বলে।

- রাসায়নিক গঠন $\rightarrow$ প্রোটিন + rRNA (40:60/1:1/50:50)
- প্রোটিন ও RNA এর অনুপাত সাধারণত 1:1
- 70S (50S + 30S সাব ইউনিট) রাইবোসোমে 52 প্রকারের প্রোটিন অণু ও 3 প্রকারের rRNA থাকে
- 80S (60S + 40S সাব ইউনিট) রাইবোসোমে 80 প্রকারের প্রোটিন অণু ও 4 প্রকারের rRNA থাকে
- রাইবোসোমে Mg^{2+} , Ca^{2+} , Mn^{2+} থাকে।
- *E.Coli* কোষের শুষ্ক ওজনের ২২ ভাগই রাইবোসোম
- প্রোটিন সংশ্লেষ করে বলে রাইবোসোমকে কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়

गलगि दखु

- অন্যান্য নাম: লাইপোকভিয়া, ইডিওসোম, ডিকটায়োসোম, গলগি কমপ্লেক্স, গলগি অ্যাপারেটাস, প্যাকেজিং কেন্দ্র
- কোষের কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলে
- গঠন: VSV

V	S	V
ভ্যাকিউল (বড় গহ্বর)	সিস্টার্নি (চ্যাপ্টা থলি)	ভেসিকল (ছোট গহ্বর)

- কাজ:

i. লাইসোসোম তৈরি করা	iii. অ-প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ করা
ii. কোষ বিভাজনকালে কোষপ্লেট তৈরি করা	iv. শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম তৈরি করে

নাইসোসোয়

- অন্যান্য নাম: অটোফ্যাগী, স্ফাংসী, আত্মঘাতী থলিকা, হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার, Bag of enzyme (এনজাইমের থলিকা) বলে।
- শ্বেত রক্ত কণিকায় এদের বেশি পাওয়া যায় • RBC-তে লাইসোসোম থাকে না
- লাইসোসোমে 40 (Hassan)/ 50 (Azmol) এনজাইম পাওয়া যায়
- সম্প্রতি উদ্ভিদকোষেও লাইসোসোম আবিষ্কৃত হয়েছে যাকে Spherosome বলা হয়। এদেরকে Oleosome-ও বলা হয়।

- কাজ:
- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| i. জীবদেহের অকেজো কোষ ধ্বংস করে | iii. ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ করে | v. কেরাটিন প্রস্তুত করায় অংশ নেয় |
| ii. লাইসোসোম নিঃসৃত উৎসেচক ক্যান্সার রোগের কারণ | iv. অন্তঃকোষীয় পরিপাকে সহায়তা করে | |

সেন্ট্রিওল

সেন্ট্রিওফার + সেন্ট্রিওল = সেন্ট্রিওসোম

সেন্ট্রিওল এ DNA, RNA থাকে না

সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাড় তরল পদার্থকে সেন্ট্রিওফার বলে

সেন্ট্রিওলে অনুপস্থিত: **Mnemonic:** আদি ডায়েরি ইস্টে আবৃত-

আদি	ডায়েরি	ইস্টে	আবৃত
আদিকোষ	ডায়টিম	ইস্ট	অ্যানজিওস্পার্ম

- একজোড়া সেন্ট্রিয়োলকে একত্রে ডিপ্লোসোম বলে
- সেন্ট্রিওল প্রাচীর ৯টি ত্রয়ী অণুনালিকা দিয়ে গঠিত
- শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট, জিমনোস্পার্ম প্রভৃতিতে থাকে

কাজ:

- কোষ বিভাজনের সময় মাকুতন্ত্র গঠন করা
- সিলিয়া ও ফ্লাজেলা সৃষ্টি

iii. বিভাজনে সাহায্য করা

iv. শুক্রাণুর লেজ গঠন

নিউক্লিয়াস

কোষে যে অঙ্গাণু দ্বিতরবিশিষ্ট অবস্থায় প্রোটোপ্লাজমিক রস ও ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করে তাই নিউক্লিয়াস।

নিউক্লিয়াসকে মস্তিষ্ক, প্রাণকেন্দ্র, কেন্দ্রিকা বলে।

এটি কোষের ১০-১৫% স্থান দখল করে থাকে।

অনুপস্থিত- আদিকোষ, প্রকৃত কোষ, পরিণত সীডকোষ, পরিণত RBC।

- Nux Nut থেকে নিউক্লিয়াস শব্দটির উৎপত্তি।
- শুক্রাণুর প্রায় ৯০% ই-নিউক্লিয়াস।
- কোষের যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়াসের সংখ্যা:

সংখ্যা	অবস্থান
১টি	প্রকৃত কোষ
২টি	Paramecium ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর যকৃত ও তরুণাঙ্ঘি কোষ
বহু	Vaucheria, Penicillium, Botrydium, Sphaeroplea, Saprolegnia
অনুপস্থিত *	আদিকোষ, কিছু প্রকৃত কোষ, পরিণত সীডকোষ, পরিণত RBC, লেপ কোষ

একধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত উদ্ভিদকোষকে সিনোসাইট এবং প্রাণীকোষকে সিনোসাইটিয়াম বলে (কিছু জীবের ক্ষেত্রে প্রাজমোভিয়াম বলে)।

সিনোসাইটিক: i. শৈবাল- Vaucheria, Botrydium, Sphaeroplea ii. ছত্রাক- Rhizopus, Penicillium, Agaricus

সিনোসাইটিয়াম: Opalina নামক আদ্যপ্রাণীর অস্থিপেশী ও অস্থিমজ্জার অস্টিওক্লাস্ট কোষ।

কাজ:

নিউক্লিয়ার মেমব্রেন

i. নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিফ বা নিউক্লিওরস- এটি মূলত প্রোটিন দিয়ে তৈরি

ii. নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন জালিকা- প্রধানত প্রোটিন RNA ও যৎ সামান্য DNA দ্বারা গঠিত

iii. নিউক্লিওলাস- নিউক্লিওটাইডের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে, ক্রোমোসোমের যে স্থানটিতে নিউক্লিওলাস লাগানো থাকে তাকে স্যাটেলাইট বলে।

CONCEPT- 03

বংশগতি



ITEM-01

ক্রোমোসোম

কোনো নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন, রং ধারণকারী নিউক্লিয়োপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সব সূত্রাকৃতির ক্ষুদ্রাঙ্গ বংশগতির উপাদান মিউটেশন, প্রকরণ প্রভৃতি কাজে ভূমিকা পালন করে এরাই ক্রোমোসোম। গ্রিক Chroma অর্থ Colour বা রং, soma অর্থ body বা দেহ। ক্রোমোসোম অর্থ হল রঞ্জিত দেহ বা রং ধারণকারী বস্তু। বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রোমোসোম সংখ্যা:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা
শসা	Cucumis sativus	১৪	কিউলেব্র মশা*	Culex pipiens	৬
মটর	Pisum sativum	১৪	ফলের মাছি*	Drosophila melanogaster	৮
পাট*	Corchorus capsularies	১৪	গৃহমাছি	Musca domestica	১২
পিঁয়াজ	Allium cepa	১৬	কুনোব্যাঙ	Bufo melanostictus	২২
পেঁপে	Carica papaya	১৮	সোনাব্যাঙ	Rana pipiens	২৬
মুলা*	Raphanus sativus	১৮	খরগোস	Oryctolagus cuniculus	৪৪
ভুট্টা*	Zea mays	২০	মানুষ*	Homo sapiens	৪৬
ধান*	Oryza sativa	২৪	গরীলা	Gorilla gorilla	৪৮
টমেটো*	Lycopersicon lycopersicum	২৪	ছাগল	Capra hircus	৬০
তামাক	Nicotiana tabacum	২৮	গরু*	Bos taurus	৬০
চানা বাদাম	Arachis hypogaea	৪০	গিনিপিগ	Cavia porcellus	৬৪
গম (৬ প্রস্থি)*	Triticum aestivum	৪২	ঘোড়া	Equus caballus	৬৪
গোলআলু	Solanum tuberosum	৪৮	কবুতর*	Columba livia	৮০

১। এর শ্রেণী বিভাগ: ৫ ভাগে ভাগ করা যায়-


tRNA	rRNA	mRNA	gRNA	Minor RNA
অকৃতর ফাঁস থাকে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র ফাঁস হলো অ্যাডিনোকোডন। এর কাজ আমিনো এসিড স্থানান্তর। শতকরা 15 ভাগ ও সবচেয়ে ক্ষুদ্র RNA।	রাইবোসোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান। রাইবোসোম সৃষ্টিতে অবদান রাখে। • RNA এর 80-90 ভাগ, সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও অদ্রবণীয়।	বার্তাবাহ RNA বলে। প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা বহন করে। • শতকরা 5-10 ভাগ।	বংশগতীয় RNA বলে, কারণ বংশগতি বস্তু হিসাবে কাজ করে, এসব ক্ষেত্রে DNA অনুপস্থিত থাকে। যেমন: TMV	ক্ষুদ্র RNA যা বিভিন্ন এনজাইমের কাঠামো দান করে এবং এনজাইম হিসাবে কাজ করে।



ITEM-03

Central Dogma of Biology

১৯৫৮ সালে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টিকে ১৯৬৮ সালে কমনার (Barry Commoner) চাক্রিক (Cyclic) রূপ দান করেন। ১৯৭০ এর দশকে জানা যায় কোনো ক্ষেত্রে RNA থেকে DNA তৈরি হতে পারে। এর নাম রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। HIV-তে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন হয়।



কিছু তথ্যাবলী:

DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধিপায়-DNA Polymerase দিয়ে

mRNA থেকে প্রোটিন তৈরি প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সলেশন

দুসর প্রতি ১০০০ জিনের মধ্যে একটি ভুল হতে পারে

উল্লেখ্য- দুটি হেলিক্সের মাঝে হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে দিয়ে সূত্র দুটি পৃথক করে

DNA এর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ভুল ধরার জন্য প্রফ রিডিং ব্যবস্থা আছে, এ ধরনের ভুলকে বলা হয় Mismatch

DNA অণুতে প্রোথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে RNA অণুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে Transcription বলে

ট্রান্সলেশন হলো DNA-এর ভাষাকে mRNA-এর এর মাধ্যমে প্রোটিনের ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করা।

কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে:

- DNA অণুর হাইড্রোজেন বন্ধনীর ভঙ্গ করা হয়-DNA Endonuclease দিয়ে
- DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে কর্তন করা হয়-Restriction Enzyme দিয়ে
- DNA অণুর কর্তিত অংশ জোড়া লাগানো হয়-Ligase Enzyme দিয়ে

অ্যান্টিবায়োটিক	বিদ্যুৎ সৃষ্টিকারী পর্যায়	অ্যান্টিবায়োটিক	বিদ্যুৎ সৃষ্টিকারী পর্যায়
রিব্রোমাইসিন	রাইবোসোমে mRNA-এর চলনে	ক্রোমোমাইসিন	পেপটাইড বন্ধনী সৃষ্টিতে
ক্লোথ্রিমাইসিন	mRNA ও tRNA এর মধ্যে আন্তঃবিক্রিয়াতে	স্ট্রেপ্টোমাইসিন	ট্রান্সলেশনের সূচনালগ্নে
ট্রিসাইক্লিন	রাইবোসোমের tRNA-এর সংযুক্তি পর্যায়ে।		

(Ref: হাসান স্যার, আজমল স্যার, আজিবুর স্যার)



ITEM-04

জিন, কোড ও কোডন সম্পর্কিত তথ্য

বিভিন্ন ধরনের জিন:

- **খণ্ডিত জিন:** যে জিন ইন্ট্রন ও এক্সন সহযোগে গঠিত তাকে খণ্ডিত জিন বলে।
 • **সিউডো জিন:** DNA এর যে অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে বা জিনের যে অংশ থেকে কোনো পলিপেপটাইড তৈরি হয় না তাকে সিউডো জিন বলে।
 • **লিংকড জিন:** যখন দুটি জিন কোনো ক্রোমোসোমে একই সঙ্গে অবস্থান করে কিন্তু স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয় না তখন তাদেরকে বলা হয় লিংকড জিন।
 • **অটোসোমাল জিন:** অটোজোম যেসব জিন ধারণ করে তাদের অটোজোমাল জিন বলে- মানুষের মাথার টাক (বল্ডনেস), অ্যালবিনিজম।
 • **হোলান্দ্রিক জিন:** Y-ক্রোমোসোম যেসব জিন বহন করে সেগুলো হোলান্দ্রিক জিন- মানুষের কানের লোম।

দিনের বিভিন্ন একক:

- **রেকন (Recon):** জিন রিকমিনেশন এর একক।
 • **মিউটন (muton):** জিন মিউটেশনের একক বলা হয়।
 • **রেপ্লিকন (Replicon):** DNA এর যে অংশ DNA এর অনুলিপন নিয়ন্ত্রণ করে তাকে রেপ্লিকন বলে।
 • **সিস্ট্রন (Cistron):** জিন কার্যের একক। *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার একটি সিস্ট্রনে প্রায় ১৫০০টি নিউক্লियोটাইড যুগল থাকে। প্রতিটি সিস্ট্রনে অনেক রেকন ও মিউটন থাকে। তাই রেকন ও মিউটন অপেক্ষা সিস্ট্রনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি।

জেনেটিক কোড:

- জীবের বেশিষ্ট্য স্থানান্তরকারী কোডকে জেনেটিক কোড বলে
- জেনেটিক ইনফরমেশন এর মূল একক টিপালেট। দেহে ৬৪ ধরনের কোডন থাকে
- তিনটি করে নিউক্লিয়োটাইডের বিশেষ বিন্যাসকে কোডন বলে
- Start Codon- AUG (মেথিওনিন), Stop Codon-UAA, UAG, UGA

VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- কোষের শক্তির বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে ।
কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় রাইবোসোমকে ।
কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বা ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় গলগি বস্তুকে ।
ফ্যাসী এবং এনজাইমের আধার বলা হয় লাইসোসোমকে ।
মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের ভাজকে ক্রিস্টি বলে ।
DNA, RNA ও এনজাইম গঠনকারী উপদান- প্রোটিন ।
উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষকে নিচের কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা পৃথক করা যায়- Cell Wall ।
লিপিড ও স্টেরয়েড উৎপন্ন করে- এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা ।

- ◆ সেলমেমব্রেনের বেশিরভাগই- লিপিড।
- ◆ কোষ প্রাচীরযুক্ত প্রোটোপ্লাজমে জলশ্রোতের মতো যে চলন দেখা যায় তাকে আবর্তন বা সাইক্লোসিস (Cyclosis) বলে।
- ◆ কোষাভ্যন্তরে অধিক প্রবিষ্ট মাইক্রোভিলাসকে বলা হয় পিনোসাইটিক ফোস্কা।
- ◆ কোষঝিল্লির মোট গুরু ওজনের প্রায় ৭৫ ভাগই লিপিড।
- ◆ লিপিড প্রধানত ফসফোলিপিড হিসেবে থাকে। ত্রিলিঙ্গ ফসফোলিপিডের অর্ধেকের বেশি থাকে লেসিথিন। কেন্দ্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন অঞ্চলকে এন্ডোপ্লাজম বলে।
- ◆ সম্প্রতি উদ্ভিদকোষেও লাইসোসোম আবিস্কৃত হয়েছে তাকে Spherosome বলা হয়।

- ◆ স্ট্রোমা ল্যামিলি- প্রাস্টিড এর অংশ।
 - ◆ প্রোটিন সংশ্লেষণের সাথে জড়িত- রাইবোজোম।
 - ◆ ক্রোমোসোমে থাকে- ডিএনএ, আরএনএ, প্রোটিন।
 - ◆ গাজরের মূলে থাকে- ক্রোমোপ্লাস্ট।
 - ◆ বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষকে সিনোসাইট বলে।
 - ◆ শুক্রাণুর ৯০% নিউক্লিয়াস।
 - ◆ মানবদেহে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে।
 - ◆ DNA ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কার করেন ওয়াটসন ও ক্রিক।
 - ◆ আদিকোষে DNA অবস্থানকারী স্থানকে নিউক্লিওয়েড (Nucleoid) বলে।
 - ◆ মনোবীজীয়া প্রাচীরের সব জীবই আদিকোষী।
 - ◆ প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোম লম্বা (বৃত্তাকার নয়)।
 - ◆ রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোষ দেখেছিলেন তা ছিল মূলত কোষ প্রাচীর।
 - ◆ কোষ প্রাচীর উদ্ভিদকোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য।
 - ◆ ক্রোমাটিনের যে অংশ কম কুণ্ডলিত থাকে সেই অংশকে ইউক্রোমাটিন বলা হয়।
 - ◆ ছোলার ১নং ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট থাকে।
 - ◆ কোষ আবিষ্কার করেন রবার্ট হুক।
 - ◆ কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম একক মাইসেলি।
 - ◆ উদ্ভিদের পাতা ও পুষ্প রঙ্গিন হয় ক্রোমোপ্লাস্টের জন্য।
 - ◆ আদিকোষে সুগঠিত ক্রোমোসোম এর সংখ্যা- থাকে না।
 - ◆ DNA ও RNA এর পার্থক্যকারী নাইট্রোজেন বেস- ইউরাসিল।
 - ◆ Cellulose সবচেয়ে বেশি থাকে- তুলায়।
 - ◆ আদিকোষে নেই- ডি.এন.এ।
 - ◆ পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে পরাগায়নে সহায়তা করে- ক্রোমোপ্লাস্ট।
 - ◆ এন্টিকোডন কোথায় পাওয়া যায়- t-RNA।
 - ◆ DNA গঠনকারী শর্করা কয় কার্বন বিশিষ্ট- ৫।
 - ◆ মুখোমুখি দুটি কুপকে পিট পেয়ার (Pit Pair) বলে।
 - ◆ মধ্যপদীয় অধিক পরিমাণে থাকে পেকটিক এসিড।
 - ◆ প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে ৭০%-৯০% পানি থাকে।
 - ◆ প্রোটোপ্লাজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা বেশি।
 - ◆ নিউক্লিয়াসের আবরণীকে নিউক্লিয়ার এনভেলপ বলা হয়।
 - ◆ ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমাটিনের যে অংশ অধিক কুণ্ডলিত থাকে তাকে হেটেরোক্রোমাটিন বলে।
 - ◆ কোষ নিয়ে আলোচনাকারী বিদ্যাকে বলা হয়- সাইটোলজি।
 - ◆ মানবদেহে কোষ সংখ্যা প্রায়- ১০০ ট্রিলিয়ন (10^{14})।
 - ◆ DNA অণুর হেলিক্সের ব্যাস- ২০ Å।
 - ◆ সব ধরনের কোষে পাওয়া যায়- রাইবোসোম।
 - ◆ উদ্ভিদের প্রতি কোষে ৩১-৪৭ ধরনের tRNA থাকে।
 - ◆ জনন কোষের উদাহরণ হলো- শুক্রাণু, ডিম্বাণু, স্পোর।
 - ◆ উদ্ভিদকোষে বিদ্যমান থাকে- কোষপ্রাচীর, ক্রোমোপ্লাস্ট, কোষ গহ্বর ব্যতিক্রম (সেন্ট্রোসোম)।
 - ◆ বৃত্তাকার DNA পাওয়া যায়- আদিকোষে, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্রাস্টিডে, ব্যাক্টেরিয়ার প্লাজমিডে।
 - ◆ প্রকৃত কোষ পাওয়া যায়- শৈবাল/ছত্রাক/ব্রায়োফাইটা/টেরিডোফাইটা/নগ্নবীজী/আবৃত্তবীজী ও সব প্রাণীকোষে।
 - ◆ উদ্ভিদ কোষ হতে নিঃসৃত পদার্থ- পিগমেন্ট/এনজাইম/নেকটার/হরমোন।
 - ◆ ক্লিন্টিবিহীন অঙ্গাণু হল- প্রোটোপ্লাস্ট, সেন্ট্রিওল, রাইবোসোম, সাইটোস্কেলিটন।
 - ◆ কোষপ্রাচীর গঠনে ক্রসলিংক হিসেবে কাজ করে- Xyloglucan।
 - ◆ জীবনের আধার হিসেবে কাজ করে- প্রোটোপ্লাজম।
 - ◆ একমুখী আবর্তন দেখা যায়- পাতা ঝাঁঝিতে।
 - ◆ ফুইড মোজাইক মডেল প্রদান করেন- সিঙ্গার ও নিকলসন।
 - ◆ অল্পত্ব, ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে- সাইটোপ্লাজম।
 - ◆ সার্বজনীন অঙ্গাণু ও প্রোটিন ফ্যাক্টরি হলো- রাইবোসোম।
 - ◆ স্তন্যপায়ী ও ছত্রাকে রাইবোসোম পাওয়া যায় যথাক্রমে- ৫৫ s ও ৭৭ s।
 - ◆ গলগি বডি পাওয়া যায় না- আদি কোষ, ছত্রাক, ব্রায়ো-টেরিডোফাইটের শুক্রাণু, পরিণত সীডনল ও RBC।
 - ◆ গলগি বডির কাজ- লাইসোসোম, ভিটামিন, কোষপ্রোট, অ্যাক্রোসোম তৈরিতে, প্রোটিন ও Vit-C সংরক্ষণ।
 - ◆ লাইসোসোম সৃষ্টি করে- ক্যাপার ও কেরাটিন।
 - ◆ লাইসোসোমে টিস্যু বিগলনকারী এনজাইম হলো- এসিড ফসফেটেজ।
 - ◆ অমসূন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে পাওয়া যায়- অগ্ন্যাশয় ও মিউকাস কোষে।
 - ◆ Apoptosis প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে- মাইটোকন্ড্রিয়া।
 - ◆ এনজাইম থাকে- মাইটোকন্ড্রিয়াতে ১০০ ধরনের, ER ১৫ ধরনের লাইসোসোমে ৪০-৪৫ ধরনের।
 - ◆ কোষীয় অঙ্গাণু সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ হল- প্রাস্টিড।
 - ◆ কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি গলজিবিডি এবং শর্করা তৈরির কারখানা- প্রাস্টিড।
 - ◆ উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ কোষে সাধারণত ক্রোমোপ্লাস্ট সংখ্যা- ১০-৪০টি।
 - ◆ শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু এবং শৈবালের বৈচিত্র্য বেশি- ক্রোরোপ্লাস্টে।
 - ◆ সেন্ট্রিওল অনুপস্থিত- আদিকোষ, ডায়টাম, ইস্ট, আবৃত্তবীজী ও স্তন্যপায়ীর RBC।
 - ◆ স্বপ্রজননক্ষম অঙ্গাণু হিসেবে কাজ করে- সেন্ট্রিওল।
 - ◆ পারঅক্সিসোম বিদ্যমান বেশি- প্রাণীর যকৃত ও বৃক্ক কোষে।
 - ◆ ৪ ধরনের ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টের নাম হল- কেরাটিন, ল্যামিনি, ডাইনিনিউরোফিলামেন্ট।
 - ◆ গ্লাইক্সিসোম পাওয়া যায়- সূত্রাকার ছত্রাক/ইস্ট/Neurospora/তেলবীজের কোষে।
 - ◆ নিউক্লিয়াস থাকে না- আদি কোষ, সিড কোষ, ভেসেল, অনুচক্রিকা, পরিণত RBC।
 - ◆ নিউক্লিওটাইডের ভাভার হিসেবে কাজ করে- নিউক্লিওলাস।
 - ◆ উদ্ভিদের প্রধান ক্রিস্টাল হল- Ca অক্সালেট।
 - ◆ উদ্ভিদের ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট বিদ্যমান- তুলা, পাট, ছোলা।
 - ◆ মানুষের X ক্রোমোসোমে বেস পেয়ার মজ্জা বিদ্যমান- ৪৫০০০০।
 - ◆ কেবলমাত্র শুক্রাণুর ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়- প্রোটামিন।
 - ◆ নন-হিস্টোন প্রোটিন প্রায়- ৫০০ ধরনের।
 - ◆ ক্রোমোসোমের প্রোটিনের পরিমাণ- ৫৫% এবং নিউক্লিক এসিডে $N_2 \rightarrow 15\%$ ও $P \rightarrow 10\%$ ।
 - ◆ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে DNA থাকে- ১০০ গ্রাম।
 - ◆ জীবকোষের জৈবিক সংকেত প্রেরক হলো- DNA।
 - ◆ ডাবল হেলিক্স মডেলে প্রতিটি প্যাচে হাইড্রোজেন বন্ড সংখ্যা- ২৫টি।
 - ◆ Mismatch এর কারণে যে ক্যাপার হয় তা হল- কোলন ক্যাপার।
 - ◆ পাইরিমিডিন ক্ষারকে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে- ইউরাসিল।
 - ◆ লবঙ্গ পত্র বা ক্রোভার লিফ মডেল পাওয়া দেখা যায়- tRNA তে।
 - ◆ DNA- বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।
 - ◆ ট্রান্সক্রিপশনের প্রধান এনজাইম- RNA পলিমারেজ।
 - ◆ শিকল সেলে অ্যামিনো এসিড থাকে- ৬০০টি।
 - ◆ গাঠনিক জিনে ল্যাটোজ- ৩টি এবং ট্রিপটোফানে- ৫টি।
 - ◆ গ্রুকেজ ভেসে ইথাইল অ্যালকোহল ও পানিতে রূপান্তরে ব্যবহৃত হয়- জাইমেজ এনজাইম।
 - ◆ DNA ডাবল হেলিক্স এর দুটি মধ্যবর্তী স্ট্যান্ডার্ড দূরত্ব- ২ nm।
 - ◆ প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়- Ribosome, mRNA এবং tRNA।
 - ◆ DNA অনুলিপনের অত্যাবশ্যকীয় এনজাইম হল- Polymerase (পলিমারেজ)।
 - ◆ DNA এর নাইট্রোজেন বেস- অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থায়ামিন।
 - ◆ প্রোটিন সংশ্লেষণকারী ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম- রাইবোজোম।
 - ◆ মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ হলো- শল্যুকোষ।
 - ◆ মানুষের দেহে অটোসোম থাকে- ২২ জোড়া।
 - ◆ প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ- ৭০-৯০% থাকে।
 - ◆ ক্রোমোসোমের সমাপ্তি স্থান- টেলোমিয়ার।
 - ◆ প্রাণীকোষে লাইসোসোমের কাজ হলো- পরিপাক।
 - ◆ ধানের ক্রোমোসোম সংখ্যা- ২৪।
 - ◆ টাঙ্গলেশন গুরুত্ব কোডন হলো- AUG।
 - ◆ ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান হলো- নিউক্লিক এসিড।
 - ◆ কোষের মেইন সুইচ বলা হয়- প্রোটোসোমোম।
 - ◆ সূচের মতো আকার ধারণকারী খনিজ ক্রিস্টাল- র‍্যাফাইড।
 - ◆ কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক হলো- মাইসেলি।
 - ◆ ট্রিপটোফেন নির্দেশনকারী কোডন- UGG।
 - ◆ কোষ প্রাচীরের মধ্যপর্দার প্রধান উপাদান হলো- পেকটিক এসিড।
 - ◆ হায়ালোপ্লাজমের অপর নাম হলো- সাইটোপ্লাজমের মাতৃকা।
 - ◆ নিউক্লিওসাইডে অনুপস্থিত উপাদান হলো- অজৈব ফসফেট।
 - ◆ চর্বি জাতীয় খাদ্য সমন্বয়কারী লিউকোপাস্টাক বলা হয়- ইল্যোপাস্ট।

- কোষের অগ্রয়োজনীয় অংশ ধ্বংস করে- লাইসোজোম।
- স্টার্ট কোডন হলো- AUG।
- স্টপ কোডন হলো- UAA, UAG, UGA।
- কোষঝিল্লিতে প্রোটিন শনাক্ত করা যায়- ৩ ধরনের। যথা:
 - (i) ইন্টিগ্রাল (ii) পেরিফেরাল এবং (iii) লিপিড।
- প্রাজমামেমব্রেন গঠন সংক্রান্ত সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট মডেল হলো- স্যান্ডউইচ মডেল।
- পিউরিন বেস হলো- দুইটি যথা- অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন।
- RNA থেকে DNA তৈরীর প্রক্রিয়াকে বলা হয়- রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন।
- পিট মেমব্রেন বলা হয়- মধ্যপর্দাকে।
- প্রকৃত কোষে rRNA থাকে- ২ ধরনের।
- কোষের বিপাক ক্রিয়ার প্রধান ক্রিয়াস্থল হলো- সাইটোসল।
- কোষের "suicidal squad" বলা হয়- লাইসোজোমকে।

ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

- ফুলের পাপড়ির রং বেগুনী হয় কোনটির প্রভাবে? [C. AG. 2022-23]
 A. নিউট্রাল-pH B. এসিডিক-pH C. ক্ষারীয়-pH D. জ্যাকোফিল

Explanation ফুলের পাপড়ির রং নানা ধরনের হওয়ার কারণ-

ফুলের পাপড়ির বৈচিত্র্যপূর্ণ রং প্রধানত অ্যাহোসায়ানিন, বিটাসায়ানিন জাতীয় রঞ্জকের উপর নির্ভরশীল। অ্যাহোসায়ানিন কতকগুলো জটিল যৌগের সমষ্টিগত রং। এটি গ্লাইকোসাইড হিসেবে কোষরসে মিশে থাকে। কোষরসের হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়তা অর্থাৎ pH এর তারতম্য ঘটলে তবেই রং-এর তারতম্য ঘটে-

i. কোষরসের pH ক্ষারীয় প্রকৃতির হলে ফুলের রং নীল হয়।

ii. এসিড প্রকৃতির হলে লাল রং হয়।

iii. যখন কোষরসের pH নিউট্রাল হয় তখন বেগুনী রং বা কালচে নীল বর্ণ হয়।

পিরাজের মূলের মেটাক্সেজ পর্যায়ের ক্রোমোসোম সংখ্যা - [C. AG. 2022-23]

- A. ১০ B. ১২ C. ১৪ D. ১৬

Explanation বিভিন্ন ক্রোমোসোমের সংখ্যা:

উদ্ভিদ বা প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা
শসা	<i>Cucumis sativus</i>	14
মটর	<i>Pisum sativum</i>	14
পাট	<i>Corchorus capsularis</i>	14
যব	<i>Hordeum vulgare</i>	14
পিয়াজ	<i>Allium cepa</i>	16
গৃহমাছি	<i>Musca domestica</i>	12

কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক হলো - [C. AG. 2022-23]

- A. Micelle B. Micro fibril C. Fibril D. Fibre

Explanation কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন-

• কোষপ্রাচীরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান সেলুলোজ।

• সেলুলোজ অণু (1000-3000)

↓

সেলুলোজ চেইন

↓100 টি

মাইসেলি (কোষপ্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক ধরা হয়)

↓20টি

মাইক্রোফাইব্রিল (কোষপ্রাচীরের গাঠনিক একক)

↓250 টি

ম্যাক্রোফাইব্রিল

কোনটির কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে? [C. AG. 2022-23]

- A. *Neurospora* B. *Oedogonium*
 C. *Sphaeroplea* D. *Ulothrix*

Ans C

05. কোনটি স্টার্ট কোডন?

[C. AG. 2022-23]

- A. UAA B. UAG C. UGA D. AUG

Explanation জেনেটিক কোড:

- জীবের বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরকারী কোডকে জেনেটিক কোড বলে।
- তিনটি করে নিউক্লিওটাইডের বিশেষ বিন্যাসকে কোডন বলে।
- জেনেটিক ইনফরমেশন এর মূল একক ট্রিপলেট। দেহে ৬৪ ধরনের কোডন থাকে।
- Start Codon- AUG (মেথিওনিন), Stop Codon (কোনো অ্যামিনো এসিড কোড করে না)- UAA, UAG, UGA।

06. কোন কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে?

[C. AG. 2022-23, 20-21]

- A. লিভার কোষ B. স্নায়ু কোষ C. জনন কোষ D. রক্ত কণিকা

Explanation নিউক্লিয়াসের সংখ্যা:

সংখ্যা	অবস্থান
১টি	প্রকৃত কোষ
২টি	Paramecium ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর যকৃত ও তরুণাঙ্ঘি কোষ
বহু	<i>Vaucheria</i> , <i>Penicillium</i> , <i>Botrydium</i> , <i>Sphaeroplea</i> , <i>Saprolegnia</i>
অনুপস্থিত	আদিকোষ, কিছু প্রকৃত কোষ, পরিণত সীতকোষ, পরিণত RBC, লেপ কোষ

07. জীবের মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনকে বলা হয়-

[C. AG. 2020-21]

- A. Dominant gene B. Binding gene
 C. Lethal Gene D. Complementary gene

Explanation বিভিন্ন জিন সম্পর্কিত তথ্য:

- গাঠনিক জিন (Structural gene): যা এনজাইম সংশ্লেষ করে।
- প্রমোটার বা উদ্দীপক জিন (Promoter gene): যেখানে RNA পলিমারেজ এনজাইম সংযুক্ত হয়।
- অপারেটর বা চালক জিন (Operator gene): চালক জিন গাঠনিক জিনের প্রোটিন উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রক জিন (Regulator gene): যা অপারেটর জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- Dominant gene: এই জিন অন্য জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে।
- Complementary gene: দুইটি ডমিনেন্ট জিন একসাথে কাজ করে যখন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

08. মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ কোনটি?

[C. AG. 2020-21]

- A. স্নায়ু কোষ B. রক্ত কোষ C. যকৃত কোষ D. পেশী কোষ

Explanation কোষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য:

- জীব বিদ্যার যে শাখায় কোষ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে কোষ বিদ্যা বা সাইটোলজি বলে।
- সবচেয়ে ছোট কোষ মাইকোপ্লাজমা (PPLO- Pleuron Pneumonia Like Organism)।
- সবচেয়ে বড় কোষ উট পাখির ডিম (17 × 12.5 সে.মি.)।
- মানবদেহে সবচেয়ে দীর্ঘতম কোষ হচ্ছে নিউরন কোষ (1.37 মিটার লম্বা)।

[BAU.2017-1]

- [BAU.2017-1]

① Explanation/মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃআবরণীর গায়ে অতি সূক্ষ্ম অনংখ্যা দাঁড়

- ক্রোমোসোমে কোন প্রোটিন পাওয়া যায়? [BAU. shift-2016-17]

A. প্রাণীকীয় প্রোটিন B. গ্রাহিকোপ্রোটিন

- C. নিউক্লিওপ্রোটিন D. অন্তর্নিহিত প্রোটিন

● **Explanation** "অনুলিপন ক্ষমতা সম্পন্ন, রং ধারনকারী নিউক্লিয়োসোম" দ্বারা গঠিত যে সব সূত্রাকার ক্ষুদ্রাঙ্গ বংশগতীয় উপাদান, মিউটেশন প্রকরণ প্রকৃতি কাজে ভূমিকা রাখে, তাকে ক্রোমোসোম বলে।

07. কোন দ্রব্যের উপস্থিতিতে গাজরের মূল হলুদ বর্ণের হয়? [BAU. 2015-16]

- A. প্রোটিন B. ক্রোরোফিল C. ক্যারোটিন D. সিন্টিন

Explanation মূলত ক্যারোটিন কমলা ও জাঙ্গোফিল হলুদ রং এর জন্য দায়ী ইরিথ্রোসায়ানিন → লাল; বিটাজ্যাঙ্কিন, ফাইকোসায়ানিন → নীল, বিটানাইডিন → লাল বেগুনী।

08. এনজাইমের ভিত্তার কোনটি? [BAU, 2015-16]

A. রাইবোসোম B. লাইসোসোম

- C. গলগি বডি D. মাইটোকন্ড্রিয়া

(B) Explanation এনজাইমের ভান্ডার → লাইসোসোম; মাইটোকন্ড্রিয়া → কোষের শক্তিঘর; গলগিবিডি → Packaging Center; রাইবোসোম → প্রোটিন তৈরির কারখানা; নিউক্লিয়াস → কোষের প্রাণকেন্দ্র/মস্তিষ্ক।

09. ব্যাক্টেরিয়াল ক্রোমোসোমের উপাদান কি? [BAU. shift-2015-16]

- A. ডিএনএ B. ডিএনএ এবং আরএনএ

- C. ডিএনএ এবং হিস্টোন প্রোটিন D. আরএনএ এবং হিস্টোন প্রোটিন

Ⓐ Explanation/ ব্যাকটেরিয়ার গঠন:

- ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোমের উপাদান ডিএনএ। এতে ক্রোমোসোমের হিস্টোন প্রোটিন থাকে না।

- ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান, সাথে মুরামিক এসিড এবং টিকোয়িক এসিড।

- ডিএনএ অবস্থানের অঞ্চলকে নিউক্লিয়োটাইড বলে।

10. নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকৃত কোষগুলোর নাম কি?

[BAU. shift-2015-16]

A. আদিকেন্দ্রিক কোষ ও প্রকৃতকেন্দ্রিক কোষ B. দেহকোষ ও জনন কোষ

- C. ভ্রূণকোষ ও জনন কোষ D. প্রাণীকোষ ও উদ্ভিদকোষ

Ⓐ Explanation/ নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষ দু প্রকার:

- আদিকেন্দ্রিক কোষ: উদাহরণ- মাইকোপ্লাজমা, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল/সায়ানোব্যাকটেরিয়া।

- প্রকৃত কেন্দ্রিক কোষ: উদাহরণ- শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা, অ্যানজিওস্পার্ম।
- অবস্থান ও কার্যভেদে কোষ ২ প্রকার: দেহ কোষ, জনন কোষ।

কোনটি নিউক্লিয়াসের গাঠনিক উপাদান? [BAU, 2015-16]

A. সিস্টার্নি B. ডেসিকুল

C. ক্রিস্টি D. ক্রোমোসোম

① **Explanation** / ক্রোমোসোম বংশগতির ভৌত ভিৰি। অবিচ্ছাৰক স্টাসৰ্গাৰ।

Chroma $\rightarrow$ रंग Soma $\rightarrow$ (द्रव)

থাইলাকায়োড উদ্ভিদ কোষের কোন অংশ বিদ্যমান?

[BAU] 2000-01, 2014-15 S & [AU] 2016-17, HSTU 2017-18]

A. সাইটোপ্লাজমে B. মাইটোকন্ড্রিয়ায়

C. লাইসোজোমে D. প্লাস্টিডে

① Explanation/ প্রাস্টিড তিন প্রকার:

কোবাপাস্ট: এটি সবজি বর্ষের। কোবাপাস্টের থাইলাকায়দে 40-60টি গান থাকে।

ii. କ୍ରୋମୋପାସଟ: ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ।

iii. লিউকোপাস্ট: বর্ণহীন।

BT SERIES -- NETWORK -- 155503-050-00 NETWORK 155503-050-00 NETWORK 155503-050-00 NETWORK 155503-050-00

27. কোষ মতবাদের প্রবক্তা কে? [BAU. 2003-04, SAU. 2003-04]

- A. শ্লেইডেন B. শ্লেইডেন ও সোয়ান
C. রবার্ট হুক D. হুক ও ব্রাউন

[Ans B]

28. DNA লাইগেজ এনজাইম দিয়ে- [BAU. 2003-04; SylIAU. 2011-12]

- A. প্রাসমিড DNA-তে ছেদন করা হয় B. DNA খন্ড সংযুক্ত করা হয়
C. DNA অনুলিখন করা হয় D. নতুন DNA তৈরি করা হয়

[B] Explanation/ বিভিন্ন এনজাইমের কাজ:

- লাইগেজ এনজাইম- DNA খন্ড সংযুক্ত করে
- রেস্ট্রিকশন এনজাইম- DNA খন্ডকে কাটা হয়

29. কোষের মাপ কোন এককের দ্বারা নেয়া হয়? [BAU. 2002-03]

- A. ইঞ্চি B. মিটার C. অ্যাংস্ট্রম D. মিলিমিটার

[C] Explanation/ সাধারণত কোষ এবং কোষের উপাংশগুলোর পরিমাপের জন্য মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন (μ) ও ন্যানোমিটার একক ব্যবহার করা হয়।

1 nm = 10^{-9} m, 1 Å = 10^{-10} m

একক	মান	ব্যবহার
সেন্টিমিটার (cm)	1 cm = 0.4 inch	খালি চোখে দেখা যায় (যেমন- ডিম)
মিলিমিটার (mm)	1 mm = 0.1 cm	খালি চোখে দৃশ্যমান, তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়
মাইক্রোমিটার (μ m)	1 μ m = 0.001 mm	আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বেশির ভাগ কোষ উপাংশসমূহ
ন্যানোমিটার (nm)	1 nm = 0.001 μ m	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কোষ উপাংশসমূহ
অ্যাংস্ট্রম (Å)	1 Å = 0.1 nm	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক্সরে প্রক্রিয়ায় দেখা যায় এমন কোষ উপাংশসমূহ

30. প্রোক্যারিওটিক শব্দটি কোন ভাষা হতে এসেছে? [BAU. 2002-03]

- A. আরবি B. গ্রীক C. ল্যাটিন D. ইংরেজী

[B] Explanation/ জীব বিজ্ঞানের অধিকাংশ শব্দ হয় ল্যাটিন অথবা গ্রীক।

31. ক্রোরোপ্রাস্টে কিয়টি দ্বারা আবৃত পানিগ্রাহী ম্যাট্রিক্সকে বলা হয়? [BAU. 2002-03]

- A. থানা B. স্ট্রোমা
C. ল্যামেলা D. কোয়ান্টাডোম

[Ans B]

32. ডি.এন.এ. (DNA)-তে কোন নাইট্রোজেন বেসটি পাওয়া যায় না? [BAU. 01-02]

- A. অ্যাডিনি B. গুয়ানিন
C. থাইমিন D. ইউরাসিল

[Ans D]

33. ডি.এন.এ. (DNA) অণুর গঠন কে আবিষ্কার করেন? [BAU. 2001-02, CVASU 2008-09]

- A. লিনিয়াস B. সিংগার
C. ওয়াটসন ও ক্রিক D. খোরানা ও হ্যালডেন

[C] Explanation/ ১৯৫৩ সালে আবিষ্কার করেন এবং ১৯৬৩ সালে নোবেল পান।

34. ক্রোরোপ্রাস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পিগমেন্ট কোনটি? [BAU. 2001-02]

- A. ক্যারোটিন B. জ্যাঙ্কোফিল C. ফাইকোবিলিন D. ক্লোরোফিল

[D] Explanation/ ক্লোরোফিল সূর্যের আলো ব্যবহার করে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। ক্যারোটিন ও জ্যাঙ্কোফিল ক্রোরোপ্রাস্টের গুরুত্বপূর্ণ পিগমেন্ট।

35. বংশগতির ভৌত ভিত্তি কোনটি? [BAU. 2001-02]

- A. ক্রোমোজোম B. রাইবোজোম C. ক্রোমাটিড D. টেলোমিয়ার

[A] Explanation/ বিভিন্ন বিষয়ের একক: বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি DNA

বিষয়	একক
বংশ গতির মৌলিক একক	জিন
বংশ গতির ভৌত একক	জিন
বংশ গতির কার্যিক একক	জিন
বংশ গতির রাসায়নিক একক	DNA
বংশ গতির ভৌত ভিত্তি	ক্রোমোসোম

36. প্রোটোপ্লাজম জীবনের ভৌত ভিত্তি- কার উক্তি? [BAU. 2000-01]

- A. রবার্ট ব্রাউন B. হার্ট ইউগ
C. হিউগো-ভন-মল D. হাঙ্গলে

[Ans D]

37. নিউক্লিয়াস এর আবিষ্কারক কে? [BAU. 2000-01, CVASU 11-12, CU-I 15-16]

- A. রবার্ট ব্রাউন B. ফন্টনা
C. হফ মাস্টার D. ফ্রেমিং

[Ans A]

38. কোন জীবিত কোষের নিউক্লিয়াস থাকে না? [BAU. 2000-01]

- A. সীডনল B. সঙ্গীকোষ C. ট্রাকিড D. ভেসেল

[A] Explanation/ অন্যান্য যে সব কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না সেগুলো মৃত রাখার টিপস SOAP:

S	O	A	P
সীডকোষ সীডনল স্তন্যপায়ী লোহিত রক্ত কণিকা (উট) ব্যতিক্রম	অনুচক্রিকা	আদিকোষ	Platelet

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. DNA এর কার্যকরী একককে কি বলে? [SAU. 2018-19]

- A. সিসট্রন B. রেকন C. কমপ্লন D. পেটোজ

[A] Explanation/ বিভিন্ন একক:

- জিন রিকমিনেশনের একক- রেকন
- জিন মিউটেশনের একক- মিউটন
- জিন কার্যের DNA এর কার্যকারী একক- সিসট্রন।

02. স্টপ কোডন নয়- [SAU. 2018-19]

- A. AUG B. UAA C. UAG D. UGA

[A] Explanation/ কোড ও কোডন:

- ট্রাইনিউক্লিয়োটাইডের অনুক্রমকে কোডন বলে
- মোট কোডন ৬১টি, এগুলো অ্যামিনো এসিডকে নির্দেশ করে
- Start Codon- AUG
- Stop Codon- UAA, UAG, UGA

03. নিউক্লিক এসিড হাইড্রোলাইসিসের পর যা পাওয়া যায় না- [SAU. 2018-19]

- A. পেটোজ সুগার B. নাইট্রোজেন ক্ষারক
C. ডিএনএ D. ফসফরিক এসিড

[C] Explanation/ নিউক্লিক এসিডের উপাদান:

- পেটোজ সুগার • নাইট্রোজেন ক্ষারক • ফসফরিক এসিড

04. লাইসোসোমের কাজ নয়- [SAU. 2018-19]

- A. কেরাটিন প্রস্তুতি B. অটোলাইসিস
C. আত্মহত্যা D. প্রোটিন লিপিবদ্ধ করা

[D] Explanation/ লাইসোসোমের কাজ:

- আত্মঘাতী থলি বা সুইসাইডাল স্কোয়াড
- অটোফ্যাগী
- ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস
- অটোলাইসিস
- কেরাটিন প্রস্তুতি

05. কোষঝিল্লিতে প্রোটিন..... হিসেবে থাকে না। [SAU. 2018-19]

- A. গাঠনিক উপাদান B. এনজাইম C. বাহক D. পানিশোষী

[D] Explanation/ কোষ ঝিল্লিতে পানিশোষী হিসেবে কাজ করে ফসফেট হেড বা লিপিড স্তর।

06. ট্রান্সক্রিপশনের জন্য প্রয়োজনীয় নয় কোনটি? [SAU 2017-18]

- A. DNA ছাঁচ B. RNA পলিমারেজ এনজাইম
C. UTP D. স্লাইসোসোম

[D] Explanation/ ট্রান্সক্রিপশন এর জন্য যা প্রয়োজন:

- DNA ছাঁচ (Template)
- RNA পলিমারেজ এনজাইম যা একাধিক রকম হতে পারে।
- মুক্ত রাইবোনিউক্লিয়োটাইড ট্রাইফসফেট (ATP) (GTP) CTP এবং UTP
- রাসায়নিক শক্তি, ট্রাইফসফেট ভেঙ্গে নিউক্লিয়োটাইড এবং পাইরোফসফেট সৃষ্টিকালে মুক্ত হয়। পাইরোফসফেট ভেঙ্গে দুটি আয়ন ফসফেট তৈরি কালেও কিছু অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যায়।
- কিছু সহযোগী প্রোটিন।

নিম্নের কোনটিতে DNA অনুপস্থিত?

[SAU. 2011-12, 2016-17]

A. লাইসোসোম B. ক্রোমোপ্লাস্ট C. মাইটোকন্ড্রিয়া D. নিউক্লিয়াস

Explanation ক্রোমোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া ও নিউক্লিয়াসে DNA পাওয়া যায়। লাইসোসোমে পাওয়া যায় না।

DNA প্রতিলিপিত হয় কোন পদ্ধতিতে?

[SAU. 2016-17]

A. অর্ধসংরক্ষণশীল B. সংরক্ষণশীল C. বিচ্ছুরণশীল D. অসংরক্ষণশীল

Explanation DNA এর তিন ধরনের প্রতিলিপন আছে এর মধ্যে DNA অর্ধসংরক্ষণশীল প্রণালীতে প্রতিলিপিত হয়।

ক্রোমোপ্লাস্টের ফটোসিনথেটিক ইউনিট কোথায় থাকে?

[SAU. 2016-17]

A. স্ট্রোমা ল্যামেলি B. থাইলাকয়েড মেমব্রেন
C. স্ট্রোমা D. ক্রোমোপ্লাস্ট আবরণ

Explanation থাইলাকয়েড মেমব্রেনে ফটোসিনথেটিক পিগমেন্টগুলি থাকে।

DNA অনুতে প্রথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে mRNA অনুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে কি বলা হয়?

[SAU. 2015-16]

A. ট্রান্সলেশন B. ট্রান্সক্রিপশন C. রেপ্লিকেশন D. ডুপ্লিকেশন

Explanation বিভিন্ন প্রক্রিয়া:

• DNA থেকে RNA উৎপাদনের প্রক্রিয়ার নাম ট্রান্সক্রিপশন।

• mRNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া ট্রান্সলেশন।

জেনেটিক কোড কে আবিষ্কার করেন?

[SAU. 2013-14]

A. সলিম আলী B. হরগোবিন্দ খোরানা
C. ওয়াটসন ও ক্রীক D. মেডেল

Explanation হরগোবিন্দ খোরানা কৃত্রিম জীন আবিষ্কারক ও ১৯৬৯ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Nobel পুরস্কার পান।

বিশ্ব প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে, তা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। নিম্নের কোনটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়?

[SAU. 12-13, 13-14; HSTU 15-16, CVASU. 2010-11]

A. রেজিন B. আঠা C. উদ্যায়ী তেল D. গুটামিন

Explanation বর্জ্য পদার্থ হল রেজিন, ট্যানিন, গাম, ল্যাটেক্স, অ্যালকালয়েড, অর্গানিক এসিড, উদ্যায়ী তেল, খনিজ ক্রিস্টাল।

হুইট-মোজাইক মডেল অনুযায়ী সেল মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান নয় কোনটি?

[SAU. 2013-14]

A. লিপিড বাইলিয়ার B. কোলেস্টেরল
C. স্টার্চ D. মেমব্রেন প্রোটিন

Ans C

নিম্নের কোনটি সেল মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান নয়?

[SAU. 2012-13]

A. প্রোটিন B. কোলেস্টেরল C. লিপিড D. স্টার্চ

Ans D

RNA-তে কোন বেসটি থাকে না?

[SAU 2004-05, 2011-12, CVASU. 2009-10, NSTU 2013-14]

A. অ্যাডেনিন B. গুয়ানিন
C. থাইমিন D. সাইটোসিন

Ans C

ত্রিগ্লিসেরিড উদ্ভিদের অণুগুলি ডিফাণ্ডে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

[SAU. 2011-12]

A. n B. 2n
C. 3n D. 4n

Ans B

অধকৃতকোষী (Prokaryote) জীব কোনটি?

[SAU 2009-10]

A. শৈবাল B. কলাগাছ
C. ছত্রাক D. মিস্টোব্যাকটেরিয়া

Ans D

DNA গঠনকারী শর্করা হল-

[SAU 2004-05]

A. চার কার্বন বিশিষ্ট B. পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট
C. ছয় কার্বন বিশিষ্ট D. বহু কার্বন বিশিষ্ট

Ans B

কনুকের 8৬টি ক্রোমোজোমের মধ্যে অটোসোম কয়টি?

[SAU 2003-04]

A. ২৩টি B. ৪৪টি
C. ২টি D. সবগুলো

Explanation বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোসোম:

• ক্রোমোজোম সংখ্যা-৪৬টি

• সেল ক্রোমোজোম-২ টি

• অটোসোম-৪৪ টি

20. ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বিভক্ত হয়ে যে দুইটি অংশ গঠন করে তাদেরকে বলে-

[SAU 2003-04]

A. ক্রোমাটিন B. ক্রোমাটিড
C. বায়োজোম D. থিয়াজোম

Ans B

21. ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান কোনটি?

[SAU 2003-04]

A. অ্যামাইনো এসিড B. নিউক্লিক এসিড
C. লিপিড D. H₂SO₄

Ans B

22. DNA ও RNA উভয়টিতে থাকে-

[SAU 2003-04]

A. নিউক্লিওটাইড B. থায়ামিন C. অগ্নিরাইবোজ D. এডিপি

Ans A

23. DNA গঠনকারী শর্করা কয় কার্বন বিশিষ্ট?

[SAU 2003-04]

A. 4 B. 5 C. 6 D. বহু

Ans B

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনটি প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে?

[SyIAU. 2018-19]

A. rRNA B. DNA C. mRNA D. ডিপ্লোটিন

Explanation RNA এর কাজ:

• rRNA: রাইবোসোম তৈরিতে ভূমিকা রাখে

• mRNA: প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

02. জীবকোষে পাশাপাশি অবস্থিত গ্রানার কিছু সংখ্যক গ্রানাম চক্র যে সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে-

[SyIAU. 2018-19]

A. সিলিভার ওয়াল B. ট্রিপলেট C. স্ট্রোমা ল্যামেলী D. থাইলাকয়েড

Explanation জীবকোষে পাশাপাশি অবস্থিত গ্রানার কিছু সংখ্যক গ্রানাম চক্র যে সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে স্ট্রোমা ল্যামেলী বলে।

• ট্রিপলেট- জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক।

• ক্রোমোপ্লাস্টে থাইলাকয়েড থাকে।

03. স্তন্যপায়ীর নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ কোনটি?

[SyIAU. 2018-19]

A. নিউরন B. লোহিত কণিকা C. পেশীকোষ D. শ্বেত রক্তকণিকা

Explanation নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ: (i) সীতনল (ii) সীতকোষ (iii) স্তন্যপায়ী RBC (উট ব্যতীত) (iv) Platelet (v) আদিকোষ।

04. DNA অণুতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি?

[SyIAU. 2016-17, 2017-18]

A. গুয়ানিন B. অ্যাডেনিন C. ইউরাসিল D. সাইটোসিন

Explanation RNA তে থাইমিন (T) অনুপস্থিত থাকে।

05. যে কারণে ফলের রং লাল হয়-

[SyIAU. 2016-17]

A. Pectin B. Carotene C. Xanthophyll D. Lycopin

Explanation বিভিন্ন বর্ণ কণিকা সম্পর্কিত তথ্য:

• Pectin: ফলের রসের ঘোলাটে বর্ণ দূর করে

• Xanthophyll: হলুদ বর্ণের পিগমেন্ট

• নীল রঙের রঞ্জক পদার্থের নাম ফাইকোসায়ানিন

• লাল রঙের রঞ্জক পদার্থের নাম ফাইকোইরিথ্রিন।

06. DNA হেলিক্সের ব্যাস কত?

[SyIAU. 2016-17]

A. 34 Å B. 35 Å C. 3.4 Å D. 20 Å

Ans D

07. কোনটি প্রোটিন তৈরির ব্রু-প্রিন্ট?

[SyIAU. 2016-17]

A. DNA B. RNA C. CTP D. Co-A

Explanation RNA থেকেই প্রোটিন তৈরী হয়। তাই RNA হলো প্রোটিন তৈরীর ব্রু-প্রিন্ট

08. মাইটোকন্ড্রিয়াতে এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য কোন ধরনের রাইবোসোম পাওয়া যায়?

[SyIAU. 2014-15]

A. 50S B. 60S C. 70S D. 80S

Explanation রাইবোসোম সম্পর্কিত তথ্য:

• 80S রাইবোসোম: সাইটোপ্লাজম

• 70S রাইবোসোম: মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্রোমোপ্লাস্ট।

09. যে জিন অপেরনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয়-

[SyIAU. 2014-15]

A. চালক জিন B. নিয়ন্ত্রক জিন
C. পরিপূরক জিন D. বাধাদানকারী জিন

Ans B

- DNA ও রাইবোজোম : ২০০টি DNA অনু থাকে।

પ્રથમ પત્ર

CELL DIVISION



SURVEY TABLE

କଉଟୁକୁ ପଢ଼ତ ? କିଭାବେ ପଢ଼ତ ?



ઉપરિક આલોચના

CONCEPT-01 | কোষ বিভাজন


ITEM-01

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আবিষ্কারক/নামকারক	আবিষ্কার
রুডলফ ভিরশাও	কোষ থেকেই কেবল কোষ সৃষ্টি হতে পারে।
টিম হাট	Sea Urchin-এর ডিমের প্রোটিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বা দৈবক্রমে সাইক্লিন প্রোটিন আবিষ্কার করেন।
ওয়াল্টার ফ্রেমিং*	সর্বপ্রথম সামুদ্রিক স্যালামান্ডার (<i>Triturus maculosa</i>) কোষে কোষ বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন এবং একে মাইটোসিস নাম দেন।
স্ট্রাসবুর্গার	অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া থেকে জটিল ও উন্নত কোষ বিভাজন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে এবং সর্বপ্রথম পুষ্পক উদ্ভিদের মায়োসিস লক্ষ্য করেন।
শ্রাইখার*	নিউক্লিয়াসের বিভাজন লক্ষ্য করেন এবং নাম দেন ক্যারিওকাইনেসিস।
হাওয়ার্ড ও পেঞ্চ*	বিভাজনরত অবস্থা ও পর্যায় মধ্যক অবস্থার সমন্বয়ে কোষচক্র প্রস্তাব করেন।
বেনেডিন এবং হাউসার	কৃমির গ্যামেটে হ্যাগ্রুয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন।
ফার্মার ও মুর*	হ্রাসমূলক বিভাজনকে মায়োসিস নামে আখ্যায়িত করেন।
সাঁটন ও বোভেরি	সর্বপ্রথম মায়োসিস বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন।
ওয়াল্টার ফ্রেমিং এবং স্ট্রাসবুর্গার*	প্রথম মাইটোসিস পদ্ধতির বর্ণনা দেন।
থমাস হাট মর্গান*	ভূট্টা উদ্ভিদে ক্রসিং ওভার সম্পর্কে ধারণা দেন এবং 1933 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ITEM-02

কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ



◆ কোষ বিভাজনের পার্থক্য:

প্রক্যারিওটিক (Prokaryotic)	মাইটোসিস (সমীকরণিক)	মিয়োসিস (হাসমূলক)
Prokaryotic জীবে ঘটে	Eukaryotic জীবে ঘটে	Eukaryotic জীবে ঘটে
দুটি কোষ তৈরি হয়	দুটি কোষ তৈরি হয়	চারটি কোষ তৈরি হয়
এককোষী জীবে ঘটে	দেহ কোষ, জনন কোষে (n) ঘটে	জনন মাতৃকোষে (2n) ঘটে
ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান থাকে	ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান থাকে	ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়
সরাসরি মাতৃ কোষের বিভাজন	নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম উভয় একবার বিভক্ত হয়	নিউক্লিয়াস দু'বার ও ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয়

◆ বিভাজন ক্ষমতাবিহীন যে সকল কোষ:

- পরিণত জনন কোষ বা গ্যামেট (ওত্রাণু, ডিম্বাণু)
- প্রাণীদেহের শ্লষুকোষ, পেশীকোষ ও হৃদপেশী কোষ
- সকল চলমান রক্তকোষ (RBC, WBC, Platelet)
- উদ্ভিদের স্থায়ী কোষ।

CONCEPT-02 কোষ বিভাজনের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও টার্ম

◆ কোষ বিভাজনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া:

- ইন্টারফেজ (90-95%): ইন্টারফেজ অবস্থাটি বেশ দীর্ঘ। পরবর্তী বিভাজন পর্যায়টিকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইন্টারফেজ অবস্থায় নিউক্লিয়াসে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তাই ইন্টারফেজ অবস্থায় কোষের নিউক্লিয়াসকে বলা হয় বিপাকীয় নিউক্লিয়াস।
- কোষচক্র: একটি কোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন এ তিনটি কাজ যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় কোষচক্র। কোষচক্রের S-দশায় DNA প্রতিলিপন সম্পন্ন হয়।
- মেটাকাইনেসিস: ক্রোমোসোমগুলো বিমুখীয় অঞ্চলে অবস্থান করলে তাকে মেটাকাইনেসিস বলে।
- ইন্টারকাইনেসিস: মায়োসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রথম ও ২য় বিভক্তির অন্তর্বর্তীকালীন বা মধ্যবর্তী সময়কে ইন্টারকাইনেসিস বলা হয়।
- ক্যারিওকাইনেসিস (শ্লাইখার নামকরণ করেন): নিউক্লিয়াসের বিভাজন।
- সাইটোকাইনেসিস: সাইটোপ্লাজমের বিভাজন। সাইটোকাইনেসিস না হলে একই কোষে বহু নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। একে মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন বলে। যেমন- ভাবের পানি। সাইটোকাইনেসিসের ফলে সৃষ্ট বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট উদ্ভিদ কোষকে সিনোসাইট বলে এবং প্রাণী কোষকে প্লাজমোডিয়াম বলে।
- ক্রসিংওভার: এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড এর মধ্যে অংশের বিনিময় হওয়াকে ক্রসিং ওভার বলে। থমাস হান্ট মর্গান সর্বপ্রথম ভূঁই উদ্ভিদে ক্রসিংওভার আবিষ্কার করেন। প্রথমে দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড একই স্থান বরাবর ভেঙ্গে যায়। পরে একটির অংশের সাথে অপরটির অন্য অংশ পুনরায় জোড়া লাগে। ফলে ক্রসজমা (X-আকৃতি) সৃষ্টি হয়।

◆ অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস ও ক্যান্সার: কোষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা মাইটোসিস নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হলে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস ঘটে থাকে, ফলে টিউমার ও ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার কোষে সাইক্রিন-Cdk এর নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়ে হয়ে যায়। p^{53} নামক প্রোটিন সাধারণত কোষকে বিভাজন হতে বিরত রাখায় ভূমিকা রাখে। এটি defective হলে (মানুষের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কোষেই defective p^{53} আছে) কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়।

- টিউমার সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় Oncogenesis।
- কোষ চক্র বিনষ্টকারী জিন হলো Oncogene; যে সব রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে তা হলো Mutagens।
- মিউটাজেনিক পদার্থই Carcinogenic হয়।
- দেহের বিভিন্ন অংশে টিউমার ছড়িয়ে পড়া হলো Metastasis।
- কোষের মৃত্যু- দুইটি উপায়ে মৃত্যু ঘটে।
 - i. Necrosis: পুষ্টির অভাব হলে বা বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে কোষের মৃত্যু ঘটে।
 - ii. Apoptosis: এটি হলো কোষের জেনেটিক্যাল নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু (Programmed cell death)।
- মাইটোটিক ইনডেক্স (Mitotic index): কোনো টিস্যুর মোট কোষ সংখ্যা এবং মাইটোসিসের কোষ সংখ্যার অনুপাত হলো মাইটোটিক ইনডেক্স (MI)

$$MI = \frac{\text{মাইটোসিসের কোষ সংখ্যা}}{\text{মোট কোষ সংখ্যা}}$$

- চিকিৎসক MI দেখে অনুমান করতে পারেন টিউমার কত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে এবং কি ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন। MI বেশি হলে দ্রুত বর্ধনশীল টিউমার।

◆ মাইটোসিসের গুরুত্ব: Mnemonic: দেব জানি কোটি টাকায় পুনরায় ক্ষতি গ্রহ

ছন্দ	তথ্য	ছন্দ	তথ্য
দে	দেহ গঠন ও দৈহিক বৃদ্ধি	কোটি	ক্রোমোসোমের সমতা রক্ষা
ব	বংশবৃদ্ধি (এককোষী সুকেন্দ্রিক জীবে Chlamydomonas)	পুনরায়	পুনরুৎপাদন
জা	জননাস্র সৃষ্টি ও জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি	ক্ষতি	ক্ষতস্থান পূরণ, ক্ষয়পূরণ
নি	নির্দিষ্ট আকার-আয়তন রক্ষা, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা	গ্রহ	গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা

মায়োসিসের গুরুত্ব:

Mnemonic: অতি প্রজাতির বৈচিত্র্যের জন্য মেডেলের কাছে গেল

ছন্দ	তথ্য	ছন্দ	তথ্য
অতি	অভিব্যক্তি	মেডেলের	মেডেলের সূত্র
প্রজাতির	প্রজাতির স্বকীয়তা ঠিক রাখা	কাছে	ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ রাখা
বৈচিত্র্যের	বৈচিত্র্যের সৃষ্টি	গেল	গ্যামিট সৃষ্টি ও বংশবৃদ্ধি
জন্য	জননকোষ সৃষ্টি, জনুক্রম		

VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

নতুন বিভক্ত হয় না, আমাদের পূর্ণাঙ্গ শাল রক্ত কোষ, পেশিকোষ, শ্নায়ুকোষ, হৃদয়ের স্থায়ী কোষসমূহ।

Cdk ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

G₁ থেকে S উপপর্যায় থেকে G₂ তে স্থানান্তরের জন্য Cdk প্রোটিনের অ্যাক্টিভেশন প্রয়োজন হয়।

কিন্তু অতি সীমিত (যেমন- মানুষের লোহিত রক্ত কোষ এবং কর্ণিয়ার বাইরের কোষ)।

কর্নাইটিন দশায় এন্ডোনিউক্লিয়েজ এর কারণে ননসিস্টার ক্রোমাটিড দু'টি এক হ'ল একাধিক স্থানে এবং একই তলে আড়াআড়িভাবে ভেঙ্গে যায়।

ইউক্লিয়ার সিস্টেম কোষকে সিনোসাইটিক বলে।

কিন্তু, RBC (উট ব্যতীত), অনুচক্রিকা ও আদিকোষে নিউক্লিয়াস থাকে না।

উন্নীত মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয়- Neoplasia।

স্ট্রোমিয়ার কোন তন্তুর সাথে যুক্ত থাকে- ট্র্যাকশন তন্তু।

কর্নেশির জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পর জাইগোটে।

উচ্চ শ্রেণির জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পূর্বে জনন মাতৃকোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টিকালে।

ইহা অনুযায়ী মায়োসিসের সময়কাল ভিন্ন হয়- ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস ঘটে গ্যামিট গঠনের পূর্বে। এ ধরনের মায়োসিসকে টার্মিনাল মায়োসিস বলে।

সম্পূর্ণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মায়োসিস পরাগধানীর মধ্যে মাইক্রোস্পোর বা পুংরেণু গঠনের সময় এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু গঠনের সময় ঘটে। এ ধরনের মায়োসিসকে স্পোরিক মায়োসিস বলে।

বহু প্রকার ছত্রাক ও শৈবালের দেহে মায়োসিস নিষেকের ফলে সৃষ্ট জাইগোট গঠনের পরে ঘটে। এ প্রকার মায়োসিসকে জাইগোটিক মায়োসিস বলে।

সকল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়- জ্বকোষ, মূল ও কাণ্ডের শীর্ষ, মেরিস্টেম কোষ।

মাইটোসিস ঘটে- ব্যাক্টেরিয়া, অ্যামিবা, সায়ানোব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও কতক ছত্রাক।

জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়- মাইটোসিসের জন্য।

ইন্টারফেজ অবস্থায় কোষের নিউক্লিয়াসকে বলে- বিপাকীয় নিউক্লিয়াস।

কোষ চক্রের নিয়ন্ত্রক- সাইক্লিক প্রোটিন ও cdk।

ইস্টোন প্রোটিন সংশ্লেষ হয়- S দশায়।

স্ট্রোমোসম মাইক্রোটিউবিউল তৈরির সূচনা করে- G₂ ধাপে।

ক্রোমোসোমীয় নৃত্য দেখা যায়- প্রো-মেটাফেজে।

সিস্টার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়- প্রো-মেটাফেজে।

ক্রোমোসোম সর্বাধিক খাটো ও মোটা দেখায়- মেটাফেজে।

ক্রোমোসোম সংখ্যা ও আকৃতি নির্ণয় করা যায়- মেটাফেজে।

প্রতিটি মেরুতে অপত্য নিউক্লিয়াসের আবির্ভাব ঘটে- টেলোফেজে।

কোষ ঝিল্লির খাঁজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে- প্রোটিন Actin ও Myosin।

ক্ষতস্থান ও ক্রমাগত ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে- মাইটোসিস।

অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিসের ফলে সৃষ্টি হয়- টিউমার ও ক্যান্সার।

ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়তা করে- প্যাপিলোমা ভাইরাস।

কোষ চক্র বিনষ্টকারী জিন- Oncogene।

কোষের জেনেটিক্যালি মৃত্যু হল- Apoptosis।

বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে কোষ মারা গেলে তাকে বলে- Necrosis।

ক্রমবৃত্তিক বিভাজন লক্ষ্য করেন- স্ট্রাসবুর্গার।

জনন কোষের সৃষ্টি হয়- মিয়োসিস প্রক্রিয়ায়।

সর্বদা মায়োসিস হয়- ডিপ্লয়েড কোষে।

- বৈচিত্র্য সৃষ্টির উপায় হলো- মায়োসিস।
- জাইগোটিক মায়োসিস দেখা যায়- শৈবাল ও ছত্রাক।
- পেঁয়াজের মূলে ক্রোমোসোম সংখ্যা- ১৬টি।
- সেন্ট্রিওলের বিভক্তির সূচনা ঘটে- জাইগোটিনে।
- Terminalization ঘটে- ডিপ্লোটিনে।
- নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের জোড় স্থানকে বলে- কায়াজমা।
- কোষ বিভাজনের ক্রোমোসোমের মধ্যে সিন্যাপসিস ঘটে- জাইগোটিনে।
- কায়াজমা সৃষ্টি হয়- প্যাকাইটিনে।
- মাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিওলাসের বিলুপ্তি ঘটে- প্রোফেজ ধাপে।
- অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম এনাফেজ পর্যায়ে দেখতে হয়- J-shaped।
- ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়- অ্যানাফেজ-১।
- কোষচক্রের মোট সময়ের মাইটোসিস দশায় ব্যয় হয়- ৫-১০%।
- দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড X-আকৃতি জোড়া স্থানকে বলা হয়- কায়াজমা।
- টিউমার সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয়- Oncogenesis।
- কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় ব্যয় হয়- ৯০-৯৫ ভাগ।
- নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয়- ক্যারিওকাইনেসিস।
- সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয়- সাইটোকাইনেসিস।
- কোষচক্রের DNA Replication হয়- S ফেজে।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়- দুই বার।
- স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে- প্রো-মেটাফেজে।
- একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে কোষ থাকে- ১০০ (১০^{১৫}) ট্রিলিয়ন।
- কোষ চক্র আবিষ্কার করে- হাওয়ার্ড ও পেঞ্চ।
- পুষ্টির অভাবজনিত কারণে কোষ মারা গেলে- নেক্রোসিস বলা হয়।
- বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট প্রাণিকোষকে বলা হয়- প্লাজমোডিয়াম।
- জীবদেহের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে- মাইটোসিস বিভাজনে।
- হ্যাপ্লয়েড জীবের মিয়োসিস ঘটে- জাইগোটিনে।
- বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয়- জাইগোটিনে।
- জৈব বিবর্তনে ভূমিকা রাখে- জার্মিনাল ক্রসিংওভারে।
- পোলারাইজড বিন্যাস দেখা যায়- লেটোটিনে।
- যে সকল ডিপ্লয়েড কোষে মিয়োসিস ঘটে তাকে বলা হয়- মিয়োসাইট।
- ক্রোমোসোমের রঙিন ধারন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়- টেলোফেজ-২।
- প্রোফেজ পর্যায়ে- জলবিয়োজন ঘটে।
- মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন ঘটে-ডাবের পানিতে।
- প্রতিটি জোড়াধা ক্রোমোসোমকে বলা হয়- বাইভেলেন্ট।
- ক্রোমোসোম সর্বাধিক মোটা, খাটো, স্পষ্ট হয়- মেটাফেজ।
- ক্রোমোসোম গতিপ্রাপ্ত হয়- অ্যানাফেজ।
- লুপ পাওয়া যায়- ডিপ্লোটিন, ডায়াকাইনেসিস ও মেটাফেজ-১ এ।
- ১টি কায়াজমা থাকলে প্রান্তীয়করণ ১৮০° এবং দুই বা ততোধিক থাকলে ৯০° কোণে ঘুরতে পারে।
- বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি চারটি ক্রোমাটিডকে একত্রে বলা হয়- টেট্রাড।
- জীবদেহের যেকোনো ক্ষত স্থান পূরণ হয়- মাইটোসিস প্রক্রিয়ায়।
- সকল উন্নত প্রাণীর গ্যামিট সৃষ্টি ঘটে- মিয়োসিস কোষ বিভাজনে।
- কোষকে বিভাজন হতে বিরত রাখায় ভূমিকা রাখে- p53 নামক প্রোটিন।



ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

01. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে সিন্যাপসিস ঘটে? [C. AG. 2022-23]

- A. লেপ্টোটিন B. জাইগোটিন
C. ডিপ্লোটিন D. ডায়াকাইনেসিস

(B) Explanation/ মিয়োসিসের বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত কাজ:

ধাপের নাম	কাজ
লেপ্টোটিন	পোলারাইজড বিন্যাস দেখা যায়
জাইগোটিন	সিন্যাপসিস ঘটে এবং বাইভ্যালেট তৈরি হয়
প্যাকাইটিন	ক্রসিংওভার ঘটে এবং ক্যাজমাটা তৈরি হয়
ডিপ্লোটিন	প্রান্তীয়করণ ঘটে
ডায়াকাইনেসিস	নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বিলুপ্তি ঘটে

02. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোম V, L, J, I আকৃতি ধারণ করে? [C. AG. 2022-23]

- A. মেটাফেজ B. টেলোফেজ
C. প্রোফেজ D. অ্যানাফেজ

(D) Explanation/ মাইটোসিসের বিভিন্ন ধাপের ঘটনা-

ধাপের নাম	ঘটনা
প্রোফেজ বা আদ্য পর্যায় (দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়)	- ক্রোমোসোমগুলোতে জলবিয়োজন শুরু হয়। - প্রতিটি ক্রোমোসোম হতে দুইটি করে সূত্রকে বিভক্ত হয় এদেরকে ক্রোমাটিড বলে।
প্রো-মেটাফেজ বা প্রাক-মধ্যপর্যায়	- স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। - ক্রোমোসোমীয় নৃত্য দেখা যায়।
মেটাফেজ বা মধ্য পর্যায়	- মেটাকাইনেসিস ঘটে অর্থাৎ ক্রোমোসোমগুলি কোষের বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। - সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয়। - ক্রোমোসোমগুলোকে সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।
অ্যানাফেজ বা গতিপর্যায়	- ক্রোমোসোমসমূহের মেরুমুখী চলন ঘটে। - মেরুমুখী গমনে ক্রোমোসোম V, L, J, I আকৃতি ধারণ করে।
টেলোফেজ বা অন্তঃপর্যায়	- মাকুষত্র ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। - ক্রোমোসোমগুলোতে জলবিয়োজন ঘটে। - সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

03. জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রিত কোষের মৃত্যুকে বলে - [C. AG. 2022-23]

- A. Necrosis B. Apoptosis
C. Karyokinesis D. Cytokinesis

(B) Explanation/ কোষের মৃত্যু-

- i. Necrosis: পুষ্টির অভাব হলে বা বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে কোষের মৃত্যু ঘটে।
ii. Apoptosis: এটি হলো কোষের জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু।

04. স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে কোথায় মিওসিস ঘটে? [C. AG. 2021-22]

- A. দেহকোষে B. জননকোষে
C. জনন মাতৃকোষে D. জাইগোটে

(C) Explanation/ স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের জনন মাতৃকোষে ও গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদে নিষেকের পর জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে।

05. কোষ চক্রের সংশ্লেষণ দশায় ব্যয়িত সময়- [C. AG. 2021-22]

- A. 10-20% B. 30-40%
C. 30-50% D. 70-90%

(C) Explanation/ কোষ চক্রের বিভিন্ন দশায় ব্যয়িত সময়:

দশার নাম	সময়
ইন্টারফেজ	90-95%
G ₁ দশা	30-40%
S দশা	30-50%
G ₂ দশা	10-20%
মাইটোসিস	5-10%

06. মাইটোসিস এর কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোম দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়? [C. AG. 2020-21]

- A. প্রোফেজ B. প্রো-মেটাফেজ
C. মেটাফেজ D. টেলোফেজ

Ans

07. 'ক্রোমোজোম নৃত্য' কোষ বিভাজনের কোন দশায় দেখা যায়? [C. AG. 2020-21]

- A. Prophase B. Pro-metaphase
C. Anaphase D. Telophase

(B) Explanation/ মাইটোসিসের বিভিন্ন ধাপের ঘটনা: C. AG. 2022-23 এর ব্যাখ্যা দেখে।

08. ক্যারিওগ্যামী কি? [C. AG. 2020-21]

- A. দু'টি অ্যাসকোস্পোরের মিলন B. দু'টি কোষের নিউক্লিয়াসের মিলন
C. দুটি কোষের সাইটোপ্লাজমের মিলন D. দুটি কোষের মিলন

(B) Explanation/ বায়োলজির কিছু টার্ম:

- ক্যারিওকাইনেসিস (শ্রাউখার নামকরণ করেন): নিউক্লিয়াসের বিভাজন।
- সাইটোকাইনেসিস: সাইটোপ্লাজমের বিভাজন।
- প্লাজমোগ্যামি: সাইটোপ্লাজমের মিলন।

09. কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রসিং ওভার ঘটে? [C. AG. 19-20]

- A. প্যাকাইটিন B. জাইগোটিন
C. লেপ্টোটিন D. ডিপ্লোটিন

Ans

10. কোন দশায় DNA অণুলিপন সম্পন্ন হয়? [C. AG. 19-20]

- A. S-দশা B. G₁-দশা
C. G₂-দশা D. প্রোফেজ

(A) Explanation/ ইন্টারফেজ এর বিভিন্ন দশার কাজ:

দশা	কাজ
G ₁ দশা	প্রোটিন, RNA ও DNA প্রতিলিপনের সকল উপাদান তৈরি হয়।
S দশা	DNA অণুলিপন সম্পন্ন হয়।
G ₂ দশা	বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ATP তৈরি হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রাণী কোষকে কি বলা হয়? [BAU. 06-07, 18-19]

- A. সিনসিটিয়াল কোষ B. সিনোসাইটস
C. পিনোসাইটস D. কোয়ানোসাইটস

(B) Explanation/ শৈবাল, ছত্রাক ও প্রাণিকোষে ক্যারিওকাইনেসিস ঘটে কিন্তু সাইটোকাইনেসিস ঘটে না। এর ফলে একটি কোষে বহু নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। ধরনের উদ্ভিদ কোষকে সিনোসাইটিক এবং প্রাণিকোষকে প্লাজমোডিয়াম বলে।

02. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করে? [BAU. 2018-19]

- A. প্রোফেজ B. মেটাফেজ
C. টেলোফেজ D. অ্যানাফেজ

(B) Explanation/ বিভিন্ন ধাপের ঘটনাবলী:

- প্রোফেজ- ক্রোমোসোম লম্বালম্বি ভাবে দুটি সূত্রে ভাগ হয়
- টেলোফেজ- ক্রোমোসোমসমূহ দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেয়
- অ্যানাফেজ- ক্রোমোসোম মেরুর কাছাকাছি আসে
- মেটাফেজ- ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেয় একে মেটাকাইনেসিস বলে।

কোষ বিভাজনের সময় সাইটোপ্রাজমের বিভাজনকে কী বলা হয়? [BAU. 13-14, 2017-18]

- A. সাইটোকাইনেসিস B. ক্যারিওকাইনেসিস
C. ক্যারিওপসিস D. ক্যারিওটাইপ

[Ans A]

সাইটোপ্রাজম পৃথকীকরণের মাধ্যমে দুটি কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলে?

[BAU 2017-18]

- A. সাইটোকাইনেসিস
B. ক্যারিওকাইনেসিস
C. অ্যামাইটোসিস
D. গ্যামিটোজেনেসিস

Explanation/ ক্যারিওকাইনেসিস: নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে।

সাইটোকাইনেসিস: সাইটোপ্রাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে।

জেনে রাখা ভালো: সাইটোকাইনেসিস না হলে একটি কোষে বহু নিউক্লিয়াস ইপল্ল হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ কোষকে সিনোসাইটিক এবং প্রাণিকোষকে গ্লোমেডিয়াম বলে।

মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের কতগুণ?

[BAU 2017-18]

- A. সমান B. অর্ধেক
C. দ্বিগুণ D. চার গুণ

Explanation/ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার সৃষ্টি করে?

[BAU. 2001-02, 2004-05, 2013-14, 16-17]

- A. লেনটোটিন B. জাইগোটিন
C. প্যাকাইটিন D. ডিপ্লোটিন

[Ans B]

যে ক্রোমোসোমের বাহুদ্বয় সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাকে কী বলা হয়?

[BAU. 15-16]

- A. মধ্যকেন্দ্রিক B. উপ-মধ্যকেন্দ্রিক
C. প্রান্তকেন্দ্রিক D. উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক

[Ans A]

মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় Bivalent তৈরি হয়?

[BAU 2007-08, 13-14; CVASU 2009-10, 2016-17]

- A. Zygotene B. Pachyten
C. Leptotene D. Diplotene

[Ans A]

কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি ও বর্ধন ঘটে?

[BAU 00-01, 06-07; SylAU. 2010-11]

- A. সাইটোকাইনেসিস B. মাইয়োসিস
C. অ্যামাইটোসিস D. মাইটোসিস

[Ans D]

অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোন আকৃতির?

[BAU 2006-07]

- A. 'J' আকৃতির B. 'V' আকৃতির
C. 'I' আকৃতির D. 'L' আকৃতির

Explanation/ বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোসোম:

ক্রোমোসোমের নাম	আকৃতি
মধ্যকেন্দ্রিক বা মেটাসেন্ট্রিক	V অক্ষরের মত
উপমধ্যকেন্দ্রিক বা সাব মেটাসেন্ট্রিক	L অক্ষরের মত
উপ প্রান্তকেন্দ্রিক বা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক	J অক্ষরের মত
প্রান্তকেন্দ্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক	I অক্ষরের মত

মাইটোটিক কোষ বিভাজনের প্রধানতম কাজ কি?

[BAU 2005-06]

- A. জীবদেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা
B. জনন কোষ বৃদ্ধি করা
C. চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করা
D. কোনটিই নয়

[Ans A]

12. মিয়োসিস বিভাজনে বিভাজিত হয়-

[BAU 2002-03, 2005-06]

- A. নিউক্লিয়াস 2 বার ও ক্রোমোসোম 2 বার
B. নিউক্লিয়াস 1 বার ও ক্রোমোসোম 2 বার
C. নিউক্লিয়াস 2 বার ও ক্রোমোসোম 3 বার
D. নিউক্লিয়াস 2 বার ও ক্রোমোসোম 1 বার

[Ans D]

13. ক্রসিংওভার সংগঠিত হয় কোন উপ-দশায়? [BAU. 01-02, SAU. 02-03, 03-04, RU. G 17-18, SylAU. 15-16, HSTU. 16-17, CVASU. 2008-09]

- A. জাইগোটিন B. প্যাকাইটিন
C. ডিপ্লোটিন D. ডায়াকাইনেসিস

[Ans B]

14. মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কি কি বিভক্ত হয়?

[BAU 2001-02]

- A. নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম উভয়েই দু'বার করে বিভক্ত হয়
B. নিউক্লিয়াস একবার ও ক্রোমোজোম দু'বার করে বিভক্ত হয়
C. নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম উভয়েই একবার করে বিভক্ত হয়
D. নিউক্লিয়াস দু'বার ও ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয়

[Ans C]

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. ইন্টারফেজ কার অংশ?

[SAU.2014-15]

- A. কোষচক্রের B. মাইটোসিসের
C. মিয়োসিসের D. অ্যামাইটোসিসের

Explanation/ ইন্টারফেজ হলো- মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কোষ চক্রের প্রস্তুতি পর্যায়। ৯০-৯৫% সময় ব্যায় হয়।

02. আবৃতবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড জীৱেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে কয়টি হ্যাপ্লয়েড জীৱেণু তৈরি করে?

[SAU.2013-14]

- A. ছয়টি B. চারটি
C. দুইটি D. আটটি

[Ans B]

03. মিয়োসিসে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয় কোন ধাপে?

[SAU.2009-10]

- A. প্রোফেজ-1 B. মেটোফেজ-1
C. অ্যানাফেজ-1 D. টেলোফেজ-1

[Ans C]

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. মিয়োসিসের কোন উপ-পর্যায়ে ক্রসিং ওভার সংঘটিত হয়?

[SylAU. 2018-19]

- A. লেনটোটিন B. জাইগোটিন
C. প্যাকাইটিন D. ডিপ্লোটিন

Explanation/ দুটি ননসিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় হওয়াকে ক্রসিং ওভার বলে। প্যাকাইটিন উপ পর্যায়ে ক্রসিং ওভার দেখা যায়।

02. বিভাজন ক্ষমতা নেই কোন কোষের?

[SylAU.2014-15]

- A. পেশি কোষ B. স্নায়ুকোষ
C. জনন মাতৃকোষ D. আবরণী কোষ

Explanation/ বিভাজন ক্ষমতা নেই → সীডকোষ, স্নায়ুকোষ, RBC, পেশি কোষ।

03. নিচের কোনটিতে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটে? [SylAU. 11-12]

- A. ফার্ণ B. মস
C. ইস্ট D. ভাইরাস

[Ans C]

04. ক্রোমোজোমের মধ্যে জিন বিনিময় ঘটে কখন?

[SylAU. 2010-11]

- A. সিন্যাপসিসের সময় B. ক্রসিং ওভারের সময়
C. প্রাণীয় করনের সময় D. মিয়োসিস-২-এ

[Ans B]

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিচের কোন কোষে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হয়? [CVASU-I. 15-16]

- A. মূলের অগ্রভাগের কোষ B. জনন মাতৃকোষ
C. জননাস্রের কোষ D. কান্ডের অগ্রভাগের কোষ

Explanation/ কোষ বিভাজনের স্থান:

- মায়োসিস: জননকোষ
- মাইটোসিস: দেহকোষ, জনন কোষ।

01.D



কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?



বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে

RATINGS

[কেন পড়ব?]

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগ

★★★

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ

★

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব

★★★

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য

★

ম্যালেরিয়ার ইতিহাস

★★

ম্যালেরিয়ার জীবনচক্র

★★★



টপিক আলোচনা

CONCEPT-01

ভাইরাস



ITEM-01

বিজ্ঞানীদের অবদান

বিজ্ঞানীর নাম	অবদান
এলফ মায়ার*	সর্বপ্রথম ভাইরাস সৃষ্ট মোজাইক রোগ বর্ণনা করেন।
মিখাইল আইভানভস্কি	মোজাইক রোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া হতে ক্ষুদ্র, ইহা প্রমাণ করেন।
ফ্রান্সিস (ভাইরোলজির জনক)	রোগাক্রান্ত পাতা থেকে মোজাইক ভাইরাস পৃথক ও কেলাসিত করেন।
ই. পাস্তুর*	জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কার করেন।
কোরম্যান ও মরিচ*	সায়ানোফায়ের আবিষ্কারক।
A. Lowff	A Virus is a virus বলেন।
গ্যালো*	এইডস রোগের ভাইরাস আবিষ্কারক।
Hervey J. Alter*	নিরব ঘাতক হেপাটাইটিস-সি আবিষ্কার করেন।
Walter Reed (ওয়াস্টার রিড)	মানবদেহের পীত জ্বর (Yellow fever) সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

(Ref: হাসান স্যার, আজিবুর স্যার)



ITEM-02

ভাইরাসের গঠন ও বৈশিষ্ট্য

ভাইরাসের গঠন: ভাইরাস নিউক্লিক এসিড (কেন্দ্রে) ও প্রোটিন (আবরণ) দিয়ে

গঠিত অতি আনুবীক্ষণিক অকোষীয় বস্তু যার অর্থ বিষ।

ভাইরাসের গঠনে ৩টি অংশ পাওয়া যায়:

i. কেন্দ্রীয় বস্তু: DNA অথবা RNA থাকে

ii. ক্যাপসিড: প্রোটিন নির্মিত, ক্যাপসোমিয়ার নামক একক নিয়ে গঠিত

(iii) বহিঃস্থ আবরণ: লিপিড বা লিপোপ্রোটিন স্তরের একককে পেপলোমিয়ার বলা

হয়। লিপোপ্রোটিন আবরণবিশিষ্ট ভাইরাসকে লিপোভাইরাস বলা হয়।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য:

- ভাইরাস জীবকোষের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজননক্ষম নয়।
- জীব ও জড়ের সেতুবন্ধন হলো ভাইরাস।
- ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।
- ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে এবং প্রকরণ তৈরি করতে সক্ষম।
- প্রোটিন আবরণ এন্টিজেন গুণাবলি বহন করে।
- নিজস্ব বিপাকীয় এনজাইম নাই।



ITEM-03

ভাইরাসের শ্রেণিবিন্যাস

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভাইরাসের শ্রেণিবিন্যাস:

আকৃতি	নিউক্লিক এসিড	অন্যান্য
• দণ্ডাকার: α-α-মোজাইক, TMV, মাম্পস • গোলাকার: TIV, পোলিও, HIV, ডেঙ্গু • ঘনকেন্দ্রাকার: হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া • ব্যাঙ্গাচি আকার: T₂, T₄, T₆ • পাউরুটি আকার: ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস • বুলেটাকার: র্যাভডো ভাইরাস	• DNA ভাইরাস: TIV, ভ্যারিচলা, T₂, ভ্যাক্সিনিয়া, হার্পিস, হেপাটাইটিস-বি, ফুলকপির মোজাইক, এডিনো। Parvoviridae গোত্রের (ϕX₁₇₄ ও M₁₃ কলিফায়) ভাইরাসের DNA একসূত্রক। • RNA ভাইরাস: TMV, HIV, ডেঙ্গু, পোলিও, মাম্পস, র্যাভিস, চিকুনগুনিয়া। Reoviridae গোত্রের (রিওভাইরাস, ধানের বামন রোগের ভাইরাস) ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।	• ইমার্জিং ভাইরাস: HIV, Ebola, Nile, SARS • মাইকোফায়: যে সব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে। • সায়ানোফায়: LPP₁, LPP₂ • ব্যাকটেরিওফায়: T₂, T₄, T₆



ITEM-04

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

◆ ভাইরাসের অপকারিতা:

(i) ভাইরাস ঘটিত রোগ:

ছন্দ	হাঙ্গ	হাঙ্গ	দেশে	বসন্ত	মাস	এল	কচি	ভাইকে	হু	ইনফ্লুয়েঞ্জা	জ্বরে	পেঙ্গ
উদাহরণ	হাম	হার্পিস	ডেঙ্গু	বসন্ত	মাম্পস	এডিনো	করোনা, চিকুনগুনিয়া	ভাইরাল হেপাটাইটিস	বার্ডফ্লু, সোয়াইন ফ্লু	ইনফ্লুয়েঞ্জা	জলাতন্ত	পেঙ্গ

(ii) ভাইরাসঘটিত রোগ এবং তাদের পোষক:

রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাসের নাম	রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাসের নাম
AIDS (রোগ নয়, লক্ষণ সমষ্টি)	মানুষ	HIV ভাইরাস	বার্ড ফ্লু *	হাঁস-মুরগি, পাখি	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_2N_2) ভাইরাস
ডেঙ্গু	মানুষ	ফ্ল্যাভিভাইরাস	জন্ডিস *	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস
জলাতন্ত *	মানুষ	র্যাবিস ভাইরাস	Swine flue *	মানুষ, শূকর	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_1N_1) ভাইরাস
গুটি বসন্ত	মানুষ	ডেরিওলা ভাইরাস	ধানের টুংরো রোগ	ধান	টুংরো ভাইরাস
হাম	মানুষ	রুবিওলা ভাইরাস	কলার বানচি টপ রোগ	কলা	বানচি টপ ভাইরাস
পোলিওমাইলাইটিস	মানুষ	পোলিও ভাইরাস	গোশ আগুর মোজাইক রোগ	গোলআলু	পট্যাটো মোজাইক ভাইরাস
ইনফ্লুয়েঞ্জা	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	তামাকের মোজাইক রোগ *	তামাক	টোবাকো মোজাইক ভাইরাস
হার্পিস	মানুষ	হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস	সিমের মোজাইক রোগ	সিম	বীন মোজাইক ভাইরাস
ভাইরাল হেপাটাইটিস	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস	টমেটোর বৃশিস্টাট রোগ *	টমেটো	বৃশিস্টাট ভাইরাস
চিকুনগুনিয়া *	মানুষ	চিকুনগুনিয়া ভাইরাস	ক্যাপোসি সার্কোমা	মানুষ	হার্পিস সিমপ্লেক্স

◆ ভাইরাসের উপকারিতা:

(i) ভাইরাস দিয়ে তৈরি রোগের প্রতিষেধক:

ছন্দ	পাশে	বসা	প্রিয়া	জন্মলে	টাইগার	দেখতে যার
প্রতিষেধক	পোলিও	বসন্ত	প্রোগ	জলাতন্ত	টাইফয়েড	জন্ডিস

(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে:

- যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear Polyhydrosis Virus (NPV)-কে পতঙ্গনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- লাল টিউলিপ ফুলে সাদা দাগ ফেলে একে ব্রোকেন টিউলিপ বলে। এতে ফুলের সৌন্দর্য ও দাম বেড়ে যায়।
- মিল্কো ভাইরাসের সাহায্যে অতিরিক্ত খরগোশ নিধন করা হয়।

◆ ভাইরাস সৃষ্ট রোগের বিস্তারিত:

হেপাটাইটিস	ডেঙ্গুজ্বর	PRSV
• ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বা সংক্ষেপে হেপাটাইটিস বলা হয় এটি জন্ডিসের অন্যতম কারণ। • হেপাটাইটিস ভাইরাস ৫ প্রকার, প্রতিরোধের জন্য পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হয়। • হেপাটাইটিস রোগের কারণ হেপাটাইটিস-B ভাইরাস • হেপাটাইটিস-C, হেপাটাইটিস B অপেক্ষা অধিক মারাত্মক। • হেপাটাইটিস C কে ত্বকের আঙন বলা হয়। • রক্ত পরীক্ষা করে HBsAg পজিটিভ হলে হেপাটাইটিস-B ভাইরাস আক্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয়।	• ভাইরাসের নাম ফ্ল্যাভি ভাইরাস বা ডেন্সি ভাইরাস • এটি একটি RNA ভাইরাস। • এই ভাইরাসের বাহক <i>Aedes aegypti</i>, <i>aedes albopictus</i> নামক মশকী। • জ্বর ১০৩-১০৫° ফারেনহাইট হয়ে থাকে। • ডেঙ্গুজ্বর ৩ প্রকার: সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর (Breakbone জ্বর), হেমোরাজিক ডেঙ্গুজ্বর, ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। • রক্ত পরীক্ষায় IgM অ্যান্টিবডি শনাক্তের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা হয়।	• Papaya Ringspot Virus Type (PRSV-P) • ফলন: শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। • রোগের বিস্তার: এফিড (<i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>) জাতীয় পতঙ্গ (জলপোকা ও সাদা মাছি) দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদেও মোজাইক রোগের সৃষ্টি করে। • জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে হাওয়াই-এ পঁপের জল (রেইনবো ও সানআপ) উদ্ভাবন করা হয়েছে যা PRSV প্রতিরোধী।

CONCEPT-02 ব্যাকটেরিয়া



ITEM-01

ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস

- আবিষ্কার: ওলন্দাজ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক ১৬৭৫ সালে সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এক ফোটা বৃষ্টির পানিতে ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। তিনি এর নাম দেন Animalcule বা ক্ষুদ্র প্রাণী। তাকে ব্যাকটেরিওলজির জনক বলা হয়।
- নামকরণ: জার্মান বিজ্ঞানী এরেনবার্গ ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে এর নামকরণ করেন।
- তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা: ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ব্যাকটেরিয়া ১৮৬৯ সালে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
- ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপেপটাইড, সাথে মুরামিক অ্যাসিড (Muramic acid) এবং টিকোয়িক অ্যাসিড (Teichoic acid) ও পলিস্যাকারাইড থাকে।
- এরা এককোষী জীব, তবে একসাথে অনেকগুলো কলোনি করে বা দল বেঁধে থাকতে পারে।
- (-17°C থেকে 80°C) তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে এবং তীব্র অভিযোজনক্ষম।



ITEM-02

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণীবিভাগ ভিত্তি	শ্রেণীবিভাগ	উপশ্রেণীবিভাগ	উদাহরণ
আকৃতি	কক্কাস (কোষ গোলাকৃতি)	মনোকক্কাস/মাইক্রোকক্কাস-একা থাকে*	<i>Micrococcus Aureus</i> , <i>Micrococcus denitrificans</i>
		ডিপ্লোকক্কাস- জোড়ায় জোড়ায় থাকে*	<i>Diplococcus pneumoniae</i>
		ট্ট্রোকক্কাস/ট্ট্রোস	<i>Tetracoccus sp.</i> , <i>Gaffkya tetragena</i> (হৃৎপিণ্ডে রোগ)
		স্ট্রেপটোকক্কাস- চেইন বা মালার মতো থাকে*	<i>Streptococcus lactis</i> , <i>Streptococcus pyrogens</i>
		স্ট্যাফাইলোকক্কাস- আঙ্গুরের থোকার ন্যায়	<i>Staphylococcus aureus</i>
		সারসিনা- ঘনতলের মতো গঠন	<i>Sarcina lutea</i>
	ব্যাসিলাস/দণ্ডাকৃতির	মনোব্যাসিলাস	<i>Bacillus albus</i> , <i>E.coli</i>
		ডিপ্লোব্যাসিলাস	<i>Moraxella lacunata</i>
		স্ট্রেপটোব্যাসিলাস- দুইয়ের অধিক*	<i>Streptobacillus moniliformis</i>
		কক্কোব্যাসিলাস	<i>Salmonella</i> , <i>Mycobacterium</i>
		প্যালিসেড ব্যাসিলাস- সমান্তরাল অবস্থান*	<i>Lampropedia sp.</i>
	সর্পিলাকার/স্পাইরিলাম		<i>Spirillum minus</i>
	কমাকৃতি/Vibrio*		<i>Vibrio cholerae</i>
	হাইফা/অনুসূত্রাকার		<i>Streptomyces sp.</i>
	বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া		<i>Rhizobium sp.</i>
	তারাকাকার/Stellate		<i>Stella sp.</i>
	বর্গাকৃতি/Square		<i>Haloquadratum walsbyi</i>
রঙন ভিত্তিক (বেসিক রং ধারণ করতে পারে)	গ্রাম পজিটিভ (অ্যালকোহল সলুশনে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে) Mnemonic: ক্রাস্টাই একটু ল্যাক আছে		ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া, ক্রুসট্রিডিয়াম, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া
	গ্রাম নেগেটিভ (ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করতে পারে না) Mnemonic: সায়ান, শিলা, রাজু কাল কলকাতায় এল		এনটেরোব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, শিগেলা, স্যালমোনেলা, রাইজোবিয়াম, ভিব্রিও, ই. কোলাই
ফ্লাজেলা ভিত্তিক	অ্যাক্টিকাস (কোন ফ্লাজেলা নাই)		<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
	মনোট্রিকাস (এক প্রান্তে একটি ফ্লাজেলা থাকে)		<i>Vibrio cholerae</i>
	অ্যাক্সিট্রিকাস (দুই প্রান্তে একটি করে ফ্লাজেলা থাকে)		<i>Spirillum minus</i>
	সেফালোট্রিকাস (একগুচ্ছ ফ্লাজেলা থাকে)		<i>Pseudomonas fluorescens</i>
	লম্ফোট্রিকাস (দুই গুচ্ছ ফ্লাজেলা থাকে)		<i>Spirillum volutans</i>
	পেরিট্রিকাস (সব দিকেই ফ্লাজেলা থাকে)		<i>Salmonella typhi</i>



ITEM-03

ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

উপকারিতা:

- * *Azotobacter*, *Pseudomonas*, *Clostridium* সরাসরি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।
- * *Bacillus subtilis* হতে সাবটিলিন, *Bacillus polymyxa* হতে পলিমিক্সিন ও *Actinomycetes* হতে স্ট্রেপটোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হয়।
- * *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউল নাইট্রোজেন সংবদ্ধন করে।
- * D.P.T, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়।
- * *Bacillus thuringiensis* বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
- * *Clostridium* এর সাহায্যে পাটের আঁশ ছড়ানো হয়।
- * *Azotobacter xylinum* দিয়ে ভিনেগার, *Bacillus lacticacidi* দিয়ে ল্যাকটিক এসিড, *Clostridium acetobutylicum* দিয়ে অ্যাসিটোন প্রস্তুত করা হয়।
- * পরিবেশের সুরক্ষার জন্য ব্যাকটেরিয়াকে প্রকৃতির ঝাঁড়ুদার বলা হয়।
- * বায়োগ্যাস উৎপাদন: *Bacillus*, *E. coli*, *Clostridium*, *Methanococcus* ইত্যাদি বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে।
- * পয়ঃনিষ্কাশন: জৈব বর্জ্য পদার্থকে দ্রুত রূপান্তরিত করে ব্যাকটেরিয়া পয়ঃপ্রণালিকে সুষ্ঠু ও চালু রাখে। যেমন: *Zooglea ramigera*।
- * তেল অপসারণ: সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল-খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন: *Pseudomonas aeruginosa*।

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ ও রোগের কারণ:

রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়া	রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়া
যক্ষা	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	ব্লাইট রোগ (ধান)*	<i>Xanthomonas oryzae</i>
নিউমোনিয়া	<i>Diplococcus pneumoniae</i>	আঠাঝরা রোগ	<i>X. vasculorum</i>
টাইফয়েড*	<i>Salmonella typhi</i>	ধনুষ্টংকার	<i>Clostridium tetani</i>
কলেরা*	<i>Vibrio cholerae</i>	গরুর যক্ষা	<i>Mycobacterium bovis</i>
ডিপথেরিয়া	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স*	<i>Bacillus anthracis</i>
আমশয়*	<i>Bacillus dysenteriae</i>	হাস-মুরগির কলেরা	<i>Bacillus avisepticus</i>
হুপিংকাশি*	<i>Bordetella pertussis</i>	লেবুর ক্যান্ডার*	<i>Xanthomonas citri</i>
টুন্ডুরোগ (গম)*	<i>Agrobacterium tritici</i>	আপেলের ফায়ার ব্লাইট*	<i>Erwinia amylovora</i>

STD (Sexually transmitted disease):

রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়া	রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়া
গনোরিয়া	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ক্রাইমাইডিয়া	<i>Chlamydia trachomatic</i>
সিফিলিস	<i>Treponema pallidum</i>		

CONCEPT- 03 ম্যালেরিয়া

◆ ম্যালেরিয়া পরজীবীর ইতিহাস:

বিজ্ঞানীর নাম	অবদান
চার্লস	সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া (অর্থ দূষিত বায়ু) শব্দটি ব্যবহার করেন
ফরাসি ডাক্তার চার্লস ল্যাভেরন	ম্যালেরিয়া পরজীবী আবিষ্কার করেন
রোনাল্ড রস	অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া পরজীবী বহন করে
স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন	ম্যালেরিয়ার জীবানু মশকীর সাহায্যে মানব দেহে সংক্রমিত হয়

(Ref: হাসান স্যার, আজিজুর স্যার)

◆ ম্যালেরিয়ার লক্ষণসমূহ তিন ধাপে প্রকাশ পায়:

- i. প্রাথমিক পর্যায়: প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধরা, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা।
ii. মাধ্যমিক পর্যায়: দ্বিতীয় পর্যায়ে কাপুনীসহ $104^{\circ}-106^{\circ}$ ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বর। মূলত 48 ঘণ্টা পর পর জ্বর আসাই *P.vivax* জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ। জ্বরের তিনটি অবস্থা পরীক্ষিত- শীত অবস্থা, উত্তাপ অবস্থা, ঘাম অবস্থা।
iii. চূড়ান্ত পর্যায়: দীর্ঘদিন আক্রান্তের ফলে যকৃত ও প্রীহা ক্ষীত হয়ে লাইসোলেসিথিন নিঃসরণ করে যার ফলে রক্তকণিকা ধ্বংস হয় (পরজীবি হিমোলাইসিন নামক অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা লোহিত রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে)।


◆ ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা:

- ক্রোরোকুইন (বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া জীবাণু এটি প্রতিরোধী)
- নিভাকুইন
- কুইনাইন (মূল ঔষধ, যা সিনকোনা গাছের বাকল থেকে তৈরি হয়)
- কেমোকুইন
- আরটিমিসিনিন (*Plasmodium falciparum* এটি প্রতিরোধী)।
- বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা- Mosquirix/RTSS।

◆ **ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀ:**

Mnemonic: ওমি ভাবি ফ্যামিলি মেকার-

ম্যালেরিয়া পরজীবির নাম	রোগের নাম	সৃষ্ট জ্বরের প্রকৃতি	সুস্থাবস্থা কাল
ও	মি	48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে	11-16 দিন
<i>Plasmodium ovale</i>	মৃদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়া		
ভা	বি	48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে	12-20 দিন
<i>Plasmodium vivax</i>	বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া		
ফ্যা	মিলি	36-48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে	8-15 দিন
<i>Plasmodium falciparum</i>	ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া		
মে	কার	72 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে	18-40 দিন
<i>Plasmodium malariae</i>	কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া		



ধাপ	বৈশিষ্ট্য	ধাপ	বৈশিষ্ট্য
স্পোরোজয়েট	মাকু আকৃতির, মানবদেহে প্রবেশকৃত প্রথম দশা	সিগনেট রিং	দেখতে আংটির মতো
ক্রিস্টোজয়েট	গোলাকার আকৃতি	অ্যামিবিবেড ট্রফোজয়েট	সায়ফনার্স কণা দেখা যায়, যার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া শনাক্ত করা হয়
সাইজন্ট	বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট দশা	মেরোজয়েট	পাইরোজেন নিঃসরণ হয়, ফলে জ্বর আসে
ট্রফোজয়েট	RBC'র প্রথম দশা	রোজেট	ফুলের পাপড়ির মতো, হিমোজয়েন নামক বর্জ্য ক্ষরিত হয়

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- মানুষ ম্যালেরিয়া পরজীবীর মাধ্যমিক পোষক।
 - মশকী ম্যালেরিয়া পরজীবীর নির্দিষ্ট পোষক।
 - উদ্ভিদে প্রায় 300 রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে।
 - P.vivax এর হিপনোজয়েট যুক্তত সাধারণত 10 মাস পর্যন্ত সুপ্ত থাকতে পারে।
 - উওসিস্ট পরিণত হতে 10-20 দিন সময় লাগে।
 - একটি উওসিস্টে প্রায় 10,000 স্পোরোজয়েট থাকতে পারে।
 - Parvoviridae গোত্রের ভাইরাসে DNA একসূত্রক।
 - Reoviridae গোত্রের ভাইরাসে RNA দ্বিসূত্রক।
 - ভিরিওন: সংক্রমনক্ষম ভাইরাস কণা।
 - নিউক্লিয়োক্যাপসিড: সংক্রমনক্ষমতাহীন ভাইরাস।
 - ভিরয়েড: শুধুমাত্র নিউক্লিক এসিড দিয়ে গঠিত।
 - প্রিন: শুধুমাত্র প্রোটিন দিয়ে গঠিত। প্রিন দ্বারা সংঘটিত রোগসমূহ: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের Kuru এবং Creutzfeldt, ভেড়া ও ছাগলের Scrapie, ম্যাড কাউ রোগ ইত্যাদি।
 - ভিরয়েড হলো সংক্রমক RNA।
 - ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াতে অনুক্রম নেই; শৈবাল, ছত্রাক অস্পষ্ট অনুক্রম; মস, ফাৰ্ণ, ম্যালেরিয়াতে স্পষ্ট অনুক্রম।
 - আৰ্কিব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে।
 - মাইকোপ্লাজমাতে জড় প্রাচীর নেই বললেই চলে। এরা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া।
 - ফ্ল্যজেলা নামক প্রোটিন দিয়ে ফ্ল্যজেলা গঠিত।
 - প্রতিটি ফ্ল্যজেলামের তিনটি অংশ থাকে। যথা:
 - (i) সূত্র (ii) সংক্ষিপ্ত হুক এবং (iii) ব্যাসাল বডি।
 - E. coli-কে T₂ ফাজ, মদ শিল্পের ইস্টকে জাইমোফাজ বলে।
 - নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী সায়ানোব্যাকটেরিয়াকে সায়ানোফাজ ধ্বংস করে থাকে।
 - প্রতি কোষে 100-300 T₂ ফায় তৈরি হয়।
 - ডেন্স জ্বরে অনুচক্রিকার সংখ্যা 150000/mm³ এর অনেক নিচে নেমে আসে।
 - IgM এন্টিবডির উপস্থিতি থাকে ডেন্স জ্বরে।
 - হেপাটাইটিস B প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো পেপ্টাইডালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। হেপাটাইটিস B ভ্যাকসিন ডোজ 4টি। প্রথম 3টি একমাস পরপর এবং ৪র্থ টি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ নিতে হয়।
 - শুধুমাত্র Escherichia coli এর 1টি কোষে 3000 ধরনের প্রোটিন থাকে।
 - ভাইরাস প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত।
 - নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া।
 - ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন এরেনবার্গ।

- ◆ ম্যালেরিয়া জীবাণু মানবদেহে প্রবেশের 28 দিন পর জ্বর আসে।
 - ◆ সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত- ব্যাকটেরিয়া কোষে।
 - ◆ 'বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া' রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী- *Plasmodium vivax*।
 - ◆ গনোরিয়া রোগ হয়- ব্যাকটেরিয়া দ্বারা।
 - ◆ ব্যাকটেরিয়াল DNA- Circular।
 - ◆ যে ভাইরাসে RNA থাকে- উদ্ভিদ ভাইরাস।
 - ◆ কোন উদ্ভিদ ভাইরাসে ডিএনএ থাকে- ফুলকপির মোজাইক।
 - ◆ ভাইরাসজনিত রোগ নহে- Cholera।
 - ◆ সোয়াইন ফ্লুরোর কারণ - SIV (Swine origin Influenza Virus)।
 - ◆ টিটানি রোগের জন্য দায়ী- প্যারাথেরমোন।
 - ◆ ধানের ব্লাইট রোগ হয়- *Xanthomonas oryzae* দ্বারা।
 - ◆ নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সহায়তা করে- *Clostridium spp.*।
 - ◆ এক্সফ্লোজেশন ঘটে- মশকীর রূপে।
 - ◆ হেপাটিক সাইজোগনি ঘটে- যকৃতে।
 - ◆ ভাইরাসের আবিষ্কারক হলেন- আইভানোভস্কি।
 - ◆ সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভাইরাস- গবাদি পশুর ফুট অ্যান্ড মাউথ।
 - ◆ সর্দি জ্বরে হাঁচির উদ্বেগ করে- ক্যাপসিড।
 - ◆ বহিঃস্থ আবরণ বিশিষ্ট ভাইরাস হলো- হার্পিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, HIV।
 - ◆ পাউরুটি আকৃতির ভাইরাস- হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া।
 - ◆ বুলেট আকার ভাইরাস হল- র্যাবডো ভাইরাস।
 - ◆ ছত্রাক আক্রমণকারী ভাইরাস- মাইকোফায়া।
 - ◆ ভাইরোরোলজির জনক হল- Stanley।
 - ◆ ত্বক কোষকে আক্রমণ করে- চিকেনপক্স ভাইরাস।
 - ◆ কেবল উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে- ভিরয়েডস।
 - ◆ সংক্রমন ক্ষমতাবিহীন ভাইরাস হল- নিউক্লিও ক্যাপসিড।
 - ◆ ইমার্জিং ভাইরাসসমূহ- HIV, SARS, Nile, Ebola, ইনফ্লুয়েঞ্জা, করোনা।
 - ◆ TMV এর প্রতিটি ক্যাপসোমিয়ামে অ্যামিনো এসিড থাকে- ১৫৮টি।
 - ◆ TMV গঠিত হল- RNA ও প্রোটিন দ্বারা।
 - ◆ লাইটিক চক্র প্রতি ৩০ মিনিটে নতুন ফায়ের সৃষ্টি হয়- ৩০০টি।
 - ◆ লাইসোজেনিক চক্র দেখা যায়- ল্যামডা (λ); P_1 , M_{13} ফায়ে।
 - ◆ মাইক্রোসেফালি হয়- জিকা ভাইরাসের জন্য।
 - ◆ টিকা উৎপাদনে ব্যবহৃত ভাইরাস হল- বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, প্রেগ, হেপাটাইটিস।
 - ◆ হেপাটাইটিস ভাইরাসে DNA যুক্ত নিউক্লিক এসিড হল- HBV।
 - ◆ হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের ভ্যাকসিন ডোজ- ৪টি।
 - ◆ ক্রনিক HBV শনাক্তকরণ করা হয়- (i) রক্তের HBsAg (ii) Anti-HBe IgG।
 - ◆ পানিবাহিত ভাইরাস- HAV ও HEV।
 - ◆ সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের তাপমাত্রা- ১০৩-১০৫°F।
 - ◆ পেন্সের রিম্পটের বিস্তার ঘটে- এফিড।
 - ◆ ব্যাক্টেরিওলজি ও প্রোটোজুওলজির জনক- লিউয়েন হুক।
 - ◆ শ্লাইম স্তর বলা হয়- ক্যাপসিউলকে।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়ার প্রধান জনন পদ্ধতি হল- দ্বিবিভাজন।
 - ◆ কোষ বিভাজনে ও স্বসনে সাহায্য করে- মেসোজোম।
 - ◆ স্ববিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বল্প সংখ্যক জিন ও ভেক্টর হিসেবে কাজ করে- প্লাজমিড।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়া হতে প্রতিষেধক টিকা হল- কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, ডি.পি.টি।
 - ◆ জিন প্রকৌশলে ব্যবহৃত ব্যাক্টেরিয়া- *Agrobacterium*, *E-coli*।
 - ◆ পতঙ্গনাশক হিসেবে ব্যাক্টেরিয়া- *Bacillus thuringiensis*।
 - ◆ গরু-মহিষের যক্ষ্মা রোগ হয়- *Mycobacterium bovis* দ্বারা।
 - ◆ কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ হল- প্রবল উদরাময়।
 - ◆ *Vibrio cholerae* নামক ব্যাক্টেরিয়ার আবিষ্কারক- রবার্ট কচ/কক।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়ার কোষ প্রাচীর গঠিত- মিউকোপ্রোটিন দিয়ে।
 - ◆ কলেরা হলে দেহে তাপমাত্রা কমে হয়- ৯৫ বা ৯৬°F।
 - ◆ ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত দশা- স্পোরোজোয়েট।
 - ◆ *Plasmodium falciparum* এর সূতাবস্থাকাল- ৮-১৫ দিন।
 - ◆ যকৃত সাইজোগনির সময়কাল- ৭-১০ দিন।
 - ◆ ডিপ্লয়েড দশা হল- জাইগোট, উকিনেট, উওসিস্ট।
 - ◆ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রধান লক্ষণ- নির্দিষ্ট সময় পরপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।
 - ◆ ম্যালেরিয়া শনাক্ত করা হয়- RBC তে সাফনার্স দানা দেখে।
 - ◆ ম্যালেরিয়া জীবাণুর গ্যামিটোসাইট সৃষ্টি হয়- RBC তে।
 - ◆ ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রাথমিক অবস্থা- স্পোরোজোয়েট।
 - ◆ একটি মশকীর রূপের প্রাচীরে উওসিস্ট থাকে- ৫০-৫০০টি।
 - ◆ পরিণত গ্যামিটোসাইট তৈরি হতে সময় নেয়- ৯৬ ঘণ্টা।
 - ◆ ম্যালেরিয়া বাহকের আবিষ্কারক- রোনাল্ড রস।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস কে বলা হয়- ব্যাকটেরিওফায়।
 - ◆ মানবদেহে *Plasmodium malariae* পরজীবীর সূতাবস্থা হলো- ১৮-৪০ দিন।
 - ◆ অনুজীব বিজ্ঞানের জনক হলো- অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হুক।
 - ◆ ধানের ব্লাইট রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস- *Xanthomonas oryzae*।
 - ◆ ডেঙ্গুরোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস হলো- Flavi virus।
 - ◆ DNA ভাইরাস হলো- T₂, TIV ইত্যাদি।
 - ◆ RNA ভাইরাস হলো- TMV, HIV।
 - ◆ কমাঙ্কৃতির ভাইরাস হলো- *Vibrio cholerae*।
 - ◆ মানুষের যক্ষ্মা রোগের জীবাণু হলো- *Mycobacterium tuberculosis*।
 - ◆ পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসকে বলা হয়- ভিরিয়ন।
 - ◆ T₂ ব্যাক্টেরিওফায়ের জিন থাকে- 150টি।
 - ◆ HIV এর সর্ববহিঃস্থ আবরণ হলো- নিউক্লিওক্যাপসিড।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়াকে চলাচলে সাহায্য করে- ফ্ল্যাজেলা।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়া থেকে প্রস্তুত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ হলো- সাবটিলিন, পলিমিক্সিন।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন এর অবস্থান হলো- কোষপ্রাচীরের নিচে।
 - ◆ ভিরিয়ন গঠিত হয়- নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা।
 - ◆ সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল হল- প্রিয়নস।
 - ◆ মদ শিল্পের ইস্টকে ধ্বংসকারী ভাইরাস- জাইমোফায়া।
 - ◆ সর্পিলাকার ব্যাক্টেরিয়া- *Spirillum sp*।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়ার গ্রাম নেগেটিভ অঙ্গ হলো- পিলি।
 - ◆ ব্যাক্টেরিয়ার দ্বিবিভাজনে সময় লাগে- ৩০ মিনিট।
 - ◆ *E. coli* মানুষের অন্ত্রে ভিটামিন তৈরি করে- B₁₂।
 - ◆ মানবদেহের হেপাটিক সাইজোগনির সর্বশেষ ধাপ হলো- মেরোজোয়েট।
 - ◆ স্পোরোজোয়েট দেখতে হলো- মাকু আকৃতির।
 - ◆ সাফনার্স কণা দেখা যায়- অ্যামিবয়েড ট্রোফোজোয়েটে।
 - ◆ বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা- Mosquirex/RTSS।
 - ◆ লাল টিউলিপ ফুলে বর্ণবিচ্যুতি সৃষ্টি করে- ভাইরাস।
 - ◆ PRSV এর আকৃতি- দণ্ডাকৃতি।
 - ◆ TMV তে ক্যাপসোমিয়ার থাকে প্রায়- ২২০০।
 - ◆ ভিরয়েড হলো- সংক্রামক RNA।
 - ◆ Parvoviridae গোত্রের ভাইরাসের DNA হলো- একসূত্রক।
 - ◆ Reoviridae গোত্রের ভাইরাসের RNA হলো- দ্বিসূত্রক।
 - ◆ মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী প্রজাতির সংখ্যা হলো- 4টি।
 - ◆ ম্যালেরিয়া পরজীবী কর্তৃক লোহিত রক্ত কণিকার ভিতরে তৈরীকৃত রক্তক হিমোজয়েন।
 - ◆ বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত ম্যালেরিয়া পরজীবিকে বলা হয়- সাইজন্ট।
 - ◆ *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে- T₂ ফায়।

• • ASPECT SERIES • • NETWORK • • ASPECT SERIES • • NETWORK • • ASPECT SERIES • • NETWORK • • ASPECT SERIES • • NETWORK • • ASPECT SERIES • • NETWORK • • ASPECT SERIES • • NETWORK • •

প্রোক্যারিওট কোনটি?

- A. ভাইরাস B. ব্যাকটেরিয়া
C. ছত্রাক D. ফাঙ্গ

[BAU 2001-02]

Explanation প্রোক্যারিওটিক: মাইকোপ্লাজমা, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া (BGA)। মনেরা রাজ্যের সব জীবই আদিকোষী।

মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু সৃষ্টাবস্থা কতদিন?

[BAU 2000-01]

- A. 9 B. 12
C. 14 D. 18

[Ans D]

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ভাইরাস গঠিত রোগ নয়?

[SAU. 2018-19]

- A. জলাতঙ্ক B. টাইফয়েড
C. ডেঙ্গু D. পোলিও

Explanation বিভিন্ন প্রকার রোগ:

- ভাইরাস গঠিত রোগ- ডেঙ্গু, বার্ডফ্লু, সোয়াইনফ্লু, জলাতঙ্ক, গুটি বসন্ত, জলবসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জডিস, ফুট অ্যান্ড মাউথ।
- ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ- যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা ডিপথেরিয়া, আমাশয়, হুপিংকাশি।

কোনটি ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া নয়?

[SAU2015-16]

- A. *Thiobacillus denitrificans* B. *Nitrobacter*
C. *Pseudomonas*
D. *Micrococcus denitrificans*

[Ans B]

ট্রাবাকো মোজাইক ভাইরাসের দেহ কি দ্বারা গঠিত?

[SAU. 2014-15]

- A. DNA এবং প্রোটিন B. RNA এবং প্রোটিন
C. DNA এবং লিপিড D. RNA এবং লিপিড

Explanation TMV একটি RNA ভাইরাস।

ছত্রাক আক্রমণকারী ভাইরাস কোনটি?

[SAU. 2011-12]

- A. ব্যাকটেরিওফায় B. সায়ানোফায়
C. একটিনোফায় D. মাইকোফায়

Explanation বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস:

মাইকোফায়	যে সব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে
Phaginae	ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাস
Phytophaginae	উদ্ভিদ আক্রমণকারী ভাইরাস
Zoophaginae	প্রাণী আক্রমণকারী ভাইরাস

হেপাটিক সাইজোগনি কোথায় ঘটে?

[SAU 2011-12]

- A. লোহিত কণিকায় B. যকৃতে
C. শ্বেত কণিকায় D. মশকীয় পাকস্থলিতে

Explanation ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিভিন্ন দশা:

- ম্যালেরিয়া জীবানুর অযৌন চক্র বা সাইজোগনি চক্র অতিবাহিত হয়- মানুষে
- হেপাটিক সাইজোগনি ঘটে → যকৃতে
- ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন চক্রের সর্বশেষ ধাপের নাম → স্পোরোজয়েট
- ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন চক্রের সর্বশেষ ধাপের নাম → গ্যামিটোসাইট
- ম্যালেরিয়া জীবানুর আক্রমণকারী পর্যায়ে → মশকীর লালগ্রন্থিতে
- ম্যালেরিয়া জীবানুর জীবনচক্রের সাফল্য দানা দেখা পর → অ্যামিবিয়ড ট্রাফোজয়েট
- ম্যালেরিয়া জীবানুর মানবদেহে প্রবেশের পর প্রথমে প্রবেশ করে → যকৃত।

প্রাজমিড পাওয়া যায় কোনটিতে?

[SAU. 2010-11]

- A. আম গাছে B. ছত্রাকে
C. ব্যাকটেরিয়ায় D. ভাইরাসে

[Ans C]

গরুর অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু একধরনের-

[SAU. 2010-11]

- A. ব্যাকটেরিয়া B. ছত্রাক
C. শৈবাল D. ভাইরাস

[Ans A]

08. গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত-

[SAU 2004-05]

- A. রোগ প্রতিরোধী B. এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী
C. গোলাপী বর্ণ ধরে রাখতে পারে D. কক্কি

[Ans D]

09. ব্যাক্টেরিওফাজ এক ধরনের-

[SAU 2003-04]

- A. ভাইরাস B. ব্যাকটেরিয়া
C. ছত্রাক D. শৈবাল

[Ans A]

10. যে জীবাণু বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করে মাটিতে নাইট্রেট যৌগ গঠন করে তা হচ্ছে-

[SAU 2003-04]

- A. অ্যামিবা B. রাইজোবিয়াম
C. মনোসিটিস D. প্রাজমোডিয়াম

[Ans B]

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ কোনটি?

[SylAU. 2018-19]

- A. গ্যামিটোসাইট B. মেরোজাইগোট
C. গোনিডিয়া D. ট্রাফোজয়েট

Explanation ব্যাকটেরিয়াতে প্রকৃতপক্ষে যৌনজনন হয় না শুধুমাত্র জেনেটিক বস্তুর স্থানান্তর হয়।02. মানবদেহে *Plasmodium malariae* এর সৃষ্টাবস্থায় কত দিন?

[SylAU. 18-19]

- A. ১২-২০ দিন B. ৮-১৫ দিন
C. ১৮-৪০ দিন D. ১১-১৬ দিন

Explanation বিভিন্ন ম্যালেরিয়া পরজীবীর সৃষ্টাবস্থা:

পরজীবীর নাম	সৃষ্টাবস্থা
<i>Plasmodium malariae</i>	১৮-৪০ দিন
<i>Plasmodium vivax</i>	১২-২০ দিন
<i>Plasmodium falciparum</i>	৮-১৫ দিন
<i>Plasmodium ovale</i>	১১-১৬ দিন

03. 'বানচি টপ ভাইরাস' কোন উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে?

[SylAU. 2016-17]

- A. কলা B. টমেটো
C. ধান D. বেগুন

Explanation উদ্ভিদের বিভিন্ন রোগ:

- টোবাকো মোজাইক-তামাক
- বীন মোজাইক-সীম
- টুংরো ভাইরাস-ধান
- পটেটো মোজাইক ভাইরাস-আলু

04. ডেঙ্গু ভাইরাসের সেরোটাইপ নয় কোনটি?

[SylAU.2015-16]

- A. DENV-0 B. DENV-1
C. DENV-2 D. DENV-3

Explanation DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 ডে ভাইরাসের সেরোটাইপ।

05. মাটিতে সরাসরি নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে কোন ব্যাকটেরিয়া?

[SylAU.2015-16]

- A. এজোটোব্যাকটার B. রাইজোবিয়াম
C. সালমোনেলা D. ব্যাসিলাস

Explanation রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) ব্যাকটেরিয়া শিম জাতি উদ্ভিদের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে।

06. পাউরুটি তৈরি প্রক্রিয়ায় ময়দার সাথে ইস্ট এর ব্যবহারের ফলে পাউরুটি হ্রদযুক্ত হয় কোন গ্যাসের চাপে?

[SylAU.2015-16]

- A. NH₃ B. O₂
C. CH₄ D. CO₂

Explanation পাউরুটি তৈরিতে ইস্ট ব্যবহারের ফলে CO₂ গ্যাসের চাপ পাউরুটি ফুলে উঠে এবং এর বৃদ্ধিতে তাতে হ্রদের সৃষ্টি করে। এটি মূলত ইস্ট এর ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া।

07. পাটের আঁশ ছাড়তে কাজে লাগে-

[SylAU. 2010-11, 14-15, HSTU 14-15]

- A. *Azotobacteria* B. *Clostridium*
C. *Rhizobium* D. *E. coli*

[Ans D]

08. তামাকের মোজাইক ভাইরাসকে পৃথক করে ক্রোমোসোম করা হয় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে? [SyIAU. 2013-14, CVASU. 2006-07]
A. Mayer B. Dimitry Iwanowasky
C. Stanley D. FC Bawden
(C) Explanation/ ভাইরাসের ইতিহাস:
• বেইজেরিচ প্রথম ভাইরাস নামটি প্রবর্তন করেন।
• বিজ্ঞানী মায়ার: সর্বপ্রথম ভাইরাস দিয়ে সৃষ্টি মোজাইক রোগের বর্ণনা করেন
• দিমিত্রি আইভানোভস্কি (১৮৯২): তামাকের মোজাইক রোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া হতে ক্ষুদ্র আকারের।
• W.M Stanley (১৯৩৫): তামাকের মোজাইক ভাইরাসকে পৃথক করেন।
• F.C. Bawden এবং N.W. Pirie (১৯৩৭): TMV নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত
• গ্যালো (১৯৮৪): AIDS রোগের প্যাথোজেন যে ভাইরাস তা আবিষ্কার করেন।

09. Plasmodium malariae-এর সুপারভাইট কত দিন? [SyIAU. 2013-14, NSTU. 2014-15]
A. 18-40 B. 12-20
C. 15-18 D. 11-20 [Ans A]

10. নিচের কোনটি RNA ভাইরাস? [SyIAU. 2011-12]
A. T₂ ভাইরাস B. TIV ভাইরাস
C. ভ্যারিচলা ভাইরাস D. টমেটোর ব্রুইস্টাট ভাইরাস [Ans D]

11. কোন পরজীবীটি মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করে না? [SyIAU. 2011-12]
A. Plasmodium cynomolgi B. Plasmodium ovale
C. Plasmodium falciparum D. Plasmodium malaria [Ans A]

12. ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর গঠনের জন্য দায়ী- [SyIAU. 2011-12]
A. লিপিড B. সেলুলোজ
C. কাইটিন D. কোনটিই নয়
(D) Explanation/ ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর গঠনের জন্য দায়ী মিউকোপেপটাইড, পলিস্যাকারাইড, মুরামিক এসিড।

13. যে পরজীবী প্রত্যক্ষ ভাবে পোষক দেহে কোন প্রভাব ফেলে না কিন্তু পোষক দেহের অন্য পরজীবীকে ধ্বংস করে তাকে বলা হয়- [SyIAU. 2009-10]
A. অস্থায়ী পরজীবী B. অক্ষতিকর পরজীবী
C. অতিপরজীবী D. অনাবশ্যক পরজীবী [Ans C]

14. সায়ানোব্যাকটেরিয়া কি? [SyIAU. 2009-10]
A. ব্যাকটেরিয়া B. ভাইরাস
C. সবুজ শৈবাল D. নীলাভ-সবুজ শৈবাল [Ans D]

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

01. সবচেয়ে ছোট ভাইরাস কোন রোগ সৃষ্টি করে? [CVASU. 2018-19]
A. হেপাটাইটিস বি B. হেপাটাইটিস সি
C. তামাকের মোজাইক রোগ D. ফুট এন্ড মাউথ রোগ
(D) Explanation/ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য:
• ভাইরাস 12 nm (পোলিও ভাইরাস) - 300 nm (TMV) হয়
• হেপাটাইটিস বি- হেপাটাইটিস রোগ হয়
• হেপাটাইটিস সি- ত্বকের আঙুন বলে।

02. ক্যাপসিড হলো- [CVASU. 2017-18]
A. নিউক্লিক এসিড B. ভাইরাসের প্রোটিন আবরণ
C. মিউট্যান্ট ভাইরাস D. কার্বোহাইড্রেট আবরণ
(B) Explanation/ প্রোটিন অনু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। ক্যাপসিডের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিক এসিডকে রক্ষা করা, তবে এরা পোষক দেহে সংক্রমণেও সহায়তা করে, এটি অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে।

03. ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বাহক কে? [CVASU.2015-16]
A. ইদুর B. এডিস মশা
C. গোলকুমি D. হুক ওয়ার্ম [Ans B]

04. মানবদেহের যকৃত ও রক্তকণিকায় সংঘটিত (Plasmodium vivax) এর অযৌন চক্রকে বলে- [CVASU: 2014-15]
A. গ্যামেটোগনি B. সাইজোগনি
C. স্পোরোগনি D. কোনটিই নয়
(B) Explanation/ মানুষ Plasmodium vivax এর মাধ্যমিক পোষক।

05. দধি তৈরীতে কোন অণুজীবটা ব্যবহৃত হয়? [CVASU.2014-15]
A. Streptomyces griseus B. Penicillium notatum
C. Saccharomyces cerevisiae D. Streptococcus lactis [Ans D]

06. অণুজীব বিজ্ঞানের জনক কে? [CVASU. 2011-12, 2014-15]
A. Robert Hooke B. Carolus Linnaeus
C. Antony Van Leeuwenhoek D. Gregor Johan Mendel [Ans C]

07. ইস্ট বেশী ব্যবহৃত হয়? [CVASU. 2011-12]
A. টিকা তৈরীতে B. এন্টিবায়োটিক তৈরীতে
C. প্রসাধনী তৈরীতে D. রুটি শিল্পে [Ans D]

08. মশকির দেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যে প্রক্রিয়াগুলি ঘটে তা হল- [CVASU. 11-12]
A. সাইজোগনি ও গ্যামোগনি B. গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি
C. স্পোরোগনি ও সাইজোগনি D. সাইজোগনি ও গ্যামিটোগনি
(B) Explanation/ 'মশকীর' দেহে স্পোরোগনি এবং গ্যামিটোগনি জীবন চক্র ঘটে।

09. মানুষের কোন অংশে ম্যালেরিয়া পরজীবী (P. vivax) এর সাইজোগনি প্রজনন ঘটে? [CVASU. 2010-11]
A. বৃক্ক B. লোহিত রক্তকণিকা
C. যকৃত D. যকৃত ও লোহিত রক্ত কণিকা [Ans D]

10. ধানের টুংরো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব কি? [CVASU. 2006-07, 2010-11]
A. ব্যাকটেরিয়া B. ভাইরাস
C. শৈবাল D. নেমাটোড [Ans B]

11. কোনটি Cyanobacterium? [CVASU. 2009-10]
A. E. coli B. Nostoc
C. Rhizobium D. Bacillus [Ans B]

12. Prions কি? [CVASU. 2009-10]
A. ভাইরাস প্রোটিন B. DNA
C. ভাইরাস RNA D. রোগ উৎপাদনকারী প্রোটিন
(D) Explanation/ বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস:
• প্রিয়নস: রোগ উৎপাদনকারী প্রোটিন
• Virion: সংক্রমনক্ষম ভাইরাস কণা
• Capsid: নিউক্লিক এসিডকে ঘিরে প্রোটিন আবরণ
• Capsomere: Capsid এর একটি আবরণ।

13. তামাকের মোজাইক রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব কি? [CVASU. 2009-10]
A. ব্যাকটেরিয়া B. ভাইরাস
C. ছত্রাক D. নিমাটোড [Ans B]

14. কে প্রমাণ করেন যে, কেবলমাত্র Anopheles গণজাতকী মশা ম্যালেরিয়ার পরজীবী বহন করে? [CVASU. 2008-09]
A. প্যাট্রিক ম্যানশন B. চার্লস ল্যাভেরন
C. রোনাল্ড রস D. রিচার্ড পিকার [Ans C]

15. 'মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রকে কি বলা হয়? [CVASU. 08-09]
A. সাইজোগনি B. স্পোরোগনি
C. গ্যামোগনি D. ট্রাফোজয়েট
(B) Explanation/ 'মশকীর' দেহে স্পোরোগনি এবং গ্যামিটোগনি জীবন চক্র ঘটে।

16. Cyanobacteria কোন ধরনের উদ্ভিদ? [CVASU. 2008-09]
A. Typical bacteria B. Blue-green algae
C. Fungi D. Virus [Ans B]

যে ব্যাকটেরিয়ার কোষের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্ল্যজেলাম থাকে তাকে কি বলে? [CVASU. 2008-09]

- A. এক্সট্রাইকাস B. লফোট্রাইকাস
C. পেরিট্রাইকাস D. মনোট্রাইকাস

① Explanation/ ব্যাকটেরিয়ার পকারভেদ:

- এক্সট্রাইকাস → এদের কোষে দুই প্রান্তে একটি করে ফ্ল্যজেলাম থাকে।
- লফোট্রাইকাস → এদের কোষে দুই প্রান্তে দুই ওচ্ছ ফ্ল্যজেলা থাকে।
- পেরিট্রাইকাস → এদের দেহের সবদিকেই ফ্ল্যজেলা থাকে।
- মনোট্রাইকাস → এদের কোষের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্ল্যজেলাম থাকে।

TMV কোন ধরনের ভাইরাস? [CVASU. 2008-09]

- A. RNA-virus B. DNA-virus
C. RNA এবং DNA-virus D. T₂ virus

② Explanation/ এক নজরে DNA Virus:

তিসুর	ভাই	টিউ	ড্যানিলা
TIV	জারিওলা	T ₂	ড্যাকসিনিয়া
হতে	ফ্রাণে	এল	
হাঙ্গিস+হেপাটাইটিস-বি	ফুলকপির মোজাইক	এডিনো	

টিকা (Vaccine) কে আবিষ্কার করেন? [CVASU. 2007-08]

- A. Luis Pasteur B. Alexander Fleming
C. Edward Jenner D. Theodor Escherich

③ Explanation/ বিভিন্ন বিষয়ের জনক ও আবিষ্কারক:

বিষয়	জনক
জ্বাতি টিকা	লুই পাস্তুর
পেনিসিলিন	আলেকজান্ডার ফ্রেমিং
ওটি বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার
শৈল্য চিকিৎসার জনক	ইবনে সিনা

T₂ Bacteriophage কি? [CVASU. 2007-08]

- A. Virus B. Bacteria C. HIV D. TMV [Ans A]

কোনটি ম্যালেরিয়ার জীবাণু নয়? [CVASU. 2007-08]

- A. Plasmodium vivax B. Plasmodium ovale
C. Plasmodium malariae D. Plasmodium falciparum [Ans D]

▶ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ▶

বাতাসের মুক্ত N₂ মাটিতে আবদ্ধ করতে পারে না কোন ব্যাকটেরিয়া?

[PSTU-G.2017-18]

- A. Azotobacter B. Bacillus
C. Pseudomonas D. Clostridium [Ans B]

মানুষের কোথায় ম্যালেরিয়া জীবাণু বাস করে? [PSTU. 2014-15]

- A. সিরামে B. W.B.C
C. R.B.C D. পরিপাকতন্ত্রে [Ans C]

অ্যানোফিলিস মশকীর কামড়ে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় এ তথ্য কে প্রকাশ করেন?

[PSTU.2013-14]

- A. ল্যাভেরণ B. রোনাল্ড রস
C. গলজি D. টর্ট [Ans B]

ম্যালেরিয়া জীবাণু মানব দেহে যে অ্যোনি প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে তাকে বলে?

[PSTU. 2012-13]

- A. গ্যামিটোগনি B. স্পোরোগনি
C. সাইজোগনি D. কোনটিই নয় [Ans C]

ভাইরাসের শূন্য প্রোটিন আবরণকে কি বলে?

[PSTU. 2011-12]

- A. ভিরেড B. ভিরিয়ন
C. প্রিয়ন D. ট্রান্সক্রিপটের [Ans C]

DNA ও RNA একত্রে কোন ভাইরাসে থাকে?

[PSTU. 2011-12]

- A. পোলিও B. ড্যান্সিনিয়া
C. হারপিস D. ইনফ্লুয়েঞ্জা [Ans D]

NETWORK PRIME TEST

01. Plasmodium vivax-এর সূতাবস্থা কতদিন?

- A. 12-20 B. 8-15
C. 18-40 D. 11-16

02. হিমোজেন কোথায় তৈরি হয়?

- A. অ্যোনি চক্রে B. মেরোগনিতে
C. স্পোরোগনিতে D. সাইজোগনিতে

03. ডেবু জুরে আক্রান্ত রোগীর রক্তে কোনটির উপস্থিতি পাওয়া যায়?

- A. IgA B. IgK
C. IgM D. IgE

04. হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের সূতিকাল কতদিন?

- A. ১৪-২৮ দিন B. ৪৫-১৮০ দিন
C. ১৪-১৮০ দিন D. ২১-৫৬ দিন

05. ভিরেডস হলো-

- A. প্রোটিন ফাইব্রিল B. দ্বিসূত্রক চক্রাকার DNA
C. একসূত্রক বৃত্তাকার RNA D. একসূত্রক বৃত্তাকার DNA

06. নাইট্রিকেশনে অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে পরিণত করতে কিসের সহযোগিতা নিতে হয়?

- A. ভাইরাস B. প্রোটোজোয়া
C. ব্যাকটেরিয়া D. ছত্রাক

07. পের্পের রিং স্পট রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসটি-

- A. H.N. B. PRSV
C. T₂ ফায় D. HIV

08. মানুষের শরীরে বসন্ত রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসটির নাম কি?

- A. র্যাবিস B. ভেরিওলা C. রুবিওলা D. হারপিস

09. ফ্ল্যজেলা ছাড়া ব্যাকটেরিয়াকে কি বলা হয়?

- A. Atrichous B. Monotrichous
C. Petritrichous D. Lophotrichous

10. কোনটি ভাইরাস ঘটিত রোগ নয়?

- A. TIV B. আঠাঝরা রোগ C. HIV D. ভ্যান্সিনিয়া

11. কোন ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় পাট থেকে আশ পৃথক করা যায়?

- A. Azotobacter B. Pseudomonas
C. Clostridium D. Bacillus

12. TMV ভাইরাস-

- A. একসূত্রক DNA B. দ্বিসূত্রক DNA
C. একসূত্রক RNA D. দ্বিসূত্রক RNA

13. কোলনে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া কোন ভিটামিন সংশ্লেষণ করে?

- A. ভিটামিন A B. ভিটামিন D C. ভিটামিন K D. ভিটামিন E

14. নিচের কোনটি ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য?

- A. এরা অকোষীয়
B. এতে সাইটোপ্রাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে
C. এদের দেহে কোন এনজাইম থাকে না
D. বিপাক ক্রিয়া ঘটে না

15. কোন ভাইরাসের RNA দ্বি-সূত্রক?

- A. ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস B. HIV
C. ইনফ্লুয়েঞ্জা D. রিও ভাইরাস

OMR SHEET	06. (A) (B) (C) (D)	12. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	13. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)	14. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)	15. (A) (B) (C) (D)
04. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)	
05. (A) (B) (C) (D)	11. (A) (B) (C) (D)	

ANS ANALYSIS	15.D	14.D	13.C	12.C	11.C	10.B
09.A	08.B	07.B	06.C	05.C	04.B	03.C
02.A	01.A					

অধ্যায়
০৭কৃত্রিম
জীবনগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ
GYMNOSPERMS & ANGIOSPERMS

কি পড়বে? কেন পড়বে?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়বে? কিভাবে পড়বে?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	নগ্নবীজী ও সাইকাসের বৈশিষ্ট্য	★ ★ ★
02	বিভাগ পরিচিতি ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য	★ ★
03	মূল, কাণ্ড, পাতা, পুষ্পমঞ্জরী	★
04	পুষ্পপত্র বিন্যাস, অমরাবিন্যাস, ফুল ও ফল	★ ★ ★
05	গোত্র পরিচিতি	★ ★ ★

CONCEPT-01 নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ

- নগ্নবীজী উদ্ভিদ পরিচিতি: যেসব উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না বলে ফল উৎপন্ন হয় না এবং বীজ নগ্ন অবস্থায় জন্মে তাদেরকে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বলে।
 - থিওফ্রাস্টাস এর Enquiry into plants গ্রন্থে সর্বপ্রথম Gymnosperm শব্দটি ব্যবহার করেন।
 - পৃথিবীতে নগ্নবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা বর্তমানে ৭২১ (৮৩টি গণ)।

- বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত নগ্নবীজী (৫ প্রকার) উদ্ভিদ:

- Cycas pectinata* (চট্টগ্রামের বাড়িয়াডালা এলাকায় পাওয়া যায়)
- Podocarpus neriifolius* (বোঁশপাতা নামে পরিচিত)
- Gnetum*: (i) *G. montenum* (ii) *G. oblongum* (iii) *G. latifolium* (ফিশ পয়জন পাওয়া যায়)।

- নগ্নবীজী উদ্ভিদের বিভাগ:

বিভাগ	উদ্ভিদ প্রকৃতি	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
Ginkgophyta	ফ্রাজেলায়ুজ	<i>Ginkgo biloba</i> একমাত্র জীবিত প্রজাতি এজন্য একে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।
Cycadophyta	ফ্রাজেলায়ুজ	<i>Zamia pygmaea</i> পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নগ্নবীজী উদ্ভিদ। এরা সাইকাস নামে পরিচিত।
Gnetophyta	ফ্রাজেলাবিহীন	<i>Gnetum</i> , <i>Welwitschia</i> (আর্কিগোনিয়াম অনুপস্থিত), <i>Ephedra</i>
Coniferophyta	ফ্রাজেলাবিহীন	পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু (115.92 মিটার বা 380.3 ফুট) বৃক্ষ <i>Sequoia sempervirens</i> বা রেড উড/হাইপেরিয়ন/জেনারেল শেরম্যান নামে পরিচিত। সবচেয়ে প্রাচীন বৃক্ষ ব্রিসল কোন পাইন, যাদের একটির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জনের প্রায় ২৫০০ বছর আগে।

(Ref: হাসান স্যার, আজিবুর স্যার, বিলকিস বানু হ্যাডার)

- নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য:

- উদ্ভিদ স্পোরোফাইট এবং অসমরুণপ্রসূ অর্থাৎ মাইক্রোস্পোর ও মেগাস্পোর তৈরি করে।
- নগ্নবীজী উদ্ভিদে দ্বিনিষেক ঘটে না (ব্যতিক্রম: *Ephedra*, এর থেকে স্বাসকটের ওষুধ ইফেড্রিন পাওয়া যায়), তাই শীর্ষ হ্যাঙ্গয়েড এবং নিষেকের পূর্বে সৃষ্টি হয়।
- জাইলেম টিস্যুতে সত্যিকার ভেসেল কোষ থাকে না (ব্যতিক্রম: *Gnetum*) এবং ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গীকোষ থাকে না।
- জীবনচক্রে অসম (Heteromorphic) আকৃতির জনুগ্রন্থ বিদ্যমান।
- Leaf scar নগ্নবীজী উদ্ভিদের একটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য। পাতা ঝড়ে পড়লেও নগ্নবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডে বিশেষ চিহ্ন থেকে যাওয়াই হলো Leaf scar।

- সাইকাস সম্পর্কিত তথ্য:

- Cycas* কে পামফার্ন বলা হয়
- পুংউদ্ভিদের মাইক্রোস্পোরোফিলগুলো একত্রিত হয়ে স্ট্রোবিলাস গঠন করে
- Cycas* এর শুক্রাণু সবচেয়ে বড়, লাটিমের মতো, সচল ও বহু ফ্রাজেলায়ুজ
- প্রাথমিক পর্যায়ে *Cycas* এর প্রধানমূল থাকে, *Cycas* এর মূলকে কোরালয়েড মূল বা রুট টিউবারকল (*Nostoc* এবং *Anabaena* দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে) বলে।
- Cycas* উদ্ভিদ স্পোরোফাইটিক (দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত)
- স্ত্রীরেণুপত্র স্ট্রোবিলাস গঠন করে না, এটি ডিম্বক ও পিনিউল নিয়ে গঠিত
- পাতায় ট্রান্সফিউশন টিস্যু বিদ্যমান, কচি পাতার ডার্নেশন সারসিনেট (কুন্ডলিত)

- আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য:

- গর্ভকেশর সাধারণত গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড এবং গর্ভমুন্ড-এ তিন অংশে বিভক্ত
- পরাগরেণু ফ্রাজেলাবিহীন, পরাগায়নকালে গর্ভমুন্ডে পতিত হয়
- ডাবল ফার্টাইলিজেশন অর্থাৎ দ্বিনিষেক ঘটে, তাই সস্য ট্রিপ্লয়েড
- কোনো প্রকার আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় না
- পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির আবৃতবীজী উদ্ভিদ হল *Wolffia microscopia* (0.1 মি.মি.)।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদটি হলো *Wolffia arrhiza*।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষ হল *Shorea faguetiana* প্রজাতি (331 ফুট বা 100.8 মিটার)।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু উদ্ভিদের মধ্যে বৈলাম (*Swintonea floribunda*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), তেলগু (*Hopea odorata*) ইত্যাদি বৃক্ষ প্রধান।

SEPT-02 উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যাবলি


কাণ্ড ও পাতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি:

মূল		কাণ্ড		পাতা	
প্রকারভেদ	উদাহরণ	প্রকারভেদ	উদাহরণ	প্রকারভেদ	উদাহরণ
প্রধান মূল (জগমূল বৃদ্ধির ফলে গঠিত শাখায়ুক্ত মূলতন্ত্র)	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ	ফাপা কাণ্ড (মধ্যপর্ব ফাপা হয়)	Poaceae, Cyperaceae (তিন কোণ বিশিষ্ট), Lamiaceae (চার কোণ বিশিষ্ট)	সিম্পল লিফ (একটি পত্র ফলকযুক্ত)	জবা, আম, জাম, কাঠাল, ধান
অস্থানিক* (জগমূল ব্যতিত অন্য স্থান থেকে উৎপন্ন হয়)	কেয়া, বট, অশখ, পাথরকুচি	রাইজোম* (ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড)	আহরা ↓ আদা হলুদ রাইজোম	কম্পাউন্ড লিফ*	Mnemonic: গোলাপীর নীল আকাশ গোলাপী→গোলাপ, র→রাধাচূড়া নী→নীম, নারিকেল, ল→লজ্জাবতী, কা→কামিনি, কৃষ্ণচূড়া, শ→সজিনা।
চক্রে মূল (কাণ্ডের পাতার অস্থানিক মূল)	একবীজপত্রী উদ্ভিদ	টিউবার (ভূনিম্নস্থ মাথার স্ফীত অংশ)	গোল আলু, মিষ্টি আলুর মূলে স্ফীত অংশ কাণ্ড নয়	আদর্শ পাতার তিনটি অংশ: (i) পত্রমূল (Base) (ii) পত্রবৃত্ত (Petiole) (iii) পত্রফলক (Lamina)। পাতায় বোটা থাকলে তাকে পিটিওলেট বা বৃত্তযুক্ত পাতা বলে বোটা না থাকলে তাকে সেসাইল বা বৃত্তহীন পাতা বলে। পাতার শিরাবিন্যাস প্রধানত দুই প্রকার: (i) জালিকাকার- দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (ii) সমান্তরাল- একবীজপত্রী উদ্ভিদ	
পরশরী মূল	অর্কিড	বাম্ব (ভূনিম্নস্থ অতি সংক্ষিপ্ত রূপান্তরিত কাণ্ড)	পেঁয়াজ, রসুন		
		রানার (দুর্বল কাণ্ড যা মাটির উপর পড়ে থাকে)	ধানকুনি		

(Ref: হাসান স্যার, আজিজুর স্যার, বিলকিস বানু ম্যাডাম, মাহফুজা হক ম্যাডাম, আজমল স্যার)

পুষ্পের বা পুষ্পবিন্যাস: কাণ্ডের শীর্ষ মুকুল অথবা কান্থিক মুকুল থেকে উৎপন্ন শাখা বা শাখাতন্ত্রের উপর পুষ্পের বিন্যাস পদ্ধতিকে পুষ্পমঞ্জরী বলে।

পুষ্পমঞ্জরী বা পুষ্পবিন্যাস



(Ref: হাসান স্যার, আজিজুর স্যার, বিলকিস বানু ম্যাডাম)

পুষ্পের বিন্যাস/এসিটেশন: মুকুলাবস্থায় বৃত্তাংশগুলো (অথবা পাপড়িগুলো) পরস্পরের সাথে কিভাবে বিন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয় এসিটেশন বা পুষ্পপত্রবিন্যাস।

ছন্দ	নাম	উদাহরণ*
ও	ওপেন বা মুক্ত	গন্ধরাজ (Gardenia jasmenoides), জবার উপবৃত্তি
ভাল,	ভালভেট বা প্রান্তম্পর্শী	আতা, আকন্দ (Calotropis procera), বাবলা, জবা ফুলের বৃত্তি
টু	টুইস্টেড বা পাকানো	জবা (Hibiscus rosa-sinensis) এর দলমণ্ডল, করবী
ই তো	ইমব্রিকেট	কৃষ্ণচূড়া (Delonix regia), বাদরলাঠি, কালকাসুন্দা (Cassia sophera)
ভেরি	ভেরিলারি	প্রজাপতিসম ফুল, মটরগুটি (Pisum sativum), শিম (Lablab purpureus), অপরাজিতা
কুইক	কুইনকানসিয়াল	পেয়ারা (Psidium guajava), সরিষা (Brassica napus)

(Ref: হাসান স্যার, বিলকিস বানু ম্যাডাম, মাহফুজা হক ম্যাডাম, আজমল স্যার)

অমরবিন্যাস বা প্রাসেন্টেশন: গর্ভাশয়ের ভেতরে প্রাসেন্টার বিন্যাস পদ্ধতিতে বলা হয় প্রাসেন্টেশন বা অমরবিন্যাস।

প্রকোষ্ঠ	নাম	উদাহরণ*
এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট	মার্জিনাল বা একপ্রান্তীয়	মটরগুটি (Pisum sativum), শিম (Lablab purpureus), অপরাজিতা
	বেসাল বা মূলীয়	ত্রিধারা (Tridax procumbens), সূর্যমুখী (Helianthus annuus), ধান, গাঁদা
	ফ্রিসেন্ট্রাল বা মুক্তমধ্য	তুঁতে, নুনিয়া শাক, বনধনিয়া, ডায়াছাস
একাধিক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট	এ্যাপিকাল বা শীর্ষক	ধনিয়া (Coriandrum sativum), লালপাতা (Euphorbia pulcherrima), ফ্রেটন
	অ্যাক্সাইল বা অক্ষীয়	জবা, ধুঁসুরা, রজনীগন্ধা, টেঁড়স, বেগুন
	সুপারফিশিয়াল বা গাভ্রীয়	শাপলা (Nymphaea nouchali), শালুক, পদ্ম (Nelumbo nucifera), শিয়াল কাটা
	প্যারাইটাল বা বহুপ্রান্তীয়	লাউ (Lagenaria vulgaris), শসা (Cucumis sativus), পেঁপে, কুমড়া, সরিষা

❖ ফুল ও ফলের প্রকারভেদ:

ফুল		ফল	
প্রকারভেদ	উদাহরণ	প্রকারভেদ	উদাহরণ
উভলিঙ্গ*	জবা, ধুতুরা	প্রকৃত (গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন)	আম, জাম, লিচু, পেয়ারা
একলিঙ্গ	লাউ, কুমড়া	অপ্রকৃত* (গর্ভাশয় ছাড়া অন্য থেকে উৎপন্ন)	চালতা, আপেল, ডুমুর, আনারস, কাঁঠাল
পুষ্পপুষ্প	লাউ এর পুষ্পপুষ্প	সরল (একটি পুষ্প হতে একটি ফল)	আম, শিম, মটর, ধান
স্ত্রীপুষ্প	লাউ এর স্ত্রীপুষ্প	গুচ্ছিত (একটি পুষ্প হতে একগুচ্ছ ফল)	স্বর্গচাঁপা, আতা, নয়নতারা
স্ত্রীপুষ্প (পুং ও স্ত্রী স্তবক উভয়ই অনুপস্থিত)	সৌন্দর্যবর্ধক কিছু উদ্ভিদ	যৌগিক* (সমগ্র পুষ্প মঞ্জুরী হতে ১টি ফল)	কাঁঠাল, বট, তুত, আনারস, ডুমুর
সম্পূর্ণ (চারটি স্তবকই বিদ্যমান)	জবা, মটর, ধুতুরা	লিগিউম (উপর থেকে নিচে ২টি কপাটে বিদীর্ণ)	শিম
অসম্পূর্ণ (এক বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত)	লাউ, কুমড়া, রজনীগন্ধা	ক্যাপসিউল (উপর থেকে নিচে বহু কপাটে বিদীর্ণ)	ধুতুরা, টেঁড়স, পাট, কার্পাস
সমাজ পুষ্প (স্তবকগুলো সমআকার ও আকৃতি বিশিষ্ট)	ধুতুরা, জবা, বেগুন, সরিষা	ক্যারিঅপসিস (এক প্রকোষ্ঠ ও একটি বীজযুক্ত)	ধান, গম, ভুট্টা
অসমাজ পুষ্প (স্তবকগুলো বিষম আকার ও আকৃতি বিশিষ্ট)	শিম, মটরগুটি, অপরাজিতা, বক	সিলিকুয়া* (গুচ্ছ বিদারী)	সরিষা, মুলা
বহুস্তম্ভ	সরিষা, জবা, ধুতুরা	বেরি* (এক বা একাধিক গর্ভপত্রী ও বহুবীজী)	কাঁট বেরী ক-১কলা, ট-১টমেটো
অপ্রতিসম	অর্কিড, কলাবতী, সর্বজয়া	সাইজোক্যার্প (গুচ্ছ অবিদারী)	ধনে, গাজর, লজ্জাবতী
এক প্রতিসম	শিম, অপরাজিতা	ড্রুপ* (ফলত্বকে ৩টি স্তর বিদ্যমান)	আম, কুল, আমড়া, নারিকেল
সর্পিলাকার	শাপলা, স্বর্নচাঁপা	পেপো (বহুবীজ ও বহুপ্রাণীয় অমরাবিন্যাসযুক্ত)	শসা, কুমড়া
গর্ভাশয়ের অবস্থান অনুযায়ী*		সরোসিস (রসালো যৌগিক)	আকাশ: আ-১আনারস, কা-১কাঁঠাল শ-১সরোসিস
গর্ভপাদ (Hypogynous)	সরিষা, জবা, ধান	হেসপেরিডিয়াম (বহুপ্রকোষ্ঠ ও অক্ষীয় অমরাবিন্যাসযুক্ত)	লেবু, কমলা
গর্ভকটি (Perigynous)	শিম, গোলাপ	নাট (ফলত্বক স্থল ও কাঠল)	বাদাম, সুপারি
গর্ভশীর্ষ (Epigynous)	কুমড়া, পেয়ারা	পোম	আপেল, নাশপতি

(Ref: হাসান স্যার, আজিবুর স্যার, বিলকিস বানু ম্যাডাম, মাহবুজা হক ম্যাডাম, আতুল স্যার)

CONCEPT-03 উদ্ভিদের গোত্র পরিচিতি

❖ Poaceae ও Malvaceae সম্পর্কিত তথ্য:

আলোচ্য বিষয়	Poaceae (Gramineae)- একবীজপত্রী	Malvaceae- দ্বিবীজপত্রী
মূল	গুচ্ছমূল	প্রধান মূলতন্ত্র
বর্ধন	একবর্ষ, দ্বিবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীজকণ্ড, গুল্ম বা কাঠল	বীজকণ্ড, গুল্ম, বৃক্ষ
কাণ্ড	নলাকার, সুস্পষ্ট পর্বসন্ধিযুক্ত, মধ্যপর্ব ফাঁপা (Culm)। (ইক্ষু, ভুট্টা ব্যতিক্রম)	কাঠল, শাখাশিখিত, বেলনাকার
পাতা	সরল, সমান্তরাল শিরাবিন্যাসযুক্ত, একান্তর, লিগিউম বিশিষ্ট (ব্যতিক্রম- <i>Echinochloa</i>)	সরল, জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, সবৃত্তাক
পুষ্পবিন্যাস	স্পাইকলেট	একক (সাইমোস)
অমরাবিন্যাস	মূলীয়	অক্ষীয়
ফল	ক্যারিঅপসিস	ক্যাপসিউল, বেরি অথবা সাইজোক্যার্প
ফুল	ট্রাইমেরাস	পেন্টামেরাস
পরাগধানী	সর্বমুখ	একপ্রকোষ্ঠীয় বৃদ্ধাকার
গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ	<i>Bambusa bambos</i> (বাঁশ) <i>Oryza sativa</i> * (ধান) <i>Saccharum officinarum</i> (আখ) <i>Triticum aestivum</i> * (গম) <i>Zea mays</i> * (ভুট্টা- কর্ণফেল্প তৈরী) <i>Hordeum vulgare</i> (যব- হরলিঙ্গ তৈরী) <i>Cymbopogon citratus</i> (লেমন ঘাস- সুগন্ধী শিল্পে) <i>Phragmites karka</i> (নলখাগড়া) <i>Thysanolaema maxima</i> (ঝাউঘাস) <i>Cynodon dactylon</i> * (দুর্বাঘাস- রক্তপাত বন্ধ ও ক্ষত নিরাময়)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> * (জবা- রক্ত আমাশয় ও অর্ধরোগের ওষুধ) <i>Abelmoschus esculentus</i> (টেঁড়শ- বহুমুত্র রোগের ওষুধ) <i>Gossypium herbaceum</i> * (কার্পাস তুলা) <i>Hibiscus cannabinus</i> (কেনাফ-মেশ্তাপাট) <i>Hibiscus sabdariffa</i> (মেশ্তাপাট) <i>Hibiscus mutabilis</i> (স্থল পদ্ম) <i>Thespesia populnea</i> (ইন্ডিয়ান টিউলিপ-খেলনা, কৃষিকাজ, পেল্লি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়; Portia tree/পরশ পিপুল নামে পরিচিত) <i>Malvaviscus arboreus</i> (মরিচফুল-লক্ষা জবা নামে পরিচিত)
উদাহরণ	ধান, গম, নারিকেল, বাঁশ, ঘৃতকুমারী, ইক্ষু, কচু, কলা, ভুট্টা, খেজুর, যব, কুমারিকা, অর্কিড, ঘাস, পেয়াজ, রসুন, শতমূলী।	আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, ধুতুরা, তেঁতুল, ছোলা, রেড়ি, লাউ, শিম, কুমড়া, চা।

জিন্ন গোত্রের তুলনামূলক পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	Liliaceae	Leguminosae (Fabaceae)	Cruciferae (Brassicaceae)	Malvaceae	Solanaceae	Poaceae (Gramineae)
মূল*	গুচ্ছমূল	প্রধান মূল	প্রধান মূল	প্রধান মূল	প্রধান মূল	গুচ্ছমূল
পাতা	সমান্তরাল শিরাবিন্যাস	জালিকা শিরাবিন্যাস	জালিকা শিরাবিন্যাস	জালিকা শিরাবিন্যাস	জালিকা শিরাবিন্যাস	সমান্তরাল শিরাবিন্যাস
ফুল*	ট্রাইমেরাস	ট্রো বা পেটামেরাস	ট্রোমেরাস	পেটামেরাস	পেটামেরাস	ট্রাইমেরাস
পুংকেশর	৬টি, সমান	১০টি বা তার কম, বা বেশি, যুক্ত বা মুক্ত	৬টি, ৪টি লম্বা এবং ২টি খাটো অর্থাৎ ট্রোডিনেমাস	অনেক, এক গুচ্ছক	৫টি, পাপড়ির সাথে যুক্ত	৩টি (ধান ও বাঁশে ৬টি)
অম্রাবিন্যাস	অক্ষীয়	একপ্রান্তীয় (মার্জিনাল)	বহুপ্রান্তীয়	অক্ষীয়	অক্ষীয়	মূলীয়
ফল*	ক্যাপসিউল, কখনও বেরী	লিগিউম বা লোমেন্টোম	সিলিকুয়া	ক্যাপসিউল, বেরী	বেরী, কখনও ক্যাপসিউল	ক্যারিঅপসিস
ফলোৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্য	মসলা ও ঔষধ গোত্রীয়	ডাল বা আমিষ গোত্রীয়	সবজি গোত্রীয়	প্রধানত তন্তু জাতীয়	সবজি ও তামাক জাতীয়	ঘাস গোত্রীয়
উদাহরণ	পিয়াজ* (<i>Allium cepa</i>), রসুন* (<i>Allium sativum</i>), ঘৃতকুমারী* (<i>Aloe vera</i>), শতমূলী (<i>Garden asparagus</i>), টিউলিপ	মসুর* (<i>Lens culinaris</i>), মাসকলাই (<i>Vigna mungo</i>), খেসারি (<i>Indian pea</i>), ছোলা (<i>Cicer arietinum</i>), মুগডাল (<i>Vigna radiata</i>), শিম (<i>Phaseolus vulgaris</i>), অড়হর (<i>Pigeon pea</i>)	সরিষা* (<i>Sinapis alba</i>), মূলা* (<i>Raphanus sativus</i>), ফুলকপি* (<i>Brassica oleracea</i>), বাধাকপি (<i>Brassica oleracea</i>), সালাদগম (<i>Brassica rapa</i>)	জবা, ডেড়স, কার্পাস, তুলা, কেনাফ- মেস্তা, পাট, স্থল পদ্ম [বৈজ্ঞানিক নামের জন্য উপরের অংশ দেখ]	ধুতুরা (<i>Datura metel</i>), গোল আলু (<i>Solanum tuberosum</i>), টমেটো* (<i>Solanum lycopersicum</i>), মরিচ (<i>Capsicum annuum</i>), বেগুন* (<i>Solanum melongena</i>), তামাক (<i>Nicotiana tabacum</i>)	ধান, গম, বাঁশ, আখ, ভুট্টা, যব, দুর্বাঘাস, নলখাগড়া, ঝাড়ুঘাস [বৈজ্ঞানিক নামের জন্য উপরের অংশ দেখ]

(Ref: হাসান স্যার, আজিবুর স্যার, বিলকিস বানু ম্যাডাম, মাহমুজা হক ম্যাডাম, আজবদ স্যার)

VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

নগ্নবীজী গ্রুপটিকে টেরিডোফাইট ও আবৃতবীজীর মাঝে সেতু বন্ধনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
 Cycas-এর শুক্রানু উদ্ভিদ কুলের মধ্যে সর্ববৃহৎ।
 ইম্পার স্পোরোফাইটিক জনুর (2n) প্রথম কোষ।
 লবু ঘাস সুগন্ধী তেল ও প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহার করা হয়।
 র বা বার্লি বাণিজ্যিক ভাবে হরলিন্ড, কমপ্র্যান জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
 বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে *C. pectinata* প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মায়।
 ধেনমূল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।
 লা, গাজর, বীট ইত্যাদি রূপান্তরিত প্রধান মূল। খাদ্য সঞ্চয় করে বলে এরা স্ক্রো প্রধান মূল।
 Ginkgophyta ও Cycadophyta বিভাগের নগ্নবীজীর শুক্রাণু ফ্লাজেলাযুক্ত।
 Gnetophyta এবং Coniferophyta বিভাগের নগ্নবীজীর শুক্রাণু ফ্লাজেলাবিহীন।
 স্পাইকলেট: এক ধরনের পুষ্পমঞ্জুরী। Poaceae গোত্রের উদ্ভিদে স্পাইকলেট দেখা যায়।
 ফলোৎপাদনের ঔষধ হিসেবে ডেড়স ব্যবহার করা করা হয়।
 চর্বা ফুল রক্ত আমাশয় রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
 লম্বা ঘাস সুগন্ধি শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
 ১৫টি আবৃতবীজী উদ্ভিদ প্রজাতি পৃথিবীর মূল খাদ্য যোগান দিয়ে থাকে (ধান, গম, ইট্টা, জোয়ার, বার্লি, ইন্ডু, ভাগ্যরবীট, আলু, মিষ্টি আলু, কসভা, সয়াবীন ও অন্যান্য বীনস (Beans), নারিকেল, বাদাম এবং কলা)।
 হুসফেরী পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য- পাপড়ি ৪টি ত্রিসংকার।
 Cycas উদ্ভিদের সস্য (endosperm) কোন ধরনের- হ্যাগ্রুয়েড।
 উদ্ভিদের ডিম্বকের নিষেক পরবর্তী দশা- বীজ।
 যার অনুপস্থিতির কারণে Cycas-এ ফল সৃষ্টি হয় না- গর্ভাশয়।
 রূপান্তরিত কাণ্ডের শীর্ষভাগ স্কী ও গোলাকার হলে তাদেরকে বলা হয়- টিউবার।
 একবীজপত্রী উদ্ভিদ গোত্র হলো- Liliaceae।
 সরিষা ফুলের গর্ভপত্র কয়টি- ২।
 Glycine max এর গোত্র কোনটি- Leguminosae।

- ◆ *Sequoia sempervirens* এর উচ্চতা- 380.3 feet।
- ◆ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ- *Zamia pygmaea*।
- ◆ Living fossil- *Cycas*, *Ginkgo biloba*।
- ◆ পুংরেণু পত্রের সর্ব বর্ধিত মাথাকে বলে- অ্যাপোফাইসিস।
- ◆ পাকস্থলির পীড়া ও চর্মরোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়- *Cycas circinalis*।
- ◆ মেগাস্পোরোফিলে লাল বর্ণের ডিম্বক সৃষ্টি হয়- ২-৪ জোড়া।
- ◆ *Cycas* উদ্ভিদের শুক্রাণু- বহুফ্লাজেলাযুক্ত।
- ◆ বাংলাদেশে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদ- *Wolffia arrhiza* (1 mm)।
- ◆ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদ- *Wolffia microscopica* (0.1 mm)।
- ◆ বাংলাদেশের প্রধান উঁচু বৃক্ষ হল- বৈলাম, গর্জন, তেলতর।
- ◆ রূপান্তরিত প্রধান মূল হলো- মূলা, গাজর, বীট, শালগম।
- ◆ অস্থানিক মূল দেখা যায়- কেয়া, বট, অশ্বখ, পাথরকুচি।
- ◆ রাইজোমের উদাহরণ- আদা, হলুদ।
- ◆ বাষ্পের উদাহরণ- পেঁয়াজ, রসুন।
- ◆ পুষ্পপত্র বিন্যাসে ক্যাপিচুলামের উদাহরণ- গাঁদা, সূর্যমুখী, ডালিয়া।
- ◆ পুষ্পপত্র বিন্যাসে স্পাইকলেটের উদাহরণ- ধান, গম, ঘাস।
- ◆ সাইমোস/নিয়ত/একক/সলিটারি পুষ্প- জবা, ধুতুরা।
- ◆ ক্যালিন্ড্র/বৃতি এর প্রতিটি সদস্যকে বলে- সেপাল বা বৃত্যংশ।
- ◆ পুংকেশরের দণ্ডকে বলা হয়- ফিলামেন্ট বা পুংদণ্ড।
- ◆ অসম্পূর্ণ (Incomplete) পুষ্পের উদাহরণ- কুমড়া, রজনীগন্ধা, লালপাতা।
- ◆ উভলিঙ্গ (Bisexual) পুষ্পের উদাহরণ- জবা, ধুতুরা, লিলি।
- ◆ অসম্পূর্ণ (Irregular) পুষ্পের উদাহরণ- মটরগুটি, অপরাজিতা, কালকাসুন্দা।
- ◆ এক প্রতিসম পুষ্পের উদাহরণ- অপরাজিতা, শিম।
- ◆ তুষ (Glume) এর উদাহরণ- ধান, গম।
- ◆ গর্ভপাদ (হাইপোগাইনাস) পুষ্পের উদাহরণ- জবা, ধুতুরা, সরিষা, ধান।
- ◆ গর্ভকটি (পেরিগাইনাস) পুষ্পের উদাহরণ- গোলাপ, শিম, মটর, অপরাজিতা।
- ◆ সর্বমুখ (Versatile) পরাগধানী দেখা যায়- ধান, গম।
- ◆ বৃদ্ধাকার (Reniform) পরাগধানী দেখা যায়- জবার পরাগধানী।

- ◆ ভালভেট বা প্রান্তস্পর্শী পুষ্পপত্র বিন্যাসের উদাহরণ- বাবলা, আকন্দ, জবা, আতা।
- ◆ টুইস্টেড বা পাকানো পুষ্পপত্র বিন্যাসের উদাহরণ- জবার দলমণ্ডল, করবী।
- ◆ ভেকসিলারি পুষ্পপত্র বিন্যাসের উদাহরণ- মটরভটি, শিম, অপরাজিতা, অতসী।
- ◆ ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্তমধ্য অমরাবিন্যাস দেখা যায়- তুঁত, নুনিয়া শাক।
- ◆ বেসাল বা মূলীয় অমরাবিন্যাস দেখা যায়- ত্রিধারা, সূর্যমুখী, ধান, গাঁদা।
- ◆ অ্যাক্সাইল বা অক্ষীয় অমরাবিন্যাস দেখা যায়- জবা, টেঁড়স, রজনীগন্ধা।
- ◆ অগ্রকৃত ফলের উদাহরণ- আপেল, চালতা, ডুমুর।
- ◆ যৌগিক ফলের উদাহরণ- কাঁঠাল, আনারস।
- ◆ ক্যারিওঅপসিস ফলের উদাহরণ- গম, ধান।
- ◆ সরোসিস ফলের উদাহরণ- কাঁঠাল, আনারস।
- ◆ বেরি ফলের উদাহরণ- কলা, টমেটো।
- ◆ ড্রুপ ফলের উদাহরণ- আম, কুল, আমড়া, নারিকেল।
- ◆ মলাসেস থেকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়- আখ/ইক্ষু।
- ◆ বাংলাদেশে বাঁশ জন্মে- ২৮ প্রজাতির।
- ◆ লন তৈরি, রক্তপাত বন্ধ ও ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়- দুর্বাঘাস।
- ◆ রক্ত আমাশয় ও অশ্ব রোগের ভালো ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়- জবা।
- ◆ বহুমুত্র রোগে ব্যবহৃত হয়- টেঁড়স।
- ◆ শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়- কার্পাস তুলা।
- ◆ শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়- মরিচ ফুল বা লঙ্কা জবা।
- ◆ কাশফলের বৈজ্ঞানিক নাম- *Saccharum spontaneum*।
- ◆ সাইকাসে- কোরালডয়েড মূল পাওয়া যায়।
- ◆ দসাইকাসকে জীবন্ত- জীবশু বলা হয়।
- ◆ Liliopsida বলাতে বোঝায়- একবীজপত্রী উদ্ভিদকে।
- ◆ Malvaceae গোত্রের উদ্ভিদের পরাগধানী হলো- এক প্রকোষ্ঠী এবং বৃদ্ধাকার।
- ◆ Malvaceae গোত্রের রেণু হলো- বৃহৎ ও কটকিত।
- ◆ বাংলাদেশে *Cycas* উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে- চট্টগ্রামের বাড়িয়াডালা গ্রামে।
- ◆ আবৃতবীজী উদ্ভিদের শস্য হলো- টিপ্পয়েড।
- ◆ নগ্নবীজী উদ্ভিদের শস্য হলো- হ্যাঙ্গয়েড।
- ◆ মার্জিনাল (এক প্রান্তীয়) অমরা বিন্যাস গোত্র হলো- Fabaceae।
- ◆ Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের মঞ্জুরি- স্পাইকলেট।

- ◆ Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের পরাগধানী- সর্বমুখ।
- ◆ Malvaceae গোত্রের ফলের ধরণ- ক্যাপসিউল।
- ◆ Malvaceae গোত্রের দলের পুষ্পপত্র বিন্যাস- ভালভেট।
- ◆ শ্বাসকষ্টের ওষুধ তৈরী করা হয়- *Ephedra* থেকে।
- ◆ এপিক্যালিক্স বা উপবৃতি দেখা যায়- জবাতে।
- ◆ জবা ফুলের দলমণ্ডলের পুষ্পপত্র বিন্যাস হলো- টুইস্টেড বা পাকানো।
- ◆ Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের অমরাবিন্যাস- মূলীয়।
- ◆ পৃথিবীতে নগ্নবীজী উদ্ভিদে- ৮৩টি গণ ও ৭২১টি প্রজাতি রয়েছে।
- ◆ জালিকা শিরাবিন্যাস- দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।
- ◆ সমান্তরাল শিরাবিন্যাস- একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।
- ◆ কৃষ্ণচূড়া ফুলের পুষ্পবিন্যাস- ইম্ব্রিকেট।
- ◆ পুষ্পপুটের অংশ- টেপাল।
- ◆ বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো নগ্নবীজ উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা- ৫টি।
- ◆ পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম উদ্ভিদ- রেড উড বৃক্ষ।
- ◆ দ্বিবীজপত্রী ফুল সাধারণত- ট্রেটামেরাস বা পেটামেরাস।
- ◆ মিথোজীবিতা লক্ষ করা যায়- *Cycas pectinata*।
- ◆ *Eucalyptus* প্রায়- ৫০০ ফুট উঁচু হতে পারে।
- ◆ *Cycas* এর পাতা- সর্ববৃহৎ ও পক্ষল যৌগিক।
- ◆ বাংলাদেশ জাতীয় বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক হলো- *Mangifera indica*।
- ◆ একটি মাত্র বীজযুক্ত ফল হলো- ক্যারিঅপসিস।
- ◆ জাতীয় ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম- *Nymphaea nouchali*।
- ◆ *Cycas*- সর্পমণি নামে পরিচিত।
- ◆ *Cycas pectinata* উদ্ভিদের কচিপাতা- সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ◆ *Cycas* এর স্ট্রোবিলাস- একলিঙ্গিক।
- ◆ *Cycas revoluta* এর বীজ- খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ◆ বাংলাদেশে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বিলুপ্তপ্রায়- ৩ প্রকার।
- ◆ Malvaceae গোত্রের পুষ্টবকের গঠন হলো- একক গুচ্ছ।
- ◆ পৃথিবীব্যাপী মানুষের মূল খাদ্যের যোগান দেয়- ১৫টি প্রজাতি।
- ◆ Solanaceae গোত্রের অমরা বিন্যাস হলো- অক্ষীয়।
- ◆ ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত মূল হলো- রাইজোম।



ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

01. কোন উদ্ভিদের পুষ্প ট্রাইমেরাস প্রকৃতির?

[C. AG. 2021-22]

- A. জবা B. ধান
C. টমেটো D. টিউলিপ

Ⓐ Explanation/ বিভিন্ন গোত্রের ফুল:

গোত্রের নাম	ফুল
Liliaceae	ট্রাইমেরাস
Leguminosae (Fabaceae)	ট্রো বা পেটামেরাস
Cruciferae (Brassicaceae)	ট্রোমেরাস
Malvaceae	পেটামেরাস
Solanaceae	পেটামেরাস
Poaceae (Gramineae)	ট্রাইমেরাস

02. কোনটি Poaceae গোত্রের ফল?

[C. AG. 2021-22]

- A. সিলিকুয়া B. ক্যাপসিউল C. ক্যারিওপসিস D. লোমেস্টাস

Ⓐ Explanation/ বিভিন্ন গোত্রের ফল:

গোত্রের নাম	ফলের ধরন
Liliaceae	ক্যাপসিউল, কখনও বেরী
Leguminosae (Fabaceae)	লিগিউম বা লোমেস্টাম
Cruciferae (Brassicaceae)	সিলিকুয়া
Malvaceae	ক্যাপসিউল, বেরী
Solanaceae	বেরী, কখনও ক্যাপসিউল
Poaceae (Gramineae)	ক্যারিঅপসিস

03. কোন উদ্ভিদকে পামফার্ন বলা হয়?

[C. AG. 2020-21]

- A. Thuja B. Pteris
C. Gnetum D. Cycas

Ⓐ Explanation/ পামফার্ন ও সানফার্ন সম্পর্কিত তথ্য:

- পামফার্ন: *Cycas* স্পোরোফাইটিক, বৃক্ষ জাতীয় কাঠল উদ্ভিদ। এর কাণ্ড ও পাতা দেখতে অনেকটা পাম জাতীয় উদ্ভিদ বা ট্রি-ফার্নের কাণ্ড ও পাতার মতো, এ কারণে একে পামফার্ন বলা হয়।
- সানফার্ন: *Pteris* এর কিছু প্রজাতি খোলা ও উন্মুক্ত জায়গা অর্থাৎ সরাসরি রোদে জন্মাতে পছন্দ করে বলে এদের সানফার্ন বলা হয়।

04. ধানের ফুলে পুংরেণুতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?

[C. AG. 19-20]

- A. 2n B. 3n C. 4n D. n

Ⓐ Explanation/ ধান একটি আবৃতবীজী উদ্ভিদ যার পুংরেণুর ক্রোমোজোম $2n$ এবং শস্য $3n$ ।

05. পেয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম কি?

[C. AG. 19-20]

- A. *Allium cepa* B. *Triticum aestivum*
C. *Allium Sativum* D. *Oryza sativa*

Ⓐ Explanation/ বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
পেয়াজ	<i>Allium cepa</i>
গম	<i>Triticum aestivum</i>
রসুন	<i>Allium Sativum</i>
ধান	<i>Oryza sativa</i>

কোন উদ্ভিদে হাইড্রোজেন সায়ানাইড আছে?

[C. AG. 19-20]

- A. কসভা B. আখরোট C. জোয়ার D. সবকটিতে

Explanation Cassava (*Marchot escelelenta*) যা শর্করা ও সাণ্ড পিটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটিতে HCN পাওয়া যায়।

অমিষ সরবরাহকারী উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিবারের নাম কি?

[C. AG. 19-20]

- A. গ্রামিনী B. সোলানেসি C. মালভেসি D. ফ্যাবাসী

Explanation অমিষের পরিমাণে মাংস ও মাছ-এর সাথে ডাল তুলনীয়, তাই ডালকে 'গরিবের মাংস' বলা হয়। সব ডাল উৎপাদনকারী উদ্ভিদই Fabaceae (Leguminosae) পরিবারের Papilionoideae উপ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের মূলে নাইট্রোজেন স্থিতিকারক নডিউল ব্যাকটেরিয়ার সমাবেশ ঘটে এবং নডিউল সৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন সংরক্ষণ করে। ডাল জাতীয় উদ্ভিদের চাষ জমির জন্য হিতকর, কারণ এরা নাইট্রোজেন সংরক্ষণের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। Leguminosae বা Fabaceae ডাল জাতীয় গাছ আর ডাল থেকে আমরা অমিষ পাই। তাই এটি অমিষ জাতীয় গাছ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

চলজাতীয় ফসলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিবারের নাম কি?

[BAU. 2018-19]

- A. ক্রসিফেরি B. গ্রামিনী C. লিগিউমিনেসি D. সোলানেসি

Explanation বিভিন্ন উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিবার:

বর্তমান	পূর্বনাম	বৈশিষ্ট্য
Brassicaceae	Cruciferae	সবজী জাতীয় গাছ
Gramineae	Poaceae	ঘাস গোত্রীয়
Fabaceae	Leguminaceae	ডাল জাতীয় গাছ
Solanaceae		সবজি ও তামাক জাতীয়
Malvaceae		প্রধানত তন্তু জাতীয়
Liliaceae		মসলা ও ঔষধ জাতীয়

স্পাইক অব স্পাইকলেটের মত পুষ্পবিন্যাস কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

[BAU.2016-17]

- A. আম B. পেয়ারা
C. গম D. আলু

Explanation বিভিন্ন ধরনের পুষ্পবিন্যাস:

- ধানের পুষ্প বিন্যাস: পেনিকল অব স্পাইকলেট
- গমের পুষ্পবিন্যাস: স্পাইক

দেবী পাটের বৈজ্ঞানিক নাম-

[BAU 2003-04,15-16]

- A. *Hibiscus cannabinus* B. *Hibiscus altissima*
C. *Corchorus olitorius* D. *Corchorus capsularis*

Explanation About Jute:

বৈজ্ঞানিক নাম	উদ্ভিদের নাম
<i>Crotalaria juncea</i>	শন পাট
<i>Corchorus capsularis</i>	দেবী পাট
<i>Hibiscus subdariffa</i>	মেস্তা পাট
<i>Corchorus olitorius</i>	তোষা পাট

ধান গাছের ফুলে কয়টি পরাগধানী থাকে?

[BAU.2015-16]

- A. 3টি B. 4টি
C. 6টি D. 8টি

Explanation ধান গাছের ফুল স্পাইকলেট। একটি স্পাইকলেটে এক বা একাধিক পুষ্প থাকতে পারে। একটি এক পুষ্পক স্পাইকলেট এর পোড়ায় ২টি ডকনা অংশ থাকে যাদেরকে গুণ্য গুম বলে কারণ এদের কক্ষে কোন পুষ্প থাকে না। এর উপরে আরো দুটি গুম থাকে যার ১ম টিকে বলা হয় লেমা বা পুষ্প গুম আর উপরের টিকে বলা হয় প্যালিয়া।

মেস্তাপাটের বৈজ্ঞানিক নাম কি?

[BAU. shift-2015-16]

- A. *Hibiscus connabinus* B. *Gossypium herbaceum*
C. *Hibiscus rosa-sinensis* D. *Triticum austivum*

Ans A

জবা ফুলের পুষ্পপত্রবিন্যাস কি রকম?

[BAU. shift-2015-16]

- A. মুক্ত B. পাকানো C. প্রান্তস্পর্শী D. কুইনকানসিয়ান

Explanation জবার দলমণ্ডল এর পুষ্প পত্রবিন্যাস পাকানো, আর বৃত্তির প্রান্তস্পর্শী।

কোন উদ্ভিদে ফল হয় না, কেবল বীজ হয়?

[BAU. shift-2015-16]

- A. ধান B. উঁশ C. পাট D. সাইকাস

Explanation নগ্নবীজী উদ্ভিদে ফল হয়না, কেবল বীজ হয় সাইকাস নগ্নবীজী উদ্ভিদ এর অন্তর্গত। সাইকাস কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।

বেগুন গাছের পুংকেশরের সংখ্যা কত?

[BAU. 05-06, shift-2015-16]

- A. 4 B. 5 C. 6 D. অসংখ্য

Explanation Solanaceae পরিবারভুক্ত, পুংকেশর দলগত থাকে।

নিম্নের কোন উদ্ভিদে যৌগিক পত্র দেখা যায়?

[BAU. shift-2015-16]

- A. আম B. সজিনা C. জাম D. কাঁঠাল

Explanation বিভিন্ন পত্রের উদাহরণ:

- যৌগিক পত্র: নিম, লজ্জাবতি, সজিনা, কামিনী, গোলাপ প্রভৃতি।
- সরল পত্র: জবা, আম, জাম, কাঁঠাল।

হেসপেরিডিয়াম জাতীয় ফল কোনটি?

[BAU. 2006-07, 2014-15]

- A. কুমড়া B. টমেটো C. কদবেল D. কমলালেবু

Explanation বিভিন্ন প্রকার ফলের উদাহরণ:

ফলের ধরন	উদাহরণ
হেসপেরিডিয়াম	লেবু, কমলা
যৌগিক ফল	কাঁঠাল
ক্যাপসিউল	চৈতন্য
ক্যারিঅপসিস	ধান
বেরি	কলা
পেপে	শশা, কুমড়া
সেরোসিস	আনারস, কাঁঠাল
ড্রুপ	চেরি, জলপাই, নারিকেল

শশা গাছে কোন ধরনের পুংকেশর দেখা যায়?

[BAU.2014-15]

- A. সিনজেনিয়াস B. সিন্যাক্সাস C. পলিএন্ড্রাস D. সাইন্যাক্সাস

Explanation বিভিন্ন ধরনের পুংকেশর:

পুংকেশর	উদাহরণ
সিনজেনিয়াস	সূর্যমুখী
সিন্যাক্সাস	শশা, কুমড়া
পলিএন্ড্রাস	সাইট্রাস, লেবু

গম গাছের পুংকেশরের সংখ্যা কত?

[BAU.2013-14]

- A. 5 B. 6 C. 3 D. 12

Explanation গম একটি হেত্রাপ্রুয়েড। এর পুংকেশরের সংখ্যা = $6x$ ।

শীত প্রধান দেশে কোন গোত্রের উদ্ভিদ বেশী জন্মায়?

[BAU.2013-14]

- A. লিলিয়েসি B. ক্রসিফেরি
C. গ্রামিনী D. মালভেসি

Ans B

কোন গোত্রে এক প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস দেখা যায়?

[BAU.2013-14]

- A. লিগিউমিনোসি B. ক্রসিফেরি
C. লিলিয়েসি D. সোলানেসি

Ans A

ডুমুর গাছের যে বিশেষ ধরনে পুষ্প মঞ্জরী দেখা যায় তার নাম কী?

[BAU 2011-12; SyIAU 16-17, PSTU 15-16]

- A. সাইমোস B. সাইথিয়াম
C. হাইপ্যানথোডিয়াম D. ভারটিসিলিস্টার

Explanation হাইপ্যানথোডিয়াম: এ ক্ষেত্রে পুষ্পধারটি রসালো হয় এবং প্রসারিত হয়ে হৃদ্বার খোলের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। যেমন- ডুমুর।

জবা গাছের উপপত্রের নাম কী?

[BAU 2011-12]

- A. বৃন্ত লগ্ন B. আন্তবেষ্টক
C. মুক্ত পার্শ্বীয় D. কাভবেষ্টক

Ans C

17. যে ডাল খেলে ল্যাথাইরিজম রোগ হয় তার নাম কী? [BAU. 2002-03, 2011-12]

- A. মসুর B. খেসারী C. অহড়র D. সয়াবিন

(B) Explanation/ খেসারী ডাল: *Lathyrus sativus* (খেসারী) ডাল খেলে ল্যাথাইরিজম নামক পায়ের প্যারালাইসিস হয়। খেসারী ডালকে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সেই পানিটা ফেলে দিয়ে রান্না করলে ল্যাথাইরিজম হয় না। খেসারী ডালে, BOAA নামক অ্যামাইনো এসিড এর জন্য ল্যাথাইরিজম রোগ হয়।

18. নিচের কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য? [BAU 2008-09]

- A. পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল B. প্রধান মূলতন্ত্র
C. ফুল ট্রোমেরাস D. মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল **[Ans A]**

19. প্যাপিলিওনেসি উপ-পরিবারের পুংকেশরগুলো সজ্জিত থাকে কিভাবে? [BAU 2007-08]

- A. বহুগুচ্ছ B. দ্বিগুচ্ছ
C. মুক্ত D. কোনটিই নয় **[Ans B]**

20. ছুটী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি? [BAU 2006-07]

- A. *Nymphaea nouchali* B. *Solanum melongena*
C. *Psidium guajaba* D. *Zea mays* **[Ans D]**

21. লিগিউমিনোসি গোত্রকে উপগোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে কোন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে? [BAU 2006-07]

- A. পত্র বিন্যাস B. দলমন্ডলের পাপড়ী বিন্যাস
C. অমরা বিন্যাস D. কোনটিই নয়

(A) Explanation/ লিগিউমিনোসি গোত্রকে উপগোত্রে বিভক্ত করার বৈশিষ্ট্য: পত্র, পুষ্পবিন্যাস, পুষ্প, দলমন্ডলের এস্টিভেশন, পুংকেশর, ফল ইত্যাদি।

22. এক প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস দেখা যায় যে গাছে তার নাম- [BAU 2006-07, 2009-10]

- A. শসা B. পেঁপে C. শিম D. ডেড়স

(C) Explanation/ বিভিন্ন ধরনের অমরাবিন্যাস:

অমরাবিন্যাস	উদাহরণ	অমরাবিন্যাস	উদাহরণ
বহুপ্রান্তীয়	শসা, লাউ	মুক্তমধ্য	তুঁত, নুনিয়া শাক
অক্ষীয়	জবা	গাত্রীয়	শাপলা, পদ্মা
এক প্রান্তীয়	মটরশুটি, শিম	শীর্ষক	ধনিয়া, লাল পাতা

23. মালভেসি গোত্রের পুংকেশরগুলো যেভাবে সজ্জিত থাকে তার নাম: [BAU 06-07]

- A. মুক্ত B. বহুগুচ্ছ
C. দ্বিগুচ্ছ D. একগুচ্ছক **[Ans D]**

24. 'ধানকুনি' গাছের পাতার পত্রফলকের নাম- [BAU 2006-07]

- A. ডাফলাকার B. অর্ধ চন্দ্রাকার C. বৃত্তাকার D. বিনাকার **[Ans C]**

25. তৈল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ কোনটি? [BAU 2005-06]

- A. বাদাম B. তেঁতুল C. চালতা D. আমলকী

(A) Explanation/ বিভিন্ন তৈল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	তৈলের নাম
সরিষা	<i>Brassica napus</i>	Mustard
সয়াবিন	<i>Glycine max</i>	Soyabean
তিল	<i>Sesamum indicum</i>	Sesame
বাদাম	<i>Arachis hypogaea</i>	Ground nut
লিনসি	<i>Linum usitatissimum</i>	Linse
সূর্যমুখী	<i>Helianthus annuus</i>	Sunflower
নারকেল	<i>Cocos nucifera</i>	Coconut

26. নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [BAU 2005-06]

- A. দ্বিনিষেক হয় B. ফল দেখা যায়
C. ফ্লেগেমে সঙ্গীকোষ থাকে D. এন্ডোস্পার্ম হ্যাগ্রয়েড

(D) Explanation/ Characteristics of Gymnosperms:

- গর্ভাশয় হয় না বলে ফল হয় না।
- দ্বিনিষেক ঘটে না, তাই শাঁস হ্যাগ্রয়েড।
- জাইলেম টিস্যুতে ভেসেল নেই, ফ্লেগেমে টিস্যুতে সঙ্গীকোষ নেই। (Gnetum ব্যতীত)।
- গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড নেই।

- পরাগকণা সরাসরি ডিম্বকে পরিণত হয়।
- উদ্ভিদ স্পোরোফাইট এবং অসমরগণু প্রসু।
- বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে।

27. *Saccharum officinarum* কোন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম? [BAU 2005-06]

- A. বাঁশ B. ইক্ষু
C. সারগাম D. যব

(B) Explanation/ বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
বাঁশ	<i>Bambusa arundinacea</i>
জোয়ার/সারগাম	<i>Sorghum vulgare</i>
বার্লি/যব	<i>Hordeum vulgare</i>

28. এক প্রান্তীয় অমরাবিন্যাস কোন গোত্রের বৈশিষ্ট্য? [BAU 2005-06]

- A. ক্রুসিফেরি B. লিলিয়েসি
C. সোলানেসি D. লিগিউমিনোসি **[Ans I]**

29. পরজীবী উদ্ভিদ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহে বিশেষ ধরনের মূল প্রবিষ্ট করে বস রস শোষণ করে সেই ধরনের মূলের নাম কি? [BAU 2004-05]

- A. পরাশ্রয়ী মূল B. শোষক-মূল
C. আন্তীকরণ মূল D. সংলগ্নী মূল **[Ans I]**

30. কলা গাছের পুষ্প মঞ্জুরীতে রসিন নৌকাকৃতি মঞ্জুরী পত্রের নাম- [BAU 2004-05]

- A. আখেল B. স্প্যাডিক্স
C. রেসিম D. স্পাইক

(B) Explanation/ স্প্যাডিক্স: অপেক্ষাকৃত ছোট ও রসালো মঞ্জুরীতে অঙ্গুলী ও একলিঙ্গ পুষ্প উপস্থিত হয় এবং গোটা মঞ্জুরীটি এক বা একাধিক উষ্ণ ও বৃহদাকার চমসা নামক মঞ্জুরীপত্র দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন- কলা ও নারিকেল ইত্যাদি।

31. কাঁঠাল গাছের ফলের নাম কি? [BAU 2004-05]

- A. বেরী B. সরোসিস
C. ক্যাপসুল D. পড

(B) Explanation/ সরোসিস: স্পাইক, স্প্যাডিক্স বা ক্যাটকিন মঞ্জুরি হতে যে যৌগিক ফল সৃষ্টি হয় তাকে সরোসিস বলে। রসালো যৌগিক ফল। পুষ্প মঞ্জুরি সকল পুষ্প মিলে ফল গঠন করে। যেমন- আনারস, কাঁঠাল।

32. *Allium cepa* কোন গাছের বৈজ্ঞানিক নাম? [BAU 2004-05]

- A. পিঁয়াজ B. রসুন
C. কুমারী লতা D. ঘৃত কুমারী

(A) Explanation/ বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
রসুন	<i>Allium sativum</i>
কুমারী লতা	<i>Smilax macrophylla Roxb</i>
ঘৃতকুমারী	<i>Aloe barbadensis</i>

33. টমেটোর বৈজ্ঞানিক নাম কি? [BAU 2004-05]

- A. *Solanum tuberosum* B. *Lycopersicon lycopersicum*
C. *Nicotiana tabacum* D. *Solanum melongena*

(B) Explanation/ বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
আলু	<i>Solanum tuberosum</i>
তামাক	<i>Nicotiana tabacum</i>
বেগুন	<i>Solanum melongena</i>

34. সরিষা গাছের পুংকেশর এর নাম- [BAU 2004-05]

- A. সাইনোফায় B. পলিএন্ড্রাস
C. ট্রোডিনোমাস D. সিনএন্ড্রাস **[Ans C]**

35. বৃত্তাকার পরাগধারী পাওয়া যায় যে গোত্রে- [BAU 2003-04, PSTU. 2017-18]

- A. Cruciferae B. Leguminosae
C. Solanaceae D. Malvaceae **[Ans D]**

WORK

পাশ্চাত্যে বিদ্যমান বিটাজেহিন নামক বর্ণ কণিকা নিম্নের যে বর্ণের জন্য [BAU 2003-04]

B. হলুদ C. বেগুনি D. সাদা

Explanation/বিভিন্ন বর্ণ কণিকা:

বর্ণ	দায়ী বর্ণ কণিকা	বর্ণ	দায়ী বর্ণ কণিকা
হলুদ	জ্যাকোফিল	কমলা	ক্যারোটিন
লাল	লাইকোপিন (টমেটো)	লাল	অ্যান্থোসায়ানিন (জবা)
সবুজ	ক্লোরোফিল-এ	নীলাভ	সি-ফাইকোসায়ানিন

গাছে যে ধরনের গ্রাসেন্টেশন দেখা যায় তার নাম- [BAU 2003-04]

অক্ষীয় B. বেসাল C. প্যারাইটাল D. মার্জিনাল

Explanation/বিভিন্ন গোত্রের অমরাবিন্যাস:

গোত্র	অমরাবিন্যাস
লিগিয়েরিস, মালভেসি	অক্ষীয় (Axile)
ক্লিসিফেরি	বহুপ্রান্তীয় (Parietal)
লিগিউমিনোসি	এক প্রান্তীয় (Marginal)
সোলানেসি	অক্ষীয়, অমরা ক্ষীত এবং মাতৃঅক্ষের সাথে তির্যকভাবে অবস্থিত

বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম- [BAU 2003-04]

A. *Nymphaea nouchali* B. *Nymphaea stellata*
C. *Nymphaea rubra* D. *Nymphaea lotus*

Explanation/বিভিন্ন উদ্ভিদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী:

নাম	নাম/বৈজ্ঞানিক নাম
জাতীয় ফুল	শাপলা (<i>Nymphaea nouchali</i>)
জাতীয় ফল	কাঁঠাল (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)
জাতীয় বন	সুন্দরবন
ধান বাদ্য	ধান (<i>Oryza sativa</i>)

♂ $\frac{1}{2} \times 2$ দ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$ এই পুষ্প সংকেত দেখা যায় যে গাছে তার

নাম- [BAU 2003-04, CVASU 11-12]

A. সরিষা B. ধান C. গম D. মরিচ

Explanation/বিভিন্ন ফুলের পুষ্প সংকেত:

• পিয়াজ: ♂ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$ • জবা: ♂ $\frac{1}{2} \times 2$ উবু $\frac{1}{2} \times 2$ দ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$

• ধুতুরা: ♂ $\frac{1}{2} \times 2$ ব $\frac{1}{2} \times 2$ দ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$

• অপরাঞ্জিতা: মপ. + ♂ $\frac{1}{2} \times 2$ উবু $\frac{1}{2} \times 2$ দ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$

• কালকাসুন্দা: মপ. + ♂ $\frac{1}{2} \times 2$ ব $\frac{1}{2} \times 2$ দ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$

• লজ্জাবতী: মপ. + ♂ $\frac{1}{2} \times 2$ ব $\frac{1}{2} \times 2$ দ $\frac{1}{2} \times 2$ পুং $\frac{1}{2} \times 2$ গ $\frac{1}{2} \times 2$

বহুপ্রান্তীয় অমরা বিন্যাস দেখা যায় যে উদ্ভিদের পুষ্প- [BAU 2002-03]

A. *Hibiscus* sp. (জবা) B. *Portulaca* sp. (নুনিশাক)
C. *Lagenaria* sp. (লাউ) D. *Sesbania* sp. (বকফুল)

Explanation/বিভিন্ন ধরনের অমরাবিন্যাস:

অমরাবিন্যাস	উদাহরণ
বহুপ্রান্তীয়	শশা, লাউ
অক্ষীয়	জবা
এক প্রান্তীয়	মটরগুটি, শিম
মুক্তমধ্য	ভুঁত, নুনিয়া শাক
গাঠীয়	শাপলা, পদ্মা
শীর্ষক	ধনিয়া, লাল পাতা

41. সরিষা গাছে যে পুষ্পপত্র বিন্যাস দেখা যায় তার নাম- [BAU 2002-03]

A. মোড়ানো B. ডেক্সিলারি
C. কুইনকানসিয়াল D. ইমব্রিকেট

Ans C

42. টেডুস যে গোত্রের উদ্ভিদ- [BAU 2002-03]

A. লিওইমিনোসি B. মালভেসি
C. সোলানেসি D. ক্লিসিফেরি

Explanation/ Malvaceae গোত্রের উদ্ভিদের নাম মনে রাখার টিপস:

Mnemonic: মেসওয়াকে ঢের কাজ:

মে	স	কে	ঢের	কা	জ
মেস্তাপাট	স্থল পদ্ম	কেনাফ-পাট	টেডুস	কর্পাস তুলা	জবা

Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের নাম মনে রাখার টিপস:

Mnemonic: আখি আর ইমন দুই বার ভুয়া জাগলো না।

আখি আর	ইমন	দুই	বার	ভুয়া
আখ	ইফু	দুর্বাঘাস	বার্লি, বাঁশ	ভুট্টা

জা	গ	লো	না
ঝাড় ঘাস	গম	লেমন ঘাস	নলখাগড়া

43. কোন উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল? [BAU 2001-02, PSTU. 14-15]

A. ভুট্টা B. পেয়ারা
C. বেগুন D. শাপলা

Explanation/ একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাস জালিকাকার। তাই - পেয়ারা, বেগুন, শাপলার পাতার শিরাবিন্যাস জালিকাময়।

44. কোন উদ্ভিদের যৌগিক পত্র আছে? [BAU 2001-02]

A. জাম B. গোলাপ
C. শাপলা D. বেগুন

Explanation/ যৌগিক পত্র বিদ্যমান: গোলাপ, রাধাচূড়া, নিম, নারিকেল, লজ্জাবতী, কামিনী, কৃষ্ণচূড়া, সজিনা।

45. *Pisum sativum* কোনটি বৈজ্ঞানিক নাম? [BAU 2001-02]

A. সোনামুগ B. মসুর C. মটর D. ছোলা

Ans C

46. বেরী জাতীয় ফল কোন পরিবারের উদ্ভিদ পাওয়া যায়? [BAU 2000-01]

A. মালভেসি B. সোলানেসি C. ক্লিসিফেরি D. লিগিউমিনোসি

Explanation/ মালভেসি ও সোলানেসি উভয় গোত্রে বেরী জাতীয় ফল পাওয়া যায়।

47. *Solanum tuberosum* কোন গাছের বৈজ্ঞানিক নাম? [BAU 2000-01]

A. বেগুন B. গোল আলু C. টমেটো D. তামাক

Explanation/বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র:

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ফ্যামিলি
শাল	<i>Shorea robusta</i>	Dipterocarpaceae
সরিষা	<i>Brassica napus</i>	Cruciferae
সীম	<i>Lablab purpureus</i>	Leguminosae
স্থলপদ্ম	<i>Hibiscus mutabilis</i>	Malvaceae
গোল আলু	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae
টমেটো	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Solanaceae
বেগুন	<i>Solanum melongena</i>	Solanaceae
সয়াবিন	<i>Glycine max</i>	Leguminosae
পিয়াজ	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae
রসুন	<i>Allium sativum</i>	Liliaceae
মুলা	<i>Raphanus sativus</i>	Cruciferae
মটর	<i>Pisum sativum</i>	Leguminosae
টেডুস	<i>Abelmoschus esculentus</i>	Malvaceae
কৃষ্ণচূড়া	<i>Delonix regia</i>	Leguminosae

- ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦

কিছু ফুলের গর্ভপত্র কয়টি?

- A. একটি B. দুইটি C. তিনটি D. চারটি [SAU 2004-05] **Ans B**

একবীজপত্রী উদ্ভিদ গোত্র হল-

- A. সোলানেসি B. লিলিয়েসি C. মালভেসি D. ক্রুসিফেরি [SAU 2004-05] **Ans B**

Glycine max এর গোত্র কোনটি?

- A. সোলানেসি B. ক্রুসিফেরি C. লিগোমিনোসি D. মালভেসি [SAU 2003-04] **Ans C**

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

নিচের কোনটি Cycas এর মূল গঠনে অংশগ্রহণ করে? [SylIAU. 2018-19]

- A. Anabaena B. Escherichia Coli C. Nostoc D. A + C

(D) Explanation Anabaena এবং Nostoc, Cycas এর মূল গঠনে অংশ করে।

কৃষ্ণচূড়া ফুলের পুষ্প পরাবিন্যাস- [SylIAU. 2017-18]

- A. ভালভেট B. টুইস্টেড C. ইমব্রিকেট D. ভেল্লারী

(C) Explanation বিভিন্ন ধরনের এস্টিভেশন:

এস্টিভেশন	উদাহরণ
গুপন বা মুক্ত	গন্ধরাজের বৃতি, জবার উপবৃতি
ভালভেট বা প্রান্তস্পর্শী	জবা ফুলের বৃতি, আকন্দ, বাবলা ফুল, আতা
টুইস্টেড বা পাকানো	জবা ফুলের দলমন্ডল, করবী
ইমব্রিকেট	কৃষ্ণচূড়া, কালকাসুন্দা, বাদর লাঠি
টুইনকানসিয়াল	পেয়ারা, সরিষা, আকন্দ
ভেল্লারী	মটরগুটি, শিম, অতসী, অপরাঞ্জিতা

বেরি ফল কোনটি? [SylIAU.2016-17]

- A. লেবু B. তেঁতুল C. কলা D. আনারস

(C) Explanation বেরি ফলের উদাহরণ হল কলা ও টমেটো।

কোনটি ভাল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ? [SylIAU.2015-16]

- A. ভুট্টা B. সূর্যমুখী C. শিম D. জোয়ার

(D) Explanation সূর্যমুখী- তেল উৎপাদনকারী, ভুট্টা- শস্য উৎপাদনকারী, শিম- ভাল জাতীয় উদ্ভিদ।

একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকে শনাক্ত করার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [SylIAU.2015-16]

- A. বহু শাখাপ্রশাখার উপস্থিতি B. পুষ্প মঞ্জুরী C. পাতার শিরাতন্ত্র D. দুর্বল কান্ড

(C) Explanation একবীজপত্রী পাতা সরল একান্তর, লিগিউম বিশিষ্ট। দ্বিবীজপত্রী পাতা সরল জালিকা শিরাবিন্যাস যুক্ত সবুজক।

কুমড়ার গর্ভাশয় কোন প্রকৃতির? [SylIAU.2014-15]

- A. অধিগর্ভ B. উপ-অধিগর্ভ C. উপ-অধিগর্ভ D. অধোঃগর্ভ **Ans D**

নিচের কোন উদ্ভিদটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়? [SylIAU.2014-15]

- A. Albizia lebbeck B. Calamus rotang C. Rauvolfia serpentina D. Centella asiatica

(C) Explanation এটি একটি ভেষজ উদ্ভিদ। যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে।

Delonix regia কোনটির বৈজ্ঞানিক নাম? [SylIAU.2013-14]

- A. কৃষ্ণচূড়া B. অশোক C. অড়হড় D. কালকাসুন্দা **Ans A**

উভি হার্ব হলো- [SylIAU.2013-14]

- A. নরম লতা গাছ B. তোষা পাট C. কচু D. কচুরিপানা **Ans B**

আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [SylIAU. 2011-12]

- A. ফুলের গর্ভাশয় নাই B. দ্বি-নিষেক হয়না C. এন্ডোস্পার্ম ট্রিপ্লয়েড D. ফুল হয়না **Ans C**

11. কোনটি Malvaceae গোত্রের বৈশিষ্ট্য নয়? [SylIAU. 2011-12]

- A. অক্ষীয় অমরাবিন্যাস B. পরাগরেণু কণ্টকিত C. বৃত্তাংশ পাঁচটি D. ফল সিলিকুয়া **Ans D**

12. ট্রেডিউনেনাস বা দীর্ঘচতুষ্টয়ী পুংকেশর পাওয়া যায়- [SylIAU. 2010-11]

- A. Malvaceae B. Solanaceae C. Leguminosae D. Cruciferae **Ans D**

13. অর্কিড কোন ধরনের উদ্ভিদ? [SylIAU. 2009-10]

- A. পরভোজী B. পরাশ্রয়ী C. মৃতজীবি D. কোনটিই নয় **Ans B**

14. ফলের রং লাল হয়- [SylIAU. 2009-10]

- A. পেকটিনের জন্য B. ক্যারোটিনের জন্য C. জ্যান্থফিলের জন্য D. লাইকোপিনের জন্য **Ans D**

15. ঘৃত কুমারী কোন গোত্রের উদ্ভিদ? [SylIAU. 2009-10]

- A. Liliaceae B. Leguminosae C. Malvaceae D. Cruciferae **Ans A**

16. নিচের কোনটি Cruciferae গোত্রের উদ্ভিদ নয়? [SylIAU. 2009-10]

- A. মূলা B. বাধাকপি C. তুলা D. সরিষা **Ans C**

17. চা কোন গোত্রের উদ্ভিদ? [SylIAU. 2009-10]

- A. Malvaceae B. Cruciferae C. Liliaceae D. Theaceae **Ans D**

18. বৃতি ও দলকে যখন আকৃতি ও বর্ণে পৃথক করা যায় না, তখন তাকে বলা- [SylIAU. 2009-10]

- A. ক্যালিক্স B. পুষ্পপুট C. ষ্টাইল D. করোলা

(B) Explanation বৃতি ও দলমন্ডল সাধারণত পৃথক আকৃতির হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বৃতি ও দলমন্ডল পৃথক না হয়ে উভয়ই মিলিতভাবে একটি স্তবক গঠন করে, তখন তাকে পুষ্পপুট বা পেরিয়াস্ট বলে।

19. নীচের কোনটি একলিঙ্গ পুষ্প? [SylIAU. 2009-10]

- A. কুমড়া B. লাউ C. খেজুর D. সবকটি **Ans B**

20. কোন গোত্রের উদ্ভিদে বৃতি ও দল মিলিত হয়ে পুষ্পপুট তৈরী করে? [SylIAU. 2008-09]

- A. ক্রুসিফেরী B. লিলিয়েসী C. মালভেসী D. সোলানেসী **Ans B**

21. সরিষার তেলে যে ক্ষতিকারক এসিড থাকে তা হলো- [SylIAU. 2008-09]

- A. ফরমিন এসিড B. নাইট্রিক এসিড C. ইউরাসিক এসিড D. কোনটিই নয়

(C) Explanation সরিষার কাঁচা তেল অধিক ঝাওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে ক্ষতিকারক ইউরাসিক এসিড থাকে।

22. কোন ফল নিরস অবিদারী? [SylIAU. 2008-09]

- A. পেয়ারা B. বেগুন C. শাপলা D. ভুট্টা

(D) Explanation অবিদারী ফল: এই প্রকারের ফলের তৃক কখনো বিদীর্ণ হয় না। কারণ সাধারণত এদের একটি বীজ থাকে। ধান, গম, ভুট্টা, গাধা, সূর্যমুখী, সুপারী, মেহগনি, শাল ইত্যাদি অবিদারী ফল।

23. কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নয়? [SylIAU. 2008-09]

- A. ফুল ট্রাইমেরাস B. জালিকা শিরা বিন্যাস C. বীজপত্র একটি D. অস্থানিক গুচ্ছমূল **Ans B**

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

01. ধানের পুষ্পমঞ্জুরি নিচের কোনটি? [CVASU. 2018-19]

- A. রেসিম B. স্পাইকলেট C. স্প্যাডিক্স D. আবেল

(B) Explanation স্পাইকলেট- ধান, গম, ঘাস রেসিম- সরিষা

02. কোরালয়েড মূল দেখা যায়- [CVASU. 2018-19]

- A. Cycas B. Pinus C. Fern D. Gnetum

(A) Explanation Nostoc ও Anabaena এর অবস্থানের কারণে কোরালয়েড মূল দেখা যায়।

03. মুগডাল কোন গোত্রের উদ্ভিদ? [CVASU. 2018-19]
A. Poaceae B. Fabaceae C. Solanaceae D. Asteraceae

① Explanation/ বিভিন্ন গোত্রের উদ্ভিদের উদাহরণ:

গোত্রের নাম	উদাহরণ
Fabaceae (Leguminosae)	মসুর, মাসকলাই, খেসারি, ছোলা, মুগডাল, শিম, অড়হর
Solanaceae	ধুতুরা, গোল আলু, টমেটো, মরিচ, বেগুন, তামাক
Cruciferae	সরিষা, মূলা, ফুলকপি, বাধাকপি, সালগম
Poaceae	ধান, গম
Asteraceae	সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, জাবেরা
Malvaceae	জবা, ডেড়স, কার্পাসতুলা, কেনাফ- মেস্তা পাট, হল পদ্ম

04. 'লিগিউম' হলো নিম্নলিখিত পরিবারের ফল- [CVASU. 2017-18]
A. Poaceae B. Liliaceae C. Fabaceae D. Solanaceae

① Explanation/ লিগিউম জাতীয় ফলের উপর থেকে নিচে দুটি কপাটে বিদীর্ণ হয়। যেমন- মটর, শিম।

05. আবৃতবীজী উদ্ভিদের এভোস্পার্ম হলো- [CVASU. 2017-18]
A. হ্যাপ্রয়েড B. ডিপ্লয়েড
C. ট্রিপ্লয়েড D. টেট্রাপ্লয়েড

06. ঘনিষেক কোন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য? [CVASU. 2017-18]
A. ব্রায়োটাইটা B. টেরিডোফাইটা
C. জিমিনোস্পার্ম D. অ্যানজিওস্পার্ম

① Explanation/ আবৃতবীজী উদ্ভিদ বা অ্যানজিওস্পার্ম উদ্ভিদ ঘনিষেক ঘটে। তাই শস্য ট্রিপ্লয়েড।

07. স্পাইকলেট জাতীয় পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়- [CVASU. 2016-17]
A. Araceae-তে B. Arecaceae-তে
C. Poaceae-তে D. Malvaceae-তে

① Explanation/ Poaceae গণের উদ্ভিদ যেমন-ধান, গম, ঘাস এ স্পাইকলেট পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়।

08. ⊕..... এটি কোন গোত্রের পুষ্প সংকেত? [CVASU. 2015-16]
A. Malvaceae B. Brassicaceae C. Solanaceae D. Liliaceae

① Explanation/ ⊕ দ্বারা বহুত্রিসম পুষ্পের সাংকেতিক চিহ্ন বুঝায়, Malvaceae এর পুষ্প বহুত্রিসম যেমন: জবা।

09. কোন উদ্ভিদ তেল প্রদানকারী নয়? [CVASU. 2015-16, 2016-17]
A. সূর্যমুখী B. সরিষা
C. তিল D. মূলা

10. কোন পরিবারে ক্যাপিচলাম জাতীয় পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়- [CVASU. 2014-15]
A. Solanaceae B. Leguminosae
C. Rubiaceae D. Asteraceae

11. "⊕ ১ বৃ(৫) দ(৫) পুং গ(১)" কোন গোত্রের পুষ্প সংকেত? [CVASU. 2014-15; HSTU 15-16]
A. Malvaceae B. Cruciferae
C. Liliaceae D. Solanaceae

12. কোনটি ক্রসিফেরি গোত্রের উদ্ভিদ? [CVASU. 2014-15]
A. Allium sativum B. Pisum sativum
C. Raphanus sativus D. Salanum melongene

13. একটি উভলিঙ্গ ফুলের দুইটি অত্যাবশ্যক অংশ কি? [CVASU. 11-12]
A. বৃতি ও দল B. দল ও পুংকেশর
C. পুং কেশর ও গর্ভপত্র D. বোটা ও মঞ্জুরীপত্র

14. বাদাম (Peanut) গাছের ফুল মাটির উপরে কাভ/শাখায় ধরে কিন্তু পরিপক্ব ফল থাকে? [CVASU. 2011-12]
A. মাটির উপরে B. মাটির নীচে
C. মাঝখানে D. কাভ/শাখায় যেখানে ফুল ধরে সেখানে

15. ধুতরা (Datura metal) ফুলে কোন ধরনের অমরাবিন্যাস (Placentation)? [CVASU. 2010-11]
A. অক্ষীয় B. একপ্রান্তীয়
C. মুক্তমধ্য D. মূলীয়

16. কৃষ্ণচূড়া কোন গোত্রের উদ্ভিদ? [CVASU. 2009-10]
A. Leguminosae B. Solanaceae
C. Liliaceae D. Malvaceae

17. গো-খাদ্য প্রদানকারী উদ্ভিদগুলি সাধারণত কোন গোত্রের হয়ে থাকে? [CVASU. 2008-09]
A. Poaceae B. Palmae
C. Malvaceae D. Polygonaceae

18. আদা কোন ধরনের রূপান্তরিত কাভ? [CVASU. 2008-09]
A. টিউবার B. রাইজোম C. বাষ D. করম

19. আম কোন জাতীয় ফল? [CVASU. 2008-09]
A. ড্রুপ B. বেরী
C. ক্যাপসিউল D. ফেসএপরিডিয়াম

20. মান কচুর কাভ কোন প্রকার? [CVASU. 2007-08]
A. মূলকার B. ছিন্নস্থ
C. সাকার D. স্টোলন

21. Cycas কোন জাতীয় উদ্ভিদ? [CVASU. 2007-08]
A. শৈবাল B. ছত্রাক
C. ফার্ন D. নগ্নবীজী

22. যৌগিক পত্রের প্রতিটি ফলকে বলা হয়- [CVASU. 2007-08]
A. পত্রক B. উপপত্র
C. পুষ্পপত্র D. উভয়ই

23. ধান কোন গোত্রের উদ্ভিদ? [CVASU. 2007-08]
A. Poaceae B. Tiliaceae
C. Nymphaeaceae D. Cyperaceae

24. ভূ-গর্ভস্থ পরিবর্তিত কাভ নয় কোনটি? [CVASU. 2006-07]
A. আদা B. হলুদ C. আলু D. মূলা

25. সয়াবিন এর বৈজ্ঞানিক নাম কি? [CVASU. 2006-07]
A. Pisum sativum B. Dolichos lablab
C. Arachis hypogea D. Glycine max

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. গ্রামিনী গোত্রের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য কোনটি? [PSTU. 2018-19]
A. অমরা বিন্যাস অরীয় B. পুংকেশর অসংখ্যক
C. দলমণ্ডল পাকানো D. পরাগধানী সর্বমুখ

① Explanation/ গ্রামিনী গোত্রের বর্তমান নাম- পোয়েসি।
সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য- (i) কাভ সাধারণত নলাকার, মধ্যপর্ব ফাঁপা (ii) পত্রমূল কাভবেষ্টক এবং পাতা লিগিউল বিশিষ্ট (iii) পুষ্পবিন্যাস (মঞ্জুরী) স্পাইকলেট (spikelet) (iv) পরাগধানী সর্বমুখ (versatile) (v) গর্ভমুন্ড পালকের ন্যায় (vi) গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (vii) অমরাবিন্যাস মূলীয় (basal) (viii) ফল ক্যারিঅপসিস (caryopsis)।

02. যৌগিক ও অপ্রকৃত ফলের উদাহরণ কোনটি? [PSTU. 2018-19]
A. আম ও লিচু B. আতা ও কাঁঠাল
C. আপেল ও কলা D. কাঁঠাল ও আপেল

① Explanation/ ফলের প্রকারভেদ:

প্রকারভেদ	উদাহরণ
প্রকৃত (গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন)	আম, জাম, লিচু, পেয়ারা
অপ্রকৃত* (গর্ভাশয় ছাড়া অন্য থেকে উৎপন্ন)	চালতা, আপেল, ডুমুর, আনারস, কাঁঠাল
সরল (একটি পুষ্প হতে একটি ফল)	আম, শিম, মটর, ধান
গুচ্ছিত (একটি পুষ্প হতে একগুচ্ছ ফল)	স্বর্গচাঁপা, আতা, নয়নতারা

ডেক্সিলারী পুষ্টিবিন্যাস দেখা যায় কোনটিতে?

[PSTU. 2018-19]

- A. জবা B. ধান C. সরিষা D. মটরতুটি

① Explanation/ বিভিন্ন ধরনের এস্টিডেশন:

এস্টিডেশন	উদাহরণ
ওপেন বা মুক্ত	গন্ধরাজের বৃতি, জবার উপবৃতি
ভালভেট বা প্রান্তস্পর্শী	জবা ফুলের বৃতি, আকন্দ, বাবলা ফুল, আতা
টুইস্টেড বা পাকানো	জবা ফুলের দলমন্ডল, করবী
ইমব্রিকেট	কৃষ্ণচূড়া, কালকাসুন্দা, বাদর লাঠি
কুইনকানসিয়াল	পেয়ারা, সরিষা, আকন্দ
ডেক্সিলারি	মটরতুটি, শিম, অতসী, অপরাজিতা

কোন ধরনের ফল পাকলে নিচ থেকে উপর বরাবর ফেটে যায়? [PSTU. 2018-19]

- A. ক্যাপসুল B. সিলিকুয়া
C. ক্যারিওপসিস D. লিগিউম

② Explanation/ বিভিন্ন প্রকার ফল:

- ক্যাপসিউল: ফল উপর থেকে নিচে বহু কপাটে বিদীর্ণ হয়। যেমন- ধুতুরা।
- সিলিকুয়া: শুষ্ক বিদারী ফল যা পরিপক্ব হলে নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ ফেটে যায়। যেমন- সরিষা।
- ক্যারিওপসিস: ফল এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং একটি মাত্র বীজযুক্ত। যেমন- ধান।
- লিগিউম: ফল উপর থেকে নিচে দুটি কপাটে বিদীর্ণ হয়।

কোনটি লিউমিনোসী গোত্রের উদ্ভিদ?

[PSTU-G.2017-18]

- A. পাট B. মেস্তা পাট
C. শন পাট D. তুলা

[Ans B]

কোন উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার কাজ করে?

[PSTU.2015-16]

- A. ফার্ণ B. ফনিমনসা
C. আদা D. পাথরকুটি

③ Explanation/ আদা ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড।

বায়বীয় মূলের সাহায্যে বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে কেন উদ্ভিদ?

[PSTU.2014-15]

- A. রান্না B. স্বর্ণলতা
C. ফার্ণ D. শৈবাল

④ Explanation/ বায়বীয় মূল: কোনো কোনো পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের কতগুলো মূল বাতাসের মধ্যে ঝুলে থাকে। এসকল মূলের বাইরের দিকে কর্কের ন্যায় ভেলামেন ঢিলা থাকে যার দ্বারা বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে। যেমন- রান্না।

এক প্রান্তীয় অমরাবিন্যাস কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

[PSTU.2014-15]

- A. পিয়াজ B. বেগুন
C. ডেডুস D. মটর

[Ans D]

কোন উদ্ভিদের পাতায় সমান্তরাল শিরা বিন্যাস দেখা যায়?

[PSTU. 2014-15]

- A. ভুট্টা B. আম C. পেয়ারা D. বেগুন

[Ans A]

Glycine Max (L) কোন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম?

[PSTU. 2014-15]

- A. মসুর B. বেগুন
C. গোল আলু D. সয়াবিন

[Ans D]

দীর্ঘঘড়ী পুংকেশর কোথায় পাওয়া যায়?

[PSTU.2013-14]

- A. বাধাকপি B. আম
C. সরিষা D. শ্বেতদ্রোন

[Ans D]

কোন গোত্রের উদ্ভিদ থেকে ভোজ্য তেল উৎপন্ন হয়? [PSTU.2013-14; RU-G 13-14]

- A. লিলিয়সী B. ত্রুসিফেরী
C. মালভেসী D. সোলানেসী

[Ans B]

মটর গাছের পুষ্প বিন্যাসের নাম কি?

[PSTU. 2013-14]

- A. ভালভেট B. ইমব্রিকেট
C. ডেক্সিলারি D. টুইস্টেট

[Ans C]

14. বহু প্রান্তীয় অমরাবিন্যাস কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

[PSTU. 2011-12]

- A. পেঁপে B. মটরতুটি C. জবাফুল

D. আলু [Ans A]

15. কোন ফুলের দলের প্রকৃতি বহুপ্রতিসম?

[PSTU. 2011-12]

- A. গোলাপ B. সরিষা C. পলাশ

D. মূলা [Ans B]

16. জবার গর্ভাশয় কোন প্রকৃতির?

[PSTU. 2011-12]

- A. অধিগর্ভ B. উপ অধিগর্ভ
C. উপ অধিগর্ভ D. অধিগর্ভ

[Ans A]

17. ফুল হওয়া সত্ত্বেও কোনটিকে ফল বলে মনে হয়?

[PSTU. 2011-12]

- A. ডালিম B. আতা C. ডুমুর

D. কাঁঠাল [Ans C]

NETWORK PRIME TEST

01. 'লিগিউম' হলো নিম্নলিখিত পরিবারের ফল-

- A. Fabaceae B. Liliaceae C. Poaceae D. Solanaceae

02. Cycas গণের কোন প্রজাতিটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মায়?

- A. Cycas circinalis B. Cycas pectinata
C. Cycas revoluta D. Cycas elongata

03. নীচের কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ?

- A. কুমড়া B. ভুট্টা C. ছোলা D. সূর্যমুখী

04. বেরি ফল কোনটি?

- A. লেবু B. ডেউশ C. কলা D. আনারস

05. Hibiscus mutabilis কার বৈজ্ঞানিক নাম?

- A. জবা B. কার্পাস C. মেস্তাপাট D. স্থলপত্র

06. নগ্নবীজী উদ্ভিদের এন্ডোস্পার্ম-

- A. হ্যাগ্রয়েড B. ডিপ্লয়েড C. ট্রিপ্লয়েড D. কোনটি নয়

07. ধানে পুংকেশর কয়টি?

- A. ৯ টি B. ১০ টি C. ৬ টি D. ৭ টি

08. করিষ এক ধরনের-

- A. ফল B. ফুল C. পুষ্পমঞ্জুরী D. মুকুল

09. কোনটি Bulb এর উদাহরণ?

- A. আলু B. আদা C. পেঁয়াজ D. হলুদ

10. ⊕..... এটি কোন গোত্রের পুষ্প সংকেত?

[CVASU.2015-16]

- A. Malvaceae B. Brassicaceae
C. Solanaceae D. Liliaceae

11. Cycas উদ্ভিদের পুংরেণু পত্রের সরু মাথাকে কী বলে?

- A. অ্যাপোফাইসিস B. স্পোরোপ্সিয়াম
C. মেগাস্পোর D. মাইক্রোস্পোর

12. উপর থেকে নিচে দু'টি কপাটে বিদীর্ণ ফলকে বলা হয়-

- A. লিগিউম B. ক্যারিওপসিস C. ক্যাপসিউল D. সিলিকুয়া

13. এক প্রান্তীয় অমরাবিন্যাস পাওয়া যায়-

- A. পিয়াজ B. জবা C. সরিষা D. ছোলা

14. লেমা ও প্যালিয়া কিসের অংশ?

- A. পরাগধানী B. ডিম্বক C. পাতা D. স্পাইকলেট

15. একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফুলের প্রতিটি স্তবক-

- A. 1 এর গুণিতক B. 2 এর গুণিতক C. 3 এর গুণিতক D. 4 এর গুণিতক

OMR SHEET

01. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	12. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	13. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)	14. (A) (B) (C) (D)
04. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)	15. (A) (B) (C) (D)
05. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)	
	11. (A) (B) (C) (D)	

ANS ANALYSIS

15.C	14.D	13.D	12.A	11.A	10.A
09.C	08.C	07.C	06.A	05.D	04.C
03.B	02.B	01.A			

অধ্যায়
০৮

প্রথম পত্র

টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র TISSUE AND TISSUE SYSTEM



কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	ভাজক টিস্যু	★ ★
02	স্থায়ী টিস্যু	★ ★ ★
03	তৃকীয় টিস্যুতন্ত্র	★ ★
04	গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র	★ ★
05	ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র	★ ★ ★



টপিক জানোচনা

CONCEPT-01 টিস্যু



ITEM-01

ভাজক টিস্যু

ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য:

- ভাজক টিস্যুর কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন
- ভাজক টিস্যু অপরিণত কোষ দ্বারা গঠিত
- ক্ষত স্থান পূরণ ও ভাজক টিস্যুর কাজ

- ভাজক টিস্যু হতে স্থায়ী টিস্যু সৃষ্টি হয়।
- এই টিস্যুর কোষগুলো সেলুলোজ নির্মিত পাতলা কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট হয়
- কোষের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত বড় আকারে এবং সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে

ভাজক টিস্যুর শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি	উপশ্রেণী-বিভাগ	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উদাহরণ
উৎপত্তি অনুসারে	প্রোমেরিস্টেম বা প্রারম্ভিক (Promeristem)	মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগের শীর্ষদেশ
	প্রাইমারি ভাজক টিস্যু	মূল ও কাণ্ডের ভাজক টিস্যু
	সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু	কর্ক ক্যাম্বিয়াম, ইন্টার ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম
অবস্থান অনুসারে	শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু (প্রাইমারি টিস্যু)	মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল বা এদের শাখা-প্রশাখার শীর্ষ
	ইন্টারক্যালারি বা নিবেশিত (প্রাইমারি টিস্যু)	দুটি স্থায়ী টিস্যুর মাঝে অবস্থিত, পত্রমূল, ফুলের বোটা
	পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু (সেকেন্ডারি টিস্যু)	কর্ক ক্যাম্বিয়াম, ইন্টার ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম
কোষ বিভাজন অনুসারে	মাস ভাজক টিস্যু	জ্ঞপ, শস্য, মজ্জা ও কটেক্স
	প্রেট ভাজক টিস্যু	পাতা ও বর্ধিষ্ণু বহিঃত্বক
	রিব ভাজক টিস্যু	বর্ধিষ্ণু মূল ও কাণ্ডের মজ্জা
কাজ অনুসারে	প্রোটোডার্ম	ত্বক সৃষ্টিকারী টিস্যু
	প্রোক্যাম্বিয়াম	ক্যাম্বিয়াম, জাইলেম ও ফ্লোয়েম সৃষ্টিকারী টিস্যু
	গ্রাউন্ড মেরিস্টেম	কটেক্স, মজ্জা ও মজ্জা রশ্মি সৃষ্টিকারী টিস্যু

Preparation of Tissue and Tissue System for effective delivery



ITEM-02

স্থায়ী টিস্যু

স্থায়ী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য:

- কোষগুলো সাধারণত বিভাজনে অক্ষম
- মৃত কোষ প্রোটোপ্লাজমবিহীন

- টিস্যুতে দূরকম কোষ থাকে- জীবিত ও মৃত
- খাদ্য তৈরি, পানি ও খাদ্য পরিবহন, পানি ও খাদ্য সংরক্ষণ, দৃঢ়তা প্রদান।

স্থায়ী টিস্যুর শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি	প্রধান শ্রেণিবিভাগ	উপ-শ্রেণিবিভাগ	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
সরল টিস্যু	প্যারেনকাইমা	ক্রোরেনকাইমা	পাতার মেসোফিল
		অ্যারেনকাইমা	জলজ উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা
		ইডিওব্লাস্ট	কচুপাতার র‍্যাফাইড এবং বট পাতার সিস্টোলিথ
		স্টিলেট প্যারেনকাইমা	তারকাকৃতির প্যারেনকাইমা
	কোলেনকাইমা	অ্যাপ্লুর বা কোণাকার কুমড়া, লাউ, ডালিয়ার কাণ্ডে	ল্যাকুনেট বা কুপাকার আকন্দ, হাতিতুড়-এর পত্রবৃন্তে
		ল্যামেলার বা স্তরীভূত ঘেঁটু গাছের কাণ্ডে	
	স্ক্লেরেনকাইমা	স্ক্লেরেনকাইমা ফাইবার	এরা উড ফাইবার বা জাইলেম ফাইবার এবং ফ্লোয়েম, পেরিসাইকেল ও কটেক্স ফাইবার বা বাস্ট ফাইবার (পাটের আঁশ)
		স্ক্লেরাইড	এদের স্টোন কোষ বলা হয়। নরম টিস্যুতে স্ক্লেরাইড থাকলে তাকে স্ক্লেরোটিক কোষ বলে

(Ref: হুসান সাব, আজিদুর সাব, জিহেৎলু সাব সাব)

নাম	উদাহরণ	নাম	উদাহরণ
একসারি কোষ	বট, অশ্বথ, পাকুর	মাইরোসিন কোষ	সরিষা গোম্বার উদ্ভিদ
তিনসারি কোষ	করবী	বুলিফর্ম কোষ	গম, ভুট্টা, আখ
লিঙ্গনিহন জমা হয়	Cycas, Pinus, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ	কর্ক ও সিলিকা কোষ	ঘাস ও নলখাগড়া

- এগুলো উদ্ভিদকে তৃণভোজী প্রাণীর কবল হতে রক্ষা করে।
- রোম বা ট্রাইকোম: মূলরোম এককোষী, কিউটিকল বিবর্জিত এবং কাভরোম বহুকোষী, কিউটিকলযুক্ত ও শাখাশ্চিত। কার্পাস তুলার বীজতুক উদ্ভূত রোমগুলো আঁশের মত ও তুলার তন্তু গঠন করে।
- শব্দ: বহুকোষী গ্রন্থিবিহীন, গুরু ও চ্যাপ্টা প্রকৃতির উপাদান।
- কোলেটার্স/গ্রন্থিরোম/পিড়কা: বহুকোষী বৃন্ত ও মন্তকসহ বিশেষায়িত ট্রাইকোম। এখান থেকে আঠালো পদার্থ ক্ষরিত হয়। পতঙ্গভুক্ত উদ্ভিদের পরিপাক গ্রন্থি এ ধরনের ট্রাইকোম বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
- পানিথলি: বরফ উদ্ভিদ (*Mesembryanthemum crystallinum*) এ পানিথলি দেখা যায়।
- দংশন রোম (Stinging hairs): এককোষী, লম্বা, সূচালো, বিষাক্ত রসে পূর্ণ ট্রাইকোম। বিছটি, অগ্নিচতরা, আলকশিতে এ রোম পাওয়া যায়।

- রক্ষীকোষ পার্শ্ববর্তী বিবেশায়িত ত্বকীয় কোষ কে সহকারী কোষ বলে।
- দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির রক্ষীকোষ বেষ্টিত ছিদ্র।
- পায়রকুচি গোত্রের উদ্ভিদে রায়ে পত্ররক্ত খোলা থাকে, দিনে বন্ধ থাকে।
- শ্বসনের সময় O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ।
- প্রাশ্বেননের সাহায্যে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করা।
- সালোকসংশ্লেষণের সময় CO_2 গ্রহণ ও O_2 ত্যাগ।
- স্টোম্যাটার নিচে বায়ু কুঠরী থাকে। একে সাব-স্টোম্যাটাল বায়ুকুঠরী বা শ্বাসকুঠরী বলে।

- বিশেষ ধরনের পানি নির্মোচন করে।
- হাইড্রোথোড ঘন সাইটোপ্লাজমপূর্ণ ক্ষুদ্রাকার, পাতলা প্রাচীরযুক্ত ও প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত হয়।
- টমেটো, ঘাস, পিনুলা, কচু পাতায় হাইড্রোথোড দেখা যায়।
- হাইড্রোথোড দিবে তরল পানি বের হয়ে যাওয়াতে গাটেশন বলে।

◆ গ্রাউন্ড টিস্যুতত্ত্ব:

অঞ্চলের নাম	বিভিন্ন অংশের নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
বহিঃস্থিলীয় অঞ্চল (Extrastelar region)	অধঃত্বক (Hypodermis)	কোলেনকাইমা (দ্বিবীজপত্রী) বা ক্লোরেনকাইমা (একবীজপত্রী) টিস্যু দ্বারা গঠিত
	কর্টেক্স (Cortex)	প্যারেনকাইমা টিস্যু দ্বারা গঠিত বহু স্তরবিশিষ্ট যা মূলের সাহায্যে পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করে এবং কাণ্ডকে দৃঢ়তা প্রদান করে ও সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে
	অন্তঃত্বক (Endodermis)	মূলে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে (কাণ্ডে শ্বেতসার আবরণ থাকে) অন্তঃত্বক বিদ্যমান যা খাদ্য সঞ্চয়, মূলজ চাপ ও বাধের মতো কাজ করে। মূলের অন্তঃত্বকীয় কোষের প্রস্থ ও পার্শ্বপ্রাচীর সুবেরিন ও লিগনিন যুক্ত হয়ে সুরু ফিতার মতো যে বেট্টনি সৃষ্টি করে তাকে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ (বিজ্ঞানী ক্যাসপেরি মূলের অন্তঃত্বকে এটি লক্ষ করেন) বলে
অন্তঃস্থিলীয় অঞ্চল (Intrastelar region)	পেরিসাইকল বা পরিচক্র (Pericycle)	ক্লোরেনকাইমা টিস্যু ফ্লোয়েমের মাথায় অবস্থান করলে তাকে হার্ড বাস্ট বা শুচ্ছ টুপি বলে। পানি সঞ্চয় ও দৃঢ়তা প্রদান এর কাজ
	মজ্জা বা মেডুলা (Pith or Medulla)	খাদ্য সঞ্চয় মজ্জার প্রধান কাজ
	মজ্জা রশ্মি (Medullary ray)	পানীয় খাদ্য পরিবহন করে এবং প্রয়োজনীয় গৌণ টিস্যু সৃষ্টি করে

(Ref: হাসান স্যার, আজিবুর স্যার, বিলকিস বানু মাকসুম, আজিজুল স্যার)

◆ ভাস্কুলার টিস্যুতত্ত্ব:

প্রধান শ্রেণীবিভাগ	উপ-শ্রেণী বিভাগ	উদাহরণ
সংযুক্ত (জাইলেম ও ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধে একই গুচ্ছে অবস্থান করে)	সমপার্শ্বীয়	মুক্ত (জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ক্যাম্বিয়াম উপস্থিত)
		বদ্ধ (জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ক্যাম্বিয়াম অনুপস্থিত)
	সমদ্বিপার্শ্বীয় (মাঝখানে জাইলেম এর উভয় পাশে ফ্লোয়েম বিদ্যমান)	সকল প্রকার একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড
অরীয় (জাইলেম ও ফ্লোয়েম ভিন্ন ভিন্ন বাডল সৃষ্টি করে)		লাউ, কুমড়া, শসা
কেন্দ্রিক (টেরিডোকাইট)	হ্যাড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রিক	Pteris, Lycopodium, Selaginella, Psilotum
	লেটোসেন্ট্রিক বা ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক	Dracaena, Yucca

(Ref: হাসান স্যার, আজিবুর স্যার, বিলকিস বানু মাকসুম, আজিজুল স্যার)



VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- ◆ ফার্ন, জলজ উদ্ভিদ এবং ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদের তৃকীয় কোষগুলোতে ক্রোরোপ্লাস্ট থাকে।
- ◆ ফুলের পাপড়ি ও ফলত্বকে অ্যাসোসায়ানিন পিগমেন্ট থাকে।
- ◆ গম, ভুট্টা, আঁখ ইত্যাদি গাছের পাতার ত্বকে বুলিফর্ম কোষ থাকে।
- ◆ সমাপৃষ্ঠীয় পাতার উভয়ত্বকে, জলজ ভাসমান উদ্ভিদের পাতার উর্ধ্বত্বকে পত্ররক্ত থাকে।
- ◆ মরুজ উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডে লুকানো পত্ররক্ত থাকে।
- ◆ এন্ডোডার্মিসের কোষগুলোর প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়।
- ◆ পিথ সাধারণত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত।
- ◆ একই উৎস থেকে সৃষ্ট, একই ধরনের কাজ সম্পন্নকারী সমধর্মী একটি অবিচ্ছিন্ন কোষগুচ্ছকে বলা হয় টিস্যু বা কোষকলা।
- ◆ বিষমপৃষ্ঠীয় পাতাগুলোতে মেসোফিল প্যালিসেড ও স্পঞ্জ নামক দুটি অঞ্চলে বিভক্ত।
- ◆ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এপিডার্মিস একাধিক সারি কোষে গঠিত হতে পারে, যেমন- বট, অশ্বথ, পাকুর ইত্যাদি গাছের পাতায়।
- ◆ মূলের জাইলেম বহিঃস্থল প্রকার (Exarch)।
- ◆ কাণ্ডের জাইলেম অন্তঃস্থ প্রকার (Endarch)।
- ◆ মূলে অধঃত্বক থাকে না, কাণ্ডে থাকে।
- ◆ পাটের আঁশ- বাস্ট ফাইবার।
- ◆ একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ ভাস্কুলার বাডল।
- ◆ মূলের বহিরাবরণকে এপিড্রেমা বলে।
- ◆ মূলের পরিবহন কলাগুচ্ছ হল- অরীয়।
- ◆ পাটের আঁশ হল- ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা।
- ◆ ভাজক টিস্যুর যে কোষ বিভাজিত হয়ে পরিবহন টিস্যু তৈরি করে তাকে বলে- প্রোক্যাম্বিয়াম।
- ◆ একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্যবর্তী প্যারেনকাইমা কোষের স্তরকে বলে- মজ্জা রশ্মি।
- ◆ বহিঃস্থিলীয় অঞ্চল- কর্টেক্স।
- ◆ জাইলেম টিস্যু প্রধানত- 4 ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত।
- ◆ জাইলেম টিস্যুর জীবিত উপাদান- জাইলেম প্যারেনকাইমা।

- ◆ ভাজক টিস্যুর অপর নাম- মেরিস্টেম।
- ◆ ভাজক টিস্যুর উৎপত্তি হয়- প্রোমেরিস্টেম হতে।
- ◆ প্রোট ভাজক টিস্যুর উদাহরণ- পাতা, বর্ষিষ্ণু বহিঃত্বক।
- ◆ সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যুর উদাহরণ- কর্ক ক্যাম্বিয়াম, ইন্টারফ্যানসিকুলার ক্যাম্বিয়াম।
- ◆ উদ্ভিদ অঙ্গ ঘনত্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ- মাস ভাজক টিস্যু।
- ◆ উদ্ভিদের ত্বক সৃষ্টি করে- প্রোটোডার্ম।
- ◆ লিগনিন জমা হয়- Cycas pinus ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ।
- ◆ ফুলের পাপড়ি ও ফলত্বকে থাকে- অ্যাসোসায়ানিন।
- ◆ দংশক রোমের উদাহরণ- বিছুটি, আলকুশি ও অগ্নিচুতরা।
- ◆ প্রাথমিক হার কমায়- শব্দ (বহুকোষী)।
- ◆ লুকানো পত্ররক্ত থাকে- মরুজ উদ্ভিদে।
- ◆ হাইডাথোডের উদাহরণ- ঘাস, কচু, টমেটো।
- ◆ গ্রাউন্ড টিস্যুতত্ত্বের উৎপত্তি হয়- পেরিড্রেম ভাজক টিস্যু।
- ◆ ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ থাকে- মূলের অন্তঃত্বকে।
- ◆ প্যাসেজ সেল/ পারনকোষ দেখা যায়- অন্তঃত্বকে।
- ◆ বাঁধ (dam) এর মতো কাজ করে- অন্তঃত্বক।
- ◆ পেরিসাইকল/পরিচক্র দেখা যায়- কুমড়া ও কুমারিকা কাণ্ডে।
- ◆ মজ্জা/মেডুলা/পিথ পাওয়া যায়- শুধুমাত্র দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে।
- ◆ নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে- পরিচক্র।
- ◆ পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে বলা হয়- মেসোফিল।
- ◆ উদ্ভিদের মজ্জা বিনষ্ট হয়ে গহ্বের সৃষ্টি হয়- Cucurbita maxima।
- ◆ ভাস্কুলার টিস্যুতত্ত্বের সৃষ্টি হয়- প্রোক্যাম্বিয়াম।
- ◆ বাস্ট ফাইবার হল- পাটের আঁশ।
- ◆ জাইলেম কেন্দ্রিক হল- Pteris, Lycopodium, Selaginella।
- ◆ ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক হল- Dracaena, Yucca।
- ◆ জাইলেম টিস্যুর কোষসমূহ- ট্রাকিড, ভেসেল, প্যারেনকাইমা কোষ, ফাইবার।

ফ্রোয়েম টিস্যুর কোষসমূহ- সিডনল, ফাইবার, প্যারেনকাইমা কোষ, কর্ক প্যারেনকাইমা।
সমীপাধীয়া ভাস্কুলার বাডল দেখা যায়- লাউ, কুমড়া, শসা।
উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ক্ষতস্থান পূরণ করে- সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু।
করুণ মূলে দেখা যায়- রিব ভাজক টিস্যু।
হাইডাথোডের প্যারেনকাইমা টিস্যু - এপিথেম।
পনিখলি বিন্যাস থাকে- বরফ উদ্ভিদে।
করুণ ভাসমান উদ্ভিদের পত্ররক্ত থাকে- উর্ধ্বতুকে।
হাইসোজেনাস গহ্বর সৃষ্টি হয়- ভূগাতে।
জাইলেম টিস্যুর সজীব উপাদান হল- জাইলেম প্যারেনকাইমা।
সেকেন্ডারী ফ্রোয়েমে অবস্থিত ফাইবারকে বলা হয়- বাস্ট ফাইবার।
দ্বিবীজপত্রী মূলে জাইলেম ও ফ্রোয়েম বাডলের সংখ্যা হলো- ২-৪টি।
ত্রিবীজপত্রী মূলে জাইলেম ও ফ্রোয়েম বাডলের সংখ্যা- ৬ এর অধিক।
ত্রিবীজপত্রী উদ্ভিদে গ্রাউন্ড টিস্যুতে বিন্যাস থাকে-প্রোক্যামিয়াম।
বহুসূত্রীয় প্যারেনকাইমা বলা হয়- অ্যারেনকাইমা।
ফ্রোয়েম থাকে- ফ্রোয়েমে।
নিজস্ব কাঠের মূল উৎস হল- সেকেন্ডারী জাইলেম।
জাইলেম টিস্যুর উপাদান হলো- ৪টি।
হাইডাথোড দিয়ে তরল পানি বের হয়ে যাওয়ায় বলা হয়- গাটেশন।

- পত্ররক্ত বন্ধ ও খোলা নিয়ন্ত্রণ করে- রক্ষীকোষ।
- প্যারেনকাইমা কোষের আকৃতি- গোলাকার।
- অবস্থান অনুসারে ভাজক টিস্যু- ৩ প্রকার।
- পাতার তৈরীকৃত খাদ্য গাছের সব অংশে পৌছে দেয়- ফ্রোয়েম।
- উদ্ভিদের পানি সরবরাহ করে- জাইলেম।
- টিস্যু মূল বা কাণ্ডের পার্শ্ব বৃদ্ধি ঘটায়- সেকেন্ডারী ভাজক টিস্যু।
- উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে- ক্যামিয়াম।
- উদ্ভিদের সেকেন্ডারী বৃদ্ধিকালে গ্যাস বিনিময় মাধ্যম ব্যবহৃত হয়- লেন্টিসেল।
- উদ্ভিদের তৃক সৃষ্টিকারী ভাজক টিস্যুকে বলা হয়- প্রোটোডার্ম।
- পিথের কাজ হলো- খাদ্য সঞ্চয় করা।
- মূলজ চাপ নিয়ন্ত্রণ করে- এন্ডোডার্মিস।
- বহুকোষী ট্রাইকোমকে বলা হয়- কোলোটার্স (গ্রন্থিকোষ)।
- ক্ষরণকারী টিস্যু দুই প্রকার- (i) তরুক্ষীর টিস্যু এবং (ii) গ্রন্থি টিস্যু।
- যে টিস্যুর কোষ বিভাজনে অক্ষম তাকে- স্থায়ী টিস্যু বলে।
- পুষ্পক উদ্ভিদের মূলের বাডল হলো- অরীয়।
- জাইলেম ও ফ্রোয়েম টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত টিস্যু হলো- জটিল টিস্যু।
- কিউটিন বা সুবেরিনের পুরু স্তরকে- কিউটিকল বলে।
- অবস্থানের উপর ভিত্তি করে হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বাডল- ২ প্রকার।
- পরিপক্ক পর্যায়ে নিউক্লিয়াস থাকে না- সিডনলে।



ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

১. পাতার পানি-পত্ররক্তের অবস্থান- [C. AG. 2022-23]
A. উর্ধ্ব তৃক B. নিম্নতৃক
C. পত্রবৃত্ত D. কিনারা

(D) Explanation/ হাইডাথোড বা পানি পত্ররক্ত-

- টমেটো, ঘাস, পিঁপুলা, কুমড়া পাতার কিনারায় প্রচণ্ড গরমের দিনে হাইডাথোড দেখা যায়।
- হাইডাথোড দিয়ে তরল পানি বের হয়ে যাওয়ায় গাটেশন বলে।
- হাইডাথোড হতে ক্ষরিত পানিতে বিভিন্ন খনিজ লবণ, শর্করা ও অন্যান্য জৈব পদার্থ দ্রবীভূত থাকে।
- হাইডাথোড ঘন সাইটোপ্লাজমপূর্ণ, ক্ষুদ্রাকার, পাতলা প্রাচীরযুক্ত ও প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।
- প্যারেনকাইমা টিস্যু এপিথেলিয়াম নামে পরিচিত।

২. ফুঁ কাণ্ডের ভাস্কুলার বাডলে কোনটি অনুপস্থিত? [C. AG. 2021-22]
A. এপিডার্মিস B. জাইলেম
C. ফ্রোয়েম D. ক্যামিয়াম

(D) Explanation/ সমপার্শ্বীয় বাডলের জাইলেম ও ফ্রোয়েমের মধ্যখানে ক্যামিয়াম না থাকলে তাকে বন্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাডল বলে। যেমন: একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ভাস্কুলার বাডল। ভুট্টা, গম, ধান ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

৩. পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে কী বলে? [C. AG. 2021-22]
A. কার্টেক্স B. মেসোফিল
C. পেরিসাইকেল D. পিথ

(B) Explanation/ পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে মেসোফিল বলে। এটি অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট ও পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। বিষমপৃষ্ঠ পাতায় মেসোফিল প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কোষ স্তরে বিভক্ত থাকে।

৪. মূলের বহিরাবরণের নাম কী? [C. AG. 2021-22]
A. এপিডার্মিস B. এপিড্রমা
C. হাইপোডার্মিস D. কার্টেক্স

(B) Explanation/ মূলের বহিরাবরণকে এপিড্রমা ও কাণ্ডের বহিরাবরণকে এপিডার্মিস বলে।

৫. সমপার্শ্বীয় মুক্ত ভাস্কুলার বাডল পাওয়া যায়- [C. AG. 2020-21]
A. একবীজপত্রী কাণ্ডে B. একবীজপত্রী মূলে
C. দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে D. পাতায়

Explanation/ ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র:

প্রধান শ্রেণীবিভাগ	উপ-শ্রেণী বিভাগ	উদাহরণ
সংযুক্ত	সমপার্শ্বীয়	মুক্ত
	বন্ধ	দ্বিবীজপত্রী (কুমড়া জাতীয় কাণ্ড ব্যতীত) ও নয়বীজী উদ্ভিদের কাণ্ডে
অরীয়	সমদ্বিপার্শ্বীয়	লাউ, কুমড়া, শসা
	-	পুষ্পক উদ্ভিদের মূল
কেন্দ্রীক	হ্যাড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রিক	<i>Pteris, Lycopodium, Selaginella, Psilotum</i>
	লেণ্টোসেন্ট্রিক বা ফ্রোয়েম কেন্দ্রিক	<i>Dracaena, Yucca</i>

০৬. কোনটি নিউক্লিয়াসবিহীন জীবিত কোষ? [C. AG. 2020-21]
A. সঙ্গী কোষ B. সীত কোষ
C. ফ্রোয়েম প্যারেনকাইমা D. জাইলেম প্যারেনকাইমা

(B) Explanation/ জটিল টিস্যুর জাইলেম ও ফ্রোয়েম সম্পর্কিত তথ্য:

শ্রেণী	উপাদান	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
জাইলেম	ট্রাকিড	এর প্রাচীর সূচালো, মৃত, জাইলেমের প্রধান উপাদান
	ভেসেল বা ট্রাকিয়া	পরিণত অবস্থায় এরা মৃত
	জাইলেম ফাইবার	এদের প্রাচীর লিগনিন যুক্ত, এদের উড ফাইবার বলা হয়
	জাইলেম প্যারেনকাইমা	জাইলেম টিস্যুর একমাত্র এই কোষগুলোই জীবিত। এদেরকে উড প্যারেনকাইমাও বলে
ফ্রোয়েম	সীডনল বা সীত কোষ	এদের কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না
	সঙ্গীকোষ	বৃহৎ নিউক্লিয়াস থাকে
	ফ্রোয়েম ফাইবার	এরা বাস্ট ফাইবার নামে পরিচিত (পাটের আঁশ)
	ফ্রোয়েম প্যারেনকাইমা	ফ্রোয়েমের একমাত্র মৃত কোষ এরা মূলত সাধারণ প্যারেনকাইমা

07. বর্ষবলয় উৎপন্ন হয় কোন কারণে-

[C. AG. 2020-21]

- A. উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির জন্য B. কর্ক ক্যাথিয়াম সৃষ্টির জন্য
C. লেন্টিসেল তৈরির জন্য D. কটেক্স বৃদ্ধির জন্য

① Explanation/ দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের ষাভাবিক সেকেন্ডারী/গৌণ বৃদ্ধি:

অন্তঃস্টিলায় বৃদ্ধি	বহিঃস্টিলায় বৃদ্ধি
- ক্যাথিয়াম বলয় তৈরী - সেকেন্ডারী জাইলেম বা ফ্লোয়েম তৈরী - সেকেন্ডারী মজ্জা রশ্মির সৃষ্টি - বর্ষবলয় তৈরী - সার কাঠ/অসার কাঠ সৃষ্টি।	- কর্ক ক্যাথিয়াম সৃষ্টি - কর্ক ও সেকেন্ডারী কটেক্স তৈরী - বাকলের সৃষ্টি - লেন্টিসেল তৈরী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি কোন পথে উদ্ভিদ দেহ থেকে তরল আকারে বের হয়ে যায়?

[BAU 2017-18]

- A. স্টোমাটা B. লেন্টিসেল
C. হাইডাথোড D. এপিডার্মিস

① Explanation/ টিস্যুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ:

- স্টোমাটা: পাতার (এবং কচি কাণ্ডের) উর্ধ্ব ও নিম্ন ত্বকে (এপিডার্মিসে) অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম রন্ধকে পত্ররন্ধ বা স্টোমাটা বলে।
- লেন্টিসেল: উদ্ভিদের সেকেন্ডারী বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় কাণ্ডের কর্ক টিস্যুর স্থানে সামান্য ফেটে গিয়ে লেন্টিসেলের সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেল দিয়ে কিছু কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়।
- এপিডার্মিস: ত্বকের উপরের অংশকে এপিডার্মিস বলে।

02. ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত প্যারেনকাইমাকে কী বলা হয়?

[BAU 2016-17]

- A. ক্লোরোফিল B. কোলেনকাইমা
C. অ্যারেনকাইমা D. ক্লোরেনকাইমা

① Explanation/ প্যারেনকাইমা 8 প্রকার:

- ক্লোরেনকাইমা (ক্লোরোফিলযুক্ত)
- অ্যারেনকাইমা (বাহ্যকূর্ট্রীয়)
- প্রোসেনকাইমা (ফাঁকা জায়গাহীন)
- ইডিওপ্লাস্ট (অপ্রয়োজনীয় বস্তুসহ)

03. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ভাস্কুলার বাউল কিভাবে সাজানো থাকে?

[BAU. shift-2015-16]

- A. বৃত্তাকারে B. সমান্তরাল অবস্থায়
C. আয়তাকারে D. বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো অবস্থায়

[Ans D]

04. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে কাণ্ডের ভাস্কুলার বাউল কি প্রকার?

[BAU. shift-2015-16]

- A. অরীয় B. বদ্ধ সমদ্বিপার্শ্বীয়
C. কেন্দ্রিক D. মুক্ত সমদ্বিপার্শ্বীয়

① Explanation/ মুক্ত সমদ্বিপার্শ্বীয়: দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড; বদ্ধ সমদ্বিপার্শ্বীয়: একবীজপত্রী কাণ্ড।

05. নিম্নের কোন টিস্যুতে খাদ্য জমা থাকে?

[BAU.2014-15]

- A. কোলেনকাইমা B. প্যারেনকাইমা
C. অ্যারেনকাইমা D. ক্লোরেনকাইমা

① Explanation/ বিভিন্ন টিস্যুর কাজ:

- কোলেনকাইমা: খাদ্য সঞ্চয় এবং অঙ্গকে আংশিক দৃঢ়তা প্রদান করে।
- প্যারেনকাইমা: খাদ্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করাই এর প্রধান কাজ।
- অ্যারেনকাইমা: জলজ উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা।
- ক্লোরেনকাইমা: উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

06. দ্বিবীজপত্রী গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের যে স্তরে শ্বেতসার দানা পরিলক্ষিত হয় তার নাম কী?

[BAU.2013-14]

- A. পরিবহন কলা গুচ্ছ B. পরিচক্র
C. মজ্জা D. অন্তঃত্বক

① Explanation/ দ্বিবীজপত্রী গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের যে স্তরে শ্বেতসার দানা পরিলক্ষিত হয় তার নাম- অন্তঃত্বক। সাধারণত, দ্বিবীজপত্রী গাছের কাণ্ডে শ্বেতসার দানা পরিলক্ষিত হয়।

07. ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

[BAU.2013-14]

- A. কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন B. কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড়
C. সাধারণত কোষ গহ্বর থাকে না D. সবগুলো

① Explanation/ ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যুর পার্থক্য:

ভাজক টিস্যু	স্থায়ী টিস্যু
কোষগুলি বিভাজনে সক্ষম	কোষগুলি বিভাজনে অক্ষম
ভাজক টিস্যু উদ্ভিদ দেহে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়	কোষ পরিণতির মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না
অ্রণাবস্থাতেই এদের উৎপত্তি ঘটে, তাই প্রাথমিক টিস্যু। সেকেন্ডারী ভাজক টিস্যু স্থায়ী টিস্যু হতে উৎপন্ন হয়	ভাজক টিস্যু হতে এদের উৎপত্তি হয় কাজেই এরা সেকেন্ডারী টিস্যু
এটি অপরিশ্রুত কোষ দিয়ে গঠিত	এটি পরিণত কোষ দিয়ে গঠিত
কোষগুলির আকার ও গঠন নির্দিষ্ট নয়	কোষগুলির গঠন ও আকার নির্দিষ্ট
যান্ত্রিক কাজে বিশেষ কোন সহায়তা করে না	যান্ত্রিক কাজে দৃঢ়তা প্রদান করে
খাদ্যোৎপাদন, সঞ্চয় ও পরিবহনের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়	খাদ্যোৎপাদন, সঞ্চয়, দৃঢ়তা দান ও পরিবহণ এদের প্রধান কাজ

08. কোনটি ভিন্নধর্মী?

[BAU 2009-10]

- A. শস্য B. জগ
C. বীজপত্র D. পরিচক্র

[Ans D]

09. সূর্যমুখী ফুলের কাণ্ডের ভাস্কুলার বাউল কোন প্রকার?

[BAU 2008-09]

- A. সমদ্বিপার্শ্বীয় মুক্ত B. সমদ্বিপার্শ্বীয় মুক্ত
C. অরীয় D. কেন্দ্রিক

① Explanation/ সমদ্বিপার্শ্বীয়: সূর্যমুখী। সমদ্বিপার্শ্বীয়: লাউ, কুমড়া, শসা।

10. কোনটি ভাজক কলার কাজ?

[BAU 2008-09]

- A. অঙ্গের দৃঢ়তা প্রদান B. উদ্ভিদের দেহকে টান সহতা প্রদান
C. কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটানো D. বর্জ্য পদার্থ ধারণ

① Explanation/ ভাজক কলার কাজ:

- শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধি পায়। এতে ছোট গাছ ক্রমে উঁচু ও লম্বা হয়।
- পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যুর বিভাজনের ফলে উদ্ভিদের ব্যাস বৃদ্ধি পায়। এতে স্তম্ভ কাণ্ড ক্রমে মোটা হয়।
- ভাজক টিস্যু হতে স্থায়ী টিস্যু সৃষ্টি হয়।

11. Pallisade Parenchyma কোষের কাজ কি?

[BAU 2007-08]

- A. খাব্য তৈরী করা B. অভ্যন্তরীণ কোষসমূহকে রক্ষা করা
C. পানি তৈরী করা D. বায়ু প্রকোষ্ঠে O₂ জমা রাখা

① Explanation/ পাতার মেসোফিল টিস্যুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- প্যালিসেড প্যারেনকাইমা: প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট বিদ্যমান। এর প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা।
- স্পঞ্জ প্যারেনকাইমা: অল্প পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট বিদ্যমান। এর কাজ হল প্রস্তুত, বায়ু ধারণ ও শ্বসন- প্রবেদনে সাহায্য করা।

12. ক্যাথিয়াম অনুপস্থিত থাকে নিম্নের কোন গাছে?

[BAU 2006-07, SAU. 2014-15]

- A. সূর্যমুখী B. কুমড়া
C. ছোলা D. কলাবতী

① Explanation/ একবীজপত্রী উদ্ভিদে ক্যাথিয়াম বলয় নাই। কলাবতী একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

13. সংযুক্ত ও সমদ্বিপার্শ্বীয় পরিবহন কলাগুচ্ছ যে গাছে পরিলক্ষিত হয়-

[BAU 06-07]

- A. কুমড়া গাছ B. ধান গাছ
C. সূর্যমুখী D. ভুট্টা গাছ

[Ans A]

14. দুটি স্থায়ী টিস্যুর মাঝখানে অবস্থিত ভাজক টিস্যুর নাম কি?

[BAU 2005-06]

- A. শীর্ষ ভাজক টিস্যু B. পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু
C. ইন্টারক্যালারী ভাজক টিস্যু D. সেকেন্ডারী ভাজক টিস্যু

[Ans C]

পরিবহন কলাওচ্ছ ঘারা পরিবেষ্টিত মূল বা কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে যে প্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে তার নাম কি? [BAU 2005-06]

- মজ্জা B. মজ্জারশি
গ্রাউন্ড টিস্যু D. পেরিসাইকল

Explanation টিস্যুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ:

মজ্জা: পরিবহন টিস্যু ওচ্ছ দিয়ে পরিবেষ্টিত মূল বা কাণ্ডের কেন্দ্র স্থলের অংশকে মজ্জা বলে।

মজ্জা রশ্মি: মজ্জা যদি দুটি পরিবহন টিস্যুওচ্ছের মধ্য দিয়ে রশ্মির ন্যায় পেরিসাইকল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে সেই রশ্মির ন্যায় অংশকে মজ্জা রশ্মি বলে।

পেরিসাইকল: অন্তঃত্বকের নিচে এবং ভাস্কুলার কাণ্ডের বাইরে এক বা একাধিক স্তর বিন্যাস্ত বিশেষ টিস্যুকে পেরিসাইকল বলে।

গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র: ত্বক ও পরিবহনতন্ত্র ছাড়া উদ্ভিদদেহের অন্যান্য অংশ গঠনকারী-টিস্যুতন্ত্রকে বুঝায়।

বাস্ট ফাইবার: সেকেন্ডারি ফ্রোয়েমে অবস্থিত ফাইবারকে বুঝায়

পত্ররন্ধ্র: দুটি রন্ধ্রীকোষ দিয়ে বেষ্টিত ও নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ছিদ্রকে স্টোম্যাটা বলে।

স্কিলি: পেরিসাইকল স্তর হতে আরম্ভ করে ভাস্কুলার বাণ্ডলসহ কেন্দ্র পর্যন্ত অংশকে বুঝায়।

প্যারেনকাইমা টিস্যুতে বড় বড় বায়ু কুঠুরী থাকলে, তাকে কি বলে? [BAU 04-05]

- A. কোলেনকাইমা B. ক্লোরেনকাইমা
C. অ্যারেনকাইমা D. মেসোফিল

Explanation বায়ু কুঠুরীযুক্ত জলজ উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা টিস্যুকে ক্লোরেনকাইমা বলে।

সমদ্বিপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাণ্ডল পরিলক্ষিত হয় কোন গাছে? [BAU 02-03, 04-05]

- A. গম গাছে B. ভূট্টা গাছে
C. সূর্যমুখী গাছে D. কুমড়া গাছে

Explanation সমদ্বিপার্শ্বীয়: লাউ, কুমড়া; সমপার্শ্বীয়: সূর্যমুখী।

ফ্রোয়েম ফাইবার এক প্রকার- [BAU 2002-03]

- A. সরল কলা B. জটিল কলা
C. ক্ষরণকারী কলা D. গ্রন্থি কলা

Explanation টিস্যু সম্পর্কিত তথ্য: গঠন ও কাজের ভিত্তিতে স্থায়ী টিস্যু বা কলা ৩ প্রকার- সরল কলা, জটিল কলা, ক্ষরণকারী বা নিঃস্রাবী কলা।

> About Simple Tissue:

- i. প্যারেনকাইমা ii. কোলেনকাইমা iii. ক্লোরেনকাইমা।
• প্যারেনকাইমা টিস্যুতে প্রাস্টিড থাকলে একে ক্লোরেনকাইমা বলে।
• পাতার ক্লোরেনকাইমাকে মেসোফিল বলে।
• প্যারেনকাইমা টিস্যুতে বড় বড় বায়ু কুঠুরী থাকলে তাকে অ্যারেনকাইমা বলে। জলজ উদ্ভিদে অ্যারেনকাইমা থাকে।

> About complex tissue: একাধিক প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত টিস্যু এবং সম্মিলিতভাবে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করে তাকে জটিল টিস্যু বলে। জটিল টিস্যু ২ প্রকার- ফ্রোয়েম ও জাইলেম টিস্যু।

- জাইলেম টিস্যুর উপাদান ৪টি: (i) ট্র্যাকিড ii. ভেসেল বা ট্র্যাকিয়া
iii. জাইলেম ফাইবার iv. জাইলেম প্যারেনকাইমা।
• বিজ্ঞানী Nagali ১৮৫৮ সালে জাইলেম, ফ্রোয়েম শব্দের প্রচলন করেন ফ্রোয়েম টিস্যু দিয়ে উদ্ভিদের বাকল তৈরী।
• ফ্রোয়েম টিস্যুর উপাদান: (i) সীভনল বা সীভকোষ ii. সঙ্গীকোষ
iii. ফ্রোয়েম ফাইবার iv. ফ্রোয়েম প্যারেনকাইমা।

১. দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে অন্তঃত্বক (Endodermis) অবস্থান করে- [BAU 2002-03]

- A. মেটাজাইলেম ও প্রোটোজাইলেমের মাঝখানে
B. ক্যাম্বিয়ামের নিচে ও পেরিসাইকেলের বাইরে
C. ক্যাম্বিয়ামের নিচে ও উপর দিয়ে
D. এপিডার্মিসের ঠিক নিচেই

Ans B

20. মেসোফিল টিস্যু কোথায় থাকে?

[BAU 2001-02]

- A. মূলে B. কাণ্ডে
C. পাতায় D. ভৌম পুষ্পদণ্ডে

Explanation পাতার উর্ধ্ব ও নিম্ন ত্বকের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে পরিবহন টিস্যু ওচ্ছ ছাড়া বাকি টিস্যুকে (ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষে গঠিত) মেসোফিল টিস্যু বলে। এটি মূলত দুই প্রকার: প্যালিসেড প্যারেনকাইমা, স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা।

21. পাটের আঁশ কোন ধরনের ফাইবার?

[BAU 2001-02, RU. G-2013-14]

- A. উড B. জাইলেম
C. প্যারেনকাইমা D. বাস্ট

Explanation পাটের আঁশ বাস্ট ফাইবার যা মূলত ফ্রোয়েম ফাইবার। উট মূলত জাইলেম ফাইবার।

22. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড কোন ধরনের ভাস্কুলার বাণ্ডল দেখা যায়?

[BAU 2000-01, CVASU:2015-17, SylAU: 16-17]

- A. সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত B. অরীয়
C. সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ D. সমদ্বিপার্শ্বীয়

Ans C

23. তুলা গাছের বীজের গাত্র হতে যে তন্ত্র উৎপন্ন হয় তার নাম কি? [BAU 2000-01]

- A. বাস্ট তন্ত্র B. উড তন্ত্র
C. সার্কোস তন্ত্র D. ব্রাশ তন্ত্র

Ans C

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিউক্লিয়াসবিহীন কোন কোষকে জীবন্ত বিবেচনা করা হয়?

[SAU.2016-17, SylAU. 2016-17, CVASU. 2006-07, HSTU 14-15, BAU. 2014-15]

- A. সঙ্গীকোষ B. সীভনল
C. ট্র্যাকিয়া D. ক্যাম্বিয়াম কোষ

Explanation জাইলেমের মধ্যে একমাত্র জীবিত কোষ জাইলেম প্যারেনকাইমা এবং ফ্রোয়েমের মধ্যে একমাত্র মৃত কোষ ফ্রোয়েম ফাইবার।

02. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কোন ধরনের পরিবহন কলা ওচ্ছ পাওয়া যায়?

[SAU.2016-17]

- A. মুক্ত B. বদ্ধ
C. অরীয় D. কেন্দ্রিক

Ans A

03. মেসোফিল টিস্যু কোথায় থাকে?

[SAU. 2015-16]

- A. মূল B. কাণ্ড
C. পাতা D. ফুল

Explanation মেসোফিল টিস্যু পাতায় অবস্থান করে সালোকসংশ্লেষনে সহায়তা করে। এটি পাতার গ্রাউন্ড টিস্যু। এটি অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট ও পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত।

04. কোন উদ্ভিতি কাণ্ডের বেলায় সঠিক নয়?

[SAU. 2015-16]

- A. বীজের অঙ্কুরোদগম কালে ভ্রূণমুকুল হতে কাণ্ডের সূচনা হয়
B. কাণ্ড কচি অবস্থায় সবুজ বর্ণের হয়
C. কাণ্ড পর্ব ও মধ্য পর্বযুক্ত
D. কাণ্ডের বহিঃত্বকে সাধারণতঃ কিউটিকল থাকে না

Explanation কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য:

- কাণ্ডের পর্ব ও মধ্য পর্বযুক্ত
• কাণ্ড কচি অবস্থায় সবুজ থাকে
• কাণ্ডের বহিঃত্বকে কিউটিকল থাকে না

05. কোনটি ফ্রোয়েমের অংশ নয়?

[SAU. 2004-05]

- A. ভেসেল B. সঙ্গীকোষ
C. ফাইবার D. প্যারেনকাইমা

Explanation ফ্রোয়েমের অংশ সমূহ:

- সীভকোষ
• সঙ্গীকোষ
• ফ্রোয়েম ফাইবার
• ফ্রোয়েম প্যারেনকাইমা

অধ্যায়
০৯

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব
PLANT PHYSIOLOGY

কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিতাবে পড়ব?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব]
01	পানি ও খনিজ লবণ শোষণ	★
02	সালোকসংশ্লেষণ	★ ★ ★
03	শ্বসন	★ ★
04	শ্বসনে উৎপন্ন শক্তি	★ ★ ★



টপিক আলোচনা

CONCEPT-01 পানি ও খনিজ লবণ শোষণ



ITEM-01

পানি পরিশোধন

উদ্ভিদের পানি অভ্যগ্রহণ প্রক্রিয়াকে পানি পরিশোধন বলে। সবচেয়ে দ্রুত ও অধিক পরিমাণে পানি শোষিত হয় কচি মূলের মূলরোম অঞ্চল দিয়ে কাজেই মূলরোমই পানি শোষণে মুখ্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। নিম্ন শ্রেণির যে সকল উদ্ভিদে রাইজয়েড আছে সেগুলো রাইজয়েড দিয়ে পানি শোষণ করে।

- ♦ মাটিস্থ পানির প্রকারভেদ: মাটিতে যে পানি থাকে তাকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়।
 - অভিকর্ষীয় পানি: বৃষ্টির পানির যে অংশ অভিকর্ষণের টানে মাটির অনেক নিচে নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে জমা হয় তাকে অভিকর্ষীয় পানি বলে।
 - কণাজাত পানি: বৃষ্টির পানির যে অংশ মাটি- কণার চারদিকে ফিল্ডের ন্যায় পাতলা আবরণ হিসেবে সংলগ্ন থাকে তাকে কণাজাত পানি বলে।
 - কণাবিশোধিত পানি: মাটি-কণা তার কলয়েড ধর্মের দ্বারা যে পরিমাণ পানি তার দেহে ধরে রাখে তাকে কণা বিশোধিত পানি বলে।
 - কৈশিক পানি: মাটি-কণার কৈশিকত্বের প্রভাবে যে পানি তার ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত থাকে তাকে কৈশিক পানি বলে। কৈশিক পানিই উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য।
- ♦ পানি শোষণ প্রক্রিয়া: উদ্ভিদ তিন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে।
 - ইমবাইবিশন: কলয়েড জাতীয় ও ছ বা আংশিক ও ছ পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি) শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে।
 - ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর দিয়ে প্রচুর পানি শোষণ করে থাকে।
 - বপনের পর ওরুবীজ ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে অঙ্কুরোদগমের উপযোগী হয়। বলা যায়, বীজের সার্বক অঙ্কুরোদগম ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।
 - ডিফিউশন বা ব্যাপন: বিক্ষিপ্ত সঞ্চারণের মাধ্যমে কোন পদার্থের অণুগুলোর গতিশক্তির ভিন্নতার জন্য একস্থান হতে অন্য স্থানের দিকে বিস্তার লাভকে ব্যাপন বলে।
 - শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন (O_2) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।
 - উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে পানি ও খনিজ লবণের বিভিন্ন অংশে যাতায়াতে ব্যাপন প্রক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
 - অসমোসিস বা অভিশ্রবণ: একই দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পাশাপাশি পৃথক থাকলে দ্রাবক পদার্থ (এখানে পানি) প্রক্রিয়ায় তার বেশি ঘনত্বের এলাকা (পানির পরিমাণ বেশি অর্থাৎ দ্রবণ কম ঘন) হতে এর কম ঘনত্বের এলাকার (পানির পরিমাণ কম অর্থাৎ দ্রবণ বেশি ঘন) দি ব্যাপিত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে অভিশ্রবণ বা অসমোসিস বলে।
 - মূলরোম মাটি কণার ফাঁকের কৈশিক পানি অসমোসিস প্রক্রিয়ায় শোষণ করে।
 - অসমোসিসের ফলে মূলজ চাপ সৃষ্টি হয় যা রস উত্তোলনে সহায়তা করে।



ITEM-02

খনিজ লবণ পরিশোধন

উদ্ভিদ আয়ন হিসেবে ১৭টি মৌল শোষণ করে। যার মধ্যে ৯টি ম্যাক্রোমৌল ও ৮টি মাইক্রোমৌল। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ তিনটি উপাদান বায়ু হতে বাকি আয়নগুলো মাটি হতে শোষণ করে।

- ♦ উদ্ভিদের ম্যাক্রোমৌল: MgK CaFe for Nice CHOPS

Mg	K	Ca	Fe	Nice	C	H	O	P	S
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Mg	K	Ca	Fe	N	C	H	O	P	S

- ♦ কতিপয় উপকারী মৌল:

- ♦ সিলিকন - ঘাস
- ♦ আয়োডিন- সামুদ্রিক শৈবাল।
- ♦ কোবাল্ট - নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউম
- ♦ সোডিয়াম- C_4 উদ্ভিদ
- ♦ Ca^{2+} ও SO_4^{2-} আয়ন সর্বাপেক্ষা মধুরগতিতে শোষিত হয়
- ♦ K^+ ও NO_3^- আয়ন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে শোষিত হয়

খনিজ লবণ পরিশোধনের বিভিন্ন মতবাদ:

মতবাদের ভিত্তি	মতবাদ	বাহক/বিনিময়
মাটিতে খনিজ লবণের প্রাপ্যতা	কার্বন ডাই-অক্সাইড মতবাদ	H ⁺ এর সাথে ক্যাটায়নের, HCO ₃ ⁻ এর সাথে অ্যানায়নের বিনিময় ঘটে
	কনট্যাক্ট একচেঞ্জ মতবাদ	ক্যাটায়নের সাথে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের সাথে অ্যানায়ন বিনিময় ঘটে
সক্রিয় পরিশোধন (ঘনত্ব আনতির বিপরীতে এই শোষণ ঘটে বলে এতে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে)	লুনডেগড় মতবাদ	সাইটোক্রেম (লৌহ গঠিত প্রোটিন)
	প্রোটিন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ	প্রোটিন
	লেসিথিন বাহক ধারণা	ফসফোলিপিড
	সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প তত্ত্ব	সোডিয়াম, পটাসিয়াম
নিষ্ক্রিয় পরিশোধন (আয়ন শোষণের জন্য কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না)	ব্যাপন (Diffusion) মতবাদ	-
	আয়ন বিনিময়	H ⁺ = K ⁺ ; OH ⁻ = Cl ⁻ ; ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন একসাথে পরিবাহিত হয় না
	ডোম্যান সাম্যাবস্থা মতবাদ	-
	ব্যাপক প্রবাহ (Mass flow) মতবাদ	-

CONCEPT-02 প্রবেদন

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ (সাধারণত পাতা) হতে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় (৯৯%), তাকে প্রবেদন বলে। বিজ্ঞানী কার্টিস প্রবেদনকে 'প্রয়োজনীয় অমঙ্গল' (Necessary evil) বলেছেন। গ্যাস পটেন্সিয়ার এর সাহায্যে প্রবেদন হার নির্ণয় করা যায়।

প্রবেদনের প্রকারভেদ:

প্রকারভেদ	প্রবেদনের স্থান	শতকরা হার
পত্রকীয় প্রবেদন (Stomatal transpiration)	পত্রকের মধ্য দিয়ে প্রবেদন	৯৫-৯৮%
ত্বকীয় প্রবেদন (Cuticular transpiration)	পত্রকের কিউটিকলের মধ্য দিয়ে প্রবেদন	০২-০৫%
লেন্টিকুলার প্রবেদন (Lenticular transpiration)	কাণ্ডের লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে প্রবেদন	১%

প্রবেদন ৯৫-৯৮ ভাগ প্রবেদন পত্রকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কাজেই পাতাই প্রবেদনের প্রধান অঙ্গ।

পত্রক:

- পত্রক পাতার উপরিতলে অবস্থিত দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির রক্ষীকোষ এবং এদের দিয়ে বেষ্টিত রন্ধ্র নিয়ে গঠিত।
- রন্ধ্র ও লবণাক্ত মাটির উদ্ভিদের স্টোমাটা সাধারণত পাতার ত্বকীয় অঞ্চল থেকে বেশ ভিতরের দিকে লুকিয়ে অবস্থান করে, এই জাতীয় স্টোমাটাকে বলে লুক্কায়িত পত্রক।
- প্রজাতির উপর নির্ভর করে পাতার প্রতি এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকায় ১০০০ হতে ৬০০০০ পত্রক থাকতে পারে।
- অধিকাংশ উদ্ভিদের পত্রক সকাল ১০-১১টা এবং বিকাল ২-৩টায় পূর্ণ খোলা থাকে, অন্যান্য সময় আংশিক খোলা থাকে এবং রাত্রিতে বন্ধ থাকে।
- বেশিরভাগ উদ্ভিদের পত্রক দিনের বেলা খোলা থাকে এবং রাতের বেলা বন্ধ থাকে (ব্যতিক্রম পাথরকুচি)।
- পটাসিয়াম আয়ন পত্রক খোলা ত্বরান্বিত করে।
- পত্রক শ্বসন, সালোকসংশ্লেষণ ও প্রবেদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

CONCEPT-03 সালোকসংশ্লেষণ



ITEM-01

প্রয়োজনীয় উপকরণ বা উপাদান

ক্রোরোপ্রাস্ট:

- উদ্ভিদের যে অঙ্গে ক্রোরোপ্রাস্ট থাকে সে অঙ্গ সবুজ হয়।
- সবুজ শৈবাল, Riccia, Marchantia এর মতো থ্যালয়েড ব্রায়োফাইটস এর প্রায় সমস্ত দেহেই ক্রোরোপ্রাস্ট থাকে।
- উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের কচি কান্ড ও পাতায় ক্রোরোপ্রাস্ট থাকে।
- সবচেয়ে বেশি ক্রোরোপ্রাস্ট থাকে পাতায়, তাই সামগ্রিক বিবেচনায় সবুজ পাতাকেই ফটোসিনথেসিস এর প্রধান অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- সায়ানো-ব্যাকটেরিয়াতে ক্রোরোপ্রাস্ট নেই তবে থাইলাকয়েড এর গায়ে ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট থাকে।
- লোহিত শৈবাল, বাদামী শৈবাল এর ফটোসিনথেটিক পিগমেন্টগুলো ক্রোম্যাটোফোর (Chromatophore) নামক অঙ্গানুতে থাকে।

রন্ধ্র পদার্থ:

রন্ধ্র গ্রুপ	রন্ধ্র	রং
ক্রোরোফিল	ক্রোরোফিল 'a' (Ch 'a')	হলদে-সবুজ
	ক্রোরোফিল 'b' (Ch 'b')	নীলাভ-সবুজ
ক্যারোটিনয়েডস	ক্যারোটিন (C ₄₀ H ₅₆ O)	কমলা
	জ্যান্থোফিল (C ₄₀ H ₅₆ O ₂)	হলুদ
ফাইকোবিলিন	ফাইকোসায়ানিন	নীল
	ফাইকোইরেট্রিন	লাল

আলো ও আলোক বর্ণালী:

- আপতিত সূর্যালোকের ৮৩% ক্রোরোপ্রাস্ট কর্তৃক শোষিত হয়, ১২% বায়ুমন্ডলে প্রতিফলিত হয় এবং বাকি ৫% ভূগর্ভে প্রতিসরিত বা বিলীন হয়। পাতায় শোষিত সৌর রশ্মির মোট পরিমাণের মাত্রা ০.৫-৩.৫% ক্রোরোফিল ও অন্যান্য রন্ধ্র পদার্থ কর্তৃক শোষিত হয়।
- সালোকসংশ্লেষণের সময় বেগুনি-নীল ও কমলা-লাল আলো বেশি ব্যবহৃত হয়। দ্বি আলো হিসেবে নীল ও লাল বেশি ব্যবহৃত হয়।

- একক আলো হিসেবে লাল আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।
 - সূর্যের উত্তপ্ত কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের সময় যে শক্তি বিকিরিত হয়, তাকে ফোটন (সালোকসংশ্লেষণে ৫০-৬০টি ফোটন ব্যবহৃত হয়) কণা বলে।
- (Ref: হাসান স্যার, আজিজুর স্যার, বিপ্লবিস ববু হাট)

(Ref: હામન માર, અબ્દુલ માર, વિગતિન માર માર)


◆ থাইলাকয়েড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন:

- ফ্লোফাইটিন: একটি রূপান্তরিত ক্রোমোফিল- a অণু।
- প্রাস্টোকুইনন: অতি ছোট চলনশীল লিপিড যা থাইলাকয়েড মেমব্রেনে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।
- সাইটোক্রোম: সাইটোক্রোম হলো লৌহঘটিত হিম গ্রুপবিশিষ্ট প্রোটিন।
- প্রাস্টোসায়ানিন: অত্যন্ত চলনশীল একটি ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন। এর ইলেকট্রন গ্রহীতা হলো কপার।
- ফেরিডক্সিন: এটি একটি আয়রন-সালফার প্রোটিন।
- NADP-রিডাক্টেজ: এটি আসলে একটি ফ্ল্যাভোপ্রোটিন এবং বাউন্ড কো-এনজাইম FAD (ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড)। এর ফ্ল্যাভিন গ্রুপ হলো ইলেকট্রন গ্রহীতা।

ITEM-02


সালোকসংশ্লেষণের কলাকৌশল

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ-কোষে ক্লোরোফিল সূর্যের আলোক শক্তিকে ATP এবং NADPH + H⁺ (পানির সালোকবিভাজনের মাধ্যমে) নামক রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং ঐ রাসায়নিক শক্তিকে (ATP ও NADPH + H⁺) কাজে লাগিয়ে CO₂ বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় পদার্থ এবং উপজাত হিসেবে O₂ নির্গত করে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস বলে।



সালোকসংশ্লেষণ

- বার্নেস সর্বপ্রথম ফটোসিনথেসিস নাম প্রবর্তন করেন
- ব্রাকম্যান ২টি পর্যায়ে ভাগ করেন



◆ আলোক পর্যায় ও অন্ধকার পর্যায়ের পার্থক্য:

আলোক নির্ভর অধ্যায়	আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়
ক্রোরোপ্লাস্টের স্থানীয় থাইলাকয়েড মেমব্রেনে ঘটে	ক্রোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমার মধ্যে ঘটে
আলোক শক্তির প্রয়োজন হয়	আলোক শক্তির প্রয়োজন হয় না
আলোক শক্তির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP ও NADPH + H ⁺ উৎপন্ন হয়	CO ₂ থেকে শর্করা উৎপন্ন হওয়ার জন্য ATP ও NADPH + H ⁺ থেকে শক্তি সরবরাহ হয়
এ অধ্যায়ে NADP বিজারিত হয়	এ অধ্যায়ে বিজারিত NADP জারিত হয়

◆ চক্রীয় ও অচক্রীয় পৰ্যায়ের পার্থক্য:

চক্রীয় ফটোসিস্থোরাইলেশন	অচক্রীয় ফটোসিস্থোরাইলেশন
PS-I হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে পুনরায় PS-I এ ফিরে আসে ও শুধু PS-I অংশগ্রহণ করে	PS-II হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন পুনরায় PS-II-তে ফিরে না এসে PS-I এ ফিরে আসে PS-I (P 700) এবং PS-II (P680) উভয়ই অংশগ্রহণ করে
পানির প্রয়োজন হয় না	পানির প্রয়োজন হয়। কারণ পানির ইলেকট্রন ও প্রোটন এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়
কোন অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না (কারণ এ প্রক্রিয়ায় কোন পানি ব্যবহৃত হয় না)	পানির ভাঙ্গনের ফলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় যা পরে নির্গত হয়
কোন NADP বিজারিত হয় না	এক অণু NADP বিজারিত হয়ে এক অণু $\text{NADPH}^+ + \text{H}^+$ সৃষ্টি করে

◆ C_1 ও C_4 চক্রের পার্থক্য:

ক্যালভিন চক্র	হ্যাচ এন্ড শ্লাক চক্র
কেবল মেসোফিল কোষে হয়	মেসোফিল ও বাভলসীথ কোষে হয়
ফটোরেসপিরেশন ঘটে	ফটোরেসপিরেশন ঘটে না
প্রাথমিক CO ₂ গ্রহীতা RuBP (Ribulose 1,5 bisphosphate)	প্রাথমিক CO ₂ গ্রহীতা PEP (Phosphoenol Pyruvate)
CO ₂ ফিকসিং এনজাইম রুবিস্কো	CO ₂ ফিকসিং এনজাইম PEP কার্বোক্সিলেজ
প্রথম স্থায়ী দ্রব্য 3PG (৩-কার্বন)	প্রথম স্থায়ী দ্রব্য অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড (৪-কার্বন)
CO ₂ এর জন্য কার্বোক্সিলেজ এর দক্ষতা মধ্যম	CO ₂ এর জন্য কার্বোক্সিলেজ এর দক্ষতা উচ্চ
ক্রোরোপ্লাস্টের ধরন একই রকম	ব্যবহৃত ক্রোরোপ্লাস্টের ধরন দু'রকম (বাবল সীথ ক্রোরোপ্লাস্টে উন্নত গ্রানাম থাকে)
এ চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ১০° সে. থেকে ২৫° সে.	এ চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ৩০° সে. থেকে ৪৫° সে
বায়ুমন্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ৫০ ppm পরিমাণ CO ₂ থাকা প্রয়োজন	বায়ুমন্ডলে প্রতি মিলিয়নে নিম্নতম ০.১০ ppm পরিমাণ CO ₂ থাকলেও চলে

C₄ উদ্ভিদের উদাহরণ:**Mnemonic:** আঁখি মুখকে তিনবার ভূয়া চিঠি দিল-

আঁখি ↓ আখ	মু ↓ মুখাঘাস	তি ↓ মিল্লাত	ন ↓ নটোশাক	বার ↓ বাজরা	ভূয়া ↓ ভুট্টা	চিঠি ↓ চিনা	দিল ↓ দুর্বাঘাস/ডাটা
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------------

(Ref: হাসান স্যার)

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অক্সিজেনের উৎস পানি এটি রবিন হিল, ড্যান নীল, স্যামুয়েল রুবেন ও কামেনের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত।

উদ্ভিদে ৩ প্রকার C₄ গতিপথ লক্ষ করা যায়।

কস্টেলসিয়ান এসিড মেটাবলিজম (CAM প্রক্রিয়া):

প্রথম স্থায়ী যৌগ অক্সালো Acetic Acid

4 Carbon যুক্ত যৌগ, প্রথম কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহীতা Phosphoenol Pyruvate.

পাথরকুচি, আনারস, ক্যাকটাস, অর্কিড, খেজুর ইত্যাদি CAM উদ্ভিদ।

CONCEPT-04 শ্বসন

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষে জটিল জৈব যৌগ জারিত হয়, ফলে জৈব যৌগে সংযুক্ত স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয়ে গতিশক্তিতে পরিণত হয়, তাকে শ্বসন বলে।

শ্বসনের প্রকারভেদ:

প্রকারভেদের ভিত্তি	প্রকারভেদ	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
সবাত শ্বসন (যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মূল অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO ₂ , H ₂ O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে)	গ্রাইকোলাইসিস (সাইটোপ্লাজমে ঘটে)	যে প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে তাকে গ্রাইকোলাইসিস বলে। এটি অবাত এবং সবাত উভয় শ্বসনের প্রথম ধাপ
	ক্রেবস চক্র/TCA/সাইট্রিক এসিড চক্র (মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে ঘটে)	পাইরুভিক এসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে দুই অণু CO ₂ উৎপন্ন করে। এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড। অ্যাসিটাইল Co-A হলো গ্রাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান। ম্যাট্রিক্সে স্থায়ী অবস্থানের কারণে অক্সালো এসিটিক এসিডকে আবাসিক অণু বলা হয়
	ইলেকট্রন স্থানান্তর ও ATP তৈরি (মাইটোকন্ড্রিয়ার মেমব্রেনে ঘটে)	ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে। ETC-এ অক্সিজেনই হলো ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতা। ETC সবাত শ্বসনের একটি পর্যায় মাত্র, কাজেই ETC ছাড়া সবাত শ্বসন পূর্ণ হয় না
অবাত শ্বসন (এই শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়)	গ্রাইকোলাইসিস	এটি অবাত এবং সবাত উভয় শ্বসনের প্রথম ধাপ
	পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ	অবাত শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল ও CO ₂ অথবা ওধু ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে i. অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন তথা ইথানল সৃষ্টি (ইস্ট ও কতিপয় ব্যাকটেরিয়া): প্রথম ধাপে অ্যাসিটোডিহাইড উৎপন্ন হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কারণে ইথানল তৈরি হয় ও NAD মুক্ত হয় ii. ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি: কতিপয় ব্যাকটেরিয়া ও প্রাণীতে, বিশেষ করে পেশিতে, ল্যাকটিক অ্যাসিড অধিক উৎপন্ন হয়। অবাত শ্বসন অধিকাংশ আণুবীক্ষণিক জীবেরই শক্তি উৎপাদনের একমাত্র প্রক্রিয়া

শ্বসনে উৎপন্ন শক্তি:

Preparation and Practice are vital for effective delivery

শ্বসনের পর্যায়	উৎপাদিত বস্তু	ব্যয়িত বস্তু	নিট উৎপাদন
গ্রাইকোলাইসিস	2 অণু পাইরুভিক এসিড	-	-
	2 অণু NADH ₂	-	4 ATP (Not 6)
	4 অণু ATP	2 অণু ATP	2 ATP
অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি	2 অণু অ্যাসিটাইল Co-A	2 অণু পাইরুভিক এসিড	2 অণু CO ₂
	2 অণু CO ₂	-	-
	2 অণু NADH ₂	-	6 ATP
ক্রেবস চক্র	4 অণু CO ₂	2 অণু অ্যাসিটাইল Co-A	4 অণু CO ₂
	6 অণু NADH ₂	-	18 ATP
	2 অণু FADH ₂	-	4 ATP
	2 অণু GTP	-	2 ATP
1 অণু NADH ₂ = 3 অণু ATP 1 অণু GTP = 1 অণু ATP ; 1 অণু FADH ₂ = 2 অণু ATP ; নিট উৎপাদন: { 6 অণু CO ₂ 36 অণু ATP			

◆ **শ্বসনিক হার/কোশ্চেট:** শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার (R.Q) বলে। বিভিন্ন শ্বসন হার:

ঋসন বস্তু	ঋসন হার	ঋসন বস্তু	ঋসন হার
গ্লুকোজ (সবাত)	1	অ্যালানিন	0.83
গ্লুকোজ (CAM)	0	পামিটিক অ্যাসিড	0.7
গ্লুকোজ (অবাত)	∞	ওলিক অ্যাসিড	0.71
সাইট্রিক অ্যাসিড	1.33	ট্রাইপামেটিন	0.7
ম্যালিক অ্যাসিড	1.33	অব্রালিক এসিড	4
টারটারিক অ্যাসিড	1.6	প্রোটিন	< 1

VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- ◆ ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়া সংঘটিত হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে।
 - ◆ অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে।
 - ◆ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অবস্থিত ক্রিস্টিতে।
 - ◆ C_4 উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়ার CO_2 গ্রাহক হলো ফসফোইনোল পাইক্লিক এসিড।
 - ◆ অবাত শ্বসনে গ্রাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইক্লিক এসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল ও CO_2 উৎপন্ন করে।
 - ◆ চক্রীয়, অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন এর মাধ্যমে 1 অনু ATP তৈরি হয়।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
 - ◆ C_4 উদ্ভিদে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড।
 - ◆ উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য পানির উৎস হলো কৈশিক পানি।
 - ◆ ক্যালভিন চক্রের প্রয়োজনীয় এনজাইম সংশ্লেষণ করে ক্লোরোপ্লাস্ট।
 - ◆ ফলের রং লাল হয় লাইকোপিনের জন্য।
 - ◆ পত্ররক্ত খোলা ও বন্ধ ফসফোরাইলেজ এনজাইম জড়িত থাকে।
 - ◆ পাইক্লিক এসিডের সম্পূর্ণ জারণকে সবাত শ্বসন বলে।
 - ◆ পাউরুটি তৈরির প্রক্রিয়ায় ময়দার সাথে ইস্টের ব্যবহারে CO_2 গ্যাসের চাপে পাউরুটি ছিদ্র হয়।
 - ◆ উদ্ভিদের প্রধান ট্রান্সলোকেটেড সুগার-সুক্রোজ।
 - ◆ মূলরোম হতে পানি ও খনিজ লবণ জাইলেম পর্ষভ যেতে ৩টি পাথওয়ে অনুসরণ করে।
 - ◆ প্রোটোপ্লাজম একটি বিশেষ ধরনের কলয়েড।
 - ◆ ছোলা মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়।
 - ◆ C_3 চক্রের প্রথম কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহীতা রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট।
 - ◆ অভ্যেদ ফিল্লির উদাহরন- সুবেরিন।
 - ◆ প্রতি অণু অ্যামোনিয়া সৃষ্টিতে ATP প্রয়োজন হয়- 3টি।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন- উভয় প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়- সবুজ উদ্ভিদে।
 - ◆ উদ্ভিদ কোষে শ্বসনের প্রধান অঙ্গ- মাইটোকন্ড্রিয়া।
 - ◆ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে বাঁধা দেয়- O_2 ।
 - ◆ ফলের রং হলুদ হয়- বিটাজ্যাঙ্কিনের কারণে।
 - ◆ ক্লোরোসিস হয় মূলত- জিংকের অভাবে।
 - ◆ “কোষরসের pH এর উঠানামাই পত্ররক্তের খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী” ইহা যে মতবাদকে সমর্থন করে- বিজ্ঞানী স্যায়ের মতবাদ।
 - ◆ উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের জনক হলেন- স্টিফেন হেলস।
 - ◆ উদ্ভিদের ম্যাক্রোমোল- ৯টি।
 - ◆ উপকারী মৌলের ক্ষেত্রে: i. সিলিকন- ঘাসের জন্য।
ii. সোডিয়াম- C_4 উদ্ভিদের জন্য।
iii. কোবাল্ট- নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউমের জন্য।
iv. আয়োডিন- সামুদ্রিক শৈবালের জন্য।
 - ◆ ক্লোরোফিল অনু গঠনের জন্য দরকারী মৌল- Mg।
 - ◆ উদ্ভিদের পাতা ও ফল করে পড়ে- P এর অভাবে।
 - ◆ সবচেয়ে দ্রুত শোষণ- K^+ ও NO_3^-
 - ◆ সবচেয়ে মধুর শোষণ- Ca^{2+} , SO_4^{2-}
 - ◆ সক্রিয় পরিশোধন- ৩ প্রকার এবং নিষ্ক্রিয় পরিশোধন ৪ প্রকার।
 - ◆ নিষ্ক্রিয় পরিশোধন সমূহ- ব্যাপন, আয়ন বিনিময়, ডোন্ড্যান সাম্যবস্থা, ব্যাপক প্রবাহ (mass flow) মতবাদ।
 - ◆ Ca, Mg আয়নের উপস্থিতি বাধাপ্রস্তু করে- K^+ আয়নকে।
 - ◆ প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয়- প্রবেদনকে।
 - ◆ প্রবেদনের হার নির্ণয় করা হয়- গ্যানং পটোমিটার দিয়ে।
 - ◆ প্রবেদনে পানি বাষ্পাকারে বের হয়- ৯৯%।
 - ◆ প্রবেদনের প্রধান অঙ্গ হল- পাতা।
 - ◆ দিনের বেলায় পত্ররক্ত বন্ধ থাকে- পাথরকুচিত।
 - ◆ প্রবেদনের হার হ্রাস করে- লুকায়িত পত্ররক্ত।
 - ◆ উদ্ভিদে পানির অভাব দেখা দিলে নিঃসৃত হয়- অ্যাবসিসিক এসিড।
 - ◆ রক্ষীকোষের স্ফীতি অবস্থার প্রভাবক- আলো, তাপমাত্রা ও জলীয় বাষ্প।
 - ◆ পাতার পত্ররক্ত খোলা তুরাশিত হয়- নীল আলোতে।
 - ◆ পত্ররক্তের খোলা রক্তের অপর প্রভাব বিস্তার করে- অসমোটিক প্রেশার।
 - ◆ হাইড্রোফিলিক পদার্থের উদাহরণ- আঠা, সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, ক্লোরোফিল।
 - ◆ Photosynthesis এ সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়- শক্তির জন্য।
 - ◆ Photosynthesis এ পানির প্রয়োজন হয়- $NADPH + H^+$ তৈরির জন্য।
 - ◆ উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের প্রধান অঙ্গ হল- সবুজ পাতা।
 - ◆ বায়োলজিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অক্সিডেন্ট হল- $P-680^+$
 - ◆ ফটোসিনথেসিস অঙ্গ- সবুজ অঙ্গ, সবুজ পাতা।
 - ◆ ফটোসিনথেসিস অঙ্গাণু- ক্লোরোপ্লাস্ট।
 - ◆ ফটোসিনথেসিস এর স্থান- ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণে বেশি ব্যবহৃত হয়- বেগুনী-নীল ও লাল-কমলা আলো।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণে একক আলো হিসেবে ব্যবহৃত হয়- লাল আলো।
 - ◆ ফটোসিস্টেম-1 এ ক্লোরোফিল থাকে- $P-680$ ।
 - ◆ একটি রূপান্তরিত ক্লোরোফিল-a অণু- ফিয়োফাইটিন।
 - ◆ অতি ছোট চলনশীল লিপিড হল- প্লাস্টোকুইনন।
 - ◆ চলনশীল অত্যন্ত ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন- প্লাস্টোসায়ানিন।
 - ◆ আলোক নির্ভর অধ্যায় সংগঠিত হয়- ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে।
 - ◆ আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় সংগঠিত হয়- ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে।
 - ◆ Biological coin/Energy coin হলো- ATP
 - ◆ চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনে ATP উৎপন্ন হয়- ১টি।
 - ◆ ক্যালভিন চক্রে CO_2 গ্রহীতা হলো- RuBP।
 - ◆ পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম হল- রুবিস্কো।
 - ◆ C_3 চক্র ঘটে- নম্বুবীজী, টেরিডো-ব্রায়োফাইটস এবং শৈবালে।
 - ◆ আলোক শ্বসন ঘটে- (i) ক্লোরোপ্লাস্ট (ii) পারঅক্সিসোম (iii) মাইটোকন্ড্রিয়া
 - ◆ C_4 বা হ্যাচ স্ল্যাক চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ- অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড।
 - ◆ C_4 চক্রের CO_2 গ্রহীতা হলো- ফসফোইনোল পাইক্লিক এসিড।
 - ◆ NADP-Malic Enzyme সমূহ- ডুই, ইক্ষু, সরগম, ক্র্যাব ঘাস।
 - ◆ NAD-Malic Enzyme সমূহ- মিষ্টিমুগ, কাউন, চিনা।
 - ◆ Phosphoenolpyruvate carboxykinase সমূহ- গিনি ঘাস।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণের অপটিমাম তাপমাত্রা হল- $22-35^\circ$ সে।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণের হার নির্ভর করে- আলো, তাপ, CO_2 , ক্লোরোফিল এর উপস্থিতি।
 - ◆ Law of minimum প্রস্তাব দেন- লিবিগ।
 - ◆ সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করা যায়- CO_2 বৃদ্ধি করে।
 - ◆ শ্বসনের প্রধান অঙ্গ হল- সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া।
 - ◆ সকল শক্তির মূল উৎস- সূর্য এবং শক্তির মূল উৎস ATP।
 - ◆ গ্রাইকোলাইসিস হতে পাই- ২-অণু করে ATP, NADH + H^+ এবং পাইক্লিক এসিড তৈরি হয়।

গ্লুকোস্টেরিক এনজাইম হল- ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ ।
 রসাত ও সবাত শ্বসনের প্রথম পর্যায় হল- গ্লাইকোলাইসিস ।
 গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় মূল উদ্দেশ্য হল- পাইক্ভিক এসিড তৈরি ।
 গ্লাইকোলাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান হল-
 ক্রিসিটাইল Co-A ।
 ক্রেবস চক্রে আবাসিক অণু বলা হয়- অক্সালো এসিটিক এসিড ।
 FTS অবস্থিত- মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেনে ।
 ইস্টের ফার্মেন্টেশনের প্রধান এজাইম- জাইমেজ ।
 ইস্টের ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে আপেল হতে- সিডার এবং আঙ্গুর হতে- ওয়াইন
 তৈরি করা হয় ।
 গ্লুকোজের শ্বসনিক/কোশেট হার- 1
 ক্রেবস চক্রে ATP পাই- 24 অণু ।
 গ্লুকোজে গ্লুকোজের শক্তি নির্গমন ক্ষমতা হল- 55.4% ।
 গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ATP খরচ হয়- 2টি ।
 রাসাত কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ- 0.03% ।
 রসাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ থেকে ATP উৎপন্ন হয়- 36 অণু ।
 ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে সর্বশেষ ইলেকট্রন গ্রহীতা হলো- অক্সিজেন ।
 গ্লুকোজ চক্রে CO₂ গ্রহীতা হলো- রাইবুলোজ-1,5-বিসফসফেট ।
 ফটোসিসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া- 2 প্রকার । যথা- চক্রীয় এবং অচক্রীয় ।
 গ্লুকোসংশ্লেষণে O₂ নির্গত হয়- পানি থেকে ।
 প্রস্বদনের সময় পত্রকণের খোলা ভূরাশিত কলে- নীল বর্ণের আলো ।
 ক্লোড জাতীয় পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণের প্রক্রিয়াকে বলা হয়-
 ইমবাইবিশন ।
 টিউদের অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য উপাদান হলো- 19টি ।
 গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় নীট ATP এর সংখ্যা হলো- 2টি ।

- ◆ গ্রাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ উৎপাদিত বস্তু হলো- পাইরুভিক এসিড।
- ◆ ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো- ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড।
- ◆ দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো- ৩৯০-৭৬০ nm।
- ◆ শ্বসন ক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে- অক্সিজেন।
- ◆ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে সাহায্য করে- *Bacillus megatherium*।
- ◆ সাইটোক্রোম পাম্প তত্ত্ব দেন- লুভেগড়।
- ◆ উদ্ভিদের দুই পার্শ্বে রক্ষীকোষ থাকে- ২টি।
- ◆ প্রোটোপ্লাজমে শতকরা পানি থাকে- ৯০ ভাগ।
- ◆ উদ্ভিদ মাটি থেকে ধনাত্মক আয়ন শোষণ করে- ১০টি।
- ◆ মাটিকণা তার কলয়েড ধর্মের দ্বারা যে পানি ধরে রাখে তাকে বলা হয়- কণা বিশোষিত পানি।
- ◆ মাটি কণার ফাকে ফাকে সম্বিষ্ট পানিকে বলা হয়- কৈশিক পানি।
- ◆ নীল রং এর রঞ্জক পদার্থ হলো- ফাইকোসায়ানিন।
- ◆ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম উদ্ভিদ কোষের সংগঠিত হয়- মাইটোকন্ড্রিয়াতে।
- ◆ Cytochrome হলো- লৌহযুক্ত হিম প্রপবিশিষ্ট প্রোটিন।
- ◆ ক্রোরোপ্লাস্টের সালোকসংশ্লেষণের আলোক- নির্ভর বিক্রিয়া সংগঠিত হয়- থাইলাকয়েড মেমব্রেনে।
- ◆ ক্রোরোফিল 'b' এর আণবিক সংকেত হলো- $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ ।
- ◆ বায়ুমণ্ডলের আলোর পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।
- ◆ C_3 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা হলো- 10-25°।
- ◆ উদ্ভিদের শ্বসনের ধাপ নিয়ন্ত্রণ করে- এনজাইম।
- ◆ স্বভাব শ্বসনে গ্লুকোজের শ্বসনিক হার- 1।
- ◆ 1 অণু $NADH_2$ হতে ATP পাওয়া যায়- 3 অণু ATP।
- ◆ অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন উৎপন্ন ATP হলো- ১টি।

APYQ

ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

- II. উদ্ভিদে সবচেয়ে ধীর গতিতে শোষিত হয় কোনটি? [C. AG. 2022-23; 21-22]
A. K^+ B. Ca^{2+} C. Na^+ D. Mg^{2+}

ⓑ Explanation/ • K^+ ও NO_3^- আয়ন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে শোষিত হয়।
• Ca^{2+} ও SO_4^{2-} আয়ন সর্বাপেক্ষা মন্থরগতিতে শোষিত হয়।

১১. সাইট্রিক এসিড চক্রে নির্গত হাইড্রোজেন গ্রহণ করে কোনটি? [C. AG. 2021-22]
- A. GTP B. ATP C. NADP D. FAD

① Explanation সাকসিনিক এসিড, $2H^+$ হারিয়ে ফিউমারিক এসিড-এ পরিণত হয়। এখানে এক অণু FAD হতে এক অণু $FADH_2$ তৈরি হয়। সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে, বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

11. গ্রাইকোলাইসিস ও ফ্রেবস চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান কোনটি? [C. AG. 2021-22]

A. সাইট্রিক এসিড
B. পাইক্লভিক এসিড
C. অ্যাসিটাইল Co-A
D. অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড

● **Explanation/** পাইরুভিক এসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে তিন অণু CO_2 উৎপন্ন করে। এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড। অ্যাসিটাইল Co-A হলো গ্রাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান। ম্যাট্রিক্সে স্থায়ী অবস্থানের কারণে অক্সালো এসিটিক এসিডকে আবাসিক অণু বলা হয়।

4. কোনটি ট্রাইকার্বোজিলিক চক্র? [C. AG. 2021-22]

A. গ্রাইকোলাইসিস
B. ফ্রেবস চক্র
C. C_3 চক্র
D. C_4 চক্র

② Explanation চক্রটির আবিষ্কারকের নামানুসারে একে ড্রেবস চক্র বলা হয়। এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ সাইট্রিক এসিড, তাই এই চক্রকে সাইট্রিক এসিড চক্রও বলা হয়। সাইট্রিক এসিডে 3টি কার্বোক্সিল ($-\text{COOH}$) গ্রুপ থাকায় এই চক্রকে ট্রাই কার্বোক্সিলিক এসিড (TCA) চক্র বলা হয়।

05. কোন আলোতে পত্রবৃক্ষের খোলা তুরাশ্বিত হয়? [C. AG. 2021-22]
A. লাল B. নীল C. হলুদ D. কমলা

ⓑ Explanation/ ব্রু-লাইট বা নীল আলো এবং পটাশিয়াম আয়ন পত্রের উপর তরঙ্গিত করে।


06. সালোকসংশ্লেষণের সময় মুক্ত অক্সিজেন কোথা থেকে আসে? [C. AG. 2020-21]

A. CO₂
C. Phosphoglyceric acid


B. Water
D. Chlorophyll

❶ Explanation সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস হলো পানি (H₂O)। পরীক্ষাগুলো নিম্নরূপ:


i. হিল বিক্রিয়া : (রবিন হিল) সাল ১৯৩৭



- ii. ড্যান নীল এর বিক্রিয়া (Van Neil)



- iii. স্যামুয়েল বুবেন ও কামেন এর তেজস্ক্রিয় পরীক্ষা:



- তেজস্ক্রিয় O_2^{18} দ্বারা পানির O_2 চিহ্নিত করা হয়।

07. গ্রাইকোলাইসিস কোথায় ঘটে? [C. AG. 2020-21]

A. সাইটোপ্লাজম B. ক্রোরোপ্লাস্ট C. রাইবোজোম D. মাইটোকন্ড্রিয়া

Ⓐ Explanation/বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংগঠনের স্থান:

ক্রিয়া-বিক্রিয়ার নাম	সংগঠনের স্থান
ETS	মাইটোকন্ড্রিয়ার মেমব্রেনে
সালোকসংশ্লেষণ	ক্লোরোপ্লাস্ট
আলোকনির্ভর অধ্যায়	থাইলাকয়েড মেমব্রেন
আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়	ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা

[BAU-16-17; SylAU. 2008-09]

- [BAU. 2000-01, 2005-06, 2016-17; PSTU 15-16]

- [BAU. 2008-09]

- [BAU. 2007-08]

- [BAU. 2007-08, CVASU-2008-09]

- [BAU. 2004-05, 07-08, SylAU 11-12]

- ### B. সাইটোপ্রাজমে

- [BAU 2006-07]

- B. নাইট্রোজেন ফিক্সেশন

- ### D.ডি-নাইট্রিফিকেশন

- B. ଭଞ୍ଜ

- [BAU 2005-06, PSTU 2013-14, JVC 2014-15]

- ### B. ব্যাপন

- କ ଶକ୍ତିତେ

- D. ইমবাইবিশন

- [BAU 2004-05]

- Ans C**

- Explanation** চক্রীয়, অচক্রীয় ফটোসফোরাইলেশন এর ক্ষেত্রে ১ অনু ATP তৈরী হয়।



- A. সাইট্রিক এসিড
B. আইসোসাইট্রিক এসিড
C. সাকসিনিক এসিড
D. ম্যালিক এসিড

- ক্রেবস চক্রে নীট উৎপাদন- চার অণু CO_2 , ছয় অণু NADH_2 , দুই অণু FADH_2 এবং 2 অণু GTP ।

- A. ইমবাইবিশন
B. ডিফিউশন
C. প্রস্বেদন
D. অসমোসিস

- A. ইথানল ও CO_2 B. ল্যাকটিক এসিড ও CO_2
C. ফসফোগ্লিসারিক এসিড ও CO_2 D. ম্যালোট ও CO_2

- Ⓐ Explanation** / পাইক্লভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ:



- A. অন্ধকার পর্যায়ে B. অচৈতন্য আলোক পর্যায়ে

- C. চক্রীয় আলোক পর্যায়ে D. কোনটিই সঠিক নয়

- A 3- ফসফাগিসাবিক এসিড B ডি-কার্বডি

- C. ফসফোহাইড্রোজেনাল পাইক্লডিক এসিড D. ডিহাইড্রোঅক্সিজেনাল পাইক্লডিক এসিড

- ⦿ **Explanation:** About C & C: উদ্ভিদ:

- **Explanation** About C_3 & C_4 cycle:

- ক্যালাবিনচক্রে CO_2 গ্রহণ হল RuBP (রাইবুলোজ ১,৫ বিসফসফেট)।

- C_3 চক্রে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হল $\rightarrow$ 3-C বিশিষ্ট 3-ফসফোগ্লিসারিক এসিড।

- C_4 চক্রে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হল 4-কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড।

- C, উদ্ভিদে ক্যালভিনচক্র সম্পন্ন হয় মেসোফিল কোষে।

- C. উদ্ভিদে ক্যালভিনচক্র পাতার বাম্ভল শীথ কোষে।

- আলোক নিৰপেক্ষ অধ্যায়েৰ বিক্ৰিয়াসমূহ সৌম্যতে সংঘটিত হয়।

- [illegible]

- A. অভিস্রবণ B. শোষণ

- C. শ্বসন D. প্রশ্বেদন

নিচের কোনটি আয়রন-সালফার প্রোটিন?

[SylIAU. 2017-18]

- A. গ্রাস্টোসায়ানিন B. ফিফোফাইটিন
C. ফেরিডক্সিন D. এনএডিপি-রিডাকটেজ

Explanation থাইলাকয়েড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন:

- ফিফোফাইটিন: একটি রূপান্তরিত ক্লোরোফিল-a অণু।
- গ্রাস্টোসায়ানিন: অতি ছোট চলনশীল লিপিড যা থাইলাকয়েড মেমব্রেনে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।
- সাইটোক্রোম: সাইটোক্রোম হলো লৌহঘটিত হিম গ্রুপবিশিষ্ট প্রোটিন।
- গ্রাস্টোসায়ানিন: অত্যন্ত চলনশীল একটি ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন।
- ফেরিডক্সিন: এটি একটি আয়রন-সালফার (Fe-S) প্রোটিন।
- NADP-রিডাক্টেজ: এটি আসলে একটি ফ্ল্যাভোপ্রোটিন এবং বাউন্ড কো-এনজাইম FAD।

নিচের কোন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন পরে না?

[SylIAU. 2017-18]

- A. Krebs cycle B. Glycolysis C. Acetyl Co-A D. Calvin cycle

Explanation সবাত ও অবাত উভয় শ্বসনের প্রথম ধাপ গ্লাইকোলাইসিস এই ধাপে O_2 এর প্রয়োজন পড়ে না।

Biogenic Law এর প্রবক্তা কে?

[SylIAU.2015-16]

- A. Dr. Wilfred G. Bigelow B. Sir Francis Galton
C. Edward Janner D. Earnest Hackel

Explanation Edward Janner- গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কারক; Ernst Hackel "Ecology" শব্দের প্রবর্তক।

‘ল অব মিনিমাম’ এর প্রস্তাবক কে?

[SylIAU.2015-16]

- A. লুভবার্গ B. লিবিগ C. বেনেট ক্লার্ক D. জে.কে. পানাম

Explanation ‘ল অব মিনিমাম’- লিবিগ; ‘ল অব টলারেন্স’ - শেলফোর্ড; ‘ল অব লিমিটিং ফ্যাক্টর’ - ব্রাকম্যান।

উদ্ভিদের প্রধান ট্রান্সলোকেটেড সুগার কোনটি?

[SylIAU.2015-16]

- A. গ্লুকোজ B. ফ্রুক্টোজ C. সুক্রোজ D. মল্টোজ

Explanation উদ্ভিদের প্রধান ট্রান্সলোকেটেড সুগার হল সুক্রোজ। এ জন্য সুক্রোজ কে প্রধান শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ধরা হয়।

উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র পূর্ণখোলা থাকে-

[SylIAU.2013-14]

- A. সকাল ৬-৮ টা B. সকাল ১০-১১টা C. সকাল ৩-৫ টা D. রাত্রিতে

Ans B

ক্রোরোফিল-a এর আণবিক সংকেত-

[SylIAU. 2011-12]

- A. $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ B. $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$
C. $C_{55}H_{72}O_6N_4Mg$ D. $C_{55}H_{70}O_5N_4Mg$

Explanation কিছু সংকেত:

- ক্রোরোফিল a $\rightarrow C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ • ক্যারোটিন $\rightarrow C_{40}H_{56}O$
- ক্রোরোফিল b $\rightarrow C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ • জ্যাঙ্কোফিল $\rightarrow C_{40}H_{56}O_2$
- ফাইকোসায়ানিন $\rightarrow C_{40}H_{44}O_8N_4$ • ফাইকোইরেট্রিন $\rightarrow C_{34}H_{46}O_8N_4$

নিচের কোনটি C_4 উদ্ভিদ নয়?

[SylIAU. 2011-12]

- A. ভুট্টা B. ইন্ডু C. মুখা ঘাস D. তামাক

Ans D

ATP তৈরী হয় কোন ফটোসফোরাইলেশন?

[SylIAU. 2010-11]

- A. চক্রীয় B. অচক্রীয়
C. উভয়টিতে D. কোনটিই নয়

Ans C

সবাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয় CO_2 ও পানি উৎপাদন কালে সর্বমোট ATP উৎপন্ন হয়-

[SylIAU. 2009-10, 2010-11, CVASU-2009-10, BAU. 2001-02, 2005-06]

- A. ১৮টি B. ৩৮টি C. ৩৬টি D. ৬টি

Ans C

ফুলের লাল বর্ণের জন্য দায়ী-

[SylIAU. 2010-11]

- A. বিটাসায়ানিন B. অ্যান্থোসায়ানিন
C. বিটাজ্যান্থিন D. ক্যারোটিন

Ans A

প্রজাতির উপর নির্ভর করে পাতার প্রতি এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকায় পত্ররন্ধ্র থাকতে পারে-

[SylIAU. 2010-11]

- A. ১০০০-৬০০০০টি B. ১০-৬০০টি
C. ১-৬টি D. কোনটিই নয়

Ans A

16. সালোকসংশ্লেষণের জন্য অপটিমাম তাপমাত্রা হলো-

[SylIAU. 2009-10]

- A. $12^\circ C - 35^\circ C$ B. $22^\circ C - 35^\circ C$ C. $22^\circ C - 37^\circ C$ D. $27^\circ C - 40^\circ C$

Explanation এক নজরে আরও গুরুত্বপূর্ণ অপটিমাম তাপমাত্রা:

- লবণ পরিশোধন $\rightarrow 20-30^\circ C$ • ক্যালভিন চক্র $\rightarrow 10-25^\circ C$
- হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্র $\rightarrow 30-45^\circ C$ • শ্বসন $\rightarrow 20-35^\circ C$
- সালোকসংশ্লেষণ $\rightarrow 22-35^\circ C$

17. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধে কোন এনজাইম জড়িত থাকে?

[SylIAU. 2009-10]

- A. ফসফাটেজ B. ফসফোরাইলেজ
C. হাইড্রোলেজ D. ডিহাইড্রোজেনেজ

Ans B

18. ক্যালভিন চক্রের প্রয়োজনীয় এনজাইম সংশ্লেষণ করে-

[SylIAU. 2009-10]

- A. ক্রোরোপ্রাষ্ট B. মাইটোকন্ড্রিয়া
C. গলজি বডি D. সবকটি

Ans A

19. ক্রোরোপ্রাটে ক্রোরোফিল রঞ্জকের পরিমাণ হলো-

[SylIAU. 2008-09]

- A. ২৫% B. ৫০%
C. ৭৫% D. ৯০%

Ans A, C

20. সূর্য হতে আগত রশ্মির কতভাগ শক্তি সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়?

[SylIAU. 2008-09]

- A. ০.০২ B. ০.০১ C. ০.০০১ D. ০.১০

Ans B

21. ইন্সট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অবস্থিত-

[SylIAU. 2008-09]

- A. স্ট্রোমাতে B. ম্যাট্রিক্সে
C. ক্রিস্টিতে D. কোনটিই নয়

Ans B

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

01. গ্লাইকোলাইসিস সংঘটিত হয়-

[CVASU. 2018-19]

- A. সাইটোপ্লাজম-এ B. মাইটোকন্ড্রিয়ার-ম্যাট্রিক্স-এ
C. নিউক্লিয়াস D. গ্রানা-য়

Explanation বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংগঠনের স্থান: C.A.G. 2020-21 এর ব্যাখ্যা দেখো।

02. সালোকসংশ্লেষণ-এর প্রধান রঞ্জক হলো-

[CVASU. 2018-19]

- A. ক্রোরোফিল-a B. ফাইকোইরিট্রিন C. ক্যারোটিন D. জ্যাঙ্কোফিল

Explanation এছাড়া জ্যাঙ্কোফিল, ক্যারোটিন এবং ক্রোরোফিল-b থাকে।

03. ক্রোরোফিল আলোক রশ্মির কোনটি শোষণ করে-

[CVASU. 2018-19]

- A. আয়ন B. নিউট্রন C. ফোটন D. ইলেকট্রন

Explanation ক্রোরোফিল আলোক রশ্মির ফোটন শোষণ করে যা হতে ATP তৈরি হয়।

04. ক্রান্তি অ্যানাটমী দেখা যায়-

[CVASU. 2018-19]

- A. CAM উদ্ভিদে B. C_4 উদ্ভিদে C. C_3 উদ্ভিদে D. এর সবগুলোতে

Explanation পাতার বাউলসীথ কোষকে ঘিরে মেসোফিস টিস্যুর ঘনস্তরকে ক্রান্তি অ্যানাটমী বলে।

05. সালোক সংশ্লেষণ নির্গত অক্সিজেনের উৎস কি?

[CVASU. 2018-19]

- A. CO_2 B. H_2O C. O_3 D. CO

Explanation সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি (H_2O), যা রবিন হিল এবং রুবেন ও কামেনের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত।

06. কোনটি C_4 উদ্ভিদ?

[CVASU. 2017-18]

- A. ধান B. গম C. পাট D. ইন্ডু

Ans D

07. কোন অম্লটি ক্রেবস চক্রের সাথে সম্পৃক্ত নয়?

[CVASU.2015-16]

- A. সাইট্রিক এসিড B. ফিউমারিক এসিড
C. অক্সালো এসিটিক এসিড D. নাইট্রিক এসিড

Explanation ক্রেবস চক্রের সাথে সম্পৃক্ত Acid সাইট্রিক, আইসোসাইট্রিক, α -কিটোগুটারিক, সাকসিনিক, ফিউমারিক, ম্যালিক, অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড।

08. অভিশ্রবন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের ঝিল্লী প্রযোজ্য?

[CVASU.2015-16]

- A. ভেদ্য B. বৈষম্যভেদ্য C. অভেদ্য D. কোনটি নয়

Explanation সকল দ্রব্য ও দ্রাবককে প্রবাহিত হতে দেয় $\rightarrow$ বৈষম্যভেদ্যঝিল্লী।

09. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন রঙের আলো বেশী ব্যবহৃত হয়?

[CVASU.15-16]

- A. লাল ও সবুজ B. লাল ও কমলা C. লাল ও নীল D. লাল ও বেগুনী

Explanation সালোকসংশ্লেষণে বেগুনী-নীল ও কমলা-লাল আলো বেশি ব্যবহৃত হয় এবং একক আলো হিসাবে লাল আলো।

10. C₃ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে প্রথম স্থায়ী যৌগ কোনটি? [CVASU. 07-08, 14-15]
- A. পাইরুভিক এসিড B. অক্সালো-এসিটিক এসিড
C. ফসফোগ্লিসারিক এসিড D. সাকসিনিক এসিড
- ☛ **Explanation** / C₃ উদ্ভিদের প্রথম পদার্থ হলো ফসফোগ্লিসারিক এসিড এবং
C₄ উদ্ভিদের প্রথম স্থায়ী পদার্থ অক্সালো এসিটিক এসিড।

11. ক্যালভিন চক্রে কোন পদার্থটি জমা হয়? [CVASU.2014-15]
 A. কিতোএসিড B. ফসফোগ্লিসারালডিহাইড
 C. গ্লুকোজ D. রাইবিউলোজ ১, ৫, বিসফসফেট Ans C
12. মূলরোম হতে পানি ও খনিজ লবণ জাইলেম পর্যন্ত যেতে কয়টি পাথওয়ে অনুসরণ করে? [CVASU.2014-15]
 A. ৫টি B. ৩টি C. ৪টি D. ২টি

- (B) Explanation** ইমবাইশন → ডিফিউশন বা ব্যাপন → অসমোসিস (অভিস্রবণ)।
13. উদ্ভিদের মাটি হতে পানি শোষণ করে মূলের কোন অঙ্গের মাধ্যমে? [CVASU, 2010-11]
A. শাখা ফুল B. প্রধান ফুল C. মূলরোম D. মূলত্রান **[Ans C]**
14. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী নয়- [CVASU, 2010-11]
A. আয়রণ B. সাইটোট্রোম C. pH D. আয়ন **[Ans A]**
15. সালোকসংশ্লেষের ফলে- [CVASU, 2010-11]
A. আয়ন শোষণ হয় B. পানি পরিশোধন হয়
C. ATP উৎপন্ন হয় D. শর্করা উৎপন্ন হয় **[Ans D]**
16. একটি ATP হতে সর্বোচ্চ কত কিলোক্যালরী শক্তি পাওয়া যায়? [CVASU, 2006-07]
A. ৭.৫ B. ১০ C. ১২ D. ২০ **[Ans B]**

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. মেসোফিল কি ধরণের কলা? [PSTU. 2018-19]
- A. পাতার ক্লোরেনকাইমা B. কাণ্ডের ক্লোরেনকাইমা
C. মূলের ক্লোরেনকাইমা D. সব কয়টি

- Ⓐ Explanation/** প্যারেনকাইমা টিস্যুতে ক্লোরোফিল উপস্থিত থাকলে তাকে ক্লোরেনকাইমা বলে। পাতার ক্লোরেনকাইমাকে মেসোফিল বলে।

02. বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব কতটুকু বাড়লে শ্বসনের হার দ্বিগুন হবে? [PSTU-G.2017-18]
- A. 0.20% B. 0.25% C. 0.30% D. 0.35%

- ⓑ Explanation/** বাতাসে CO_2 ঘনত্ব 0.25% বাড়লে শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। অন্যদিকে, বাতাসে যদি O_2 ঘনত্ব 20% থেকে 5% এ নেমে আসে তাহলেও শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

03. প্রস্বেদনে হার বেড়ে যাওয়ার কারণ কোনটি? [PSTU-G.2017-18]
- A. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে B. তাপমাত্রা হ্রাস হলে
- C. মাটিস্থ পানি কম হলে D. পুরু কিউটিকলের উপস্থিতি

- Ⓐ Explanation** আপেক্ষিক অর্দ্রতা কম হলে প্রষেদনের হার বেড়ে যায়। কারণ আপেক্ষিক অর্দ্রতা কম হলে বায়ু অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে আপেক্ষিক অর্দ্রতা বেড়ে গেলে বায়ু কোষাতন্তুর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলে প্রষেদনের হার হ্রাস পায়।

04. গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ ঢলে পড়ার জন্য কোন প্রক্রিয়াটি দায়ী?
[PSTU-G.2017-18]
- A. অভিশ্রবণ
B. ব্যাপন
C. প্লাজমোলাইসিস
D. ইমবাইশিশন
- Ans D**

05. স্বসনের কোন পর্যায়ে গ্লুকোজ জারিত হয়? [PSTU, 2016-17]
- A. গ্লাইকোলাইসিস B. ফ্রেবস চক্রে
C. ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্রে D. এসিটাইল কো এ
- Ans C

06. কোন আলোতে সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষন হয়? [PSTU, 2016-17]
A. সবুজ B. নীল C. লাল D. কমলা **Ans C**

07. C₄ উদ্ভিদ কোনটি? [PSTU.2015-16]
A. ধান B. গম C. ইক্ষু D. যব

- Explanation/ C₄ উদ্ভিদ → ইন্ডু, বাজরা, ডাটা, মুথাঘাস।

৪৮. উদ্ভিদের শ্বসনের ধাপকে নিয়ন্ত্রণ করে? [PSTU.2013-14]
A. এনজাইম B. জিবেরেলিন C. প্রভাবক D. ভিটামিন **Ans A**

09. কোন উদ্ভিদ মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়?
A. ভুট্টা B. ধান C. ছোলা D. আম [PSTU. 2013-14] Ans C
10. উদ্ভিদের কোন অংশে মেসোফিল টিস্যু বিদ্যমান?
A. মূলে B. কাণ্ডে C. পাতায় D. পুষ্পদণ্ডে [PSTU. 2013-14] Ans C
11. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কোথায় সম্পন্ন হয়?
A. এপিডার্মিসে B. কোষ ও শিরায় C. পত্ররন্ধ্র ও বায়ু কুঠুরিতে D. প্যালিসেড স্পঞ্জিকলার কোষে [PSTU. 2012-13] Ans D

NETWORK PRIME TEST

01. খনিজ লবণ পরিশোধণে 'Lundegardth Theory' অনুযায়ী বাহক হিসেবে কোনটিকে বর্ণনা করা হয়?
A. সাইটোক্রেম B. লেসিথিন C. সাইটোপ্লাজম D. কোশদ্বিভি
 02. সালোকসংশ্লেষণ ঘটে না-
A. পাতায় B. সবুজ কাণ্ডে C. শাখা-প্রশাখায় D. মূলে
 03. জীবদেহে পাইক্লডিক এসিড ল্যাকটিক এসিডে রূপান্তরিত হয়-
A. দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে B. কোষে খাদ্য ঘাটতি থাকলে
C. কোষে অক্সিজেনের অভাব হলে D. কোষে পানির পরিমাণ কম থাকলে
 04. ফাইকোসায়ানিন বিশিষ্ট ক্রোরোপাস্ট কোন বর্ণের?
A. হলুদ B. লাল C. নীল D. কমলা
 05. ক্লেবস চক্র প্রথম পদার্থ-
A. অ্যাসিটিক এসিড B. সাইট্রিক এসিড C. কার্বলিক এসিড D. পাইক্লডিক এসিড
 06. নিম্নের কোনটি সালোকসংশ্লেষণের জন্য আলোক শক্তি শোষন করে?
A. ADP B. ATP C. Chlorophyll D. NADPH₂
 07. উদ্ভিদের প্রবেশদ্বারের হার কোনটির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়?
A. গ্যাস পটেন্সিয়ার B. ল্যান্সিটিয়ার C. ল্যাকটোমিটার D. pH মিটার
 08. লবণ শোষিত হয় উদ্ভিদের কোন অঙ্গ দিয়ে?
A. মূল B. মূলরোম C. মূলের অগ্রভাগ D. কাণ্ড
 09. গ্লাইকোলাইসিসে নীচ কত অণু ATP তৈরী হয়?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
 10. ইস্ট হতে নিঃসৃত এনজাইম কোনটি?
A. মলটেজ B. জাইমেজ C. ইনভারটেজ D. সবগুলো
 11. সাইটোক্রেম কি?
A. হিম গ্রুপ বিশিষ্ট প্রোটিন B. ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন
C. আয়রন-সালফার প্রোটিন D. ফ্লাভোপ্রোটিন
 12. শ্বসন প্রক্রিয়ার ইলেক্ট্রন পরিবহনতন্ত্র এর অবস্থান কোথায়?
A. সাইটোপ্লাজম B. মাইটোকন্ড্রিয়ার মেমব্রেন
C. মাইটোকন্ড্রিয়ার বহিঃকিলি D. মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃকিলি
 13. গাছের ট্রান্সপিরেশন হার মাপার যন্ত্রের নাম কী?
A. Hygrometer B. Potometer
C. Auxanometer D. Barometer
 14. শুষ্কবীজে পানি শোষণ প্রক্রিয়া হলো-
A. টারজিডিটি B. ডিফিউশন C. ইমবাইবিশন D. অসমোসিস
 15. গ্লাইকোলাইসিসকে কোন পাথওয়ে বলা হয়?

OMR SHEET			06. (A) (B) (C) (D)			12. (A) (B) (C) (D)		
01. (A) (B) (C) (D)			07. (A) (B) (C) (D)			13. (A) (B) (C) (D)		
02. (A) (B) (C) (D)			08. (A) (B) (C) (D)			14. (A) (B) (C) (D)		
03. (A) (B) (C) (D)			09. (A) (B) (C) (D)			15. (A) (B) (C) (D)		
04. (A) (B) (C) (D)			10. (A) (B) (C) (D)					
05. (A) (B) (C) (D)			11. (A) (B) (C) (D)					
ANS ANALYSIS			15.C	14.C	13.B	12.D	11.A	10.D
09.A	08.C	07.A	06.C	05.B	04.C	03.C	02.D	01.A

অধ্যায়
১১

প্রথম পত্র

জীব প্রযুক্তি
BIO-TECHNOLOGY

কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?



বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে

RATINGS
[কেন পড়ব?]

জীবপ্রযুক্তি, টিস্যু কালচারের ধাপ	★
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রাজমিড	★★★
জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব	★★
জিনোম সিকোয়েন্স ও জিন ক্লোনিং	★




টীকিত তালোচনা

CONCEPT-01 বায়োটেকনোলজি ও টিস্যুকালচার

ITEM-01

বায়োটেকনোলজি বা জীবপ্রযুক্তি

সন (১৯৬৮) এর মতে, জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদন প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীব প্রযুক্তি।



ITEM-02

টিস্যুকালচার

উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পাপড়ি) বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ করাকে টিস্যুকালচার বলে।

কারণভেদ:

Preparation and Practice are vital for effective delivery

- কক্ষমুকুল কালচার- চারা উৎপাদন
- দৈহিক কোষ থেকে জন্ম উৎপাদন (Somatic embryogenesis)
- মেরিস্টেম কালচার*- রোগমুক্ত চারা উৎপাদন
- প্রোটোপ্লাস্ট কালচার
- মাইক্রোপ্রোপাগেশন- চারা উৎপাদন
- পরাগধানী কালচার*- হ্যাণ্ডপ্রেড উদ্ভিদ উৎপাদন
- ক্যালাস কালচার এর মাধ্যমে সোমাক্রোনাল ভ্যারিয়েশন ও অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি হয়।

টিস্যুকালচারের ধাপসমূহ:

- মাতৃউদ্ভিদ বা এক্সপ্লান্ট নির্বাচন
- কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি:
 - বিভিন্ন ধরনের মুখ্য ও গৌণ উপাদান, ভিটামিন, সুকরোজ (২-৪%), ফাইটোহরমোন প্রভৃতি এ মিডিয়ামে থাকা প্রয়োজন।
 - মিডিয়ামের pH (৫.৫-৫.৮) এর মধ্যে রাখা হয়।
 - মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ আবাদ মাধ্যমকে ব্যাসাল মিডিয়াম বলে।
- জীবাণুমুক্তকরণ বা নির্বীজকরণ
 - নির্বীজকরণ যন্ত্র (Autoclave) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়
 - অটোক্লেভ যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপ (১২১°সে.), চাপ (১৫ পাউন্ড) ও সময় (২০ মিনিট) রাখা হয়।

iv. কাচের পাত্রে এক্সপ্লান্ট থেকে অনুচারা (Plantlet) তৈরী- In-vitro culture।

v. মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট বা টিস্যু স্থাপন।

vi. ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি।

- মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট তথা টিস্যু স্থাপনের পর পাত্রটিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো (৩,০০০-৫,০০০/১,০০০-৩,০০০ লাক্স), তাপমাত্রা (১৭°-২০°C) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৭০-৭৫%) নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়।

vii. মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন।

viii. চারা টবে স্থানান্তর।

ix. প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর।

◆ বাংলাদেশে টিস্যু কালচার গবেষণা:

- শীতপ্রধান দেশের ফ্রিজেবল ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্রাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ।
- আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবিজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্যাডিওলাস, লালপাতা ও নানাপ্রকারের অর্কিডের চারা উৎপাদন ইপিল-ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদি কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

CONCEPT-02 রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তি



ITEM-01

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

কোনো জীবকোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জীন প্রকৌশল বলা হয়।

- এ ধরনের জীবকে GEO (Genetically Engineered organism)/GMO (Genetically modified organism)/ LMO (Living modified organism) বলে।

◆ ধাপসমূহ:

i. DNA নির্বাচন

ii. বাহক হিসেবে প্রাসমিড DNA নির্বাচন

iii. নির্বাচিত ও বাহক DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কর্তন

iv. কর্তনকৃত DNA লাইগেজ এনজাইম দ্বারা জোড়া লাগানো

v. অনুলীপনের জন্য পোষক (*E. coli*) নির্বাচন

vi. কৃত্রিম DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকমিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো

vii. রিকমিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium* এ স্থানান্তর

viii. *Agrobacterium* দ্বারা উদ্ভিদ কোষে স্থানান্তর।



ITEM-02

প্রাসমিড

প্রাসমিড এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য	প্রাসমিড এর প্রকারভেদ
• ক্রোমোসোম বহির্ভূত বৃত্তাকার DNA অণুকে প্রাসমিড বলা হয় • প্রাসমিড বৃত্তাকার (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু • আণবিক ভর প্রায় $10^6 - 200 \times 10^6$ dalton • অল্পসংখ্যক জিন ধারণ করে থাকে • রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্রাসমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায় • কোনো কোনো প্রাসমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন: Colicin, Vibriocin ইত্যাদি • অর্ধ সংরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় প্রতিলিপন ক্ষমতা সম্পন্ন	• F এবং F' প্রাসমিড: ব্যাকটেরিয়ার দেহে পিলি তৈরী করে • R প্রাসমিড: R_6 প্রাসমিড ৬টি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন • কোল প্রাসমিড: কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল <i>E.coli</i> কোষকে ধ্বংস করতে পারে। ভিত্রিওসিন সংবেদনশীল <i>Vibrio cholerae</i> কোষকে ধ্বংস করে দেয় • Virulence plasmid: ব্যাকটেরিয়াকে প্যাথোজেনে পরিণত করে। Ti Plasmid (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) উপস্থিতির কারণে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ক্রান্তন পল রোগ সৃষ্টি হয় • Degradative plasmid: অস্বাভাবিক বস্তুকে হজমে সহায়তা করে (টলুইন ও স্যালিসাইলিক এসিড)



ITEM-03

জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব

◆ কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ:

- ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ: *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে ফলে পোকা আক্রমণ করতে পারে না।
- গুণগত মান উন্নয়ন: রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া প্রাসমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্রোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে।
- সুপার রাইস: *Japonica* টাইপ ধানে, ডায়াফেডিল থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এই ধানে ভাত মানুষ ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মায়েরা দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে।
- রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ফলে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উদাহরণ: Bt বেগুন, তুলা।
- নাইট্রোজেন সংরক্ষণ: বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবেদনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে 'নিফ জিন' (যা নাইট্রোজেন সংরক্ষণের জন্য দায়ী) *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন' বাহী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে।
- দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টি: জোনাকি পোকার দেহে লুসিফারেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে 'লুসিফেরিন' নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে।
- ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী সৃষ্টি: রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সাহায্যে ট্রান্সজিন সন্নিবেশিতকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীকে ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী বলা হয়।
- কীট-পতঙ্গ রোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি: *Bacillus thuringiensis* (Bt) নামক মৃত্তিকাবাসী বড় ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছে যা কীট-পতঙ্গনাশক।

কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ:

টিস্যু প্লাসমিনোজেন অ্যাকটিভেটর (Tissue Plasminogen Activator = TPA): TPA প্রাজমিনোজেনকে কর্মক্ষম অবস্থায় আনে। ফলে জমাটবাধা রক্ত গলে যায়।

ইরিথ্রোপোইটিন (EPO): EPO বোনম্যারেতে প্রবেশ করে RBC তৈরিতে সহায়তা করে।

জীন থেরাপি: কোন নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জীনকে সঠিক করার পদ্ধতি জীন থেরাপি।

মলিকুলার ফার্মিং: ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদেরকে বায়ো-রিঅাক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা হয়ে থাকে।

বায়োফার্মিং: যখন ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বড় মাত্রায় উৎপাদন করা হয় তখন তাকে বায়োফার্মিং বলে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা: অণুজীবের সহায়তায় দুধের কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কাগজ ও কাগজের মণ্ড এবং নির্গত বর্জ্য পদার্থে *Torula* নামক ইস্ট জন্মায় যার মধ্যে প্রচুর আমিষ থাকে। *Saccharomyces cerevisiae* এবং *Torula utilis* বর্জ্য পদার্থের মধ্যে জন্মায়। এদের থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

সমুদ্র তেল নির্গমন: *Pseudomonas*, *Nocardia*, *Mycobacteria*, বিশেষ ধরনের ইস্ট ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে। যা দ্বারা সমুদ্রের তেল নির্গমন করা হয়।

পল্লবর্জ্য বা সিউয়েজ আতীকরণ: *Zooglea ramigera* ব্যাকটেরিয়াম এ কাজে ব্যবহৃত হয়। এন্টিভেটেড স্ল্যাজ পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন করা হয়।

ইনসুলিন ও ইন্টারফেরন সম্পর্কিত তথ্য:

ইনসুলিন	ইন্টারফেরন
- ইনসুলিন একটি হরমোন যা অগ্ন্যাশয় বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। - ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন ১৫৩টি বেস নিয়ে গঠিত এবং ১১ নং ক্রোমোসোমে থাকে। - ইনসুলিন ৫১টি অ্যামাইনো এসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। - আমেরিকার Eli Lilly & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় হিউমুলিন নামে।	- ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন। - ইন্টারফেরনের আণবিক ওজন ২০০০০-৩০০০০ ডালটন। - কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসরণ করে। - বিতর্কিত ইন্টারফেরন (Betaferon) বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। ইন্টারফেরনের কাজ: - অনাক্রম্যতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে। - B ও T লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধিকে দমন করতে। - ভাইরাসজনিত অসুখে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে। - NK কোষ এর ক্ষমতা ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে বাধা দিতে।

CONCEPT-03 জিনোম সিকোয়েন্স ও জিন ক্লোনিং

ITEM-01

জিনোম সিকোয়েন্স

DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলো কোন অনুক্রমে (কোনটির পর কোনটি) সজ্জিত থাকে তা হলো জিনোম সিকোয়েন্স, আর এই সিকোয়েন্সটি (সাজানো পদ্ধতি) উদ্ঘাটন করাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং।

কোনো একটি প্রজাতির একটি নিউক্লিওসোম ক্রোমোসোমের একটি সেটকে বলা হয় জিনোম।

মানবদেহে এক জোড়া বা দুইটি জিনোম আছে।

একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট বলা হয়।

পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি।

বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও তার সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য:

জীবের নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	স্কারজোড়
<i>E. coli</i>	১	৩২০০	৪.৬ মিলিয়ন
<i>Haemophilus influenzae</i>	১	১৭০০	১.৮ মিলিয়ন
ইস্ট	১৬	৬০০০	১২.১ মিলিয়ন
<i>Arabidopsis thaliana</i> (পুষ্পক উদ্ভিদ)	১০	২৫০০০	১০০ মিলিয়ন
মানুষ	৪৬	২৫০০০ (+বহু অপ্রকাশিত)	৩.২ বিলিয়ন

ITEM-02

জিন ক্লোনিং

DNA ক্লোনিং: রিকমিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে DNA ক্লোনিং করা হয়। এটি জিন ক্লোনিং নামেও পরিচিত।

রিপ্রোডাক্টিভ ক্লোনিং: জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হলো রিপ্রোডাক্টিভ ক্লোনিং। ডলি নামক ভেড়ার (১৯৯৬) সৃষ্টি এই পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

VVI DATA	NETWORK SPECIAL	AT A GLANCE
<i>Bacillus thuringiensis</i> নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক ভুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। টাইফসেট একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮ আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। মানুষের দেহের প্রতিটি কোষ ২৫০০০ পর্যন্ত কর্মক্ষম জিন বহন করে এবং মানুষের ৩৫০০টি জেনেটিক ডিজঅর্ডার জানা গেছে।	◆ <i>Pseudomonas</i>, <i>Nocardia</i>, <i>Mycobacteria</i> বিশেষ ধরনের ইস্ট ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে। ◆ আলু ও টমেটোর সংকর হলো পোমাটো। ◆ আলুতে অসমোটিন জিন দ্বারা <i>Phytophthora infestans</i> প্রতিরোধী উদ্ভিদ উদ্ভাবন করা হয়েছে।	

- ◆ প্যারব্যাক্টেরিয়ার জন্য ফেসব ব্যাকটেরিয়া কার্যকর, তাদের মধ্যে *Pseudomonas*, *Achromobacter*, *Enterobacter*, *Flavobacterium*, *Zoogaea*, *Micrococcus*, *Arthrobacter*, *Sphaerotilus* ও বিভিন্ন ধরনের কেরিনোব্যাক্টার ও মাইক্রোব্যাক্টার প্রধান।
 - ◆ ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis কোষ বহির্ভূতভাবে DNA ক্লোনিং এর দ্রুততম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
 - ◆ ডলি হলো পৃথিবীর প্রথম ক্লোনপায়ী যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ (ক্লোনিং কোষ) থেকে ক্লোন করা হয়েছে।
 - ◆ *E.coli*-তে ক্ষারক জোড় ৪৬ লাখ এবং জিন সংখ্যা ৩২০০।
 - ◆ *Thiobacillus ferrooxidans* এর রূপান্তরিত জাত ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহার হয়।
 - ◆ ১৯৭০ দশকে রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তি তথা জিন-প্রকৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর জীবপ্রযুক্তি বিষয়টি নতুনমাত্রা লাভ করেছে।
 - ◆ মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যম উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে।
 - ◆ Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাণ্ড্রেড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।
 - ◆ Electroporation পদ্ধতিতে পোষক কোষে DNA প্রবেশ করানো হয়।
 - ◆ Genegum পদ্ধতিতেও উদ্ভিদ কোষে DNA প্রবেশ করানো যায়।
 - ◆ প্রাজমিড বহন করে ব্যাকটেরিয়া (*E. coli*)।
 - ◆ ইনসুলিন এক প্রকার হরমোন যা প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
 - ◆ Ingo Potrykus- সুপার রাইস উদ্ভাবন করেন।
 - ◆ Lindermann- ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন।
 - ◆ Dr. F. Sanger- জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রবর্তক।
 - ◆ যে সব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না (যেমন: ধূজা, সাগর কলা) সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারাগাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।
 - ◆ ব্রু বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ দেখা যায়- জলীয় ও সামুদ্রিক।
 - ◆ Biotechnology এর নামকরণ করেন- কার্ল এরিকে।
 - ◆ টিস্যু কালচারের জনক হলেন- Gottfried Haberland।
 - ◆ জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অটোকেড যন্ত্রের তাপমাত্রা- ১২১° সে.।
 - ◆ সাধারণত রোগ মুক্ত চারা পাওয়া যায়- মেরিস্টেম কালচার করে।
 - ◆ ভ্রূণ উদ্ধার, দেহজ ভ্রূণ সৃষ্টি- গাজর, আলফা-আলফা।
 - ◆ প্রাজমিড আবিষ্কার করেন- Laderberg।
 - ◆ R-প্রাসমিড এ অ্যান্টিবায়োটিক বিদ্যমান- ৬টি।
 - ◆ *E. coli* কোষকে ধ্বংস করে- কোল প্রাসমিড।
 - ◆ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা হয়- ইমপ্লান্টা পদ্ধতিতে।
 - ◆ রেস্ট্রিকশন এনজাইমের অপর নাম- এন্ডোনিউক্লিয়েজ, Biological knife, Molecular scissor, আণবিক কাঁচি, সূক্ষ্ম ছুরিকা।
 - ◆ ক্ষতিকর পোকা প্রতিরোধী জাত- Bt. cotton।
 - ◆ মাস্টার ব্রু-প্রিন্ট বলা হয়- জিনোমকে।
 - ◆ ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে- ইন্টারফেরন।
 - ◆ টিকা উৎপাদন করা হয়- জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে।
 - ◆ রিকমিনেন্ট DNA শনাক্ত করা যায়- DNA probe দ্বারা।
 - ◆ রিকমিনেন্ট DNA দ্বারা তৈরি করা যায়- ইনসুলিন।
 - ◆ হৃৎরোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়- টিস্যু প্রাজমিনোজেন অ্যান্টিভেটর।
 - ◆ জিন ক্লোনিং এ ব্যবহৃত হয়- কাল্পিত জিন, এনজাইম, ক্লোনিং ভেক্টর।
 - ◆ পানিতে তেল শোধনে ব্যবহার হয়- *Pseudomonas aeruginosa*।
 - ◆ জিন প্রকৌশলে উত্তম বাহক- *E. coli*।
 - ◆ নাইট্রোজেন সংবন্ধনে ব্যবহৃত জিন- নিফ জিন।
 - ◆ হাইড্রোকর্ডন অক্সিডাইজিং অনুজীব হিসেবে কাজ করে- *Nocardia*।
 - ◆ গোল্ডেন রাইচ অভাব পূরণ করে- Vitamine-A।
 - ◆ লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন- PDH 45 জিন।
 - ◆ Biology শব্দের প্রবর্তন করেন- ল্যামার্ক।
 - ◆ কোলসিন উৎপাদনকারী জিন বহন করে- প্রাজমিড।
 - ◆ প্রাসমিড- ৩ প্রকার।
 - ◆ প্র্যান্ট টিস্যু কালচারে ব্যবহৃত ব্যাসাল মিডিয়ামের pH- ৫.৫-৫.৮।
 - ◆ সুপার রাইস আবিষ্কার করেন সুইডেনের বিজ্ঞানী- Ingo potrycus।
 - ◆ সুপার রাইসে ক্যারোটিন তৈরীর জন্য প্রতিস্থাপিত জিনের সংখ্যা- ৩টি।
 - ◆ ঈস্টের ক্রোমোসোম সংখ্যা- ১৬টি।
 - ◆ প্রাসমিড DNA অণুর দৈর্ঘ্য হলো- ০.৩৩-৬.৬।
 - ◆ আদি কোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে বলা হয়- সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।
 - ◆ জীবের DNA পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয়- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।
 - ◆ তোষাপাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করেন- ড. মাকসুদুল আলম।
 - ◆ রিকমিন্যান্ট DNA তৈরীর প্রক্রিয়াকে বলা হয়- জিন প্রকৌশল।
 - ◆ DNA খণ্ডকে প্রাজমিডে সংযুক্তকারী এনজাইম হলো- লাইগেজ।
 - ◆ ৫১টি অ্যামিনো এসিড নিয়ে গঠিত হয়- ইনসুলিন।
 - ◆ পাটের বেস পেয়ার- ১২০ কোটি।



ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

01. রিকমিনেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ-

[C. AG. 2022-23]

- A. লিফোকাইনস
B. সোম্যাটোস্ট্যাটিন
C. ইন্টারফেরন
D. হিউমেন ইউরোকাইনেজ

© Explanation/ ইন্টারফেরেন্স:

- ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন।
- বর্তমানে ক্রোন জিনকে প্রাজমিড বাহকের মাধ্যমে *Saccharomyces cerevisiae* এর কোষে ঢুকিয়ে ইন্টারফেরন উৎপাদিত হচ্ছে।
- প্রতি কোষে প্রায় 1 মিলিয়ন (10 লক্ষ) অণু ইন্টারফেরন তৈরি হয় এবং *E.coli* এর ভেতরে 1×10^5 অণু তৈরি হয়।
- কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসরণ করে।
- বিত্তুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন (Betaferon) বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়।
- NK কোষ এর ক্ষমতা ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে বাধা দিতে কাজ করে।

২. অতি ক্ষুদ্র টিস্যু থেকে বহু চারা উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলে- [C. AG. 2022-23]

- A. ক্রোনাল প্রোপাগেশন
B. মাইক্রোপ্রোপাগেশন
C. ক্যালাস কালচার
D. সোম্যাটিক অ্যান্ড্রিজেনেসিস

- ⑧ Explanation:** উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পাপড়ি) বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাব্যুৎপত্ত অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ করাকে টিস্যুকালচার বলে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টিস্যু থেকে হুবহু মাতৃ গুণাগুণসম্পন্ন বহু চার উৎপাদনের এ পদ্ধতি মাইক্রোপ্রোপাগেশন নামেও পরিচিত।

03. কোন প্রক্রিয়ায় রোগমুক্ত গাছের চারা উৎপাদন সম্ভব? [C. AG. 2022-23]

- A. কক্ষমুকুল কালচার
B. মেরিস্টেম কালচার
C. ক্যালাস কালচার
D. ভ্রূণ কালচার

ⓑ Explanation/ টিস্যুকালচারের প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্য-

প্রকারভেদ	উদ্দেশ্য
মেরিস্টেম কালচার	ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদ
এক্সপ্লান্ট কালচার	মাইক্রোপ্রোপাগেশন
সস্য কালচার	ডিপ্লয়েড ক্রোনাল প্রোপাগেশন
ক্যালাস কালচার	সোমাটিক অ্যান্ডিওজেনেসিস, সোমাক্রোনাল ভ্যারিয়েশন, অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি
ক্রপ কালচার	বীজহীন ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ
ক্রপ উদ্ধার	সংকরজাত বৈশিষ্ট্য রক্ষা
প্রোটোপ্লাস্ট কালচার	উন্নতজাত: সাইব্রিড, সংকর ট্রান্সফরমেশন প্রভৃতি
পুংধানী ও পরাগ রেণু কালচার	হোমোজাইগাস জাত সৃষ্টি

11. ইনসুলিন গঠন আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান কোন বিজ্ঞানী?

[BAU. 2005-06, SAU. 2014-15]

- A. ফ্রেডারিক সেনগার B. হরগোবিন্দ খোরানা
C. চার্লস ডারউন D. লুই পাস্তর

Ⓐ Explanation/ জীব প্রযুক্তিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের অবদান:

আবিষ্কারক/নামকরক	আবিষ্কার
Karl Ereky*	সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন
Morgan*	টিউপোটেন্সি (প্রতি সজিব উদ্ভিদ কোষের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ হওয়ার ক্ষমতা) কথা বলেন
Gottlieb Haberlandt*	টিস্যু কালচারের জনক
Jack Williamson	Genetic engineering শব্দটি ব্যবহার করেন
Laderberg*	প্রাজমিড আবিষ্কার করেন
Kary Mullis	PCR আবিষ্কার করেন
Ingo Potrykus*	সুপার রাইস উদ্ভাবন করেন
Edward Kripling ও Raymond Bushland	স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক আবিষ্কার
Eli Lilly & Company	ইনসুলিন আবিষ্কার করেন
Lindermann*	ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন
Dr. F. Sanger	জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রবর্তক

12. জিন প্রকৌশলে কোনটির গুরুত্ব অপরিণীম?

[BAU. 2005-06]

- A. ছত্রাক B. শৈবাল C. ভাইরাস D. ব্যাকটেরিয়া

Ⓐ Explanation/ জিন প্রকৌশলে প্রাজমিড একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাজমিড সাধারণত ব্যাকটেরিয়াতেই পাওয়া যায়। ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোম বহির্ভূত বৃত্তাকার DNA-কে প্রাজমিড বলে।

13. জৈব প্রযুক্তির প্রধান হাতিয়ারের নাম কি?

[BAU. 2002-03]

- A. DNA লাইগেজ B. প্রাজমিড
C. রিকমিন্যান্ট DNA D. এডোনিউক্লিয়েজ

Ans B

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. প্রথম জেনেটিক্যাল মডিফাইড কোন খাদ্য চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে?

[SAU 2017-18]

- A. BT ভূট্টা B. BT বেগুন
C. BT ধান D. BT গম

Ⓑ Explanation/ GMO ফসল:

- জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে GM ফসল বলে।
- গত ২২ জানুয়ারী ২০১৪, বাংলাদেশ প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (BT-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

02. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরীতে কোনটি বাহক হিসেবে কাজ করে?

[SAU2016-17]

- A. Plasmodium B. Penicium
C. Vibrio D. Agrobacterium

Ⓐ Explanation/ Agrobacterium হলো দভাকৃতির মৃত্তিকাবাসী গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়ায় Ti-প্রাজমিড থাকে। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরীতে Agrobacterium প্রাসমিড/ বাহক হিসেবে কাজ করে।

03. প্রাজমিড বিশিষ্ট কোন ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহৃত হয়?

[SAU.2014-15]

- A. Bacillus B. Clostridium
C. Escherichia D. Spirillum

Ans C

04. মলিকুলার ফার্মিং কি উপাদানের সাথে জড়িত?

[SAU.2013-14]

- A. এনজাইম B. প্রোটিন
C. ঔষধ D. এন্টিজেন

Ⓐ Explanation/ গবাদি পশুর দুগ্ধ, রক্ত ও মূত্র হতে ঔষধ তৈরীর প্রক্রিয়া হল মলিকুলার ফার্মিং।

05. ক্রোমোজোম বহির্ভূত DNA কে কি বলা হয়?

- A. অপেরন B. ওয়ানিন
C. ক্রোমাটিন D. প্রাজমিড

06. প্রাজমিড পাওয়া যায় কোনটিতে?

- A. আম গাছে B. ছত্রাকে
C. ব্যাকটেরিয়ায় D. ভাইরাসে

07. DNA এর নির্দিষ্ট স্থান জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়-

[SAU 2004-05, RU 2013-14, 2017-18, CVASU 2018-19]

- A. লাইগেজ B. এডোনিউক্লিয়েজ
C. লাইগেজ DNA D. এমাইলেজ

Ⓐ Explanation/ DNA-কে কাটা হয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে।

08. প্রাজমিড আছে কোনটিতে?

[SAU 2004-05]

- A. A. spergillus B. Penicillium
C. E. Coli D. Yeast

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উভয় অণুকে কোভ্যালেট বন্ধনী এর মাধ্যমে জোড়া লাগাতে কোনটি সাহায্য করে?

[SyIAU. 2018-19]

- A. রেস্ট্রিকশন এনজাইম B. লাইটিক এনজাইম
C. গাইরেজ এনজাইম D. লাইগেজ এনজাইম

Ⓐ Explanation/ জেনেটিক প্রকৌশলে লাইগেজ এনজাইম দ্বারা উৎস অণু কোভ্যালেট বন্ধনীর মাধ্যমে জোড়া লাগানো হয়। রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA কাটা হয়।

02. জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে E.coli ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়-

[SyIAU.2013-14]

- A. ভিটামিন B. প্রোটিন
C. ইনসুলিন D. চর্বি

Ans C

03. পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং উদ্ভাবন করেন-

[SyIAU. 2011-12]

- A. ড. মাকসুদুল আলম B. জগদীশ চন্দ্র বসু
C. ড.আবেদ চৌধুরী D. ড. জাফর ইকবাল

Ⓐ Explanation/ মাকসুদুল আলম ছিলেন একজন, বাংলাদেশী জিনতত্ত্ববিদ। তার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইজ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ঢাকা সফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝমাঝি সময়ে সফলভাবে উন্মোচিত হয় পাটের জিনোম সিকোয়েন্স। এছাড়া তিনি উদ্ভাবন করেন রাবার, পেঁপে, ছত্রাকের জিনোম।

04. প্রাজমিডের ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্যটি সত্য নয়?

[SyIAU. 2011-12]

- A. স্বজননক্ষম B. ক্রোমোজোমীয় DNA
C. বৃত্তাকার DNA D. সবক'টি

Ⓑ Explanation/ প্রাজমিড হচ্ছে স্বজননক্ষম ও বহিঃক্রোমোসোমীয় বৃত্তাকার দ্বৈত DNA অণু। উল্লিখিত অপশনে ক্রোমোজোমীয় DNA সঠিক নয়।

05. কোনটি আবিষ্কারের ফলে রিকমিনেন্ট DNA তৈরী সম্ভব হয়েছে?

[SyIAU. 10-11]

- A. RNA পলিমারেজ B. DNA পলিমারেজ
C. রেস্ট্রিকশন এডোনিউক্লিয়েস D. A ও C

Ans C

06. ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদে তৈরীতে নিচের কোন পদ্ধতি বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বহুল প্রচলিত?

[SyIAU. 2010-11]

- A. মেরিস্টেম কালচার B. ক্যালাস কালচার
C. হ্যাণ্ডয়েড কালচার D. প্রোটোপ্লাস্ট কালচার

Ans A

07. Recombinant DNA Technology তে ব্যবহৃত হয়-

[SyIAU. 2009-10]

- A. Bacillus B. Vibrio
C. Escherichia D. Pseudomonas

Ans C

08. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ উদ্ভাবিত ইনসুলিন প্রস্তুতিতে কোন অনুজীবটি ব্যবহৃত হয়?

[SyIAU. 2008-09]

- A. Bacillus subtilis
B. Vibrio cholerae
C. Escherichia coli
D. Pseudomonas fluorescens

Ans C

অধ্যায়
০৩

প্রাথমিক

কোষ রসায়ন CELL CHEMISTRY



কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	কার্বোহাইড্রেট	★ ★
02	অ্যামিনো এসিড	★ ★ ★
03	প্রোটিন	★ ★
04	এনজাইম	★ ★ ★
05	লিপিড	★



VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- ◆ ডিজিটালিন নামক স্টেরয়েড হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- ◆ সামান্য সর্বপ্রথম ইউরিয়েজ এনজাইম পৃথক করেন এবং বলেন যে, "Enzymes are proteins"।
- ◆ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম:
 - FAD • FADH₂ • FMN
 - NAD • NADH + H⁺ • NADP
 - NADPH + H⁺ • CoA • ATP
- ◆ দেহের প্রায় শতকরা ৬০-৯০ অংশ হলো পানি।
- ◆ অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপযুক্ত চিনিকে বলা হয় রিডিউসিং স্যুগার।
- ◆ রাইবোজ: এর আণবিক সংকেত C₅H₁₀O₅।
- ◆ ডিঅক্সিরাইবোজ: এর আণবিক সংকেত C₅H₁₀O₄।
- ◆ পাকা আলুর গ্লুকোজ এর পরিমাণ শতকরা ১২-৩০ ভাগ।
- ◆ গ্লুকোজকে অনেক সময় গ্রেইপ স্যুগার বা আলুরের শর্করা বলা হয়।
- ◆ খসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।
- ◆ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসেবে ওষুধ শিল্পে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
- ◆ ভিটামিন 'সি' তৈরি করার জন্য গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
- ◆ উদ্ভিদে সব সময়ই D-গ্লুকোজ থাকে।
- ◆ অধিকাংশ পাকা মিষ্টি ফল ও মধুতে ফ্রুক্টোজ থাকে।
 - ফ্রুক্টোজের আরেক নাম ফ্রুট স্যুগার বা ফলের চিনি।
 - কনফেকশনারিতে নানা ধরনের মিষ্টান্ন জাতীয় জিনিস প্রস্তুত করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়।
- ◆ ডাইস্যাকারাইডের সাধারণ সংকেত হলো C₁₂H₂₂O₁₁।
- ◆ উদ্ভিদের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো সুক্রোজ।
- ◆ এক অণু গ্লুকোজ এক এক অণু ফ্রুক্টোজ এক সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুক্রোজ।
- ◆ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ উভয়েই রিডিউসিং স্যুগার, কিন্তু সুক্রোজ রিডিউসিং স্যুগার নয়।
- ◆ বীজ, ফল, রস প্রভৃতি সফরী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে।
- ◆ ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উৎস।
- ◆ অয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে।
- ◆ স্টার্চ হাইড্রোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয়।
- ◆ আলু, ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি স্টার্চে শতকরা ২২ ভাগ অ্যামাইলোজ এবং ৭৮ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন থাকে।
- ◆ ফেহলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।
- ◆ মানুষের (স্তন্যপায়ী) পাকস্থলী বা অস্ত্রে সেলুলোজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ পদার্থ হজম হয় না কিন্তু গরু-ছাগল (তৃণভোজী স্তন্যপায়ী) সেলুলোজ হজম করতে পারে।
- ◆ বস্ত্র ও বন শিল্পের প্রধান উপাদান সেলুলোজ।
- ◆ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিরাজ করে সেলুলোজ।
- ◆ সেলুলোজ নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ◆ সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়।

- ◆ গ্লাইকোজেন প্রাণী জগতের গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। এর মূল গাঠনিক একক হলো α-D গ্লুকোজ। এটি পানিতে আংশিক দ্রবণীয়। এতে অয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ করলে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে।
- ◆ তরুনাঙ্ঘ্রির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন।
- ◆ রডোপসিনে Vit-A থাকে।
- ◆ *Hevea brasiliensis* নামক উদ্ভিদ থেকে প্রাকৃতিক রাবার পাওয়া যায়।
- ◆ ক্যারোটিনয়েডস আলোক শোষণকারী পিগমেন্ট।
- ◆ মানবদেহে বিটা-ক্যারোটিন ভেঙ্গে দুই অণু ভিটামিন-এ তৈরি করে যা থেকে পুরো রডোপসিন তৈরি হয়।
- ◆ ডিমের কুসুম, গাজর, টমেটো ইত্যাদি থেকে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়।
- ◆ বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে।
- ◆ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে মিলে সর্বমোট ২৮টির মতো অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে।
- ◆ সব এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়।
- ◆ প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়।
- ◆ আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার।
- ◆ অধিকাংশ উদ্ভিদের গুরু ওজনের ৫০-৮০% কার্বোহাইড্রেট থাকে।
- ◆ গ্লুকোজ পলিমাররূপে স্টার্চ, সেলুলোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি তৈরি করে।
- ◆ আখের কাণ্ড রসে ১৫% সুক্রোজ থাকে।
- ◆ স্টার্চ হলো উদ্ভিদ জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। স্টার্চে অ্যামাইলোজ সাধারণত ২০০ হতে ১০০০ এবং অ্যামাইলোপেকটিন ২০০০ হতে ২০০০০০ গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত। গোল আলুর স্টার্চ কণিকা বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা ক্ষুদ্রতম।
- ◆ সেলুলোজ উদ্ভিদ জগতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। এটি β-D গ্লুকোজ পলিমার।
- ◆ ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমূহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।
- ◆ সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন ইনসুলিন যা ৫১টি এবং বৃহৎ প্রোটিনে ৪০০০০ অ্যামিনো এসিড সংযুক্ত থাকতে পারে।
- ◆ ডিমের সাদা অংশ- অ্যালবুমিন।
- ◆ ডিমের কুসুম- গ্লোবিউলিন।
- ◆ মস্তিষ্ক ও ধমনির জমাট রক্ত গলাতে ব্যবহৃত হয়- ইউরোবাইলেজ এনজাইম
- ◆ সেলোবায়োজ এক ধরনের- ডাইস্যাকারাইড।
- ◆ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত প্রতি ১৪.৬ ক্যালরি খাদ্যগ্রহণের ফলে শরীরে চর্বি জমা হয়- ২g।
- ◆ দুধের আমিষকে বলা হয়- কেসিন
- ◆ সাপের বিষ বা ভেনম এক ধরনের- আমিষ
- ◆ ট্যানারিতে লেদার তৈরি করার সময় কাঁচা চামড়া থেকে লোম আলাদা করতে ব্যবহার করা হয়- প্রোটিনোলাইটিক এনজাইম
- ◆ কোলেস্টেরল- Steroid জাতীয় পদার্থ
- ◆ প্রোটিন যে বন্ধন দিয়ে গঠিত তাকে বলে- Peptide Bond

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

দুধে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তার নাম কি?

[BAU. shift-2, 2015-16]

- A. এলবোমিন
B. গ্লোবিউলিন
C. কেসিন
D. জিলেটিন

Explanation দুধের প্রোটিন: মায়ের দুধে ০.৯% এবং পশুর দুধে ৩.২-৪.৬% প্রোটিন থাকে। দুধে তিন শ্রেণির প্রোটিন থাকে। যেমন- i. ক্যাজিন, ii. ল্যাকটো এলবুমিন iii. ল্যাকটো গ্লোবিউলিন। ল্যাকটো অ্যালবুমিন ও ল্যাকটোগ্লোবিউলিনকে সেরাম বা হোয়ে-প্রোটিন বলে। দুধের মোট প্রোটিন (০.৯-৪.৬%) এর মধ্যে ৮২% হলো ক্যাজিন এবং ১৮% হলো হোয়ে-প্রোটিন। ক্যাজিন হলো দুধের প্রধান প্রোটিন উপাদান। গ্লুটামিন ও এস্পারাজিন গ্রামাইনো এসিড বাদে অন্য সব অ্যামাইনো এসিড ক্যাজিনে আছে।

নিচের কোনটি পলিস্যাকারাইড?

[BAU. shift-2015-16, HSTU. 2017-18]

- A. সুক্রোজ
B. রাইবোজ
C. গ্লুকোজ
D. সেলুলোজ

Explanation বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট:

• মনোস্যাকারাইড → গ্লিসারালডিহাইড, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন, ইরিথ্রোজ, ইরিথ্রুলোজ, রাইবোজ, ডি অক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ, জাইলোজ, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ, সেডাহেক্টোলোজ।

• ডাইস্যাকারাইড → সুক্রোজ, মল্টোজ, ল্যাক্টোজ, সেলোবায়োজ।

• অলিগোস্যাকারাইড → র্যাফিনোজ, কার্টোজ।

• পলিস্যাকারাইড → সেলুলোজ, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, হেমিসেলুলোজ।

• এনজাইম এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা এক প্রকার-

[BAU. 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2013-14, CVASU. 2008-09]

- A. প্রোটিন
B. অ্যামাইনো এসিড
C. লিপিড
D. নিউক্লিক এসিড

Explanation এনজাইম ও অ্যামাইনো এসিড:

Enzyme	এনজাইম হল এক প্রকার প্রোটিন
Amino acid	অ্যামাইনো এসিড হচ্ছে জৈব এসিড যাতে কার্বক্সিল মূলক (-COOH) যুক্ত কার্বন পরমাণুর সাথে অ্যামাইনো মূলক (-NH ₂) যুক্ত থাকে।

উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদানের নাম-

[BAU 2006-07]

- A. প্রোটিন
B. লিপিড
C. লেসিথিন
D. সেলুলোজ

Ans D

দুধ জমাটবদ্ধ হয় যে এনজাইমের কারণে তার নাম:

[BAU 2004-05]

- A. ল্যাকটোজ
B. পেপসিন
C. রেনিন
D. ট্রিপসিন

Explanation বিভিন্ন এনজাইমের কাজ:

- পেপসিন- প্রোটিনকে ভেঙ্গে পেপটোন তৈরি করে
• ট্রিপসিন- আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইড তৈরি করে
• রেনিন- দুধ জমাটবদ্ধ করে।

সরল প্রোটিন কোনটি-

[BAU 2003-04]

- A. নিউক্লিওপ্রোটিন
B. অ্যালবুমিন
C. গ্লাইকোপ্রোটিন
D. লিপোপ্রোটিন

Explanation সরল প্রোটিন: অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, গ্লুটেলিন, প্রোলামিন, হিস্টোন, প্রোটামিন।

07. NADP একটি- [BAU 2000-01, 2003-04; SAU. 2016-17, CVASU 2007-08]

- A. ভিটামিন
B. হরমোন
C. এনজাইম
D. কো-এনজাইম

Explanation কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম:

- FAD = Flavin Adenine Dinucleotide.
- FADH₂ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide.
- FMN = Flavin Mononucleotide (ভিটামিন B₂ মনোফসফেট)
- NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide
- NADH + H⁺ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide.
- NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
- NADPH + H⁺ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
- CoA = Co-enzyme-A
- ATP = Adenosine Triphosphate

08. কনজুগেটেড প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে বলা হয়-

[BAU 2003-04]

- A. একটিভ গ্রুপ
B. প্রোসেথিটিক গ্রুপ
C. কনজুগেটেড নন একটিভ গ্রুপ
D. সেমিএকটিভ গ্রুপ

Ans B

09. গ্লাইসিন কি?

[BAU 2000-01]

- A. লিপিড
B. নিউক্লিক এসিড
C. কার্বোহাইড্রেট
D. অ্যামিনো এসিড

Ans D

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনটি প্রোটিন সংশ্লেষী?

[SAU. 2018-19]

- A. অরনিথিন
B. ট্রিপ্টোফ্যান
C. সাইট্রুলিন
D. হেমোসেরিন

Explanation অনেক অ্যামিনো এসিড আছে যেগুলো প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে বলা হয় নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিড। যেমন- অরনিথিন, সাইট্রুলিন, হেমোসেরিন প্রভৃতি।

02. উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাইস্যাকারাইড সুক্রোজের রাসায়নিক সংকেত-

[SAU. 2017-18]

- A. C₆H₁₂O₄
B. C₁₂H₂₂O₁₁
C. C₄H₂₂O₇
D. C₉H₃₅O₃

Explanation উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাই স্যাকারাইড (C₁₂H₂₂O₁₁)

03. ইন্টারফেরন কী জাতীয় পদার্থ?

[SAU. 2015-16]

- A. আমিষ
B. খেতসার
C. লিপিড
D. লবণ

Explanation ইন্টারফেরন আমিষ জাতীয় পদার্থ। আণবিক ওজন ২০ থেকে ৩০ হাজার ডাল্টন। এটি তিন প্রকার α, β, γ

04. এনজাইমের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?

[SAU. 2014-15]

- A. এনজাইম হল প্রোটিন
B. এর কার্যকারিতা pH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
C. এরা তাপ প্রবণ নয়
D. সাধারণত বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়

Explanation এনজাইমের বৈশিষ্ট্য:

- এরা প্রোটিন ধর্মী।
- নিজে অপরিবর্তিত থেকে জৈব প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।
- নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের উপর নির্দিষ্ট বিক্রিয়া ঘটায়।
- পানিতে দ্রবণীয় (লিপোপ্রোটিনযুক্ত এনজাইম ছাড়া)
- অত্যনুকূল তাপমাত্রা → (20-40)°C, তবে অল্প তাপমাত্রা ও 50°C, এর উপরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।
- তাপ প্রবণ অর্থাৎ তাপে বিনষ্ট হয়।

- বৈষম্যভেদ্য পদাভেদ করতে পারে না।
- উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি জিয়াশীল হয়।
- কার্যপদ্ধতি দ্রুত ও ফল তাৎক্ষণিক
- সাধারনত বহিঃক্ষরা গ্রহি (নালীযুক্ত) থেকে নিঃসৃত হয়।

05. অ্যামাইলেজের প্রধান উৎস কোনটি?

[SAU.2013-14]

- A. অক্লরিত বীজ B. অগ্ন্যাশয়
C. যকৃত D. উদ্ভিদ কোষ

Ans A

06. কোনটি মেমব্রেন এনজাইম?

[SAU.2013-14]

- A. টায়ালিন B. পেপসিন
C. ট্রিপসিন D. সুক্রোজ

Ans D

07. প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক কি?

[SAU.2012-13]

- A. ফ্যাটি এসিড B. অ্যামিনো এসিড
C. নাইট্রিক এসিড D. নাইট্রাস এসিড

Ans B

08. কোলেস্টেরল কোন জাতীয় পদার্থ?

[SAU.2009-10]

- A. লিপিড B. স্টেরয়েড
C. কার্বোহাইড্রেট D. প্রোটিন

Ans B

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. রাইবুলোজের রাসায়নিক সংকেত কোনটি?

[SyIAU. 2018-19]

- A. $C_5H_{10}O_5$ B. $C_5H_{12}O_6$
C. $C_{10}H_{22}O_{11}$ D. $C_4H_8O_4$

Explanation: রাইবুলোজ $\rightarrow C_5H_{10}O_5$

• গ্লুকোজ $\rightarrow C_6H_{12}O_6$

• সুক্রোজ বা চিনি $\rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}$

02. কোন এনজাইম দ্বারা ডায়বেটিস রোগীর রক্তের শর্করার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়?

[SyIAU. 2015-16]

- A. এমাইলেজ B. লাইপেজ
C. অক্সিডেজ D. ইউরোবাইলেজ

Explanation: অক্সিডেজ এনজাইম দ্বারা ডায়বেটিস রোগীর রক্তের শর্করার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

03. তাপে জমট বাঁধে না কোন প্রোটিন?

[SyIAU. 2015-16]

- A. অ্যালবুমিন B. গ্লোবিউলিন
C. গ্লুটেলিন D. ক্যাসিন

Explanation: অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিন তাপে জমট বাঁধে। শস্য দানায় গ্লুটেলিন থাকে।

04. সাবস্ট্রেটের কনফিগারেশন পরিবর্তনকারী এনজাইমকে বলা হয়- [SyIAU. 13-14]

- A. ট্রান্সফারেজ
B. এপিমারেজ
C. আইসোমারেজ
D. কার্বোক্সিলেজ

Ans B

05. চালে কোন প্রোটিন পাওয়া যায়?

[SyIAU. 2010-11; PSTU-G.2017-18]

- A. গ্লুটেলিন
B. অরাজেনিন
C. জেইন
D. হার্ডিন

Explanation: গমের গ্লুটেলিন (glutelin) এবং চালের অরাজেনিন (orygenin) গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ। ভুট্টার জেইন, গম ও রাইয়ের গ্লিঅ্যাডিন এবং যব ও বালির হার্ডিন প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ।

06. রাইবোজ কোন ধরনের স্যাকারাইড?

[SyIAU. 2009-10]

- A. অলিগোস্যাকারাইড B. পরিস্টাকারাইড
C. ট্রাইস্যাকারাইড D. মনোস্যাকারাইড

Ans D

07. কোনটি আবশ্যিকীয় এমাইনো এসিড নয়-

[SyIAU. 2009-10]

- A. ভ্যালিন B. গ্লাইসিন
C. লাইসিন D. মেথিওনিন

Ans

08. গ্লাইসিন এর সংকেত হলো-

[SyIAU. 2009-10]

- A. H_2N-CH_2-COOH
B. $H_2N(CH_2)COOH$
C. $(NH_2)(CH_2)COOH$
D. $(NH_2)CH(COOH)_2$

Ans

09. সেলুলোজের হাইড্রোলাইসিস এর ফলে উৎপন্ন হয়-

[SyIAU. 2009-10]

- A. গ্লুকোজ B. ফ্রুক্টোজ
C. সুক্রোজ D. A ও B

Ans

10. কোনটি দুগ্ধ প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম?

[SyIAU. 2009-10]

- A. পেপসিন B. অ্যামিনোট্রিপসিন
C. ট্রিপসিন D. ক্যাসোট্রিপসিন

Ans

11. টারপিনস পাওয়া যায়-

[SyIAU. 2009-10; RU. G 2017-18]

- A. সূর্যমুখী B. পুদিনা
C. লজ্জাবতী D. শতমূলী

Explanation: ১০ থেকে ৪০টি কার্বন পরমানু বিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগ টারপিনস বলে। এর সাধারণ সংকেত হলো $(C_5H_8)_n$ । পুদিনা, ফুল ইত্যাদিতে উদ্ভাবী তেল হিসেবে টারপিনস পাওয়া যায়।

12. শরীরে শক্তির প্রধান উৎস হলো-

[SyIAU. 2009-10]

- A. চর্বি B. আমিষ
C. গ্লুকোজ D. গ্লাইকোজেন

Ans

13. রাবার কোন ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ?

[SyIAU. 2009-10]

- A. পলিস্যাকারাইড B. টারপিনয়েড লিপিড
C. কসফোলিপিড D. গ্লাইকোলিপিড

Ans

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনটি ডাইস্যাকারাইড নহে?

[CVASU. 2014-15]

- A. স্টার্চ
B. সুক্রোজ
C. ল্যাকটোজ
D. ম্যালটোজ

Ans

02. রাইবোজ একটি-

[CVASU. 2010-11]

- A. অলিগোস্যাকারাইড B. মনোস্যাকারাইড
C. পলিস্যাকারাইড D. কোনটিই নয়

Explanation: কার্বোহাইড্রেটের প্রকারভেদ:

- অলিগোস্যাকারাইড $\rightarrow$ স্কার্ডোজ, র্যাফিনোজ
- পলিস্যাকারাইড $\rightarrow$ স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন
- মনোস্যাকারাইড $\rightarrow$ রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ।

03. সুক্রোজ কে গ্লুকোজে পরিণত করার জন্য দায়ী-

[CVASU. 2010-11]

- A. লাইপেজ B. অক্সিডেজ
C. সুক্রোজ D. ইউরিয়েজ

Ans

04. কোনটি Co-enzyme নয়?

[CVASU. 2009-10]

- A. ATP B. NADP
C. NAD D. PEP

Ans

05. অ্যামাইনো এসিডের পলিমার কি?

[CVASU. 2007-08]

- A. লিপিড B. প্রোটিন
C. শর্করা D. চর্বি

Ans

06. এনজাইমের উপস্থিতি কোথায়?

[CVASU. 2007-08]

- A. কোষ B. চুল
C. অস্ত্রংক্ষরা গ্রহি D. কোনটিই নয়

Ans

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের পেশীতে পাওয়া যায় কোনটি?

[PSTU. 2018-19]

- A. অ্যাকটিন
B. নিউসিন
C. ভ্যালিন
D. গ্লুটামিন

Explanation মানুষের পেশীতে অ্যাকটিন ও মায়োসিন নামক প্রোটিন পাওয়া যায়।

মানব চোখের রঙ কোষে কোনটি থাকে?

[PSTU-G.2017-18]

- A. Vitamin-E
B. Vitamin-A
C. Vitamin-K
D. Vitamin-B

Ans B

বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় লিপিডকে ভেঙ্গে চিনিতে পরিণত করে কোনটি?

[PSTU-G.2017-18]

- A. গ্লাইঅক্সিসোম
B. পারঅক্সিসোম
C. রাইবোসোম
D. লাইসোসোম

Explanation বিভিন্ন অঙ্গাণু:

- পারঅক্সিসোম: $2H_2O_2$ কে $2H_2O + O_2$ এ রূপান্তরিত করে। H_2O_2 বিষতুল্য, তাই catalase এনজাইমের সাহায্যে H_2O_2 কে H_2O ও O_2 এ রূপান্তর করে কোষকে রক্ষা করে।
- গ্লাইঅক্সিসোম: বীজের লিপিড সঞ্চয়ী কোষে এদেরকে দেখা যায়। এদের কাজ হলো বীজ অঙ্কুরোদগমকালে লিপিডকে ভেঙ্গে গ্রহণযোগ্য চিনিতে পরিণত করা, যাতে করে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে নিজের খাদ্য তৈরির আগ পর্যন্ত অঙ্কুরিত চারার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

NETWORK PRIME TEST

উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাইস্যাكارাইড সুক্রোজের রাসায়নিক সংকেত-

- A. $C_6H_{12}O_4$
B. $C_{12}H_{22}O_{11}$
C. $C_4H_{22}O_7$
D. $C_9H_{35}O_3$

নন-গ্লার কোনটি?

- A. সুক্রোজ
B. গ্লুকোজ
C. সেলুলোজ
D. ফ্রুক্টোজ

তুল্য শতকরা কতভাগ সেলুলোজ থাকে?

- A. ৬০ ভাগ
B. ৫০ ভাগ
C. ৯০ ভাগ
D. ৯৪ ভাগ

কোনটি অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো এসিড?

- A. সিস্টিন
B. টাইরোসিন
C. লাইসিন
D. গ্লাইসিন

মায়োফাইব্রিলে কোন ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়?

- A. অ্যালবুমিন
B. প্রোলিন
C. মায়োসিন
D. গ্লোবিউলিন

06. নিচের কোনটি কো-ফ্যাক্টর?

- A. H^+
B. Fe^{2+}
C. FAD
D. $NADH_2$

07. প্রোটিনের এমাইনো এসিডগুলো একে অপরের সাথে কোন বন্ধনে যুক্ত হয়?

- A. পেপটাইড
B. গ্লাইকোসাইট
C. এস্টার
D. হাইড্রোজেন

08. এনজাইমের অপ্রোটিন অংশকে কী বলে?

- A. কো-এনজাইম
B. প্রোসথিটিক গ্রুপ
C. অ্যাক্টিভেটর
D. অ্যাপো-এনজাইম

09. উদ্ভিদের বীজে খাদ্য হিসেবে সঞ্চিত থাকে-

- A. গ্লুকোজ
B. সুক্রোজ
C. ফ্রুক্টোজ
D. স্টার্চ

10. বিরল অ্যামিনো এসিড হলো-

- A. গ্লাইসিন
B. হাইড্রোক্সিপ্রোপিন
C. লাইসিন
D. হাইড্রোক্সিলাইসিন

11. টারপিনস কোন উদ্ভিদে থাকে?

- A. সূর্যমুখী
B. পুদিনা
C. তুলা
D. রাবার

12. রাইবোজের গলনাঙ্ক-

- A. $85^\circ C$
B. $95^\circ C$
C. $195^\circ C$
D. $105^\circ C$

13. সালফারযুক্ত অ্যামিনো এসিড কোনটি?

- A. মেথিওনিন
B. গ্লাইসিন
C. ভেলিন
D. নিউসিন

14. ভূটার জেইন, গমের গ্লিয়াডিন, বার্লির হার্ডিন-

- A. Globulins
B. Glutelins
C. Prolamins
D. Albumins

15. স্টার্চের ধর্ম নয় কোনটি?

- A. আয়োডিন দ্রবণে নীল বর্ণ দেয়
B. ফেলিং দ্রবণ দ্বারা বিজারিত হয়
C. পানিতে অদ্রবণীয়
D. শাখাযুক্ত পলিমার

OMR SHEET		06. (A) (B) (C) (D)	12. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	13. (A) (B) (C) (D)	
02. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)	14. (A) (B) (C) (D)	
03. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)	15. (A) (B) (C) (D)	
04. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)		
05. (A) (B) (C) (D)	11. (A) (B) (C) (D)		

ANS ANALYSIS		15.B	14.C	13.A	12.B	11.B	10.B
09.D	08.B	07.A	06.B	05.C	04.B	03.D	02.C

অধ্যায়
০৫

अथय अज

শৈবাল ও ছত্রাক

ALGAE & FUNGI



କି ପଢ଼ିବ ? କିନି ପଢ଼ିବ ?

SURVEY TABLE

କଉଟୁକୁ ପଢ଼ବ ? କିଭାବେ ପଢ଼ବ ?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বা]
01	শৈবালের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ	★ ★ ★
02	শৈবালের বিভাগ	★ ★
03	শৈবালের জনন ও গুরুত্ব	★
04	ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য ও গঠন	★ ★ ★
05	ছত্রাক সংঘটিত রোগ ও গুরুত্ব	★ ★
06	Agaricus ও লাইকেন	★

**VI DATA****NETWORK SPECIAL**

AT A GLANCE



- ◆ *Ulothrix* একটি ভিন্নবাসী বা হেটারোথ্যালিক (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ আলাদা) শৈবাল।
 - ◆ ছত্রাকের অযৌন জননের প্রধান প্রক্রিয়া হলো স্পোর উৎপাদন প্রক্রিয়া।
 - ◆ ছত্রাকের জননাসকে গ্যামিট্যাঙ্গিয়াম (বহুবচনে- গ্যামিট্যাঙ্গিয়া) বলা হয়।
 - ◆ পুংগ্যামিট্যাঙ্গিয়ামকে অ্যানথেরিডিয়াম এবং স্ত্রী গ্যামিট্যাঙ্গিয়ামকে উগোনিয়াম বলা হয়।
 - ◆ মাশরুম নামে পরিচিত *Agaricus* ছত্রাক পৃষ্ঠিকর খাদ্য ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
 - ◆ মাইসেলিয়াম থেকে ছাতার ন্যায় বায়বীয় অংশ সৃষ্টিকে ফ্রুকটিফিকেশন বলা হয়।
 - ◆ খাদ্য হিসেবে বাংলাদেশে *Volvariella* ও *Pleurotus* গণভুক্ত কয়েকটি মাশরুম প্রজাতির চাষ হচ্ছে। আমেরিকা ও ইউরোপে *Agaricus brunnescens* (*A. bisporus*) মাশরুম প্রজাতির ব্যাপক চাষ হয়। কিছু কিছু প্রজাতি (*Agaricus xanthodermus*) বেশ বিষাক্ত।
 - ◆ লাইকেন অঙ্গ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।
 - ◆ *Pyrophyta* শৈবালের ক্রোরোপ্লাস্টে ক্রোরোফিল এ,সি এবং ক্যারোটিনয়ে থাকে, এদের দ্বারাই রেড টাইড হয়ে থাকে।
 - ◆ *Euglenophyta* শৈবালের এক-তৃতীয়াংশ ফটোসিনথেসিস করে।
 - ◆ শৈবালের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ ও পেকটিন দ্বারা নির্মিত। এর সঞ্চিত খাদ্য শর্করা।
 - ◆ ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত। এর প্রধান সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন।
 - ◆ শৈবাল ও ছত্রাকের মিথোজীবিতাকে লাইকেন বলে।
 - ◆ হলোকার্পিক ছত্রাক (সমস্ত দেহকোষ জনন কাজে ব্যবহৃত হয়)।
 - ◆ ইউকার্পিক ছত্রাক (যখন ছত্রাক দেহের অংশ বিশেষ জনন কাজে ব্যবহৃত হয়)।
 - ◆ সংশ্লেষ পদ্ধতির মাধ্যমে যৌন প্রজনন হয়- *Navicula spp*
 - ◆ পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়- 1929 সালে।
 - ◆ স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে জননকার্য সম্পন্ন হয়- শৈবালে।



ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

01. কোনটি পাথরের উপর জন্মায়? [C. AG. 2020-21]
- A. হ্যালাফাইট B. লিথোফাইট
C. এপিফাইট D. জেরোফাইট

ⓑ Explanation/বিভিন্ন প্রকার শৈবাল:

শৈবাল	বাসস্থান
ফাইটোপ্লাঙ্কটন	সম্পূর্ণ ভাসমান
বেনথিক	পানির নিচে আবদ্ধ
লিথোফাইট	পাথরের গায়ে জন্মায়
এন্ডোফাইট	উচ্চশ্রেণীর জীবের তিস্যু অভ্যন্তরে
এপিফাইট	শৈবালের গায়ে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিচের কোনটির জন্য সায়ানো ব্যাকটিরিয়ার রং নীলাভ-সবুজ হয়? [BAU-09-10]
- A. ট্রেনমোপ্লাস্ট B. ক্লোরোপ্লাস্ট
- C. সি-ফাইকোসায়ানিন D. টেনোপ্লাস্ট

● **Explanation** / সি-ফাইকোসায়ানিন অধিক পরিমাণে থাকার কারণে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নীলাভ বর্ণের হয়। তাছাড়া লাল বর্ণ কণিকা সি- ফাইকোইরিথ্রিন ও সবজ ক্লোরোফিল ও থাকে।

02. *Penicillium* কোন শ্রেণীভুক্ত ছত্রাক? [BAU 2008]
- A. *Oomycetes* B. *Ascomycetes*
C. *Deuteromycetes* D. *Basidiomycetes* **Ans: B**

03. ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কোন উপাদান দিয়ে গঠিত- [BAU 06-07; CVASU 07-08]
- A. সেলুলোজ B. লিগনিন C. পেকটিন D. কাইটিন

① Explanation/ ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত, শৈবালের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত।

04. গোল আলুর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ- [BAU, 2006]
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| A. কান্ড পচন রোগ | B. বিলম্বিত ধ্বসা রোগ |
| C. কান্ড মরিচা রোগ | D. মোজাইক ভাইরাস রোগ |

ⓑ Explanation/ • আলুর বিলম্বিত ধ্বসা (Late blight disease of potato): আলু গাছে দুই ধরনের ধ্বসা বা ব্লাইট রোগ হয়ে থাকে—লেট ব্লাইট এবং এল্টি ব্লাইট যা *Alternaria solani* দিয়ে হয়ে থাকে 1843-47 সাল আয়ারল্যান্ডে এ রোগের কারণে ভয়াবহ দুর্তিক দেখা দিয়েছিল।

- আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের কারণ: *Phytophthora infestans* নামক এক প্রকার ছত্রাকের কারণে আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ হয়।

05. মিউকর উদ্ভিদে বিভেদ প্রাচীর (Septum) বিহীন হাইফার নাম? [BAU. 06-4]
- A. সিনোসাইটিক হাইফা B. মাইসেলিয়াম
C. স্টোলন D. স্পোরেন্টিওফোর

Ⓐ Explanation/ হাইফা যখন প্রস্থ প্রাচীরবিহীন হয় তখন অনেকটা নিউক্লিয়াস একত্রে অবস্থান করে। এ বিশেষ গঠনকে সিনোসাইটিক বলা হয়।

04. কোন শৈবালে সিনোবিয়াম পাওয়া যায়? [CVASU. 2018-19]
 A. Chara B. Volvox
 C. Cladophora D. Ulothrix
(B) Explanation: সচল কলোনী (সিনোবিয়াম): *Pandorina, Volvox, Eudorina, Pyrobotrys*।
05. ফ্রাজেলা যুক্ত স্পোরকে বলে- [CVASU: 2017-18]
 A. হিপনোস্পোর B. ক্রামাইভোস্পোর
 C. বেসিডিওস্পোর D. জুস্পোর
(D) Explanation: বিভিন্ন প্রকার স্পোর:
 • ফ্রাজেলাযুক্ত স্পোরকে জুস্পোর বা চলরেণু বলে
 • নিচল ও ফ্রাজেলা বিহীন রেণুকে অ্যাপ্রানোস্পোর বলে
 • এককোষী, নিচল, ফুল-প্রাচীরবিশিষ্ট রেণুকে ক্রামাইভোস্পোর বলে।
06. ছত্রাকের কোন গণ ইস্ট নামে পরিচিত? [CVASU: 2016-17]
 A. *Saprolegnia* B. *Saccharomyces*
 C. *Agaricus* D. *Penicillium*
(B) Explanation: ছত্রাকের কয়েকটি গণের মধ্যে *Saccharomyces* গণের ছত্রাক ইস্ট নামে পরিচিত।
07. কোনটি *Agaricus* এর অংশ নয়? [CVASU: 2016-17]
 A. Pileus B. Annulus
 C. Lamellae D. Medula
(D) Explanation: *Agaricus* এর অংশগুলো হলো: পাইলিয়াস, গিল বা ল্যামেলি, অ্যানুলাস, স্টাইপ, মাইসেলিয়াম।
08. নিচের কোনটি খাওয়ার যোগ্য ছত্রাকের জেনাস? [CVASU: 14-15; JGVC 14-15]
 A. *Saprolegnia* B. *Penicillium*
 C. *Saccharomyces* D. *Agaricus*
(D) Explanation: *Agaricus campestris* ও *Agaricus bisporus* প্রজাতির মাশরুম সবজি হিসাবে খাওয়া হয়।
09. বায়ুকূরী কোন জেনাসের শৈবালের সাথে পাওয়া যায়- [CVASU: 2014-15]
 A. *Spirogyra* B. *Penicillium*
 C. *Sargassum* D. *Polysiphonia* **[Ans C]**
10. ধানের কান্ড পচা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের নাম কি? [CVASU: 2008-09]
 A. *Phytophthora infestans*
 B. *Helminthosporium oryzae*
 C. *Helminthosporium sigmoideum*
 D. *Penicillium digitatum* **[Ans B]**
11. *Spirogyra* কোন ধরনের উদ্ভিদ? [CVASU: 2008-09]
 A. শৈবাল B. ছত্রাক
 C. নগ্নবীজী D. একবীজপত্রী **[Ans A]**
12. *Penicillium* কোন Kingdom এর অন্তর্ভুক্ত? [CVASU: 2008-09]
 A. Monera B. Eukaryota
 C. Fungi D. Animalia **[Ans C]**
13. নিচের কোনটি এককোষী উদ্ভিদ? [CVASU: 2007-08]
 A. *Spirogyra* B. *Navicula*
 C. *Sargassum* D. *Pteris* **[Ans B]**
14. রুটি শিল্পে কোন ছত্রাক ব্যবহার হয়? [CVASU: 2006-07; RU-G 15-16]
 A. *Penicillium* B. *Aspirogyra*
 C. *Saccharomyces* D. *Agaricus* **[Ans C]**
15. হেটারোসিস্ট কোন শৈবালে পাওয়া যায়? [CVASU: 2006-07]
 A. *Nostoc* B. *Spirogyra*
 C. *Oscillatoria* D. *Chlorella* **[Ans A]**
16. মাশরুম উদ্ভিদ কোনটি? [CVASU: 2006-07]
 A. *Helminthosporium* B. *Phytophthora*
 C. *Saprolegnia* D. *Agaricus* **[Ans D]**

17. নিচের কোনটি শৈবাল? [CVASU: 2006-07]
 A. *Saccharomyces* B. *Nostoc*
 C. *Penicillium* D. *Clostridium* **[Ans B]**
18. *Sargassum* কোন জাতীয় উদ্ভিদ? [CVASU: 2006-07]
 A. ছত্রাক B. রেটিয়া
 C. ভাইরাস D. বাদামী শৈবাল **[Ans D]**

NETWORK PRIME TEST

01. কিংডম ফানজাই এর ফাইলাম সংখ্যা কত?
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
02. নিচের কোনটি Water bloom নামে পরিচিত?
 A. *Selaginella vulgare* B. *Zea mays*
 C. *Polysiphonia* D. *Mycrocystis*
03. ছত্রাক এবং ইস্ট এর মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?
 A. উভয়েই ক্রোরোফিল বিহীন B. উভয়েই মিমোজীবি
 C. এরা যৌন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে D. এদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়
04. ছত্রাকে সঞ্চিত খাদ্য-
 A. সেলুলোজ B. গ্রাইকোজেন ও সেলুলোজ
 C. গ্রাইকোজেন ও তৈলবিন্দু D. চর্বি ও প্রোটিন
05. মাইসেলিয়াম উপস্থিত-
 A. ব্যাকটেরিয়াতে B. ভাইরাসে C. ছত্রাকে D. শৈবালে
06. উদ্ভিদের মূল ও ছত্রাকের মধ্যকার এসোসিয়েশনকে কী বলা হয়?
 A. রাইজোমর্ফ B. হস্টোরিয়াম
 C. মাইকোরাইজা D. মাইকোরাইজাম
07. প্রাস্টিড বিহীন উদ্ভিদ হলো-
 A. এগারিকাস B. রিকশিয়া C. সাইকাস D. স্পাইরোপাইরা
08. *Nostoc* কোন ধরনের জীব?
 A. ব্যাকটেরিয়া B. সায়ানোব্যাকটেরিয়া
 C. ছত্রাক D. ভাইরাস
09. কোনটিতে ক্রোরোফিল বিদ্যমান?
 A. পেনিসিলিয়াম B. ভাইরাস C. লাইকেন D. ব্যাকটেরিয়া
10. ফ্রাজেলা যুক্ত স্পোরকে বলে-
 A. জুস্পোর B. অ্যাপ্রানোস্পোর C. হিপনোস্পোর D. অটোস্পোর
11. রক ফ্লাওয়ার (Rock Flower) কিসের নাম?
 A. ছত্রাক B. ফুল C. লাইকেন D. শৈবাল
12. বিখ্যাত 'আইরিশ দুর্ভিক্ষ' এর কারণ কি?
 A. ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ B. ছত্রাক আক্রমণ
 C. ভাইরাস আক্রমণ D. শৈবাল আক্রমণ
13. প্যারামাইলন কোন শ্রেণির শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য?
 A. Chlorophyta B. Pyrrophyta C. Phaeophyta D. Rhodophyta
14. আলুর বিলম্বিত ধস রোগের কারণ কোন ছত্রাক?
 A. *Phytophthora infestans* B. *Mucor gorgantia*
 C. *Penicillium notatum* D. *Rhizopus stromati*
15. জীব বিজ্ঞানের যে শাখায় শৈবাল বিষয়ে পড়াশোনা করা হয় তাকে বলে-
 A. Mycology B. Phycology C. Algology D. Planktology

OMR SHEET		06. (A) (B) (C) (D)	12. (A) (B) (C) (D)					
01. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	13. (A) (B) (C) (D)						
02. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)	14. (A) (B) (C) (D)						
03. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)	15. (A) (B) (C) (D)						
04. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)							
05. (A) (B) (C) (D)	11. (A) (B) (C) (D)							
ANS ANALYSIS		15.B	14.A	13.B	12.B	11.C	10.A	
09.C	08.B	07.A	06.C	05.C	04.C	03.D	02.D	01.C

ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা
BRYOPHYTA & PTERIDOPHYTA



କି ପଢ଼ୁଛ ? କିନ ପଢ଼ୁଛ ?

SURVEY TABLE

কণ্ট্রোল পড়ত ? কিভাবে পড়ত ?



সিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	ব্রায়েফাইটার বৈশিষ্ট্য	★ ★
02	টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য	★ ★
03	Riccia এর বৈশিষ্ট্য	★ ★
04	Pteris এর বৈশিষ্ট্য	★ ★ ★

VVI DATA**NETWORK SPECIAL**

AT A GLANCE

- উভচর উদ্ভিদ বলা হয়- ব্রায়োফাইটাকে।
- ব্রায়োফাইটের পুংজননাস্রের নাম - অ্যান্‌ড্রিডিয়াম।
- ব্রায়োফাইটের নিষেকের জন্য প্রয়োজন- তরল মাধ্যম।
- ব্রায়োফাইটের শুক্রাণুতে কয়টি ফ্ল্যাগেলা থাকে- 2টি।
- কোন প্রজাতি জলজ- *Riccia fluitans*।
- *Riccia*-র শুক্রাণু প্রবেশ করে- আর্কিগোনিয়ামে।
- *Riccia*-র আর্কিগোনিয়াম দেখতে- ফ্ল্যগেলের মতো।
- পুষ্টির জন্য স্পোরোফাইট সম্পূর্ণ নির্ভরশীল- গ্যামিটোফাইটের ওপর।
- পরিবেশ দূষণের সূচক হিসেবে কাজ করে- *Riccia*।
- দেহ, মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত- টেরিডোফাইটের।
- বৃন্ত ও ক্যাপসুল সমন্বয়ে গঠিত- স্পোরান্জিয়াম।
- প্রোথ্যালাসের আকৃতি- হৃৎপিণ্ডাকার।
- অ্যান্‌ড্রিডিয়াম শুক্রাণু মাতৃকোষের সংখ্যা- 32টি (বা 20-50টি)।
- ফার্ণের শুক্রাণু- বহু ফ্ল্যাগেলাযুক্ত।

APYQ

ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

① Explanation ব্রায়োফাইটার ক্যাপসিউলের বহিরাবরণ ৩-৪ কোষ স্তর বিশিষ্ট। মধ্যস্থলে রেণু ও ইলেক্টার বিদ্যমান। রেণু ধারণ কলার অর্ধেক কোষ, রেণু মাতৃকোষ এবং অবশিষ্ট কোষগুলি দীর্ঘ, স্থূল ও সর্পিলাকার, বন্ধ্য রেণুক্ষেপক বা ইলেক্টার কোষে পরিণত হয়। ক্যাপসিউল বিদীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ইলেক্টারগুলি পানি শোষণ করে ক্ষীত হয়ে ক্যাপসিউলের প্রাচীরে চাপ সৃষ্টি করে, ফলে রেণুগুলি ক্যাপসিউলের বাইরে নির্গত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

• ক্রোজিয়ার→ ফার্নের কুন্ডলিত কচি পাতা।
• সারসিনেট ভার্নেশন→ কুন্ডলী পাকানো প্রক্রিয়া।
• সোরাস→ ফার্নের স্পোরোজিয়ামের গুচ্ছ।
• প্রাসেন্টা→ ফার্নের যে টিস্যু হতে স্পোরাজিয়াম উৎপন্ন হয়।
• ফলস ইন্ডুসিয়াম→ ফার্নের ফলক প্রান্তের ঢাকনি অংশ।
• স্পোরোফিল→ ফার্নের সোরাস উৎপন্নকারী পাতাকে স্পোরোফিল বলে।

02. ফার্নের কান্ডকে কি বলা হয়? [BAU. shift-2015-16]

A. স্টাইপ
B. রাইজোম
C. রাইবোসোম
D. কোনটিই নয়

03. ফার্নের প্রোথ্যাল্যাস এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়? [BAU. shift-2015-16]

A. এটি সবুজ বর্ণের
B. রেণু অংকুরিত হয়ে এটি হয়
C. এটি স্ত্রী জননাস্র ও পুং জননাস্র ধারণ করে
D. এটি ডিপ্লয়েড

04. মস এর মূলকে কি বলা হয়? [BAU 2009-10]

A. রাইজয়েড
B. গুচ্ছমূল
C. অস্থানিক মূল
D. প্রধান মূল

Ⓐ Explanation/ মসের প্রকৃত মূল নেই। মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড বিদ্যমান।

গিমা কাপ পাওয়া যায়-

- A. Anthoceros
C. Riccia

- B. Marchantia
D. Semibarbula

[CVASU.2015-16]

[B] Explanation/ Marchantia গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদ। এর দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয় অর্থাৎ দেহ থ্যালয়েড। থ্যালাস শায়িত, চ্যাপ্টা, বিষমপৃষ্ঠ, সবুজ, ছায়া শাখাবিশিষ্ট। থ্যালাসের প্রতিটি শাখার শীর্ষে অগ্রস্থ ঝাঁজ বিদ্যমান। থ্যালাসের পৃষ্ঠ বরাবর লম্বাভাবে মধ্যশিরা বিদ্যমান। থ্যালাসের পৃষ্ঠতলে মধ্যশিরা বরাবর পেয়লা আকৃতির অঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে। এটি গিমা কাপ নামে পরিচিত।

পরিবহন কলা অনুপস্থিত-

- A. অ্যানজিওস্পার্মে
C. ব্রায়োফাইটায়

- B. জিমিনোস্পার্মে
D. টেরিডোফাইটায়

[CVASU.2014-15]

মসের জী জননাস্রের নাম কি?

- A. অ্যাহেরিডিয়াম
C. স্পোর

- B. আর্কিগোনিয়াম
D. ডিম্বাণু

[CVASU.2014-15]

[B] Explanation/ মসের পুরুষ জননাস্রকে অ্যাহেরিডিয়াম বলে।

কৈ শাক কোন ধরনের উদ্ভিদ?

- A. সবজী
C. মস

- B. ফার্ন
D. কোনটাই নয়

[CVASU. 2012-13]

যে সকল উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে-

- A. হেটারোফাইট
C. ব্রায়োফাইট

- B. অটোফাইট
D. এপিফাইট

[CVASU. 2007-08]

[B] Explanation/ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কোন উদ্ভিদে ভাস্কুলার টিস্যু নেই?

- A. টেরিডোফাইট
C. জিমোস্পার্মি

- B. ব্রায়োফাইট
D. অ্যানজিওস্পার্মি

[PSTU-G.2017-18]

[B] Explanation/ ব্রায়োফাইটের দেহে কোনো ভাস্কুলার টিস্যু নেই। দেহ গ্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত।

'Horsetail' নামে পরিচিত নিচের কোনটি?

- A. Scelginella
C. Pinus

- B. Cycas
D. Equisetum

[PSTU2013-14 ; SAU.2012-13, SylAU. 2008-09]

[D] Explanation/ Equisetum স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ। এর দেহ দু'ভাগে বিভক্ত:

- i. মাটির নিচে বহুবর্ষজীবী শক্ত রাইজোম কাণ্ড।
ii. রাইজোম হতে খাড়াভাবে উপরে বেড়ে ওঠা সবুজ বায়বীয় কাণ্ড। বায়বীয় কাণ্ড আবার দু'প্রকার-

- অনুর্বর যা বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, সবুজ ও স্থায়ী। এ ধরনের কাণ্ডকে দেখতে 'হর্সটেল' এর মত দেখায়।
- উর্বর যা শাখাহীন, অনেকটা বিবর্ণ।

ফার্নের পাতার পত্র বিন্যাস কেমন?

- A. দ্বিপক্ষল সচুড়
C. সচুড় ও এক পক্ষল যৌগিক

- B. পক্ষল যৌগিক
D. এক পক্ষল

[PSTU 2012-13, 2013-14]

NETWORK PRIME TEST

নিচের কোনটি ব্রায়োফাইটের উন্নত বৈশিষ্ট্য?

- A. উদ্ভিদ হ্যাণ্ড্রেড
C. সত্যিকার মূল নেই

- B. স্টোম্যাটাযুক্ত এপিডার্মিস
D. এরা হোমোস্পোরাস

ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের ভাস্কুলার বাণ্ডল কোন প্রকৃতির?

- A. সংযুক্ত
C. হ্যাড্রোসেন্ট্রিক

- B. লেন্টোসেন্ট্রিক
D. অরীয়

মসের জী জননাস্রকে বলা হয়-

- A. আর্কিগোনিয়াম
C. অ্যাহেরিডিয়াম

- B. ডিম্বাণু
D. শুক্রাণু

04. কোনটি পরিবেশ দূষণের সূচক হিসাবে কাজ করে?

- A. Riccia
C. Pteris

- B. Agaricus
D. Azolla

05. কোনটি ব্রায়োফাইটের শ্রেণী নয়?

- A. হেপাটিকি
C. ফিলিসিন

- B. অ্যাহেরিডিয়োট
D. মাসাই

06. নিচের কোন উদ্ভিদের পরিবহনতন্ত্র নেই?

- A. Moss
C. Pteris

- B. Selaginella
D. Cycas

07. ব্রায়োফাইটের শুক্রাণুতে কয়টি ফ্লাজেলা থাকে?

- A. ২টি
C. ৫টি

- B. ৩টি
D. ৭টি

08. টেরিডোফাইটের স্পোর হলো-

- A. হ্যাণ্ড্রেড
C. ট্রিপ্লয়েড

- B. ডিপ্লয়েড
D. লাইকেন

09. পৃথিবীর প্রাচীনতম উদ্ভিদ হলো-

- A. সামুদ্রিক শৈবাল
C. ভাইরাস

- B. ব্যাকটেরিয়া
D. ফার্ন

10. ফার্নের শুক্রাণু হল-

- A. ফ্লাজেলাবিহীন
B. দুইটি ফ্লাজেলাযুক্ত
C. বহু ফ্লাজেলাযুক্ত
D. একটি ফ্লাজেলাযুক্ত

11. Fern prothallus-

- A. Triploid
C. Haploid

- B. Diploid
D. Polyploidy

12. রাইজোফোর কোথা থেকে উৎপন্ন হয়?

- A. মূল
C. পাতা

- B. কাণ্ড
D. রাইজয়েড

13. টেরিডোফাইটের জনুক্রমের প্রধান দশা-

- A. Haploid
C. Diploid

- B. Tetraploid
D. Triploid

14. 'রায়মেন্টাম' কোথায় উপস্থিত?

- A. Marchantia
C. Semibarbula

- B. Pteris
D. Selaginella

15. Pteridophyta এর বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?

- A. কাণ্ড রাইজোম জাতীয় এবং বর্ষজীবী
B. ফুল ফল হয় না
C. ডিপ্লয়েড
D. স্পোরোফাইট

OMR SHEET	06. (A) (B) (C) (D)	12. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	13. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)	14. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)	15. (A) (B) (C) (D)
04. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)	
05. (A) (B) (C) (D)	11. (A) (B) (C) (D)	

ANS ANALYSIS	15.A	14.B	13.C	12.C	11.C	10.C
09.D	08.A	07.A	06.A	05.C	04.A	03.A
					02.C	01.B

অধ্যায়
১০

পত্র
১

উদ্ভিদ প্রজনন

PLANT REPRODUCTION



কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব]
01	পরাগরেণুর পরিস্ফুটন ও পুং-গ্যামিটোফাইটের বিকাশ	★
02	ডিম্বকের পরিস্ফুটন ও স্ত্রী-গ্যামিটোফাইটের বিকাশ	★
03	নিষেক	★★★
04	অযৌন প্রজনন	★★★



VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্গ্যামাস ধরনের।
- Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে, একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম বলে।
- পরাগরেণু (n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।
- সকল আবৃতবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পরাগায়ন ঘটে থাকে।
- অধিকাংশ উদ্ভিদে (যেমন- আম, জাম) পরাগনালিকা ডিম্বকরূপে পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে Porogamy বলে।
- কিছু কিছু উদ্ভিদে (ঝাউ- Casuarina) পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে Chalazogamy বলে।
- কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে Mesogamy বলে।
- খিনিসেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (নগ্নবীজী উদ্ভিদের Ephedra তে খিনিসেক অবিস্তৃত হয় ১৯৯০ সালে- এটি ব্যতিক্রম)।
- সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন বলা হয়।
- সস্যটিস্য প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।
- ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়।
- লিচু, কাঠলিচু, জায়ফলে ও শাপলা বীজে এরিল দেখা যায়।
- লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে।

- ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন স্পোর গঠন করে অযৌন জনন করে থাকে। এদের স্পোর পেনিসিলিয়ায়ামের কনিডিয়া বা কনিডিওস্পোর, মিউকরের স্পোরানজিওস্পোর বা গনিডিয়া, অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই জরূপ সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক বাতরিত বীজে পরিণত হয় তাকে পারথেনোজেনেসিস বা অপুংজন বলে।
- হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি বলে। জেনেলেবু, কমলালেবু ইত্যাদি।
- নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রানু থেকে জরূপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস বলে।
- ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড জরূপ থলির ডিম্বানুটি নিষেক ছাড়াই সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপোমস্পোরি। যেমন: Hieracium।
- ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের যে কোনো কোষ হতে জরূপথলি গঠন হয় জরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি।
- ডিম্বাণু ছাড়া জরূপথলির অন্য কোনো কোষ থেকে জরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অ্যাপোগ্যামি বলে। যেমন- Allium।
- ডিম্বাণু, জরূপথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া জরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে (পারথেনোজেনেসিস, অ্যান্ড্রোজেনেসিস, অ্যাপোমস্পোরি, অ্যাপোগ্যামি, অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি) সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যাগ্যামোস্পার্মি।
- উভলিঙ্গ ফুলকে পুরুষত্বহীন করার পদ্ধতিকে- ইমাস্কুলেশন।
- নিষেকের ফলে ফলে পরিণত হয়- গর্ভাশয়।
- সাকারের মাধ্যমে প্রজনন হয়- কলায়।

APYQ

ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

01. জরূপথলিতে একটি পুংগ্যামিট ও একটি ডিম্বাণুর মিলনকে কী বলে? [C. AG. 2021-22]
- A. ক্যালাজোগ্যামি B. সিনগ্যামি
C. পেরোগ্যামি D. মেসোগ্যামি

[B] Explanation পরাগনালিকা হতে জরূপথলিতে নিষ্কৃত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ প্রকার মিলনকে সিনগ্যামি বলে। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনই হলো নিষেকক্রিয়া। অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে ত্রিমিলন বলে।

02. নিষেক ক্রিয়া ছাড়া পুংগ্যামিট থেকে জরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলে? [C. AG. 2021-22]
- A. অ্যাগ্যামোস্পার্মি B. অ্যাপোগ্যামি
C. অ্যাপোমস্পোরি D. অ্যান্ড্রোজেনেসিস

[D] Explanation Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে জরূপ সৃষ্টি হয়। নিষেক ক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে জরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস বলে।

03. পার্থেনোকার্পি এর কারণ কি?

- A. ইথিলিন B. অক্সিন
C. জিবেরেলিন D. সাইটোকাইনি

[B] Explanation হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদনের প্রক্রিয়া পার্থেনোকার্পি বলে। পার্থেনোকার্পিতে অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনি এ তিনটিরই ভূমিকা আছে। তবে পার্থেনোকার্পিতে অক্সিনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিষেকের পর উদ্ভিদের ডিম্বাণু প্রথমে কিসে পরিণত হয়?

- A. জরূপ B. বীজ
C. ফল D. কান্ড

[A] Explanation নিষেক পরবর্তী অবস্থা:

নিষেকের আগে	নিষেকের পরে	নিষেকের আগে	নিষেকের পরে
ডিম্বাণু	জরূপ	গর্ভাশয়	ফল
ডিম্বক	বীজ	গর্ভাশয় ত্বক	ফলত্বক

WORK

উদ্ভিদের রূপান্তরিত কোন অংশ প্রজননক্ষম ফুলে রূপান্তরিত হয়? [BAU 17-18]

- A. বিটপ B. পাতা
C. শাখা ডাল D. কাণ্ড

Explanation অপশন সম্পর্কিত তথ্য:

• পাতা: শালোকসংশ্লেষণ অংশগ্রহণ করে। (ক্লোরোফিল)

• শাখা ডাল: বিস্তার ঘটায়।

• কাণ্ড: গাছের মূল আকৃতি দান করে।

কোন ভিষকের মধ্যে একাধিক পুংগ্যামেট প্রবেশ করলে কী ধরনের এমব্রায়ো তৈরি হয়? [BAU 05-06, 11-12, 2017-18, SylAU, 16-17]

- A. হ্যাপ্লয়েড
B. ডিপ্লয়েড
C. পলিপ্লয়েড
D. কোনটিই নয়

Explanation ডিম্বানুর দু'পাশের দুটি নিউক্লিয়াসকে সিনারজিড বা সহকারী নিউক্লিয়াস বলে।

একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটলে তাকে কি বলা হয়?

[BAU 2008-09, 2017-18, SAU-14-15]

- A. অ্যালোগ্যামি
B. জেনোগ্যামি
C. অটোগ্যামি
D. গেইটোনোগ্যামি

Explanation প্রজনন সম্পর্কিত তথ্য:

• পার্থেনোজেনেসিস: অনিষিক্ত ডিম্বানু থেকে নতুন জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

• পার্থেনোকার্পি: হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে।

• অ্যাস্মোজেনেসিস: নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রানু থেকে জন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

• অ্যাপোগ্যামি: ডিম্বানু ছাড়া জনখলির অন্য যে কোন কোষ থেকে জন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে Apogamy বলে।

• নিষেক ক্রিয়া/সিনগ্যামি/ত্রিমিলন: পরাগানালিকা হতে জনখলিতে 'নিষিক্ত' দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বানুর সাথে মিলিত ও একীভূত হচ্ছে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ ধরনের মিলনকে সিনগ্যামি বলে। অপর পুংগ্যামিটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে ত্রিমিলন বলে।

• দ্বিনিষেক ক্রিয়া: একই সময়ে ডিম্বানুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলনকে দ্বিনিষেক ক্রিয়া বলে।

নিষেক ছাড়া জন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [BAU 2016-17]

- A. পার্থেনোজেনেসিস
B. গ্যামেটোজেনেসিস
C. ডাইটেলেজেনেসিস
D. ফার্টিলাইজেশন

Ans A

মৃৎভদী অঙ্কুরোদগম কোন বীজে দেখা যায়? [BAU 2014-15, PSTU 2016-17]

- A. ধান B. গম
C. খেজুর D. তেঁতুল

Explanation বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত ৩ প্রকার:

• মৃৎগত: জনমুকুল মাটির উপরে কিন্তু বীজপত্র নিচে থাকে। যেমন: আম, ছোলা, মটরগুটি, ধান, গম, নারিকেল।

• মৃৎভদী: বীজপত্র মাটিভেদ করে উপরে উঠে আসে। যেমন: তেঁতুল, লাউ, কুমড়া, পেঁয়াজ-শিম।

• জন্মায়ুজ: লোনামাটির উদ্ভিদে দেখা যায়। যেমন: গড়ান, কেওড়া, পতর, গোলপাতা, সুন্দরী।

07. রসুনের কোন অংশ ভক্ষণযোগ্য? [BAU 2014-15]

- A. পাতা B. কাণ্ড
C. শব্দপত্র D. মূল

Explanation লিচু, জায়ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ → এরিল। আলু, কচু, ভাটের ভক্ষণযোগ্য অংশ → কাণ্ড। মূলা, মিষ্টি আলু, গাজর, শালগম, বাট → মূল। আদা, হলুদ → মাটির নিচের কাণ্ড।

08. গাছের কোন অংশ রূপান্তরিত হয়ে বুলবিলে পরিণত হয়? [BAU 2014-15]

- A. বায়বীয় কাণ্ড B. কান্টিক মুকুল
C. ফল D. জনমুকুল

Explanation কোন কোন উদ্ভিদের কান্টিক মুকুলের বৃদ্ধি যথাযথ না হলে একটি পিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে, একে বুলবিল বলে।

09. লিচুর যে অংশ ভক্ষণ করা হয় তার নাম কি? [BAU 2014-15]

- A. অন্তঃত্বক B. বহিঃত্বক
C. এরিল D. এন্ডোস্পার্ম

Explanation এটি লিচুর তৃতীয় স্তর। লিচু, জয়ফল, শাপলা, জামরুলে এরিল পাওয়া যায়।

10. বীজপত্রের কোন অংশটি সস্যের সাথে সংযুক্ত থাকে? [BAU 2014-15]

- A. জনমূল B. বীজনাভি
C. স্কুটেলাম D. ক্যারাহকল

Explanation বীজের সূচালো অংশের কাছে ১টি ছিদ্র আছে যাকে ভিষক রক্ত বলে। এর ভিতর দিয়ে জনমূল বাইরে বের হয়ে আসে। অঙ্কুর বের হওয়া বীজটিকে দুই আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে ছোলা বীজের আবরণটিকে সরিয়ে ফেললে হলুদ রঙের একটি অংশ বের হবে, এটিকে আরও একটু চাপ দিলে পুরু বীজপত্র দুটি দুই দিকে খুলে যাবে। এ দুটো যেখানে লেপে আছে সেখানে সাদা রঙের একটি লম্বাটে অঙ্গ দেখা যাবে, এর নিচের অংশকে জনমূল ও উপরের অংশকে জনকাণ্ড বলে।

11. আপেল ফলের খাদ্যাংশের নাম কী? [BAU 2013-14]

- A. মধ্যত্বক ও অন্তঃত্বক B. রসালো পুষ্পাঙ্ক
C. রসালো বীজত্বক D. ফল ত্বক ও অমরা

Ans B

12. একই গাছে বিভিন্ন বর্ণের ফল ফুটাবার কাজে কোন জিনিসটি ব্যবহার করা হয়? [BAU 2009-10; SylAU, 2014-15]

- A. Radio B. Isomer
C. Isotone D. Isobar

Ans A

13. গর্ভাশয় নিষেকের পর কিসে পরিণত হয়? [BAU 2009-10; JVC 14-15, SylAU, 2008-09]

- A. ফল B. ফলত্বক
C. জন D. বীজ

Ans A

14. কোন বীজে মৃৎভদী অঙ্কুরোদগম দেখা যায়? [BAU 2006-07]

- A. তেঁতুল B. মটর
C. খেজুর D. ধান

Ans A

15. পার্থেনোকার্পিক ফল কোনটি? [BAU 2005-06]

- A. কাঁঠাল B. আম
C. কলা D. লিচু

Ans C

16. ডালিমের খাদ্যাংশের নাম কি? [BAU 2004-05]

- A. বীজ
B. রসালো পুষ্পাঙ্ক
C. রসালো মধ্যত্বক
D. রসালো বীজ

Ans D

17. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে বলে- [BAU 2003-04]

- A. পার্থেনোজেনেসিস
B. ফার্টিলাইজেশন
C. গ্যামেটোজেনেসিস
D. ডাইটেলেজেনেসিস

Ans B

18. নিম্নলিখিত ডিম্বক পরিপক্ব হয়ে কি পরিণত করে? [BAU 2003-04, CVASU-11-12]

- A. ফল B. বীজ
C. ভ্রূণ D. শস্য/এন্ডোস্পার্ম

(B) Explanation/ নিষেক পরবর্তী অবস্থা:

নিষেকের পূর্বে	নিষেকের পরে
গর্ভাশয়	ফল
ডিম্বক	বীজ
গর্ভাশয় তুক	ফলতুক
এন্ডোস্পার্ম (ডিম্বক বহিঃস্থ তুক)	টেস্টা (বীজের বহিঃস্থ তুক)
ডিচাপু	ভ্রূণ
এন্ডোস্পার্ম মাতৃকোষ	সস্য বা এন্ডোস্পার্ম
সহকারী কোষ বা সিনারজিড	নষ্ট হয়ে যায়
প্রতিপাদ কোষ বা অ্যান্টিপোডাল	নষ্ট হয়ে যায়

19. জনন নিউক্লিয়াস হতে পুং গ্যামেট সৃষ্টি হয়- [BAU 2003-04]

- A. একটি B. দুইটি
C. তিনটি D. চারটি

Ans B

20. একটি ডিপ্লয়েড রেণু মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে কয়টি হ্যাপ্লয়েড পরাগ রেণু সৃষ্টি করে? [BAU 2000-01]

- A. 2 টি B. 3 টি
C. 4 টি D. 6 টি

Ans C

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিচের কোনটি হ্যাপ্লয়েড নয়? [SAU. 2017-18]

- A. স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ
B. ডিচাপু
C. সহকারী কোষ
D. প্রতিপাদ কোষ

(A) Explanation/ ভ্রূণ, ডিচাপু হ্যাপ্লয়েড। দেহকোষ ডিপ্লয়েড।

02. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সস্য কলায় কত সেট ক্রোমোসোম থাকে? [SAU.2016-17]

- A. n B. 2n
C. 3n D. 4n

(C) Explanation/ সস্য কলা ডিপ্লয়েড → 3n।

03. আবৃতবীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে কয়টি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু তৈরি করে? [SAU.2013-14]

- A. ছয়টি B. চারটি
C. দুইটি D. আটটি

Ans B

04. ডিম্বকমূল, ডিম্বকনাড়ী ও ডিম্বকরন্ধ্র যখন একই সরলরেখায় অবস্থান করে তখন তাকে কি ধরনের ডিম্বক বলে? [SAU.2012-13]

- A. অধোমুখী B. বক্রমুখী
C. পার্শ্বমুখী D. ঊর্ধ্বমুখী

Ans D

05. বীজহীন ফল সৃষ্টিতে সাহায্য করে কোনটি? [SAU.2012-13]

- A. অগ্নিন B. ফোরিজেন
C. ইথিলিন D. সাইটোকাইনিন

(A) Explanation/ অগ্নিন প্রয়োগে কৃত্রিমভাবে বীজহীন ডুমুর, তামাক, ব্র্যাকবেরি, টমেটো উৎপাদন করা হয়।

06. ফল পাকার জন্য দায়ী কোনটি? [SAU. 2011-12]

- A. অগ্নিন B. ফোরিজেন
C. ইথিলিন D. সাইটোক্রোম

(C) Explanation/ ফল পাকার রাসায়নিক কারণ: ফল পাকার জন্য বিশেষভাবে ইথিলিন দায়ী। সাধারণ শারীরতাত্ত্বিক তাপমাত্রায় এথিলিন একটি গ্যাস, যা আণবিক গঠন হল $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ । এটিকে একটি ফাইটোহরমোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একটি পাকা ফল থেকে এথিলিন ব্যাপিত হয়ে তার আশপাশে রাখা ফলে প্রবেশ করতে পারে এবং এদেরকে দ্রুত পাকতে সাহায্য করে থাকে। কৃষি ফলে ইথিলিন প্রয়োগ করে তাকে পরিণত হওয়ার আগেই পাকানো যায়। নিম্ন তাপমাত্রায় ইথিলিন তৈরি কমে যায়, তাই নিম্ন তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করলে পাকতে বিলম্ব হয়। ইথিলিন টিস্যুর ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয় এবং ফল পাকার সঞ্চারনের প্রক্রিয়া শুরু করতে ট্রিগার হিসেবে কাজ করে।

07. নীচে উল্লেখিত ফুলের চারটি অংশের কোনটির মধ্যে বাকিলো থাকে? [SAU. 2004-05]

- A. ডিম্বক B. গর্ভাশয়
C. গর্ভপত্র D. অমরা

Ans D

08. অনিষিক্ত ডিম্বানু থেকে নতুন জীব সৃষ্টি হওয়া কে বলে- [SAU.2002-03, 03-04]

- A. মেটামরফোসিস B. পার্থেনোজেনেসিস
C. পলিমরফিজম D. পলিপয়ডি

Ans B

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনো দেহকোষ সরাসরি গ্যামিটোফাইটে পরিণত হলে তাকে কি বলা হয়? [SylAU. 2018-19]

- A. অ্যাগামোস্পার্মি
B. অ্যাপোগ্যামি
C. পার্থেনোজেনেসিস
D. অ্যাপোস্পোরি

(D) Explanation/ ভ্রূণ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া:

- অ্যাপোস্পোরি- ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড ডিম্বানু হতে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- অ্যাপোগ্যামি- ডিচাপু ছাড়া ভ্রূণথলির যে কোনো কোষ থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- পার্থেনোজেনেসিস- নিষেক ছাড়া ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- অ্যাডভেনটিভ এমব্রায়োনি- ডিম্বকের ডিম্বক তুক বা নিউসেলাসের যে কোন কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- অ্যাগামোস্পার্মি: নিষেক ছাড়া ডিচাপু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে ভ্রূণ তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে অ্যাগামোস্পার্মি বলে।

02. পরাগরেণুর এন্ডোস্পার্ম তুকটির রাসায়নিক পদার্থ কোনটি? [SylAU.2016-17]

- A. কাইটিন B. কিউটিন
C. লিপিড D. সেলুলোজ

Ans B

03. মিষ্টি আলু উদ্ভিদের কোন অংশ রূপান্তরিত হয়ে উৎপন্ন হয়? [SylAU.2015-16]

- A. শিকড় B. কান্ড
C. মুকুল D. পাতার বোট

(A) Explanation/ মিষ্টি আলু, রূপান্তরিত মূল। স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন:

- মূল দ্বারা → মিষ্টি আলু, ডালিয়া, কাকরোল, পটল।
- কান্ড দ্বারা → আলু, আদা, পেঁয়াজ, সটি, ওলকচু।
- সাকার (বিশেষ কান্ড) → কলা, পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ।
- পাতা → পাথর কুচি।

04. আলু এক প্রকার রূপান্তরিত- [SylAU.2014-15]

- A. শিকড় B. কান্ড
C. পাতা D. ফুল

(B) Explanation/ রূপান্তরিত কান্ড: আদা, হলুদ, সটি, আলু, কচু।

রূপান্তরিত মূল: মিষ্টি আলু, মূলা, গাজর, শালগম।

05. কোন বীজে এরিল পাওয়া যায়? [SylAU.2013-14; JVC 2015-16]

- A. আম B. কলা
C. কাঁঠাল D. জায়ফল

Ans D

ফটোপিরিয়ডিক ইনডাকশনের প্রভাবে সৃষ্ট উদ্ভেজক পদার্থের নাম- [SyIAU. 09-10]

- A. অক্সিন
B. ফোরোফিল
C. ফোরিজেন
D. সাইটোকাইনি

Explanation পুষ্পায়নের জন্য আলোর প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ফটোপিরিয়ডিক ইনডাকশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় ফোরিজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়।

নিষেকের পর সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস কিসে পরিবর্তিত হয়? [SyIAU. 2009-10]

- A. শস্য
B. বীজ
C. বীজনাভী
D. জণ

Ans A

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

কিভাবে নিষেক ছাড়া জণ সৃষ্টি পদ্ধতিকে বলে- [CVASU. 2018-19]

- A. অ্যাপোস্পারি
B. অ্যাপোগ্যামি
C. পার্থেনোজেনেসিস
D. অ্যাডভেনটিভ এমব্রায়োনি

Explanation জণ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া:

- অ্যাপোস্পারি- ডিপ্লয়েড জণথলির ডিপ্লয়েড ডিম্বানু হতে নিষেক ছাড়াই জণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- অ্যাপোগ্যামি- ডিম্বানু ছাড়া জণথলির যে কোনো কোষ থেকে জণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- পার্থেনোজেনেসিস- নিষেক ছাড়া জণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
- অ্যাডভেনটিভ এমব্রায়োনি- ডিম্বকের ডিম্বক তুক বা নিউসেলাসের যে কোনো কোষ হতে জণথলি গঠন ছাড়াই জণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

কিটি আলু গাছের বংশ বৃদ্ধি প্রধানত কি দ্বারা হয়? [CVASU. 2011-12]

- A. পাতা
B. গাছের কান্ড
C. মূল
D. বীজ

Ans C

পাতা থেকে নতুন গাছের জন্ম হয় কোন উদ্ভিদে? [CVASU. 2011-12]

- A. পাথরকুচি
B. কলা
C. জবা
D. ক্যাকটাস

Ans A

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

একটি প্রাথমিক ডিম্বকোষ থেকে কয়টি ডিম্বক উৎপন্ন হয়? [PSTU. 2015-16]

- A. এক
B. দুই
C. তিন
D. চার

Explanation প্রাথমিক ডিম্ব কোষ মিয়োসিস প্রক্রিয়ার বিভাজিত হয়ে ৪ (চারটি) হ্যাপ্লয়েড ডিম্বক উৎপন্ন করে।

একটি ডিপ্লয়েড রেণু মাতৃকোষ মাইয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে কয়টি হ্যাপ্লয়েড পরাগরেণু সৃষ্টি হবে? [PSTU. 2014-15]

- A. ৪ টি
B. ৬ টি
C. ৩ টি
D. ২ টি

Ans A

NETWORK PRIME TEST

সস্য কলা-

- A. ডিপ্লয়েড
B. ট্রিপ্লয়েড
C. পলিপ্লয়েড
D. হ্যাপ্লয়েড

পরিষ্কৃতিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে-

- A. পরাগথলি
B. প্রাথমিক জননকোষ
C. ট্যাপেটাম
D. পলিনিয়াম

নিষেকের পর ইন্টাইন পরিবর্তিত হয়ে কি হয়?

- A. টেস্টা
B. বীজ
C. ফল
D. টেগমেন

04. কোনটির কান্ড থেকে নতুন গাছ সৃষ্টি হয়?

- A. আদা
B. হলুদ
C. ওলকচু
D. সবগুলো

05. নিষেকের পর প্রতিপাদ কোষ থেকে কি হয়?

- A. বীজতুক
B. বীজরন্ধ্র
C. বিনষ্ট হয়ে যায়
D. শস্য

06. পরাগরেণুর বাইরের তুকটি-

- A. কাইটিন নির্মিত
B. লিপিড নির্মিত
C. কিউটিন নির্মিত
D. সেলুলোজ নির্মিত

07. দুইটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনকে বলে-

- A. জাইগোস্পোর
B. মেটাস্পোর
C. অ্যাজাইগোস্পোর
D. উপরের সবগুলো

08. বীজহীন ফল সৃষ্টিতে সাহায্য করে কোনটি?

- A. অক্সিন
B. ফোরিজেন
C. ইথিলিন
D. সাইটোকাইনি

09. ডিম্বকের যে স্থানে ডিম্বক নাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে বলে-

- A. ডিম্বক মূল
B. ডিম্বকতুক
C. ডিম্বকরন্ধ্র
D. ডিম্বক নাড়ী

10. নিউসেলাস কিসের অংশ?

- A. পরাগধানীর
B. গর্ভদন্ডের
C. গর্ভমুন্ডের
D. ডিম্বকের

11. কোনটি পার্থেনোকারপিক ফল?

- A. অমৃত সাগর কলা
B. আম
C. জাম
D. অ্যাতোকেডো

12. নিচের কোনটি হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস-এর উদাহরণ?

- A. *Solanum nigrum*
B. *Solanum melongena*
C. *Parthenium argentatum*
D. *Taraxacum albidum*

13. নিষেকের পর ডিম্বানু কিসে পরিণত হয়?

- A. জণ
B. বীজ
C. ফল
D. শস্য

14. উদ্ভিদের নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত হয়-

- A. গর্ভমুন্ডে
B. গর্ভদন্ডে
C. গর্ভাশয়ে
D. ডিম্বকে

15. কোনটিতে সাইয়ন (Scion) ব্যবহৃত হয়?

- A. শাখা কলম
B. দাবা কলম
C. জোড় কলম
D. গুটি কলম

OMR SHEET			06. (A) (B) (C) (D)				12. (A) (B) (C) (D)										
01. (A) (B) (C) (D)			07. (A) (B) (C) (D)				13. (A) (B) (C) (D)										
02. (A) (B) (C) (D)			08. (A) (B) (C) (D)				14. (A) (B) (C) (D)										
03. (A) (B) (C) (D)			09. (A) (B) (C) (D)				15. (A) (B) (C) (D)										
04. (A) (B) (C) (D)			10. (A) (B) (C) (D)														
05. (A) (B) (C) (D)			11. (A) (B) (C) (D)														
ANS ANALYSIS			15.C		14.D		13.A		12.A		11.A		10.D				
09.D		08.A		07.A		06.C		05.C		04.D		03.D		02.C		01.B	



କି ପଢ଼ବ ? କେନ ପଢ଼ବ ?

SURVEY TABLE

କଉଟୁକୁ ପଢ଼ତ ? କିଭାବେ ପଢ଼ତ ?

টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATING [কেন গড়]
01	জীবের পরিবেশ	★
02	বাস্তুতন্ত্র	★★
03	উদ্ভিদের অভিযোজন	★★★
04	বিনুগুপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণি	★★
05	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	★★★



VVI DATA

NETWORK SPECIAL

AT A GLANCE

- ◆ পাটের দুটি প্রজাতি: *Corchorus capsularis* (সাদা পাট) এবং *Corchorus olitorius* (তোষা পাট)।
 - ◆ ভৌত পরিবেশের মধ্যে আছে- বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, অশ্মমন্ডল।
 - ◆ বায়োফিল্মার ও বায়োফিল্মারের সাথে বায়ু মন্ডল, বারিমন্ডল ও অশ্মমন্ডলের আন্তঃক্রিয়াকে বলা হয় ইকোফিল্মার।
 - ◆ খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় ঘটে।
 - ◆ খাদ্যক্রম যত উৎপাদককে ভক্ষণ করে তার দশমাংশ মাত্র ব্যবহারকারীর (খাদকের) দেহ গঠনের কাজে লাগে। এটি ১০ শতাংশ নিয়ম নামে পরিচিত। Lindenmann এ মতবাদের প্রবর্তক।
 - ◆ ঘাস হলো গ্রাসল্যান্ডের প্রধান ভেজিটেশন।
 - ◆ সাতনাতো দীর্ঘ শুকনো মৌসুম থাকে।
 - ◆ সবচেয়ে উত্তরের স্থল বায়োম হলো তুন্দ্রা।
 - ◆ তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ মস ও লাইকেন।
 - ◆ সবচেয়ে বড় ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকা, দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এরপর আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা এবং ফিলিপাইনের অংশবিশেষে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অবস্থিত।
 - ◆ আমাজান রেইন ফরেস্টকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় কারণ- সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২০% অক্সিজেন এ বনে নির্গত হয়।
 - ◆ বাংলাদেশের শালবন ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট।
 - ◆ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কনিফার ফরেস্ট আছে।
 - ◆ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ওয়েটল্যান্ড বায়োমের অন্তর্গত।
 - ◆ একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা উচিত।
 - ◆ বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চল কমে দাড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগ এর মতো।
 - ◆ পত্রঝরা বনে শাল বৃক্ষের পরিমাণ কোনো কোনো স্থানে শতকরা প্রায় ৯৯ পর্যন্ত। তাই এই বনের অপর নাম শালবন।
 - ◆ মূল শাল বৃক্ষের কর্তিত গোড়া থেকে গজানো চারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পত্রঝরা বন, তাই এ বনের আরেক নাম গজারী বন।
 - ◆ বর্তমানের প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৫০ একর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে।
 - ◆ লবণাক্ত পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় লোন উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট।
 - ◆ হ্যালোফাইট উদ্ভিদে শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর থাকে ও জরায়ুজ অঙ্গ হয়।
 - ◆ রোয়েটা সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন হুকার এন্ড থমসন। এর নামকরণ করেন S. K.
 - ◆ ফিল্ড জিন ব্যাংকের মাধ্যমে রিকালসিট্র্যান্ট বীজবাহী উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয়।
 - ◆ ফ্লোরা হলো- কোন এলাকার সকল উদ্ভিদ প্রজাতি।
 - ◆ কোন নির্দিষ্ট এলাকার একই প্রজাতির জীব সমষ্টিকে বলে- পপুলেশন।
 - ◆ অ্যারেনকাইমা থাকে- জলজ উদ্ভিদে।
 - ◆ নিউম্যাটোফোর (Pneumatophores) থাকে কোন উদ্ভিদে- Mangroves।
 - ◆ Ex-Situ সংরক্ষণ- সীড ব্যাংক।
 - ◆ Ecosystem এর জীবজ উপাদান- হিউমাস।
 - ◆ বায়ুকূটরী পাওয়া যায় যে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ে- Hydrophytes।
 - ◆ খরগোশ একটি- প্রাইমারী খাদক।
 - ◆ ঘড়িয়ালের বৈজ্ঞানিক নাম- *Gavialis gangeticus*।
 - ◆ Ramsar Site বলা হয়- সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওরকে।
 - ◆ গোখরা সাপের বৈজ্ঞানিক নাম- *Naja naja*।
 - ◆ জেরোফাইট এক ধরনের- মরুজ উদ্ভিদ।
 - ◆ ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণি- ঘড়িয়াল।



APYQ

ANALYSIS OF PREVIOUS YEAR QUESTIONS

CLUSTER AG

01. কোনটির ভাস্কুলার টিস্যু গঠনগত দিক থেকে দুর্বল? [C. AG. 2021-22]
- A. শাপলা B. সুন্দরী C. জবা D. ধান

(A) Explanation/ জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য:

- নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কান্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা মধ্যপর্ব বিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙ্গরবদ্ধ ভাসমান উদ্ভিদের কান্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।
- জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে মূল থাকে না বললেই চলে।
- কান্ড ও পাতার বহিঃত্বক কিউটিনযুক্ত থাকে না, বা কম থাকে। পত্ররন্ধ্রের প্রহরী কোষ নাও থাকতে পারে। এদের মূল ও কান্ডে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।
- মেকানিক্যাল টিস্যু খুবই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব শক্ত হয় না, অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

- কিছু উদ্ভিদের (আমাজান লিলি) পাতা এতো চওড়া যে, একটি হেঁট ভর বহন করতে পারে।
02. কি স্থাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা যায়? [C. AG. 14]

A. Blood bank B. Gene bank
C. Sperm bank D. Hormone bank

ⓑ Explanation/ জীববৈচিত্র্য দুই ভাবে সংরক্ষণ করা যায়:

- **ইনসিটু-কনজারভেশন:** স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশের মধ্যে জীব সংরক্ষণ। জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক, সাফারী পার্ক, বন্যজীব উল্লেখ্য গেম রিজার্ভ, বিশ্ব ঐতিহ্য- সুন্দরবন, মৎস্য অভয়াশ্রম (i. টাঙ্গুর হা ii. হাকালুকি হাওড়, iii. হালদা নদী)।

ECT SERIES •• NETWORK •• ASPECT SERIES •• NETWORK •• ASPECT SERIES •• NETWORK •• ASPECT SERIES •• NETWORK •• ASPECT SERIES •• NETWORK •• ASPECT SERIES •• NETWORK ••

- বুনোপরিবেশে বিলুপ্ত- বোস্তামী কাছিম।
- বিপন্ন প্রজাতি-কালো ভালুক।
- অরক্ষিত বা শংকাকুল প্রজাতি- পাঁতি শিয়াল।
- Red Data Book ছিল পৃথিবীর শংকিত প্রাণীদের তালিকাসম্বলিত পুস্তিকা।
- জাতিসংঘের বৃহত্তম সম্মেলন রিওডি জেনিরো (ব্রাজিলে ১৯৯২ সালে ৫ই জুন অনুষ্ঠিত হয়)।
- WSSD এর Meaning → World Summit on Sustainable Development.
- জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোকে হটস্পট বলে।
- হটস্পট শব্দের প্রচলন করেন ব্রিটিশ বাস্তব বিজ্ঞানী নর্মান মার্যাস।
- পৃথিবীতে ২৫টি হটস্পট আছে।
- বাংলাদেশের সমগ্র সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ইন্দোবান্ধা হটস্পট এর অন্তর্ভুক্ত।
- বাংলাদেশে প্রায় ৫ হাজার সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে।
- বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা ২৫৬টি।
- বাংলাদেশে ৩৪ প্রজাতির উভচর প্রাণি আছে।
- বাংলাদেশে বন্য সরিসৃপ প্রজাতির সংখ্যা ১৪৯।

16. একটি খাদ্য চক্রের কয়টি ধাপ থাকে?

[BAU 2005-06]

- A. 4-5টি B. 2-3টি
C. 3-4টি D. 5-6টি

Ans A

17. কোনগুলি প্রাথমিক খাদক?

- A. ছোট ছোট মাছ, ব্যঙ
B. মশার লার্ভা, পানির উপর জনজ মাছি
C. বড় বড় মাছ, বক, গাঙচিল
D. ফাইটোপ্লাটন, হাইড্রিলা, পাতা শেওলা

Ans B

18. নিম্নলিখিত সংবদ্ধ জলজ উদ্ভিদের নাম-

[BAU 2003-04]

- A. হাইড্রিনা
B. কচুরী পানা
C. শাপলা
D. অ্যাজোলা

Ans A

19. বাংলাদেশ কোন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্গত?

[BAU. 2002-03; SAU 09-10,10-11,RU-G 14-15]

- A. নিআৰ্কটিক
B. প্যালিআৰ্কটিক
C. ওৱিয়েণ্টাল
D. ইথিওপিয়ান

Explanation বাংলাদেশ ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ভারতীয় উপ-অঞ্চলের অন্তর্গত।

20. Wallace পৃথিবীকে কয়টি প্রাণী ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে?

[BAU 2003-04; CVASU 06-07]

- A. 4টি
C. 8টি

Ans B

21. কোনটি নিম্নোক্ত পিক্যাল অঞ্চলের পাখি?

[BAU 2001-02]

- A. কোকিল
B. পেলিক্যান
C. টুকান
D. লায়ার বার্ড

● Explanation/ বিভিন্ন অঙ্কের প্রাণি:

অঞ্চলের নাম	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম
প্যালিআর্কটিক অঞ্চল	হরিণ, ভাল্লুক, ভোঁদর, বলগা হরিণ, উট, গরু, কবুতর, ফ্রেমিংগো, উটপাখি, পেলিকন, এলিগেটর প্যাডেল ফিস, সাকারফিস, ক্যাটফিস।
ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (বাংলাদেশ)	হাতি, বাঘ, গীবন, ভাল্লুক, ওরাংউটাং, টাপীর, বাদুর, কবুতর, ফিঙে, কোকিল, ব্রু বার্ড, ময়ূর, কুমির, গুইসাপ, রুই, কাতলা, মুগেল, ক্যাট ফিস।
অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল	ক্যান্ডারু, ওয়াল্লাবি, কোয়েলা, ওমবাট, প্রাটিপাস, অপোসাস, লায়ার বার্ড, ক্যাসোয়ারি কাকাতোয়া, টিয়া, এমু, বার্ডস অব প্যারাডাইস, কাঠঠোকরা, কিউই, স্ফেনোডন, টিফলপস।

অঞ্চলের নাম	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম
নিওট্রোপিক্যাল অঞ্চল	ভাল্লুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসাম, উটপাখি, অস্ট্রিচ, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিংবার্ড, কুমির, কোরাল, সাপ, বোয়া, ভাইপার, বাইন মাছ, কালাথফিস, পিরানহা।
ইথিওপিয়ান অঞ্চল	গরীলা, শিম্পান্জী, লেমুর, হাতি, ভোঁদর, হায়না, আর্মাডিলা, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখি, বাজ, সারস, ফিঙে, কুমির, গুইসাপ, বোয়া, পাইথন, কালাথফিস।
নিআর্কটিক অঞ্চল	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়াছা, মেরুশিয়াল, ভাল্লুক, ক্যাসার, বাইসন, লালহরিণ, পেঁশকুন, টার্কিস, হামিংবার্ড, ফিঙে, কচ্ছপ, এলিগেটর, প্রবাল, সাপ, স্যালামান্ডার, প্যাডেল ফিস, বো ফিন, ফিস, ক্যাটফিস ইত্যাদি।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনটি মরুজ উদ্ভিদের শরীরবৃত্তীয় অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য নয়? [SAU 20

- A. অভিশ্রবনিক চাপ কম
B. প্রস্বেদনের হার কম
C. এনজাইমের ক্রিয়া
D. পানির অপচয় কম

Ⓐ Explanation/ মরুজ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন:

- মরু উদ্ভিদের অভিশ্রবনিক চাপ বেশি। তাই পানি শোষন মাত্রা বৃদ্ধি পানি শোষন সহজ হয়, খরচ হয় এবং অপচয় রোধ হয়।
- প্রস্বেদনের হার খুবই কম। তাই শোষিত পানির পরিমাণ কম হলে দেহভ্যন্তরে ধরে রাখতে পারে।
- বৃষ্টির সাথে সাথে শোষণ করে নিতে সক্ষম
- বর্ষজীবী উদ্ভিদসমূহ বৃষ্টির পরপরই অতি অল্প সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে।
- কম পানি, অতি উত্তাপ ইত্যাদি কারনে এনজাইমের ক্রিয়া কিছুটা কম। তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীর গতি হয়।
- পাতার ভেতরের দিকে অর্থাৎ নিম্নতরে পত্ররন্ধ্র থাকে।

02. উদ্ভিদ প্রজাতি বন্টনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাবক হলো- [SAU-2013]

- A. মাটির গঠন
B. মাটির তাপ
C. পানি
D. মাটিস্থ জৈব পদার্থ

● **Explanation** // উদ্ভিদ প্রজাতি বন্টনে পানির ভূমিকা: উদ্ভিদ প্রজাতি কী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাবক হল পানি। বাসস্থানে পানির প্রাপ্যতার উপর করে উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে চার ভাগ ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

- i. জলজ উদ্ভিদ: যে পরিবেশে প্রায় সব সময়ই পানি থাকে।
- ii. স্থলজ উদ্ভিদ: যে পরিবেশে মাটিতে পানির পরিমাণ মধ্যম প্রকৃতির।
- iii. মরুজ উদ্ভিদ: যে পরিবেশে মাটিতে পানির পরিমাণ খুবই কম।

03. লাতফিশ কোন প্রাণীভৌগলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত? [SAU.2014]

- A. ওরিয়েন্টাল B. অস্ট্রেলিয়ান
C. ইথিওপিয়ান D. প্যালিআর্কটিক

04. শাপলার কান্ড কোথায় থাকে?

- A. বায়ুতে
B. পানিতে
C. আংশিক বায়ু ও আংশিক পানিতে
D. কাদায়

05. *Rauwolfia serpentina* হচ্ছে এক ধরনের- [SAU 2010-11, CVASU, II-I]

- A. স্তন্যপায়ী জীব
B. ভেষজ উদ্ভিদ
C. কার্ণল উদ্ভিদ
D. সাপ

06. বিয়োজক কিরূপ?

- A. স্বভোজী
B. পরভোজী
C. পরজীবী
D. মতজীবী

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানী প্রথম খাদ্য পিরামিডের ব্যাখ্যা প্রদান করেন?

[SylIAU. 2018-19; BAU. 05-06]

- এলটন, ১৯৩৯ B. স্ট্রাসবার্গার, ১৯১৪
হরগোবিন্দ খোরানা, ১৯৫০ D. কোনটিই নয়

Explanation/ বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের অবদান:

কৃত্রিম জিন- হরগোবিন্দ খোরানা।
বিজ্ঞানী এলটন খাদ্য পিরামিডের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
ক্রোমোসোম আবিষ্কার- স্ট্রাসবার্গার।

কিছু কনজারভেশনের উদাহরণ কোনটি? [SylIAU.2016-17]

- ইকো পার্ক B. সাফরি পার্ক
বোটানিক্যাল গার্ডেন D. জাতীয় উদ্যান

Explanation/ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:

এক-সিউ: বোটানিক্যাল গার্ডেন, বীজ ব্যাংক, জিন ব্যাংক, ফিল্ড জিন ব্যাংক, চিড়িয়াখানা, নিন্দ্র তাপমাত্রায় সংরক্ষণ, ডিএন এ সংরক্ষণ, পরাগরেনু সংরক্ষণ।
ইন-সিউ: জাতীয় উদ্যান, ইকো পার্ক, সাফারী পার্ক, গেম রিজার্ভ, অভয়প্রম ইত্যাদি।

কোনটি টিয়া পাখির বৈজ্ঞানিক নাম? [SylIAU.2015-16]

- Copsychus saularis* B. *Penaeus monodon*
Psittacula eupatria D. *Pennatula phosphora*

Explanation/ মনে রাখা প্রয়োজন রাজ শকুন এর বৈজ্ঞানিক নাম-
ecogyps calvus.

সিপামের বৈজ্ঞানিক নাম কি? [SylIAU.2015-16]

- Ceriops decandra* B. *Asparagus racemosus*
Vallisneria spiralis D. *Corypha taliera*

Explanation/ বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
তালিপাম	<i>Corypha taliera</i>
মটিকা ঝাঁঝ	<i>Aldrovandu vesiculosu</i>
কুদে বড়লা	<i>Knema bengalensis</i>
কোকরুদ	<i>Licuala peltata</i>
গরান	<i>Ceriops decandra</i>
শতমূলী	<i>Asparagus racemosus</i>
ভ্যালেনসনারিয়া	<i>Vallisneria spiralis</i>
	<i>Corypha taliera</i>

নিচের কোনটি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি স্তরের খাদক? [SylIAU.14-15]

- A. পাখি B. বাঘ
C. ছাগল D. মানুষ

Explanation/ বিভিন্ন খাদক: পাখি→সেকেন্ডারি খাদক, ছাগল → প্রাথমিক খাদক, বাঘ → সেকেন্ডারি [কখনো টারশিয়ারি ও যখন মানুষ খায় তখন সর্বোচ্চ খাদক]।

নিচের কোনটি নিমজ্জিত উদ্ভিদ? [SylIAU.2013-14]

- A. হাইড্রিলা B. ইউট্রিকুলারিয়া
C. নায়াস D. সব কয়টিই

Ans D

পৃথিবীকে ছয়টি Avifaunal region-এ ভাগ করেন-

[SylIAU.2013-14, RU. G- 2015-16]

- A. Slater B. Wallace
C. Wayber D. Russel

Ans B

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' কোন প্রাণী-ভৌগোলিক অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণী?

[SylIAU. 2011-12]

- A. ওরিয়েন্টাল B. অস্ট্রেলিয়ান
C. ইথিওপিয়ান D. নিওট্রপিক্যাল

Ans A

09. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলে কোন বিশেষ ধরনের পাখি পাওয়া যায়? [SylIAU. 2009-10]

- A. কিউই B. পেলিক্যান
C. ম্যাকাউ D. হেজ স্প্যারো

Ans A

10. রামসাগর হলো-

[SylIAU. 2009-10]

- A. জাতীয় উদ্যান B. অভয়ারণ্য
C. সংরক্ষিত অঞ্চল D. লাইকোপিনের জন্য

Explanation/ বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক:

জাতীয় উদ্যানের নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
ভাওয়াল (ন্যাশনাল পার্ক)	গাজীপুর	৫০২২	১৯৮২
মধুপুর	টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ	৮৪৩৬	১৯৮২
রামসাগর (সবচেয়ে ছোট)	দিনাজপুর	২৭.৭৫	২০০১
হিমছড়ি (সর্ব প্রথম)	কক্সবাজার	১৭২৯	১৯৮০
লাউয়াছড়া	মৌলভীবাজার	১২৫০	১৯৯৬
কাপ্তাই	রাঙ্গামাটি	৫৪৬৪	১৯৯৯
নিঝুম দ্বীপ (সবচেয়ে বড়)	নোয়াখালী	১৬৩৫২	২০০১
মেধাকচ্চপিয়া	কক্সবাজার	৩৯৫	২০০৮
সাতছড়ি	হবিগঞ্জ	২৪২	২০০৪
খাদিমনগর	সিলেট	৬৭৮	২০০৬
বাড়ইডালা	চট্টগ্রাম	২৯৩৩	২০১০
নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর	৫১৭	২০১০
সিংখা	দিনাজপুর	৩০৫	২০১০
কাদিগড়	ময়মনসিংহ	৩৪৪	২০১০
আলতাদিঘি	নওগাঁ	২৬৪	২০১১
বীরগঞ্জ	দিনাজপুর	১৬৮	২০১১

11. পৃথিবীতে জীব বৈচিত্র্যের কতগুলি হটস্পট রয়েছে? [SylIAU. 2008-09]

- A. ১৮টি B. ২৫টি
C. ১০টি D. অসংখ্য

Ans B

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

01. শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণকে বলা হয়- [CVASU: 2017-18]

- A. হার্বেরিয়াম
B. আর্বোরিটাম
C. অর্কিডেরিয়াম
D. ক্রায়োপ্রিজারভেশন

Ans A

02. প্রকৃতি সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি? [CVASU.2008-09]

- A. IUCN
B. ICZN
C. UN
D. UNESCO

Ans A

03. লুকায়িত পত্ররক্ত পাওয়া যায়- [CVASU. 2007-08]

- A. জলজ উদ্ভিদে
B. মরুজ উদ্ভিদে
C. লবণাক্ত উদ্ভিদে
D. মেসো উদ্ভিদে

Ans B

04. মরুস্রবণের কারণ কোনটি? [CVASU. 2006-07]

- A. বেশি মাত্রায় পশু চরানো B. বৃক্ষ নিধন
C. আবহাওয়ার তারতম্য D. উপরের বর্ণিত সব কয়টি

Explanation/ মরুস্রবণ: কৃষি জমি অনুর্ব হয়ে যাওয়া, ফসল না ফলা, বন উজাড় হয়ে যাওয়া, নদী-নালা, খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়া, বৃষ্টির অভাব, আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন যার ফলে মানুষের জীবন ধারণের রীতির পরিবর্তন সাধন ও সামগ্রিক পরিবর্তন।

A. ওয়ার্ম স্পট B. হট স্পট
C. ফেমাস স্পট D. ডাইভার্স স্পট

- A. খুলনা
C. চট্টগ্রাম

A. এপিডার্মিস বহুস্থর বিশিষ্ট
B. পাতা কাটায় রূপান্তরিত হয়
C. কিউটিকল পুরু
D. কোনটিই নয়

(i) কিউটিকল থাকে না অথবা খুবই পাতলা থাকে (ii) মূলে মূলরোম অনুপস্থিত
(iii) নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কান্ডের ত্বকে ফ্লোরোপ্লাস্ট থাকে (iv)
এপিডার্মিস এক স্তর বিশিষ্ট।

A. পানি ফল
B. বাবলা
C. কলমী শাক
D. কুমড়া

A. সুনামি
B. দাবানল
C. ভূমিকম্প
D. মরুভূমি

A. জরায়ুজ অংকুরোদগম
B. পাতা কন্টকে পরিণত হয়
C. বড় বড় বায়ুকুঠরি থাকে
D. তাকে কিউটিকল থাকে না

A. তালিপাম B. পাতা ঝাঁজি
C. ক্ষুদ্রে বড়লা D. পানিয়াওলা

A. ইউরোপীয়
B. ভারতীয়
C. ভূ-মধ্যসাগরীয়
D. অস্ট্রেলিয়া

A. *Corandrum sativum*
B. *Curcuma domestica*
C. *Cunnamomum tamala*
D. *Foemculum Vulgare*

A. জোরোফাইট B. হ্যালোফাইট
C. হাইড্রোফাইট D. ছায়োফাইট

A. ওরিয়েন্টাল B. অস্টেলিয়ান
C. নিওট্রপিক্যাল D. ইথিওপিয়ান

A. *Eugenia earyophyllus*
B. *Enterolobium saman*
C. *Delonix regia*
D. *Tournefortia roxburghii*

A. হাকালুকি হাওর
B. রেমা-কেলেঙ্গা
C. টেংরাগিরি
D. দুধমুখী

A. Carolus Linnaeus B. Patriots
C. Eugen Odum D. Elton

A. পানি
B. মাটির তাপ
C. মাটিস্থ জৈব পদার্থ
D. মাটির গঠন

A. উৎপাদক B. মুখ্য খাদক
C. গৌণ খাদক D. টারসিয়ারী খাদক

A. সীড ব্যাংক
B. অভয়াারণ্য
C. শিকার সংরক্ষিত এলাকা
D. ইকোপার্ক

A. সুন্দরি
C. বাইন

B. গেওয়া
D. কড়ই

OMR SHEET		06. (A) (B) (C) (D)	12. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	13. (A) (B) (C) (D)	
02. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)	14. (A) (B) (C) (D)	
03. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)	15. (A) (B) (C) (D)	
04. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)		
05. (A) (B) (C) (D)	11. (A) (B) (C) (D)		

ANS ANALYSIS			15.D	14.A	13.D	12.A	11.D	10
09.C	08.A	07.B	06.C	05.D	04.D	03.B	02.B	01