



গণিত- ১ম পত্র

গণিত- ২য় পত্র

অধ্যায় ক্রম: অধ্যায়ের নাম পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যসূচি-১: সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

০১. ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক	362-370
০৩. সরলরেখা	371-384
০৪. বৃত্ত	384-393
০৭. সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	394-404
০৯. অন্তরীকরণ	405-427
১০. যোগজীকরণ	427-449

পাঠ্যসূচি-২: পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের বাকি অংশ

০২. ভেক্টর	450-453
০৫. বিন্যাস ও সমাবেশ	453-459
০৬. ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	460-462
০৮. ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র	463-467

অধ্যায় ক্রম: অধ্যায়ের নাম পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যসূচি-১: সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

০৩. জটিল সংখ্যা	468-475
০৪. বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ	476-485
০৬. কণিক	486-495
০৭. বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণ সমীকরণ	495-503
০৮. স্থিতিবিদ্যা	504-511
০৯. সমতলে বস্তুর কণার গতি	512-519

পাঠ্যসূচি-২: পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের বাকি অংশ


০১. বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা	520-522
০২. যোগাত্মকী প্রোগ্রাম	522-523
০৫. দ্বিপদী বিস্তৃতি	524-526
১০. বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা	527-530

নেটওয়ার্ক গুচ্ছ গণিত যেভাবে সাজানো:

- ◆ STEP-01: সার্ভে টেবিল- বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক সাজেশন
- ◆ STEP-02: আলোচনা- সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা
- ◆ STEP-03: প্রশ্ন বিশ্লেষণ- বিগত বছরের সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান
- ◆ STEP-04: প্রাইম টেস্ট- মানসম্মত অধ্যায়ভিত্তিক সেলফ টেস্ট
- ◆ STEP-05: মডেল টেস্ট- মানসম্মত প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি যাচাই

গণিতের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি এবং বিস্তারিত টেকনিকসহ আলোচনার জন্য-
আসপেক্ট সিরিজের **ASPECT MATH** বইটি দেখতে পার।

দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ, জনপ্রিয় ও সুপরিচিত শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘদিনের
অভিজ্ঞতায় দেশসেরা আসপেক্ট সিরিজ-এর বইগুলো সর্বদাই অতুলনীয়



পথ চলার

১ যুগ
পেরিয়ে

ASPECT SERIES

পাঠ্যবইকে সহজ করার প্রয়াস...



১ম অংশ: ম্যাট্রিক্স [MATRIX]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টি প্রশ্ন আসতে পারে।


TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ মাত্রা/ক্রম ও মান নির্ণয় সংক্রান্ত	**
02	ম্যাট্রিক্সের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও সমতা	**
03	ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স [Singular]	***
04	অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স [Adjoint]	***

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

TOPIC 01 ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ মাত্রা/ক্রম ও মান নির্ণয় সংক্রান্ত

কর্ণ পরিচিতি:

মুখ্য বা প্রধান কর্ণ (Principal or main Matrix): $[A_{ij}]_{n \times n}$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে দুটি কর্ণ পাওয়া যাবে। ম্যাট্রিক্সের প্রথম সারি ও প্রথম কলামে যে উপাদান থাকে তাকে নিয়ে যে কর্ণ গঠিত হয় তাই মুখ্য কর্ণ এবং অপর কর্ণটি গৌণ কর্ণ। যেমন-



Note: (1) মুখ্য কর্ণের উপাদান গুলোর যোগফলকে ট্রেস $(a + y + r)$ বলে।
(2) মুখ্য কর্ণের উপাদান গুলোর গুণফলকে মুখ্যপদ (ayr) বলে।
(3) গৌণ কর্ণের উপাদান গুলোর গুণফলকে (pyc) গৌণপদ বলে।

Different Types of Matrix:

[অনেক প্রকার ম্যাট্রিক্স রয়েছে এর মধ্যেও পরীক্ষাতে যেগুলো আসে নিচে সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো]

01. বর্গ ম্যাট্রিক্স (Square Matrix): যখন সারি সংখ্যা = কলাম সংখ্যা। অর্থাৎ $[A_{ij}]_{m \times n}$ ম্যাট্রিক্সটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে $m = n$ হবে।

যেমন- $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ একটি 2×2 ক্রমের বা 2 ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স

02. আয়ত ম্যাট্রিক্স (Rectangular Matrix): সারির সংখ্যা কলাম সংখ্যার সমান না হলে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স হয়। অর্থাৎ $[A_{ij}]_{m \times n}$ আয়ত ম্যাট্রিক্স হলে $m \neq n$ হবে।

Ex: (i) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, মাত্রা = 2×3 ; সারির সংখ্যা (2) $\neq$ কলাম সংখ্যা (3)।
(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$, সারি = 3টি, কলাম = 2টি, সারি $\neq$ কলাম।

03. কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal Matrix): কোন বর্গ ম্যাট্রিক্স $[A_{ij}]_{n \times n}$ কে n ক্রমের কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $[A_{ij}] = 0$ যখন $i \neq j$ অর্থাৎ প্রধান কর্ণের উপাদান ব্যতীত সকল উপাদান '0' হবে। যেমন- $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

04. স্কেলার ম্যাট্রিক্স (Scalar Matrix): যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের অশূন্য উপাদান গুলো

সমান। যেমন- $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ স্কেলার ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়কের মান $= a^3$

05. একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স (Unit or Identity Matrix): কোন বর্গ ম্যাট্রিক্স $[A_{ij}]_{n \times n}$ কে n ক্রমের একক ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A_{ij} = 0$ যখন $i \neq j$ এবং $A_{ij} = 1$ যখন $i = j$ হয়। I দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বর্গ/কর্ণ/স্কেলার হবে।

$$\text{যেমন- } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

06. সমঘাতি ম্যাট্রিক্স (Idempotent Matrix): বর্গাকার কোন ম্যাট্রিক্স A কে সমঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হবে যখন $A^2 = A$ হবে। যেমন: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ হলে

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = A$$

07. অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (Involutory Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A^2 = I$ হয়। যেমন- $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$

$$\text{এখানে } A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

08. ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স (Transpose Matrix): সারি এবং কলাম যখন স্থান বিনিময় করে। যেমন-

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{bmatrix} \text{ এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স } A^T \text{ বা } A' = \begin{bmatrix} a & x & p \\ b & y & q \\ c & z & r \end{bmatrix}$$

09. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A^T = A$ হয় অর্থাৎ $A_{ij} = A_{ji}$ হয়। যেমন-

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ হবে;}$$

A হবে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

10. বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew - Symmetric Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A $= [A_{ij}]_{n \times n}$ কে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A^T = -A$ হয়

$$\text{অর্থাৎ } A_{ij} = -A_{ji} \text{ হয়। যেমন- } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ হলে}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -3 \\ -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

Note: বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে $A^T = -A$ হবে এবং প্রধান কর্ণের উপাদান শূন্য হবে (অর্থাৎ $A_{ii} = 0$ যখন $i = j$)

একনজরে বিভিন্ন ম্যাট্রিক্সের মান নির্ণয়

- কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মান/নির্ণায়ক $= abc$
- স্কেলার ম্যাট্রিক্সের মান $= a^3$
- অভেদক ম্যাট্রিক্সের মান $= 1$
- কর্ণ ম্যাট্রিক্সের $a = b = c$ হলে, উহা স্কেলার।

মান নির্ণয় সংক্রান্ত শর্টকাট ধর্ম

n -ক্রমের ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $|MA| = M^n |A|$
[যেখানে M = স্কেলার রাশি, |A| = নির্ণায়কের মান]

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 Matrix $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ এর নাম-

[BUTex. 14-15]

Solve যে Matrix এর কলাম এবং সারি inter-change করলে Matrix অপরিবর্তিত থাকে। তাকে প্রতিসম Matrix বলে।

TOPIC 02 ম্যাট্রিক্সের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও সমতা

- দুটি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা সমান না হলে যোগ বা বিয়োগ করা যায় না।
- দুটি ম্যাট্রিক্স সমান হলে তাদের অনুরূপ উপাদানগুলো সমান হবে।

- দুটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর গুণফল AB নির্ণয় করা যাবে যদি A ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা B ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যার সমান হয়।
 $\therefore A = [a_{ij}]_{m \times n}$ এবং $B = [b_{ij}]_{n \times r}$ হলে যদি $AB = [ab_{ij}]_{m \times r}$ হয় তবে AB ম্যাট্রিক্সের মাত্রা $m \times r$ হবে।
 □ ম্যাট্রিক্স গুণনের ক্ষেত্রে যেকোনো একটি সারি বা কলাম এর গুণ বের করে দেখলেই Ans. অপশনে পাওয়া যায়।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ এবং $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, $AB = ?$ [DU. 14-15; RU. 18-19]

Solve $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 & 2 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 \\ (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 3 & (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 3 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 4 - 6 & 4 - 6 \\ -4 + 6 & -4 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

MEEx 02 তিনটি ম্যাট্রিক্স $\begin{bmatrix} x & y \\ a & h \\ h & b \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ এর গুণফলের মান হবে-
 [BUET. 12-13; RU. 17-18; CU. 13-14; BRU-E. 19-20]

Solve $\begin{bmatrix} x & y \\ a & h \\ h & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + hy & hx + by \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
 $= [ax^2 + hxy + hxy + by^2] = [x^2a + 2xyh + y^2b]$

TOPIC 03 ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স [Singular]

- যে ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য তাকে Singular বা ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\begin{pmatrix} p-4 & 8 \\ 2 & p+2 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে যদি p এর মান-
 [DU. 09-10, 07-08, 05-06; RU. 17-18; BSMRSTU-B. 19-20]

Solve ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী বলে, $(p-4)(p+2) - 16 = 0$
 $\Rightarrow p^2 - 2p - 24 = 0 \Rightarrow (p-6)(p+4) = 0 \therefore p = 6, -4$

TOPIC 04 অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স [Adjoint]

- **Adjoint ম্যাট্রিক্স:** কোন বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়ক |A| এর সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের (ভুক্তিগুলোর ক্রম অনুসারে) Transpose ম্যাট্রিক্সকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর Adjoint matrix বলা হয়। এটিকে সূচিত করা হয় Adj (A)

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা adjoint of A / Adj (A)
 $=$ প্রাইমারি কর্ণের উপাদানগুলোর স্থান পরিবর্তন এবং সেকেন্ডারি কর্ণের উপাদানগুলোর চিহ্ন পরিবর্তন করলে যা পাওয়া যায় তাই Adjoint
 $\therefore$ Adjoint of $A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

A ম্যাট্রিক্সের বিপরীত বা Inverse ম্যাট্রিক্স $= \frac{1}{\text{Det}(A)} \text{Adj}(A)$
 $= \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

Note: সকল ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকে না। Inverse ম্যাট্রিক্স থাকার শর্ত দুটি:

- (i) ম্যাট্রিক্সটি অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে।
 (ii) ম্যাট্রিক্সটির নির্ণায়কের মান শূন্য হওয়া যাবে না।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 যদি $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ হয় তবে $A^{-1} = ?$

[DU. 06-07; RU. 15-16; JnU. 06-07; CU. 13-14]

Solve By Using Tricks, $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
 $= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

MEEx 02 $\begin{bmatrix} k\sqrt{k} & 2 \\ 2 & \sqrt{k} \end{bmatrix}$ একটি বাস্তব ম্যাট্রিক্স। k এর কোন মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে না? [KUET. 12-13; SUST. 17-18]
Solve বিপরীত ম্যাট্রিক্স না পাওয়া গেলে $|A| = 0 \Rightarrow k \cdot k - 4 = 0$
 $\Rightarrow k^2 = 4 \Rightarrow k = \pm 2$

STEP 03 বিভাগে সাধারণ প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নাল ভাষায় সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. A এবং $(A^T + B)C$ ম্যাট্রিক্স দুইটির ক্রম যথাক্রমে 4×5 এবং 5×2 হলে C ম্যাট্রিক্স এর ক্রম কী হবে? [GST-A. 2022-2023]

- A. 4×2 B. 4×3 C. 4×4 D. 4×5

S@Why $(A^T + B)C$ এর ক্রম 5×2 আবার, A এর ক্রম 4×5 $(A^T + B)$ এর ক্রম 5×4 $\therefore$ C হবে 4×2

02. 3×2 এবং 2×3 ক্রম বিশিষ্ট দুটি ম্যাট্রিক্স যথাক্রমে A এবং B এর ভুক্তি 0 বা 1 হলে $\text{tr}(BA)$ এর সর্বোচ্চ মান হবে- [GST-A. 21-22]

- A. 0 B. 1 C. 6 D. 9

S@Why সর্বোচ্চ মানের জন্য

A ম্যাট্রিক্স হবে $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$; B ম্যাট্রিক্স হবে $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$

$\therefore BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

$\therefore$ ট্রেস $= (3+3) = 6$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $A = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A(\text{Adj} A) = ?$ যেখানে Adj A হলো A এর সহায়ক (adjoint) ম্যাট্রিক্স। [JnU. 17-18]

- A. $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

S@Why $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$

$\therefore A \cdot \text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

02. $M = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ হলে M^{-1} সমান কত? [JnU. 16-17]

- A. $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -5 & -2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$

S@Why $M = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$

$\therefore M^{-1} = \frac{1}{\text{Det}(M)} \text{adj}(M) = \frac{1}{5-6} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$

03. কোন ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নেই- [JnU. 12-13; RU. 16-17]

- A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

S@Why যে ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক শূন্য তার বিপরীত ম্যাট্রিক্স নেই।

04. যদি $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ এবং $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ হয় তাহলে AX সমান- [JnU. 09-10]

- A. $X = \begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}$ B. $X = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ C. $X = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$ D. $X = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

S@Why $AX = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot x - 1 \cdot y \\ 1 \cdot x + 0 \cdot y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

05. যদি $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ হয় তবে AB সমান-

[JnU. 08-09]

A. $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 15 & -3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 10 & -3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 10 & 3 \end{pmatrix}$

[S@Why] $AB = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 0 \cdot (-3) \\ 5 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 5 \cdot 0 + 1 \cdot (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 10 & -3 \end{pmatrix}$

II খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় **II**

01. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ টি i. কর্ণ ম্যাট্রিক্স ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স iii. অভেদক ম্যাট্রিক্স। [KU. 19-20]

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

A. i, iii B. i, iii C. ii, iii D. i, ii, iii

[S@Why] i. কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal Matrix): যে বর্গ ম্যাট্রিক্স প্রধান কর্ণের (a_{ii} ; $i = j$) ভুক্তিগুলো ব্যতিত অন্যসব ভুক্তি শূন্য।

ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স (Scalar Matrix): যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের অশূন্য ভুক্তিগুলো সমান।

iii. অভেদক ম্যাট্রিক্স বা একক ম্যাট্রিক্স (Identity or unit Matrix): যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের কর্ণস্থিত সকল ভুক্তি 1।

02. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ এবং $A^2 + 2A - 11x = 0$ হলে x এর মান কত? [KU. 19-20]

A. $\begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$

[S@Why] $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$

$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{pmatrix}$

$\therefore A^2 + 2A - 11x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} - 11x = 0$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & -6 \end{pmatrix} - 11x = 0$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} - 11x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

03. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে তাদের যোগফল কত? [KU. 12-13]

A. $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ D. যোগ করা যাবে না

[S@Why] A ম্যাট্রিক্সের মাত্রা 2×2 এবং B ম্যাট্রিক্সের মাত্রা 1×2 যেহেতু ম্যাট্রিক্সদ্বয়ের মাত্রা সমান নয় তাই যোগ করা যাবে না।

II ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় **II**

01. বর্গাকার কোন ম্যাট্রিক্স A-এর ক্ষেত্রে যদি $A^2 = A$ হয়, তবে সেই ম্যাট্রিক্সটি-

[IU-A: 19-20; SUST: 17-18]

A. সমঘাতি B. প্রতিসম C. পর্যায়বৃত্ত D. অভেদঘাতি

[S@Why] বর্গাকার ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে $A^2 = A$ হলে A একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স।

02. k এর কোন মানের জন্য $\begin{pmatrix} \sqrt{k} & 2 \\ 8 & k\sqrt{k} \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স-

[IU-D. 19-20]

A. -4 B. 4 C. $\sqrt{2}$ D. ± 4

[S@Why] ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়কের মান শূন্য

$\therefore \sqrt{k} \times (k\sqrt{k}) - 16 = 0 \Rightarrow k^2 - 16 = 0 \Rightarrow k = \pm 4$

[$k = -4$ বসালে তা কাল্পনিক সংখ্যা হয়, যা উত্তর হতে পারে না। $\therefore k = 4$]

03. যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়কের মান অশূন্য তাকে বলে-

[IU. 17-18]

A. ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স B. অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স

C. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স D. একক ম্যাট্রিক্স

[S@Why] যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়কের মান অশূন্য তাকে বলে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স।

04. নিচের কোনটি Complex Matrix?

[IU. 17-18]

A. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3+1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ B. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$ C. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ D. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

[S@Why] যে ম্যাট্রিক্সের এক বা একাধিক উপাদান জটিল সংখ্যা তাকে জটিল ম্যাট্রিক্স বলে।

05. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & a & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির Trace-এর মান 7 হলে a এর মান কত? [IU. 17-18]

A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

[S@Why] ম্যাট্রিক্সের ট্রেস = $1 + a + 4 = 5 + a$

$\therefore$ শর্তানুসারে, $5 + a = 7$ বা, $a = 2$

06. কর্ণ ম্যাট্রিক্সের অশূন্য ভুক্তিদুই সমান হলে তাকে বলা হয়- [IU. 16-17]

A. সারি ম্যাট্রিক্স B. স্কেলার ম্যাট্রিক্স C. শূন্য ম্যাট্রিক্স D. কর্ণ ম্যাট্রিক্স

[S@Why] যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মূল্য কর্ণের উপাদানগুলো সমান তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে।

07. নিচের কোনটি অপ্রতিসম Matrix? [IU. 16-17]

A. $\begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} b & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -b & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & -b \\ 0 & b \end{bmatrix}$

[S@Why] বিপ্রতিসম/অপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew-symmetric Matrix):

একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স $= A^T$ এবং $A = -A^T$ বা, $A^T = -A$ হলে তাকে বিপ্রতিসম/অপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে। এর Prime কর্ণের ভুক্তি সমূহ শূন্য হয়।

08. $\begin{pmatrix} a-3 & 5 \\ 4 & a-4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে a এর মান হবে-

[IU. 16-17; IU: 14-15; KU: 11-12]

A. -8, 1 B. 4, -1 C. 8, -1 D. 5, 4

[S@Why] $\begin{pmatrix} a-3 & 5 \\ 4 & a-4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী বলে নির্ণয়কের মান শূন্য

$\therefore (a-3)(a-4) - 20 = 0 \Rightarrow a^2 - 7a - 8 = 0$

$\Rightarrow a^2 - 8a + a - 8 = 0 \Rightarrow (a-8)(a+1) = 0 \therefore a = 8, -1$

09. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix}$ হলে x ও y এর মান-

[IU. 15-16]

A. $\begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

[S@Why] $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4x \\ -2x + 3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$ এবং $-2x + 3y = 3$

$\Rightarrow -6 + 3y = 3 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3 \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

10. যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের কর্ণের উপাদানগুলো অশূন্য ও সমান এবং অন্যান্য উপাদানগুলো শূন্য তাকে বলা হয়?

[IU. 10-11, 08-09, 04-05; JnU. 12-13]

A. কর্ণ B. ইউনিট ম্যাট্রিক্স C. স্কেলার ম্যাট্রিক্স D. বর্গ ম্যাট্রিক্স

[S@Why] যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের কর্ণের উপাদানগুলো অশূন্য ও সমান এবং অন্যান্য উপাদানগুলো শূন্য তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে।

II বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় **II**

01. যদি A একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স এবং $|A| = -7$ হয়, তাহলে $|(2A)^{-1}|$ এর মান-

[BRUR-E. 19-20]

A. $-\frac{1}{14}$ B. $-\frac{1}{56}$ C. $-\frac{8}{7}$ D. $-\frac{2}{7}$

[S@Why] $|(PA_n, n)^{-1}| = \frac{1}{p^n |A|} \therefore |(2A)^{-1}| = \frac{1}{2^3 (-7)} = -\frac{1}{56}$

II জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় **II**

01. যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A^T = ?$

[JKKNIU. 19-20]

A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

[S@Why] $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \therefore A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

02. নিচের কোন ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নেই? [JKKNU. 19-20]

- A. $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

S@Why বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকার শর্ত:

i) বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে। ii) ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হওয়া যাবে না।

$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য তাই বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা যাবে না।

03. $A = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ -5 & -9 \end{bmatrix}$ হলে $(A^T)^{-1}$ কত? [JKKNU. 17-18]

- A. $\begin{bmatrix} 9 & -5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -9 & 5 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 9 & -5 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$

S@Why $A = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ -5 & -9 \end{bmatrix}$ $\therefore A^T = \begin{bmatrix} -4 & -5 \\ 7 & -9 \end{bmatrix}$

$$(A^T)^{-1} = \frac{1}{-36 + 35} \begin{bmatrix} -9 & 5 \\ -7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি ম্যাট্রিক্স $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং ম্যাট্রিক্স $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে ম্যাট্রিক্স B কোনটি? [SUST-A. 19-20]

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
D. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

S@Why $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{\text{Det}(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; B = A^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} + \frac{1}{3} & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} + \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aspect special tricks: অপশন টেস্ট করলেই হবে।

অর্থাৎ যে অপশনের সাথে A ম্যাট্রিক্স গুণ করলে AB ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় সে অপশনটিই সঠিক Ans.।

02. 3×3 আকারের কর্ণ ম্যাট্রিক্স A এর কর্ণ উপাদানগুলির গুণফল $2\sqrt{2}$ হলে $|(\sqrt{2}I - A)^3|$ এর মান কত? [SUST-A. 16-17]

- A. $2\sqrt{2}$ B. $24\sqrt{2}$ C. $12\sqrt{2}$
D. 0 E. $-12\sqrt{2}$

S@Why $|(\sqrt{2}I - A)^3| = (2\sqrt{2} - 2\sqrt{2})^3 = 0$

03. 3×3 আকারের একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স D এর জন্য $|D| = 20$ হলে $|(2D)^{-1}|$ এর মান কত? [SUST. 15-16]

- A. $\frac{1}{100}$ B. $\frac{1}{40}$ C. $\frac{1}{10}$
D. $-\frac{1}{160}$ E. $-\frac{1}{40}$

S@Why $|D| = 20$ হলে $|(2D)^{-1}| = (2 \times 2 \times 2 \times 20)^{-1} = \frac{1}{160}$

04. x এর কোন মানগুলির জন্য $\begin{pmatrix} x & -1 & -1 \\ 0 & x & -3 \\ x-4 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের কোনো বিপরীত

ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে না। [SUST. 15-16]

- A. 6, -2 B. -6, -2 C. -6, 2
D. -6, 2 E. 6, 4

S@Why $\begin{pmatrix} x & -1 & -1 \\ 0 & x & -3 \\ x-4 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} x & -1 & -1 \\ 0 & x & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$

$$\Rightarrow x(x-4) - 4(3+x) = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 2x - 12 = 0 \Rightarrow x(x-6) + 2(x-6) = 0$$

$$\Rightarrow (x-6)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 6, -2$$

05. $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ হলে $x^{-1} = ?$ [SUST. 14-15]


- A. $\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ E. অসংজ্ঞায়িত

S@Why $x^{-1} = \frac{1}{-2+3} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

06. A এবং B ম্যাট্রিক্স দুটির মাত্রা (Order) যথাক্রমে 2×3 এবং 3×5 হলে নিচের কোনটি সত্য- [SUST. 07-08]

- A. BA সংজ্ঞায়িত হবে B. AB সংজ্ঞায়িত হবে
C. AB এর মাত্রা হবে 5×2 D. AB এর মাত্রা হবে 3×3

S@Why A ম্যাট্রিক্সের মাত্রা $= 2 \times 3$; B ম্যাট্রিক্সের মাত্রা $= 3 \times 5$



যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $A = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ হলে, $AB = ?$ [JUST-A. 19-20]

- A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

S@Why $A = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$; $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. P, Q, R ম্যাট্রিক্সগুলির আকার 4×5 , 5×4 এবং 2×4 হলে $(P^T + Q)R^T$ ম্যাট্রিক্সের আকার কত হবে? [MBSTU-C. 19-20; ব.বো. ২০১৯]

- A. 5×4 B. 5×2 C. 4×2 D. 4×5

S@Why P ম্যাট্রিক্সের আকার 4×5

Q ম্যাট্রিক্সের আকার 5×4

R " " 2×4

$\therefore P^T$ ম্যাট্রিক্সের আকার $= 5 \times 4$

$\therefore P^T + Q$ " " $= 5 \times 4$

$\therefore R^T$ " " $= 4 \times 2$

$\therefore (P^T + Q)R^T$ ম্যাট্রিক্সের আকার 5×2

02. ম্যাট্রিক্স $A = \begin{bmatrix} \lambda+4 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকবে না, যদি λ এর মান হয়- [MBSTU-C. 19-20]

- A. 0 B. 4 C. -4 D. 12

S@Why নির্ণায়কের মান শূন্য হলে বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকবে না।

$\therefore (\lambda+4)3 - 24 = 0$ হলে বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকবে না।

$$\Rightarrow 3\lambda + 12 - 24 = 0; \lambda = \frac{12}{3} = 4$$

03. P একটি 2×3 ম্যাট্রিক্স এবং Q একটি 3×4 ম্যাট্রিক্স হলে QP-

[MBSTU-A. 19-20]

A. 2×4 ম্যাট্রিক্স B. 4×2 ম্যাট্রিক্স C. 3×3 ম্যাট্রিক্স D. অগুন যোগ্য

SOWHY P ম্যাট্রিক্স এর আকার 2×3 , Q ম্যাট্রিক্সের আকার 3×4

$\therefore$ QP ম্যাট্রিক্সের আকার $(3 \times 4)(2 \times 3)$ [যা অগুনযোগ্য]

04. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ a & -3 & 0 \end{bmatrix}$ হলে a এর কোন মানের জন্য A একটি বিপরীতসম ম্যাট্রিক্স হবে?

[MBSTU. 16-17]

A. $a = 1$ B. $a = -1$ C. $a = 0$ D. $a = 4$

SOWHY $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ a & -3 & 0 \end{bmatrix}$

$a = 4$ হলে $A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -3 \\ -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -A$

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. ম্যাট্রিক্স গুণনের ক্ষেত্রে, নিচের কোনটি সত্য?

[PUST. 17-18]

A. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1-1) = (0 \ 0)$ B. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1-1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1-1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1-1) = (2)$

SOWHY $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1-1) = \begin{pmatrix} 1 \times 1 & 1 \times (-1) \\ (-1) \times 1 & (-1) \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিচের কোনটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স?

[BSMRSTU-A. 19-20]

A. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ D. কোনটিই নয়

SOWHY একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলা যাবে যদি $A^T = A$ হয়।

02. A একটি অভেদক ম্যাট্রিক্স হলে $A^{-1} + A + A^2 = ?$

[BSMRSTU. 18-19]

A. A^2 B. 2^0 C. $3A$ D. $1 + A^2 + A^2$

SOWHY Aspect special tricks: অভেদক ম্যাট্রিক্সের মান 1

$\therefore A^{-1} + A + A^2 = 1^{-1} + 1 + 1^2 = 3$

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $A = \begin{bmatrix} a & 5 & 4 \\ -5 & b & 3 \\ -4 & 3 & c \end{bmatrix}$ একটি বিপরীতসম ম্যাট্রিক্স হয়, তাহলে a, b, c এর মানগুলো হবে-

[BSFMSTU. 19-20]

A. $-5, -4, -3$ B. $0, 0, 0$ C. $1, 1, 1$ D. $5, 4, 3$

SOWHY $\begin{bmatrix} -a & 5 & 4 \\ -5 & b & 3 \\ -4 & 3 & c \end{bmatrix}$ একটি বিপরীতসম ম্যাট্রিক্স হলে $a = 0, b = 0$

এবং $c = 0$ হবে।

02. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ হলে-

[BSFMSTU. 19-20]

(i) $A - B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (ii) $A^T = B$ (iii) $AB \neq BA$

A. (i) ও (ii) B. (ii) ও (iii) C. (i) ও (iii) D. (i), (ii) ও (iii)

SOWHY $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; A - B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$A^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = B, AB = \begin{pmatrix} 25 & 11 \\ 11 & 5 \end{pmatrix}; BA = \begin{pmatrix} 20 & 14 \\ 14 & 10 \end{pmatrix}$

$\therefore AB \neq BA$

২য় অংশ: নির্ণায়ক [DETERMINANT]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টি প্রশ্ন আসতে পারে

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	নির্ণায়কের মান নির্ণয়	***
02	অনুরাশি ও সহগুণক নির্ণয়	**
03	একটি অজানা চলক থাকলে মান নির্ণয়	***

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

TOPIC 01 নির্ণায়কের মান নির্ণয়

Technique: নির্ণায়কের মান: কোন নির্ণায়কের যে কোন সারি বা কলামের এর উপাদানসমূহ ও তাদের নিজ নিজ সহগুণক গুণফলের সমষ্টিই নির্ণায়কের মান।

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়কের a_1, a_2, a_3 -এর সহগুণক যথাক্রমে A_1, A_2, A_3

হলে নির্ণায়কের মান হবে

$$= a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \times - \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

$$\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$$

MEX 01

এর মান- $[\omega]$ এককের একটি জটিল ঘনমূল।

[DU. 09-10; JU. 09-10; SUST. 09-10; CU. 07-10]

Solve

নির্ণায়কের অংকে যদি কোথাও ω থাকে তাহলে $\omega = 1$ বসিয়ে নির্ণায়কের মান নির্ণয় করলে Answer পাওয়া যাবে।

$$\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

TOPIC 02 অনুরাশি ও সহগুণক নির্ণয়

Technique: পঙ্গুফায় যেভাবে অনুরাশি বের করবে:

Step-1: যে রাশি বা সংখ্যার অনুরাশি বের করতে বলবে ঠিক সেই রাশি বরাবর Row এবং Column বাদ দাও।

Step-2: বাকি উপাদানগুলো দিয়ে নির্ণায়ক গঠন কর। সেটিই অনুরাশি।

Step-3: মান বের করতে বললে সাধারণ নিয়মে নির্ণায়কের মান বের করতে হবে।

অনুরাশি সামনে $(-1)^{R+C}$ সূত্র ব্যবহার করে যথাযথ চিহ্ন বসানো। সেটিই সহগুণক

যেখানে R = সারি, C = কলাম অর্থাৎ সহগুণক $= (-1)^{R+C} \times$ অনুরাশি

অর্থাৎ, অনুরাশিকে উক্ত উপাদানের চিহ্ন দিয়ে গুণ করলে সহগুণক পাওয়া যায়

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

$$\text{MEX 01 } A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 8 \end{vmatrix}$$

হলে, 7 উপাদানটির অনুরাশি কোনটি? [JU. 19-20]

Solve: 7 এর অনুরাশি $= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 4 = 14$

TOPIC 03 একটি অজানা চলক থাকলে মান নির্ণয়

Technique: এই নিয়মের অংকগুলো সরাসরি নির্ণায়কের মৌলিক নিয়ম ব্যবহার করে করা যায়। যথা:

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 মান নির্ণয় কর : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix}$ [BUET. 07-08; RUET. 13-14, 12-13, 08-09, 07-08; ঢা.বো: 12, 07; রা.বো: 11-10; কু.বো: 15]

Solve $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1-p & p-p^2 & p^2 \\ 1-p^2 & p^2-p^4 & p^4 \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 - c_2; c'_2 = c_2 - c_3]$

$$= (1-p)(1-p) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1+p & (1+p)p^2 & p^4 \end{vmatrix}$$

$$= (1-p)^2 \begin{vmatrix} 1 & p & p^2 \\ 1+p & (1+p)p^2 & p^4 \end{vmatrix} = (1-p)^2 (p^2 + p^3 - p - p^2)$$

$$= (1-p)^2 (p^3 - p) = p(1-p)^2 (p^2 - 1)$$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামোলাল ভ্যাসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $i^2 = -1$ হলে $\begin{vmatrix} i & i^3 & i+i^3 \\ i^3 & i^5 & i^3+i^5 \\ i^5 & i^7 & i^5+i^7 \end{vmatrix}$ [GST-A. 20-21]

A. -1 B. 0 C. 1 D. i

S@Why $\begin{vmatrix} i & i^3 & i+i^3 \\ i^3 & i^5 & i^3+i^5 \\ i^5 & i^7 & i^5+i^7 \end{vmatrix}$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} i & i^3 & i \\ i^3 & i^5 & i^3 \\ i^5 & i^7 & i^5 \end{vmatrix} = 0 [C_3 = C_1 - C_2]$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\begin{vmatrix} 10 & 13 & 16 \\ 11 & 14 & 17 \\ 12 & 15 & 18 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান- [JnU. 10-11; RU. 10-11]

A. 0 B. 1 C. 10 D. 5

S@Why $\begin{vmatrix} 10 & 13 & 16 \\ 11 & 14 & 17 \\ 12 & 15 & 18 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -3 & 16 \\ -3 & -3 & 17 \\ -3 & -3 & 18 \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 - c_2; c'_2 = c_2 - c_3] = 0$

[যেহেতু নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি কলামের উপাদান একই।]

02. $\begin{vmatrix} 13 & 16 & 19 \\ 14 & 17 & 20 \\ 15 & 18 & 21 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান- [JnU. 09-10]

A. 1 B. 10 C. 20 D. 0

S@Why $\begin{vmatrix} 13 & 16 & 19 \\ 14 & 17 & 20 \\ 15 & 18 & 21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -3 & 19 \\ -3 & -3 & 20 \\ -3 & -3 & 21 \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 - c_2; c'_2 = c_2 - c_3] = 0$

[যেহেতু নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি কলামের উপাদান একই।]

03. $\begin{vmatrix} 50 & 60 & 70 \\ 10 & 20 & 30 \\ 30 & 60 & 90 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান- [JnU. 08-09]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

S@Why $\begin{vmatrix} 50 & 60 & 70 \\ 10 & 20 & 30 \\ 30 & 60 & 90 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & -10 & 70 \\ -10 & -10 & 30 \\ -30 & -30 & 90 \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 - c_2; c'_2 = c_2 - c_3] = 0$

[যেহেতু নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি কলামের উপাদান একই।]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\begin{vmatrix} 3 & x \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান (-1) হলে x এর মান কত? [KU. 16-17]

A. -2 B. 0 C. 2 D. 4

S@Why $\begin{vmatrix} 3 & x \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$ Or, $3 - 2x = -1$ Or, $2x = 4$ Or, $x = 2$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $\begin{vmatrix} 2x-y & 5 \\ 3 & y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ হয় তবে x = ? [CoU-A. 18-19]

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

S@Why $\begin{vmatrix} 2x-y & 5 \\ 3 & y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow 2x - y = 6$ এবং $y = 2$
 $\Rightarrow 2x - 2 = 6 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$

02. নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান কর: $5x + 2y - 11 = 0$ এবং $3x + 4y - 1 = 0$? [CoU. 15-16]

A. (x, y) = (3, -2) B. (x, y) = (-2, 3)
 C. (x, y) = (5, 4) D. (x, y) = (5, -1)

S@Why $10x + 4y - 22 = 0$
 $(-) 3x + 4y - 1 = 0$
 $7x - 21 = 0 \therefore x = 3$
 $\therefore 15 + 2y - 11 = 0 \Rightarrow 2y = -4 \Rightarrow y = -2 \Rightarrow (x, y) = (3, -2)$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x + 2y - z = 9$; $2x - y + 3z = -2$; $3x + 2y + 3z = 9$ সমীকরণগুচ্ছ সমাধান করলে y এর মান কত হবে? [IU. 17-18]

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

S@Why $x + 2y - z = 9$ (i)
 $2x - y + 3z = -2$ (ii)
 $3x + 2y + 3z = 9$ (iii)
 (iii) - (ii) $\Rightarrow x + 3y = 11$ (iv)
 (i) $\times 3 +$ (ii) $\Rightarrow 5x + 5y = 25 \Rightarrow x + y = 5$ (v)
 (iv) - (v) $\Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow y = 3$

02. x-এর কোন মানের জন্য $\begin{vmatrix} x^2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0$ হবে? [IU. 17-18]

A. 0, -3 B. 0, 3 C. 2, 0 D. 0, -2

S@Why $x^2(-5-0) - x(-15-0) + 2(0-0) = 0$
 বা, $-5x^2 + 15x + 0 = 0$ বা, $x^2 - 3x = 0$ বা, $x(x-3) = 0$ বা, $x = 0, 3$

03. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 8 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের 7-এর cofactor-এর মান- [IU-F. 12-13]

A. 14 B. -14 C. 23 D. -23

S@Why $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} \therefore 7$ এর Co-factor $= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = -14$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. ক্রেমারের প্রক্রিয়ায় নিচের সমীকরণজোটের সমাধান করলে Δx কত হবে?
সমীকরণজোট : $2x + 3y = 5, 5x - 2y = 3$ [BRUR-E. 16-17; JKKNIU. 19-20]
A. -19 B. 19 C. 15 D. -15

SOWHY $\Delta x = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -10 - 9 = -19$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ জোটের সমাধানের জন্য ব্যবহৃত নির্ণায়ক প্রক্রিয়াকে কী বলে? [JKKNIU-B. 16-17]
A. মাত্রিক প্রক্রিয়া B. নিউটন প্রক্রিয়া C. ক্রেমারের প্রক্রিয়া D. থমসন প্রক্রিয়া
SOWHY তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ জোটের সমাধানের জন্য ব্যবহৃত নির্ণায়ক প্রক্রিয়াকে ক্রেমার প্রক্রিয়া বলে।

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. এককের একটি জটিল ঘনমূল ω হলে, $\begin{vmatrix} \omega & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ \omega^3 & 1 & \omega \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান কত? [SUST. 08-09]
A. 1 B. ω C. ω^2 D. 0

SOWHY $\begin{vmatrix} \omega & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ \omega^3 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \omega \begin{vmatrix} \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \omega \begin{vmatrix} 1+\omega+\omega^2 & \omega & \omega^2 \\ 1+\omega+\omega^2 & \omega^2 & 1 \\ 1+\omega+\omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$
 $[c'_1 = c_1 + c_2 + c_3]$

$= \omega(1+\omega+\omega^2) \begin{vmatrix} 0 & \omega & \omega^2 \\ 0 & \omega^2 & 1 \\ 0 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \omega(1+\omega+\omega^2) \times 0 = 0$

02. যদি $\Delta = \begin{vmatrix} a & a & x \\ m & m & n \\ b & x & b \end{vmatrix}$ হয়, তবে $\Delta = 0$ সমীকরণের মূল হচ্ছে- [SUST. 05-06]
A. $x = a, x = m$ B. $x = b, x = m$ C. $x = a, x = b$ D. কোনটিই নয়

SOWHY $\Delta = \begin{vmatrix} a & a & x \\ m & m & n \\ b & x & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a & x \\ 0 & m & n \\ b-x & x & b \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 - c_2]$

$= (b-x) \begin{vmatrix} a & x \\ m & n \end{vmatrix} = (b-x)(an - mx)$

$\therefore \Delta = 0 \Rightarrow (b-x)(an - mx) = 0 \therefore x = \frac{an}{m}$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স এ 2 এর সহগুণক কত? [JUST. 13-14]
A. -1 B. -2 C. -3
D. -4 E. -5

SOWHY 2 এর সহগুণক $= (-1)^{1+2} |3| = -3$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে X এর (3, 2) তম সহগুণক কত? [MBSTU-A. 16-17]
A. 0 B. -2 C. 2 D. -3

SOWHY (3, 2) তম উপাদানটি 2 এর সহগুণক

$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -(0 - 2) = 2$

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & x \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির (1, 2) তম অনুরাশি -6 হলে, x এর মান কত? [PUST-B. 17-18]
A. -2 B. -3 C. 3 D. 6
SOWHY নির্ণায়কের (1, 2) তম অনুরাশি $= (0 - 2x) = -2x$
প্রশ্নমতে, $-2x = -6 \Rightarrow x = 3$

STEP 04 PRIME TEST

Time: 15

01. $(7A)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, A নির্ণয় কর।
A. $-\frac{1}{21} \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$ B. $\frac{1}{21} \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$
C. $\frac{1}{21} \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}$ D. $-\frac{1}{21} \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$
02. x এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} 2-x & 13 \\ 5 & 10-x \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স একটি ব্যতিক্রমী (Singular) ম্যাট্রিক্স হবে?
A. -15 ও -3 B. -15 ও 3 C. 15 ও -3 D. 13 ও 5
03. k এর কোন মানের জন্য $A = \begin{bmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{bmatrix}$ ইনভার্টিবল হবে না?
A. 3 B. 2 C. $\frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$ D. $\frac{5}{2}$
04. তিনটি ম্যাট্রিক্স $\begin{bmatrix} x & y \\ a & h \\ h & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ এর গুণফলের মান হবে-
A. $[x^2a + xyh \quad xyh + y^2b]$ B. $[x^2a + 2xyh + y^2b]$
C. $\begin{bmatrix} x^2a + xyh \\ xyh + y^2b \end{bmatrix}$ D. $[2x^2a + xyh + 2y^2b]$
05. 3×3 আকারের একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স D এর জন্য $|D| = 20$ হলে $(2D)^{-1}$ এর মান কত?
A. $\frac{1}{160}$ B. $\frac{1}{40}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $-\frac{1}{160}$
06. X ম্যাট্রিক্সটি বের কর যখন $2X + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$
A. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$
07. যদি $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ ও $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ হয়, তবে $(BA)^{-1}$ এর মান কত?
A. $\begin{pmatrix} 44 & -1 \\ -31 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\frac{1}{13} \begin{pmatrix} 44 & -1 \\ -31 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\frac{1}{13} \begin{pmatrix} 44 & 1 \\ 31 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -31 & 1 \\ 44 & -1 \end{pmatrix}$
08. নিচের নির্ণায়কের $(-2a)$ এর সহগুণক কত?
 $\begin{vmatrix} 1+a^2-b^2 & 2ab & -2b \\ 2ab & 1-a^2+b^2 & 2a \\ 2b & -2a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$
A. $(1-a^4) - b^2(4-b^2)$ B. $2a(a+a^2+b^2)$
C. $(1+a^2+b^2)^3$ D. $-2a(1+a^2+b^2)$
09. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & z \\ y & -3 \end{bmatrix}$ x, y এবং z এর মান হবে-
The values of x, y and z are-
A. 1, 2, 3 B. 3, 4, 3 C. 3, -3, 4 D. -1, 2, 3

- | প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা |
|--------|-------|---|
| 01 | B | $(7A)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \therefore 7A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{8}{3} & \frac{5}{3} \\ \frac{7}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$ $\therefore A = \frac{1}{21} \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$ |
| 02 | C | $\det \begin{bmatrix} 2-x & 13 \\ 5 & 10-x \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-x & 13 \\ 5 & 10-x \end{vmatrix} = 0$ $\Rightarrow x^2 - 12x - 45 = 0 \Rightarrow x = 15, -3$ |
| 03 | C | $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{ A }$ <p>A ইনভার্সিবল হবে না যদি $A = 0$ হয়</p> $ A = \begin{vmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{vmatrix} \Rightarrow 0 = (k-3)(k-2) - (2)(-2)$ $\Rightarrow 0 = k^2 - 3k - 2k + 6 - 4 \Rightarrow 0 = k^2 - 5k + 2$ $\Rightarrow k = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 8}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$ |
| 04 | B | $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + hy & hx + by \end{bmatrix}$ $\therefore \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + hy & hx + by \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} ax^2 + hxy + hxy + by^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^2a + 2xyh + y^2b \end{bmatrix}$ <p>Shortcut: a, b, h, x, y এর ইচ্ছেমত মান নিয়ে তা নিয়ে Calculator এ Calculate কর।</p> |
| 05 | A | <p>ধরি, 3×3 আকারের কর্ণ ম্যাট্রিক্স, $D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix}$</p> $\therefore 2D = \begin{vmatrix} 2a & 0 & 0 \\ 0 & 2b & 0 \\ 0 & 0 & 2c \end{vmatrix} \therefore D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 20$ $\therefore 2D = \begin{vmatrix} 2a & 0 & 0 \\ 0 & 2b & 0 \\ 0 & 0 & 2c \end{vmatrix} = 2^3 \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 8 \times 20 = 160$ <p>এখন, জেনে রাখো, $(2D)^{-1} = \frac{1}{ 2D } = \frac{1}{160}$</p> <p>$\therefore$ কর্ণ ম্যাট্রিক্সের গুণু মুখ্য কর্ণ বরাবর ভূমিকোণে অমূল্য আর বাকিগুলো শূন্য।</p> |
| 06 | A | $2X + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow 2X = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow 2X = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \therefore X = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ |

প্রশ্ন উত্তর	ব্যাখ্যা	প্রশ্ন উত্তর	ব্যাখ্যা
07 B	$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ $\therefore BA = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 31 & 44 \end{bmatrix}$ $\therefore (BA)^T = \begin{bmatrix} 1 & 31 \\ 1 & 44 \end{bmatrix} \therefore \text{adj}(BA) = \begin{bmatrix} 44 & -1 \\ -31 & 44 \end{bmatrix}$ $\therefore (BA)^{-1} = \frac{\text{adj}(BA)}{\det(BA)} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 44 & -1 \\ -31 & 1 \end{bmatrix}$	17 A	মাত্রিকতা অবাধিতকর্মী নয় অর্থাৎ ব্যতিক্রমী হলে $\begin{pmatrix} K-2 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} = 0$ $\therefore (K-2) \times 9 - 12 = 0$ $\Rightarrow 9K - 18 - 12 = 0 \Rightarrow 9K = 30 \Rightarrow K = \frac{10}{3}$
08 E	$(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & a^2 - b^2 & -2b \\ 2ab & 2a & \end{vmatrix}$ $= (-1)(2a - 2a^3 - 2ab^2 + 4ab^2) = -2a(1 + a^2 + b^2)$	18 B	ব্যতিক্রমী মাত্রিকের নির্ণয়কের মান শূন্য $\therefore \sqrt{k} \times (k\sqrt{k}) - 16 = 0$ $\Rightarrow k^2 - 16 = 0; k = \pm 4 \therefore k = 4$
09 B	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & z \\ y & -3 \end{bmatrix}$	19 A	$A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Adj } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}$ $\therefore (\text{Adj } A) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} = -2 + 12 = 10$
10 C	$A^T + B^T = \begin{bmatrix} x-y & ab \\ -6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -9 \\ a+b & x+y \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} x-y-3 & ab-9 \\ -6+a+b & 7+x+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\therefore a+b-6=0; ab-9=0$ $\therefore a+b=6; ab=9$ Solving we get, $a=b=3$	20 D	কি, $\begin{bmatrix} J & J \\ 2J & J \end{bmatrix} = A$ $\therefore A^{-1} = \frac{1}{J^2 - 2J^2} \begin{bmatrix} J & -J \\ -2J & J \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-J^2 + 2} \begin{bmatrix} J & -J \\ -2J & J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J & -J \\ -2J & J \end{bmatrix}$
11 B	$A^T = A$ হলে এটি একটি হারমিটিয়ান মাত্রিক এবং হারমিটিয়ান মাত্রিকের অব্যবহার্য বৃত্তি ব্যবহার সম্ভব। $\therefore$ প্রশ্ন ৬ ব্যবহার সম্ভব হবে।	21 A	4 এর অনুরাশি $= \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = (10 - 0) = 10$
12 C	যদি A ও B প্রতিসম হয় তবে $A^T = A$ এবং $B^T = B$ এখন, $(AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T$ $= B^T A^T - A^T B^T = BA - AB$ $= -(AB - BA)$ $\therefore (AB - BA)^T = -(AB - BA) \therefore$ এটি বিপ্রতিসম হবে।	22 D	$\begin{vmatrix} 6i & -3i & 1 \\ 4 & 3i & -1 \\ 20 & 3 & i \end{vmatrix} = x + iy$ $\Rightarrow -3i \begin{vmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 20 & i & i \end{vmatrix} = x + iy$ $\Rightarrow x + iy = 0 \therefore x = 0, y = 0$
13 B	$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-1 & -1-1 \\ -1-1 & -1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	23 C	$\begin{vmatrix} 5 & 6 & x \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4 \Rightarrow \begin{vmatrix} 5 & 6 & x \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4 [r'_1 = r_1 - r_2]$ $\Rightarrow \begin{vmatrix} 5+x & 6 & z \\ 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4 [c'_1 = c_1 + c_2]$ $\Rightarrow -2(10 + 2x - 24) = -4 \Rightarrow 2x - 14 = 2 \therefore x = 8$
14 A	$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3x+4y \\ 4x+6y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}$ $\therefore 3x+4y = -5$ এবং $4x+6y = -8$ সুতরাং সমীকরণ দুটির সমাধান করে $x = 1$ এবং $y = -2$	24 C	$\begin{vmatrix} 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -x & x & 1 \\ 0 & -y & 1+y \\ 0 & -y & 1+y \end{vmatrix} \begin{bmatrix} c'_1 = c_1 - c_2 \\ c'_2 = c_2 - c_3 \end{bmatrix}$ $= \begin{vmatrix} -x & x \\ 0 & -y \end{vmatrix} = xy$
15 C	$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+6 & 2-8 \\ 3-12 & 6+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}$ $\therefore A^2 + 3A - 10I = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} - 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 7+3-10 & -6+6-0 \\ -9-9-0 & 22-12-10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	25 D	$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix}$ $= \begin{vmatrix} 2(a+b+c) & a & b \\ 2(a+b+c) & b+c+2a & b \\ 2(a+b+c) & a & c+a+2b \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 + c_2 + c_3]$ $= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & b+c+2a & b \\ 1 & a & c+a+2b \end{vmatrix}$ $= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 0 & -(a+b+c) & 0 \\ 0 & a+b+c & -(a+b+c) \end{vmatrix}$ $= 2(a+b+c) \cdot 1 \cdot \{-(a+b+c) \times -(a+b+c)\} = 2(a+b+c)^3$ $[r'_1 = r_1 - r_2, r'_2 = r_2 - r_1]$
16 C	$A = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} \cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta & -2\sin 2\theta \cos 2\theta \\ 2\sin 2\theta \cos 2\theta & \cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 4\theta & -\sin 4\theta \\ \sin 4\theta & \cos 4\theta \end{bmatrix}$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} \cos 4\theta & -\sin 4\theta \\ \sin 4\theta & \cos 4\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore [A^2] = I$ $\Rightarrow \cos 4\theta = 1$ এবং $\sin 4\theta = 0$ $\Rightarrow 4\theta = 0, 2\pi \Rightarrow 4\theta = 0, \pi$ $\Rightarrow \theta = 0, \frac{\pi}{2} = 0^\circ, 90^\circ \Rightarrow \theta = 0, \frac{\pi}{4}$ বা, $0^\circ, 45^\circ$		

সরলরেখা

প্রথম অংশ: স্থানাঙ্ক [CO-ORDINATES]

TOPIC
NO.

বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে

॥

01	স্থানাদি ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত	*
02	অনুপাত সম্পর্কিত	***
03	ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্পর্কিত	***
04	তিনটি বিন্দু সমরেখ হওয়া সম্পর্কিত	***
05	অন্তঃকেন্দ্র ও পরিকেন্দ্র নির্ণয়	**

TOPIC 01 স্থানান্তর ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত


(i) $x = r \cos \theta$
(ii) $y = r \sin \theta$
(iii) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
(iv) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$

$\left. \begin{array}{l} \text{(i)} \\ \text{(ii)} \\ \text{(iii)} \end{array} \right\} \rightarrow \text{পোলার হতে কার্তেসীয়}$
 $\left. \begin{array}{l} \text{(iii)} \\ \text{(iv)} \end{array} \right\} \rightarrow \text{কার্তেসীয় হতে পোলার}$

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

ভরকেন্দ্র মধ্যমাকে 2:1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।



LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 কোন বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাংক $(-1, \sqrt{3})$ হলে বিন্দুটির পোলার স্থানাংক হবে- [JU. 17-18; RU. 15-16, 18-19; CU. 13-14, 05-06; JU. 12-13, 11-12, 07-08; KU. 03-04; IU. 07-08; সকল বোর্ড: ২০১৮; ঢা.বো. ২০১৭]

Solve: $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ এবং $\theta = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = 120^\circ$

∴ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক $(2, 120^\circ)$

TOPIC 02 অনুপাত সম্পর্কিত


(ii) $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে,

$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}$ এবং $A(x_1, y_1)$  $B(x_2, y_2)$

$$y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$


(ii) $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত করলে,

$$x = \frac{m_1 x_2 - m_2 x_1}{m_1 - m_2} \text{ এবং } y = \frac{m_1 y_2 - m_2 y_1}{m_1 - m_2}$$




(iii) $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার মধ্যবিন্দু :

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



(iv) $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের
সংযোজক রেখাকে x অক্ষ বা y অক্ষকে $k : 1$ অনুপাতে বিভক্ত করে।




Technique: (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে

* x অক্ষ: $-\frac{y_1}{y_2}$ অনুপাতে এবং * y অক্ষ: $-\frac{x_1}{x_2}$ অনুপাতে বিভক্ত করে।

Note: ক্যালকুলেশন করার পর চিহ্ন যদি (+) আসে তাহলে অন্তর্বিভক্ত এবং চিহ্ন (-) আসলে বহির্বিভক্ত।

(v) $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে বিভক্ত করলে,

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x_1 - x}{x - x_2} = \frac{y_1 - y}{y - y_2};$$



Note: অনুপাত ধনাত্মক হলে অন্তর্বিভক্ত ও ঋণাত্মক হলে বহির্বিভক্ত

(vi) (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশকে $ax + by + c = 0$

রেখাটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে বিভক্ত করলে, $\frac{m_1}{m_2} = \frac{ax_1 + by_1 + c}{ax_2 + by_2 + c}$

Note: $m_1 : m_2$ ঋণাত্মক হলে অন্তর্বিভক্ত এবং ধনাত্মক হলে বহির্বিভক্ত হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 যে বিন্দু (1, 4) এবং (9, -12) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখাংশকে
অন্তঃস্থভাবে 3:5 অনুপাতে বিভক্ত করে তার স্থানাঙ্ক- [DU. 10-11; JU. 15-
16, . 18-19, 07-08, 06-07; DU. 06-07; JU. 08-09; JnU. 06-07]

Solve নির্ণেয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক:

$$\left(\frac{3 \cdot 9 + 5 \cdot 1}{3 + 5}, \frac{3 \cdot (-12) + 5 \cdot 4}{3 + 5} \right) = \left(\frac{32}{8}, \frac{-16}{8} \right) = (4, -2)$$


ME02 (2, -4) ও (-3, 6) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে x অক্ষ রেখা কী
অনুপাতে বিভক্ত করে? [RU, 09-10, 07-08]

Solve অনুপাত $= -\frac{y_1}{y_2} = -\frac{-4}{6} = 2:3$

TOPIC 03 ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্পর্কিত


Technique:

- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল: ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ দেওয়া থাকলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$


$$= \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)| \text{ বর্গ একক}$$

- চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল: একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ হলে চতুর্ভুজটির-

$$\Delta ABCD = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix}$$


$$= \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_4y_3 + x_1y_4)|$$

বর্গ একক।

Note : i) ক্ষেত্রফল সর্বদা ধনাত্মক হবে। ii) উপরোক্ত সূত্র ব্যবহার করে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য শীর্ষবিন্দু গুলোর ক্রম বিবেচনা করতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

ME1 01 $P(6, 8)$, $Q(4, 0)$ এবং $R(0, 0)$ শীর্ষবিন্দুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-

[DU. 14-15; JU. 18-19; CU. 15-16]

Solve নির্ণয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \{6(0-0) + 4(0-8) + 0(8-0)\}$
 $= \frac{1}{2} \{0 - 32 + 0\} = \frac{1}{2} \{-32\} = 16 \text{ sq. units.}$

TOPIC 04 তিনটি বিন্দু সমরেখ হওয়া সম্পর্কিত

Technique:

- (i) $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ এবং $C(x_3, y_3)$ বিন্দুদ্বয় সমরেখ বা একই সরলরেখার উপর অবস্থিত হলে এদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য।

$$\text{অর্থাৎ } \frac{1}{2} \{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\} = 0$$

Note: তিনটি বিন্দুর সমরেখ হলে তাদের যে কোন দুই জোড়া বিন্দুর ঢাল সমান হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

ME1 01 $(a, 0)$, $(0, b)$, $(1, 1)$ বিন্দুদ্বয় সমরেখ হবে কোন শর্তে?

[JU. 17-18, 14-15; RU. 15-16]

Solve বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে তাদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে।

$$\therefore \frac{1}{2} \{a(b-1) + 0(1-0) + 1(0-b)\} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} (ab - a + 0 - b) = 0 \text{ বা, } ab - a - b = 0 \text{ বা, } a + b = a$$

TOPIC 05 অন্তঃকেন্দ্র ও পরিকেন্দ্র নির্ণয়

- অন্তঃকেন্দ্র নির্ণয়: ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ দেওয়া থাকলে, প্রথমে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে। এরপর সূত্র বসিয়ে অন্তঃকেন্দ্র বের করতে হবে। ত্রিভুজের অন্তঃকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $D(x, y)$ হলে,

$$x = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c} \quad y = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c}$$

- পরিকেন্দ্র নির্ণয়: তিন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ ব্যবহার করে পরিকেন্দ্র নির্ণয় করতে হয়

যখন কোন (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2)$$

$$= k \{(y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y + x_1y_2 - x_2y_1\}$$

কে তৃতীয় বিন্দু (x_3, y_3) দিয়ে নিয়ে k এর মান বের করে বৃত্তের সমীকরণ পাওয়া যায়।

STEP 03 বিভাগ সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামোলাল ভ্যামসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $A(-1, 3)$ এবং $B(-2, 1)$ বিন্দুগামী সরলরেখার উপরিস্থিত $P(a, a)$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [GST-A. 2022-2023]

A. (5, 5) B. (-5, -5) C. (4, 4) D. (-4, -4)

Soln একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে যে কোন দুটি বিন্দু নিয়ে গঠিত ঢাল সমান।

$$\therefore \frac{a-1}{a+2} = \frac{1-3}{-2+1} \Rightarrow \frac{a-1}{a+2} = \frac{-2}{-1} \Rightarrow a-1 = 2a+4$$

$$\frac{a-1}{a+2} = -2 \Rightarrow a-1 = -2a-4$$

$$4 \therefore a = -5 \therefore \text{বিন্দুটি } (-5, -5)$$

02. $r(1 + \cos \theta) = 2$ এর কার্ভেসীয় সমীকরণ-

[GST-A. 21-22]

A. $x^2 + y^2 + x - 2 = 0$

B. $y^2 - 4x = 4$

C. $x^2 + 4x = 2$

D. $y^2 + 4x = 4$

Soln $r(1 + \cos \theta) = 2 \Rightarrow r + r \cos \theta = 2$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + x = 2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 2 - x$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = (2 - x)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 - 4x + x^2 \therefore y^2 + 4x = 4$$

03. একটি চলমান বিন্দুর ভূজ ও কোটি সমান হলে বিন্দুটির সম্ভাব্য পথের সমীকরণ- [GST-A. 21-22]

A. $x + y = 0$

B. $x - y = 0$

C. $x - y = 1$

D. $x + y = 1$

Soln ধরি, $p(x, y)$ চলমান বিন্দুটি $x = y \Rightarrow x - y = 0$

04. $(0, -1)$ বিন্দু এবং $y = 1$ সরলরেখা থেকে সমান দূরত্বের বিন্দুর সম্ভাব্য পথ কোনটি? [GST-A. 20-21]

A. $y^2 + 4x = 0$

B. $y^2 - 4x = 0$

C. $x^2 + 4y = 0$

D. $x^2 - 4y = 0$

Soln ধরি চলমান বিন্দুটি (x, y)

$$\therefore (x, y) \text{ বিন্দু হতে } y = 1 \text{ সরলরেখার দূরত্ব} = \frac{y-1}{\sqrt{1}} = y-1$$

$$\text{শর্তমতে, } (x-0)^2 + (y+1)^2 = (y-1)^2$$

$$\Rightarrow x^2 = (y-1)^2 - (y+1)^2 = -4y \therefore x^2 + 4y = 0$$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(1, 5)$ এবং $(3, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে x অক্ষের সাথে কোন অনুপাতে বিভক্ত করে? [JU. 17-18]

A. 5:2 অনুপাতে বহির্বিভক্ত

B. 5:2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত

C. 2:5 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত

D. 2:5 অনুপাতে বহির্বিভক্ত

Soln $m = -\frac{y_1}{y_2} = -\frac{5}{2} \therefore 5:2$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে।

02. (3, 4) এবং (5, 9) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে $(-1, -6)$ বিন্দুটি কোন অনুপাতে বিভক্ত করে? [JnU. 17-18]

A. 2:3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত B. 3:2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত
C. 3:2 অনুপাতে বহির্বিভক্ত D. 2:3 অনুপাতে বহির্বিভক্ত

[S@Why] $m = \frac{x_1 - x_2}{x - x_2} = \frac{3 - (-1)}{-1 - 5} = \frac{4}{-6} = -\frac{2}{3}$

∴ 2:3 অনুপাতে বহির্বিভক্ত

03. $x^2 + y^2 - by = 0$ বৃত্ত এর সমীকরণ পোলার স্থানাঙ্ক এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে সমীকরণটি হবে- [JnU. 15-16; DU7-Clg. 19-20]

A. $x = y \sin \theta$ B. $r = b \cos \theta$ C. $r = b \sin \theta$ D. $r = b$

[S@Why] $x^2 + y^2 = by \Rightarrow (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = br \sin \theta$
 $\Rightarrow r^2 = br \sin \theta \Rightarrow r = b \sin \theta$

04. A(1, 1) এবং B(4, 5) বিন্দু দুইটির দূরত্ব- [JnU. 10-11; JU. 15-16]

A. 4 units B. 6 units C. 5 units D. 8 units

[S@Why] A(1, 1) এবং B(4, 5) বিন্দু দুইটির দূরত্ব:

$= \sqrt{(1-4)^2 + (1-5)^2} = 5 \text{ units}$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(2, 270^\circ)$ বিন্দুটির কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত?

[KU. 16-17; RU. 12-13, 09-10; CU. 08-09; JU. 06-07]

A. $(-2, 0)$ B. $(0, -2)$ C. $(2, -2)$ D. $(0, 0)$

[S@Why] $x = r \cos \theta = 2 \cos(270^\circ)$

$= 2 \cos(90^\circ \times 3 + 0) = 2 \sin 0^\circ = 0$

$y = r \sin \theta = 2 \sin(270^\circ) = 2 \sin(90^\circ \times 3 + 0) = -2 \cos 0^\circ = -2$

∴ কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক $(0, -2)$

02. ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের সমদ্বিখন্ডকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে কি বলা হয়? [KU. 16-17]

A. অন্তঃকেন্দ্র B. পরিকেন্দ্র C. ভরকেন্দ্র D. লম্বকেন্দ্র

[S@Why] ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের সমদ্বিখন্ডকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে পরিকেন্দ্র বলে।

03. একটি ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষবিন্দু $(2, 7)$ ও $(6, 1)$ এবং ভরকেন্দ্র $(6, 4)$ হলে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত? [KU. 15-16; BSFMSTU. 19-20]

A. $(6, 4)$ B. $(10, 4)$ C. $(12, 8)$ D. $(5, 2)$

[S@Why] $6 = \frac{2+6+x}{3} \Rightarrow x = 3$ এবং $4 = \frac{7+1+y}{3} \Rightarrow y = 4$

04. ΔABC এর ভরকেন্দ্র মূলবিন্দুতে এবং A ও B এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(4, -7)$ ও $(-2, 5)$ হলে C এর স্থানাঙ্ক বের কর। [KU. 12-13]

A. $(-1, 1)$ B. $(-2, 2)$ C. $(3, 4)$ D. $(1, 3)$

[S@Why] $A = (4, -7) = (x_1, y_1)$, $B = (-2, 5) = (x_2, y_2)$

$C = (x_3, y_3) = ?$

ভরকেন্দ্র $G(x, y) = (0, 0)$; ∴ $0 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$ বা, $x_3 = -(4-2) = -2$

এবং $y_3 = -(y_1 + y_2) = -(-7+5) = 2$ ∴ $C = (-2, 2)$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(\sqrt{3}, 1)$ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক কত? [CoU. 19-20; JnU. 12-13; IU. 14-15]

A. $(2, \frac{5\pi}{3})$ B. $(2, \frac{\pi}{6})$ C. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{3})$ D. $(2, -\frac{\pi}{3})$

[S@Why] $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$

$\theta = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$; $(\sqrt{3}, 1)$ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক $(2, \frac{\pi}{6})$

02. ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলি A(1, 2), B(-5, 1) এবং C(2, -3) হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [CoU. 19-20]

A. 31 B. 32 C. 33 D. 34 **[Ans x]**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(-2, 3)$ ও $(-7, 5)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ সরল রেখাংশকে যে বিন্দুটি 2:3 অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে তার স্থানাঙ্ক- [IU-D. 19-20; IU-A. 19-20]

A. $(4, 13)$ B. $(8, -1)$ C. $(2, 4)$ D. $(4, 2)$

[S@Why] $x = \frac{2(-7) - 3(-2)}{2-3} = \frac{-8}{-1} = 8$; $y = \frac{2(5) - 3 \times 3}{2-3} = -1$

∴ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক, $(8, -1)$

02. A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(1, 2)$, $(-5, 1)$, (x, y) এবং ΔABC এর ক্ষেত্রফল 18 বর্গ একক হলে নিচের কোনটি সঠিক? [IU. 17-18]

A. $x = 6y + 25$ B. $x + 5 = 6y$ C. $x - 20 = 6y$ D. $x = 6y + 20$

[S@Why] ΔABC এর ক্ষেত্রফল

$= \frac{1}{2} \{1(1-y) - 2(-5-x) + 1(-5y-x)\} = \frac{1}{2} (x - 6y + 11)$

∴ $\frac{1}{2} (x - 6y + 11) = 18 \Rightarrow x = 6y + 25$

03. P বিন্দুর ভূজ 2। x অক্ষ হতে P বিন্দুর দূরত্ব y অক্ষ হতে এর দূরত্বের দ্বিগুণ হলে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক- [IU. 17-18]

A. $(2, 4)$ অথবা $(2, -4)$ B. $(4, -8)$ অথবা $(4, 8)$

C. $(4, 1)$ অথবা $(4, 0)$ D. $(4, 1)$ অথবা $(4, -1)$

[S@Why] দেওয়া আছে, P বিন্দুর ভূজ 2. চারটি অপশন এর মধ্যে ভূজ 2 একমাত্র Option (A) তেই আছে।

04. $(-6, 8)$ বিন্দু সাপেক্ষে $(4, -1)$ বিন্দুর প্রতিবিম্ব কত? [IU. 17-18]

A. $(-16, 17)$ B. $(-8, 9)$ C. $(9, -8)$ D. $(17, -16)$

[S@Why] ধরি, $(-6, 8)$ বিন্দুর সাপেক্ষে $(4, -1)$ বিন্দুর প্রতিবিম্ব (x, y) সাপেক্ষ বিন্দু $(-6, 8)$ যা $(4, -1)$ এবং (x, y) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দু

$-6 = \frac{4+x}{2}$ এবং $8 = \frac{-1+y}{2}$

$\Rightarrow x = -16$ $\Rightarrow y = 17$

∴ প্রতিবিম্ব বিন্দু $(-16, 17)$

05. স্থানাঙ্ক যার উপর নির্ভরশীল হয়- [IU. 12-13]

A. বিন্দুর B. বিন্দুর অবস্থানের

C. বিন্দুর অবস্থানের ও দৈর্ঘ্যের এককে D. কোনটিই না

[S@Why] বিন্দুর অবস্থানের উপর স্থানাঙ্ক নির্ভরশীল।

06. t এর সকল বাস্তব মানের জন্য একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(at^2, 2at)$ হলে বিন্দুটির সম্ভারপথের সমীকরণ হবে- [IU. 15-16; RU. 08-09]

A. $x^2 + y^2 = a^2$ B. $y^2 = 4ax$ C. $x^2 = 4ay$ D. $x^2 - y^2 = a^2$

[S@Why] ধরি, সম্ভারপথের উপর একটি বিন্দু $P(x, y)$;

প্রশ্নমতে, $x = at^2$ and $y = 2at \Rightarrow y^2 = 4a^2 t^2$

এখন, t অপসারণ করে পাই, $x = a \frac{y^2}{4a^2} \Rightarrow y^2 = 4ax$

07. মূল বিন্দু থেকে যে সকল বিন্দুর দূরত্ব একটি ধ্রুবক "a" এর সমান সেই সম্ভারপথের সমীকরণ- [IU. 12-13]

A. $x^2 - y^2 = a^2$ B. $x^2 + y^2 = a^2$ C. $x^2 - y^2 = a^2$ D. $y + x = a$

[S@Why] ধরি, সেটের বিন্দু $P(x, y)$

শর্তমতে, $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = a \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2$

08. $(1, -1)$, $(-1, 1)$, $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ বিন্দুদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক- [IU. 11-12]

A. $(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$ B. $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ C. $(-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$ D. $(1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3})$

[S@Why] $x = \frac{1-1+\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $y = \frac{-1+1+\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোন বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক $(2, \frac{3\pi}{2})$ হলে বিন্দুটির কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত? [BRUR-D. 19-20]

A. $(-2, 1)$ B. $(0, -2)$ C. $(2, 0)$ D. $(0, 2)$

[S@Why] $x = 2 \cos \frac{3\pi}{2} = 0$; $y = 2 \sin \frac{3\pi}{2} = -2$

02. যদি $(n, 21)$, $(2, 9)$ এবং $(-1, 0)$ বিন্দু তিনটি একই সরলরেখার মধ্যে অবস্থান করে, তবে n এর মান- [BRUR-E. 19-20]
- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

[S@Why] $\frac{n-2}{2+1} = \frac{21-9}{9-0} \Rightarrow \frac{n-2}{3} = \frac{12}{9} \Rightarrow 3n-6=12$
 $\Rightarrow 3n=18 \Rightarrow n=6$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনো বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক $(2, \frac{\pi}{3})$ হলে, ঐ বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত? [JKKNU. 19-20; RU. 16-17]
- A. $(1, 1)$ B. $(1, \sqrt{3})$ C. $(2, \sqrt{3})$ D. $(1, 2\sqrt{3})$

[S@Why] $x = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{1}{2} = 1$

$y = 2 \sin \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \therefore$ কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক $(1, \sqrt{3})$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. দুটি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক $(2\sqrt{3}, 90^\circ)$ এবং $(2\sqrt{5}, 180^\circ)$ হলে, বিন্দু দুটির দূরত্ব কত? [SUST-B. 19-20]
- A. $2\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{5}$
 D. $4\sqrt{2}$ E. 0

[S@Why] $(r_1, \theta_1) = (2\sqrt{3}, 90^\circ)$ $(r_2, \theta_2) = (2\sqrt{5}, 180^\circ)$

$\therefore$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}$

$= \sqrt{12 + 20 - 8\sqrt{15} \cos(180 - 90)}$

$= \sqrt{32 - 8\sqrt{15} \cos(90)} = \sqrt{32 - 0} = 4\sqrt{2}$

02. কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য 3, 5 ও 6 একক হলে, এর অন্তঃস্থ কোণের পরিধি কত? [SUST-A. 19-20]

A. $\frac{\pi + \sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

B. $\frac{\pi 2\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

C. $\frac{\pi 6\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

D. $\frac{\pi 4\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

E. $\frac{\pi 10\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

[S@Why] $S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+5+6}{2} = 7$

$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{7 \times 4 \times 2 \times 1} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$

$\therefore$ অন্তঃস্থ কোণের পরিধি $= 2\pi = 2\pi \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{4\pi\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

03. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের সাথে যে কোন দুটি কৌণিক বিন্দু সংযুক্ত করে নতুন ত্রিভুজ তৈরি করা হল। নতুন ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের কত অংশ হবে? [SUST. 16-17]

A. $2/3$

B. $1/2$


C. $1/6$

D. $1/3$

E. $1/4$

[S@Why] ভরকেন্দ্র G এর সাথে যেকোন দুটি কৌণিক বিন্দু সংযুক্ত করে নতুন ত্রিভুজ আঁকলে তা

সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফলের $\frac{1}{3}$ অংশ হবে।



04. পোলার স্থানাঙ্কে একটি বক্ররেখার সমীকরণ $r^2 \sin 2\theta = 36$ । বক্ররেখাটি কার্ভেসীয় স্থানাঙ্কে নিচের কোন বিন্দু দিয়ে যায়? [SUST. 12-13]

A. $(4, 5)$

B. $(4, 9)$

C. $(18, 2)$

D. $(3, 6)$

E. $(2, 18)$

[S@Why] $r^2 \sin 2\theta = 36$

$\Rightarrow r^2 \cdot 2 \sin \theta \cdot \cos \theta = 36 \Rightarrow r \sin \theta \cdot r \cos \theta = 18 \Rightarrow xy = 18$

$\therefore$ Option D এর জন্য ভূজ ও কোটির গুণফল 18 হবে।

05. একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো হলো $P(1, 2)$, $Q(-3, 0)$ এবং $R(3, -2)$; ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কত? [SUST. 11-12]

A. $(1/3, 0)$

B. $(0.4/3)$

C. $(0, 0)$

D. $(1/3, 4/3)$

[S@Why] $x = \frac{1-3+3}{3} = \frac{1}{3}$ এবং $y = \frac{2+0-2}{3} = 0$

06. $y = 6$ রেখাটি $x = 5$ রেখাকে এবং $y^2 = a(x-7)$ পরাবৃত্তকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। AB এর দৈর্ঘ্য 7 একক। a ঋণাত্মক হলে উহার মান কত? [SUST. 08-09]
- A. -4 B. -5 C. -6 D. -7

[S@Why] যেহেতু $y = 6$ রেখাটি $x = 5$ রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করে সেহেতু A বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv (5, 6)$ আবার যেহেতু $y = 6$ রেখাটি $y^2 = a(x-7)$ পরাবৃত্তকে B বিন্দুতে ছেদ করে সেহেতু B বিন্দুর কোটি = 6

$\therefore 6^2 = a(x-7) \Rightarrow x = \frac{36}{a} + 7 \therefore$ B বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv \left(\frac{36}{a} + 7, 6\right)$

$AB = 7 \Rightarrow \sqrt{\left(5 - \frac{36}{a} - 7\right)^2 + (6-6)^2} = 7$

$\Rightarrow \pm \left(\frac{36}{a} + 2\right) = 7 \therefore a = -\frac{36}{9} = -4$

07. $A(-3, -5)$ এবং $C(3, 5)$ ABCD রম্বসের দুইটি শীর্ষ বিন্দু। B বিন্দুটি $y = 6$ রেখার উপর অবস্থিত হলে D বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি? [SUST. 08-09]
- A. $(3, 6)$ B. $(10, -6)$ C. $(-10, 6)$ D. $(3, -6)$

[S@Why] যেহেতু B বিন্দুটি $y = 6$ রেখার উপর অবস্থিত সেহেতু B বিন্দুর কোটি = 6 ধরি, B বিন্দুর ভূজ = x_1 $\therefore$ B বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= (x_1, 6)$;

আবার যেহেতু ABCD রম্বস সেহেতু $AB = BC$

$\therefore \sqrt{(x_1+3)^2 + (6+5)^2} = \sqrt{(x_1-3)^2 + (6-5)^2}$

$\Rightarrow (x_1+3)^2 + 121 = (x_1-3)^2 + 1$

$\Rightarrow (x_1+3)^2 - (x_1-3)^2 = 1 - 121 \Rightarrow 12x_1 = -120$

$\therefore x_1 = -10 \therefore$ B বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= (-10, 6)$

$\therefore$ D বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= \{(-3+3+(-10), -5+5-5)\} = (10, -6)$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক কত? [JUST-C. 19-20; ক্র.সে. ২০১৭; IU: 16-17; JU: 14-15]

A. $\left(\sqrt{6}, \frac{3\pi}{4}\right)$

B. $\left(\sqrt{6}, \frac{\pi}{4}\right)$

C. $\left(\sqrt{6}, \frac{5\pi}{4}\right)$

D. $\left(\sqrt{6}, -\frac{\pi}{4}\right)$

[S@Why] $r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$

$0 = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} \right| = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \therefore$ পোলার স্থানাঙ্ক $\left(\sqrt{6}, \frac{5\pi}{4}\right)$

02. $(7, 7)$ এবং $(-5, -10)$ বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাংশ y -অক্ষকে কোন অনুপাতে ছেদ করে? [JUST-C. 19-20]

A. 7:10

B. 10:7

C. 7:5

D. 5:7

[S@Why] y অক্ষ দ্বারা বিভক্তকারী অনুপাত $\frac{m_1}{m_2} = -\frac{x_1}{x_2} = -\frac{7}{-5} = \frac{7}{5}$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(1, -\sqrt{3})$ এর পোলার স্থানাঙ্ক কত? [MBSTU-A. 19-20]

A. $\left(5, -\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left(-2, \frac{\pi}{4}\right)$

C. $\left(2, \frac{5\pi}{3}\right)$

D. $\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$

[S@Why] $r = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$

$Q = 2\pi - \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{1} \right| = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \therefore$ পোলার স্থানাঙ্ক $\left(2, \frac{5\pi}{3}\right)$

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

$$\Rightarrow \frac{5-x}{x+1} = \frac{-3}{-3} \Rightarrow 5-x = x+1 \Rightarrow 2x=4 \therefore x=2$$

- (14, 4) বিন্দুটি দ্বারা $x - 3y = 2$ রেখাটি সিদ্ধ হয় $\therefore P$ এর স্থানাংক (14, 4)

- A. 1 B. 4 C. 7 D. 11

[SⓑWhy] y অক্ষ থেকে (k, l) বিন্দুর দূরত্ব $= |k|$

$$\text{শর্তমতে, } \sqrt{(k-4)^2 + (1-5)^2} = |k|$$

$$\Rightarrow k^2 - 8k + 16 + 16 = k^2 \Rightarrow 8k = 32 \therefore k = 4$$

- A. সমদ্বিবাহু B. সমবাহু C. সমকোণী D. বিষমবাহু

So why $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y = 1$ রেখার ঢাল $= \frac{4}{3}$

$$y + 3x - 2 = 0 \text{ রেখার ঢাল} = -\frac{3}{1} = -3; \frac{1}{2}y = -1 \text{ রেখার ঢাল} = 0$$

∴ তিনটি রেখার ঢালই ভিন্ন সেহেতু রেখা তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি বিষমবাহু।

দ্বিতীয় অংশ: সরলরেখার সমীকরণ [STRAIGHT LINE]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

STEP 02 DISCUSSION সাক্ষাৎকারভিত্তিক তত্ত্বগতপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

- সরলরেখা: এক সেট বিন্দু একটি নির্দিষ্ট পথ পরিভ্রমণকালে যদি কখনই দিক পরিবর্তন না করে, তাহলে বিন্দু সেটটির সম্ভারপথকে সরলরেখা বলে।

□ **ভিন্ন ভিন্ন শর্তে ঢাল নির্ণয়:**

- Note:** $\tan \theta$ ঋণাত্মক হলে x -অক্ষের সাথে উৎপন্ন নির্ণেয় কোণ $= 180^\circ - |\theta|$

- (iii) $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব রেখার ঢাল = $\frac{y \text{ এর সহগ}}{x \text{ এর সহগ}}$

- (iv) দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) গামী সরলরেখার ঢাল =

$$\frac{\text{কোটিদ্বয়ের অন্তর}}{\text{ভুজদ্বয়ের অন্তর}} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

 লক্ষ্য করি ভিন্ন ভিন্ন শর্তে ঢাল নির্ণয়:

- (i) কোন সরলরেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে ঢাল, $m = \tan\theta$

Note: $\tan\theta$ ঋণাত্মক হলে x -অক্ষের সাথে উৎপন্ন নির্ণেয় কোণ $= 180^\circ - |\theta|$

- (ii) কোন সরলরেখা $ax + by + c = 0$ এর ঢাল, $m = -\frac{x\text{-এর সহগ}}{y\text{-এর সহগ}}$

- (iii) $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব রেখার ঢাল = $\frac{y \text{ এর সহগ}}{x \text{ এর সহগ}}$

- (iv) দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) গামী সরলরেখার ঢাল =

$$\frac{\text{কোটিদ্বয়ের অন্তর}}{\text{ভূজদ্বয়ের অন্তর}} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

01. $y = -5x + 9$ রেখার সাথে লম্ব রেখার নতি-

Solⁿ $y = -5x + 9$ রেখাকে $y = mx + c$ রেখার সাথে তুলনা করে
পাই, $m = -5 \therefore$ লম্ব রেখার নতি $= \frac{1}{5}$

TOPIC 02 লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: $ax + by + c = 0$ রেখার উপর লম্ব এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ: $b(x - x_1) - a(y - y_1) = 0$

□ $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ, $bx - ay + k = 0$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $3x+7y-2=0$ সরলরেখার উপর লম্ব এবং $(2, 1)$ বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ- [DU. 11-12. 07-08; JNU. 07-08; RU. 18-19; NSTU. 19-20]

Solve $3x+7y-2=0$ রেখার ঢাল $= -\frac{3}{7}$

$\therefore 3x+7y-2=0$ রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল $= \frac{7}{3}$

$\therefore$ লম্ব রেখার সমীকরণ $y - 1 = \frac{7}{3}(x - 2)$

$$\Rightarrow 3y-3=7x-14 \quad \therefore 7x-3y-11=0$$

TOPIC 03 সমান্তরাল রেখার সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ: $a(x - x_1) + b(y - y_1) = 0$

□ $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $ax + by + k = 0$

TOPIC 07 দূরত্ব সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ**Technique:**

$$(i) (x_1, y_1) \text{ বিন্দু হতে } ax + by + c = 0 \text{ রেখার লম্ব দূরত্ব} = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Note: যে কোন প্রকার দূরত্ব সবসময়ই ধনাত্মক হবে, তবে দূরত্ব দিয়ে কোন অজানা মান বের করতে বললে সেক্ষেত্রে দূরত্ব $\pm$ দুটোই হবে।

(ii) $ax + by + c_1 = 0$ এবং $ax + by + c_2 = 0$ সমান্তরাল রেখাঘরের

$$\text{মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Note: উভয় সমীকরণে x এবং y এর সহগগুলো সমান হলে দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ে উপরিউক্ত সূত্রটি ব্যবহার করা যাবে।

Technique: $ax + by + c_1 = 0$ রেখার সাথে সমান্তরাল এবং d একক দূরবর্তী রেখার সমীকরণ হবে $ax + by + c_2 = 0$

$$\text{এখানে } c_2 = c_1 \pm d \times \sqrt{a^2 + b^2}$$

(iii) দুটি সরলরেখার সহগ সমান না হলে, কিন্তু সরলরেখাঘর সমান্তরাল হলে রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়:

Step 1: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাঘর সমান্তরাল হলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব- নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূলবিন্দু হতে modulus ছাড়া রেখা দুটির দূরত্ব যথাক্রমে- $d_1 = \frac{c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$ এবং $d_2 = \frac{c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$ নির্ণয় করতে হবে।

Step 2: এরপর $|d_1 - d_2|$ বের করতে হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $4y = 3(x - 4)$ এবং $4y = 3(x - 1)$ সমান্তরাল রেখা দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে- [KU. 17-18, 08-09, 06-07; BUET. 10-11; RUET. 11-12; চ.বো. ২০১৯]


Solve $4y = 3(x - 4)$
 $\Rightarrow 3x - 4y - 12 = 0 \dots\dots\dots (i)$ এবং $4y = 3(x - 1)$
 $\Rightarrow 3x - 4y - 3 = 0 \dots\dots\dots (ii)$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং সমান্তরাল রেখাঘরের দূরত্ব} = \frac{|-12 - (-3)|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-9|}{5} = \frac{9}{5}$$

TOPIC 08 দুটি রেখার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত**Technique:**

$y = m_1x + c_1$, এবং $y = m_2x + c_2$ রেখাঘরের অন্তর্ভুক্ত কোণ θ হলে,

$$\tan \theta = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$



Note: (i) সূক্ষ্মকোণ নির্ণয় করতে বললে যোগবোধক (+) মানটি নিতে হবে।
 (ii) স্থূলকোণ নির্ণয় করতে বললে বিয়োগবোধক (-) মানটি নিতে হবে।
 (iii) দুইটি সরল রেখার মধ্যে যখন দেখবে একটি রেখার একটি চলক অনুপস্থিত তখন চিত্র দিয়ে সমাধান করাই শ্রেয়।


LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $y = b$ এবং $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাঘরের অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্মকোণের মান- [DU. 18-19; JUST. 19-20]
Solve $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল $\sqrt{3} \therefore \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$
 তাই রেখাটি x অক্ষ বা x অক্ষের সমান্তরাল রেখা $y = b$ এর সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে।

TOPIC 09 দুটি রেখার মধ্যবর্তী কোণের সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ নির্ণয়

Technique: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাঘরের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমূহের সমদ্বিখন্ডক রেখাসমূহের সমীকরণ,

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

**Note:**

- $a_1a_2 + b_1b_2 > 0$ হলে, (+) চিহ্ন নিয়ে স্থূলকোণ এবং (-) চিহ্ন নিয়ে সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ পাওয়া যাবে।
- $a_1a_2 + b_1b_2 < 0$ হলে, (+) চিহ্ন নিয়ে সূক্ষ্মকোণ এবং (-) চিহ্ন নিয়ে স্থূলকোণের সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ পাওয়া যাবে।
- যদি $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$ হয়, তবে রেখাঘর পরস্পর লম্ব।
- c_1c_2 এর চিহ্ন নিলে মূলবিন্দুদ্বারী কোণের সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ পাওয়া যাবে।
- কোণের সমদ্বিখন্ডক দুটি সবসময়ই পরস্পর লম্ব হয়।
- প্রদত্ত রেখা দুইটি সমান্তরাল হলে তাদের সমদ্বিখন্ডক হয় না।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $3x + 4y + 3 = 0$ এবং $4x + 3y + 4 = 0$ রেখাঘরের মধ্যবর্তী কোণঘরের সমদ্বিখন্ডকঘরের সমীকরণ হল-। [CU. 14-15]

Solve রেখাঘরের মধ্যবর্তী কোণঘরের সমদ্বিখন্ডক ঘরের সমীকরণ:

$$\frac{3x + 4y + 3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \pm \frac{4x + 3y + 4}{\sqrt{4^2 + 3^2}}$$

$$\Rightarrow 3x + 4y + 3 = \pm (4x + 3y + 4)$$

$$(+) \text{ নিয়ে } 3x + 4y + 3 = 4x + 3y + 4 \Rightarrow x - y + 1 = 0$$

$$(-) \text{ নিয়ে } 3x + 4y + 3 = -(4x + 3y + 4)$$

$$\Rightarrow 3x + 4y + 3 = -4x - 3y - 4 \Rightarrow 7x + 7y + 7 = 0 \Rightarrow x + y + 1 = 0$$

TOPIC 10 তিনটি রেখা দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique:01 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ও

$$a_3x + b_3y + c_3 = 0 \text{ রেখাঘর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{D^2}{2C_1C_2C_3}$$

$$\text{যেখানে, } D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ এবং } C_1, C_2, C_3 \text{ যথাক্রমে } c_1, c_2, c_3 \text{ এর}$$

$$\text{সহগুণক। } c_1 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}; c_2 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}; c_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

Technique:02 $y = m_1x + c_1 = m_2x + c_2$ ও $y = m_3x + c_3$ রেখাঘর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(c_1 - c_2)^2}{m_1 - m_2} + \frac{(c_2 - c_3)^2}{m_2 - m_3} + \frac{(c_3 - c_1)^2}{m_3 - m_1} \right\}$$

Note: কোন একটি রেখার ঢাল অসীম (∞) হলে এ সূত্রটি প্রয়োগ করা যাবে না।

Technique:03 রেখাঘরের ছেদবিন্দু বের করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করাই শ্রেয়।

- [KU. 11-12, JU. 09-10, SUST-11-12]

[**KU. 18-19**]

[KU, 16-17]

D. 1

[KU, 14-15]

D. 5/38

[KU, 14-15]

[KU. 12-13]

D. 5

[KU. 11-12, JU, 05-06]

D. $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

[CoU. 19-20]

D. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

$$\begin{aligned} \text{রেখাখয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব} &= \left| \frac{-2 - \frac{9}{2}}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} \right| = \left| \frac{-4 - 9}{2} \right| \\ &= \left| \frac{-13}{2} \right| = \left| \frac{-\sqrt{13}}{2} \right| = \frac{\sqrt{13}}{2} \end{aligned}$$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

- [IU-D. 19-20]

D. $3x - 2y - 9 = 0$

[IU-A. 19-20]

D. $y = x$

[1U. 17-18]

D. $x - y = 0$

মদুরবতা হ'বে।

D. 13

$$= \frac{|4.0 + 3.0 - c|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{c}{5}$$

$$= \left| \frac{12.0 - 5.0 - 2(c+3)}{\sqrt{12^2 + 5^2}} \right| = \frac{2(c+3)}{13} \text{ প্রশ্নমতে, } \frac{c}{5} = \frac{2(c+3)}{13} \therefore c = 10$$

মধ্যানুভী বহিত অংশের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

01. $(-2, -5)$ বিন্দুগামী কোনো সরলরেখা x ও y অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে যেন $OA + 2OB = 0$, যেখানে O মূলবিন্দু। OAB - ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [PSTU, 19-20]
- A. 16 B. 32 C. 8 D. 64

SHOW অক্ষদ্বয়কে ছেদ করে একরূপ সরলরেখা সমীকরণ: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

या $(-2, -5)$ बिन्दुगामी

$$\therefore \frac{-2}{a} + \frac{-5}{b} = 1 \Rightarrow \frac{-2b - 5a}{ab} = 1 \Rightarrow -2b - 5a = ab$$

শর্তমতে, $a + 2b = 0 \Rightarrow 2b = -a \therefore b = -\frac{a}{2}$

$$\therefore -2\left(-\frac{a}{2}\right) - 5a = a \cdot \left(-\frac{a}{2}\right) \Rightarrow -4a = -\frac{a^2}{2} \Rightarrow -8a = -a^2$$

$$\therefore a = 8 \quad \therefore b = -\frac{8}{2} = -4$$

$$\therefore \text{ত্রিভুজ OAB ক্ষেত্রফল} = \left| \frac{1}{2} ab \right| = \left| \frac{1}{2} \times 8 \times (-4) \right| = 16$$

STEP 04 PRIME TEST

Time: 15


01. $(5, 2)$ ও $(-4, 3)$ বিন্দুর সংযোগ রেখাকে y - অক্ষ কত অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে?
A. 2:3 B. 3:2 C. 5:4 D. 4:5
02. দুটি রেখা $2x + 3y = 1$ এবং $3x + 2y = 1$ এর ছেদবিন্দু ও $(1, 1)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
A. $x + y = 0$ B. $x - y = 0$ C. $x + y = 1$ D. None
03. $A(2, 1)$ ও $B(5, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে-সমকোণে সমদ্বিখলিত করে এরূপ রেখার সমীকরণ হলো-
A. $5x + 2y = 6$ B. $7x + 3y = 9$
C. $9x + 5y = 11$ D. $3x + y = 12$
04. $4x + 3y = c$ এবং $12x - 5y = 2(c + 3)$ রেখা দ্বয় মূলবিন্দু হতে সমদূরবর্তী। c এর মান হবে-
A. 14 B. 12 C. 8 D. 10
05. a এর মান কত হলে $3x + 2y - 5 = 0$, $ax + 4y - 9 = 0$ এবং $x + 2y - 7 = 0$ রেখা ত্রয় সমবিন্দু?
A. -7 B. 5 C. 3 D. 7
06. x এর কোন মানের জন্য $(1, -x)$, $(1, x)$ এবং $(x^2, -1)$ বিন্দু তিনটি একই সরল রেখায় অবস্থান করবে?
A. -1, 0, 1 B. 2, 3, 4 C. -3, 2, 3 D. -4, 3, 4
07. $x - 3y - 2 = 0$ রেখার উপর P একটি বিন্দু এবং তা $(2, 3)$ ও $(6, -5)$ বিন্দু দুটি হতে সমদূরবর্তী। P বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হল-
A. (12, 4) B. (14, 2) C. (14, 4) D. (16, 4)
08. $(1, 0)$ বিন্দু এবং $x + 1 = 0$ সরলরেখা থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুসমূহের সেট যে সম্ভারপাণ্ড গঠন করে তার সমীকরণ হবে-
A. $x^2 = 2y$ B. $y^2 = 4x$ C. $x^2 = 4y$ D. $y^2 = 2x$
09. $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ এর পোলার স্থানাঙ্ক কত?
A. $(6, \frac{\pi}{4})$ B. $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{4})$ C. $(\sqrt{6}, \frac{5}{4}\pi)$ D. $(6, -\frac{\pi}{4})$
10. $4x + 5y - 7 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব এবং $(1, 2)$ বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ হলঃ
A. $4x + 5y - 7 = 0$ B. $5x - 4y - 1 = 0$
C. $5x - 4y + 3 = 0$ D. $4x + 5y - 10 = 0$

11. ABC ত্রিভুজের BC, CA, AB বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (2,4), (5,0) এবং (4,-2)। ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নিচের কোনটি?
A. $(\frac{11}{3}, \frac{2}{3})$ B. $(\frac{22}{3}, \frac{4}{3})$ C. (11, 2) D. $(\frac{7}{3}, \frac{4}{3})$
12. যদি $3x - 4y + 7 = 0$ এবং $2x + ky + 5 = 0$ সরল রেখা দুটির পরস্পর লম্ব হয়, k এর মান কত?
A. $\frac{2}{3}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $-\frac{2}{3}$
13. A (2, 1) ও B (5, 2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজন রেখাকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে এক্ষেপ রেখার সমীকরণ হলো-
A. $5x + 2y = 0$ B. $7x + 3y = 9$
C. $9x + 5y = 11$ D. $3x + y = 12$
14. OP রেখাংশকে ঘড়ির কাঁটার দিকে $\frac{\pi}{6}$ কোণে ঘুরানোতে নতুন অবস্থান হলো OQ। P এর স্থানাঙ্ক $(-\sqrt{3}, -3)$ হলে Q এর পোলার স্থানাঙ্ক হবে-
A. $(-2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$ B. $(-2\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$ C. $(-2\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$ D. $(2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$
15. একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহের পোলার স্থানাঙ্ক যথাক্রমে পোল, $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ও $(2, \frac{\pi}{3})$ হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বর্গএককে হবে-
A. $1 + \sqrt{3}$ B. $(\frac{1 + \sqrt{3}}{2})$ C. $1 - \sqrt{3}$ D. $(\frac{\sqrt{3} - 1}{2})$
16. ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে A(0,0); B(1,5) এবং C(-2,2) হলে A বিন্দুগামী BC রেখার উপর লম্বের সমীকরণ হলো-
A. $2x + 5 = 0$ B. $2x + y = 0$ C. $3x + 7y = 0$ D. $x + y = 0$
17. একটি সরল রেখা (1, -2) বিন্দুগামী ও অক্ষদ্বয় হতে সমান অংশ ও একই চিহ্ন খণ্ডিত করলে রেখাটির ঢাল হলো-
A. 45° B. 60° C. 30° D. 135°
18. $5x + 4y - 3 = 0$ এবং $7y - 6x = 5$ রেখা দুটির ছেদবিন্দুগামী এবং $x + y - 3 = 0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি?
A. $11x + 11y - 8 = 0$ B. $30x - 28y + 15 = 0$
C. $11x - 11y + 18 = 0$ D. $59x - 59y + 42 = 0$
19. একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু গুলি A(x,y), B(1,3) ও C(3,1) হলে এবং যদি $x + y = 12$ হয়, তবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কোনটি?
A. 8 বর্গ একক B. 6 বর্গ একক C. 12 বর্গ একক D. 9 বর্গ একক
20. (3, -1) ও (4, -2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখা x অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করলে?
A. 30° B. 75° C. 105° D. 135°
21. যদি $\frac{3}{2}$ ঢাল বিশিষ্ট একটি সরলরেখা $ax + 3y - 7 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব হয়, তবে a এর মান হলো-
A. None B. 3 C. 2 D. -2
22. $y - \sqrt{3}x + 1 = 0$ এর $\sqrt{3}y - x + 3 = 0$ রেখা দুটির মধ্যবর্তী সূক্ষকোণ-
A. 45° B. 30° C. 60° D. 80°
23. x অক্ষের উপর অবস্থিত P বিন্দু হতে (0,2) এবং (6, 4) বিন্দু দুইটি সমদূরবর্তী হলে P এর স্থানাঙ্ক কত?
A. (2,0) B. (3,0) C. (5,0) D. (4,0)
24. $r = a \sin \theta$ পোলার সমীকরণের কার্ভেসীয় সমীকরণ কত?
A. $ax^2 + y^2 - y = 0$ B. $x^2 + y^2 + ay = 0$
C. $x^2 + y^2 - ay = 0$ D. $x^2 + ay^2 - y = 0$
25. যে ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুদ্বয় (3, 4) (3, -6) এবং (-1, 2) তার পরিব্যাসার্ধ কত?
A. $\sqrt{5}$ B. 5
C. $\sqrt{3}$ D. 3

OMR SHEET		17. A B C D E
01. A B C D E	09. A B C D E	18. A B C D E
02. A B C D E	10. A B C D E	19. A B C D E
03. A B C D E	11. A B C D E	20. A B C D E
04. A B C D E	12. A B C D E	21. A B C D E
05. A B C D E	13. A B C D E	22. A B C D E
06. A B C D E	14. A B C D E	23. A B C D E
07. A B C D E	15. A B C D E	24. A B C D E
08. A B C D E	16. A B C D E	25. A B C D E

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	C	ধরি, A (5,2) ও B (-4, 3) এবং y- অক্ষের উপর C (0,5), D (0,2) [y-অক্ষের উপর ইচ্ছামতো ২টি বিন্দু নিলেই হবে] $\therefore \frac{\Delta CDA}{\Delta CDB} = \frac{\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{15}{-12} = -\frac{5}{4}$ 5:4 অনুপাতে অন্তর্গর্ভভুক্ত করে। বিকল্প: ধরি, k:1 অনুপাতে অন্তর্গর্ভভুক্ত করে। $\left(\frac{-4k+5}{k+1}, \frac{3k+2}{k+1}\right)$; [y অক্ষে x = 0] $\therefore \frac{-4k+5}{k+1} = 0 \Rightarrow k = \frac{5}{4}$ $\therefore$ 5:4 অনুপাতে অন্তর্গর্ভভুক্ত করে। শর্টকাট: y অক্ষ দ্বারা বিভক্তির অনুপাত = ভূজদ্বয়ের অনুপাত = $\frac{5}{-4}$ [$\therefore$ অনুপাত 5:4 (অন্তর্গর্ভভুক্ত)]
02	B	$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$ ছেদবিন্দু $\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$ $\therefore$ নির্ণেয় রেখার সমীকরণ: $\frac{y - \frac{1}{5}}{\frac{1}{5} - 1} = \frac{x - \frac{1}{5}}{\frac{1}{5} - 1} \therefore x = y \therefore x - y = 0$
03	D	AB এর মধ্যবিন্দু $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$ AB এর সমীকরণ $y - 1 = \frac{1-2}{2-5}(x-2) \Rightarrow y - 1 = \frac{1}{3}(x-2)$ $\Rightarrow x - 3y = -1$ $\therefore$ লম্বদ্বিখলকের সমীকরণ, $3x + y = 3\left(\frac{7}{2}\right) + \frac{3}{2} \Rightarrow 3x + y = 12$
04	D	$\frac{c}{5} = \pm \frac{2(c+3)}{13} \Rightarrow c = 10, -\frac{30}{23}$
05	D	শর্তমতে, $\begin{vmatrix} 3 & 2 & -5 \\ a & 4 & -9 \\ 1 & -2 & -7 \end{vmatrix} = 0$ $= 3(-28 + 18) - 2(-7a + 9) - 5(2a - 4) = 0 \Rightarrow a = 7$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
06	A	বিন্দুত্রয় একই সরলরেখায় অবস্থান করলে, $\begin{vmatrix} 1 & -x & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x^2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ $\Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -2x & 0 \\ 1-x^2 & x+1 & 0 \\ x^2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ $[r_1 = r_2 - r_2, r_2' = r_2 - r_3]$ $\Rightarrow 0 - 0 + 1 [0 - (-2x)(1 - x^2)] = 0$ $= 0 [C_3 \text{ বরাবর বিস্তার}]$ $\Rightarrow 2x(1-x)(1+x) = 0 \therefore x = 0$ $\text{Or } 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$ $\text{Or } 1 + x = 0 \Rightarrow x = -1$ $x = -1, 0, 1$
07	C	P এর স্থানাঙ্ক (x, y) $\therefore (x-2)^2 + (y-3)^2 = (x-6)^2 + (y+5)^2$ $\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 + 9 = x^2 + y^2 - 12x + 10y + 36 + 25$ $\Rightarrow 8x - 16y - 48 = 0 \dots\dots\dots (i)$ [সহজ উপায়: এখানে শুধুমাত্র (14, 4) বিন্দুটি দ্বারাই সমীকরণটি সিদ্ধ হয়।] আবার, $x - 3y - 2 = 0 \dots\dots\dots (ii)$ (i) ও (ii) হতে, (x, y) = (14, 4)
08	B	$\frac{(x+1)^2}{1} = (x-1)^2 + (y-0)^2$ $\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = x^2 - 2x + 1 + y^2 \Rightarrow y^2 = 4x$
09	C	$r = \sqrt{3+3} = \sqrt{6}, \tan\theta = 1$ $\therefore \theta = \frac{5\pi}{4} [\text{তৃতীয় চতুর্ভাগ}] \therefore \text{পোলার স্থানাঙ্ক: } \left(\sqrt{6}, \frac{5\pi}{4}\right)$
10	C	$5x - 4y = 5 - 8 = -3 \therefore 5x - 4y + 3 = 0$
11	A	ধরি, B বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) $\therefore$ BDEF চতুর্ভুজ $x = (4 + 2 - 5) = 1$ $y = (4 - 2 - 0) = 2$ $\therefore B = (1, 2)$ আবার, CEF চতুর্ভুজ হতে, $x = 2 + 5 - 4 = 3$ $y = 4 + 0 + 2 = 6$ $C = (x, y) = (3, 6)$ $\therefore$ ভরকেন্দ্র $= \frac{1+3+7}{3}, \frac{2+6-6}{3} = \left(\frac{11}{3}, \frac{2}{3}\right)$ Shortcut: ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রই হবে ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র। 
12	C	প্রথম রেখার ঢাল $= -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$; দ্বিতীয় রেখার ঢাল $= -\frac{2}{k}$ শর্তমতে, $\frac{3}{4} \times -\frac{2}{k} = -1 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$
13	D	AB এর মধ্যবিন্দু $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$; AB এর সমীকরণ $y - 1 = \frac{1-2}{2-5}(x-2)$ $\Rightarrow y - 1 = \frac{1}{3}(x-2) \Rightarrow x - 3y = -1$ $\therefore$ লম্ব দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ, $3x + y = 3\left(\frac{7}{2}\right) + \frac{3}{2} \Rightarrow 3x + y = 12$
14	D	$P = (-\sqrt{3}, -3) \equiv (2\sqrt{3}, \pi + \tan^{-1} \left \frac{-3}{-\sqrt{3}} \right) \equiv (2\sqrt{3}, \frac{4\pi}{3})$ $Q = (2\sqrt{3}, \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) \equiv (2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$

অধ্যায়
০৪
প্রথম পত্র
বৃত্ত

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	বৃত্তের সমীকরণের বৈশিষ্ট্য	*
02	বৃত্তের কেন্দ্র, ব্যাসার্ধ, ক্ষেত্রফল এবং অক্ষ দ্বারা ঋজু অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয়	*
03	বৃত্ত কোন অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়	**
04	(h, k) কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত x বা y অক্ষকে স্পর্শ করলে তার সমীকরণ নির্ণয় সম্পর্কিত	**
05	নির্দিষ্ট কেন্দ্র এবং অপর কোন বিন্দুগামী ও কোন বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং কোন নির্দিষ্ট বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়	**
06	দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অর্ধকৃত বৃত্তের সমীকরণ	***
07	একটি সরলরেখা একটি বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত	***
08	স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয়	**
09	কোন বৃত্ত অপর একটি বৃত্তকে স্পর্শ করা সংক্রান্ত	**
10	বৃত্তের সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়	*
11	বৃত্তের জ্যা কোন বিন্দুতে সমদ্বিখলিত হলে, জ্যা এর সমীকরণ ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত	**
12	বৃত্তের জ্যা কর্তৃক কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত—	**

□ কার্ভেসীয় তলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমান দূরে অবস্থিত বিন্দুসমূহের সেট যে সম্ভারপথ তৈরি করে সেটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে। নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে বৃত্তের কেন্দ্র (centre) এবং নির্দিষ্ট দূরত্বকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ (radius) বলে। গাণ্বে চিত্রটিতে, বৃত্তটির কেন্দ্র $C(h, k)$ এবং বৃত্তের উপরিস্থিত একটি বিন্দু $P(x, y)$ ।

ধরি, $CP = r$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r$$

$$\Rightarrow (x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2 \text{ যা বৃত্তের সমীকরণ}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$$

ধরি, $h = -g$; $k = -f$ এবং $h^2 + k^2 - r^2 = c$

তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ যা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ।

- (i) x এবং y উভয়ের দ্বিঘাত যুক্ত পদ থাকবে।
- (ii) x^2 এবং y^2 এর সহগ সমান।
- (iii) সমীকরণটি ' xy ' সম্বলিত পদ বর্জিত। অর্থাৎ, বৃত্তের সমীকরণের ' xy ' এর সহগ শূন্য।
- (iv) $f = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র X -অক্ষের উপর অবস্থিত হয়।
- (v) $g = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র Y - অক্ষের উপর অবস্থিত হয়।
- (vi) $C = 0$ হলে বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী।

[illegible]

TOPIC 06 দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তের সমীকরণ**Technique:** দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তের সমীকরণ: (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুর সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE**MEx 01** $(0, -1)$ এবং $(2, 3)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তটি x -অক্ষ থেকে যে পরিমাণ অংশ ছেদ করে তা হচ্ছে-

[BUET, 10-11; CUET 13-14; CU-C, 11-12, 10-11; IU, 14-15]

Solve $x(x - 2) + (y + 1)(y - 3) = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + y^2 - 2y - 3 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$$

$$\therefore x \text{ অক্ষ থেকে ছেদকৃত অংশ} = 2\sqrt{g^2 + f^2 - c} = 2\sqrt{1^2 + 1^2 - 3} = 4$$

TOPIC 07 একটি সরলরেখা একটি বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত**Technique:**

- কোন সরলরেখা একটি বৃত্তকে স্পর্শ করলে কেন্দ্র থেকে উক্ত রেখার উপর অংকিত লম্বদূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান।

অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = কেন্দ্র থেকে রেখার উপর অংকিত লম্বদূরত্ব।

$$\therefore ax + by + c = 0 \text{ সরলরেখা } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ বৃত্তকে স্পর্শ}$$

$$\text{করার শর্ত: } \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \frac{|-ag - bf + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শক হলে, $c = \pm a\sqrt{1 + m^2}$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE**MEx 01** $3x + 4y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে k -এর মান কত হবে?

[RU, 16-17, 15-16, 12-13, 09-10; CU, 19-20; KU, 12-13; BSMRSTU, 19-20]

Solve $x^2 + y^2 - 10x = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাংক $(5, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r = 5$

$$\text{শর্তমতে, } \left| \frac{3.5 + 4.0 - k}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right| = 5$$

$$\Rightarrow |k - 15| = 25 \Rightarrow k - 15 = \pm 25 \therefore k = 40, -10$$

TOPIC 08 স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয়**Technique:**

- (i) (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অংকিত


$$\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, } \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - a^2}$$

- (ii) (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অংকিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, $PT =$

$$\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

- (iii) মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে কোন বৃত্তের স্পর্শকের

$$\text{দৈর্ঘ্য} = \sqrt{c}$$

**LAW STORMING | MODEL EXAMPLE****MEx 01** $(1, -1)$ বিন্দু হতে $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$ বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত?

[KU, 15-16, 14-15, RU-C, 14-15, 13-14, 09-10, 08-09; IU, 12-13, 08-09; JKNU, 19-20]

$$\text{Solve } 2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0$$

$$\therefore \text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}(-1) + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

TOPIC 09 কোন বৃত্ত অপূর্ণ একটি বৃত্তকে স্পর্শ করা সংক্রান্ত

- i. অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করার শর্ত: দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ব্যাসার্ধদ্বয়ের বিয়োগফলের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, } c_1c_2 = r_1 - r_2$$

এবং এফেক্রে সাধারণ স্পর্শক একটি।

- ii. বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করার শর্ত: কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব = ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফলের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, } c_1c_2 = r_1 + r_2$$

এবং এফেক্রে সাধারণ স্পর্শক তিনটি।

- iii. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করবে যদি কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তরফলের থেকে বড় এবং যোগফলের থেকে ছোট হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } r_1 - r_2 < c_1c_2 < r_1 + r_2$$

এবং এফেক্রে সাধারণ স্পর্শক দুইটি।

Note: দুটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলেই কেবলমাত্র সাধারণ জ্যা পাওয়া যায়। এফেক্রে সাধারণ জ্যা EF।**LAW STORMING | MODEL EXAMPLE****MEx 01** এক্ষণে দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যাদের প্রত্যেকটির কেন্দ্র $(3, 4)$ এবং যারা $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তকে স্পর্শ করে।**Solve** $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_1 = 3$ এখন ধরি নির্ণেয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= r_2$ এবং কেন্দ্র $C_2(3, 4)$

$$C_1C_2 = r_2 \pm r_1 \Rightarrow \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = r_2 \pm 3$$

$$\Rightarrow 5 = r_2 \pm 3 \Rightarrow r_2 = 5 \pm 3 \Rightarrow r_2 = 8 \text{ [+নিয়মে] বা, } r_2 = 2 \text{ [-নিয়মে]}$$

$$\text{সুতরাং নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ } (x-3)^2 + (y-4)^2 = 2^2 = 4$$

$$\text{এবং } (x-3)^2 + (y-4)^2 = 8^2 = 64$$

TOPIC 10 বৃত্তের সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়**Technique:**

- (a) (x_1, y_1) বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের

$$(i) \text{ বাইরে হলে } x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$$

$$(ii) \text{ বৃত্তের (পরিধির) উপর হলে } x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$$

$$(iii) \text{ ভিতরে হলে } x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$$

- (b) (x_1, y_1) বিন্দুটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের

$$(i) \text{ বাইরে হলে } x_1^2 + y_1^2 - a^2 \text{ এর মান } > 0$$

$$(ii) \text{ বৃত্তের (পরিধির) উপর হলে } x_1^2 + y_1^2 - a^2 = 0$$

$$(iii) \text{ ভিতরে হলে } x_1^2 + y_1^2 - a^2 < 0$$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE**MEx 01** $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ হলে নীচের কোন বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত? [KU, 16-17]**Solve** $(1, 1)$ বিন্দুটি $\rightarrow 1^2 + 1^2 - 6.1 + 4.1 - 12 = -12 < 0$ (যা বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত)

$$(-2, 2) \text{ বিন্দুটি } \rightarrow (-2)^2 + 2^2 - 6(-2) + 4(2) - 12 = 16 > 0 \text{ (যা বৃত্তের বাইরে অবস্থিত)}$$

একই ভাবে, $(3, 3)$ এবং $(7, -5)$ বিন্দুদ্বয় ও বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত।**TOPIC 11** বৃত্তের জ্যা কোন বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হলে, জ্যা এর সমীকরণ ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত**Technique:01**

বৃত্তের জ্যা কোন বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হলে, জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য তিনটি Step Follow করতে হবে-

Step-1: প্রথমে বৃত্তের কেন্দ্র এবং সমদ্বিখণ্ডক বিন্দুর সংযোগ রেখার ঢাল বের করতে হবে।**Step-2:** উক্ত ঢালের সাপেক্ষে নির্ণেয় জ্যা এর ঢাল বের করতে হবে।**Step-3:** পরবর্তীতে ঢাল এবং নির্দিষ্ট বিন্দুদ্বয়ী রেখার সমীকরণ প্রয়োগ করে জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে।

14. কোন বৃত্তের কেন্দ্র (4, 5) এবং তার একটি ব্যাসের প্রান্ত (8, 9) হলে, ঐ ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাংক হবে- [IU. 12-13]

A. (6, 7) B. (2, 2) C. (0, 1) D. (4, 4)

SCoWhy যেহেতু কেন্দ্র ব্যাসের মধ্যবিন্দু সেহেতু ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাংক $\equiv (2 \times 4 - 8, 2 \times 5 - 9)$ or, $\equiv (0, 1)$

15. $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$ বৃত্তের (4, -11) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [IU. 12-13, 06-07CU. 11-12]

A. $5x - 12y - 152 = 0$ B. $5x + 12y - 152 = 0$
C. $5x - 12y + 152 = 0$ D. $12y - 5x + 152 = 0$ **Ans A**

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. (1, -1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 3x - 4y + 7 = 0$ বৃত্তের অংকিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? [BRUR-D. 19-20]

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. 4 D. 10

SCoWhy See TOPIC-10.

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. p এর কোন মানের জন্য $(x - y + 3)^2 + (px + 2)(y - 1) = 0$ একটি বৃত্ত সূচিত কর? [JKKNIU. 19-20]

A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

SCoWhy See TOPIC-01.

PART B ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $r = a \cos \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{1}{2}, 0)$ হলে, এর ক্ষেত্রফল কত? [SUST-A. 19-20]

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{3\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{8}$ E. 1

SCoWhy $r = a \cos \theta \Rightarrow r = a \cdot \frac{x}{r} \Rightarrow r^2 = ax$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - ax = 0$ (i)

$\therefore$ এর কেন্দ্রের স্থানাংক $= (\frac{a}{2}, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(\frac{a}{2})^2 + 0 - 0} = \frac{a}{2}$

শর্তমতে, $\frac{a}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 1$

$\therefore$ ব্যাসার্ধ, $r = \frac{1}{2}$ এবং ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = \frac{\pi}{4}$ বর্গ একক

02. $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$ বৃত্তটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে a এর মান কত? [SUST-B. 19-20]

A. $1 + \sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $-\sqrt{2}$

D. 1 E. $1 - \sqrt{2}$

SCoWhy $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$

বৃত্তের কেন্দ্র (-1, 1) এবং ব্যাসার্ধ $r_1 = 1$

$x^2 + y^2 = a^2$

বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0) এবং ব্যাসার্ধ $r_2 = a$

$\therefore$ বৃত্তদ্বয় অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করেছে।

$\therefore \sqrt{(-1-0)^2 + (1-0)^2} = |a-1| \Rightarrow \sqrt{2} = |a-1|$

$\Rightarrow \sqrt{2} = \pm(a-1) \Rightarrow a = \sqrt{2} + 1$ বা $a = 1 - \sqrt{2}$

03. 2cm দৈর্ঘ্যের একটি জ্যা কোন বৃত্তের কেন্দ্রে $\frac{\pi}{4}$ কোন উৎপন্ন করে। উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত cm^2 ? [SUST. 17-18]

A. 21.5 B. 20.5 C. 22.5

D. 23.0 E. 23.5

SCoWhy $0 = 2\sin^{-1} \frac{\text{জ্যা}}{\text{ব্যাস}}$ বা, $\frac{\pi}{4} = 2\sin^{-1} \frac{2}{\text{ব্যাস}}$ বা, ব্যাস = 5.226

$\therefore r = \frac{5.226}{2}$

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = 3.1416 \times (2.61)^2 = 21.5 \text{ cm}^2$

04. OT এবং OS মূল বিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 11 = 0$ বৃত্তের দুটি স্পর্শক এবং C বৃত্তটির কেন্দ্র। OTCS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত একক? [SUST. 17-18]

A. $\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{6}$ D. 2 E. 3

SCoWhy যেহেতু, O বিন্দুটি প্রদত্ত বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত সেহেতু, OT, OS এর স্পর্শক হতে পারে না।

05. 3 একক ব্যাস ও 15 একক উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সিলিন্ডার ও একক ব্যাস বিশিষ্ট সুষম ও মসৃণ গোলক দ্বারা পূর্ণ করা হলো। সিলিন্ডারের কত অংশ ফাঁকা থাকবে? [SUST. 17-18]

A. $\frac{1}{15}$ B. $\frac{2}{15}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$ E. 0

SCoWhy 3 একক ব্যাস বিশিষ্ট মোট 5টি গোলক দ্বারা সিলিন্ডার পূর্ণ করা যাবে।

$\frac{5 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{\pi r^2 h} = 1 - \frac{20r}{3h} = 1 - \frac{20 \times 3}{3 \times 15} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

06. $(-4, -3)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত কোন বিন্দুর সর্বনিম্ন দূরত্ব কত একক? [SUST. 16-17]

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 10

SCoWhy $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র (4, 3)

এবং ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2 - 9} = 4$

$(-4, -3)$ বিন্দু থেকে (4, 3) বিন্দুর দূরত্ব $= \sqrt{(-4-4)^2 + (-3-3)^2} = 10$

$(-4, -3)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$ বৃত্তের

উপরিস্থিত কোন বিন্দুর সর্বনিম্ন দূরত্ব $= 10 - 4 = 6$

07. একটি বৃত্তের কেন্দ্র হতে y অক্ষের লম্বদূরত্ব 8 একক। বৃত্তটি y অক্ষকে (0, -2) ও (0, 6) বিন্দুতে ছেদ করলে তার ব্যাসার্ধ কত একক? [SUST-B. 16-17]


A. $4\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{17}$ C. 8 D. 4 E. $2\sqrt{5}$

SCoWhy

জ্যা এর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{0^2 + 8^2} = 8$

লম্বের দৈর্ঘ্য = 8

$\therefore$ ব্যাসার্ধ $= \sqrt{(\text{অর্ধ জ্যা})^2 + (\text{লম্ব})^2} = \sqrt{4^2 + 8^2} = 4\sqrt{5}$



08. একটি বৃত্ত মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y অক্ষ দুটির ধনাত্মক দিক থেকে যথাক্রমে 3 ও 5 অংশ ছেদ করে। বৃত্তটির সমীকরণ- [SUST. 15-16, RU. 14-15, JU. 05-06; MBSTU. 11-12; CU-C., 13-14]

A. $x^2 + y^2 - x - y = 0$ B. $x^2 + y^2 + 3x + 5y = 0$

C. $x^2 + y^2 - 3x - 5y = 0$ D. $x^2 + y^2 - 5x - 3y = 0$

SCoWhy ধরি, বৃত্তটির সমীকরণ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (i) যেহেতু বৃত্তটি মূলটি মূলবিন্দুগামী সেহেতু $c = 0$; আবার, যেহেতু বৃত্তটি x ও y অক্ষ দুটির ধনাত্মক দিক থেকে যথাক্রমে 3 ও 5 অংশ ছেদ করে সেহেতু বৃত্তটি (3, 0) ও (0, 5) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

এই বিন্দুদ্বয়ের স্থানাংক (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই, $9 + 6g = 0$

$\therefore g = -\frac{3}{2}$ এবং $25 + 10f = 0 \therefore f = -\frac{5}{2}$

$\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2\left(-\frac{3}{2}\right)x + 2\left(-\frac{5}{2}\right)y + 0 = 0$

বা, $x^2 + y^2 - 3x - 5y = 0$

09. কোন শর্তসাপেক্ষে $(-1, 2)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 2x + 2y + c = 0$ বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করবে?
 A. $c = 11$ B. $c = 0$ C. $c = -11$ D. $c < -11$ E. $c > -11$ [SUST. 15-16]
[SOD Why] $x^2 + y^2 - 2x + 2y + c = 0$ বৃত্ত $(-1, 2)$ বিন্দু বসিয়ে,
 $1 + 4 + 2 + 4 + C = C + 11$
 ভিতরে হবে, যদি $C + 11 < 0 \Rightarrow C < -11$
10. c এর মান কত হলে $y = -2x + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 3$ বৃত্তকে স্পর্শ করে?
 A. 0 B. 15 C. $\pm\sqrt{3}$ D. $\pm\sqrt{10}$ E. $\pm\sqrt{15}$ [SUST. 14-15]
[SOD Why] আমরা জানি, $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত, $c = \pm a\sqrt{1+m^2}$
 সুতরাং $y = -2x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = (\sqrt{3})^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে,
 $c = \pm\sqrt{3}\sqrt{1+(-2)^2} = \pm\sqrt{3}\cdot\sqrt{5} = \pm\sqrt{15}$
11. $x^2 + y^2 + 10x - 10y - 14 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের পোলার স্থানাঙ্ক কত?
 A. $5\sqrt{2}, 130^\circ$ B. $\sqrt{2}, 135^\circ$ C. $5\sqrt{3}, 130^\circ$ D. $5\sqrt{2}, 135^\circ$ E. $\sqrt{3}, 130^\circ$ [SUST. 14-15]
[SOD Why] কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-5, 5)$
 $\therefore r = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$
 $\theta = \tan^{-1} \frac{5}{-5} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$
 পোলার স্থানাঙ্ক $(5\sqrt{2}, 135^\circ)$
12. নিচের কোন সরল রেখাটি $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$ বৃত্তকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে?
 A. $x - 2y = 0$ B. $3x + y = 0$ C. $x + 3y = 0$ D. $x - 3y = 0$ E. $x + 2y = 0$ [SUST. 13-14]
[SOD Why] $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $(3, -1)$ বৃত্তটির কেন্দ্রগামী যেকোনো রেখা বৃত্তটিকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করে। অপশন (C) হতে, $3 + 3(-1) = 0$
13. $y^2 = x$ এবং $x^2 = y$ পরাবৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দুর সংযোজককে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র-
 A. $(0, 0)$ B. $(1, \frac{1}{2})$ C. $(-\frac{1}{2}, 1)$ D. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ E. $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ [SUST. 12-13]
[SOD Why] $y^2 = x, x^2 = y$
 $\therefore x^4 = x \Rightarrow x = 0, 1 \therefore y = 0, 1$
 ছেদবিন্দুদ্বয় $(0, 0), (1, 1) \therefore$ কেন্দ্র $(\frac{0+1}{2}, \frac{0+1}{2}) \Rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
14. 4 একক বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু দিয়ে যে বৃত্ত আঁকা যায় তার ক্ষেত্রফল কত?
 A. 54π B. 8π C. 12π D. 16π [SUST. 12-13]
[SOD Why] কর্ণ = বৃত্তের ব্যাস
 $\therefore 2r = 4\sqrt{2}$
 $\therefore r = 2\sqrt{2}$
 ক্ষেত্রফল $= (\sqrt{2})^2 \pi = 8\pi$
15. m এর মান কত হলে $(x - y + 3)^2 + (mx + 2)(y - 1) = 0$ সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করবে?
 A. 1 B. -1 C. 0 D. 2 E. 3 [SUST. 11-12]
[SOD Why] See TOPIC-01.
16. m মান কত হলে $mx - y = 0$ সরলরেখা $x^2 + y^2 = px + qy$ বৃত্তকে স্পর্শ করে?
 A. $p + q$ B. $p - q$ C. $-p/q$ D. $-q/p$ E. pd [SUST. 11-12]
[SOD Why] $mx - y = 0$ সরলরেখা এবং $x^2 + y^2 = px + qy$ বৃত্তের ছেদ বিন্দু $(0, 0)$
 $mx - y = 0$ সরলরেখার ঢাল $= m$ এবং $(0, 0)$ বিন্দুতে $x^2 + y^2 = px + qy$ বৃত্তের ঢাল $= -p/q \therefore m = -p/q$
17. $(4, 3)$ বিন্দুকে কেন্দ্র করে কত ব্যাসার্ধের বৃত্ত অংকন করলে $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে?
 A. 3 B. 2 C. 5 D. 1 E. 7 [SUST. 11-12, IU. 07-08]
[SOD Why] $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $= 2$
 ধরি, $(4, 3)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= r$
 দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থ ভাবে স্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ে দূরত্ব $=$ ব্যাসার্ধ দ্বয়ের সমষ্টির সমান।
 $\therefore \sqrt{(4-0)^2 + (3-0)^2} = r + 2 \Rightarrow 5 = r + 2 \therefore r = 3$
18. $5x - 12y - 9 = 0$ সরলরেখার সমান্তরাল, $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0$ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ-
 A. $5x - 12y + 131 = 0, 5x - 12y - 51 = 0$ B. $5x - 12y = 0, 5x - 12y - 1 = 0$ C. $5x - 12y + 31 = 0, 5x - 12y - 5 = 0$ D. $5x - 12y + 1 = 0, 5x - 12y = 0$ [SUST. 08-09]
[SOD Why] $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0$
 বৃত্তের কেন্দ্র $(4, 5)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{(-4)^2 + (-5)^2 + 8} = 7$
 $5x - 12y - 9 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ:
 $5x - 12y + k = 0$ যা প্রদত্ত বৃত্তের স্পর্শক
 শর্তমতে, $\left| \frac{5 \cdot 4 - 12 \cdot 5 + k}{\sqrt{5^2 + 12^2}} \right| = 7$
 $\Rightarrow \left| \frac{k - 40}{13} \right| = 7 \Rightarrow k - 40 = \pm 91 \therefore k = 131, -51$
 $\therefore$ স্পর্শকের সমীকরণ: $5x - 12y + 131 = 0$ এবং $5x - 12y - 51 = 0$
19. 6 একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি জ্যা $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ বৃত্তের কেন্দ্রে বরাবর কোণ তৈরী করে?
 A. $\sin^{-1}(6/5)$ B. $\sin^{-1}(3/5)$ C. $2\sin^{-1}(3/5)$ D. $\tan^{-1}(6/5)$ [SUST. 08-09]
[SOD Why] $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = 5$
 $\therefore \theta = 2\sin^{-1}\left(\frac{AB}{2r}\right) = 2\sin^{-1}\left(\frac{6}{2 \times 5}\right) = 2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$
20. যদি $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তটি x -অক্ষকে $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে c এর মান কত?
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 [SUST. 06-07]
[SOD Why] যেহেতু বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু $c = g^2 = (-2)^2 = 4$
21. একটি বৃত্তের সমীকরণ হল $2x^2 + 2y^2 = 25$ । 5 একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি জ্যা বৃত্তের কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ তৈরী করবে?
 A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$ [SUST. 06-07]
[SOD Why] $2x^2 + 2y^2 = 25 \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{25}{2} = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2$
 $\therefore \theta = 2\sin^{-1}\left(\frac{5}{2 \times \frac{5}{\sqrt{2}}}\right) = 2\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

22. দুইটি বৃত্ত এমনভাবে অবস্থিত যে একটি অপরটির বাহিরে অবস্থিত এবং একে অপরকে স্পর্শ করে আছে। তাদের কেউই যদি বিন্দু বৃত্ত না হয় তবে তাদের কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যাবে?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [SUST. 05-06]

SCoWhy তিনটি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যাবে



যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ বৃত্তে $x = 2$ সরলরেখাটি একটি- [JUST-C. 19-20]

A. ব্যাস B. জ্যা C. স্পর্শক D. ব্যাসার্ধ

SCoWhy $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র (0, 3)

ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{0^2 + (-3)^2 - 5} = 2$

(0, 3) থেকে $x = 2$ রেখার লম্ব দূরত্ব $= \frac{|0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 0}} = 2$

∴ রেখাটি বৃত্তের স্পর্শক

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. (2, 1) বিন্দুতে কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত y-অক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে x-অক্ষ থেকে খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য হবে- [MBSTU-C. 19-20]

A. $2 + \sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

SCoWhy (2, 1) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত y-অক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে

∴ $c = 1^2 = 1$

∴ অক্ষ থেকে খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য $= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(-2)^2 - 1} = 2\sqrt{3}$

02. একটি বৃত্ত y অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং (3, -4) বিন্দু দিয়ে যায়। বৃত্তটির সমীকরণ- [MBSTU-A. 19-20]

A. $3x^2 + 3y^2 - 25x = 0$ B. $3x^2 + 3y^2 + 25x = 0$

C. $x^2 + y^2 - x = 0$ D. $x^2 + y^2 + x = 0$

SCoWhy (3, -4) বিন্দু দিয়ে গুরু $3x^2 + 3y^2 - 25x = 0$ সমীকরণটি সিদ্ধ হয়।

03. c এর মান কত হলে $y = 3x + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে? [MBSTU-A. 19-20]

A. 9 B. 10

C. 18 D. 20

SCoWhy $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0) এর ব্যাসার্ধ $= \sqrt{10}$

শর্তমতে, $\left| \frac{c}{\sqrt{3^2 + 1^2}} \right| = \sqrt{10} \Rightarrow c = 10$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোন বৃত্তটির কেন্দ্র মূল বিন্দুতে অবস্থিত? [BSMRSTU-B. 19-20]

A. $x^2 + y^2 + 2x = 0$ B. $x^2 + y^2 = 4$

C. $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 10 = 0$ D. $x^2 + y^2 + 5x + 5y - 9 = 0$

SCoWhy $x^2 + y^2 = 4$ এর কেন্দ্র (0, 0)

02. $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 4$ বৃত্তের কোন বিন্দুটি $(x - 10)^2 + (y - 4)^2 = 1$ বৃত্তের সবচেয়ে নিকটে? [BSMRSTU-B. 19-20]

A. (5, 4) B. (7, 4)

C. $(5\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ D. $(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{4}{\sqrt{2}})$

SCoWhy $(x - 10)^2 + (y - 4)^2 = 1$ বৃত্তের কেন্দ্র (10, 4)

(10, 4) থেকে (5, 4) বিন্দুর দূরত্ব $= \sqrt{(10 - 5)^2 + (4 - 4)^2} = 5$

(10, 4) থেকে (7, 4) বিন্দুর দূরত্ব $= \sqrt{(10 - 7)^2 + (4 - 4)^2} = 3$

(10, 4) থেকে $(5\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ বিন্দুর দূরত্ব;

$$= \sqrt{(10 - 5\sqrt{2})^2 + (4 - 4\sqrt{2})^2} = 3.36$$

(10, 4) থেকে $(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{4}{\sqrt{2}})$ বিন্দুর দূরত্ব;

$$= \sqrt{(10 - \frac{5}{\sqrt{2}})^2 + (4 - \frac{4}{\sqrt{2}})^2} = 6.57$$

∴ (10, 4) থেকে সবচেয়ে কাছের বিন্দু (7, 4)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x^2 + y^2 - 4x + 8 + m = 0$ বৃত্তের ব্যাস 4 হলে m এর মান কত? [NSTU. 19-20]

A. -8 B. 12 C. 16 D. 24

SCoWhy $x^2 + y^2 - 4x + 8 + m = 0$

বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(-2)^2 + 0 - (8 + m)}$

শর্তমতে, $2r = 4 \Rightarrow r = 2 \Rightarrow \sqrt{4 - (8 + m)} = 2$

$$\Rightarrow 4 - 8 - m = 4 \Rightarrow m = -8$$

STEP 04

PRIME TEST

Time: 15

01. $x^2 + y^2 + 2x + c = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 2y + c = 0$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করলে c এর মান হবে-

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

02. $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0$ ও $x^2 + y^2 + 32x + 24y = 0$ বৃত্তদ্বয়ের ছেদ বিন্দুগামী ও বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র সমূহের সংযোগকারী রেখার উপর লম্ব লেখার সমীকরণ হলো-

A. $6x - y = 0$ B. $4x + 3y = 0$
C. $3x + 4y = 0$ D. $3x - 4y = 0$

03. যে শর্তে $x + y = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে তা হল-

A. $a^2 - 2a = 1$ B. $a^2 + 2a = -1$
C. $a^2 + 2a = 1$ D. $a^2 - 2a = -1$

04. $4x^2 + 4y^2 - 6x + 9y - 13 = 0$ দ্বারা বর্ণিত বৃত্তের (2, -3) বিন্দুতে অংকিত স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?

A. $x + y = 6$ B. $2x + y = 12$ C. $x + 2y = 5$ D. $2x - 3y = 13$

05. পোলার স্থানাঙ্কে $(5, \frac{\pi}{4})$ কেন্দ্র ও 2 ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

A. $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r + 21 = 0$

B. $r^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}(\cos\theta + \sin\theta)r - 21 = 0$

C. $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r - 21 = 0$

D. $r^2 - 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r + 21 = 0$

06. একটি বৃত্ত Y-অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করে এবং (3, -4) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে, বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?

A. $3x^2 + y^2 = 10x$ B. $4x^2 + y^2 = x$

C. $x^2 + 3y^2 = 7x$ D. $3x^2 + 3y^2 = 25x$


07. $y = x + 5$ সরলরেখাটি যে সমীকরণকে কখনও স্পর্শ করে না-

A. $y^2 = 20x$

B. $9x^2 + 16y^2 = 144$

C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $x^2 + y^2 = 25$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
04	D	$4xx_1 + 4yy_1 - 3(x + x_1) + \frac{9}{2}(y + y_1) - 13 = 0;$ $(x_1, y_1) = (2, -3)$
05	D	$\left(x - 5 \cos \frac{\pi}{4}\right)^2 + \left(y - 5 \sin \frac{\pi}{4}\right)^2 = 2^2$ $\Rightarrow x^2 + y^2 + 25 - 5\sqrt{2}x - 5\sqrt{2}y = 4$ $\Rightarrow r^2 - 5\sqrt{2}r(\cos\theta + \sin\theta) + 21 = 0$
06	D	$f^2 = c$ $\therefore x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + f^2 = 0$ যা, $(0, 0)$ ও $(3, -4)$ বিন্দুগামী $\therefore f^2 = c = 0$ $\therefore x^2 + y^2 + 2gx = 0$ যা $(3, -4)$ বিন্দুগামী $9 + 16 + 6g = 0;$ $6g = -25; g = -\frac{25}{6}$ $\therefore x^2 + y^2 - \frac{25}{3}x = 0$ $\therefore 3x^2 + 3y^2 - 25x = 0$
07	D	$x^2 + (x+5)^2 = 25;$ $x = -5, 0$ $\therefore y = x + 5, x^2 + y^2 = 25$ কে ছেদ করে।
08	AC	$(x - y + 3)^2 + (Kx + 2)(y - 1) = 0$ বা, $x^2 + y^2 + 9 - 2xy - 6y + 6x + Kxy - Kx + 2y - 2 = 0$ বা, $x^2 + y^2 + (6 - K)x - 4y + (K - 2)xy + 7 = 0$ কিন্তু বৃত্তের ক্ষেত্রে xy যুক্ত কোন পদ থাকতে পারবে না। $\therefore K - 2 = 0 \therefore K = 2$
09	C	$2\sqrt{g^2 - c} = 0 \Rightarrow g^2 = c \Rightarrow \left(\frac{k}{2}\right)^2 = 25$ $\Rightarrow \frac{k}{2} = \pm 5 \therefore k = \pm 10$
10	C	ব্যাসার্ধ, $r = 2, x^2 = r^2 - 1^2$ $= 2^2 - 1^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$ $\therefore y$ -অক্ষ হতে বৃত্তটি দ্বারা খণ্ডিত অংশ $= 2\sqrt{3}$ 
11	A	$S_1 - S_2 \Rightarrow -2x - 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$
12	D	$x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0$ $C = (-1, -1); r = \sqrt{2}$ $AC = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ $BC = r = \sqrt{2}$ $AB = AC - BC = 2\sqrt{2} - \sqrt{2}$ একক

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
13	C	$(x - y + 3)^2 + (kx + 2)(y - 1) = 0$ $\Rightarrow x^2 + y^2 + 9 - 2xy + 6x - 6y + kxy - kx + 2y - 2 = 0$ $\Rightarrow x^2 + y^2 + (k - 2)xy + (6 - k)x - 4y + 7 = 0$ xy এর সহগ শূন্য বলে, $k - 2 = 0$ $\Rightarrow k = 2$
14	C	বৃত্তের সমীকরণের বৈশিষ্ট্য: i. x^2 ও y^2 এর সহগ সমান হবে ii. xy আকারের পদ থাকবে না। Option $\rightarrow c$ তে x^2 ও y^2 এর সহগ সমান; xy আকারের পদ নেই। তাই ইহাই বৃত্তের সমীকরণ
15	A	যেহেতু বৃত্তটি মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y অক্ষের ধনাত্মক দিক হতে 3 ও 5 অংশ ছেদ করে সুতরাং এর কেন্দ্র $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ অপশন (A) হতে, রেখাটিকে, $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ বিন্দুটি সিক্ত করে।
16	B	যেহেতু $(1, 2)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত x অক্ষকে স্পর্শ করে $\therefore c = g^2 = (-1)^2 = 1$ $\therefore$ বৃত্তটি y অক্ষকে ছেদ করে $= 2\sqrt{f^2 - c}$ $= 2\sqrt{(-2)^2 - 1} = 2\sqrt{3}$ একক
17	C	বৃত্তটির সমীকরণ $= (x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 4^2$ $\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 8y + 16 = 0$
18	D	বৃত্তের ব্যাস = সমান্তরাল স্পর্শকদ্বয়ের দূরত্ব $= \left \frac{-27 - 7}{\sqrt{36 + 144}} \right = \frac{34}{6\sqrt{5}}$ $\therefore$ ব্যাসার্ধ $= \frac{\text{ব্যাস}}{2} = \frac{17}{6\sqrt{5}}$
19	D	x -অক্ষের স্পর্শ করে বলে $g^2 = c$ হবে। সুতরাং, প্রদত্ত option-গুলোর মধ্যে B এবং D option-এ $g^2 = c$ হয় যার মধ্যে D option-টির কেন্দ্র $(4, 3)$ দিয়ে $5x - 7y + 1 = 0$ রেখাটি সিক্ত হয়।
20	C	বৃত্তের কেন্দ্র $(-7, 8)$ যেহেতু বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে। $\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ $=$ কেন্দ্রের ভূজ $= -7 = 7$ $\therefore$ বৃত্তের ব্যাস $= 2 \times 7 = 14$
21	D	$x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $= (-2, -3)$ $\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \sqrt{(4+2)^2 + (5+3)^2} = 10$ $\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = (10)^2$ $\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 10y - 59 = 0$
22	D	Option $\rightarrow D$ তে $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 58$ বৃত্তের কেন্দ্র $(4, -5)$
23	A	বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \frac{1}{2} \sqrt{(-4 - 12)^2 + (3 + 1)^2} = 2\sqrt{17}$ একক
24	C	$c = \pm a \sqrt{1 + m^2} = \pm 4 \sqrt{1 + 1^2} = \pm 4\sqrt{2}$
25	B	$(1, 1)$ বিন্দুটি $\rightarrow 1^2 + 1^2 - 6 \cdot 1 + 4 \cdot 1 - 12 = -12 < 0$ যা বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত $(-2, 2)$ বিন্দুটি $\rightarrow (-2)^2 + 2^2 - 6(-2) + 4(2) + 4(2) - 12 = 16 > 0$ যা বৃত্তের বাহিরে অবস্থিত একই ভাবে, $(3, 3)$ এবং $(7, -5)$ বিন্দুদ্বয় ও বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত।

Sine & Cosine-rule

01. ত্রিভুজের sine-rule : $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$; R = পরিব্যাসার্ধ।

02. ত্রিভুজের cosine-rule :


(i) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

(ii) $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$

(iii) $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

নিম্নোক্ত মানগুলো ধরলে ত্রিভুজের গুণাবলীর সকল ম্যাথ মিলে যায়।

$a = b = c = 2$
 $A = B = C = 60^\circ$
 $s = 3$
 $\Delta = \sqrt{3}$
 $R = \frac{2}{\sqrt{3}}$



Ex: $\frac{a}{\sin A} = 2R$

$\frac{2}{\sin 60^\circ} = 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$

$\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$

অভিক্ষেপ সূত্র (Projection Rule)

03. $a = b \cos C + c \cos B$

04. $b = c \cos A + a \cos C$

05. $c = a \cos B + b \cos A$

ত্রিভুজের পরিসীমা সংক্রান্ত সূত্র:

□ একটি ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমাকে সাধারণত s দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, $s = \frac{a+b+c}{2}$

06. $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$

07. $\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{ca}}$

08. $\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}$

09. $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$

10. $\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{s(s-b)}{ca}}$

11. $\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$

12. $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$

13. $\tan \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{s(s-b)}}$

14. $\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$

15. $\cot \frac{A}{2} = \frac{s(s-a)}{\Delta}$

16. $\cot \frac{B}{2} = \frac{s(s-b)}{\Delta}$

17. $\cot \frac{C}{2} = \frac{s(s-c)}{\Delta}$

18. $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{s}{R}$

Tangent Rule:

19. $\tan A = \frac{abc}{R} \cdot \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2}$


20. $\tan B = \frac{abc}{R} \cdot \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2}$

21. $\tan C = \frac{abc}{R} \cdot \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল Area of a Triangle

22. $\Delta = \frac{1}{2} \times (\text{দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফল}) \times \text{বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের sine}$

$= \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} bc \sin A$



23. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

□ ত্রিভুজের অন্তঃব্যাসার্ধ, $r = \frac{\Delta}{s}$ এবং ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ, $R = \frac{abc}{4\Delta}$

Special Formula

24. $\frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{abc}{4R} = \Delta$

25. (i) $\sin A = \frac{2\Delta}{bc}$ (ii) $\sin B = \frac{2\Delta}{ca}$ (iii) $\sin C = \frac{2\Delta}{ab}$

TOPIC 05

কোণ পূর্ণ সংখ্যা গুণিতক আকারে থাকলে ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ

MEx 01

$n \in \mathbb{Z}$ হলে, $\sin\left\{n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}\right\}$ এর মান নির্ণয় কর। [JUST. 13-14]

Solve

প্রশ্নে n থাকলে $n = 0$ বসিয়ে দিয়ে যে মান পাওয়া যাবে সেই মানটি।
 Ans. হবে।

যেমন, $n = 0$ বসিয়ে দিলে $\sin\left\{n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}\right\} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Ans.

MEx 02

$\sin\{(2n+1)\pi + \alpha\} = ?$

Solve

প্রশ্নে n থাকলে $n = 0$ বসিয়ে যেই মান পাওয়া যায় সেই মানটি। Answer হবে।
 $\sin\{(2n+1)\pi + \alpha\} = \sin(\pi + \alpha) [n = 0 \text{ বসিয়ে}] = -\sin \alpha$

TOPIC 06

ত্রিকোণমিতিক অভেদাবলী

MEx 01

$A + B = \frac{\pi}{2}$ হলে $\cos^2 A - \cos^2 B$ এর মান- [DU. 2017-2018]

Solve

$\cos^2 A - \cos^2 B = 1 - \sin^2 A - 1 + \sin^2 B = \sin^2 B - \sin^2 A$
 $= \sin(B+A) \cdot \sin(B-A)$
 $= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin(B-A) = 1 \cdot \sin(B-A) = \sin(B-A)$

TOPIC 07

ত্রিভুজের sin ও cosine সূত্রের ব্যবহার

□

চারটির মধ্যে 2টি বাহু এবং 2টি কোণ হলে sine-এর সূত্র use করব।

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

□

চারটির মধ্যে 3টি বাহু এবং একটি কোণ হলে cosine সূত্র use করব।

(i) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

(ii) $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$

(iii) $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

Note: যে কোন ত্রিভুজে বড় বাহুর বিপরীত কোণটি সবচেয়ে বড় এবং ছোট বাহুর বিপরীত কোণটি সবচেয়ে ছোট।

MEx 01

ΔABC -এর তিনটি বাহু $a = 3 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$, $c = 7 \text{ cm}$ হলে বৃহত্তম কোণের মান কত? এবং ত্রিভুজটি কি ধরণের হবে? [ক.বো. ২০১০; সি.বো. ২০১২; চ.বো. ২০১০]

Solve

$\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} \Rightarrow C = \cos^{-1}\left(-\frac{15}{30}\right) \therefore C = 120^\circ$
 $\therefore$ ত্রিভুজটি স্থলকোণী। Ans.

TOPIC 08 ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত

MEQ 01 কোন ত্রিভুজের বাহুগুলি 13, 14, 15 হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
[J: 14-15; IU: 11-12; JnU: 10-11; CUET: 06-07; CU: 08-09; RU: 07-08; BUET: 06-07]

Solve $S = \frac{13+14+15}{2} = 21 \therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
 $= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84$

TOPIC 09 তথ্য দেওয়া না থাকলে ত্রিভুজের রাশিমালার মান নির্ণয় সংক্রান্ত

MEQ 01 ABC ত্রিভুজের $\frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c}$ হলে $\angle C$ এর মান কত?
[KUET: 07-08; SUST: 09-10; ঢ.বো: 05, 12; সি.বো: 04, 08, 12; চ.বো: 11, 13; ব.বো: 11; কু.বো: 07; রা.বো: 06; মা.বো: 10, 12]

Solve $\frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c} \Rightarrow \frac{a+b+c+c}{(a+c)(b+c)} = \frac{3}{a+b+c}$
 $\Rightarrow (a+b+c)(a+b+c+c) = 3(ab+ac+bc+c^2)$
 $\Rightarrow (a+b+c)^2 + c^2 + bc + ca = 3ab + 3ac + 3bc + 3c^2$
 $\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = 3ab + 2bc + 2ca + 2c^2$
 $\Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 = ab \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \cos C = \cos 60^\circ \therefore C = 60^\circ$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যারালেল ডায়াগ্রাম সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\alpha + \frac{5\pi}{6}\right)$ এর মান কত? [GST-A. 2022-2023]

- A. -1 B. 0 C. $-\cos \alpha$ D. $\sqrt{3} \sin \alpha$

S(Why) $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\alpha + \frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\pi + \alpha - \frac{\pi}{6}\right)$

$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = 0$

02. যদি $\cos x + \cos y = p$ এবং $\sin x + \sin y = q$ হয় তবে, $\tan \frac{x+y}{2}$ [GST-A. 20-21]

- A. $\frac{p}{q}$ B. $\frac{q}{p}$ C. $\frac{p^2}{q^2}$ D. $\frac{q^2}{p^2}$

S(Why) $\cos x + \cos y = p$ (i)
 $\sin x + \sin y = q$ (ii)

(ii) ÷ (i) করে পাই, $\frac{\sin x + \sin y}{\cos x + \cos y} = \frac{q}{p}$

$\Rightarrow \frac{2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}}{2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}} = \frac{q}{p} \Rightarrow \tan \frac{x+y}{2} = \frac{q}{p}$

03. যদি $\cos \theta + \sec \theta = 2$ হয় তবে $\cos^3 \theta + \sec^3 \theta$ এর মান কত? [GST-A. 20-21]

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 8

S(Why) $\cos \theta + \sec \theta = 2$ সুতরাং $\cos^3 \theta + \sec^3 \theta$
 $\Rightarrow \frac{\cos^2 \theta + 1}{\cos \theta} = 2 \Rightarrow (\cos \theta - 1)^2 = 0$ $= 1^3 + 1^3$
 $\therefore \cos \theta = 1 \therefore \sec \theta = 1$ $= 2$

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\tan 17^\circ + \tan 28^\circ + \tan 17^\circ \tan 28^\circ$ এর মান- [JNU 17-18]

- A. 1 B. -1 C. $\sqrt{3}$ D. $1/\sqrt{3}$

S(Why) $\tan(17^\circ + 28^\circ) = \frac{\tan 17^\circ + \tan 28^\circ}{1 - \tan 17^\circ \tan 28^\circ}$

$\Rightarrow \frac{\tan 17^\circ + \tan 28^\circ}{1 - \tan 17^\circ \tan 28^\circ} = \tan 45^\circ \Rightarrow \tan 17^\circ + \tan 28^\circ = 1 - \tan 17^\circ \tan 28^\circ$
 $\Rightarrow \tan 17^\circ + \tan 28^\circ + \tan 17^\circ \tan 28^\circ = 1$

02. $\tan 40^\circ \tan 50^\circ \tan 60^\circ$ এর মান- [RU. 17-18; JNU 17-18]

- A. $\sqrt{3}$ B. $\tan 10^\circ$ C. $1/\sqrt{3}$ D. $-\sqrt{3}$

S(Why) $\tan 40^\circ \tan 50^\circ \tan 60^\circ = \tan 40^\circ \cot 40^\circ \tan 60^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

03. $\tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ$ এর মান- [JNU 16-17; DU: 03-04; SAU: 05-06]

- A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

S(Why) $\tan(75^\circ - 30^\circ) = \frac{\tan 75^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 75^\circ \tan 30^\circ}$

$\Rightarrow \frac{\tan 75^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 75^\circ \tan 30^\circ} = \tan 45^\circ$

$\Rightarrow \tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ = 1$

04. $f(\theta) = \cos \theta - \sin \theta$ হলে θ এর কোন মানের জন্য $f(\theta) = 0$? [JNU 15-16, RU 08-09]

- A. $\pi/2$ B. $\pi/4$ C. π D. $\pi/6$

S(Why) $\therefore f(\theta) = 0 \therefore \cos \theta - \sin \theta = 0 \Rightarrow \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ$ এর মান কত?

[KU. 18-19; BUTex. 11-12; ব.বো. ২০০৭; চ.বো. ২০০৬; রা.বো. ২০১০; কু.বো. ২০০৯]

- A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ D. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

S(Why) $\tan 20^\circ \cdot \tan 40^\circ \tan 80^\circ$

$= \tan 20^\circ \cdot \frac{2 \sin 40^\circ}{2 \cos 40^\circ} \cdot \frac{\sin 80^\circ}{\cos 80^\circ} = \frac{\sin 20^\circ (\cos 40^\circ - \cos 120^\circ)}{\cos 20^\circ (\cos 120^\circ + \cos 40^\circ)}$

$= \frac{(\cos 40^\circ + \frac{1}{2})}{\cos 20^\circ (-\frac{1}{2} + \cos 40^\circ)} = \frac{\sin 20^\circ (2 \cos 40^\circ + 1)}{\cos 20^\circ (2 \cos 40^\circ - 1)}$

$= \frac{2 \cos 40^\circ \cdot \sin 20^\circ + \sin 20^\circ}{2 \cos 40^\circ \cdot \cos 20^\circ - \cos 20^\circ} = \frac{\sin 60^\circ - \sin 20^\circ + \sin 20^\circ}{\cos 60^\circ + \cos 20^\circ - \cos 20^\circ}$
 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

02. $\sin x \sin(x+30^\circ) + \cos x \sin(x+120^\circ)$ এর মান কত? [KU. 16-17; CoU. 18-19]

- A. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

S(Why) $x = 30^\circ$ ধরে, $\sin x \sin(x+30^\circ) + \cos x \sin(x+120^\circ)$

$= \sin 30^\circ \sin 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

03. $\sin 15^\circ$ এর মান কত? [KU 16-17; IU 16-17; কু.বো. ২০০৫]

- A. $\frac{3}{2\sqrt{2}}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$ D. $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$

S(Why) $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ)$

$= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$

04. n পূর্ণ সংখ্যা হলে $\sin\{n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{4}\}$ এর মান হবে- [KU 14-15]

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ D. 1

S(Why) $n = 1$ ধরলে, $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 135^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$

05. $\tan A = \frac{m+n}{m-n}$ এবং $\tan B = \frac{m-n}{m+n}$ হলে $\tan(A-B)$ এর মান কত হবে? [KU: A 12-13]

A. অসংগায়িত B. $2mn$ C. $4mn$ D. $\frac{2mn}{m^2-n^2}$

[SOWhy] $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$

$$= \frac{\frac{m+n}{m-n} - \frac{m-n}{m+n}}{1 + \frac{m+n}{m-n} \times \frac{m-n}{m+n}} = \frac{\frac{4mn}{(m-n)^2}}{(1+1)} = \frac{2mn}{m^2-n^2}$$


06. $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4\theta}}$ এর মান কত? [KU 12-13]
- A. $\cos \theta$ B. $\cos^2 \theta$ C. $2\cos \theta$ D. $2\cos^2 \theta$

[SOWhy] $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4\theta}} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2(1+\cos 2.2\theta)}}$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2.2\cos^2 2\theta}}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{2+2\cos \theta} = \frac{1}{2}\sqrt{2(1+\cos \theta)}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{2.2\cos^2 \theta} = \frac{1}{2}.2\cos \theta = \cos \theta$$



07. যদি $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$ হয় তবে $A+B+C$ এর মান কত? [KU: 10-11]

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. 2π

[SOWhy] $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$

From Option B, $A = B = C = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$

$$\cot 60^\circ \cot 60^\circ + \cot 60^\circ \cot 60^\circ + \cot 60^\circ \cot 60^\circ = 1$$

08. ABC ত্রিভুজের $\angle B = 30^\circ$, $c = \sqrt{3}b$ হলে $\angle A = ?$ [KU: 10-11]

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

[SOWhy] $\angle B = 30^\circ$, $c = \sqrt{3}b$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{b}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}b}{\sin C} \Rightarrow \frac{2}{1} = \frac{\sqrt{3}}{\sin C} \Rightarrow \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow C = 60^\circ$$

$$\therefore \angle A = 180^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 90^\circ$$

09. $\tan(45^\circ + \theta) = ?$ [KU: 01-02; MBSTU: 14-15]

A. $\frac{1-\tan \theta}{1+\tan \theta}$ B. $\frac{1-\sin \theta}{1+\cos \theta}$ C. $\frac{1-\cos \theta}{1+\sin \theta}$ D. $\frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta}$

[SOWhy] $\tan(45^\circ + \theta) = \frac{\tan 45^\circ + \tan \theta}{1 - \tan 45^\circ \cdot \tan \theta}$

$$= \frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta} (\because \tan 45^\circ = 1)$$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\sin^2 2^\circ + \sin^2 7^\circ + \sin^2 12^\circ + \dots + \sin^2 147^\circ$ এর পদসংখ্যা কত? [CoU. 19-20; BUTex. 12-13]

A. 15 B. 27 C. 29 D. 30

[SOWhy] $\sin^2 2^\circ + \sin^2 7^\circ + \sin^2 12^\circ + \dots + \sin^2 147^\circ$

ধরি, পদ সংখ্যা, $n = \frac{\text{শেষ পদ} - \text{প্রথম পদ}}{\text{ব্যবধান}} + 1 = \frac{147-2}{5} + 1 = 30 \therefore n = 30$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\tan \theta + \cot \theta = ?$ [IU-A. 19-20]

A. $2\cos \theta$ B. $2\sin \theta$ C. $\frac{2}{\cos 2\theta}$ D. $\frac{2}{\sin 2\theta}$

[SOWhy] $\tan \theta + \cot \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta}$

$$= \frac{2}{2\cos \theta \sin \theta} = \frac{2}{\sin 2\theta}$$

02. $\cos(7\frac{1}{2}^\circ) = ?$ [IU. 18-19; জা.বো. ২০১৭]

A. $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

C. $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

D. $\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

[SOWhy] $\cos(7\frac{1}{2}^\circ) = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

03. $\cos^3 x$ এর সূত্র- [IU 17-18]

A. $\frac{4\cos x + \cos 3x}{3}$

B. $\frac{\cos x + 3\cos 3x}{4}$

C. $\frac{\cos x + \cos 3x}{3}$

D. $\frac{3\cos x + \cos 3x}{4}$

[SOWhy] [সূত্র]

04. $\cot 3A$ এর মান- [IU 17-18]

A. $\frac{3\cot A + \cot A}{1 - \cot^3 A}$

B. $\frac{3\cot A - \cot^3 A}{1 - 3\cot^2 A}$

C. $\frac{\cot A - 3\cot^3 A}{1 - \cot^2 A}$

D. $\frac{\cot^3 A - 3\cot A}{1 - 3\cot^2 A}$

[SOWhy] [সূত্র]

05. $\sin^3 x$ এর সূত্র- [IU 17-18]

A. $\frac{3\sin x - \sin 3x}{4}$

B. $\frac{\sin x - 3\sin 3x}{4}$

C. $\frac{4\sin x - \sin 3x}{3}$

D. $\frac{\sin x - 3\sin 3x}{3}$

[SOWhy] [সূত্র]

06. $\cot A + \cot B + \cot C = 0$ হলে $(\sum \tan A)^2$ এর মান- [IU 17-18]

A. $\sum \sin^2 A$

B. $\sum \cos^2 A$

C. $\sum \tan^2 A$

D. $\sum \cot^2 A$

[SOWhy] $(\sum \tan A)^2$

$$= (\tan A + \tan B + \tan C)^2$$

$$= \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C + 2(\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A)$$

$$= \sum \tan^2 A + 2\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C \left(\frac{1}{\tan C} + \frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B} \right)$$

$$= \sum \tan^2 A + 2\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C (\cot C + \cot A + \cot B)$$

$$= \sum \tan^2 A [\because \cot A + \cot B + \cot C = 0]$$

$$(\sum x)^2 = \sum x^2 \text{ যখন } \sum \frac{1}{x} = 0$$

07. ত্রিভুজের দুটি বাহু a, b ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ C হলে- [IU 17-18]

A. $\Delta = \frac{1}{2}ab \sin C$

B. $\Delta = \frac{a}{b} \sin C$

C. $\Delta = \frac{b}{a} \sin C$

D. $\Delta = \frac{1}{2}(a+b) \sin C$

[SOWhy] ত্রিভুজের গুণাবলীর সূত্র।

08. 9, 40 ও 41 বাহু বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাস কত? [IU: A. 17-18]

A. 41

B. 21.5

C. 20.5

D. $\frac{9 \times 40 \times 41}{4}$

[SOWhy] $9^2 + 40^2 = 41^2 \Rightarrow 1,681 = 1,681$

ইহা একটি সমকোণী ত্রিভুজ। যার অতিভুজ = 41

$\therefore$ পরিবৃত্তের ব্যাস = 41

০৭. ABC ত্রিভুজের তিনটি বাহু a, b, c এবং পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ R হলে- [IU 17-18]
- A. $\Delta = \frac{4R}{abc}$ B. $\Delta = \frac{R}{4abc}$ C. $\Delta = \frac{R}{abc}$ D. $\Delta = \frac{abc}{4R}$

[S@Why] ত্রিভুজের গুণাবলীর সূত্র।

১০. $\tan\theta + \sec\theta = \frac{x}{y}$ হলে $\sin\theta$ এর মান- [IU: 16-17]
- A. $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ B. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ C. $\frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-y^2}$ D. $\frac{x^2+2xy}{x^2-y^2}$

[S@Why] $\tan\theta + \sec\theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{1}{\cos\theta} = \frac{x}{y}$

$$\Rightarrow \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{(\sqrt{1+\sin\theta})(\sqrt{1+\sin\theta})}{(\sqrt{1+\sin\theta})(\sqrt{1-\sin\theta})} = \frac{x}{y}$$

$$\Rightarrow \frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta} = \frac{x^2}{y^2} \Rightarrow \frac{1+\sin\theta-1+\sin\theta}{1+\sin\theta+1-\sin\theta} = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

১১. $\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta} = ?$ [IU 16-17, CU: 12-13, RU: 12-13, DU: 01-02, 98-99]

- A. $\tan 2\theta$ B. $2 \sin\theta \cos\theta$ C. $2\cos^2\frac{\theta}{2}$ D. $\cos 2\theta$


[S@Why] সরাসরি সূত্র।

১২. কোন ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় 22.5° ও 11.5° এবং ত্রিভুজের উচ্চতা h হলে ভূমি কত? [IU: E, 16-17]

- A. 2h B. h C. h/2 D. $h/\sqrt{2}$

[S@Why]

চিত্র হতে, BC এর দৈর্ঘ্য AD এর দৈর্ঘ্য হতে বড় হবে। অপশনে B, C, D Ans. হবে না।



১৩. $\sec A = \frac{17}{8}$ এবং $\operatorname{cosec} B = \frac{5}{4}$ হলে, $\sec(A+B)$ এর মান কত? [IU: 15-16]

- A. $-\frac{7}{6}$ B. $-\frac{85}{36}$ C. $\frac{87}{35}$ D. $\frac{78}{35}$

[S@Why] $\sec A = \frac{17}{8}$

$$\cos A = \frac{8}{17}, \sin A = \frac{15}{17} \text{ এবং } \operatorname{cosec} B = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \sin B = \frac{4}{5} \text{ এবং } \cos B = \frac{3}{5}$$

$$\sec(A+B) = \frac{1}{\cos(A+B)} = \frac{1}{\cos A \cos B + \sin A \sin B}$$

$$= \frac{1}{\frac{8}{17} \cdot \frac{3}{5} + \frac{15}{17} \cdot \frac{4}{5}} = \frac{1}{\frac{24+60}{85}} = \frac{85}{84}$$

১৪. $\sin\phi + \cos\phi = 1$ হলে $\sin\phi - \cos\phi$ এর মান- [IU 15-16]

- A. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C. ± 1 D. $-\frac{1}{2}$

[S@Why] $\sin\phi + \cos\phi = 1 \Rightarrow \sin^2\phi + \cos^2\phi + 2\sin\phi \cos\phi = 1$

$$\Rightarrow 1 + 2\sin\phi \cos\phi = 1 \Rightarrow 2\sin\phi \cos\phi = 0$$

$$\text{আবার, } (\sin\phi - \cos\phi)^2 = \sin^2\phi - 2\sin\phi \cos\phi + \cos^2\phi = 1 - 0 = 1$$

$$\therefore \sin\phi - \cos\phi = \pm 1$$

১৫. ABC ত্রিভুজ $\angle A = 60^\circ$ এবং $\angle B = 75^\circ$ এবং c বাহুর দৈর্ঘ্য $\sqrt{6}$ সে. মি. হলে, a বাহুর দৈর্ঘ্য কত? [IU 15-16, SUST. 06-07]

- A. 12 B. 6 C. 3 D. 9

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow a = \frac{\sin A}{\sin C} \times c = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} \times \sqrt{6} = 3$$

১৬. $\frac{1-\cos 2\theta + \sin 2\theta}{1+\cos 2\theta + \sin 2\theta} = ?$ [IU 15-16, JU 14-15, RU 07-08, 05-06; CU 02-03]

- A. $\sec\theta$ B. $\sin\theta$ C. $\tan\theta$ D. $\cot\theta$

[S@Why] প্রদত্ত রাশি

$$= \frac{1-\cos 2\theta + \sin 2\theta}{1+\cos 2\theta + \sin 2\theta} = \frac{2\sin^2\theta + 2\sin\theta \cos\theta}{2\cos^2\theta + 2\sin\theta \cos\theta} = \frac{2\sin\theta(\sin\theta + \cos\theta)}{2\cos\theta(\cos\theta + \sin\theta)} = \tan\theta$$

১৭. $\sin 28^\circ 32' \cdot \sin 88^\circ 32' + \sin 61^\circ 28' \cdot \sin 1^\circ 28'$ এর মান হবে- [IU 14-15]


- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

[S@Why] $\sin 28^\circ 32' \cdot \sin 88^\circ 32' + \sin 61^\circ 28' \cdot \sin 1^\circ 28'$

$$= \sin 28^\circ 32' \cdot \cos 1^\circ 28' + \cos 28^\circ 32' \cdot \sin 1^\circ 28'$$

$$= \sin(28^\circ 32' + 1^\circ 28') = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

১৮. চিত্রে ABC একটি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হলে, $\cos \frac{B}{2}$ এর মান হবে- [IU-F. 14-15]




A. $\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$

B. $\sqrt{\frac{(s-c)(s-a)}{ca}}$

C. $\sqrt{\frac{s(s-b)}{ca}}$

D. $\sqrt{\frac{s(s-c)(s-a)}{s(s-b)}}$

[S@Why]



১৯. $\operatorname{cosec}(2A) - \cot(2A) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ [IU: E, 13-14]

- A. $\tan A$ B. $\tan 2A$ C. $\cot A$ D. $\tan 2A$

[S@Why] $\operatorname{cosec}(2A) - \cot(2A) = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ($A = 30^\circ$ ধরে)

(A) Option বসিয়ে পাই, $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

২০. $\frac{4}{\sqrt{2+\sqrt{2}+2\cos 4x}}$ এর মান- [IU 12-13]

- A. $\sec x$ B. $2\sec x$ C. $\sec^2 x$ D. $2\sec^2 x$

[S@Why] $\frac{4}{\sqrt{2+\sqrt{2}+2\cos 4x}}} = \frac{4}{2\cos x} = 2\sec x$

২১. $2\cos \frac{\pi}{12} = ?$ [IU 11-12]

- A. $\sqrt{2+\sqrt{3}}$ B. $\sqrt{3+\sqrt{3}}$ C. $\sqrt{3+\sqrt{2}}$ D. $\sqrt{2+\sqrt{2}}$

[S@Why] $2\cos \frac{\pi}{12} = \sqrt{2 \cdot 2\cos^2 \frac{\pi}{12}} = \sqrt{2(1+\cos 2 \cdot \frac{\pi}{12})}$

$$= \sqrt{2+2\cos \frac{\pi}{6}} = \sqrt{2+2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{2+\sqrt{3}}$$

22. n পূর্ণসংখ্যা হলে $\cos\{n\pi + \alpha\} = ?$ [IU 11-12]

- A. $n\cos\alpha$ B. $\cos\alpha$ C. $(-1)^n \cos\alpha$ D. $(-1)^n \sin\alpha$

[S@Why] $n = 0$ হলে প্রদত্ত রাশি এর মান $= \cos\alpha$ এবং $n = 1$ হলে প্রদত্ত রাশি এর মান $= -\cos\alpha$

$\therefore \cos\{n\pi + \alpha\}$ এর মান $= (-1)^n \cos\alpha$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\sin 22 \frac{1}{2}^\circ$ এর মান কোনটি? [BRUR-D. 19-20]

- A. $\frac{1}{2} \sqrt{2} - \sqrt{2}$ B. $\frac{1}{2} \sqrt{2} + \sqrt{2}$ C. $\sqrt{2} - \sqrt{2}$ D. $\sqrt{2} + \sqrt{2}$

[S@Why] $\sin 22 \frac{1}{2}^\circ = \frac{1}{2} \times 2 \sin \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \times 2 \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2} - \sqrt{2}$

02. $\sin 54 = \frac{1}{4} (1 + \sqrt{5})$ হলে, $\cos 36$ এর মান- [BRUR-E. 19-20; SUST. 16-17]

- A. $\frac{1}{4} (1 + \sqrt{5})$ B. $\frac{1}{4} (1 - \sqrt{5})$ C. $\frac{1}{4} (\sqrt{5} - 1)$ D. $\frac{1}{4} (-1 - \sqrt{5})$

[S@Why] $\sin 54 = \sin(90 - 36) = \cos 36 = \frac{1}{4} (1 + \sqrt{5})$

03. যদি একটি ষড়ভুজের প্রতিটি বাহুর মান 2 হয়, তবে, ক্ষেত্রফল হবে- [BRUR-E. 19-20]

- A. $2\sqrt{6}$ B. $6\sqrt{2}$ C. $6\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$

[S@Why] একটি ষড়ভুজের প্রতিটি বাহুর মান s হলে

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{3\sqrt{3}}{2} s^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 2^2 [\because s = 2] = 6\sqrt{3}$$

04. যদি $\tan 2\theta \tan \theta = 1$, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ হয়, $\theta = ?$ [BRUR-E. 19-20]

- A. 0° B. 30° C. 45° D. 60°

[S@Why] $\tan 2\theta \tan \theta = 1$

$$\theta = 30^\circ \text{ হলে } \tan 2\theta \tan \theta = 1 \Rightarrow \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 1 \text{ L.H.S} = \text{R.H.S}$$

05. একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 1:2:3 হলে বাহুগুলোর অনুপাত হচ্ছে- [BRUR: 15-16; MBSTU: 14-15]

- A. 2:3:1 B. $\sqrt{3}:2:1$ C. 2: $\sqrt{3}:1$ D. 1: $\sqrt{3}:2$

[S@Why] কোণ গুলোর অনুপাত 1:2:3 $\Rightarrow A:B:C = 30^\circ:60^\circ:90^\circ$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{1} = \frac{b}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{c}{1} \Rightarrow a:b:c = 1:\sqrt{3}:2$$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এবং $\sin \theta = \frac{3}{5}$ হয়, তবে $\cos \theta$ এর মান কত? [JKKNIU. 19-20]

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{5}$

[S@Why] $\sin \theta = \frac{3}{5} \Rightarrow \sin^2 \theta = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \Rightarrow 1 - \cos^2 \theta = \frac{9}{25}$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{16}{25} \therefore \cos \theta = \pm \frac{4}{5}$$

$$\text{কিন্তু } \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{ শর্তে } \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

02. যদি $\tan \theta = \frac{a}{b}$ হয় তবে $\frac{a \sin \theta - b \cos \theta}{a \sin \theta + b \cos \theta}$ এর মান কত? [JKNU: 12-13]

- A. $\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$ B. $\frac{2a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$ C. $\frac{a+2+2b^2}{a^2 - b^2}$ D. $\frac{3a^2 - b^2}{2a^2 + b^2}$

[S@Why] $\tan \theta = \frac{a}{b}$ ধরি, $a = \sqrt{3}$ এবং $b = 1$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{1} \text{ এবং } \theta = 60^\circ \therefore \frac{\sqrt{3} \sin 60^\circ - \cos 60^\circ}{\sqrt{3} \sin 60^\circ + \cos 60^\circ} = \frac{1}{2}$$

$$\text{From Option A, } \frac{(\sqrt{3})^2 - (1)^2}{(\sqrt{3})^2 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\cos x - \sec x = \frac{3}{2}$ হলে, $\cos^4 x + \sin^4 x$ এর মান কত? [SUST-A. 19-20]

- A. 25 B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{8}{5}$ D. 1 E. 0

[S@Why] $\cos x - \sec x = \frac{3}{2}$

$$\Rightarrow \cos x - \frac{1}{\cos x} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{\cos^2 x - 1}{\cos x} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 x - 2 = 3\cos x \Rightarrow 2\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 x - 4\cos x + \cos x - 2 = 0 \Rightarrow (\cos x - 2)(2\cos x + 1) = 0$$

$$\cos x - 2 = 0 \text{ অথবা } 2\cos x + 1 = 0$$

$$\cos x = 2 \text{ যা অসম্ভব } \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$x = 120^\circ$$


$$\therefore \cos^4 x + \sin^4 x = \{\cos(120^\circ)\}^4 + \{\sin(120^\circ)\}^4$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \left\{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\right\}^2 = \frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

02. একটি সমবাহু ত্রিভুজের অপর বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিব্যাসার্ধ যথাক্রমে 8 ও 5 একক। পরিকেন্দ্রটি ত্রিভুজের অভ্যন্তরে হলে সমবাহুত্রয়ের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য কত একক? [SUST: 16-17]

- A. $4\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{3}$ E. $3\sqrt{5}$

[S@Why] পরিকেন্দ্র ত্রিভুজের অভ্যন্তরে, তাই ত্রিভুজটি সমকোণী



$$\text{এখন, } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin(180^\circ - 2A)} = 2R$$

$$\therefore \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin 2A} = 2R \Rightarrow \sin 2A = \frac{b}{2R}$$

$$\therefore A = \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{b}{2R} \therefore a = 2R \sin \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{b}{2R}\right) = 2\sqrt{5}$$


03. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের সাথে যে কোন দুটি কৌণিক বিন্দু সংযুক্ত করে নতুন ত্রিভুজ তৈরি করা হলো। নতুন ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে কত অংশ হবে? [SUST: 16-17]

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{1}{4}$

[S@Why] Δ ক্ষেত্র GBC

$$= \frac{1}{2} \times GD \times BC$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{AD}{3} \times BC = \frac{1}{3} \times \Delta \text{ ক্ষেত্র ABC}$$



04. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের পরিধির উপর তিনটি বিন্দু $P(5, 0)$, $Q(0, 5)$ এবং $R(-4, 3)$ হলে $\angle PRQ$ এর মান কত? [SUST: 15-16]

A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$ E. $\frac{\pi}{2}$

[SOWHY] $PQ = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50}$

$QR = \sqrt{(-4)^2 + (5-3)^2} = \sqrt{20}$ এবং $PR = \sqrt{(5+4)^2 + 3^2} = \sqrt{90}$

$\therefore \Delta PQR$ এ $\angle PQR = \cos^{-1} \sqrt{\frac{PR^2 + RQ^2 - PQ^2}{2 \times PR \times RQ}}$

$= \cos^{-1} \sqrt{\frac{90 + 20 - 50}{2 \times \sqrt{20} \times \sqrt{90}}} = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$

05. ABC ত্রিভুজে $\angle A = \frac{\pi}{5}$, $\angle B$ ও $\angle C$ কোণদ্বয়ের দ্বিভুজ দুটি O বিন্দুতে মিলিত হলে $\angle BOC$ এর মান কোনটি? [SUST: 15-16]

A. $\frac{2\pi}{5}$ B. $\frac{3\pi}{5}$ C. $\frac{4\pi}{5}$ D. $\frac{2\pi}{3}$ E. $\frac{3\pi}{4}$

[SOWHY] $\angle B + \angle C = \pi - \frac{\pi}{5} = \frac{4\pi}{5} \therefore \angle BOC = \frac{4\pi}{5} = \frac{2\pi}{5}$

06. ABC ত্রিভুজের $AB = 2$, $BC = 3$ এবং $CA = 4$ হলে A শীর্ষ বিন্দু হতে BC এর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত? [SUST: 14-15]

A. $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ B. $\frac{3\sqrt{15}}{8}$ C. $\frac{7\sqrt{15}}{8}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ E. $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

[SOWHY] পরিসীমা, $S = \frac{2+4+3}{2} = 4.5$

$\Delta = \sqrt{4.5(4.5-2)(4.5-3)(4.5-4)} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$

$\Delta = \frac{1}{2} AD \cdot BC \Rightarrow AD = \frac{2\Delta}{BC} = \frac{2 \times \frac{3\sqrt{15}}{4}}{4 \times 3} = \frac{\sqrt{15}}{2}$

07. 4 একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের পরিবৃত্তের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [SUST: 14-15]

A. 16 B. 16π C. 8π D. 4π E. 2π

[SOWHY] পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$

পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল $\pi r^2 = \pi(2\sqrt{2})^2 = 8\pi$

08. একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু 6 এবং 8 একক, এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [SUST: 14-15]

A. 48 B. 24 C. $12\sqrt{3}$ D. $48\sqrt{3}$ E. $80\sqrt{3}$

[SOWHY] ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin 60^\circ = 24 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$

09. ABC ত্রিভুজ $\angle B = 55^\circ$, $\angle C = 80^\circ$, $a = 20\sqrt{2}$ cm হলে ত্রিভুজটির পরিলিখিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত cm হবে? [SUST: 12-13, 08-09]

A. 10 B. $10\sqrt{2}$ C. 20 D. $20\sqrt{2}$

[SOWHY] $\angle B = 55^\circ$, $\angle C = 80^\circ \therefore \angle A = 45^\circ$

এখন, $\frac{a}{\sin A} = 2R \therefore R = \frac{a}{2\sin A} = 20$ cm

10. $\sin^2(3/100) + \cos^2(3/100) = ?$ [SUST: 11-12]

A. 0.06 B. 0.018 C. 1.00 D. 0 E. 0.3

[SOWHY] $\sin^2(3/100) + \cos^2(3/100) = 1$ ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$)

11. $A - B = \frac{\pi}{4}$ হলে $(1 + \tan A)(1 - \tan B) = ?$ [SUST: 10-11]

A. 2 B. -2 C. $\sqrt{2}$ D. $-\sqrt{2}$

[SOWHY] See TOPIC-04, Model Ex-02.

12. ABC ত্রিভুজে $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 11.25 cm^2 , $\angle ABC$ এর মান কত? [SUST: 09-10]

A. $\sin^{-1} \frac{4}{5}$ B. $\cos^{-1} \frac{3}{5}$ C. $\sin^{-1} \frac{3}{4}$ D. $\sin^{-1} \frac{2}{5}$

[SOWHY] $11.25 = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{3}{4} \Rightarrow \theta = \sin^{-1} \frac{3}{4}$

13. $\ln \sin \theta = 0$ হলে $\cos \theta = ?$ [SUST: 09-10]

A. 1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. $\sqrt{3}/2$

[SOWHY] $\ln \sin \theta = 0$ হলে $\sin \theta = e^0 = 1$;

$\therefore \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - 1} = 0$

14. ABC ত্রিভুজে $a = \sqrt{3}$ একক, $b = \sqrt{2}$ একক, $\angle A = 60^\circ$ এবং $\angle B = 45^\circ$ হলে $c = ?$ [SUST: 08-09]

A. 11 B. 8 C. $(\sqrt{3}+1)/\sqrt{2}$ D. 6

[SOWHY] $\angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B) = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ)$

$= 75^\circ$

$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$

$\Rightarrow c = \frac{a}{\sin A} \times \sin C = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} \times \sin(75^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = 2 \times \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$

15. n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\cos \{(2n+1)\pi + \pi/3\}$ এর মান- [SUST: 06-07]

A. $-1/2$ B. 0 C. 1 D. কোনটিই নয়

[SOWHY] $n = 0$ হলে প্রদত্ত রাশি এর মান

$= -\frac{1}{2}$ এবং $n = 1$ হলে প্রদত্ত রাশি এর মান $= -\frac{1}{2}$

$\therefore \cos \{(2n+1)\pi + \pi/3\}$ এর মান $= -\frac{1}{2}$

16. $(a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2} = ?$ [SUST: 06-07]

A. a^2 B. b^2 C. $a^2 + b^2$ D. কোনটিই নয়

[SOWHY] $(a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2}$

$= a^2 \left(\cos^2 \frac{C}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} \right) + b^2 \left(\cos^2 \frac{C}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} \right) - 2ab \left(\cos^2 \frac{C}{2} - \sin^2 \frac{C}{2} \right)$

$= a^2 + b^2 - 2ab \cos C = c^2$

17. যখন n একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা তখন $\cos n\pi$ এর মান- [SUST: 05-06, JNU: 11-12]

A. 1 B. -1 C. $(-1)^n$ D. 0

[SOWHY] $n = 0$ হলে প্রদত্ত রাশি এর মান = 1 এবং $n = 1$ হলে প্রদত্ত রাশি এর মান = -1 $\therefore \cos n\pi$ এর মান $= (-1)^n$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $0^\circ < \theta < 180^\circ$ হয়, তবে $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots + 2(1 + \cos \theta)}}} = ?$

[JUST-C: 19-20; RUET: 14-15]

A. $2\cos \frac{\theta}{2^{n-1}}$ B. $2\cos \frac{\theta}{2^{n+1}}$ C. $2\cos \frac{\theta}{2^n}$ D. $2\cos \frac{n\theta}{2}$

[SOWHY] $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots + 2(1 + \cos \theta)}}}$

এখানে $\sqrt{2(1 + \cos \theta)} = \sqrt{2.2\cos^2 \frac{\theta}{2}} = 2\cos \frac{\theta}{2}$

আবার, $\sqrt{2 + 2\cos \frac{\theta}{2}} = \sqrt{2(1 + \cos \frac{\theta}{2})} = \sqrt{2.2\cos^2 \frac{\theta}{4}} = 2\cos \frac{\theta}{4}$

$\therefore n$ সংখ্যক $\sqrt{\dots}$ হলে $= 2\cos \frac{\theta}{2^n}$

১১ মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১১

01. যদি $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ হয় তবে θ এর মান হবে-

[MBSTU-C. 19-20]

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

[S@Why] $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ বসালে $\sin\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = \sqrt{2}$ $\theta = \frac{\pi}{3}$ বসালে $\sin\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{3} = \sqrt{2}$

$\theta = \frac{\pi}{4}$ বসালে $\sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$ $\theta = \frac{\pi}{6}$ বসালে $\sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{2}$

02. $\tan(-945^\circ)$ এর মান-

[MBSTU-C. 19-20; IU. 15-16]

- A. 1 B. -1 C. 0 D. $\sqrt{3}$

[S@Why] $\tan(-945^\circ) = -\tan(945^\circ)$

$= -\tan(10 \times 90 + 45^\circ) = -\tan(45^\circ) = -1$

03. $A + B + C = \pi$ হলে $\tan A + \tan B + \tan C =$ কত? [MBSTU: 16-17]

- A. $\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3}$ D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

[S@Why] $A + B + C = \pi \therefore A = B = C = \frac{\pi}{3}$

04. $\sin\alpha - \sin\beta = 2$ এবং $\cos\alpha + \cos\beta = 3$ হলে $\cos(\alpha - \beta)$ এর মান-

[MBSTU: A. 14-15]

- A. $\frac{8}{13}$ B. $\frac{4}{13}$ C. $\frac{9}{13}$ D. $\frac{5}{13}$

[S@Why] $\sin\alpha - \sin\beta = 2$, $\cos\alpha + \cos\beta = 3$

$\frac{\sin\alpha - \sin\beta}{\cos\alpha + \cos\beta} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}}{2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \tan\frac{(\alpha-\beta)}{2} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{\alpha-\beta}{2} = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 33.69$

$\therefore \alpha - \beta = 67.38 \therefore \cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$

১২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১২

01. $7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4$ হলে, $\tan\theta$ এর মান হবে- [BSMRSTU-B. 19-20]

- A. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ C. $+\frac{1}{\sqrt{2}}$ D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

[S@Why] $7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4$

$\Rightarrow 7\sin^2\theta + 3(1 - \sin^2\theta) = 4 \Rightarrow 7\sin^2\theta + 3 - 3\sin^2\theta = 4$

$\Rightarrow 4\sin^2\theta = 1 \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin\theta = \pm\frac{1}{2}$

$\therefore 1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$

$\Rightarrow \cos\theta = \pm\sqrt{1 - \sin^2\theta} = \pm\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\pm\frac{1}{2}}{\pm\frac{\sqrt{3}}{2}} = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

02. ABC ত্রিভুজের $a : b : c = 3 : 7 : 5$ হলে, $\angle B = ?$ [BSMRSTU-B. 19-20]

- A. 60° B. 30° C. 90° D. 120°

[S@Why] See TOPIC-07.

[BSRMSTU: 18-19]

03. $\cot\theta + \operatorname{cosec}\theta = y$ হলে $\cos\theta$ এর মান কত?

- A. $\frac{y^2+1}{y^2-1}$ B. $\frac{y^2-1}{y^2+1}$ C. $\frac{y+1}{y^2-1}$ D. $\frac{y^2+1}{y-1}$

[S@Why]

$y = \cot\theta + \operatorname{cosec}\theta \Rightarrow y = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{1}{\sin\theta}$

$\frac{2\cos^2\frac{\theta}{2}}{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}} = \cot\frac{\theta}{2} \therefore \cos\frac{\theta}{2} = \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}$

$\Rightarrow \cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{y^2}{1+y^2} \Rightarrow 2\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{2y^2}{1+y^2} \Rightarrow 1 + \cos\theta = \frac{2y^2}{1+y^2}$

$\Rightarrow \cos\theta = \frac{2y^2 - 1 - y^2}{1 + y^2} = \frac{y^2 - 1}{y^2 + 1}$

04. ABC ত্রিভুজের $b^2\sin^2C + c^2\sin^2B$ এর মান কত? [BSRMSTU: 12-13]

- A. 4Δ B. Δ C. 2Δ D. None

[S@Why] $b^2\sin^2C + c^2\sin^2B$

হরি, $a = b = c = 2$ এবং $A = B = C = 60^\circ$

$= 2^2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2^2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3 + 3 = 6$

From A Option $= 4\sqrt{3} = 6.9$

১৩ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৩

01. ABC ত্রিভুজের $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm এবং ত্রিভুজের কোণ 12 cm? [PSTU. 19-20]


- A. $\sin^{-1}\frac{4}{5}$ B. $\cos^{-1}\frac{3}{5}$ C. $\sin^{-1}\frac{3}{4}$ D. $\sin^{-1}\frac{2}{5}$

[S@Why] $AB = 5$; $BC = 6$

$\Delta = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \sin(\angle ABC)$

$\Rightarrow 12 = \frac{30}{2} \sin(\angle ABC)$

$\Rightarrow \frac{4}{5} = \sin(\angle ABC) \Rightarrow \angle ABC = \sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$



02. $\sin\theta$ কে $\cot\theta$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর:

[PSTU: 13-14; KUET: 06-07; RU: 09-10]

- A. $\pm \frac{1}{\sqrt{1+\cot^2\theta}}$ B. $\pm \frac{1}{\sqrt{2+\cot^2\theta}}$
C. $\pm \frac{1}{1+\cot\theta}$ D. $\pm \frac{1}{1-\cot^2\theta}$

[S@Why] (A) Option, $\frac{1}{\sqrt{1+\cot^2\theta}} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2\theta}} \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta} = \sin\theta$

১৪ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৪

01. $\sin\theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta = 1 + \cos 2\theta + \cos\theta$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে θ এর মান কত?

- A. 0° B. 30° C. 60° D. 90°

[S@Why] $\sin\theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta = 1 + \cos 2\theta + \cos\theta$

$\Rightarrow 2\sin 2\theta \cos\theta + \sin 2\theta = 2\cos^2\theta + \cos\theta$

$\Rightarrow \sin 2\theta (2\cos\theta + 1) = \cos\theta (2\cos\theta + 1)$

$\Rightarrow 2\sin\theta \cos\theta = \cos\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2} \therefore \theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$

বদমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\cos 15^\circ$ এর মান-

[BSFMSTU. 19-20]

- A. $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ C. $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ D. $\sqrt{2+\sqrt{3}}$

SHOW WHY $\cos 15^\circ$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2\cos^2(15^\circ)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1+\cos 30^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$$

STEP 04 PRIME TEST

Time: 15

01. ABC ত্রিভুজের যদি $a=3, b=3\sqrt{3}$ এবং $A=30^\circ$ হয় তবে B ও C এর মান কোনটি?

- A. $45^\circ, 30^\circ$ B. $30^\circ, 40^\circ$ C. $20^\circ, 45^\circ$ D. $10^\circ, 70^\circ$

02. যদি $5\tan\theta=4$ হয়, তাহলে $\frac{5\sin\theta-3\cos\theta}{\sin\theta+2\cos\theta}=?$

- A. 6/15 B. 5/15 C. 5/14 D. 1/8

03. $\cos 2\theta = \frac{24}{25}$ হলে $\tan\theta$ এর মান কত?

- A. ± 7 B. $\pm \frac{5}{7}$ C. $\pm \frac{1}{7}$ D. $\pm \frac{7}{5}$

04. যদি $\tan\theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos\theta$ ধনাত্মক হয়, তবে $\frac{\sin\theta+\cos(-\theta)}{\sec(-\theta)+\tan\theta}$ এর মান হবে-

- A. $\frac{34}{39}$ B. $\frac{34}{40}$ C. $\frac{30}{39}$ D. $\frac{35}{50}$

05. $(a+b+c)(b+c-a)=3bc$ হলে A কোণের মান নির্ণয় কর।

- A. 30° B. 0° C. 60° D. 45°

06. মান নির্ণয় কর: $\sin 18^\circ + \cos 18^\circ$

- A. $\sin 36^\circ$ B. $-\sqrt{2}\cos 27^\circ$ C. $\frac{1}{\sqrt{2}}\sin 27^\circ$ D. $\sqrt{2}\cos 27^\circ$

07. $\operatorname{cosec}(x-y)$ এর মান কোনটি?

- A. $\cos x - \cos y$ B. $\sin x - \sin y$ C. $\tan x - \tan y$ D. $\frac{\sec x \sec y}{\tan x - \tan y}$

08. যদি $A+B+C=\pi$ ও $\cos A + \cos B = \sin C$ হয় তবে B কোণের মান হলো-

- A. $\pi/3$ B. $\pi/6$ C. $\pi/4$ D. $\pi/2$

09. $\frac{\cos 27^\circ - \cos 63^\circ}{\cos 27^\circ + \cos 63^\circ}=?$

- A. $\sin 18^\circ$ B. $\tan 18^\circ$ C. $\cos 18^\circ$ D. $\tan 15^\circ$

10. $\sin^2 18^\circ + \sin^2 36^\circ + \sin^2 54^\circ + \sin^2 72^\circ =$ কত?

- A. -2 B. ± 2 C. 0 D. 2

11. $\sin 50^\circ - \sin 70^\circ + \sin 10^\circ = ?$

- A. 1 B. $\sqrt{2}\sin 10^\circ$ C. 0 D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

12. $\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ এর মান কত?

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{7}$ D. $\frac{1}{8}$

13. $\tan(-945^\circ)$ এর মান কত?

- A. 1 B. ∞ C. 0 D. -1

14. $\sin 22\frac{1}{2}^\circ$ এর মান কোনটি?

- A. $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$ C. $\sqrt{2-\sqrt{2}}$ D. $\sqrt{2+\sqrt{2}}$

15. যদি $A+B+C=\pi$ হয় তবে $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2\cos A \cos B \cos C =$ কত হবে?

- A. 0 B. 1 C. 3/2 D. কোনটিই নয়

16. $\tan\theta(1+\sec 2\theta) = ?$

- A. $\tan\theta$ B. $\sin 2\theta$ C. $\sin\theta$ D. $\tan 2\theta$

17. $\cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$ হলে $\sin 4A = ?$

- A. $4\frac{\tan A(1-\tan^2 A)}{(1+\tan^2 A)^2}$ B. $4\frac{(1-\tan^2 A)}{(1+\tan^2 A)^2}$
C. $\frac{\tan A(1-\tan^2 A)}{(1+\tan^2 A)^2}$ D. $4\frac{\tan A(1-\tan^2 A)}{(1+\tan^2 A)^2}$

18. $\cos A + \sin A = \sqrt{2}\cos A$ হলে $\cos A - \sin A$ হবে-

- A. $2\sin A$ B. $\sqrt{2}\sin A$ C. $\sqrt{2}\sin A$ D. $\sqrt{3}\sin A$

19. $\cos 15^\circ$ এর মান-

- A. $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ C. $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ D. $\sqrt{2+\sqrt{3}}$

20. $\frac{2\tan 30^\circ}{1+\tan^2 30^\circ}$ এর মান হয়?

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ E. $\frac{1}{2}$

21. $\tan 54^\circ - \tan 36^\circ$ এর মান-

- A. $2\tan 18^\circ$ B. $2\cot 27^\circ$ C. $-2\tan 81^\circ$ D. $-2\tan 72^\circ$

22. $\cos 420^\circ \cos 390^\circ + \sin(-300^\circ) \sin(-330^\circ)$ এর মান-

- A. 0 B. -1 C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

23. $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$ হলে, $A+B = ?$

- A. π B. $\pi/2$ C. 2π D. $\pi/4$

24. ABC ত্রিভুজের $c=3.8$ সে.মি., $a=5.2$ সে.মি. এবং কোণ $A=35^\circ$ হলে B কোণের মান কত হবে?

- A. 120.2° B. 130.2° C. 125.2° D. 135.2°

25. 9, 40 ও 41 বাহু বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাস কত?

- A. 41 B. 21.5 C. 20.5 D. $\frac{9 \times 40 \times 41}{4}$

OMR SHEET

01. (A)(B)(C)(D)(E)	09. (A)(B)(C)(D)(E)	17. (A)(B)(C)(D)(E)
02. (A)(B)(C)(D)(E)	10. (A)(B)(C)(D)(E)	18. (A)(B)(C)(D)(E)
03. (A)(B)(C)(D)(E)	11. (A)(B)(C)(D)(E)	19. (A)(B)(C)(D)(E)
04. (A)(B)(C)(D)(E)	12. (A)(B)(C)(D)(E)	20. (A)(B)(C)(D)(E)
05. (A)(B)(C)(D)(E)	13. (A)(B)(C)(D)(E)	21. (A)(B)(C)(D)(E)
06. (A)(B)(C)(D)(E)	14. (A)(B)(C)(D)(E)	22. (A)(B)(C)(D)(E)
07. (A)(B)(C)(D)(E)	15. (A)(B)(C)(D)(E)	23. (A)(B)(C)(D)(E)
08. (A)(B)(C)(D)(E)	16. (A)(B)(C)(D)(E)	24. (A)(B)(C)(D)(E)
		25. (A)(B)(C)(D)(E)

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	x	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow B = \sin^{-1}\left(\frac{b \sin A}{a}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{3\sqrt{3} \times \sin 30^\circ}{5.2}\right) = 60^\circ$ $\therefore C = 180^\circ - (A+B) = 180^\circ - (30^\circ + 60^\circ) = 90^\circ$

অধ্যায়
০৯
প্রথম পত্র

অন্তরীকরণ

প্রথম অংশ: [LIMIT]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০২-০৩ টি প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	মহুদ
01	লব/ হর আকৃতির ফাংশন সংক্রান্ত	**
02	' $\sqrt{\quad}$ ' ফাংশন সংক্রান্ত	***
03	Logarithmic ও Exponentian ফাংশন সংক্রান্ত সমস্যা	**
04	ত্রিকোণমিতিক সমস্যা সংক্রান্ত	***
05	ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা [Continuity of Function]	**

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

TOPIC 01 লব/ হর আকৃতির ফাংশন সংক্রান্ত

SOME SPECIAL FORMULA

i	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$ [RUET: 05-06; য.বো-১৪]
ii	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin^{-1} x} = 1$ [RU: 07-08; 08-09; SUST: 08-09; HSTU: 02-03]
iii	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$
iv	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan^{-1} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x}{x} = 1$ [JU: 09-10; DU: 05-06; IU: 15-16; CU: 14-15]
v	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ [RUET: 08-09; JU: 09-10; DU: 12-13; JU: 17-18] [DU: 16-17; RU: 15-16; JUST: 16-17, 14-15]
vi	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ [BUTex: 12-13]
vii	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ [SUST: 11-12; CU: 11-12]
viii	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ [RU: 16-17; BAU: 14-15; JU: 11-12; IU: 17-18; 15-16; KU: 16-17]
ix	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a = \log_e a$ [RU: 02-03; 07-08; JKNIU: 12-13; CU: 06-7; IU: 04-05; KU: 12-13; HSTU: 07-08]
x	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 \pm x)^n - 1}{x} = \pm n$
xi	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$

□ L'hospital rule's ব্যবহার বিধি:

কোন লিমিটের লিমিটিং value বসানোর পরে যদি $\frac{0}{0}$ আকার ধারণ করে তাহলে, লবকে আলাদা করে ও হরকে আলাদা করে অন্তরীকরণ করতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত $\frac{0}{0}$ আকার remove হয় ততক্ষণ অন্তরীকরণ করতে হবে। $\frac{0}{0}$ আকার remove হয়ে গেলে লিমিটিং value বসাতে হবে।

Note: যদি কোন লিমিটে লিমিটিং value বসানোর পর direct মান চলে আসে, তাহলে ঐ মানই হবে উত্তর।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1}{x}$ এর মান কত?

[KU: 10-11; SUST: 05-06; RU: 07-08, 02-03; CU: 06-07]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1}{x} = \frac{a^0 \log_e a}{1}$ [Hospital's Law প্রয়োগে] $= a^0 \log_e a = \log_e a$

Type-02: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}$ আকারের সমস্যাবলী

□ ASPECT SPECIAL TECHNIQUE: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{m}{n} \times a^{m-n}$

[লবের পাওয়ার
হরের পাওয়ার] $\times$ প্রবক $\frac{\text{লবের পাওয়ার} - \text{হরের পাওয়ার}}$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$ এর মান কত হবে?

[KU: 11-12; RU: 02-03; IU: 14-15, 16-17, 17-18]

Solve $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2}} a^{\frac{5}{2} - \frac{1}{2}} = 5a^2$

Type-03: $\lim_{x \rightarrow \infty}$ সংক্রান্ত সমস্যাবলী

□ $\lim_{x \rightarrow \infty}$ (বীজগাণিতিক রাশি):

উত্তর হবে = সর্বোচ্চ পাওয়ার এর লবের সহগ
= সর্বোচ্চ পাওয়ার এর হরের সহগ

Written করার জন্য $x \rightarrow \infty$
এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ power
common নিতে হয়।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 5}{3x^2 + 5x - 6}$ এর মান-

[DU 17-18; CU: 15-16, 11-12]

Solve $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 5}{3x^2 + 5x - 6} = \frac{2}{3}$ [সর্বোচ্চ ঘাতযুক্ত x এর সহগের অনুপাত]

Type-04: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{b}{x}}}{\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{b}{x}}}$ সংক্রান্ত সমস্যাবলী

□ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{b}{x}}}{\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{b}{x}}} = e^{ab}$
লিমিটের ২য় পদের চলক ও তাদের পাওয়ারের চলক পরস্পর উল্টা হলে, উত্তর
= $e^{2য় পদের সহগ \times পাওয়ারের চলকের সহগ}$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ এর মান কত?

[RU 11-12, SUST: 11-12, CU 11-12, 04-05; PUST: 14-15]

Solve $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = (1+1)^1 = 2$

Type-05: $\lim_{x \rightarrow \text{others } (0, 1, 2, \frac{\pi}{2}, a, \dots)}$ সংক্রান্ত সমস্যাবলী

□ এ ধরনের ম্যাথগুলো আমরা L'hospital rule's ব্যবহার করে করলে উত্তর
সহজে ও তাড়াতাড়ি আসবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}$ সীমাটির মান নির্ণয় কর।

[JU 17-18; JNU 2016-17, JU 2009-10; CU 2009-10]

Solve $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{-1} = \frac{-1}{-1} = 1$

TOPIC 02 '√' ফাংশন সংক্রান্ত

Type-01: General '√' ফাংশন

এ ধরনের '√' ফাংশন এর সকল Math অনুবন্ধী দ্বারা গুণ ও ভাগের মাধ্যমে খুব সহজেই উত্তর পাওয়া যায়।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - 1} = ?$ [RU: 15-16, JNU: 12-13; CU: 15-16]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

MEx 02 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}}{x}$ এর মান- [DU: 04-05; JNU: 08-09, 05-06; JUST: 12-13]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

TOPIC 03 Logarithmic ও Exponential ফাংশন সংক্রান্ত সমস্যা

Note: ক্যালকুলাসের Math এ প্রশ্নের মধ্যে log থাকলেও তা ln হিসেবে বিবেচিত হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = ?$ [KU: 15-16; 16-17; RU: 15-16; IU: 11-12, 14-15, 15-16; JU: 13-14; 09-10; CU: 13-14]

Solve [Using L'Hopital Rule] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \frac{1}{1} = 1$

MEx 02 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ এর মান- [KU: 17-18, 15-16; RU: 16-17 SUST: 04-05]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ [Using L'Hopital Rule]
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x}$ [Again Using L'Hopital Rule]
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$ [Again Using L'Hopital Rule]
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \frac{e^0 + e^0}{\cos 0} = \frac{1+1}{1} = 2$

TOPIC 04 ত্রিকোণমিতিক সমস্যা সংক্রান্ত

আরোও কতিপয় Tricks যা Problems Solving এর গতি বাড়িয়ে দিবে:

SHORTCUT TRICKS & TIPS	3 in 1	MODEL EXAMPLE
1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$		$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{7x}$ এর মান- $\frac{4}{7}$ [CU: 15-16]
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$		$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{5x}$ এর মান- $\frac{3}{5}$

SHORTCUT TRICKS & TIPS

3 in 1

MODEL EXAMPLE

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} ax}{bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{5x}$ এর মান $\frac{3}{5}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$ [RU: 12-13]	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{\sin 2x} = \frac{5}{2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} ax}{bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}(2x)}{x} = 2$ [DU: 11-12]
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x} = \frac{3}{5}$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\sin^{-1} bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin^{-1} 3x} = \frac{2}{3}$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin 7x} = \frac{3}{7}$
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\tan^{-1} bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\tan^{-1} x} = 2$

Type-01: sin ও tan এর বিশেষ আকার

Technique-01: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{x}{\sin x} = \frac{\sin^{-1} x}{x} = \frac{x}{\sin^{-1} x} = \frac{\tan x}{x}$
 $= \frac{x}{\tan x} = \frac{\tan^{-1} x}{x} = \frac{x}{\tan^{-1} x} = 1$

লক্ষ্য কর বন্ধুরা sin বা tan এর ক্ষেত্রে কোণের মান যা তা নীচে বা উপরে থাকলেই Ans. 1 হচ্ছে। তাই সহজেই আমরা বলতে পারি, tan বা sin এর Math এ যা extra part আকারে থাকবে সেটিই হবে final উত্তর।

Ex: $\lim_{x \rightarrow 0} 2^x \sin \frac{b}{2^x}$ এখানে extra part (b) তাই Ans হবে b।

Technique-02: sin এর ক্ষেত্রে লব ও হরে একাধিক ফাংশন থাকলে তাদের সহগের সহঅবস্থানই হবে সঠিক উত্তর।

যেমন- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\sin 6x} = \frac{7}{6}$ **ASPECT TRICKS:** $\frac{7}{6} = 1$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 যখন $x \rightarrow 0$, লিমিট $\frac{\tan^{-1} 2x}{x}$ কত? [DU: 07-08; CLU: 07-08; JNU: 06-07]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} 2x}{2x} \times 2 = 2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} 2x}{2x} = 2 \times 1 = 2$

MEx 02 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin 3x - \sin 2x}$ এর মান- [KUET: 16-17; BUTex: 16-17]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin 3x - \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cos 5x - 3 \cos 3x}{3 \cos 3x - 2 \cos 2x}$
 [Using La Hospital] $= \frac{5-3}{3-2} = 2$

Type-02: cos এর বিশেষ আকার

cos magic method follow করে যার পূর্ব শর্ত হরের power ন্যূনতম 2 হতে হবে।

Magic method-01: $\frac{\cos bx - \cos ax}{cx^d} = \frac{a^2 - b^2}{c \times d}$

লবের সহগগুলোর বর্গ
হরের সহগ $\times$ power

Magic method-02: $\frac{\cos bx - \cos ax}{\cos dx - \cos ex} = \frac{a^2 - b^2}{c^2 - d^2}$

লবের সহগগুলোর বর্গ
হরের সহগগুলোর বর্গ

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$ এর মান কত?

[DU: 13-14; BRUR: 17-18; BSMRSTU: 15-16]

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 0}{1 \times x^2} = \frac{0^2 - 1^2}{1 \times 2}$

[using magic method] $= -\frac{1}{2}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos bx - \cos ax}{cx^d} = \frac{a^2 - b^2}{c \times d}$

Type-03: সাধারণ ত্রিকোণমিত্তির অসাধারণ আকার

Technique-01: sin ও tan এর ক্ষেত্রে কোণের মান বর্গ আকারে থাকলে উত্তর হবে 0।

Technique-02: cos এর ক্ষেত্রে হরের power 1 থাকলে উত্তর হবে 0।
[Magic method এর শর্ত উপেক্ষা করায়]

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x} = ?$ [DU: 09-10, JNU: 14-15, JU: 18-19, 09-10; RU: 18-19, 09-10; BRU: 19-20; BUTex: 13-14; MBSTU: 16-17; CoU: 17-18]


Solve লব এ কোণের মান বর্গ আকারে আছে তাই Ans. 0।

TOPIC 05 ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা [Continuity of Function]

লেখচিত্রের মাধ্যমে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতার ধারণা: (TOPIC of Continuity of a function with the help of graph):

যদি $f(x)$ ফাংশনের লেখচিত্র (a, b) ব্যবধির কোনো বিন্দুতে ফাঁকা বা Jump না থাকে, তবে উক্ত ব্যবধিতে ফাংশনটিকে অবিচ্ছিন্ন বা ছেদহীন বলা হয়।

অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের ক্ষেত্রে পেন্সিল না তুলে একটানে এর লেখচিত্র অংকন করা যায়।



অবিচ্ছিন্নতার গাণিতিক উপস্থাপন (Mathematical Representation of Continuity):

$x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনকে অবিচ্ছিন্ন বলা হয় যদি $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

$f(x) = f(a)$ অথবা $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a-h) = f(a)$ হয়।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ফাংশনটি $x = 0$ তে- [SUST 07-08; BSMRSTU 17-18; IU 15-16]

Solve $f(x) = \frac{|x|}{x}$ [ধরি, $x = 0 + h$]

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{-h} = -1$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \therefore$ ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদ।

STEP 03 নিম্নতম স্নাতক প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামালাল ভাষাসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\frac{2}{x^4+1} + \frac{3}{x^3+7} + \frac{5}{x^2+1} + \frac{6}{x^2-6} \right)$ এর মান কত?

[GST-A. 2022-2023]
A. 8 B. 10 C. 11 D. 16

Solve Why $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\frac{2}{x^4+1} + \frac{3}{x^3+7} + \frac{5}{x^2+1} + \frac{6}{x^2-6} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\left(\frac{x^4+1}{x^2}\right)} + \frac{3}{x + \frac{7}{x^2}} + \frac{5}{1 + \frac{1}{x^2}} + \frac{6}{1 - \frac{6}{x^2}} \right) = 0 + 0 + 5 + 6 = 11$

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} + e^{-5x} - 2}{x^2} =$ কত?

[GST-A. 21-22]

A. -2 B. 0 C. 25 D. 50
Solve Sol $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} + e^{-5x} - 2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5e^{5x} - 5e^{-5x}}{2x}$ [using L; H Rule]
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{25e^{5x} + 25e^{-5x}}{2}$ [again use L.H Rule]
 $= \frac{25 + 25}{2} = 25$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sec x)^x =$ কোনটি? [JnU. 13-14]
A. 0 B. 1 C. -1 D. অসংজ্ঞায়িত

Solve Why $\lim_{x \rightarrow 0} (\sec x)^x = (\sec 0)^0 = 1^0 = 1$

02. $\lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{x+4}{x^2+2x-8} \right)$ এর মান কত? [JnU: 11-12]

A. $-\frac{1}{6}$ B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{6}$
Solve Why $\lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{x+4}{x^2+2x-8} \right) = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x+4}{(x+4)(x-2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{-4-2} = -\frac{1}{6}$

03. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x+2}$ এর মান- [JNU 11-12]

A. 12 B. 21 C. 14 D. 15
Solve Why [Using L'Hopital Rule]

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2}{1} = 3 \cdot (-2)^2 = 12$

04. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 8}{x - 2}$ সীমানার মান কত? [JnU: 10-11]
 A. 6 B. -2 C. 1 D. $\frac{1}{2}$

[S@Why] [Using L'Hopital Rule]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 2}{1} = 2 \cdot 2 + 2 = 6$$

[BU] খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় **[BU]**

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ এর মান- [KU: 17-18, 15-16; RU: 16-17 SUST: 04-05]
 A. 0 B. 2 C. 4 D. ∞

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ [Using L'Hopital Rule]

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} \text{ [Again Using L'Hopital Rule]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\sin x} \text{ [Again Using L'Hopital Rule]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\cos x} = \frac{e^0 + e^0}{1} = \frac{1 + 1}{1} = 2$$

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = ?$ [KU: 15-16; 16-17; RU: 15-16; IU: 11-12, 14-15, 15-16; JU: 13-14; 09-10; CU: 13-14]
 A. ∞ B. 0 C. -1 D. কোনটিই নয়

[S@Why] [Using L'Hopital Rule]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \frac{1}{1} = 1 \text{ Or, Use Calculator}$$

03. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$ এর মান কত? [KU: 13-14; CU: 04-05; JnU: 11-12]
 A. 12 B. 21 C. 14 D. 15

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2}{1} = 3 \cdot (-2)^2 = 12$

04. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$ এর মান কত হবে? [KU: 11-12; RU: 02-03; IU: 14-15, 16-17, 17-18]
 A. $-5a^2$ B. $5a^2$ C. $\frac{a^2}{5}$ D. $\sqrt{5}a^2$

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \frac{\frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{5}{2} a^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \frac{\frac{5}{2} (x^{\frac{3}{2}} - a^{\frac{3}{2}})}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = 5a^2$

05. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1}{x}$ এর মান কত? [KU: 10-11; SUST: 05-06; RU: 07-08, 02-03; CU: 06-07]
 A. a B. 0 C. 2 D. $\log_e a$

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1}{x} = \frac{a^x \log_e a}{1}$ [Hospital's Law প্রয়োগে]
 $= a^0 \log_e a = \log_e a$

[BU] কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় **[BU]**

01. মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x$
 [CoU: 17-18; BUET: 08-09; BUTex: 14-15; IU: 16-17; চ.বো: 10]
 A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x$

ধরি, $x = \frac{\pi}{2} + h$, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ হলে $h \rightarrow 0$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} (-h) \tan \left(\frac{\pi}{2} + h \right) = \lim_{h \rightarrow 0} (-h) (-\cot h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\tan h} = 1$$

[BU] ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় **[BU]**

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x}$ এর মান- [IU: 17-18]
 A. 0 B. 1 C. -1 D. ∞

[S@Why] [Using L'Hopital Rule]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1-x} \cdot (-1)}{1} = -1$$

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x}$ এর মান- [IU: 17-18]
 A. 0 B. 1 C. -1 D. ∞

[S@Why] [Using L'Hopital Rule]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^{-x} - 0}{1} = \frac{-e^0}{1} = -1$$

03. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 3^{-x} - 2x \log_3 3}{x - \sin x}$ এর মান হলো- [IU: 15-16]
 A. $2(\log_2 3)^3$ B. $2(\log_2 3)^2$ C. $2(\log_e 3)^3$ D. $2(\log_3 e)^2$

[S@Why] **Shortcut:** La Hospital;

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 3^{-x} - 2x \ln 3}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x \ln 3 + 3^{-x} \ln 3 - 2 \ln 3}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x (\ln 3)^2 - 3^{-x} (\ln 3)^2}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x (\ln 3)^3 + 3^{-x} (\ln 3)^3}{\cos x} = \frac{(\ln 3)^3 + (\ln 3)^3}{1} = 2(\ln 3)^3$$

04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$ এর মান কোনটি? [IU: A, 13-14; RU: H, 12-13]
 A. $\log \left(\frac{b}{a} \right)$ B. $\log_e \left(\frac{a}{b} \right)$ C. $\log_e (b - a)$ D. $\log_e (a - b)$

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \frac{a^x \log_e a - b^x \log_e b}{1} \text{ (x=0 বসিয়ে)}$
 $= \log_e a - \log_e b = \log_e \left(\frac{a}{b} \right)$

05. $x = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-2y}}{\log(1+y)}$, $0 < y < 1$ হলে এই ফাংশনের সীমার মান- [IU: 14-15, SUST: 04-05, KU: 03-04]
 A. -1 B. 1 C. -2 D. 2

[S@Why] [Using L'Hopital Rule]

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-2y}}{\log(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2e^{-2y}}{\frac{1}{1+y}} = 2e^{-2y} (1+y) = 2$$

[BU] বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় **[BU]**

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x}$? [BRUR-E: 19-20]
 A. 0 B. 1 C. π D. কোনোটিই নয়

[S@Why] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = 1$

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} = ?$ [BRUR: 11-12]

A. $\frac{1}{2a}$ B. $\frac{1}{5a}$ C. $\frac{2}{7a}$ D. $\frac{3}{8a}$

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{2a}$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$ এর মান কত? [JKKNIU: 19-20]

A. 3 B. 5 C. 8 D. 4

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \times 4 = 1 \times 4 = 4$

PART B ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ হয়, তবে $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ এর মান কত? [SUST-B: 19-20]

A. 1 B. -1 C. 0 D. -2 E. 2

SO Why $f(x) = 1$ যখন $x = 0$ $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

02. যদি $0 < x < \frac{1}{a}$ হয় তাহলে $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{(bx+c)}{x}}$ এর মান কত? [SUST-17-18]

A. e^b B. e^c C. e^a D. e^{ac} E. e^{ab}

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{(bx+c)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\left(b + \frac{c}{x}\right)} = e^{ac}$

03. a এবং b এর মান যথাক্রমে কত হলে $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x - b \cos x + e^{-x}}{\sin x} = 2$ হয়। [SUST: 16-17]

A. 3, 3 B. 3, 4 C. 4, 3 D. -3, 4

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x - b \cos x + e^{-x}}{\sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right] - b \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right] + b \left[1 - x + \frac{x^2}{2!} \right]}{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a-b+1) + (a-1)x + x \text{ এর উচ্চতর ঘাত যুক্ত পদ}}{x \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right)}$$

তাহলে, $a-b+1=0 \Rightarrow b=a+1$; Option গুলোতে এরূপ অপশন (a, b) = (3, 4)

04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - 1}{m(\tan x + \sin x)}$ এর মান কত? [SUST: 15-16]

A. 0 B. m C. 1 D. $\frac{1}{2}$

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - 1}{m(\tan x + \sin x)}$ এর লব ও হরে লিমিট প্রয়োগ করলে

∞ আকারে আসে, ফলে L, Hospital's Rule প্রয়োগ করে পাই,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{me^{\tan x} \cdot \sec^2 x}{m(\sec^2 x + \cos x)} = \frac{m}{2m} = \frac{1}{2}$

05. $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1 - \sin^2 \alpha - \cos \alpha}{\alpha^2}$ এর মান কোনটি? [SUST: 11-12]

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 1

SO Why $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1 - \sin^2 \alpha - \cos \alpha}{\alpha^2}$ [Using L'Hopital Rule]

$= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \sin \alpha}{2\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha - \sin 2\alpha}{2\alpha}$

$= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\cos \alpha - 2 \cos 2\alpha}{2} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\cos 0 - 2 \cos 0}{2} = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$

06. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ফাংশনটি $x = 0$ তে- [SUST 07-08; BSMRSTU 17-18; IU 15-16]

A. অসীম B. অবিচ্ছেদ্য C. বিচ্ছেদ্য D. কোনটিই নয়

SO Why $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ধরি, $x = 0 + h$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{-h} = -1$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \therefore$ ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদ।

07. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{2x}$ এর মান- [SUST 06-07]

A. 2 B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. does not exist

SO Why [Using L'Hopital Rule]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = ?$ [MBSTU-A: 19-20]

A. 0 B. 1 C. 2 D. e

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

02. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+2}{x-5} = ?$ [MBSTU-A: 19-20]

A. $+\infty$ B. $-\infty$ C. 7 D. অস্তিত্ব নেই

SO Why $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+2}{x-5} = \frac{7}{0} = +\infty$

03. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = ?$ [MBSTU-A: 19-20]

A. অস্তিত্ব নেই B. 1 C. -1 D. ∞

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pm x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\pm 1)$ যেখানে limit এর অস্তিত্ব নেই।

04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ এর মান কোনটি? [MBSTU: C, 17-18]

A. 1 B. 0 C. -1 D. $\pi/180$

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\pi x}{180}}{\frac{\pi x}{180}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi x}{180}}{1} = \frac{\pi}{180}$

05. যদি $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + x \ln(1 + b^2)]^{\frac{1}{x}} = 2b \sin^2 \theta$, $b > 0$ এবং $\theta \in (-\pi, \pi)$ হয় তবে $\theta = ?$ [MBSTU: A, 15-16]

A. $\pm \frac{\pi}{4}$ B. $\pm \frac{\pi}{3}$ C. $\pm \frac{\pi}{6}$ D. $\pm \frac{\pi}{2}$ **Ans A**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+4+\dots+n}{n^2} = ?$ [BSMRSTU-A. 19-20]

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$
C. 1 D. অসীম

S B Why $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+4+\dots+n}{n^2} = ?$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+\frac{1}{n})}{2n} = \frac{1+\frac{1}{\infty}}{2} = \frac{1}{2}$$

02. मान निर्णय कर: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x}$ [BSRMSTU: 18-19]

- A. -1
C. 5
- B. 1
D. 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} \cos x}{\cos x} \quad (\text{H. Law প্রয়োগে})$$

$$= e^0 = 1$$

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{3}{2}} - a^{\frac{3}{2}}}{x^2 - a^2} =$ কত? [PUST: A₁/A₂ 16-17]

- A. $5a^4$ B. $4a^5$
C. $3a$ D. $5a^2$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{3}{2}} - a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} a^{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}} = 3a$$

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = ?$

- A. 0
B. ∞
C. 2
D. অনির্নিত

$$\text{SC Why } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}(-1)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} [e^x + e^{-x}] = 2$$

02. যখন $x \rightarrow 0$ লিমিট $\frac{x^x - 1}{x}$ কত?

[HSTU 07-08; KU 12-13; RU 07-08, 02-03; IU 04-05]

- A. 1
C. e
B. 0
D. $\log_e a$

SO Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} a^x \ln a = \lim_{x \rightarrow 0} a^x \log_e a = \log_e a$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2x}$ এর মান হবে- [PSTU: B,14-15]

- A. 2
C. 0
- B. $\frac{1}{2}$
D. 3

SC Why $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 7}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^0 - e^{-0}}{2} = 0$

২য় অংশ: অন্তরীকরণ, পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ ও অন্তরীকরণের প্রয়োগ

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০২-০৩ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	(Constant) ^{function} এই ধরনের Problem	**
02	$\{f(x)\}^{g(x)}$ এই আকারের Problem	***
03	অন্তরীকরণের সাধারণ সূত্রের প্রয়োগ	***
04	অব্যক্ত ফাংশন [Implicit Function]	**
05	পারামিতিক ফাংশন [Parametric Function]	**
06	পর্যায় ক্রমিক অন্তরীকরণ	*
07	চরম মান বা সন্ধি মান (গুরুমান ও লঘু মান)	**
08	স্পর্শক ও অভিলম্বের ঢাল ও সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	**

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

Required Formulas for Differentiation

$$01. \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

02. $\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$ [where c is a constant]

$$03. \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

04. $\frac{d}{dx}(c) = 0$ [where c is a constant]

05. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

06. $\frac{d}{dx}(\log_e x)$ or, $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$

$$07. \frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$$

08. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log_e a = a^x \ln a$

09. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ 10. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

11. $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ 12. $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$

13. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$ 14. $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$

$$15. \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad 16. \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$17. \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad 18. \frac{d}{dx} (\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

19. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ 20. $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$

□ If U and V both are functions of x , then

$$(i) \frac{d}{dx}(U \pm V) = \frac{dU}{dx} \pm \frac{dV}{dx}.$$

$$(ii) \frac{d}{dx}(UV) = U \frac{dV}{dx} + V \frac{dU}{dx}$$

$$(iii) \frac{d}{dx}(UVW) = VW \frac{dU}{dx} + UW \frac{dV}{dx} + UV \frac{dW}{dx}$$

$$(iv) \frac{d}{dx} \left(\frac{U}{V} \right) = \frac{V \frac{dU}{dx} - U \frac{dV}{dx}}{V^2}$$

TOPIC 01 (Constant)^{function} এই ধরনের Problem

Technique:

i. (Constant)^{function} এই ধরনের Problem Solve করার জন্য $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$ এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

ii. (Exponential)^{function} এই ধরনের Problem Solve করার জন্য $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

iii. (Function)^{Constant} এই ধরনের Problem Solve করার জন্য $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

Note: যেকোনো ধরনের অন্তরীকরণ করতে গেলে প্রথমে প্রশ্নের x এর জায়গায় যা থাকবে তাকে x ধরে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। তারপর যাকে x ধরা হলো তার অন্তরীকরণ করতে হবে। সবশেষে দুই অন্তরীকরণ গুণ করতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 যদি $y = e^{e^x}$ হয় তবে $\frac{dy}{dx} =$ কত? [CU 07-08; IU 05-06; JUST. 09-10; BU. 12-13; ব.বো. ২০১৬]

Solve $y = e^{e^x} \Rightarrow \ln y = e^x \ln e = e^x \therefore \frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx} e^x \Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = e^x \therefore \frac{dy}{dx} = e^{e^x} \cdot e^x$

TOPIC 02 $\{f(x)\}^{g(x)}$ এই আকারের Problem

Technique-1: $Y = \{f(x)\}^{g(x)}$ এই আকারের Problem Solve করতে হবে, $\frac{d}{dx} \{f(x)\}^{g(x)} = \{f(x)\}^{g(x)} \frac{d}{dx} \{g(x) \ln(f(x))\}$ সূত্রের সাহায্যে

Technique-2: $\{f(x)\}^{g(x)}$ এই আকারের Problem উভয় পক্ষে $\ln$ নিয়েও Solve করা যায়।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 যদি $x^y = e^{x-y}$ হয়, তাহলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [RU 11-12, IU 12-13, RU 10-11, RU 09-10; SUST. 06-07]

Solve $x^y = e^{x-y} \Rightarrow y \ln x = (x-y) \ln e$ [উভয় পাশে $\ln$ নিয়ে]
 $\Rightarrow y \ln x = x - y$ [$\ln e = 1$]
 $\Rightarrow y(\ln x + 1) = x \Rightarrow y = \frac{x}{\ln x + 1}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{(\ln x + 1) \cdot 1 - x \left(\frac{1}{x} \right)}{(\ln x + 1)^2} = \frac{\ln x + 1 - 1}{(\ln x + 1)^2} = \frac{\ln x}{(\ln x + 1)^2}$

MEEx 02 $\frac{d}{dx}(x^x)$ এর মান কত? [KU. 13-14; RUET. 08-09; BUTex. 05-06; ব.বো. ২০১১, ০৯; রা.বো. ২০১৬, ০৮, ০৬; কু.বো. ২০০৫; সি.বো. ২০১৬, ০৮]

Solve $\frac{d}{dx}(x^x) = x^x \frac{d}{dx}(x^x \ln x)$
 $= x^x \left\{ x^x \frac{1}{x} + x^x (1 + \ln x) \ln x \right\}$
 $= x^x \cdot x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x) \ln x \right]$

TOPIC 03 অন্তরীকরণের সাধারণ সূত্রের প্রয়োগ

Technique: সূত্রের সাহায্যে solve করতে হবে।

□ এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ত্রিকোণমিতির বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের সূত্রাবলী মুখস্থ রাখতে হবে।

$$(i) 2 \tan^{-1} x = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$$

$$= \operatorname{cosec}^{-1} \frac{1+x^2}{2x} = \sec^{-1} \frac{1+x^2}{1-x^2} = \cot^{-1} \frac{1-x^2}{2x}$$

$$(ii) \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = 2 \sin^{-1} x;$$

$$(iii) \cos^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = -2 \sin^{-1} x$$

$$(iv) \sin^{-1}(3x-4x^3) = 3 \sin^{-1} x;$$

$$(v) \cos^{-1}(4x^3-3x) = 3 \cos^{-1} x$$

$$(vi) \tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2} = 3 \tan^{-1} x$$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $y = \sin^{-1}[\sin(x+1)]$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

[DU: 97-98; SUST: 06-07; RU: 06-07; JnU. 05-06; NU. 06-07]

Solve $y = \sin^{-1}[\sin(x+1)] = x+1 \therefore \frac{dy}{dx} = 1$

MEEx 02 $y = \sec x^\circ$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান হবে-

[CU. 05-06; HSTU. 08-09; BAU. 06-07]

Solve $y = \sec x^\circ = \sec \frac{x\pi}{180}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \left(\sec \frac{x\pi}{180} \tan \frac{x\pi}{180} \right) \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{180} \sec x^\circ \tan x^\circ$

TOPIC 04 অব্যক্ত ফাংশন [Implicit Function]

□ Implicit function চেনার উপায় (সমীকরণ আকারে থাকবে এবং সমীকরণের একই পাশে একাধিক চলক বিদ্যমান থাকবে)।

Technique: $\frac{dy}{dx} = - \frac{x \text{ এর সাপেক্ষে Differentiate } (Y \rightarrow \text{constant})}{y \text{ এর সাপেক্ষে Differentiate } (X \rightarrow \text{constant})}$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 যদি $y = \sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x} + \dots$ হয় তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান- [RU 16-17, JNU 13-14, SU 06-07, 05-06, 03-04, 02-03; RU 03-04; IU 06-07]

Solve $y = \sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x} + \dots \infty \quad y = \sqrt{x+y} \Rightarrow y^2 = x+y$
 $\therefore 2y \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y-1}$

MEEx 02 যদি $x^2 + 3xy + 5y^2 = 1$ হয়, $\frac{dy}{dx}$ সমান-

[DU: 12-13, DU: 07-08; RU 13-14, JNU: 08-09]

Solve $\frac{d}{dx}(x^2 + 3xy + 5y^2) = \frac{d}{dx}(1)$
 $\Rightarrow 2x + 3x \frac{dy}{dx} + 3y \cdot 1 + 10y \frac{dy}{dx} = 0$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(2x+3y)}{(3x+10y)} = -\frac{2x+3y}{3x+10y}$

TOPIC 05 পরামিতিক ফাংশন [Parametric Function]

- Parametric Function চেনার উপায়: x ও y এর মান তৃতীয় অন্য একটি চলকের মাধ্যমে দেয়া থাকবে। এবং তৃতীয় চলকটিকে বলে পরামিতি।

Technique: $\frac{dy}{dx} = \frac{\text{পরামিতির সাপেক্ষে } y \text{ এর diff}}{\text{পরামিতির সাপেক্ষে } x \text{ এর diff}} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ [0 পরামিতি]

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

- MEx 01** $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [RU 17-18, 14-15; KU 14-15, JNU 10-11, JU 06-07, KU 09-10; SUST. 04-05; BSMRSTU. 2019-20]

Solve $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ এবং $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$
 $x = \sin^{-1} \left(\frac{2t}{1+t^2} \right) = 2 \tan^{-1} t$ $y = \tan^{-1} \left(\frac{2t}{1-t^2} \right) = 2 \tan^{-1} (t)$
 $\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{2}{1+t^2}$ (i) $\frac{dy}{dt} = \frac{2}{1-t^2}$ (ii)
 $\therefore (ii) + (i) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 1$

TOPIC 06 পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ

- $y = f(x)$ একটি ফাংশন হলে অন্তরীকরণের বিভিন্ন আকার:

$$y_1 = \frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{d}{dx} \{f(x)\}$$

- $y = f(x)$ এর 1ম অন্তরীকরণ, $y_1 = \frac{dy}{dx} = f'(x)$; 2য় অন্তরীকরণ, $y_2 = \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x)$; 3য় অন্তরীকরণ, $y_3 = \frac{d^3y}{dx^3} = f'''(x)$; n তম অন্তরীকরণ, $y_n = \frac{d^ny}{dx^n} = f^{(n)}(x)$

Technique:

$y = x^4$ $y_1 = 4x^3 = 4p_1 x^{4-1}$ $y_2 = 4.3x^2 = 4p_2 x^{4-2}$ $y_3 = 4.3.2x = 4p_3 x^{4-3}$ $y_4 = 4.3.2.1 = 4p_4 x^{4-4} = 4!$ $y_5 = 0$ [5 > 4]	$y = x^n$ হলে $y_n = n!$ $y_m = 0$ [m > n] $y_m = n! p_m x^{n-m}$ [m < n]
$y = \sin x$ $y_1 = \cos x$ $y_2 = -\sin x$ $y_3 = -\cos x$ $y_4 = \sin x = y$ অর্থাৎ প্রতি 4n তম অন্তরকের পর পুনরাবৃত্তি ঘটবে	$y = \cos x$ $y_1 = -\sin x$ $y_2 = -\cos x$ $y_3 = \sin x$ $y_4 = \cos x = y$ অর্থাৎ প্রতি 4n তম অন্তরকের পর পুনরাবৃত্তি ঘটবে
$y = \sin x$ হলে, $y_n = \sin \left(\frac{n\pi}{2} + x \right)$	$y = \cos x$ হলে, $y_n = \cos \left(\frac{n\pi}{2} + x \right)$

$y = (ax + b)^n$ $y_n = n! \times a^n$ $y_m = 0$ [m > n] $y_m = n! p_m (ax + b)^{n-m} \times a^m$ [m < n]	$y = \frac{1}{x}$ এর nতম অন্তরক = $\frac{(-1)^n \cdot n!}{x^{n+1}}$ $y = \frac{1}{x+a}$ এর nতম অন্তরক = $\frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+a)^{n+1}}$
--	--

$y = e^{mx}$ $y_1 = m \cdot e^{mx}$ $y_2 = m^2 \cdot e^{mx}$ $y_3 = m^3 \cdot e^{mx}$ $y_n = m^n \cdot e^{mx}$	$y = \sin(ax + b)$ এর nতম অন্তরক, $y_n = a^n \sin \left(\frac{n\pi}{2} + ax + b \right)$ $y = \cos(ax + b)$ এর nতম অন্তরক, $y_n = a^n \cos \left(\frac{n\pi}{2} + ax + b \right)$
$y = a^x$ $y_1 = a^x \ln a$ $y_2 = a^x (\ln a)^2$ $y_3 = a^x (\ln a)^3$ $y_n = a^x (\ln a)^n$	

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

- MEx 01** $y = x^2 \log x$ হলে $\frac{d^3y}{dx^3}$ এর মান কত? [RU. 18-19, 09-10; BSMRSTU. 14-15; BUTex. 16-17, 15-16, 14-15; KUET. 06-07, 05-06; JUST. 12-13; BRU. 12-13; CUET. 12-13, 08-09, 06-07, 05-06; CU. 07-08; KU. 14-15; BSMRSTU. 14-15]

Solve $y_1 = 2x \log x + x$, $y_2 = 2 \log x + 2 + 1 \therefore y_3 = \frac{2}{x}$

- MEx 02** একটি ট্রেন 1-সেকেন্ডে $3t + \frac{1}{8}t^2$ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, 5 মিনিট পর তার বেগ কত হবে? [RU. 15-16, BUET. 06-07; JU. 10-11, 09-10; HSTU. 16-17; BUET. 13-13; MBSTU. 19-20; ঢাবো. ২০১৪, ০৬; দি.বো. ২০১৩; রা.বো. ২০০৯; কৃ.বো. ২০১১, ০৫; চ.বো. ২০০৭; ব.বো. ২০০৭]

Solve $S = 3t + \frac{1}{8}t^2 \therefore v = 3 + \frac{1}{4}t = 3 + \frac{1}{4} \times 5 \times 60 = 78$

TOPIC 07 চরম মান বা সন্ধি মান (গুরুমান ও লঘু মান)

Technique:

Step-1: দেওয়া ফাংশনটিকে $y = f(x)$ ধরাতে হবে।

Step-2: $f'(x)$ এবং $f''(x)$ নির্ণয় করতে হবে।

Step-3: $f'(x) = 0$ ধরে x এর মান (ধরি x এর মানগুলি a, b, c ইত্যাদি) নির্ণয় করতে হবে।

Step-4: $x = a$ এর জন্য $f''(a)$ বের করতে হবে। যদি $f''(a) > 0$ হয় তবে $x = a$ এর জন্য $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান বা লঘুমান থাকবে এবং যদি $f''(a) < 0$ হয় তবে $x = a$ এর জন্য $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান বা গুরুমান থাকবে।

Step-5: অনুরূপভাবে $x = b, c$ ইত্যাদির জন্য চরম মান নির্ণয় করতে হবে।

Note: (i) $f'(x)$ ফাংশনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান থাকবে যদি $f'(x) = 0$ হয়।
 (ii) $f''(x) = 0$ হলে ফাংশনের কোন চরমমান থাকবে না। $f''(a) = 0$ হলে পরবর্তী পর্যায়ে অন্তরক সহগ নির্ণয় করে ফাংশনের চরম মান নির্ণয় করা যায়।
 (iii) কোনো বিন্দুতে ফাংশনের সর্বোচ্চ মান অপর একটি বিন্দুর সর্বনিম্ন মান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হতে পারে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

- MEx 01** x এর মান কত হলে $y = x(12 - 2x)^2$ ফাংশনটির গুরুমান থাকবে? [JU 14-15; RU. 13-14; BRU. 15-16]

Solve ধরি, $y = x(12 - 2x)^2 = 144x - 48x^2 + 4x^3 \therefore \frac{dy}{dx} = 144 - 96x + 12x^2$
 বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মানের জন্য,
 $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 144 - 96x + 12x^2 = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + 12 = 0 \therefore x = 6, 2$
 আবার, $\frac{d^2y}{dx^2} = 24x - 96; \therefore x = 6$ হলে,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 48 > 0 \therefore x = 6 \text{ হলে ফাংশনটির মান ক্ষুদ্রতর।}$$

$$\text{আবার, } x = 2 \text{ হলে, } \frac{d^2y}{dx^2} = -48 < 0 \therefore x = 2 \text{ হলে ফাংশনটির মান বৃহত্তম।}$$

TOPIC 08 স্পর্শক ও অভিলম্বের ঢাল ও সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

1.	$y = f(x)$ বক্ররেখার ঢাল $m = \frac{dy}{dx}$ = নতি = স্পর্শকের ঢাল
2.	$y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে অভিলম্বের ঢাল = $-\frac{1}{\text{স্পর্শকের ঢাল}}$
3.	$y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকটি x অক্ষের সমান্তরাল হলে $\frac{dy}{dx} = \tan 0^\circ = 0$

4.	$y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকটি y অক্ষের সমান্তরাল হলে $\frac{dy}{dx} = \tan 90^\circ = \infty$
5.	$y = f(x)$ এর উপরস্থ (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $(y - y_1) = \frac{dy}{dx}(x - x_1)$
6.	$y = f(x)$ এর উপরস্থ (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ $(x - x_1) + \frac{dx}{dy}(y - y_1) = 0$
7.	$\frac{dy}{dx} > 0$ স্পর্শক x অক্ষের সাথে সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে।
8.	$\frac{dy}{dx} < 0$ স্পর্শক x অক্ষের সাথে স্থূলকোণ উৎপন্ন করে।
9.	$y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকটি x অক্ষের দ্বিতীক দিকের সাথে 45° কোণ বা সমান সমান কোণ উৎপন্ন করলে $\frac{dy}{dx} = \tan 45^\circ = 1$
10.	মূল বিন্দুতে স্পর্শকের ক্ষেত্রে কোনো গ্রন্থকের মান চাইলে, গ্রন্থক = $\tan 0$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEQ 01 x কোন মানের জন্য $y = x + \frac{1}{x}$ বক্ররেখাটির ঢাল শূন্য হবে?

[RU 17-18, DU 16-17, DU 13-14, DU 98-99, JnU 10-11]

Solve দেওয়া আছে, $y = x + \frac{1}{x} \therefore \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

প্রশ্নমতে, $\frac{dy}{dx} = 0$ বা, $\frac{x^2 - 1}{x^2} = 0$ বা, $x^2 = 1$ বা, $x = \pm 1$

MEQ 02 $y = x + 1/x$ বক্ররেখায় যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শক রেখা x - অক্ষের সমান্তরাল, তাদের স্থানাঙ্ক হবে-

[CU. 05-06; BUET. 13-14; IU. 16-17; CoU. 18-19]

Solve $y = x + \frac{1}{x} \therefore \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

প্রশ্নমতে, $\frac{dy}{dx} = 0$ বা, $\frac{x^2 - 1}{x^2} = 0$ বা, $x^2 = 1 \therefore x = \pm 1$

এখন, $x = 1$ হলে, $y = 2$ এবং $x = -1$ হলে, $y = -2$
 $\therefore$ নির্ণয় বিন্দুগুলো, $(1, 2), (-1, -2)$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্ন ভিত্তিক সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. x এর কোন মানের জন্য $y = x \ln x$ এর লঘু মান নির্ণয় করা যাবে?

[GST-A. 2022-2023]

A. e B. $-e$ C. $\frac{1}{e}$ D. $-\frac{1}{e}$

SCWhy $f(x) = x \ln x$

$\therefore f'(x) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x = 1 + \ln x ; f''(x) = \frac{1}{x}$

সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের জন্য $f'(x) = 0 \therefore 1 + \ln x = 0$

$\Rightarrow \ln x = -1 \Rightarrow x = e^{-1} \therefore x = \frac{1}{e} ; x = \frac{1}{e}$ হলে $f''\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{\frac{1}{e}} = e > 0$

$\therefore x = \frac{1}{e}$ মূল ফাংশানে বসালে, সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায়।

02. $a > 1$ হলে $\frac{d}{dx} (\ln a^x) = ?$

[GST-A. 2022-2023]

A. $\frac{a^x}{\ln a}$ B. $\ln a$ C. a^x D. $x \ln a$

SCWhy $\frac{d}{dx} (\ln a^x) = \frac{1}{a^x} \cdot \frac{d}{dx} (a^x) = \frac{1}{a^x} \cdot a^x \cdot \ln a = \ln a$

03. $e^y = \tan^{-1} x$ হলে $\frac{dx}{dy} = ?$

[GST-A. 2022-2023]

A. $\sqrt{1+x^2} \tan^{-1} x$ B. $(1+x^2) \tan^{-1} x$

C. $\sqrt{1-x^2} \tan^{-1} x$ D. $(1-x^2) \tan^{-1} x$

SCWhy $e^y = \tan^{-1} x \Rightarrow y = \ln(\tan^{-1} x)$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\tan^{-1} x} \times \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = (1+x^2) \tan^{-1} x$

04. $y = \log_x a^5$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত?

[GST-A. 21-22]

A. $5x \ln a$ B. $\frac{5 \ln a}{x(\ln x)^2}$ C. $\frac{-\ln a^5}{x \ln x}$ D. $\frac{-5 \ln a}{x (\ln x)^2}$

SCSol $y = \log_x a^5 \Rightarrow y = 5 \log_x a$

$\Rightarrow y = 5 \log_x e \log_e a \Rightarrow 5 \frac{\ln a}{\log_e x} \Rightarrow y = 5 \frac{\ln a}{\ln x}$

$\Rightarrow y = 5 \ln a (\ln x)^{-1} \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{5 \ln a}{x (\ln x)^2}$

05. যদি $f(x) = x + \sin x$ হয়, তবে x এর কোন মানটির জন্য $f'(x) = 0$ হবে?

[GST-A. 21-22]

A. $\frac{\pi}{5}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π

SCSol $f(x) = x + \sin x ; f'(x) = 1 + \cos x$

$\therefore 0 = 1 + \cos x (\therefore f'(x) = 0) \Rightarrow \cos x = -1 \therefore x = \pi$

06. $\frac{d(\sin x)}{d \cos x} = ?$

[GST-A. 20-21]

A. $\cot x$ B. $-\cot x$ C. $\sec^2 x$ D. $\csc^2 x$

SCWhy $\frac{d}{d \cos x} (\sin x) = \frac{\frac{d}{dx} (\sin x)}{\frac{d}{dx} (\cos x)} = \frac{\cos x}{-\sin x} = -\cot x$

07. $f(x) = x + \frac{1}{x}, x > 0$ ফাংশনের চরম বিন্দু কোনটি?

[GST-A. 20-21]

A. $(1, -1)$ B. $\left(-1, \frac{-3}{2}\right)$ C. $(1, 2)$ D. $\left(2, \frac{5}{2}\right)$

SCWhy $f(x) = x + \frac{1}{x} ; f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$

চরম বিন্দুর জন্য $f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \therefore x = \pm 1$

$\therefore$ চরম বিন্দু $f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \therefore$ চরম বিন্দুদ্বয় $(1, 2)$

08. $y = (x-2)(x-3) - x + 7$ বক্ররেখাটির কোন বিন্দুতে ঢাল 4? [GST-A. 20-21]

A. $(2, 3)$ B. $(2, 7)$ C. $(3, 7)$ D. $(5, 8)$

SCWhy $y = (x-2)(x-3) - x + 7 ; \frac{dy}{dx} = 2x - 6$

প্রশ্নমতে, $2x - 6 = 4 \therefore x = 5 \therefore y = 8 \therefore$ বিন্দুটি $(5, 8)$

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

অগ্নীশিখা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = \tan^{-1} \frac{4x}{1-4x^2}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ সমান কত?

[JNU 16-17]

A. $\frac{4x}{1-4x^2}$ B. $\frac{-4x}{1-4x^2}$ C. $\frac{4}{1+4x^2}$ D. $\frac{1}{4x^2-1}$

SCWhy $y = \tan^{-1} \frac{4x}{1-4x^2} = \tan^{-1} \frac{2 \cdot 2x}{1-(2x)^2} = 2 \tan^{-1} (2x)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{1+(2x)^2} \cdot 2 = \frac{4}{1+4x^2}$

02. $\sqrt{e^{\sqrt{x}}}$ এর অন্তরক সহগ কত?

[JNU 15-16]

- A. $\frac{-\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ B. $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ C. $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{2\sqrt{x}}$ D. $\frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{e^{\sqrt{x}}}}$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(\sqrt{e^{\sqrt{x}}}) = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 $= \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{e^{\sqrt{x}}}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$

03. $x^2 - 4y^2 = 8$ বক্ররেখার দুইটি স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হলে, স্পর্শকদ্বয়ের সমীকরণ কত?

[JNU 14-15]

- A. $x = 2\sqrt{2}$, $y = 2\sqrt{2}$ B. $x \pm 2\sqrt{2} = 0$
 C. $x + 2\sqrt{2} = 0$, $y + 2\sqrt{2} = 0$ D. $y \pm 2\sqrt{2} = 0$

[S@Why] প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2 - 4y^2 = 8$; x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $2x - 8y \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x}{4y}$

স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হলে $\frac{dy}{dx} = \infty$; অর্থাৎ, $\frac{x}{4y} = \frac{1}{0} \Rightarrow y = 0$

এখন $y = 0$ প্রদত্ত সমীকরণে বসিয়ে পাই, $x^2 - 4 \cdot 0^2 = 8$

$\Rightarrow x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2\sqrt{2}$

04. $(y = x^2 + \frac{1}{x^2})$ হলে $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = ?$

[JnU: 10-11]

- A. 2 B. $\pm\sqrt{5}$ C. 1 D. 0

[S@Why] $y = x^2 + x^{-2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x - 2x^{-3} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 2 + 6x^{-4}$
 $\therefore x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = x^2(2 + 6x^{-4}) + x(2x - 2x^{-3}) - 4(x^2 + \frac{1}{x^2})$
 $= 2x^2 + 6x^{-2} + 2x^2 - 2x^{-2} - 4(x^2 + \frac{1}{x^2})$
 $= 4x^2 + 4x^{-2} - 4x^2 - 4x^{-2} = 0$

05. যদি $S = 6 + 4t - t^2$ হয়, তাহলে 2 সে. পর এর ত্বরণ-

[JNU 09-10]

- A. 4 m/s^2 B. -4 m/s^2 C. 2 m/s^2 D. -2 m/s^2

[S@Why] $\therefore v = \frac{dS}{dt} = 4 - 2t \therefore a = \frac{dv}{dt} = -2$; $\therefore 2$ সে. পর ত্বরণ $= -2 \text{ m/s}^2$

06. $ax + by + c = 0$ এবং $x = 0$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত?

[JnU: 09-10; CU: 03-04; RU: 09-10]

- A. 0 B. a C. -b D. $-\frac{a}{b}$

[S@Why] $ax + by + c = 0 \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{a}{b}$

07. $y = \frac{1-2x}{x^3+5}$ হলে $x = 1$ এর জন্য $\frac{dy}{dx}$ এর মান-

[JnU: 07-08]

- A. 0 B. $-\frac{1}{6}$ C. $-\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{4}$

[S@Why] $y = \frac{1-2x}{x^3+5} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(x^3+5)(-2) - (1-2x)3x^2}{(x^3+5)^2}$
 $= \frac{-2(1^3+5) - (1-2 \cdot 1)3(1)^2}{(1+5)^2} = \frac{-12+3}{36} = -\frac{9}{36} = -\frac{1}{4}$

08. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান-

[JnU: 07-08; NSTU: 05-06]

- A. $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ B. $\frac{-1}{\sqrt{x^2+1}}$ C. $\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ D. $\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$

[S@Why] $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{(\sqrt{x^2+1}) \frac{d}{dx}(x) - x \frac{d}{dx}(\sqrt{x^2+1})}{(\sqrt{x^2+1})^2}$

$= \frac{\sqrt{x^2+1} - \frac{x}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x}{(x^2+1)} = \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)^2}$
 $= \frac{1}{(x^2+1)^2} = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$

09. $xy + x^3y^3 - 5 = 0$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান-

[JNU 07-08; PUST: 13-14]

- A. $\frac{y}{x}$ B. $\frac{2x}{y}$ C. $\frac{2y}{x}$ D. $-\frac{y}{x}$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(xy + x^3y^3 - 5) = \frac{d}{dx}(0)$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + y + x^3y^2 \frac{dy}{dx} + y^3 3x^2 = 0 \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(3x^2y^3 + y)}{(3x^3y^2 + x)} = -\frac{y}{x}$

[JnU: 06-07]

10. $y = e^{mx}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$

- A. $\text{Log} m^x$ B. $\text{Log} e^x$ C. me^{mx} D. None

[S@Why] $y = e^{mx} \therefore \frac{dy}{dx} = m \cdot e^{mx}$

11. $x^3 + 3axy + y^3 = a^3$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত হবে? [JnU: 06-07; JU: 09-10; IU: 06-07]

- A. $\frac{x^2 - ay}{ax + y^2}$ B. $\frac{x^2 + ay}{ax + y^2}$ C. $-\frac{x^2 + ay}{ax + y^2}$ D. $\frac{x + ay}{ax + y}$

[S@Why] $x^3 + 3axy + y^3 = a^3$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 + 3ay}{3ax + 3y^2} = -\frac{3(x^2 + ay)}{3(ax + y^2)} = -\frac{x^2 + ay}{ax + y^2}$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1}(e^x)$ এর অন্তরজ কত?

[KU: 19-20]

- A. $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$ B. $\frac{e^x}{1-e^{2x}}$ C. $\frac{1+e^{2x}}{e^x}$ D. $\frac{1-e^{2x}}{e^x}$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(\tan^{-1}(e^x)) = \frac{e^x}{1+(e^x)^2} = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$

02. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ফাংশনটির গুরুমান লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হলে গুরুমানটি কত?

[KU: 19-20]

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

[S@Why] See TOPIC-10.

03. $y = \frac{1}{6}x^3 \log x$ হলে $\left(\frac{d^4y}{dx^4}\right)$ এর মান কত?

[KU 17-18]

- A. 1 B. $\frac{6}{x}$ C. $\frac{1}{x}$ D. $\log x$

[S@Why] $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{6}\{x^3 \cdot \frac{1}{x} + 3x^2 \cdot \ln(x)\} = \frac{1}{6}\{x^2 + 3x^2 \ln(x)\}$

$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{6}\{2x + 6x \cdot \ln(x) + 3x^2 \cdot \frac{1}{x}\}$
 $= \frac{1}{6}\{2x + 6x \cdot \ln(x) + 3x\} = \frac{1}{6}\{5x + 6x \cdot \ln(x)\}$
 $\Rightarrow \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{1}{6}\{5 + 6 \cdot \ln(x) + 6x \cdot \frac{1}{x}\} = \frac{1}{6}\{11 + 6 \cdot \ln(x)\} \Rightarrow \frac{d^4y}{dx^4} = \frac{1}{x}$

04. k -এর মান কত হলে $y = kx(1+x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে তার স্পর্শক x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করবে?

[KU 17-18, RU 14-15, IU 14-15, 13-14; JUST. 18-19]

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ D. $2\sqrt{3}$

[S@Why] $y = kx + kx^2 \therefore \frac{dy}{dx} = k + 2kx$

এখন, মূলবিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = k + 2k \cdot 0 = k$

$\therefore$ মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করলে,

$\frac{dy}{dx} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \therefore k = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

05. x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$ এর অন্তরক কত? [KU 16-17]

- A. $\frac{3}{1+x^2}$ B. $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ C. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ D. $\frac{-x}{\sqrt{1+x^2}}$

[S@Why] $\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right) = \frac{d}{dx} (3 \tan^{-1} x) = 3 \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{3}{1+x^2}$

06. $\frac{d}{dx} \left\{ \frac{x^2}{x^2-4} \right\}$ এর মান কত? [KU 16-17]

- A. $\frac{8x}{(x^2-4)^2}$ B. $-\frac{8x}{(x^2-4)^2}$ C. $\frac{4x}{(x^2-8)^2}$ D. $\frac{4x}{(x^2+8)^2}$

[S@Why] Use: $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right)$

07. $y = \ln [x - \sqrt{x^2-1}]$ হলে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর- [KU 14-15, JU 13-14; ক্র.বো. ২০১০, ০৩; চ.বো. ২০০৫; মাদ্রাসা বোর্ড: ২০১৩]

- A. $\frac{1}{x^2-1}$ B. $-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ C. $-\frac{1}{x^2-1}$ D. $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

[S@Why] $y = \ln [x - \sqrt{x^2-1}]$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x - \sqrt{x^2-1}} \cdot \frac{d}{dx} (x - \sqrt{x^2-1})$

$= \frac{1}{x - \sqrt{x^2-1}} \left(1 - \frac{1}{2} (x^2-1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x \right)$

$= \frac{1}{x - \sqrt{x^2-1}} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right) = \frac{1}{x - \sqrt{x^2-1}} \left(\frac{\sqrt{x^2-1} - x}{\sqrt{x^2-1}} \right)$

$= \frac{1}{x - \sqrt{x^2-1}} \left\{ \frac{-(x - \sqrt{x^2-1})}{\sqrt{x^2-1}} \right\} = \frac{-1}{\sqrt{x^2-1}}$

08. $\frac{d}{dx} (x^x)$ এর মান কত? [KU. 13-14; RUET. 08-09; BUTex. 05-06; য.বো. ২০১১, ০৯; রা.বো. ২০১৬, ০৮, ০৬; ক্র.বো. ২০০৫; সি.বো. ২০১৬, ০৮]

- A. $x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x) \ln x \right]$ B. $x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x) \ln x \right]$
C. $x^x x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x) \ln x \right]$ D. $x^x x^{x-1} \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x) \ln x \right]$

[S@Why] $\frac{d}{dx} (x^x) = x^x \cdot \frac{d}{dx} (x \ln x)$

$= x^x \left\{ x^x \cdot \frac{1}{x} + x^x (1 + \ln x) \ln x \right\} = x^x \cdot x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x) \ln x \right]$

09. একটি গতিশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = 4t + 0.5t^2 - t^3$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যেখানে t (সে.) বস্তুটি কত সে. পর থেমে যাবে? [KU:13-14]

- A. 1.75 B. 1.25 C. 0.75 D. 1.33

[S@Why] $s = 4t + 0.5t^2 - t^3$ বা, $v = 4 + 2 \times 0.5t - 3t^2$

বা, $v = 4 + t - 3t^2$ বা, $3t^2 - t - 4 = 0$ বা, $t = \frac{4}{3} = 1.33$

10. যদি একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমহারে বাড়ে, তবে তার পরিসীমা- [KU: 13-14]

- A. ব্যাসার্ধের ব্যস্তানুপাতে বাড়ে B. ব্যাসের ব্যস্তানুপাতে বাড়ে
C. ব্যাসের সমানুপাতে বাড়ে D. ব্যাসার্ধের সমানুপাতে বাড়ে

[S@Why] ধরি ব্যাসার্ধ = r , ক্ষেত্রফল $A = \pi r^2$

পরিসীমা $p = 2\pi r$; $\frac{dA}{dt} = k$

$\therefore \frac{dA}{dt} = 2\pi r \cdot \frac{dr}{dt}$; $\frac{dp}{dt} = 2\pi \frac{dr}{dt} = 2\pi \frac{k}{2\pi r} = \frac{k}{r} \therefore \frac{dp}{dt} \propto \frac{1}{r}$

11. $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} e^x) = ?$ [KU: 11-12; DU: 00-01; RU: 06-07]

- A. e^x B. $\frac{e^x}{1-e^x}$ C. $\frac{e^x}{1+e^x}$ D. $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$

[S@Why] $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} e^x) = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$

12. যদি কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমহারে বৃদ্ধি পায় তবে তার ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধির হার ব্যাসার্ধের [KU: 11-12]

- A. ব্যস্তানুপাতিক B. সমানুপাতিক
C. ক্রমানুপাতিক D. কোনটিই নয়

[Ans B]

13. $\frac{d}{dx} (x \tan^{-1} x)$ এর মান হলো- [KU 09-10; CU 13-14]

- A. $\frac{x}{1+x^2} \tan^{-1} x$ B. $\frac{1}{1+x^2} + \tan^{-1} x$
C. $\frac{x}{1+x^2} + \tan^{-1} x$ D. $\frac{x}{1+x^2} \tan x$

[S@Why] $\frac{d}{dx} (x \tan^{-1} x) = x \cdot \frac{1}{1+x^2} + \tan^{-1} x = \frac{x}{1+x^2} + \tan^{-1} x$

14. $x = 3t^3 + 4t^2 + 3t$ দ্বারা একটি বস্তুর সরণ মিটারে প্রকাশিত হয়। 4 সেকেন্ড পর বস্তুটির ত্বরণ কত? [KU:07-08; JnU. 09-10]

- A. 20m/s^2 B. 40m/s^2 C. 60m/s^2 D. 80m/s^2

[S@Why] $x = 3t^3 + 4t^2 + 3t$ বা, $v = 9t^2 + 8t + 3$
বা, $a = (18t + 8)$ বা, $a = 18 \times 4 + 8$; $(t=4) = 80\text{m/s}^2$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\dot{x}$ প্রেক্ষিতে $y = \tan^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ এর অন্তরজ কত? [CoU. 19-20]

- A. $\frac{1}{1+x^2}$ B. $\frac{1}{1-x^2}$ C. $\frac{-1}{1+x^2}$ D. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

[S@Why] $y = \tan^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ বা, $y = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(x)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{1+x^2}$

02. $xy + x^2y^2 = 1$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [CoU. 19-20]

- A. $\frac{-x}{y}$ B. $\frac{-y}{x}$ C. $\frac{\dot{y}}{x}$ D. $\frac{x}{y}$

[S@Why] $xy + x^2y^2 = 1$

$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{y + 2y^2x}{x + 2x^2y} = -\frac{y(1 + 2xy)}{x(1 + 2xy)} = -\frac{y}{x}$

03. যদি $y = (x^x)^x$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx} = ?$

[CoU: 18-19]

- A. $x(1 + 2 \log x)$ B. $x^x \cdot 2 \log x$
C. $(x^x)^x \cdot (1 + \log x)$ D. $(x^x)^x \cdot x(1 + 2 \log x)$

[S@Why] $y = (x^x)^x \Rightarrow y = x^{x^2}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = (x^x)^x \cdot \frac{dx}{dy} (x^2 \log x) = (x^x)^x \left\{ \frac{x^2}{x} + 2x \log x \right\}$
 $= (x^x)^x (x + 2x \log x) = (x^x)^x \cdot x(1 + 2 \log x)$

04. $x = \alpha$ বিন্দুতে $f(x)$ ক্রমবর্ধমান হবে যদি?

[CoU- 18-19]

- A. $f(\alpha) = 0$ B. $f'(\alpha) > 0$ C. $f'(\alpha) < 0$ D. $f'(\alpha) \neq 0$

[S@Why] $x = \alpha$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান হবে যদি $f'(\alpha) > 0$

05. $y = \frac{3x^2}{4x-1}$ হলে, কোন বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = 0$ হবে?

[CoU- 18-19]

- A. $\left\{ (0,0), \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right) \right\}$ B. $\{(0,0), (0,1)\}$ C. $(1,1)$ D. $(0,0)$

[S@Why] $y = \frac{3x^2}{4x-1}$; $\frac{dy}{dx} = \frac{(4x-1)6x - 3x^2(4x-1) \cdot 4}{(4x-1)^2}$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 0$ হলে, $\frac{(4x-1)6x - 3x^2(4x-1) \cdot 4}{(4x-1)^2} = 0$
 $\Rightarrow \frac{(4x-1)(6x - 12x^2)}{(4x-1)^2} = 0 \Rightarrow 6x - 12x^2 = 0 \Rightarrow 12x^2 = 6x = 0$

$\therefore x = \frac{1}{2}, 0 \therefore y = 0, \frac{3}{4}$ [x এর মান বসিয়ে]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $e^{xy+1} = 5$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান-

[IU- 18-19]

- A. $\frac{\ln 5}{xy}$ B. $\frac{\ln 5}{-x^2}$ C. $-\frac{y}{x}$ D. $-\frac{\ln 5}{y}$

[S@Why] $e^{xy+1} = 5 \Rightarrow \ln e^{xy+1} = \ln 5 \Rightarrow (xy+1) \ln e = \ln 5$
 $\Rightarrow xy+1 = \ln 5 \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

02. $y = \frac{1}{x}$ হলে, y_n এর মান কত? [IU: 17-18, 10-11, 04-05; CU: 08-09, 07-08; MBSTU: 13-14; JUST: 14-15, 16-17; HSTU: 17-18]

- A. $\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$ B. $\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}$ C. $\frac{x^{n+1}}{(-1)^n n!}$ D. $\frac{(-1)^n}{x^n}$

[S@Why] $y = x^{-1} \Rightarrow y_1 = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$
 $\Rightarrow y_2 = -1, -2x^{-3} = -(1)2!x^{-2-1} \therefore y_n = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

03. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ফাংশনটি সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন হবে-

[IU 17-18; RU 17-18, BUTex. 16-17, 15-16; BUET. 11-12; MBSTU. 19-20]

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

[S@Why] ধরি, $y = x + \frac{1}{x} \therefore \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{x^2}$

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মানের জন্য, $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = -1, 1$

আবার, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2}{x^3} \therefore x = 1$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 > 0$;

$\therefore x = 1$ হলে ফাংশনটির মান লঘিষ্ঠ।

আবার, $x = -1$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} = -2 < 0 \therefore x = -1$ হলে ফাংশনটির মান গরিষ্ঠ।

$\therefore$ ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান $= -1 - 1 = -2$

04. একটি বিন্দুতে $y = f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান থাকলে-

[IU 17-18]

- A. $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ B. $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ C. $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ D. $\frac{d^2y}{dx^2} = \infty$

[S@Why] $y = f(x)$; এর সর্বোচ্চ মান থাকবে $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

05. $f(x) = \ln\left(\frac{x}{2}\right)$ বক্ররেখার $x = 3$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? [IU: 17-18, A]

- A. 3 B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$

[S@Why] $f(x) = \ln\left(\frac{x}{2}\right)$; $f'(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2x}$

ঢাল $f'(3) = \frac{1}{6} = m$ ($x = 3$ হলে)

06. $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত? [IU 17-18, RU 09-10]

- A. 1 B. 0.5 C. -0.5 D. -1

[S@Why] See TOPIC-03.

07. যদি $x = at^2$, $y = 2at$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত?

[IU 16-17, IU 12-13, CU 11-12]

- A. $\frac{1}{2t}$ B. $-\frac{1}{t}$ C. $\frac{1}{t}$ D. $\frac{2}{t}$ E. কোনটিই নয়

[S@Why] $x = at^2$ এবং $y = 2at$
 $\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2at \dots\dots\dots (i)$ $\Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2a \dots\dots\dots (ii)$

$\therefore (ii) \div (i) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2a}{2at} = \frac{1}{t}$

08. x এর সাপেক্ষে $\frac{1+\sin x}{1-\sin x}$ এর অন্তরজ-

[IU 16-17]

- A. $\frac{\sin x}{(1+\cos x)^2}$ B. $\frac{\cos x}{(1+\sin x)^2}$ C. $\frac{2\cos x}{(1+\sin x)^2}$ D. $\frac{2\cos x}{(1-\sin x)^2}$

[S@Why] $\frac{d}{dx} \left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right) = \frac{(1-\sin x) \cos x - (1+\sin x)(-\cos x)}{(1-\sin x)^2}$
 $= \frac{\cos x (1-\sin x + 1 + \sin x)}{(1-\sin x)^2} = \frac{2\cos x}{(1-\sin x)^2}$

09. $y = \frac{\ln x}{x}$ হলে $\frac{d^2y}{dx^2} = ?$

[IU 16-17, IU 14-15]

- A. $2x \frac{2\ln x - 3}{x^3}$ B. $\frac{\ln(x-3)}{2x}$ C. $\frac{2\ln x - 3}{x^3}$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{x} \right) = \ln x \cdot \left(\frac{-1}{x^2} \right) + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} (1 - \ln x)$

$\therefore \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left\{ \frac{1}{x^2} (1 - \ln x) \right\} = \frac{1}{x^2} \cdot -\frac{1}{x} + (1 - \ln x) \cdot \frac{-2}{x^3} = \frac{2\ln x - 3}{x^3}$

10. $x^2 + y^2 = 20$ বৃত্তের $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ-

[IU 16-17]

- A. $x + 2y = 10$ B. $x - 2y = 10$
C. $2x - y = 10$ D. $2x + y = 5$

[S@Why] দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 = 20$ এখন, $x = 2$ হলে, $y = 4$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \therefore (2,4)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}$; $\therefore$ স্পর্শকের ঢাল $= -\frac{1}{2}$

$\therefore (2,4)$ বিন্দুগামী ও $-\frac{1}{2}$ ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণ,

$y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow 2y - 8 = -x + 2 \Rightarrow x + 2y = 10$

11. $x = \sqrt{y^3}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ মান কত?

[IU: 15-16]

- A. $\frac{2}{3\sqrt{y}}$ B. $\frac{2}{2\sqrt{y}}$ C. $\frac{3}{2\sqrt{y}}$ D. $\frac{24}{3\sqrt{y}}$

[S@Why] $x = \sqrt{y^3} = y^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{y} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{2}{3\sqrt{y}}$

12. x -এর সাপেক্ষে অন্তরজ কর: $(x+1)^2(x-1)$

[IU 15-16]

- A. $x^2 - 2x$ B. $3x^2 + 2x - 1$
C. $2x^2 + 3x - 1$ D. $x^2 - 2x + 1$

[S@Why] $y = (x+1)^2(x-1)$

$\frac{dy}{dx} = (x+1)^2 \cdot 1 + (x-1)2(x+1)$

$= x^2 + 2x + 1 + 2x^2 - 2 = 3x^2 + 2x - 1$

13. t সময়ে কোন কণার অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = t^3 - 12t^2 + 6t + 8$ যখন কণাটির ত্বরণ শূন্য তখন এর বেগ কত?

[IU:E-15-16; RU:18-19]

- A. -48 B. -42 C. 42 D. 48

[S@Why] $S = t^3 - 12t^2 + 6t + 8$ বা, $v = 3t^2 - 24t + 6$

বা, $a = 6t - 24$; $a = 0 \therefore 0 = 6t - 24$; $t = 4$

$\therefore v = 3 \times (4)^2 - 24 \times 4 + 6 = 48 - 96 + 6 = -42$

14. $x = 2\sin t$, $y = \cos 2t$, $\frac{dy}{dx} = ?$

[IU: E, 14-15]

- A. $-\tan t$ B. $\tan t$
C. $-2\sin t$ D. $-\cot t$

[S@Why] $x = 2\sin t$, $y = \cos 2t$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-2\sin 2t}{2\cos t} = -\frac{2\sin t \cos t}{\cos t} = -2\sin t$

15. $y = \log_a x$ হলে $\frac{dy}{dx}$ হবে-

[IU 14-15, IU 12-13, JU 05-06; CU 06-07, 05-06]

- A. $\frac{1}{x}$ B. $\frac{1}{x \log_e a}$ C. $\frac{\log_e a}{x}$
D. a^x E. কোনটিই নয়

[S@Why] $y = \log_a x \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \log_e a}$

16. $7x^3 + 3\ln(x)$ এর অন্তরক-

[IU 14-15]

- A. $7\{3x^2 + \ln(x^{-1})\}$ B. $3(7x^2 + x^{-1})$
C. $21(2x^2 + x^{-0})$ D. $3(x^2 - 2x^{-2})$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(7x^3 + 3\ln x) = 7 \cdot 3x^2 + 3 \cdot \frac{1}{x} = 3(7x^2 + x^{-1})$

17. $(x^2 + 1)\tan^{-1}x - x$ এর অন্তরক-

[IU 14-15]

- A. 1 B. $2x\tan^{-1}x$
C. $(x-x^2)^{-1}$ D. $-e^x/(1+x^2)$

[S@Why] $\frac{d}{dx} \{(x^2 + 1)\tan^{-1}x - x\}$

$= (x^2 + 1) \cdot \frac{1}{1+x^2} + \tan^{-1}x \cdot 2x - 1 = 1 + 2x\tan^{-1}x - 1 = 2x\tan^{-1}x$

18. $x^2\ln(x)$ এর অন্তরক-

[IU 14-15]

- A. $x^2e^1 - 3x^2e^1$ B. $x^2\ln(x)$
C. $x - 2x\ln(x)$ D. $x^2\ln(x) + x^{-1}$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(x^2\ln x) = x^2 \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot 2x = x + 2x\ln x$

19. $ax^3 - bx^{n+1} = ?$

[IU: E, 14-15]

- A. $anx^{n-1} - b(n+1)x^n$ B. $anxn^{-2} - bnxxn^{-1}$
C. $(ax^3 - bn^{n+1})/n$ D. $(anx^3 - bn^{n+1})/n$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(ax^3 - bx^{n+1}) = 3ax^2 - b(n+1)x^n$

20. x এর সাপেক্ষে $e^x \cos x$ এর অন্তরীকরণ-

[IU: 13-14]

- A. $e^x(\sin x + \cos x)$ B. $e^x(\sin x - \cos x)$
C. $e^x(\cos x - \sin x)$ D. $e^x(\cos x + \sin x)$

[S@Why] $y = e^x \cos x \therefore \frac{dy}{dx} = e^x(\cos x - \sin x)$

21. x এর প্রেক্ষিতে $\sqrt{x^2 + b^2}$ এর অন্তরক সহগ-

[IU: E, 13-14]

- A. $\frac{2x}{\sqrt{x^2 + b^2}}$ B. $\frac{x}{2\sqrt{x^2 + b^2}}$
C. $\frac{2x^2}{\sqrt{x^2 + b^2}}$ D. $\frac{x}{\sqrt{x^2 + b^2}}$

[S@Why] x এর প্রেক্ষিতে $\sqrt{x^2 + b^2}$ এর অন্তরক সহগ।

$= \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + b^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + b^2}}$

22. $x = a + b^2t^2$, $y = c + dt^2$ পরামিতিক সমীকরণ থেকে $\frac{dy}{dx} = ?$

[IU: 13-14]

- A. $\frac{dy\sqrt{x-a}}{2b^2}$ B. $\frac{2dy\sqrt{x-a}}{3b^2}$
C. $\frac{3y\sqrt{x-a}}{2b}$ D. $\frac{3dy\sqrt{x-a}}{2b}$

[S@Why] $x = a + b^2t^2$, $y = c + dt^2$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{2dt}{2bt^2} = \frac{d}{b^2}$

23. $y = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শকগুলো x -অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক-

[IU:13-14,E]

- A. $(-1, 6) \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$ B. $(1, -6) \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$
C. $(-1, 6) \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ D. $(1, 6) \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$

[S@Why] See TOPIC-08

24. x এর সাপেক্ষে e^{x^x} এর অন্তরক সহগ নিম্নের কোনটি?

[IU 12-13, 06-07; জ.বো. ২০১৪; পি.বো. ২০১৪]

- A. $e^{x^x} x^x \log x$ B. $e^{x^x} x^x (1 + \log x)$
C. $e^x \log x$ D. $x^x e^{x^x} (\log x - 1)$

[S@Why]

ধরি, $y = e^{x^x} \Rightarrow \ln y = x^x \ln e = x^x \Rightarrow \ln(\ln y) = x \ln x$

$\frac{d}{dx}[\ln(\ln y)] = \frac{d}{dx}(x \ln x) \Rightarrow \frac{1}{\ln y} \cdot \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \ln y (1 + \ln x)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = e^{x^x} \ln e^{x^x} (1 + \ln x) = e^{x^x} \cdot x^x (1 + \ln x)$

25. $y = \tan(b + ax)$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

[IU: 12-13, 05-06; CU: 07-08]

- A. $a \cos^2(b + ax)$ B. $a \sec^2(b + ax)$
C. $a \tan^2(b + ax)$ D. $a \cot^2(b + ax)$

[S@Why] $y = \tan(b + ax)$ হলে, $\frac{dy}{dx} = a \sec^2(b + ax)$

26. x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1}(ax)$ এর অন্তরক হবে-

[IU: 12-13]

- A. $\frac{a}{1+a^2x^2}$ B. $\frac{x}{1+a^2x^2}$ C. $\frac{a}{\sqrt{1+a^2x^2}}$ D. $\frac{x}{\sqrt{1+a^2x^2}}$

[S@Why] $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} ax) = \frac{a}{1+a^2x^2}$

27. x -এর সাপেক্ষে $\sin(ax+b)$ এর অন্তরক হবে- [IU 12-13, JU 11-12]

- A. $\cos(ax-b)$ B. $\sin(ax+b)$
C. $\cos(ax+b)$ D. $\sin(ax-b)$

SO Why $y = \sin(ax+b) \therefore \frac{dy}{dx} = \cos(ax+b) \cdot a = a \cos(ax+b)$

28. কোন বিন্দুতে অধিকতম স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল হলে $\frac{dy}{dx}$ -এর মান- [IU 12-13]

- A. 0 B. 1 C. -1 D. ∞

SO Why স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল হলে, $\frac{dy}{dx} = 0$

29. $y = 3^x$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [IU 11-12]

- A. $3^x \log_e 3$ B. $\log_e 3$
C. $3/\log_e x$ D. $\log_e 3^x$

SO Why ধরি, $y = 3^x \therefore \frac{dy}{dx} = 3^x \log_e 3$

30. $f(x) = \sqrt[3]{e^{\sqrt{x}}}$ হলে $f'(x)$ হবে। [IU: 11-12]

- A. $\frac{\sqrt[3]{e^{\sqrt{x}}}}{2\sqrt{x}}$ B. $\frac{\sqrt[3]{e^{\sqrt{x}}}}{6\sqrt{x}}$ C. $\frac{\sqrt[3]{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ D. $\frac{\sqrt[3]{e^{\sqrt{x}}}}{3\sqrt{x}}$

SO Why $f(x) = \sqrt[3]{e^{\sqrt{x}}}$ হলে,
 $f'(x) = \frac{\frac{1}{3}(e^{\sqrt{x}})^{-2/3} \cdot e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} = \frac{(e^{\sqrt{x}})^{1/3}}{6\sqrt{x}}$

31. x কে পরিবর্তনশীল ধরে $x^7 + 9$ ফাংশনের অন্তরক- [IU: D, 11-12]

- A. $7x^6$ B. $-7x^6$
C. $5x^6$ D. $-5x^6$

SO Why ধরি, $y = x^7 + 9 \therefore \frac{dy}{dx} = 7x^6$

32. $y = \tan^{-1} \sqrt{x}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [IU 11-12]

- A. $\frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$ B. $\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$ C. $\frac{2}{\sqrt{x}(1+x)}$ D. $\frac{1}{\sqrt{x}(1-x)}$

SO Why $y = \tan^{-1}(\sqrt{x})$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$

33. $x^a y^b = (x-y)^{a+b}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [IU: D, 11-12]

- A. $-\frac{x}{y}$ B. $-\frac{y}{x}$
C. $\frac{x}{y}$ D. $\frac{y}{x}$

SO Why $x^a y^b = (x-y)^{a+b}$

$$\Rightarrow a \log x + b \log y = (a+b) \log(x-y)$$

$$\Rightarrow a \log x + b \log y - (a+b) \log(x-y) = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{\frac{a}{x} - \left(\frac{a+b}{x-y} \cdot 1 \right)}{\frac{b}{y} - \left(\frac{a+b}{x-y} (-1) \right)} \right) = - \frac{\frac{ax - ay - ax - bx}{x(x-y)}}{\frac{bx - by + ay + by}{y(x-y)}} = - \frac{-(bx + ay)}{bx + ay} \cdot \frac{y}{x} = \frac{y}{x}$$

34. $x^2 + y^2 = 4$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$ [IU: 11-12, DU: 95-96]

- A. $2x+2y$ B. $-\frac{x}{y}$ C. $\frac{y}{x}$ D. $4-2x$

SO Why $\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(4) \Rightarrow 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

35. মূল বিন্দুতে $y = ax(1+x)$ বক্ররেখাটির স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করলে a এর মান কত? [IU: 10-11; JU: 13-15; KU: 14-15]

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ C. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ D. $-\sqrt{3}$

SO Why যেহেতু রেখাটি মূল বিন্দুগামী এবং x -অক্ষের সাথে 60° কোণ আনত। সুতরাং $a = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x^n + y^n = a^n$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [BRUR-D: 19-20]

- A. $\left(\frac{x}{y}\right)^n$ B. $-\left(\frac{x}{y}\right)^n$ C. $-\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$ D. $\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$

SO Why $x^n + y^n = a^n \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{nx^{n-1}}{ny^{n-1}} = -\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$

02. $y = \frac{\ln x}{x}$ হলে $x^3 \frac{d^2y}{dx^2} - 2xy$ এর মান কত? [BRUR-D: 19-20; KUET: 16-17]

- A. 2 B. -2 C. 3 D. -3

SO Why $y = \frac{\ln x}{x}$ বা, $y_1 = \frac{x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$
 $x^2 \left(-\frac{1}{x^3} \right) - 2x \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right) = \frac{-x - 2x(1 - \ln x)}{x^3} = \frac{-1 - 2(1 - \ln x)}{x^3}$

বা, $y_2 x^3 = 2 \ln x - 3 \therefore x^3 y_2 - 2xy = -3 [\because \ln x = xy]$

03. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ সর্বনিম্ন হবে- [BRUR-E: 19-20]

- A. $-\frac{1}{e}$ B. e C. $\frac{1}{e}$ D. $-e$

SO Why See Solution of SUST-09.

04. $(-1, 8)$ বিন্দুতে $y = 3x^2 - 5x$ বক্ররেখাটির ঢাল কত? [BRUR-E: 19-20]

- A. 1 B. 4 C. -6 D. -11

SO Why $y = 3x^2 - 5x$
 $\frac{dy}{dx} = 6x - 5 \therefore \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(-1,8)} = 6(-1) - 5 = -11$

05. x এর সাপেক্ষে $(3x-5)^4$ এর অন্তরক সহগ- [BRUR-E: 19-20]

- A. $4(3x-5)^3$ B. $12(3x-5)^3$ C. $\frac{(3x-5)^5}{5}$ D. $\frac{(3x-5)^5}{15}$

SO Why $\frac{d}{dx}(3x-5)^4 = 4(3x-5)^3 \times 3 = 12(3x-5)^3$

06. একটি বাস t সেকেন্ডে $3t + \frac{t^2}{4}$ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। 2 মিনিট পর তার বেগ কত হবে? [BRUR-D: 17-18; JUST: 16-17, 14-15]

- A. 50 ms^{-1} B. 58 ms^{-1} C. 63 ms^{-1} D. 70 ms^{-1}

SO Why $s = 3t + \frac{1}{4}t^2$ বা, $v = \frac{ds}{dt} = 3 + \frac{1}{4} \times 2t$ বা, $v = 3 + \frac{1}{2}t$

বা, $v = 3 + \frac{1}{2} \times 120$ (t = 2 min = 120 sec)
 $= 3 + 60 = 63 \text{ ms}^{-1}$

- [SUST-B. 19-20]

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্দু $\left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$

07. $(1, 1)$ বিন্দুতে $y = e^{\ln\left(x - \frac{1}{x}\right)}$, $x > 0$ বক্ররেখার ঢাল কত? [SUST-17-18]
 A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2

So Why $y = e^{\ln(x - \frac{1}{x})} = x - \frac{1}{x}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x^2}$; (1, 1) বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = 1 + 1 = 2$
 $\therefore$ নির্ণেয় ঢাল = 2

08. $\frac{d}{dx}(\log_{10}x)$ এর মান কত? [SUST 17-18; ঢা.বো. ২০১৯]
- A. $\frac{1}{x}$ B. $\frac{1}{|x|}$ C. $\frac{\ln 10}{x}$ D. $\frac{1}{|x| \ln 10}$ E. $\frac{\ln 10}{|x|}$

S D Wh $y = \log_{10} x \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{|x|} \log_{10} e = \frac{1}{|x| \ln 10}$

09. $4(x-2)^2 + 5(y+3)^2 = 20$ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত একক? [SUST'16-17]
- A. $2\sqrt{5}\pi$ B. $5\sqrt{2}\pi$ C. 20π
D. 10π E. 9π

SA Why? (a); $\frac{(x-2)^2}{5} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$

$$\text{উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi ab = \pi \cdot \sqrt{5} \cdot 2$$

10. $\frac{x}{\log x}$ এর লঘুমান কত? [SUST 16-17, IU 16-17, JU 2009-10]
A. e^2 B. e^{-2} C. $1/e$ D. e

$$\text{S@Why} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\ln x \frac{d}{dx}(x) - x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2}$$

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মানের জন্য,

$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = 0 \Rightarrow \ln x - 1 = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \therefore x = e$$

আবার, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-1}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} + \frac{2}{(\ln x)^3} \cdot \frac{1}{x}$

$$\therefore \text{यथन } x = e, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{e} + \frac{2}{e} = \frac{1}{e}$$

$\therefore x = e$ হলে ফাংশনটির মান ক্ষুদ্রতর।

$$\therefore \text{ফাংশনটির ক্ষুদ্রতর মান} = \frac{e}{\ln e} = e$$

11. কোন বিন্দুতে $y = 2x^2 + x + 1$ বক্ররেখা স্পর্শক $5x - y + 5 = 0$ রেখার সমান্তরাল হবে? [SUST'16-17]

A. (0, 1) B. (1, 4) C. (2, 11)

D. $(-1, 2)$ E. $(-2, 7)$

S^BWhy (b); $5x - y + 5 = 0$; $m = 5$

$$\frac{dy}{dx} = 4x + 1 = 5; x = 1$$

$$y = 2x^2 + x + 1 = 2 \cdot 1 + 1 + 1 = 4 \quad \therefore (x, y) = (1, 4)$$

12. যদি $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}} \right)$ হয় তাহলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [SUST 16-17]

A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$

A. 1
D. 2

Solve Why $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}} \right)$

$= \tan^{-1} \left(\frac{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2 \sin \frac{x}{2}}{2 \cos \frac{x}{2}} \right) = \tan^{-1} \left(\tan \frac{x}{2} \right)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$$

13. $f(x) = -(x-5)^4$ ফাংশনের গুরুমান কত?
 A. -5 B. -1 C. 0
 D. 5 E. 625

D. 5 E. 625
So Why লক্ষ করি, $(x-5)^4 \geq 0 \therefore -(x-5)^4 \leq 0$ [সর্বদাই]
 অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, $f(x) = -(x-5)^4$ ফাংশনের মান সর্বোচ্চ শূন্য হতে
 পারে। অতএব ফাংশনটির গুরুমান = শূন্য (0)।

14. $x^3 - 2xy^2 = 1$ বক্ররেখার $(-1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? [SUST 15-16]
- A. -1 B. $-\frac{1}{4}$ C. 0 D. $\frac{1}{4}$ E. 1

SB Why $x^3 - 2xy^2 = 1$
 $\Rightarrow 3x^2 - 2y^2 - 4xy \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - 2y^2}{4xy}$
 $\therefore (-1, 1)$ বিন্দুতে ঢাল $= \frac{3-2}{-4} = -\frac{1}{4}$

$x = 0$ বিন্দুতে $f(x) = \ln(2x + 1)$ এবং নিচের কোন বক্ররেখার স্পর্শকের ঢাল সমান হবে? [SUST-15-16]

A. $f(x) = 1 + x + 2x^2$ B. $f(x) = -2x - 2x^2 + 4x^3$

C. $f(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$ D. $f(x) = 2x - 2x^2 + \frac{8}{3}x^3$

E. $f(x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$

So Why $f(x) = \ln(2x + 1) \therefore f'(x) = \frac{2}{2x + 1}$

ফাংশনের ক্ষেত্রে $x = 0$ বিন্দুতে ফাংশনের ঢাল শূন্য হয় না। $x = 0$ বিন্দুতে

$$\text{ঢাল } \frac{2}{2 \times 0 + 1} = 2$$

16. $y = e^x \log_a x$ হলে $x = a$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [SUST 14-15]

A. e^a B. $\frac{e^a \log_a a^e}{a}$

C. $e^a \left(1 + \frac{1}{a \ln a} \right)$ D. $e^a (1 + \log a^e)$ E. $1 + \frac{1}{a \ln a}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} e^{x(\log_a x)} &= \frac{d}{dx} e^x (\log_a x) = e^x \cdot \frac{d}{dx} (\log_a x) + \log_a x \cdot \frac{d}{dx} (e^x) \\ &= e^x \cdot \frac{1}{x \ln a} + \log_a x \cdot e^x \end{aligned}$$

$$\therefore x = a \text{ বিদ্যুতে } \frac{dy}{dx} = e^a \cdot \frac{1}{a \ln a} + \log_a a \cdot e^a = \frac{e^a}{a \ln a} + e^a = e^a \left(1 + \frac{1}{a \ln a} \right)$$

17. $y = \sin 2x$ এর 99-তম অন্তরক সহগ কত?
A. $2^{99} \cos 2x$

D. $-2^{99} \sin 2x$

SC Why $y = \sin 2x$

B. $2^{99} \sin 2x$

E. $2^{99} \sin 2x \cos 2x$

$$y_{99} = 2^{99} \sin\left(99 \cdot \frac{\pi}{2} + 2x\right) = 2^{99} \sin\left(3\frac{\pi}{2} + 2x\right) = -2^{99} \cos 2x$$

18. $y = \exp(\exp(x))$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [SUST 13-14, 11-12]

- A. $x \exp(x)$ B. $\exp(x)\exp(x^x)$
C. $\exp(x) \exp(\exp(x))$ D. $x^x \exp(x)$ E. $\ln x$

SQ Why $y = e^{e^x} \Rightarrow \ln y = e^x \ln e = e^x \therefore \frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx} e^x$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = e^x \therefore \frac{dy}{dx} = e^{e^x} \cdot e^x = \exp(x) \exp(\exp(x))$$

Ans. [As $\exp = e$]

19. $f(x) = x - \frac{1}{x}$, $x > 0$ ফাংশনটির ক্ষেত্রে কোনটি সত্য [SUST:13-14]

- A. শুধু গুরুমান আছে B. শুধু লঘুমান আছে
C. গুরুমান ও লঘুমান উভয়ই আছে D. গুরুমান ও লঘুমান নেই

SQ Why $f(x) = x - \frac{1}{x}$; $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} \therefore 0 = 1 + \frac{1}{x^2}$

বা, $\frac{1}{x^2} = -1$ বা, $x^2 = -1$: $x = i$ অর্থাৎ গুরুমান ও লঘুমান নেই।

20. x এর কোন মানের জন্য $y = (2x - 3)e^x$ এর গুরু বা লঘু মান পাওয়া যাবে? [SUST: 12-13]

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1 E. $\frac{1}{4}$

SQ Why $y = (2x - 3)e^x$; $\frac{dy}{dx} = (2x - 3)e^x + e^x \cdot 2$

$$0 = e^x(2x - 3 + 2) = e^x(2x - 1) \therefore 2x - 1 = 0 \text{ বা, } x = \frac{1}{2}$$

21. $(0, 2)$ বিন্দুটি $y = 5x^2 + 3x + c$ বক্ররেখার উপর অবস্থিত। ঐ বিন্দুতে বক্ররেখার উপর অধিকতর স্পর্শক $ax + cy + 1 = 0$ রেখার সামান্তরাল হলে a এর মান কত? [SUST: 12-13]

- A. 10 B. 6 C. 3 D. -3 E. -6

SQ Why $y = 5x^2 + 3x + c$ (i) $(0, 2)$ বিন্দুটি (i) এর উপর অবস্থিত। $\frac{dy}{dx} = 10x + 3$

$$\therefore 2 = c \text{ বা, } c = 2 \text{ (0, 2) বিন্দুতে ঢাল, } m = 3$$

$$ax + cy + 1 = 0 \text{ রেখার ঢাল, } m = -\frac{a}{c}$$

$$\therefore -\frac{a}{c} = 3 \text{ বা, } -\frac{a}{2} = 3 \text{ বা, } a = -6$$

22. $y = |2x|$ হলে $(-2, 4)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [SUST: 12-13]

- A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 E. 4

SQ Why $y = |2x|$ এবং $x = -2$ বলে $y = -2x$ $\therefore \frac{dy}{dx} = -2$

23. মূলবিন্দুগামী একটি সরল রেখা কোন বিন্দুতে $y = e^x$ বক্র রেখার সম্পর্ক হবে? [SUST:11-12,B]

- A. $1, \frac{1}{e}$ B. 1, 1 C. $\frac{1}{e}, 1$ D. 1, e E. e, 1

SQ Why $y = e^x$ যাহা $(0, 0)$ বিন্দুগামী আবার যে অপশন $y = e^x$ বক্র রেখাটিকে স্পর্শ করে সেটি সঠিক উত্তর D অপশনে $e = e^1$ বা, $e = e$

24. $\ln x$ এর সাপেক্ষে $\ln(1/x)$ এর অন্তরক সহগ হলো- [SUST 11-12]

- A. $1/x$ B. $-1/x$ C. 1
D. -1 E. 0

SQ Why $\frac{d}{d \ln x} \left(\ln \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{d \ln x} (\ln x^{-1}) = \frac{d}{d \ln x} (-\ln x) = -1$

25. $x^2 + y^2 = \log(xy)$ [SUST: 10-11]

- A. $\frac{y - 2x^2 y}{2xy^2 - x}$ B. $\frac{x - 2x^3}{y - 2y^3}$ C. $\frac{2x^3 x - x}{y - 2y^3}$ D. $\frac{y - 2x^2 y}{x - 2xy^2}$

SQ Why $x^2 + y^2 = \log(xy) \Rightarrow x^2 + y^2 - \log x - \log y = 0$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{2x - \frac{1}{x}}{2y - \frac{1}{y}} \right) = \frac{-y(2x^2 - 1)}{x(2y^2 - 1)} = \frac{y - 2x^2 y}{2xy^2 - x}$$

26. $y = 2x^2$ এবং $z = 3x^3$ হলে $\frac{dy}{dz} = ?$ [SUST: 10-11]

- A. $\frac{4}{9x}$ B. $\frac{9}{4x}$ C. $\frac{4}{9x^2}$ D. $\frac{2}{3x^2}$

SQ Why $y = 2x^2$, $z = 3x^3$

$$\therefore \frac{dy}{dz} = \frac{y \text{ মানের অন্তরীকরণ}}{z \text{ মানের অন্তরীকরণ}} = \frac{2 \cdot 2x}{3 \cdot 3x^2} = \frac{4}{9x}$$

27. $y = -\cos x$ এবং $z = \sin x$ হলে $\frac{dy}{dz} = ?$ [SUST: 10-11]

- A. $\tan x$ B. $\cos x$ C. $\sec x$ D. $-\tan x$

SQ Why $y = -\cos x$, $z = \sin x$ $\therefore \frac{dy}{dz} = \frac{-(-\sin x)}{\cos x} = \tan x$

28. $y^2 + xy + x^2 = 8$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত? [SUST 09-10]

- A. $\frac{-(y+2x)}{(2y+x)}$ B. $\frac{(y+2x)}{(2y+x)}$ C. $\frac{-(2y+x)}{(y+2x)}$ D. 0

SQ Why $y^2 + xy + x^2 = 8$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} (y^2 + xy + x^2) = \frac{d}{dx} (8) \Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} + x \frac{dy}{dx} + y + 2x = 0$$

29. y একটি বক্ররেখা যা $(0, 3)$ বিন্দু দিয়ে যায়। যদি $\frac{dy}{dx} = x^2 + x + 1$ হয় তাহলে y কে x এর ফাংশন হিসাবে প্রকাশ কর। [SUST: 09-10; BSMRSTU:A:17-18]

- A. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$ B. $y = 2x + 1$

- C. $y = \frac{x^2}{2} + x + 3$ D. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 1$

SQ Why $\frac{dy}{dx} = x^2 + x + 1$ হলে y কে x এর ফাংশন হিসাবে প্রকাশ

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \text{ (By Integration)}$$

30. $y = 3x^5 - 1$ বক্ররেখার $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কী? [SUST: 09-10]

- A. $y = 13x - 14$ B. $y = 14x - 15$
C. $y = 15x - 16$ D. $y = 16x - 17$

SQ Why $y = 3x^5 - 1$ বা, $\frac{dy}{dx} = 15x^4$ $\therefore$ ঢাল $m = \frac{dy}{dx} = 15$

$$\therefore \text{স্পর্শকের সমীকরণ, } y + 1 = 15(x - 1) \text{ বা, } y = 15x - 16$$

31. $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ বক্ররেখার $(-1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? [SUST 09-10]

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2


SQ Why $\frac{d}{dx} (x^2 + y^2 - 2x - 3) = \frac{d}{dx} (0) \Rightarrow 2x + 2y \frac{dy}{dx} - 2 = 0$





$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1 - x}{y} \therefore (-1, 1) \text{ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল, } \frac{dy}{dx} = 2$$

32. $y = \sin \sqrt{x}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান- [SUST: 06-07; সি.বো. ২০১২; কু.বো. ২০১৪, ১৩]

- A. $\frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ B. $\frac{-\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ C. $\frac{-2\sqrt{x}}{\cos \sqrt{x}}$ D. $\frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

SQ Why $y = \sin \sqrt{x}$ $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

33. $y = f(x)$ এর চিত্র হলো-  $\frac{dy}{dx}$ এর চিত্র কোনটি হবে? [SUST: 06-07]

- A.  X
B.  X
C.  X
D.  X

[S@Why] প্রদত্ত চিত্র মূলত $y = mx + c$ এর $\frac{d}{dx} = m$
 $y = f(x)$ এর চিত্র কখনো মূল বিন্দুগামী হবে না।

34. $y = (\log_e x)^2$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান- [SUST: B, 05-06]

A. $\frac{1}{x^2}$ B. $\frac{2}{x}$ C. $2 \log x$ D. $\frac{2 \log_e x}{x}$

[S@Why] $y = (\log_e x)^2 = 2 \log_e x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{2}{x}$

35. $y = f(x)$ ফাংশনের (x_0, y_0) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $y = \sqrt{2}x + 3$ হলে $f(x_0) =$ কত? [SUST: 05-06]

A. 0 B. $\sqrt{2}$ C. 1 D. None

[S@Why] $f(x) = \sqrt{2}x + 3 \therefore f(x) = \sqrt{2}$

36. $x^2y^2 = 1 - xy$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান- [SUST: 04-05]

A. $\frac{y}{x}$ B. $\frac{x}{y}$ C. $-\frac{y}{x}$ D. $-\frac{x}{y}$

[S@Why] $x^2y^2 + xy = 1$ যেহেতু অংকে xy সম্বলিত পদ ও ধ্রুবক পদ রয়েছে। $\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

37. $x = 2 \sin t, y = \cos^2 t$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [SUST: 04-05]

A. $\frac{\sin t}{\cos^2 t}$ B. $-\sin t$ C. $\frac{\tan t}{2}$ D. $\cos t$

[S@Why] $x = 2 \sin t, y = \cos^2 t$
 $\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \cos t \cdot \sin t}{2 \cos t} = -\sin t$

38. যদি $x = a(\theta + \sin \theta), y = a(1 + \cos \theta)$ হয় তবে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান- [SUST: 04-05]

A. $-\tan \frac{\theta}{2}$ B. $\tan \frac{\theta}{2}$ C. $-\tan \frac{\theta}{4}$ D. $\tan \frac{\theta}{4}$

[S@Why] $\frac{y}{x} = \frac{a(1 + \cos \theta)}{a(\theta + \sin \theta)} \frac{dy}{dx} = \frac{-2 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = -\tan \frac{\theta}{2}$

39. $\frac{d}{dx} (\cos^2 3x)$ এর মান- [SUST: A, 02-03]

A. $\sin 6x$ B. $6 \cos 3x$ C. $2 \sin 3x$ D. $-3 \sin 6x$

[S@Why] $\frac{d}{dx} (\cos^2 3x) = -2 \cos 3x \sin 3x \cdot 3 = -3 \sin 6x$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{2x+y}{x+2y}$

01. $\frac{d}{dx} \{\sin^{-1}(\sin e^x)\} = ?$ [JUST-A. 19-20]

A. e^{-x} B. $e^{-1/x}$ C. e^x D. $e^{1/x}$

[S@Why] $\frac{d}{dx} \{\sin^{-1}(\sin e^x)\} = \frac{d}{dx} (e^x) = e^x$

02. $\frac{2 \ln \{f(x)\}}{\{f(x)\}^2}$ ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান কত? [JUST-A. 19-20]

A. $-\frac{1}{e}$ B. $-\frac{1}{e^2}$ C. $\frac{1}{e}$ D. $\frac{1}{e^2}$

[S@Why] $y = \frac{2 \ln \{f(x)\}}{\{f(x)\}^2}$
ধরি, $f(x) = x \therefore y = \frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{\ln x^2}{x^2}$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x - \ln x^2 \cdot 2x}{x^4}$
 $= \frac{2x - 2x \ln x^2}{x^4} = \frac{2x(1 - \ln x^2)}{x^4} = \frac{2(1 - \ln x^2)}{x^3}$

$\therefore \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x^3 \cdot 2 \cdot \frac{-1}{x^2} \cdot 2x - 2(1 - \ln x^2) \cdot 3x^2}{x^6}$
 $= \frac{-4x^2 - 3(2 - 2 \ln x^2)x^2}{x^6} = \frac{-4 - 3(2 - 2 \ln x^2)}{x^4}$

সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন মানের জন্য $\frac{dy}{dx} = 0$

$\Rightarrow \frac{2(1 - \ln x^2)}{x^3} = 0$

$\Rightarrow 1 - \ln x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = e$

$x^2 = e$ হলে $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-4 - 3(2 - 2 \ln e)}{e^2} = \frac{-10 + 6 \ln e}{e^2} = \frac{-4}{e^2} < 0$

$\therefore$ সর্বোচ্চ মান $= \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$

03. $x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5$ এর লঘিষ্ঠ মান- [JUST-C. 19-20]

A. 5 B. 3 C. 8 D. 7

[S@Why] See TOPIC-07.

04. $y = x^{1/x}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [JUST. 18-19; ভা.বো. ২০০৮; রা.বো. ২০০৩; ব.বো. ২০০৮; চ.বো. ২০১৩, ০৬; য.বো. ২০০৮; সি.বো. ২০১৩, ০৯, ০৭]

- A. $x^{1/x-1}(1 - \ln x)$ B. $x^{1/x-2}(1 - \ln x)$
C. $x^{1/x^2}(1 - \ln x)$ D. $x^{1/x}(1 - \ln x)$

[S@Why] $x^{\frac{1}{x}} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \ln x \right) \Rightarrow x^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x} \times \frac{1}{x} - \ln x \times \frac{1}{x^2} \right)$
 $= x^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} \right) = x^{\frac{1}{x}} \frac{1}{x^2} A(1 - \ln x) = x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x)$

05. যদি $y = a^x$ হয়, তবে $\frac{d^3y}{dx^3}$ এর মান কত? [JUST-18-19]

A. $a^x \ln a$ B. $(a^x \ln a)^3$ C. $a^{3x} (\ln a)^3$ D. $a^x (\ln a)^3$

[S@Why] $y = a^x \therefore \frac{dy}{dx} = a^x \ln a$

$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 0 + (\ln a)^2 \cdot a^x \Rightarrow \frac{d^3y}{dx^3} = a^x (\ln a)^3$

06. $x = a \sec^2 \theta$ এবং $y = a \tan^3 \theta$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [JUST: 17-18]

A. $\frac{4}{5} \sec \theta$ B. $\frac{3}{2} \tan \theta$ C. $\frac{1}{2} \tan \theta$ D. $4 \cos \theta$

[S@Why] $x = a \sec^2 \theta, y = a \tan^3 \theta$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{a 3 \tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta}{a 2 \sec \theta \cdot \sec \theta \tan \theta} = \frac{3}{2} \tan \theta$

07. যদি $x = y^{1/2}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx} = ?$

[JUST: 16-17]

- A. 0 B. 1 C. $\frac{y(1-x \ln y)}{x^2}$

D. $\frac{y^2}{1-y \ln(\ln x)}$ E. $\frac{x^2}{y(1+x \ln y)}$

S@Why $x = y^{1/2}$ $\frac{dy}{dx} = 0$ (চলক নাই)

08. $x^2 - 4x + 8$ ফাংশনের গুরুমান কত?

[JUST: 16-17]

- A. 4 B. 8 C. 2 D. 5 E. নাই

S@Why $x^2 - 4x + 8 = (x-2)^2 + 2^2$

$(x-2)^2$ এর মান সর্বদা ধনাত্মক এবং 2^2 ও ধনাত্মক। তাই ইহার কোন গুরুমান নাই।

09. যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তবে $\frac{y_1}{y_2}$ এর মান কোনটি? [JUST: 16-17; RUET: 14-15]

- A. $\frac{1}{1-x^2}$ B. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ C. $\frac{x}{1-x^2}$ D. $\frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}$ E. $\frac{1-x^2}{x}$

S@Why $y = \sin^{-1} x$ বা, $y_1 = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

বা, $y_2 = -\frac{1}{2} (1-x^2)^{-3/2} \cdot -2x = x(1-x^2)^{-3/2}$

$\therefore \frac{y_1}{y_2} = \frac{(1-x^2)^{-1/2}}{x(1-x^2)^{-3/2}} = \frac{1-x^2}{x}$

10. $y = x^3(x^2 - 3) + 2x^4 + 101$ হলে, $\frac{d^6 y}{dx^6}$ এর মান কত? [JUST: 15-16]

- A. $5 - 3x$ B. $60x$ C. 0 D. ∞ (অসীম)

S@Why $y = x^3(x^2 - 3) + 2x^4 + 101$

বা, $y = x^5 - 3x^3 + 2x^4 + 101 \therefore \frac{d^6 y}{dx^6} = 0$

11. একটি গাড়ী t সেকেন্ড সময়ে $3t^2 - 5t + 2$ দূরত্ব অতিক্রম করে। কখন তার বেগ শূন্য হবে? [JUST: 15-16, A; HSTU: 18-19]

- A. $\frac{6}{5}$ sec B. $\frac{2}{3}$ sec C. $\frac{3}{2}$ sec D. $\frac{5}{6}$ sec E. $\frac{7}{8}$ sec

S@Why $S = 3t^2 - 5t + 2$

বা, $v = \frac{ds}{dt} = 6t - 5$ বা, $0 = 6t - 5$ বা, $t = \frac{5}{6}$ sec

12. যদি $0 \leq x < 2$ হয় তাহলে $x(1-x)^2$ এর সর্বোচ্চ মান কত? [JUST: 13-14]

- A. 2 B. $\frac{4}{27}$ C. $\frac{5}{12}$ D. 0 E. $\frac{3}{11}$

S@Why $0 \leq x < 2, y = x(1-x)^2$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 2(1-x)x \cdot (-1) + (1-x)^2$

বা, $0 = (1-x)(1-x-2x) \therefore x = \frac{1}{3}$

$\therefore$ সর্বোচ্চ মান $= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{27}$ ($x = \frac{1}{3}$ বসিয়ে)

MAHJANABANANBIJANANPRABHAKARIBHABANAN

01. $\frac{d}{dx} \sqrt{\frac{1}{e^x}} = ?$

[MBSTU-A: 19-20]

- A. $\frac{1}{2\sqrt{e^x}}$ B. $-\frac{1}{2\sqrt{e^x}}$ C. $\frac{1}{\sqrt{e^x}}$ D. $-\frac{1}{\sqrt{e^x}}$

S@Why $\frac{d}{dx} \sqrt{\frac{1}{e^x}} = \frac{d}{dx} (e^{-x})^{1/2} = \frac{1}{2} (e^{-x})^{-1/2} \cdot e^{-x} \cdot (-1)$

$= -\frac{e^{-x}}{2\sqrt{e^{-x}}} = -\frac{\sqrt{e^{-x}}}{2} = -\frac{1}{2\sqrt{e^x}}$

02. বক্ররেখা $y = x + e^x$ এর $x = 0$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হবে-

[MBSTU-C: 19-20]

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = x$ C. $y = 2x - 1$ D. $y = 2x$

S@Why $y = x + e^x \therefore \frac{dy}{dx} = 1 + e^x$

$x = 0$ হলে $\frac{dy}{dx} = 1 + e^0 = 2$

$x = 0$ হলে $y = 0 + e^0 = 1$

$\therefore (0, 1)$ বিন্দু ও 2 ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ:

$y - 1 = 2(x - 0) \Rightarrow y = 2x + 1$

03. $y = \ln(ax^3)$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত?

[MBSTU-18-19]

- A. $\frac{1}{ax^3}$ B. $\frac{3a}{x}$ C. $\frac{a}{x^3}$ D. $\frac{3}{x}$

S@Why $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{ax^3} \times \frac{d}{dx} (ax^3) = \frac{1}{ax^3} \times a \cdot 3x^2 = \frac{3}{x}$

04. $\frac{d}{dx} \left(\ln \frac{1}{x} \right) =$ কত?

[MBSTU: C, 17-18]

- A. $1/x$ B. $-1/x$ C. $1/x^2$ D. $-1/x^2$

S@Why $\frac{d}{dx} \left(\ln \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \{ \ln(1) - \ln(x) \} = -\frac{1}{x}$

05. $y = \tan x$ হলে $\frac{d^2 y}{dx^2}$ এর মান কত?

[MBSTU: 17-18, A]

- A. $1 + y^2$ B. $2(1 + y^2)$ C. $2y(1 + y^2)$ D. $1 + x^2$

S@Why $y = \tan x \therefore \frac{dy}{dx} = \sec^2 x$

$\therefore \frac{d^2 y}{dx^2} = 2 \sec x \sec x \tan x = 2 \sec^2 x \tan x = 2y(1 + \tan^2 x) = 2y(1 + y^2)$

06. $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$ এর সন্ধি বিন্দু কোনটি?

[MBSTU: 16-17, A]

- A. $(-1, 1)$ B. $(1, -1)$ C. $(-1, -1)$ D. $(1, 1)$

S@Why $f(x) = 3x^2 - 6x + 4 \therefore f'(x) = 6x - 6$

$\therefore 0 = 6x - 6$ বা, $x = 1 \therefore f(x) = y = 3 - 6 + 4 = 1 \therefore$ সন্ধি বিন্দু $(1, 1)$

07. $f(x) = 10x - \frac{54}{(5x^2 + 4)^2}$ হলে $f'(1)$ এর মান-

[MBSTU: A, 15-16]

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

S@Why $f(x) = 10x - \frac{54}{(5x^2 + 4)^2} \therefore f'(x) = 10 - 54 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (5x^2 + 4)^{-3/2} \cdot 10x$

$= 10 + 270x \cdot (5x^2 + 4)^{-3/2}$

$\therefore f'(1) = 10 + 270 \times 1 \cdot (5 + 4)^{-3/2} = 10 + 270(9)^{-3/2}$

$\Rightarrow f'(1) = 10 + (3^2)^{-3/2} \cdot 270 = 10 + (3)^{-3} \cdot 270$

$= 10 + \frac{270}{3^3} = 10 + \frac{270}{27} = 10 + 10 = 20$

08. $y = e^{\sin^{-1} x}$ এবং $z = \log x$ হলে $\frac{dy}{dz} = ?$

[MBSTU: C, 14-15]

- A. $\frac{e^{\sin^{-1} x}}{x\sqrt{1-x^2}}$ B. $xe^{\sin^{-1} x}$ C. $\frac{e^{\sin^{-1} x}}{x\sqrt{1-x^2}}$ D. $\frac{xe^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}}$

S@Why $y = e^{\sin^{-1} x}, z = \log x; \frac{dy}{dz} = \frac{\frac{e^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{x}} = \frac{xe^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}}$

09. $x^3 - 3x + 9$ এর গুরুমান কত?

[MBSTU: 14-15, A]

- A. -11 B. 10 C. 7 D. 11

S@Why $x^3 - 3x + 9$ বা, $3x^2 - 3 = 0$ বা, $x^2 - 1 = 0$

$x = \pm 1$ গুরুমান $(-1)^3 - 3(-1) + 9 = -1 + 3 + 9 = 11$

10. $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ পরাবৃত্তের $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল- [MBSTU: 14-15, A]

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[S@Why] $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$; $f'(x) = 6x - 2$

ঢাল, $m = 6 - 2 = 4$ [$x = 1$ বিন্দুতে]

11. $y = x(1 - x)$ বক্ররেখার যে বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল তার স্থানাঙ্ক- [MBSTU: 14-15, A]

- A. (1, 0) B. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ C. $(\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$ D. $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$

[S@Why] $y = x(1 - x)$ (i) বা, $y = x - x^2$; $\frac{dy}{dx} = 1 - 2x$

x -অক্ষের সমান্তরাল। $\therefore 0 = 1 - 2x$ বা, $x = \frac{1}{2}$ (i) এ $x = \frac{1}{2}$ বসিয়ে

$$y = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \therefore \text{স্পর্শ বিন্দু} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$$

[MBSTU: 14-15]

12. $f(x) = e^{\tan^{-1}x}$ যদি $f'(0)$ এর মান কত?

- A. 0 B. 1 C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

[S@Why] $f(x) = e^{\tan^{-1}x}$; $f'(x) = \frac{e^{\tan^{-1}x}}{1+x^2}$ $\therefore f'(0) = \frac{e^0}{1} = 1$

13. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = x^3 + 3x^2 - 45x + 10$ এর গরিষ্ঠ মান হবে? [MBSTU: 13-14, A]

- A. 3 B. -5 C. -3 D. 5

[S@Why] $f(x) = x^3 + 3x^2 - 45x + 10$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 45 \text{ বা, } 0 = 3x^2 + 6x - 45$$

$$\text{বা, } x^2 + 2x - 15 = 0 \text{ বা, } x = 3, -5$$

$x = -5$ হলে গরিষ্ঠ মান পাওয়া যাবে।

[MBSTU: 12-13]

14. $y = \tan(\sin^{-1}x)$ হলে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর।

- A. $(1 - x^2)^{\frac{1}{2}}$ B. $(1 - x^2)^{\frac{3}{2}}$
C. $(1 - x^2)^{-\frac{3}{2}}$ D. $(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}$

[S@Why] $y = \tan(\sin^{-1}x)$

$$y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-x^2} \cdot 1 - x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}$$

$$= \frac{\frac{1-x^2+x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2} = (1-x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

[M] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. $y = \frac{1}{4}e^{4\ln x}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত? [BSMRSTU-B. 19-20]

- A. $\frac{1}{4}x^3$ B. x^4 C. x^3 D. $\frac{1}{4}x^5$

[S@Why] $y = \frac{1}{4}e^{4\ln x} \Rightarrow y = \frac{1}{4}e^{\ln x^4} = \frac{1}{4}x^4 \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{4}4x^3 = x^3$

02. x -এর সাপেক্ষে $\cos^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$ এর অন্তরক সহগ কত?

[BSMRSTU-A. 19-20]

- A. $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ B. $-\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$
C. $\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] ধরি, $y = \cos^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$

$$= \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = \frac{\pi}{2} - 2\sin^{-1}x$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 0 - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

03. $\vec{r} = 2t\hat{i} + 3t^2\hat{j}$ হচ্ছে একটি বিন্দুবস্তুর অবস্থান ভেক্টর, যেখানে t হচ্ছে সময়। বস্তুর বেগ কত? [BSMRSTU-A. 19-20]

- A. $2t\hat{i}$ B. $2\hat{i} + 6t\hat{j}$ C. $6t\hat{j}$ D. $2\hat{i} + 3t\hat{j}$

[S@Why] $\vec{r} = 2t\hat{i} + 3t^2\hat{j}$; বেগ $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\hat{i} + 6t\hat{j}$

04. x এর কোন মানের জন্য $y = 2x + \frac{1}{x}$ বক্ররেখাটির ঢাল শূন্য হবে? [BSMRSTU-A. 19-20]

- A. ± 2 B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

[S@Why] $y = 2x + \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2 - \frac{1}{x^2}$

$$\therefore \text{ঢাল শূন্য} \therefore 2 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{x^2} = 2 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

05. যদি কোন বস্তুর সরণ-এর সমীকরণ $y = 12t^3 + 50t^2 + 100$ হয়, তবে 10sec এ তার ত্বরণ কত হবে? [BSMRSTU: 18-19]

- A. 720ms^{-1} B. 750ms^{-1} C. 820ms^{-1} D. 500ms^{-1}

[S@Why] $y = 12t^3 + 50t^2 + 100$; $\frac{dy}{dt} = v = 36t^2 + 100t$

$$\text{বা, } \frac{dv}{dt} = a = 72t + 100$$

$$\text{বা, } a = 72 \times 10 + 100 \text{ (} t = 10 \text{ সে. পর)} = 820\text{ms}^{-1}$$

06. $y = x^3 + xy$ বক্ররেখাটির (2, -8) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল- [BSMRSTU: 18-17, A]

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. -4 D. -8

[S@Why] $y = x^3 + xy$ বা, $y - x^3 - xy = 0$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-3x^2 - y}{1 - x} \text{ বা, } \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + y}{1 - x}$$

$$(2, -8) \text{ বিন্দুতে ঢাল } \frac{dy}{dx} = \frac{3(2)^2 - 8}{1 - 2} = -4$$

07. যদি $f(x) = \ln x^3$ হয়, তাহলে $f''(3)$ এর মান কত? [BSMRSTU: 14-15]

- A. $-\frac{1}{3}$ B. -1 C. -3 D. 1

[S@Why] $f(x) = \ln x^3 = 3\ln x$

$$f'(x) = \frac{3}{x}, f''(x) = -\frac{3}{x^2} \therefore f''(3) = -\frac{3}{3^2} = -\frac{1}{3}$$

[M] হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. $y = f(x)$ এর উপস্থিতি (x, y) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক অক্ষদ্বয়ের সাথে সমান কোন উৎপন্ন করলে নিচের কোনটি ঠিক? [HSTU: 18-19]

- A. $\frac{dy}{dx} = 0$ B. $\frac{dy}{dx} = 2$ C. $\frac{dy}{dx} = 3$ D. $\frac{dy}{dx} = \pm 1$

[S@Why] $\frac{dy}{dx} = \tan(\pm 45^\circ) = \pm 1$

02. যদি $\frac{dy}{dx} = 2a$ হয়, তাহলে y এর মান কত? [HSTU: F. 16-17]

- A. ax^2 B. a^2x C. a^2 D. $2ax + b$

[S@Why] যদি $\frac{dy}{dx} = 2a \therefore y = 2ax + b$

03. $x + y = xy^2$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [HSTU: F, 14-15]

- A. $\frac{y^2+1}{1-2xy}$ B. $\frac{y^2-1}{1-2xy}$ C. $\frac{y^2-1}{2-2xy}$ D. $\frac{y^2-1}{-3xy}$

[S@Why] $x + y = xy^2 \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1-y^2}{1-2xy} = \frac{y^2-1}{1-2xy}$

04. কোন বৃত্তের পরিধির বৃদ্ধির হার বৃত্তের ব্যাসার্ধের- [HSTU: 11-12]

- A. 3 গুণ B. $\sqrt{2}$ গুণ C. π গুণ D. 2π গুণ

[S@Why] ধরি, ব্যাসার্ধ = r পরিধি $p = 2\pi r$ বা, $\frac{dp}{dt} = 2\pi \frac{dr}{dt}$

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = \tan^{-1} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ কত? [NSTU: 18-19]

- A. 1 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

[S@Why] $y = \tan^{-1} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = \tan^{-1} \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$

$$= \tan^{-1} \tan \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \therefore y = \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \therefore \frac{dy}{dx} = -1$$

02. যদি $y = (\sin^{-1} x)^2$ হলে কোন সম্পর্কটি সঠিক? [NSTU: 14-15; ঢা.বো. ২০০৮; রা.বো. ১১, ০৩; কু.বো. ১৩, ০৮, ০৩; ব.বো. ১২, ০৮, ০৫; চ.বো. ২০১১; মাদ্রাসা. ২০১০]

- A. $(1-x^2)y_2 + xy_1 + y = 0$ B. $(1-x^2)y_2 - xy_1 = 2$
C. $(1-x^2)y_2 - xy_1 + 2 = 0$ D. $(1-x^2)y_1 - xy_2 = 0$

[S@Why] $y = (\sin^{-1} x)^2$ বা, $y_1 = \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$

$$\text{বা, } y_1 \sqrt{1-x^2} = 2\sin^{-1} x \text{ বা, } \frac{y_1(-2x)}{2\sqrt{1-x^2}} + y_2 \sqrt{1-x^2} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{বা, } \frac{-xy_1}{\sqrt{1-x^2}} + y_2 \sqrt{1-x^2} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{বা, } -xy_1 + y_2(1-x^2) = 2 \text{ বা, } y_2(1-x^2) - xy_1 = 2$$

03. $y = \ln \left(x + \frac{1}{x} \right)$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত? [NSTU: 06-07]

- A. $\frac{1-x^2}{x}$ B. $\frac{1-x}{x^2}$ C. $\frac{1-x^2}{x(x^2+1)}$ D. $\frac{x^2-1}{x(x^2+1)}$

[S@Why] $y = \ln \left(x + \frac{1}{x} \right) \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + \frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{x^2-1}{x(x^2+1)}$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{\ln x}{x}$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত? [PSTU: 19-20; BSMRSTU: 18-19]

- A. $\frac{1}{e}$ B. e C. 1 D. $\frac{1}{e^2}$

[S@Why] ধরি, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

$$f'(x) = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{x^2 \left(-\frac{1}{x} \right) - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4}$$

$$= \frac{-x - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{-x(1 + 2(1 - \ln x))}{x^4} = -\frac{(1 + 2(1 - \ln x))}{x^3}$$

সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন মানের জন্য $f'(x) = 0$

$$\therefore \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow x = e$$

$$x = e \text{ হলে } f''(e) = -\frac{1 + 2(1 - \ln e)}{e^3} = -\frac{1}{e^3} < 0$$

$$\therefore \text{সর্বোচ্চ মান } f(e) = \frac{\ln e}{e} = 1/e$$

02. $y = a^x + 100^x$ যেখানে $a > 0$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ কত? [PSTU: 17-18]

- A. $a^x \ln a$ B. $a^x \ln a + 100a \ln 100$
C. a^x D. None of them

[S@Why] $y = a^x + 100^x \therefore \frac{dy}{dx} = a^x \ln a + 100^x \ln 100$

03. $Z = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ হলে, $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} \sqrt{Z})$ কত? [PSTU-A₁/A₂: 17-18]

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 1

[S@Why] See TOPIC-03.

04. $xy = 4$ এবং $\frac{dx}{dy} = 0$ হলে x এর মান কত? [PSTU: A₁/A₂: 17-18]

- A. 0 B. 1 C. 4 D. None of them

[S@Why] $xy = 4 \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{x}{y} \Rightarrow 0 = -\frac{x}{y} \Rightarrow x = 0$

05. $y = \cos x$ হলে y_9 কত? [PSTU: 17-18]

- A. $\cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right)$ B. $\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$ C. $\sin \left(\frac{\pi}{2} + x \right)$ D. $\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$

[S@Why] $y = \cos x$

$$\therefore y_9 = \cos \left(9 \cdot \frac{\pi}{2} + x \right) = \cos \left(4\pi + \frac{\pi}{2} + x \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right)$$

06. $\frac{1}{x}$ এর চতুর্থ অন্তরক সহগ কত? [PSTU: 17-18, 16-17; MBSTU: 17-18, C]

- A. $\frac{1}{x^2}$ B. $25x^5$ C. $\frac{x^4}{9}$ D. $\frac{24}{x^5}$

[S@Why] See TOPIC-07.

07. $y = x^3 - 7x^2 + 5x$ বক্ররেখার (5, 4) বিন্দুতে ঢাল কত? [PSTU: A₁/A₂: 16-17]

- A. 14 B. 12 C. 10 D. 9

[S@Why] $y = x^3 - 7x^2 + 5x$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 3x^2 - 14x + 5$$

$$(5, 4) \text{ বিন্দুতে ঢাল, } \frac{dy}{dx} = 3(5)^2 - 14(5) + 5 = 75 - 70 + 5 = 10$$

08. $y = x^x + x^a$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত? [PSTU-A₁/A₂: 16-17]

- A. $x^x (1 + \ln x) + ax^{a-1}$ B. $x^x (1 + \ln x) + x^a \ln a$
C. $x^x (1 + \ln x) + a^x \ln a$ D. $x^x (1 - x^x)$

[S@Why] $y = x^x + x^a$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = x^x (1 + \ln x) + ax^{a-1}$$

09. $x^2 + xy + y^2 = 4$ বক্ররেখার (2, -2) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? [PSTU: 13-14]

- A. 2 B. -1 C. 1 D. -2

[S@Why] $x^2 + xy + y^2 = 4, \frac{dy}{dx} = -\frac{2x+y}{x+2y}$

$$\therefore (2, -2) \text{ বিন্দুতে ঢাল } m = -\frac{4-2}{2-4} = -\frac{2}{-2} = 1$$

10. $y = x^n$ ফাংশনের $(n+1)$ তম অন্তরক সহগ হবে- [PSTU: 13-14, B]

- A. 0 B. $(n-1)!$ C. $n!$ D. $(n+1)!$

[S@Why] $y = x^n \therefore y_{n+1} = 0$

11. কোন গতিশীল বস্তু t সেকেন্ডে $5t + 2$ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করলে 3 সে. পর তার গতিবেগ হবে-

A. 17ft/s B. 15ft/s C. 12ft/s D. 18ft/s [PSTU:13-14]

S.O.Why $s = 5t + 2$ বা, $v = 5$

$\therefore$ 3 সে. পর বেগ 5ft/s

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{d}{dx} (\log_a a) = ?$

[BSFMSTU. 19-20]

A. $\frac{1}{a}$ B. $\frac{1}{x}$ C. 0 D. $-\frac{\ln a}{x(\ln x)^2}$

S.O.Why $\frac{d}{dx} (\log_a a) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\log_a X} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\log_a e \log_e x} \right)$
 $= \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln a}{\ln x} \right) = \ln a \frac{d}{dx} \{ (\ln x)^{-1} \} = \ln a \cdot (-1)(\ln x)^{-2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{\ln a}{x(\ln x)^2}$

02. $y = f(x)$ ফাংশনটি $x = a$ বিন্দুতে সর্বনিম্ন মান থাকবে যদি-

[BSFMSTU. 19-20]

A. $f''(a) > 0$ এবং $f'(a) = 0$ B. $f''(a) < 0$ এবং $f'(a) = 0$
 C. $f''(a) > 0$ এবং $f''(a) > 0$ D. $f''(a) < 0$ এবং $f''(a) < 0$

S.A.Why $y = f(x)$ ফাংশনটি $x = a$ বিন্দুতে সর্বনিম্ন মান থাকবে যদি $x = a$ বিন্দুতে $f''(a) > 0$ এবং $f'(a) = 0$ হয়।

STEP 04 PRIME TEST

Time: 15

01. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{3x+2}{x}}$ এর মান কত?

A. e^2 B. e^2 C. $e^{\frac{2}{3}}$ D. e^3

02. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 10x + 5$ এর চরম মান x এর কোন মানের জন্য পাওয়া যাবে?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

03. $x^3 + y^3 = 3xy$ এর কোন বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল?

A. $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ B. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ C. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ D. $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

04. $y^x = e^{x+y}$ হলে dy/dx এর মান কোনটি?

A. $\frac{y}{x+y} (1 + \ln y)$ B. $\frac{y}{x+y} (1 - \ln y)$
 C. $\frac{y}{x-y} (1 + \ln y)$ D. $\frac{y}{x-y} (1 - \ln y)$

05. যদি $y = \sin^{-1} \left[\frac{4\sqrt{x}}{1+4x} \right]$ হয়, তাহলে $\left(\frac{dy}{dx} \right)_{(4,2)}$ এর মান হচ্ছে-

A. 4 B. $\frac{1}{17}$ C. $\frac{1}{9}$ D. None

06. The value of $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{4x^3 - 1}$ is:

A. ∞ B. 1 C. 0 D. $\frac{1}{4}$

07. যদি $x = a(\theta - \sin \theta)$ এবং $y = a(1 + \cos \theta)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান হবে-

A. $-\cot \frac{\theta}{2}$ B. $-\sin \theta$ C. $1 - \cos \theta$ D. $-\tan \frac{\theta}{2}$

08. $y = \sqrt{(\sin x + y)}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।

A. $\frac{\cos x}{1-2y}$ B. $\frac{\cos x}{2y-1}$ C. $\frac{\sin x}{2y-1}$ D. $\frac{\sin x}{1-2y}$

09. $4e^x + 9e^{-x}$ এর ক্ষুদ্রতম মান নির্ণয় কর।

A. 12 B. 5 C. 7 D. 11

10. যদি $x = t - \sin t$ এবং $y = \frac{dx}{dt}$ তাহলে $\frac{dy}{dx}$ কত হবে?

A. $\cot \frac{t}{2}$ B. $\tan \frac{t}{2}$ C. $\tan t$ D. $\cot t$

11. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের $(1, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হলো-

A. $x - y + 1 = 0$ B. $x + y + 1 = 0$
 C. $-x + y + 1 = 0$ D. $x + y - 1 = 0$

12. a এর মান কত হলে, $y = ax(1+x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করবে?

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ C. $3\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$

13. $(1, 6)$ বিন্দুতে $y = x^2 + 5$ বক্ররেখাটি কেমন হবে?

A. ক্রমহাসমান B. ক্রমবর্ধমান
 C. কমবেও না বাড়বেও না D. কোনটিই নয়

14. $\sqrt{e^{\sqrt{x}}}$ এর অন্তরক সহগ কত?

A. $-\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ B. $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ C. $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{2\sqrt{x}}$ D. $\frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{e^{\sqrt{x}}}}$

15. $\frac{d}{dx} (\log_x e) = ?$

A. $\frac{\log_x e}{x}$ B. $\frac{1}{x \ln x}$ C. $\frac{\ln x}{x}$ D. $\frac{-1}{x(\ln x)^2}$

16. $y = \ln [x - \sqrt{x^2 - 1}]$ হলে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর-

A. $\frac{1}{x^2 - 1}$ B. $-\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ C. $-\frac{1}{x^2 - 1}$ D. $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$

17. $z = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ হলে, $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} \sqrt{z})$ এর মান কত?

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 1

18. $y = \cos^{-1} \frac{x-x^{-1}}{x+x^{-1}}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$

A. $-\frac{2}{1+x^2}$ B. $\frac{2}{1-x^2}$
 C. $-\frac{2}{1-x^2}$ D. $\frac{2}{1+x^2}$

19. $y = \sec x^\circ$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান হবে-

A. $\tan^2 x^\circ$ B. $\sec x^\circ \tan x^\circ$
 C. $\frac{\pi}{180} \sec x^\circ \tan x^\circ$ D. $\frac{\pi}{90} \sec^2 x^\circ$

20. $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{1 + \sin 2x}}{\sin x + \cos x} \right) = ?$

A. 1 B. 0 C. $2 \sin 2x$ D. $2 \cos 2x$

21. $y = x\sqrt{x+1}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ কত?

A. $\frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$ B. $\frac{3x+2}{3\sqrt{x+1}}$ C. $\frac{3x+1}{2\sqrt{x+1}}$ D. $\frac{3x+1}{3\sqrt{x+1}}$

22. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{e^{x+2}} \right)$ এর মান নির্ণয় কর।

A. $\frac{2x}{e^{x+2}}$ B. $\frac{x^2}{e^{x+2}}$ C. $\frac{x(2-x)}{e^{x+2}}$ D. $\frac{1+2x}{e^{x+2}}$

23. $y = x^{-\frac{1}{x}}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান-

- A. $x^{-2} + \frac{1}{x} (\log x - 1)$ B. $\frac{1}{x^2 + \frac{1}{x}} (\log x - 1)$
C. $\frac{1}{x^2 + \frac{1}{x}} (1 - \log x)$ D. $x^{\frac{1}{x}} \frac{1}{x} (1 - \log x)$

24. $x^2 + y^2 = 25$ হলে, $(3, -4)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ কত?

- A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $-\frac{4}{5}$ D. $\frac{7}{5}$

25. $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি?

- A. $-\frac{1}{(1+x)^2}$ B. $\frac{2}{(1+2x)^2}$ C. $\frac{7}{1+5x}$ D. $\frac{d}{1-9x}$

OMR SHEET

01. A B C D E	09. A B C D E	17. A B C D E
02. A B C D E	10. A B C D E	18. A B C D E
03. A B C D E	11. A B C D E	19. A B C D E
04. A B C D E	12. A B C D E	20. A B C D E
05. A B C D E	13. A B C D E	21. A B C D E
06. A B C D E	14. A B C D E	22. A B C D E
07. A B C D E	15. A B C D E	23. A B C D E
08. A B C D E	16. A B C D E	24. A B C D E
		25. A B C D E

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	B	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{3x+2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^3 \cdot (1+x)^{\frac{2}{x}} = 1 \cdot e^2 = e^2$
02	B	$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 10x + 5$ $\therefore f'(x) = x^2 - 7x + 10 = 0 \therefore x = 2, 5$
03	C	$x^3 + y^3 = 3xy \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 3(y + x \frac{dy}{dx})$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{3y - 3x^2}{3y^2 - 3x} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$ স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল বলে, $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{y - x^2}{y^2 - x} = 0 \therefore x^2 = y$ মূল সমীকরণে $y = x^2$ বসিয়ে, $x^3 + x^6 = 3x^3$ $\Rightarrow x^6 = 2x^3 \Rightarrow x^3(x^3 - 2) = 0$ হয় $x = 0 \therefore y = 0$ অথবা, $x^3 = 2$ $\therefore x = 2^{\frac{1}{3}} \therefore y = 2^{\frac{2}{3}} \therefore$ বিন্দুটি $(2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{2}{3}})$
04	D	$y^x = e^{x \ln y} \Rightarrow x \ln y = x + y$ $\therefore \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} + \ln y = 1 + \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 - \ln y}{\frac{x}{y} - 1} = \frac{y}{x - y} (1 - \ln y)$
05	B	$y = \sin^{-1} \left[\frac{4\sqrt{x}}{1+4x} \right] \Rightarrow y = 2 \tan^{-1} 2\sqrt{x};$ $\frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{1+4x} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(4,2)} = \frac{1}{17}$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
06	C	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{4x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{4 - \frac{1}{x^3}} = 0$
07	A	$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos 0); \frac{dy}{dt} = a \times (-\sin 0)$ $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-\sin 0}{1 - \cos 0} = \frac{-2 \sin \frac{0}{2} \cos \frac{0}{2}}{2 \sin^2 \frac{0}{2}} = -\cot \frac{0}{2}$
08	B	দেওয়া আছে, $y = \sqrt{\sin x + y}$ $\Rightarrow y^2 = \sin x + y \Rightarrow y^2 - y = \sin x \Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} - \frac{dy}{dx} = \cos x$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} (2y - 1) = \cos x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2y - 1}$
09	A	$f(x) = 4e^x + 9e^{-x} \Rightarrow f'(x) = 4e^x - 9e^{-x} = 0$ $\Rightarrow \frac{4(e^x)^2 - 9}{e^x} = 0 \Rightarrow (e^x)^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow e^x = \frac{3}{2}$ $\Rightarrow f''(x) = 4e^x + 9e^{-x}$, (যা সর্বদা শূন্য অপেক্ষা বড়) এখন, $e^x = \frac{3}{2}$ এর জন্য, $f(x)$ সর্বনিম্ন হবে। $\therefore f(x) = 4 \times \frac{3}{2} + 9 \times \frac{2}{3} = 6 + 6 = 12$
10	A	$x = t - \sin t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 1 - \cos t$ $\Rightarrow y = 1 - \cos t \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \sin t$ $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2}$
11	B	$y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ: $y \cdot y_1 = 2a(x + x_1)$ $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের $(1, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ: $-2y = 2x + 2$ $\Rightarrow 2x + 2y + 2 = 0 \therefore x + y + 1 = 0$
12	B	$y = ax - ax^2$ $\therefore \frac{dy}{dx} = a - 2ax$ এখন, মূলবিন্দু $(0, 0)$ তে $\frac{dy}{dx} = a - 2a \cdot 0 = a$ $\therefore$ মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x-অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে, $\therefore \frac{dy}{dx} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}}$
13	B	প্রদত্ত রেখা, $y = x^2 + 5; \frac{dy}{dx} = 2x$ এখন, $(1, 6)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = 2 \times 1 = 2$
14	B	$\frac{d}{dx} (\sqrt{e^{\sqrt{x}}}) = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}}$ $= \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{e^{\sqrt{x}}}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$
15	D	ধরি, $y = \log_x e = \frac{1}{\ln x} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{-1}{x(\ln x)^2}$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
16	B	$y = \ln [x - \sqrt{x^2 - 1}]$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \cdot \frac{d}{dx} (x - \sqrt{x^2 - 1})$ $= \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \left(1 - \frac{1}{2} (x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x \right)$ $= \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \right) = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \left(\frac{\sqrt{x^2 - 1} - x}{\sqrt{x^2 - 1}} \right)$ $= \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \left\{ -\frac{(x - \sqrt{x^2 - 1})}{\sqrt{x^2 - 1}} \right\} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1}}$
17	B	দেওয়া আছে, $z = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ $\therefore \tan^{-1} \sqrt{z} = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \tan^{-1} \sqrt{\frac{2 \sin^2(x/2)}{2 \cos^2(x/2)}}$ $= \tan^{-1} \sqrt{\tan^2 \frac{x}{2}} = \tan^{-1} \tan \frac{x}{2} = \frac{x}{2}$ এখন, $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} \sqrt{z}) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} \right) = \frac{1}{2}$
18	A	$y = \cos^{-1} \frac{x - x^{-1}}{x + x^{-1}} = \cos^{-1} \frac{1 - x^2}{1 + x^2} = -2 \tan^{-1} x$ $\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{1 + x^2}$
19	C	$y = \sec x^\circ = \sec \frac{x\pi}{180}$ $\therefore \frac{dy}{dx} = \left(\sec \frac{x\pi}{180} \tan \frac{x\pi}{180} \right) \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{180} \sec x^\circ \tan x^\circ$
20	B	$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{1 + \sin 2x}}{\sin x + \cos x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x}}{\sin x + \cos x} \right)$ $= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}}{\sin x + \cos x} \right)$ $= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} \right) = \frac{d}{dx} (1) = 0$
21	A	$y = x \sqrt{x+1}$ $\therefore \frac{dy}{dx} = \sqrt{x+1} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2x+2+x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$
22	C	$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{e^{x+2}} \right) = \frac{e^{x+2} \cdot 2x - x^2 \cdot e^{x+2}}{(e^{x+2})^2} = \frac{xe^{x+2} (2-x)}{(e^{x+2})^2} = \frac{x(2-x)}{e^{x+2}}$
23	B	$y = x^{-\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = -\frac{1}{x} \ln x$ $\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = -\left\{ \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot \frac{d}{dx} (x^{-1}) \right\} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} \ln x$ $\frac{dy}{dx} = y \cdot \frac{1}{x^2} (\ln x - 1) = x^{-\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} (\ln x - 1) = \frac{1}{x^{2+\frac{1}{x}}} (\ln x - 1)$
24	B	$\frac{d}{dx} (x^2 + y^2) = \frac{d}{dx} (25) \Rightarrow 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$ $\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \quad \therefore (3, -4) \text{ বিন্দুতে } \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}$
25	A	$x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0 \Rightarrow x^2(1+y) = y^2(1+x)$ $\Rightarrow x^2 + x^2y - y^2 - xy^2 = 0$ $\Rightarrow x^2 - y^2 + xy(x-y) = 0 \Rightarrow (x-y)(x+y+xy) = 0$ $\Rightarrow x+y+xy = 0 \quad [\because x \neq y]$ $\Rightarrow y = -\frac{x}{1+x} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(1+x)+x}{(1+x)^2} = \frac{-1}{(1+x)^2}$

অধ্যায়
১০
প্রথম পত্র

যোগজীকরণ

প্রথম অংশ: অনির্দিষ্ট যোগজীকরণ [INDEFINITE INTEGRATION]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	মত্রে
01	Basic Formula সংক্রান্ত	**
02	বিশেষ আকারের যোগজ	**
03	প্রতিস্থাপন পদ্ধতি [Method of Substitution]	*
04	Some Special Formula	*
05	Integration by parts সংক্রান্ত	**

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

TOPIC 01 Basic Formula সংক্রান্ত

□ যোগজীকরণ/ সমাকলন: Integration হলো অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া বা প্রতি অন্তরক প্রক্রিয়া, যা প্রকাশ করা হয় $\int f(x) dx = F(x) + c$ দ্বারা।
এখানে, $f(x)$ ফাংশনটি যোগ্য রাশি (Integrand);
 $F(x)$ ফাংশনটি অনির্দিষ্ট যোগজ (Indefinite Integral); c সমাকলন/ইচ্ছামূলক ধ্রুবক (Orbitary Constant)

□ Linear Properties of Integrals
 $\int \{f_1(x) \pm f_2(x)\} dx = \int f_1(x) dx \pm \int f_2(x) dx$
 $\therefore \int \{f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)\} dx$
 $= \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx + \dots + \int f_n(x) dx$

□ Scalar Multiplication of Integrals
 $\int \{Kf(x)\} dx = K \int f(x) dx$
 $\therefore \int \{K_1 f_1(x) \pm K_2 f_2(x)\} dx = K_1 \int f_1(x) dx \pm K_2 \int f_2(x) dx$

Required Formulas for Integration General Formula

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1 \quad \int \frac{1}{x^n} dx = \frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c \quad \int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + c$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad [a > 0, a \neq 1]$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int (u \pm v) dx = \int u dx \pm \int v dx$
- $\int uv dx = u \int v dx - \int \left[\frac{d}{dx} (u) \int v dx \right] dx$
- $\int \cos x dx = \sin x + c$
- $\int \sin x dx = -\cos x + c$
- $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$
- $\int \csc^2 x dx = -\cot x + c$
- $\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$
- $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + c$

Standard Formula

13. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$
14. $\int \frac{f(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$
15. $\int \tan x dx = -\ln(\cos x) + c = \ln(\sec x) + c$
16. $\int \sec x dx = \ln \tan\left[\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right] + c = \ln|\sec x + \tan x| + c$
17. $\int \cot x dx = \ln(\sin x) + c = -\ln(\csc x) + c$
18. $\int \cos \csc x dx = \ln\left|\tan \frac{x}{2}\right| + c = -\ln(\csc x + \cot x) + c$
19. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$ i. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c$
20. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$ i. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$
21. $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$
22. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + c$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - a^2} \right) + c$
25. $\int \frac{a+x}{a-x} dx = a \sin^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + c$
26. $\int \frac{a-x}{a+x} dx = a \sin^{-1} \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + c$
27. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{-x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$
28. $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + c$
29. $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$
30. $\int \ln x dx = x \ln x - x + c$
31. $\int \tan^{-1} x dx = x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + c$
32. $\int \sin^{-1} x dx = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$

LAW STORMING || MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x + e^{2x}}} = ?$ [RU:09-10; IU:14-15; MBSTU: 13-14; য.বো. 2010]

Solve $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}(1+e^{-x})}}} = \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{1+e^{-x}}} dx = -\ln(1+e^{-x}) + c$

MEEx 02 $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{1-6x}}$ এর যোজিত ফল- [CU: 13-14, 12-13, 02-03; KU: 10-11; KUET: 04-05; JU: 12-13; BUTex: 13-14]

Solve $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{1-6x}} = \int (1-6x)^{-\frac{1}{3}} dx = \left(\frac{-1}{6} \right) \frac{(1-6x)^{-\frac{1}{3}+1}}{-\frac{1}{3}+1} = -\frac{1}{4} (1-6x)^{\frac{2}{3}}$

TOPIC 02 বিশেষ আকারের যোগজ

Type-01: $\int \frac{ax+b}{cx+d} dx$ আকারের Integral

Technique: $cx+d$ কে z ধরে নেওয়া হবে।

Type-02: $\int \sqrt{1 \pm \cos 2x} dx$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1 \pm \cos 2x}}$ আকারের Integral

Technique: এক্ষেত্রে নিম্নের সূত্রগুলো ব্যবহার করতে হবে।

(i) $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$ (ii) $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$

Type-03: $\int \sqrt{1 \pm \sin 2x} dx$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1 \pm \sin 2x}}$ আকারের Integral

Technique: $\sqrt{1 \pm \sin 2x} = \sqrt{\sin^2 x \pm 2\sin x \cos x + \cos^2 x} = (\sin x \pm \cos x)$ তে পরিবর্তন করে সমাধান করতে হবে।

LAW STORMING || MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\int \frac{\cos 2x}{\sqrt{1 - \sin 2x}} dx = ?$

Solve $\int \frac{\cos 2x}{\sqrt{1 - \sin 2x}} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sqrt{\sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x}} dx$
 $= \int \frac{(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)}{\sqrt{(\sin x - \cos x)^2}} dx$
 $= \int (\cos x + \sin x) dx$ অথবা $-\int (\cos x + \sin x) dx$
 $= \sin x - \cos x + c \Rightarrow -(\sin x - \cos x) + c$
 $= \pm (\sin x - \cos x) + c$ (Ans.)

Type-04: $\int \frac{dx}{1 \pm \sin ax}$, $\int \frac{dx}{1 \pm \cos ax}$ আকারের Integral

Technique:

Step 01: হরের অনুবন্ধী দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করতে হবে।

Step 02: নিম্ন লিখিত সূত্রগুলো প্রয়োগ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

(i) $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$

(ii) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$

(iii) $\int \csc x dx = -\cot x + c$

(iv) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + c$

Type-05: $\int \sin^2(ax+b) dx$, $\int \cos^2(ax+b) dx$ আকারের Integral

Technique: এক্ষেত্রে নিম্নের সূত্রগুলো ব্যবহার করতে হবে।

(i) $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$

(ii) $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\int \sin^2(ax+b) dx = ?$

Solve $\int \sin^2(ax+b) dx = \frac{1}{2} \int 2\sin^2(ax+b) dx$
 $= \frac{1}{2} \int \{1 - \cos(2ax+2b)\} dx = \frac{1}{2} \left\{ x - \frac{\sin(2ax+2b)}{2a} \right\} + c$ (Ans.)

Type-06: $\int \sin px \sin qx dx / \int \sin px \cos qx dx / \int \cos px \cos qx dx$ আকারের Integral

Technique: এক্ষেত্রে নিম্নর সূত্র গুলো ব্যবহার করতে হবে।

(i) $\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$

(ii) $\cos A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]$

(iii) $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$

(iv) $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

MEx 01 $\int 5\cos 5x \sin 4x dx = ?$ [জা. বো. ২০০৫; দি. বো.: ২০১৪; সি. বো. ২০১৪]

Solve $\int \sin px \cos qx dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos(p+q)x}{p+q} + \frac{\cos(p-q)x}{p-q} \right] + c$

Type-07: $\int \sin^n x dx, \int \cos^n x dx$ আকারের Integral যেখানে $n \in \mathbb{N}$

Technique: n জোড় সংখ্যা হলে,

(i) $\int \sin^n x dx$ কে $\frac{1}{2} \int 2\sin^n x dx$ আকারে আনতে হবে।

এবং $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$ এর সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

(ii) $\int \cos^n x dx$ কে $\frac{1}{2} \int 2\cos^n x dx$ আকারে আনতে হবে।

এবং $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$ এর সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

n বিজোড় হলে: (i) $\int \sin^n x dx$ এর জন্য $\cos x = z$ ধরতে হবে।
 (ii) $\int \cos^n x dx$ এর জন্য $\sin x = z$ ধরতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\int \sin^5 x dx = ?$ [RUET: 10-11]

Solve $\int \sin^5 x dx = \int \sin^4 x \cdot \sin x dx$
 $= \int (\sin^2 x)^2 \cdot \sin x dx$
 $= \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx$
 $= -\int (1 - z^2)^2 dz = -\int (1 - 2z^2 + z^4) dz$
 $= -\left[z - \frac{2}{3}z^3 + \frac{z^5}{5} \right] + c$
 $= -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + c$

Type-08: $\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$ আকারের Integral

Technique:01 m ও n উভয়ই বিজোড় হলে যার Power বড় সেটা = z ধরতে হবে।

Technique:02 m ও n এর মধ্যে জোড় এবং অপরটি বিজোড় হলে যার Power জোড় সেটা = z ধরতে হবে।

Technique:03 m ও n উভয়ই জোড় হলে, $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ এবং $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

MEx 01 $\int \sin^3 x \cos^4 x dx = ?$

Solve $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$
 $= \int (1 - \cos^2 x) \cos^4 x \cdot \sin x dx = -\int (1 - z^2) z^4 dz$
 $= \int (z^6 - z^4) dz = \frac{1}{7} z^7 - \frac{1}{5} z^5 + c = \frac{1}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + c$

[RU. 00-01]
 ধরি, $\cos x = z$
 $-\sin x dx = dz$

Type-09: $\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{ax+c}}$ আকারের Integral যেখানে a, b, c ধ্রুবক

Technique: হরের অনুবন্ধী দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\int \frac{dx}{\sqrt{2x+5} + \sqrt{2x-3}}$

Solve $\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{ax+c}} = \frac{1}{b-c} \times \frac{2}{3a} \{ (ax+b)^{3/2} - (ax+c)^{3/2} \} + c$

Type-10: $\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}$ আকারের Integral যেখানে a, b, c যে কোন ধ্রুবক সংখ্যা

Technique: $\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}$ আকারের Integral solve করার জন্য দুটি Step Follow করতে হবে।

Step 01: $ax^2 + bx + c$ কে দুটি বর্গের সমষ্টি বা অন্তরফল রূপে প্রকাশ করতে হবে।

Step 02: নিম্ন লিখিত সূত্র গুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

(i) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

(ii) $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$

(iii) $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\int \frac{dx}{5+4x-x^2} = ?$

[KUET. 04-05; RUET. 04-05]

Solve $\int \frac{dx}{5+4x-x^2} = \int \frac{dx}{9-x^2+4x-4} = \int \frac{dx}{9-(x-2)^2} = \frac{1}{2.3} \ln \left| \frac{3+(x-2)}{3-(x-2)} \right| + c = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1+x}{5-x} \right| + c$

Type-11: $\int \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$ আকারের Integral

Technique: লবকে $\sqrt{\quad}$ মুক্ত করতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\int \sqrt{\frac{5-x}{5+x}} dx = ?$

[KU. 03-04]

Solve $\int \sqrt{\frac{5-x}{5+x}} dx = \int \frac{5-x}{\sqrt{5^2-x^2}} dx = \int \frac{5}{\sqrt{5^2-x^2}} dx - \int \frac{x}{\sqrt{5^2-x^2}} dx$
 $= 5 \int \frac{dx}{\sqrt{5^2-x^2}} + \frac{1}{2} \int \frac{(-2x)}{\sqrt{5^2-x^2}} dx$
 $= 5 \sin^{-1} \frac{x}{5} + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{5^2-x^2} + c = 5 \sin^{-1} \frac{x}{5} + \sqrt{25-x^2} + c$

Type-12: $\int \frac{dx}{a + b \sin^2 x}$; $\int \frac{dx}{a + b \cos^2 x}$; $\int \frac{dx}{a \sin^2 x + b \cos^2 x}$;
 $\int \frac{dx}{a \sin^2 x + b \cos^2 x + c}$ আকারের Integral

Technique: লব ও হর কে $\sec^2 x$ দ্বারা গুণ করে হরকে $\tan x$ এর ফাংশন আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং $\tan x = z$ ধরতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\int \frac{1+x}{1-x} dx = ?$ [DU: 12-13, DU: 95-96; JU: 07-08]

Solve $\int \frac{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} dx \left[\because \int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c \right]$
 $= \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} + c = \sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

TOPIC 03 প্রতিস্থাপন পদ্ধতি [Method of Substitution]

□ প্রদত্ত যোজ্য রাশি এর অন্তর্ভুক্ত কোন ফাংশনের পরিবর্তে একটি চলরাশি স্থাপন করে যোজিত ফল নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বলে।

Technique: যদি ইন্টিগ্র্যান্ড এর কোন অংশ এর অন্তরক dx এর সাথে গুণ আকারে থাকে তবে সেই অংশটিকে z ধরে সরলীকরণ করার পর ইন্টিগ্রেশন করতে হয়।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx$ সমান- [DU 15-16, 14-15, 11-12, 07-08; IU 16-17, CU 15-16, JNU 07-08; KU 03-04]

Solve $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx = \int \sec^2(xe^x) \cdot \{e^x(1+x)\} dx$
 $= \tan(xe^x) + c$
Ans. $\therefore \int \sec^2\{f(x)\} \cdot f'(x) dx = \tan\{f(x)\} + c$

TOPIC 04 Some Special Formula

Technique:01 $\int e^{ax} [f(x) + f'(x)] dx = e^{ax} f(x) + c$

Technique:02 $\int e^x [f(x) + f'(x)] dx = e^x f(x) + c$

Technique:03 $\int e^{ax} \sin(bx + d) dx$

$= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \{a \sin(bx + d) - b \cos(bx + d)\}$

$= \frac{e^{ax}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin(bx + d - \tan^{-1} \frac{b}{a}) + c$

Technique:04 $\int e^{ax} \cos(bx + d) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}$

$\{a \cos(bx + d) + b \sin(bx + d)\}$

$= \frac{e^{ax}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos(bx + d - \tan^{-1} \frac{b}{a}) + c$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ?$ [DU 17-18; DU 09-10, DU 97-98; JU 17-18, IU 17-18, KU 16-17, 19-20, 15-16, JU 06-07; CU 04-05]

Solve $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \int \frac{e^x dx}{1 + (e^x)^2}$
 $\left[\because \int \frac{f'(x) dx}{a^2 + \{f(x)\}^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left\{ \frac{f(x)}{a} \right\} + c \right] = \tan^{-1} e^x + c$

MEEx 02 $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx = f(x) + c$ হলে, $f(x) = ?$ [DU: 10-11, 01-02, 00-01; NU: 11-12, RU: 09-10, 08-09, 05-06, 04-05; JU: 06-07; CU: 02-03]

Solve $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx = \int e^x \frac{(x+1-1)}{(x+1)^2} dx = \int e^x \left\{ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right\} dx$
 $= \frac{e^x}{x+1} + c \therefore \int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

TOPIC 05 Integration by parts সংক্রান্ত


□ Integration by parts: যে পদ্ধতিতে দুইটি সমাকলন যোগ্য ফাংশনের গুণফলের সমাকলিত মান নির্ণয় করা হয়, তাকে সংযুক্ত পদ্ধতিতে যোগজীকরণ বলা হয়।

Technique:01 Follow the following order of functions to integrate by parts of a integrand which consist of two functions:

$\int uv dx = u \int v dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v dx \right) dx + c$ এই ক্ষেত্রে "LIATE" এর মাধ্যমে u বাছাই করে Problem Solve করতে হবে।

কোন function টিকে u বা v ধরতে হবে তার নিয়ম: LIATE অনুক্রমের প্রথম function টিকে u ও অপরটিকে v ধরতে হবে।

LIATE



LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\int \ln x dx = ?$ [JNU 15-16, RU 10-11, JU 09-10, RU 07-08; KU 06-07, CU 06-07]

Solve $\int \ln x dx = \ln x \int 1 dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int 1 dx \right\} dx = \ln x \cdot x - \int \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) dx$
 $= x \ln x - x + c$
 $\int \ln x dx = x \ln x - x$
 formula আকারে মনে রাখতে পার MCQ এর জন্য

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নাল ভাষ্যসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. যদি $\int \phi(x) dx = \ln(\ln x) + C$ হয় যেখানে C একটি ধ্রুবক, তবে $\phi(x) = ?$ [GST-A-20-21]

A. $x \ln(\ln x) + x$ B. $\frac{x}{\ln x}$ C. $\frac{1}{x \ln x}$ D. $x \ln x$

Sol $\int \phi(x) dx = \ln(\ln x) + C$

$\therefore \phi(x) = \frac{d}{dx} \ln(\ln x) = \frac{1}{x \ln x}$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int e^{2x} dx$ এর মান কত? [JNU 16-17]

- A. $\frac{1}{2}e^{2x} + c$ B. $e^{2x} + c$ C. $\frac{1}{2}e^x + c$ D. $2e^{2x} + c$

[S@Why] $\int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + c$

02. $\int \ln x dx = ?$ [JNU 15-16, RU 10-11, JU 09-10, RU 07-08; KU 06-07, CU 06-07]

- A. $x \ln x - x^2$ B. $x \ln x - e^x$
C. $x \ln x - x$ D. $x \ln x - e^{2x}$

[S@Why] $\int \ln x dx$

$= \ln x \int 1 dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int 1 dx \right\} dx = \ln x \cdot x - \int \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) dx$

$= x \ln x - x + c$ $\int \ln x dx = x \ln x - x$
formula আকারে মনে রাখতে পার MCQ এর জন্য

03. $\int \sin^{-1} x dx$ সমান- [JNU 14-15, CU 14-15; ঢা.বো. ২০১৪; য.বো. ২০১০, ০৩; য.বো. ২০১২]

- A. $\sin^{-1} x + \sqrt{(1-x^2)} + c$ B. $x \sin^{-1} x + \sqrt{(1-x^2)} + c$
C. $\sin^{-1} x + c$ D. $\sin^{-1} x + \sqrt{(1-x)} + c$

[S@Why] $\int \sin^{-1} x dx = \sin^{-1} x \int 1 dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) \int 1 dx \right\} dx$

$= x \sin^{-1} x - \int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x \right) dx = x \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$= x \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} + c = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$

$\int \sin^{-1} x dx = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$
formula আকারে মনে রাখতে পার MCQ এর জন্য

04. $\int \frac{3x^2}{1+x^6} dx = f(x) + c$ হলে $f(x)$ এর মান কত? [JNU 11-12]

- A. $\tan^{-1} x^3$ B. $\sin^{-1} x^3$
C. $\frac{1}{1+x^3}$ D. $\cos^{-1} x^3$

[S@Why] $\int \frac{3x^2}{1+x^6} dx = \int \frac{3x^2 dx}{1+(x^3)^2}$ $\therefore \int \frac{f(x) dx}{a^2 + [f(x)]^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{f(x)}{a} \right) + c$ $= \tan^{-1} (x^3) + c$

05. $\int e^x \left\{ f(x) + \frac{d}{dx} (f(x)) \right\} dx$ [JNU 09-10; KU 18-19; JU 13-14; CU 12-13; HSTU 09-10; PUST 09-10]

- A. $e^x + c$ B. $e^x f(x) + c$
C. $f(x) + c$ D. $e^x / f(x) + c$

[S@Why] $\int e^x \left\{ f(x) + \frac{d}{dx} (f(x)) \right\} dx = e^x f(x) + c$

06. $\frac{1}{\sin^2 x \sqrt{\cot x}}$ এর একটি অনিদিষ্ট যোগজ- [JNU 08-09]

- A. $\sqrt{\cot x} \ln (\sin x)$ B. $\sin x \sqrt{\tan x}$
C. $-2\sqrt{\cot x}$ D. $\frac{2}{3} (\tan x)^{\frac{1}{2}}$

[S@Why] $\int \frac{dx}{\sin^2 x \sqrt{\cot x}} = \int \frac{\sec^2 x dx}{\sqrt{\cot x}}$ $\therefore \int \frac{f(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} + c$ $= -2\sqrt{\cot x} + c$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

[KU 19-20]

01. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ?$

- A. $-\tan e^x + c$ B. $\tan e^x + c$
C. $\cot^{-1} e^x + c$ D. $\tan^{-1} e^x + c$

[S@Why] $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{(e^x)^2 + 1}$

$= \int \frac{dz}{z^2 + 1} = \tan^{-1}(z) + c = \tan^{-1}(e^x) + c$ $\left| \begin{array}{l} \text{ধরি, } e^x = z \\ e^x dx = dz \end{array} \right.$

02. $\int \frac{d\theta}{1+3\cos^2\theta}$ এর মান কোনটি? [KU-18-19; BUTex. 02-03]

- A. $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{\tan\theta}{2} \right) + c$ B. $\tan^{-1} \left(\frac{\tan\theta}{2} \right) + c$
C. $\frac{1}{2} \cos^{-1} \left(\frac{\tan\theta}{2} \right) + c$ D. $\cos^{-1} \left(\frac{\tan\theta}{2} \right) + c$

[S@Why] $\int \frac{d\theta}{1+3\cos^2\theta} = \int \frac{\sec^2\theta d\theta}{\sec^2\theta + 3}$

$= \int \frac{\sec^2\theta d\theta}{1 + \tan^2\theta + 3}$ $\left| \begin{array}{l} \text{ধরি,} \\ \tan\theta = z \\ \sec^2\theta d\theta = dz \end{array} \right.$

$= \int \frac{dz}{4+z^2} = \int \frac{dz}{2^2+z^2}$
 $= \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{z}{2} + c = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{\tan\theta}{2} \right) + c$

03. $\int \frac{5e^{2x}}{1+e^{4x}} dx = ?$ [KU 12-13]

- A. $\frac{2}{5} \tan(e^{-2x})$ B. $\frac{5}{2} \tan(e^{2x})$
C. $\frac{5}{2} \tan^{-1}(e^{2x})$ D. $\frac{5}{2} \tan^{-1}(e^{-2x})$

[S@Why]

$\int \frac{5e^{2x}}{1+e^{4x}} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2e^{2x}}{1+(e^{2x})^2} dx = \frac{5}{2} \int \frac{d(e^{2x})}{1+(e^{2x})^2} = \frac{5}{2} \tan^{-1}(e^{2x}) + c$

04. $\int (3x-7)^7 dx$ নির্ণয় যোগজ হলো? [KU: 11-12]

- A. $\frac{4x}{10}$ B. $\frac{(3x-7)^8}{24}$ C. $\frac{3x}{7}$ D. $\frac{4}{3x}$

[S@Why] $\int (3x-7)^7 dx = \frac{(3x-7)^8}{3 \times 8} = \frac{(3x-7)^8}{24}$

05. $\int \frac{\tan(\log x)}{x} dx = ?$ [KU 11-12]

- A. $\log(\sec x)$ B. $\log(\sec^2 x)$
C. $\log \sec(\log x) + c$ D. $\log(\tan^2 x)$

[S@Why] $\int \frac{\tan(\log x)}{x} dx = \int \tan(\log x) \cdot d(\log x)$
 $= \log \sec(\log x) + c$

06. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ এর যোগজ নির্ণয় কর? [KU:08-09; RUET:05-06, সি.বো.11; য.বো.06]

- A. $-\sqrt{1-x^2}$ B. $\sqrt{1-x^2}$
C. $\sqrt{1+x^2}$ D. $-\sqrt{1+x^2}$

[S@Why] $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{1}{2} 2\sqrt{1-x^2} = -\sqrt{1-x^2}$

01. $\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{4 - \cos^2 x}} = ?$

[IU-A. 19-20]

A. $-2 \cos^{-1} x + c$

B. $-\sin^{-1} \left(\frac{\cos x}{2} \right) + c$

C. $-2 \sin^{-1} x + c$

D. $-\frac{\sin^{-1} x}{2} + c$

[S.O. Why] $-\int \frac{dz}{\sqrt{4 - z^2}}$

$= -\sin^{-1} \frac{z}{2} + c = -\sin^{-1} \left(\frac{\cos x}{2} \right) + c$

02. $\int \tan x dx = ?$

[IU-D. 19-20]

A. $\ln |\cos x| + c$

B. $\ln |\sec x| + c$

C. $\ln |\sin x| + c$

D. $\ln \cos x + c$

[S.O. Why] $\int \tan x dx = \ln |\sec x| + c$

03. $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx = ?$

[IU:18-19; RU:09-10]

A. $x + c$

B. $\sqrt{\sin x} + c$

C. $\sin 2x + c$

D. 0

[S.O. Why] $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx = \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}} dx$

$= \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int (1) dx = x + c$

04. $\int \frac{dx}{4 - x^2}$ এর সমাধান-

[IU 17-18]

A. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + c$

B. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

C. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{2-x}{2+x} \right| + c$

D. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x}{2+x} \right| + c$

[S.O. Why] $\int \frac{dx}{4 - x^2} = \int \frac{dx}{2^2 - x^2}$

$= \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + c = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + c$

05. $\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx$ এর সমাধান-

[IU 17-18]

A. $-\ln(\ln \cos x) + c$

B. $-\ln(\cos x) + c$

C. $-\ln(\cot x) + c$

D. $-\ln(\ln \cot x) + c$

[S.O. Why] $\ln \cos x = z$ ধরে, $\frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = \frac{dz}{dx} \Rightarrow -\tan x dx = dz$

$\therefore \int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx = -\int \frac{-\tan x}{\ln \cos x} dx = -\int \frac{dz}{z} = -\ln z = -\ln(\ln \cos x) + c$

06. $\int \frac{1}{x(1 + \ln(x))} dx$ এর মান কত? [IU 17-18; RU 08-09; BSMRSTU. 16-17]

A. $\ln(1 - \ln x) + c$

B. $-\ln(1 - \ln x) + c$

C. $-\ln(\ln x - 1) + c$

D. $\ln(1 + \ln x) + c$

[S.O. Why]

$\int \frac{1}{x(1 + \ln(x))} dx = \int \frac{\frac{1}{x} dx}{1 + \ln x} \left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c \right] = \ln(1 + \ln x) + c$

07. যোগজ $\int \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x} \right) dx$ এর মান-

[IU. 16-17; জা.বো. ২০০২; বা.বো. ২০০৯]

A. $x^2 - \frac{1}{x} + c$ B. $x - \frac{1}{x^2} + c$ C. $x + \frac{1}{x} + c$ D. $x - \frac{1}{x} + c$

[S.O. Why] $\int \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x} \right) dx = \int \left(1 + \frac{1}{x} \right) dx = x + \frac{1}{x} + c$

08. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}}$ এর মান কোনটি?

[IU: 16-17, E]

A. $\frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{x}{a}$ B. $\sec^{-1} \frac{x}{a}$ C. $\cos^{-1} \frac{x}{a}$ D. $\sin^{-1} \frac{x}{a}$

[S.O. Why] $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \sec^{-1} \frac{x}{a}$

09. $\int \tan^2 x dx$

[IU 15-16, RU 09-10]

A. $\sec^2 x + C$

B. $\tan x - x + C$

C. $\sec x + \tan x + C$

D. $x - \tan^2 x + C$

[S.O. Why] $\int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + c$

10. $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx$ এর যোজিত ফল নির্ণয় কর-

[IU 15-16]

A. $\tan x - \cot x - c$

B. $\tan x + \cot x + c$

C. $\tan x - \cot x + c$

D. $\sin x - \operatorname{cosec} x + c$

[S.O. Why] $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx = \int \sec^2 x (1 + \cot^2 x)$

$= \int (\sec^2 x + \sec^2 x \cot^2 x) dx = \tan x - \cot x + c$

11. $\int e^{2t} \cos e^t dt = ?$

[IU: 14-15, E]

A. $\frac{e^t}{1-t}$ B. $\frac{e^{-t}}{t}$ C. $e^t \sin e^t + \operatorname{cose}^t$ D. $\frac{e^t}{1+t}$

[S.O. Why] $\int e^{2t} \cos e^t dt = \int e^t \cdot e^t \cos e^t dt$

ধরি, $e^t = z$, $\therefore e^t dt = dz \therefore \int z \cos z dz$
 $= z \sin z - \int 1 \cdot \sin z dz = z \sin z + \cos z = e^t \sin e^t + \operatorname{cose}^t + c$

12. $\int e^x \sec x (1 + \tan x) dx = ?$

[IU. 14-15, 13-14; MBSTU-A. 15-16; RU. 06-07; বা.বো.১১; চ.বো. ১০]

A. $e^x \tan x$

B. $e^x \sec x$

C. $e^x \cot x$

D. $e^x \operatorname{cosec} x$

[S.O. Why] $\int e^x \sec x (1 + \tan x) dx$

$= \int e^x (\sec x + \sec x \tan x) dx = e^x \sec x$

13. $\int \frac{1}{x^2} dx = ?$

[IU:13-14]

A. $-\frac{1}{x}$

B. $\frac{1}{x}$

C. x^2

D. $\frac{1}{x^2}$

[Ans A]

14. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}}$ এর যোগজ নির্ণয় কর।

[IU 12-13, KU 08-09]

A. $-\sqrt{1-x^2}$

B. $\sqrt{1-x^2}$

C. $\sqrt{1+x^2}$

D. $-\sqrt{1+x^2}$

[S.O. Why]

$\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{\sqrt{1+x^2}} \left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c \right] = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+x^2} + c$

04. $\int x^2 [1 + \ln(x^3 + 1)] dx = ?$ [SUST:16-17]

- A. $(x^3 + 1) \ln(x^3 + 1)$ B. $\frac{1}{3} (x^3 + 1) \ln(x^3 + 1)$ C. $\frac{x^3 + 1}{\ln(x^3 + 1)}$
D. $\frac{3(x^3 + 1)}{\ln(x^3 + 1)}$ E. $\frac{\ln(x^3 + 1)}{x^3 + 1}$

[S@Why] $\int x^2 [1 + \ln(x^3 + 1)] dx$

ধরি, $x^3 + 1 = z \therefore 3x^2 dx = dz \therefore x^2 dx = \frac{dz}{3}$

$\therefore \int (1 + \ln z) \frac{dz}{3} = \frac{1}{3} [\int (1) dz + \int \ln z dz]$

$= \frac{1}{3} [z + z \ln z - z] = \frac{1}{3} z \ln z = \frac{1}{3} (x^3 + 1) \ln(x^3 + 1) + c$

05. $\int e^x \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2} \right) dx$ এর মান কত? [SUST:13-14]

- A. e^x B. $(x+2)e^x$ C. $(x+2)^2 e^x$
D. $\frac{e^x}{(x+2)^2}$ E. $\frac{e^x}{(x+2)}$

[S@Why] $\int e^x \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2} \right) dx = \frac{e^x}{(x+2)}$

06. $\int \frac{dx}{x^2 - 3x + 2} = ?$ [SUST 10-11]

- A. $\ln(x-2) - \ln(x-1)$ B. $\ln(x-2) + \ln(x-1)$
C. $\ln(x+2) - \ln(x+1)$ D. $\ln(x+2) + \ln(x+1)$

[S@Why] $\int \frac{dx}{x^2 - 3x + 2} = \int \frac{dx}{(x-2)(x-1)} = \int \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx$
 $= \ln(x-2) - \ln(x-1) + c$

07. y একটি বক্ররেখা যা $(0, 3)$ বিন্দু দিয়ে যায়। $\frac{dy}{dx} = x^2 + x + 1$ হলে y কে x এর

ফাংশন হিসাবে প্রকাশ কর?

- A. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$ B. $y = 2x + 1$
C. $y = \frac{x^3}{2} + x + 3$ D. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 3$

[S@Why] $\frac{dy}{dx} = x^2 + x + 1 \Rightarrow dy = (x^2 + x + 1) dx$

$\Rightarrow \int dy = \int (x^2 + x + 1) dx \therefore y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + c$

বক্ররেখা $(0, 3)$ বিন্দু দিয়ে যায় $3 = 0 + 0 + 0 + c$

$\Rightarrow c = 3 \therefore y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 3$ Ans.

08. $\int x \log(1 + 2x) dx$ এর মান কত? [SUST 06-07]

- A. $\frac{1}{2} x^2 \log(1 + x) + x$ B. $\log(1 + 2x)$
C. $\frac{x}{1 + 2x} + \log(1 + 2x)$
D. $\frac{1}{2} x^2 \log(1 + 2x) - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{4} - \frac{1}{8} \log(1 + 2x)$

[S@Why] Option D কে $\frac{d}{dx}$ করলে $x \log(1 + 2x)$ পাওয়া যায়।

09. $\int \frac{dx}{ay - bx}$ এর মান- [SUST 06-07]

- A. $-\frac{1}{b} \log(ay - bx) + c$ B. $\log(ay - bx) + c$
C. $\frac{1}{b} \log(ay - bx) + c$ D. $-\frac{1}{b} \log(bx - ay) + c$

[S@Why] $\int \frac{dx}{ay - bx} = -\frac{1}{b} \log(ay - bx) + c$

10. $\int x \log x dx$ এর মান- [SUST:05-06; IU:11-12, A]

- A. $1 + x + c$ B. $\frac{1}{2} x^2 \log x - \frac{1}{4} x^2 + c$
C. $0 + c$ D. $1 + \log x + c$

[S@Why] $\int x \log x dx = \frac{x^{1+1}}{(1+1)^2} \{ (1+1) \log x - 1 \} + c$
 $= \frac{x^2}{4} (2 \log x - 1) + c = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4} + c$

11. $\int \frac{dx}{9 - x^2} =$ কত? [SUST - A; 02-03]

- A. $\frac{1}{6} \log \frac{3+x}{3-x}$ B. $\log \frac{3+x}{3-x}$
C. $\frac{1}{6} \log \frac{3-x}{3+x}$ D. $6 \log \frac{3+x}{3-x}$

[S@Why] $\int \frac{dx}{9 - x^2} = \frac{1}{2 \times 3} \cdot \log \frac{3+x}{3-x} + c = \frac{1}{6} \cdot \log \frac{3+x}{3-x} + c$

12. $\int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx = ?$ [SUST: 00-01, A]

- A. $\frac{1}{2} \sin^{-1} x + c$ B. $\frac{1}{2} \sin^{-1} x$
C. $\frac{1}{2} (\sin^{-1} x)^2 + c$ D. $\frac{1}{2} (\cos^{-1} x)^2 + c$

[S@Why] $\int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} (\sin^{-1} x)^2 + c$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1 + \tan x}}$ এর মান- [JUST-C. 19-20; PUST. 14-15; CUET. 10-11]

- A. $2\sqrt{1 + \tan x} + c$ B. $\sqrt{1 + \tan x} + c$
C. $2\sqrt{1 + \tan x}$ D. None

[S@Why] $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1 + \tan x}} = \int \frac{\sec^2 x dx}{\sqrt{1 + \tan x}} = 2\sqrt{1 + \tan x} + c$

02. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = ?$ [JUST-18-19]

- A. $\sin^{-1} \frac{x}{a} + c$ B. $\cos^{-1} \frac{x}{a} + c$
C. $\frac{1}{a} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$ D. $\frac{1}{a} \cos^{-1} \frac{x}{a} + c$

[S@Why] See standard formula-20.

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int e^x \sin x dx =$ কত? [MBSTU-18-19]

- A. $\frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C$ B. $\frac{e^x}{2} (\sin x + \cos x) + C$
C. $\frac{e^x}{2} (\cos x - \sin x) + C$ D. $\frac{e^x}{2} (\sec x - \cos x) + C$

[S@Why] $\int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{1^2 + 1^2} (1 \cdot \sin x - 1 \cdot \cos x) + c$
 $= \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + c$

02. $\int \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \text{কত?}$

[MBSTU:17-18]

- A. $\frac{1}{\ln x}$ B. $-\frac{1}{\ln x}$ C. $\frac{1}{x}$ D. $\ln x$

[S⊗Why] $\int \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \int \frac{\frac{1}{x}}{(\ln x)^2} dx = -\frac{1}{\ln x}$

[ম] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[ম]**

01. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ কত?

[BSMRSTU-B. 19-20]

- A. $-\frac{1}{\sqrt{x}}$ B. $2\sqrt{x}$ C. $\frac{3}{\sqrt{x}}$ D. $\sqrt{x}$

[S⊗Why] $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{x} + c$

02. $\int \frac{dx}{1+\sin x}$ এর মান কত?

[BSMRSTU-B. 19-20; CU. 12-13]

- A. $\sec x + \tan x + c$ B. $\tan x - \sec x + c$
C. $\tan x + \sec x + c$ D. কোনোটিই নয়

[S⊗Why] $\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} dx = \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} dx$
 $= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx - \int \sec x \tan x dx = \tan x - \sec x + c$

03. নিচের কোন ফাংশনটির অন্তরক ও যোগজ মান একই? [BSMRSTU:16-17,A]

- A. $\ln x$ B. $\log x$ C. I D. e^x

[S⊗Why] $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \int e^x dx = e^x$

04. $f(x)$ এর মান কত হলে $\int x^2 \cos x dx = f(x) - \int 2x \sin x dx$ সূত্রটি মেনে চলে? [BSMRSTU: 14-15,A]

- A. $2\sin x + 2x \cos x$ B. $x^2 \sin x$
C. $2x \cos x - x^2 \sin x$ D. $4 \cos x$

[S⊗Why] $\frac{d}{dx}(x^2 \sin x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$

$\therefore x^2 \sin x = \int 2x \sin x dx + \int x^2 \cos x dx$
 $\therefore \int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x dx$

[ম] হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[ম]**

01. $\int \frac{x^2 dx}{x^3 + 1} = ?$

[HSTU:14-15]

- A. $\frac{1}{3} \ln |x^2 + 1|$ B. $\ln |x^2 + 1|$
C. $\frac{1}{3} \ln |x^3 + 1|$ D. $\ln |x^3 + 1|$

[S⊗Why] $\int \frac{x^2 dx}{x^3 + 1} = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx = \frac{1}{3} \ln |x^3 + 1|$

02. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$ এর মান কত?

[HSTU:05-06]

- A. $\frac{1}{3} \ln x$ B. $\ln x^3$ C. $3 \ln x$ D. $\frac{1}{3} (\ln x)^3$

[S⊗Why] $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \frac{1}{3} (\ln x)^3$

[ম] নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[ম]**

01. $\int \frac{4 \sec^2 x}{3} dx$ এর মান কত?

[NSTU. 19-20]

- A. $\frac{1}{2} \tan x + c$ B. $\tan x + c$ C. $\frac{4}{3} \tan x + c$ D. $\frac{1}{4} \tan x + c$

[S⊗Why] $\int \frac{4 \sec^2 x}{3} dx = \frac{4}{3} \int \sec^2 x dx = \frac{4}{3} \tan x + c$

02. $\int x^x (1 + \log x) dx = ?$

[NSTU. 19-20]

- A. $x \log x + c$ B. $c + x^x \log x$
C. $\log(x^x + 1) + c$ D. $x^x + c$

[S⊗Why] $\int x^x (1 + \log x) dx = x^x + c$

03. কোনটি সঠিক নয়?

[NSTU: 14-15]

- A. $\int \sec x dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right|$ B. $\int \sec x dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right|$

C. $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x|$ D. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}$ **[Ans A]**

[ম] পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[ম]**

01. $\int e^x \left(\frac{a}{x} - \frac{a}{x^2} \right) dx = \text{কত?}$

[PSTU:16-17,A1/A2]

- A. $\frac{e^x}{x} + c$ B. $\frac{ae^x}{2} + c$ C. $\frac{ae^x}{x} + c$ D. $\frac{ae^x}{x^2} + c$

[S⊗Why] $\int e^x \left(\frac{a}{x} - \frac{a}{x^2} \right) dx = e^x \left(\frac{a}{x} \right) + c$

02. $\int 2e^{\frac{1}{3}x} dx$ এর মান কত?

[PSTU: 15-16]

- A. $6e^{\frac{2}{3}x} + c$ B. $3e^{\frac{2}{3}x} + c$ C. $6e^{\frac{1}{3}x} + c$ D. $3e^{\frac{1}{3}x} + c$

[S⊗Why] $\int 2e^{\frac{1}{3}x} dx = 2 \int e^{\frac{x}{3}} dx = 2 \cdot \frac{e^{\frac{x}{3}}}{\frac{1}{3}} = 6e^{\frac{x}{3}} + c$

03. $\int x^3 e^{x^4} dx$ এর মান কত?

[PSTU: 14-15,A]

- A. $\frac{1}{4} e^{x^4} + c$ B. $\frac{1}{4} e^{x^4} + c$ C. $\frac{1}{4} e^{4x^3} + c$ D. $\frac{1}{4} e^{x^5} + c$

[S⊗Why] $\int x^3 e^{x^4} dx$ ধরি, $x^4 = z$ বা, $4x^3 dx = dz$ বা, $x^3 dx = \frac{1}{4} dz$
 $\therefore \frac{1}{4} \int e^z dz = \frac{1}{4} e^z + c = \frac{1}{4} e^{x^4} + c$

[ম] বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[ম]**

01. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = ?$

[BSFMSTU. 19-20]

- A. $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{2}} + C$ B. $\sin^{-1} \frac{x}{2} + C$ C. $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{2}} + C$ D. $\sin^{-1} \frac{x}{2} + C$

[S⊗Why] $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{2}} + c$

[ম] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[ম]**

02. $\int e^{-x} \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = ?$

[BSMRSTU: 16-17,A]

- A. $\frac{e^{-2}}{x}$ B. $\frac{-e^{-2}}{x}$ C. $-\frac{e^{-x}}{x}$ D. $-\frac{2e^{-1}}{x}$

[S⊗Why] $\int e^{-x} \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = -\frac{e^{-x}}{x}$

দ্বিতীয় অংশ: নির্দিষ্ট যোগজ [DEFINITE INTEGRATION]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০২-০৩ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	Definite Integrals of Trigonometric Function	**
02	Definite Integrals of Algebraic Function	***
03	যুগ্ম ও অযুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে	*
04	Some Special Definite Integrals	*

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

নির্দিষ্ট যোগজ: x স্বাধীন চলক বিশিষ্ট কোন একটি ফাংশন $f(x)$ যদি $[a, b]$ ব্যবধিতে চলমান থাকে তবে ফাংশনটির নির্দিষ্ট যোগজ বলতে X ও Y অক্ষদ্বয় এবং $f(x)$ ফাংশনটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বুঝায়।

$$F = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

এক্ষেত্রে, b কে উপরসীমা ও a কে নিম্নসীমা বলে।

TOPIC 01 Definite Integrals of Algebraic Function

MEx 01 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$ এর মান- [RU 16-17, RU 15-16, CU 15-16, DU 08-09, 06-07, JU 14-15, 10-11, RU 12-13, 09-10, KU 03-04]

Solve $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}}$

$$= [\sin^{-1}(x-1)]_0^1 = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \text{ Ans.}$$

MEx 02 $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ এর মান কত? [KU 14-15, RU 12-13, 09-10, IU 12-13; BU. 09-10; BSMRSTU. 14-15; BUTex. 12-13; KUET. 09-10]

Solve $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int_0^1 \frac{e^x dx}{(e^x)^2 + 1} = \int_0^1 \frac{e^x dx}{1 + (e^x)^2}$

$$\left[\because \int \frac{f'(x) dx}{a^2 + (f(x))^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left\{ \frac{f(x)}{a} \right\} + c \right]$$

$$= [\tan^{-1}(e^x)]_0^1 = [\tan^{-1} e - \tan^{-1} 1] = \tan^{-1} e - \frac{\pi}{4}$$

TOPIC 02 Definite Integrals of Trigonometric Function

MEx 01 $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x dx$ এর মান-

[RUET. 07-08; সি.বো. ২০০৫; চ.বো. ২০১১]

Solve $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x dx = - \int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 d(1 + \cos x)$

$$= - \left[\frac{(1 + \cos x)^3}{3} \right]_0^{\pi/2} = - \frac{1}{3} (1 - 2^3) = \frac{7}{3}$$

TOPIC 03 যুগ্ম ও অযুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে

Technique: যদি কোন ফাংশনের ক্ষেত্রে $f(-x) = f(x)$ হয় তবে তাকে যুগ্ম ফাংশন বলে। আবার যদি কোন ফাংশনের ক্ষেত্রে $f(-x) = -f(x)$ হয় তবে তাকে অযুগ্ম ফাংশন বলে। যেমন, x^2 , $\cos x$, $x \sin x$ যুগ্ম ফাংশন এবং x^3 , $\sin x$, $x \cos x$ অযুগ্ম ফাংশন।

(i) $f(x)$ যুগ্ম ফাংশন হলে, $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

(ii) $f(x)$ অযুগ্ম ফাংশন হলে, $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ যেমন, $\int_{-a}^a x \cdot \cos x dx = 0$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\int_{-1}^2 |x| dx = ?$ [RU. 15-16; SUST. 15-16; MBSTU. 14-15]

Solve $\int_{-1}^2 |x| dx = - \int_{-1}^0 x dx + \int_0^2 x dx$

$$= - \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2$$

$$= - \frac{1}{2} (0 - (-1)^2) + \frac{1}{2} (2^2 - 0) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

TOPIC 04 Some Special Definite Integrals

Technique:

Walli's theorem:

(i) $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{3.1}{4.2} \cdot \frac{\pi}{2}$ (n জোড় পূর্ণসংখ্যা হবে।)

যেমন: $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx = \frac{3.1}{4.2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$

(ii) $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{3}{2}$ (n বিজোড় পূর্ণসংখ্যা হবে।)

যেমন: $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^5 x dx = \frac{5-1}{5} \cdot \frac{5-3}{5-2} = \frac{8}{15}$

Some Special Definite Integrals

$\int_A^B \frac{1}{\sqrt{(x-A)(B-x)}} dx = \pi$; Where $B > A$

$\int_A^B \sqrt{(x-A)(B-x)} dx = \frac{\pi}{8} (B-A)^2$; Where $B > A$

i) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}$

ii) $\int_0^{\pi/2} \frac{\tan^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\cot^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \frac{\pi}{4}$

উপরিউক্ত ফর্মুলাগুলোতে লিমিট $0, \frac{\pi}{2}$ না হয়ে যেকোন লিমিট হলে (যাদের

যোগফল $= \frac{\pi}{2}$) তবে যোজিত ফল হবে $= \frac{\text{upper limit} - \text{lower limit}}{2}$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 02 $\int_1^4 f(x) dx = 5$ হলে $\int_0^4 f(3x+1) dx$ এর মান- [RU 17-18, DU 16-17]

Solve $\int_0^4 f(3x+1) dx = \frac{1}{3} \int_1^4 f(z) dz$

$$= \frac{1}{3} \int_1^4 f(x) dx \text{ [চলক পরিবর্তন করলে]}$$

যোগজের মানের পরিবর্তন হয় না।

$$= \frac{1}{3} \times 5 = \frac{5}{3}$$

ধরি, $3x+1 = z$

$\Rightarrow 3dx = dz$

$\Rightarrow dx = \frac{1}{3} dz$

x	0	1
z	1	4

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামালাল ভ্যাসহ সমাধান

01. $3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 3x e^{\cos 3x} dx = ?$ [GST-A. 2022-2023]

A. $3e$ B. $1 - e$ C. $e - 1$ D. $3e - 1$

So Why $3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 3x e^{\cos 3x} dx$
 $= - \int_1^e e^z dz = [e^z]_1^e = e^e - e^1 = e - 1$

Let, $z = \cos 3x$
 $dz = -3 \sin 3x dx$

x	$\pi/2$	0
z	0	1

02. $2 \int_0^1 \operatorname{cosec} \left(\sin^{-1} \frac{1}{x} \right) dx = ?$ [GST-A. 2022-2023]

A. 2.5 B. 21.0 C. 1.5 D. 1.0

So Why $2 \int_0^1 \operatorname{cosec} \left(\sin^{-1} \frac{1}{x} \right) dx = 2 \int_0^1 \operatorname{cosec} \operatorname{cosec}^{-1} x dx$
 $= 2 \int_0^1 x dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1 - 0 = 1$

03. $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = ?$ [GST-A. 21-22, SUST 11-12; IU. 04-05]

A. e B. $\ln 4/e$ C. 1 D. -1 E. -2

Sol $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{2 - (1+x)}{1+x} dx$
 $= \int_0^1 \left(\frac{2}{1+x} - \frac{1+x}{1+x} \right) dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx - \int_0^1 dx$
 $= [2 \log(1+x) - x]_0^1 = 2 \log 2 - 1 = \log 3 - \log e = \log \frac{4}{e}$

04. $\int_0^2 dx = Z$ হলে, $\int_{-1/2}^{1/2} f(1-2x) dx =$ কত? [GST-A. 21-22]

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 3

Sol দেওয়া আছে, $\int_0^2 f(z) dz = 2$

এখন, $\int_{-1/2}^{1/2} f(1-2x) dx$

$\Rightarrow \int_2^0 f(z) - \frac{dz}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \int_2^0 f(z) dz$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \int_0^2 f(z) dz \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 = 1$

ধরি, $1 - 2x = z$
 $\Rightarrow -2dx = dz$
 $\therefore dx = \frac{dz}{-2}$

x	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
z	2	0

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$ [JNU 15-16, IU 14-15, RU 09-10, MBUST 11-12; NSTU. 05-06]

A. $\pi/3$ B. $\pi/2$ C. $\pi/4$ D. 1

So Why $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2x) dx$

$= \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} \left[\frac{\pi}{2} - 0 - 0 + \frac{1}{2} \sin \pi \right]$

02. $\int_0^x \frac{\tan^{-1} u}{1+u^2} du$ এর মান কত? [JNU 13-14; CoU. 17-18; JU-A. 19-20]

A. $\frac{1}{2} (\tan^{-1} x)^2$ B. $\frac{x^2}{2}$ C. $\frac{1}{2} (\tan^{-1} u)^2$ D. $\frac{1}{2} (\tan^{-1} x)$

So Why $\int_0^x \frac{\tan^{-1} u}{1+u^2} du$
 $= \int_0^x \tan^{-1} u \left(\frac{1}{1+u^2} \right) du \left[\because \int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c \right]$

$= \left[\frac{(\tan^{-1} u)^2}{2} \right]_0^x = \left[\frac{1}{2} (\tan^{-1} x)^2 - 0 \right] = \frac{1}{2} (\tan^{-1} x)^2$

03. যদি $\int_0^4 f(x) dx = 6$ তবে $\int_{-1}^3 f(x+1) dx$ এর মান- [JNU 08-09; BUTex. 16-17]

A. 5 B. 7 C. 0 D. 6

So Why $\int_{-1}^3 f(x+1) dx$
 $= \int_0^4 f(z) dz = \int_0^4 f(x) dx = 6$

ধরি, $x+1 = z$
 $\Rightarrow dx = dz$

x	-1	3
z	0	4

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx$ এর মান কত? [KU 17-18, RU 17-18; BRU. 17-18; JKKNU. 17-18; BUET. 06-07]

A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

So Why $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx = \int_0^1 \frac{x}{1+(x^2)^2} dx$

ধরি, $x^2 = z$ বা, $2x dx = dz$ এবং $x=0$ হলে $z=0$ ও $x=1$ হলে $z=1$

$\therefore \int_0^1 \frac{x}{1+(x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x dx}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} = \frac{1}{2} [\tan^{-1} z]_0^1$
 $= \frac{1}{2} [\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0)] = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{8}$

02. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ এর মান কত? [KU 14-15, RU 12-13, 09-10, IU 12-13; BUTex. 12-13; KUET. 09-10]

A. $\tan^{-1} e - \frac{\pi}{4}$ B. $\tan^{-1} e - \frac{\pi}{4}$

C. $\tan^{-1} e + \frac{\pi}{4}$

D. কোনটিই নয়

So Why $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int_0^1 \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1} = \int_0^1 \frac{e^x dx}{1 + (e^x)^2} \left[\because \int \frac{f'(x) dx}{a^2 + \{f(x)\}^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left\{ \frac{f(x)}{a} \right\} + c \right]$
 $= [\tan^{-1}(e^x)]_0^1 = [\tan^{-1} e - \tan^{-1} 1] = \tan^{-1} e - \frac{\pi}{4}$

03. $\int_0^{\pi/4} \sin \sqrt{x} dx = ?$ [KU. 09-10]

A. 0 B. 1 C. 2 D. কোনটিই নয়

So Why $\int_0^{\pi/4} \sin \sqrt{x} dx = -\sqrt{2} [\cos \sqrt{x}]_0^{\pi/4} = -\sqrt{2}$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = ?$ [CoU-A. 17-18; ঢা.বো. ২০১৯]

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\ln 2$ C. 0 D. $\ln 2 - 1$

[S@Why] $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = [\ln(1+x^2)]_0^1 = \ln(1+1^2) - \ln(1) = \ln 2$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2\theta}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta = ?$ [IU. 18-19; BUET. 10-11; JUST. 15-16; KUET. 16-17]

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

[S@Why] $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2\theta}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2\theta}{1 + \cos^2 2\theta} d\theta$
 $= 2 \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(-2 \sin 2\theta)}{1 + (\cos 2\theta)^2} d\theta$
 $= -\{ \tan^{-1}(\cos \frac{\pi}{2}) - \tan^{-1}(\cos 0) \} = -\{ \tan^{-1} 0 - \tan^{-1} 1 \} = -\{ 0 - \frac{\pi}{4} \} = \frac{\pi}{4}$

02. $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{9-2x^2}} dx = ?$ [IU 17-18; BUET. 09-10; BRU. 12-13]

A. 1 B. 4 C. 3 D. 0

[S@Why] $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{9-2x^2}} dx = -\frac{1}{4} \int_0^2 \frac{-4x}{\sqrt{9-2x^2}} dx$
 $= -\frac{1}{4} \cdot 2 [\sqrt{9-2x^2}]_0^2 = -\frac{1}{2} (1-3) = 1$

03. $\int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx$ এর মান- [IU 16-17]

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$ D. $\ln(2+\sqrt{3})$

[S@Why] $\int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$
 $= [\tan^{-1} x]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = [\tan^{-1} x]_0^1 + \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1$
 $= (\frac{\pi}{4} - 0) + \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$ Ans.

04. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = \int_0^x \frac{t-3}{t^2+7} dt$ ন্যূনতম হবে? [IU: 16-15, Ec]

A. 7 B. 3 C. -3 D. -7

[S@Why] $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$
 $f(x) = \int_0^x \frac{t-3}{t^2+7} dt$ x এর মান কত হলে $f(x)$ ন্যূনতম হবে-
 $f(x)$ ন্যূনতম হতে হলে $\frac{d}{dx} (F(x)) = 0$ হতে হবে।
এখানে, $f(t) = \frac{t-3}{t^2+7} \therefore f(x) = \frac{x-3}{x^2+7}$
 $\therefore \frac{d}{dx} f(x) = f'(x) = \frac{x-3}{x^2+7} \therefore \frac{x-3}{x^2+7} = 0$
বা, $x-3=0$ বা, $x=3$

05. $\int_0^1 x e^x dx$ এর মান কত? [IU 15-16, RU 08-09]

A. 0 B. 1 C. -1 D. e

[S@Why] $\int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 e^x (x-1+1) dx = \int_0^1 e^x \{ (x-1) + 1 \} dx$
 $[\therefore \int e^x \{ f(x) + f'(x) \} dx = e^x f(x) + c]$
 $= [e^x (x-1)]_0^1 = [e(1-1) - e^0(0-1)] = 1$

06. $\int_0^{\pi} \cos^2 x dx = ?$ [IU 14-15]

A. $\pi/4$ B. $\pi/3$ C. $\pi/2$ D. $\pi/6$

[S@Why] $\int_0^{\pi} \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} [x + \frac{1}{2} \sin 2x]_0^{\pi}$
 $= \frac{1}{2} \{ (\pi + 0) - (0 + 0) \} = \frac{\pi}{2}$

07. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$ এর মান হবে- [IU 14-15]

A. 0 B. π C. $-\pi$ D. $\frac{\pi}{2}$

[S@Why] $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}}$
 $= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \left[\ln \left| \frac{\frac{1}{2} + x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2}} \right| \right]_0^1$
 $= \left[\ln \left| \frac{x}{1-x} \right| \right]_0^1 = [\ln |x| - \ln |1-x|]_0^1 = \ln 1 - \ln 0 - \ln 0 + \ln 1 = 0$

08. $y = f(x) = k$ হলে $\int_a^b f(x) dx$ জ্যামিতিকভাবে বুঝায়- [IU: 10-11; CU: 03-04; NUST: 13-14]

A. ক্ষেত্রফল B. দৈর্ঘ্য C. আয়তন D. ফাংশন **[Ans A]**

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_1^2 \frac{x^3-1}{x^2} dx = ?$ [BRUR: 15-16]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

[S@Why] $\int_1^2 \frac{x^3-1}{x^2} dx = \int_1^2 \left(x - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{2^2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1^2}{2} - \frac{1}{1} = 1$

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}}$ এর মান- [BU: 13-14]

A. $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ B. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ C. b D. b

[S@Why] $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(2)^2 - (\sqrt{3}x)^2}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} x \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin^{-1} 0 \right] = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{\pi}{3} \right] = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^1 \frac{e^x}{1+x} [(1+x)/\ln(1+x) + 1] dx$ এর মান কত? [SUST-B. 19-20]
 A. $\ln 2$ B. 1
 C. e D. 0 E. $e/\ln 2$

SQ Why $\int_0^1 \frac{e^x}{1+x} [(1+x)\ln(1+x) + 1] dx$

$$dx = \int_0^1 e^x \left[\ln(1+x) + \frac{1}{1+x} \right] dx$$

$$= [e^x \ln(1+x)]_0^1 = e^1 \ln(1+1) - e^0 (\ln(1+0))$$

$$= e \ln 2 - 0 = e \ln 2$$

02. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d(\tan \theta)$ এর মান কত? [SUST: 17-18]
 A. $\tan\left(n \frac{\pi}{2}\right)$ B. $\frac{1}{3} \cos^3\left(n \frac{\pi}{2}\right)$ C. $\frac{1}{3} \sin^3\left(n \frac{\pi}{2}\right)$
 D. $n\pi$ E. $n \frac{\pi}{2}$

SQ Why $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d(\tan \theta) = \int_0^{\pi/2} \frac{d(\tan \theta)}{\sec^2 \theta} = \int_0^{\pi/2} \frac{d(\tan \theta)}{1 + \tan^2 \theta}$

$$= [\tan^{-1}(\tan \theta)]_0^{\pi/2} = [\theta]_0^{\pi/2} = n \frac{\pi}{2} - 0 = n \frac{\pi}{2}$$

03. $\int_0^8 f(x) dx = \beta$ হলে $\int_1^9 f(x-1) dx$ এর মান কত? [SUST 17-18]
 A. $1 - \beta$ B. $9 - \beta$ C. $\beta - 1$
 D. β E. $\beta - 9$

SQ Why দেওয়া আছে, $\int_0^8 f(x) dx = \beta$

বা, $[f(x)]_0^8 = \beta$ বা, $f(8) - f(0) = \beta$

$\therefore \int_1^9 f(x-1) dt = [f(x-1)]_1^9 = [f(8) - f(0)] = \beta$

04. a এর মান কত হলে $\int_1^a \{2 + x \ln(x^2+5)\} dx + \int_1^a \{3 - x \ln(x^2+5)\} dx = 30$ [SUST 16-17]

- A. 2 B. $\ln 3$ C. 4
 D. $\ln 5$ E. 7

SQ Why $\int_1^a \{2 + x \ln(x^2+5)\} dx + \int_1^a \{3 - x \ln(x^2+5)\} dx = 30$

$$= \int_1^a 2 dx + \int_1^a \{x \ln(x^2+5)\} dx + \int_1^a 3 dx - \int_1^a \{x \ln(x^2+5)\} dx = 30$$

$$= \int_1^a 2 dx + \int_1^a 3 dx = 30$$

$$\Rightarrow [2x]_1^a + [3x]_1^a = 30$$

$$\Rightarrow (2a-2) + (3a-3) = 30$$

$$\Rightarrow 5a-5 = 30 \Rightarrow a = 7$$

05. $\int_{-a}^a x \ln(1+x^2) dx$ এর মান কত? [SUST: 15-16]

- A. 0 B. $\frac{2}{2} a^2 [\ln(1+a^2) - 1]$
 C. $a^2 [\ln(1+a^2) - 1]$ D. $\frac{1}{2} (1-a^2) [\ln(1+a^2) - 1]$
 E. $(1+a^2) [\ln(1+a^2) - 1]$

SQ Why $\int_{-a}^a x \ln(1+x^2) dx = 0$

06. a এর মান কত হলে $\int_{\sqrt{3}}^a \frac{2x}{x^2-4} dx = \ln 3a$? [SUST: 15-16]

- A. $\sqrt{6}$ B. $2\sqrt{2}$
 C. $2\sqrt{3}$ D. 3 E. 4

SQ Why $\int_{\sqrt{3}}^a \frac{2x}{x^2-4} dx = [\ln(x^2-4)]_{\sqrt{3}}^a$

$$= \ln(a^2-4) - \{\ln(\sqrt{3}^2-4)\} = \ln(a^2-4) - \ln 1 = \ln(a^2-4)$$

$$\therefore \ln(a^2-4) = \ln 3a$$

$$\text{বা, } a^2-4 = 3a \quad \text{বা, } a^2-3a-4 = 0$$

$$\text{বা, } a^2-4a+a-4 = 0$$

$$\text{বা, } a(a-4) + 1(a-4) = 0 \quad \text{বা, } (a-4)(a+1) = 0 \therefore a = 4, -1$$

07. $\int_0^{\ln 2} \frac{dx}{1+e^{-x}}$ এর মান কত? [SUST 14-15]

- A. $\ln \frac{2}{3}$ B. $\ln \frac{4}{3}$ C. $\ln \frac{1}{3}$ D. $\ln \frac{3}{2}$ E. 1

SQ Why $\int_0^{\ln 2} \frac{dx}{1+e^{-x}} = \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx$

$$= [\ln(1+e^x)]_0^{\ln 2} \left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln\{f(x)\} + c \right] = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$$

08. $\int_0^1 d(\tan^{-1} ax)$ এর মান কত? [SUST: 13-14]

- A. 0 B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$
 D. $\frac{\pi}{6}$ E. 1

SQ Why $\int_0^1 d(\tan^{-1} ax) = [\tan^{-1} ax]_0^1 = \tan^{-1} a \times \frac{1}{a} - \tan^{-1} 0 = \frac{\pi}{4}$

09. $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$ এর মান কত? [SUST 12-13]

- A. $-\pi/4$ B. $-\pi/2$ C. $\pi/2$ D. $\pi/4$ E. π

SQ Why $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x + x^2\right)}}$

$$= \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - x\right)^2}} = \left[-\sin^{-1} \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2} - x\right)}{\frac{1}{2}} \right\} \right]_{1/2}^1$$

$$= -\left[\sin^{-1} 2 \left(\frac{1}{2} - x \right) \right]_{1/2}^1 = -[\sin^{-1}(-1) - \sin^{-1}(0)]$$

$$= -(-\pi/2 - 0) = \pi/2$$

10. $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} d(\sqrt{x})$ এর মান কত? [SUST:12-13, B/BI; HSIU:13-14; JU:12-13]

- A. $\frac{e^2-1}{\sqrt{a}}$ B. $\frac{e^2-1}{a}$ C. e^2-1
D. $\frac{1-e^2}{\sqrt{a}}$ E. $\frac{1-e^2}{a}$

SO Why $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} d(\sqrt{x})$
 $= \frac{1}{a} [e^{\sqrt{x}}]_0^4$
 $= \frac{1}{a} [e^{\sqrt{4}} - e^0] = \frac{e^2-1}{a}$

11. $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = ?$ [SUST 11-12]

- A. 1 B. $\pi/4$ C. $\tan^{-1} \frac{1}{2}$
D. $\ln 2$ E. $\ln \sqrt{2}$

SO Why $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1$
 $= \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2 = \ln 2^{1/2} = \ln \sqrt{2}$

12. $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = ?$ [SUST 11-12; IU: 04-05]

- A. e B. $\ln 4/e$ C. 1
D. -1 E. -2

SO Why $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{2-(1+x)}{1+x} dx = \int_0^1 \left(\frac{2}{1+x} - \frac{1+x}{1+x} \right) dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx - \int_0^1 dx$
 $= [2 \log(1+x) - x]_0^1 = 2 \log 2 - 1 = \log 4 - \log e = \log \frac{4}{e}$

13. $\int_4^5 \frac{x dx}{x^2-5x+6} = ?$ [SUST 10-11]

- A. $\ln(32/9)$ B. $\ln(4/3)$
C. $\ln(41)$ D. $\ln(1/41)$

SO Why $\int_4^5 \frac{x dx}{x^2-5x+6} = \frac{1}{2} \int_4^5 \frac{2x-5+5}{x^2-5x+6} dx$
 $= \frac{1}{2} \int_4^5 \frac{2x-5}{x^2-5x+6} dx + \frac{5}{2} \int_4^5 \frac{dx}{x^2-5x+6}$
 $= \frac{1}{2} [\ln(x^2-5x+6)]_4^5 + \frac{5}{2} \int_4^5 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right) dx$
 $= \frac{1}{2} [\ln 6 - \ln 2] + \frac{5}{2} [\ln(x-3) - \ln(x-2)]_4^5$
 $= \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{5}{2} [(\ln 2 - \ln 3) - (\ln 1 - \ln 2)]$
 $= \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{5}{2} (2 \ln 2 - \ln 3) = \frac{1}{2} \ln 3 + 5 \ln 2 - \frac{5}{2} \ln 3$
 $= 5 \ln 2 - 2 \ln 3 = \ln 32 - \ln 9 = \ln \left(\frac{32}{9} \right)$

14. $\int_0^5 \frac{x dx}{1-x^2} = ?$ [SUST 10-11]

- A. $1-2\sqrt{6i}$ B. $-1-2\sqrt{6i}$
C. $1-2\sqrt{6}$ D. $-1-2\sqrt{6}$

SO Why Note: সঠিক উত্তর নাই। Ans. $\ln \left(\frac{1}{2\sqrt{6i}} \right)$

15. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (3 \tan x + 2 \sin x) dx = ?$ [SUST:10-11]

- A. 4.4 B. 3.0
C. 0 D. -4.4

SO Why $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (3 \tan x + 2 \sin x) dx = [-3 \ln(\cos x) + 2 \cos x]_{-\pi/4}^{\pi/4}$

যখন আপনার লিমিট ও লোহার লিমিট সমান কিন্তু বিপরীতচিহ্ন বিশিষ্ট হলে, রেজাল্ট হবে শূন্য।

16. $\int_2^5 \frac{dx}{x^2-4x+13} = ?$ [SUST 09-10]

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{12}$

SO Why $\int_2^5 \frac{dx}{x^2-4x+13} = \int_2^5 \frac{dx}{x^2-4x+4+9} = \int_2^5 \frac{dx}{3^2+(x-2)^2}$
 $\left[\because \int \frac{f'(x)dx}{a^2+(f(x))^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left\{ \frac{f(x)}{a} \right\} + c \right] = \frac{1}{3} \left[\tan^{-1} \frac{x-2}{3} \right]_2^5 = \frac{1}{3} \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$

17. $\int_0^{\pi} d(\sin x)$ এর মান কত? [SUST 11-12]

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\pi/3$ C. $\sqrt{3}/2$
D. $\pi/2$ E. $\pi/4$

SO Why $\int_0^{\pi} d(\sin x) = [\sin x]_0^{\pi} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

18. $\int_0^{\pi} 4 \tan^3 x \sec^2 x dx$ এর মান কত? [SUST 11-12]

- A. 2 B. 1 C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$ E. $\frac{\pi}{8}$

SO Why $\int_0^{\pi} 4 \tan^3 x \sec^2 x dx = 4 \int_0^{\pi} (\tan x)^3 (\sec^2 x) dx$

$\left[\because \int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c \right] = -[\tan^4 x]_0^{\pi} = 1 \text{ Ans.}$

19. $\int_0^{\pi} 3\sqrt{1-\cos x} \sin x dx = ?$ [SUST 09-10]

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

SO Why $\int_0^{\pi} 3\sqrt{1-\cos x} \sin x dx = \int_0^{\pi} 3(1-\cos x)^{\frac{1}{2}} \sin x dx$
 $\left[\because \int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c \right]$
 $= 3 \times \frac{2}{3} \left[(1-\cos x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\pi} = 4\sqrt{2}$

20. $\int_{-1}^3 (3x^2 - 2x) dx$ এর মান হবে-

[SUST: 01-02, A]

- A. 0 B. 6
C. 4 D. 2

[S@Why] $\int_{-1}^3 (3x^2 - 2x) dx = [x^3 - x^2]_{-1}^3 = [(8-4) - (-1-1)] = 6$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = ?$

[JUST-A: 19-20]

- A. -0.25 B. -0.5
C. 0.25 D. 0.5

[S@Why] $\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = \int_0^1 x^2 e^{x^2} x dx$
 $= \frac{1}{2} \int_0^1 z e^z dz$
 $= \frac{1}{2} \left[z \int e^z dz - \int \left(\frac{d}{dz} (z) \int e^z dz \right) dz \right]$
 $= \frac{1}{2} [z \cdot e^z - \int e^z dz] = \frac{1}{2} [ze^z - e^z]_0^1$
 $= \frac{1}{2} [1 \cdot e^1 - e^1 - 0 + e^0] = \frac{1}{2} (e - e + 1) = 0.5$

ধরি, $x^2 = z$
 $2x dx = \frac{dz}{2}$
 $\therefore x dx = \frac{dz}{2}$

x	0	1
z	0	1

02. $\int_0^{\pi/2} e^x (\sin x + \cos x) dx = ?$

[JUST-A: 19-20]

- A. $e^{\pi/2}$ B. $\frac{\pi}{2}$
C. e^{π} D. $-\frac{\pi}{2}$

[S@Why] $\int_0^{\pi/2} e^x (\sin x + \cos x) dx$
 $= [e^x \sin x]_0^{\pi/2} = e^{\pi/2} \sin \frac{\pi}{2} - e^0 \sin 0 = e^{\pi/2}$

03. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} dx = ?$

[JUST-18-19]

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 2

[S@Why] Upper Limit এবং Lower Limit পরস্পরের বিপরীত।

04. $\int_{-3}^2 f(x) dx = 5$ হয়, তবে $\int_1^6 4 f(x-4) dx = ?$

[JUST: 17-18, B]

- A. 5 B. 9 C. -5 D. 20

[S@Why] $\int_{-3}^2 f(x) dx = 5$
 $= 4 \int_{-3+4}^{2+4} f(x-4) dx = 4 \times 5 = 20$

$\int_c^b f(x) dx = k$ হলে
 $\int_{c+a}^{b+a} f(x-a) dx = k$

05. $\int_p^q f(t) dt$ জ্যামিতিক ভাবে কি নির্দেশ করে?

[JUST: 15-16, A]

- A. ফাংশন B. ক্ষেত্রফল C. দৈর্ঘ্য
D. আয়তন E. পরিধি

[S@Why] $\int_p^q f(t) dt$ দ্বারা ক্ষেত্রফল বুঝায়।

06. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx$ এর মান কত? [JUST: 15-16; BSMRSTU: 14-15; BUET: 09-10; JU: 06-07, 07-08, 13-14; MBSTU: 17-18]

- A. $\frac{3}{e^2}$ B. $\ln \frac{3}{2}$
C. $\ln 2$ D. e^2

[S@Why] $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx = [\ln(1+e^x)]_0^{\ln 2} = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$

01. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = ?$

[MBSTU: A. 19-20]

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

[S@Why] $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left[\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{1}{2} \sin^{-1} x \right]_0^1$
 $= (0 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - 0 - 0) = \frac{\pi}{4}$

02. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{4 - \sin x} dx$ এর মান কত?

[MBSTU-A: 19-20]

- A. $\frac{1}{2} \ln 2$ B. $\frac{1}{4} \ln 3$ C. $\ln \frac{2}{3}$ D. $\ln \frac{4}{3}$

[S@Why] $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{4 - \sin x} dx$
 $= - \int_4^3 \frac{dz}{z} = -[\ln z]_4^3$
 $= -[\ln(3) - \ln(4)]$
 $= (\ln 4 - \ln 3) = \ln \frac{4}{3}$

ধরি,
 $4 - \sin x = z$
 $\Rightarrow -\cos x dx = dz$

x	0	$\frac{\pi}{2}$
z	4	3

03. $\int_2^0 \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx$ এর মান হবে-

[MBSTU: 18-19]

- A. $\ln \frac{3}{2}$ B. $\ln \frac{1}{2}$ C. $\ln \frac{2}{3}$ D. $\ln \frac{1}{3}$

[S@Why] $\int_{-\ln 2}^0 \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = -[\ln(1+e^{-x})]_{-\ln 2}^0$
 $= -\ln(1+e^0) + \ln(1+e^{\ln 2}) = -\ln 2 + \ln 3 = \ln 3 - \ln 2 = \ln \left(\frac{3}{2} \right)$

04. $\int_1^0 \ln x dx =$ কত?

[MBSTU: 16-17, 17-18]

- A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

[S@Why] $\int_1^0 \ln x dx = [x \ln x - x]_1^0 = 0 - (1 \ln 1 - 1) = 1$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$ এর মান নিচের কোনটি?

[BSMRSTU: 17-18, B]

- A. $\ln 4$ B. $2 \ln 3$ C. $\ln 3$ D. $\ln 2$

[S@Why] $\int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx = \int_2^3 \frac{2x-1}{x^2-x} dx$
 $= [\ln(x^2-x)]_2^3 = [\ln(3^2-3) - \ln(2^2-2)] = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3$

02. $\int_1^4 f(x) dx = 6$ হলে $\int_1^4 f(5-x) dx$ এর মান কত?

[BSMRSTU: 14-15, A]

- A. 6 B. 3 C. 0 D. -6

[S@Why] $\int_1^4 f(x) dx = 6$

ধরি, $5-x = z$ বা, $-dx = dz$
 বা, $dx = -dz \therefore \int_1^4 f(z) dz = -\int_1^4 f(x) dx = -6$

03. $\int_e^2 \frac{dx}{x(\ln x)^3} dx = ?$

[BSMRSTU: 13-14]

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{1}{2}$

[S@Why] $\int_e^2 \frac{dx}{x(\ln x)^3} dx$

ধরি, $\ln x = z \therefore \frac{1}{x} dx = dz$

$\therefore I = \int_1^2 \frac{1}{z^3} dz = \frac{z^{-3+1}}{-3+1} = \frac{-1}{2} \left[\frac{1}{z^2} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{3}{8}$

x	e ²	e
z	2	1

১১ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx$ এর মান- [BSFMSTU. 19-20]

- A. 0 B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{7}{3}$

[S.O. Why] $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx$

$$= \int_2^1 z^2 (-dz) = -\left[\frac{z^3}{3}\right]_2^1$$

ধরি, $1 + \cos x = z$
 $\therefore \sin x \, dx = -dz$

x	0	$\pi/2$
z	2	1

$$= -\left[\frac{1}{3} - \frac{8}{3}\right] = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

১২ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$ এর মান কত? [HSTU:16-17, B]

- A. e B. e - 2 C. e + 2 D. e - 14

[S.O. Why] $\int_0^1 x^2 e^x \, dx = [e^x(x^2 - 2x + 2)]_0^1$
 $= [e(1 - 2 + 2) - e^0(0 - 0 + 2)] = e - 2$

02. $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 + \sin x} \, dx = ?$ [HSTU:16-17, B, JSTU:14-15, C]

- A. $\sqrt{2} - 2$ B. $2 - \sqrt{2}$
 C. $1 - \sqrt{2}$ D. $\sqrt{2} - 1$

[S.O. Why] $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 + \sin x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \sin x}{1 + \sin^2 x} \, dx$

$$= \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} \, dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} \sec^2 x - \sec x \tan x \, dx$$

$$= [\tan x - \sec x]_0^{\pi/4} = \left(\tan \frac{\pi}{4} - \sec \frac{\pi}{4}\right) - (\tan 0 - \sec 0)$$

$$= (1 - \sqrt{2}) + 1 = 2 - \sqrt{2}$$

03. $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = ?$ [HSTU:15-16]

- A. 1 B. $\frac{\pi}{2} + 1$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2} - 1$

[S.O. Why] $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = [x \sin^{-1} x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

$$= [x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}]_0^1 = 1 \sin^{-1} 1 - 1 = \frac{\pi}{2} - 1$$

১৩ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx = ?$ [PSTU. 19-20]

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. π

[S.O. Why] $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{(\sin x + \cos x) + (\sin x - \cos x)}{\sin x + \cos x} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 1 \, dx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} \, dx = \frac{1}{2} [x - \ln |\sin x + \cos x|]_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \ln \left(\sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2}\right) - 0 + \ln(\sin 0 + \cos 0)\right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 0 - 0 + 0\right) = \frac{\pi}{4}$$

তৃতীয় অংশ: যোগজীকরণের প্রয়োগ [Application of Integration]

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০২-০৩ টি প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	একটি বক্ররেখা ও এক/দুই সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত	**
02	Some Special Applications of Integration	**

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

TOPIC 01 একটি বক্ররেখা ও এক/দুই সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত

[Technique:01] y বা x এর একটি মান দেওয়া থাকলে নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করতে হয়।

□ $y = f(x)$ সমীকরণের ক্ষেত্রে, (i) একটি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \int_a^b y \, dx$

(ii) মোট ক্ষেত্রফল $= m \int_a^b y \, dx$

এক্ষেত্রে, a, b একটি চতুর্ভুজে x এর যথাক্রমে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান এবং m ক্ষেত্রটি যতগুলো চতুর্ভুজ জুড়ে আছে তার সংখ্যা।

□ $x = f(y)$ সমীকরণের ক্ষেত্রে,

(i) একটি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \int_a^b x \, dy$

(ii) মোট ক্ষেত্রফল $= m \int_a^b x \, dy$

এক্ষেত্রে, a, b একটি চতুর্ভুজে y এর যথাক্রমে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান এবং m ক্ষেত্রটি যতগুলো চতুর্ভুজ জুড়ে আছে তার সংখ্যা।

[Technique:02] y বা x এর দুইটি মান দেওয়া থাকলে নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করতে হয়।

□ $y_1 = f_1(x)$ এবং $y_2 = f_2(x)$ ফাংশন দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল $= \int_a^b (y_1 - y_2) \, dx$; যেখানে $a \leq x \leq b$.

(i) একটি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \int_a^b (y_1 - y_2) \, dx$

(ii) মোট ক্ষেত্রফল $= m \int_a^b (y_1 - y_2) \, dx$

এক্ষেত্রে, a, b হল y_1, y_2 রেখা সমাধান করে প্রাপ্ত x এর মান এবং m ক্ষেত্রটি যতগুলো চতুর্ভুজ জুড়ে আছে তার সংখ্যা।

□ $x_1 = f_1(y)$ এবং $x_2 = f_2(y)$ বক্ররেখার $y = a$ এবং $y = b$ বিন্দুতে আবদ্ধ ক্ষেত্রের-

(i) একটি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \int_a^b (x_1 - x_2) \, dy$; যেখানে $a \leq y \leq b$.

(ii) মোট ক্ষেত্রফল $= m \int_a^b (x_1 - x_2) \, dy$

এক্ষেত্রে, a, b হল x_1, x_2 রেখা সমাধান করে প্রাপ্ত y এর মান এবং m ক্ষেত্রটি যতগুলো চতুর্ভুজ জুড়ে আছে তার সংখ্যা।


LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $y^2 = 16x$ এবং $y = 4x$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল- [DU 15-16, DU 11-12, DU 07-08; BRU. 19-20; BSFMSU. 19-20; MBSTU. 19-20]

Solve $y^2 = 4ax$ এবং $y = mx$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \frac{a^2}{m^3}$
এখানে $a = 4$ এবং $m = 4$
 $\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \frac{2}{3} \text{ unit}^2$

MEx 02 $y = 3x$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত? [JU 17-18, 09-10; IU 07-08; SUST. 07-08; HSTU. 16-17; KU. 12-13; JKKNIU. 18-19; MBSTU. 13-14]

Solve $y = 3x$;
 x -অক্ষ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের
ক্ষেত্রফল $= \int_0^2 3x \, dx$
 $= 3 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (2^2 - 0) = 6$




TOPIC 02 Some Special Applications of Integration

□ $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের - একটি চতুর্ভাগের ক্ষেত্রফল $\frac{\pi a^2}{4}$ বর্গ একক।
 $\therefore$ মোট ক্ষেত্রফল $= \pi a^2$ বর্গ একক।

$$A = 4 \int_0^a y \, dx = 4 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

$$= 4 \left[\frac{1}{2} a^2 (\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta) \right]_0^{\pi/2}$$

$$= \pi a^2 \quad [x = a \sin \theta \text{ ধরে}]$$




□ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের একটি চতুর্ভাগের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi ab}{4}$ বর্গ একক।

$$\therefore \text{মোট ক্ষেত্রফল} = \pi ab \text{ বর্গ একক।}$$

$$A = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{4b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

$$= \frac{4b}{a} \left[\frac{1}{2} (x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a}) \right]_0^a$$

$$= \frac{4b}{a} \left[\frac{1}{2} (a \cdot 0 + a^2 \cdot \frac{\pi}{2}) \right] = \pi ab \quad [x = a \sin \theta \text{ ধরে}]$$




□ $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} a^2$

$$A = \int_0^{4a} (y_1 - y_2) \, dx = \int_0^{4a} \left(\sqrt{4ax} - \frac{x^2}{4a} \right) dx$$

$$= \left[\frac{2}{3} \sqrt{4a} x^{3/2} - \frac{1}{12a} x^3 \right]_0^{4a}$$


$$= \frac{32}{3} a^2 - \frac{16}{3} a^2 = \frac{16}{3} a^2$$



□ $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2$

$$A = 2 \int_0^a \sqrt{4ax} \, dx$$

$$= \left[2 \sqrt{4a} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^a = \frac{8}{3} a^2$$




□ $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ পরাবৃত্ত এবং স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{1}{6} a^2$

$$A = 4 \int_0^a y \, dx = 4 \int_0^a (\sqrt{a} - \sqrt{x})^2 \, dx$$

$$= 4 \int_0^a (a - 2\sqrt{ax} + x) \, dx$$


$$= \left[ax + \frac{x^2}{2} - 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^a$$

$$= a^2 + \frac{a^2}{2} - \frac{4}{3} a^2 = \frac{1}{6} a^2$$



□ $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখা দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= c^2 \ln \left| \frac{b}{a} \right|$

$$A = \int_a^b y \, dx = \int_a^b \frac{c^2}{x} \, dx = [c^2 \ln x]_a^b = c^2 (\ln b - \ln a) = c^2 \ln \left| \frac{b}{a} \right|$$



LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [RU:18-19; 17-18, IU:15-16; ঢা.বো. ২০০৮; রা.বো. ২০১৩; কু.বো. ২০০৮; দি.বো. ২০০৯; সি.বো. ২০১৬, ১৫, ০৮; বা.বো. ২০১৫, ১৪]

Solve $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} a^2$

MEx 02 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ বক্ররেখাটির ক্ষেত্রফল কত? [BRU. 15-16; কু.বো. ২০১২; রা.বো. ২০০৮; দি.বো. ২০১৪; বা.বো. ২০১৬; সি.বো. ২০০৮]

Solve $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; বক্ররেখাটির ক্ষেত্রফল $= \pi ab$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যারালাল ভাষাসহ সমাধান

01. প্রথম চতুর্ভাগে $x^2 + y^2 = 1$ এবং $4x^2 + y^2 = 4$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [GST-A. 21-22]

A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Sol এখন, $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $\Rightarrow \pi r^2 = \pi$

$\therefore$ প্রথম চতুর্ভাগে ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4} \pi$

আবার, $4x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$

উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi \times ab = \pi \times 2$;

আবার প্রথম চতুর্ভাগে ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4} 2\pi = \frac{\pi}{2}$

$\therefore$ ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi - \pi}{4} = \frac{\pi}{4}$

02. $y^2 = 3x$ এবং $x^2 = 3y$ পরাবৃত্তদ্বয়ের ছেদ বিন্দু দিয়ে গমনকারী সরলরেখার ঢাল কত?

[GST-A. 21-22]

- A. -1 B. 1 C. 2 D. 3

[SOL] $y^2 = 3x \therefore x = \frac{y^2}{3}$

আবার, $x^2 = 3y \Rightarrow \frac{y^4}{9} = 3y$

$\Rightarrow y^4 - 27y = 0$

$\Rightarrow y(y^3 - 27) = 0$


$\Rightarrow y = 0$ অথবা, $y = 3$

$\therefore \text{ঢাল} = \frac{0-3}{0-3} = \frac{-3}{-3} = 1$

ASPECT SPECIAL:

$\therefore \text{ঢাল} = \frac{0-a}{0-a} = \frac{-a}{-a} = 1$

এখন,
 $y = 0$ হলে $x = 0$
 $y = 3$ হলে $x = 3$
 $\Rightarrow$ ছেদ বিন্দু দুই $(0,0)$ এবং $(3,3)$



PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = -|x|$, x -অক্ষের ও $y = -4$ রেখার দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (area) কত?

[JNU 17-18]

- A. 8 sq. unit B. 0 sq. unit
C. 16 sq. unit D. 32 sq. unit

[SOL] সীমা, $y = 0$ এবং $y = -4$

$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \int_{-4}^0 x dy = \int_{-4}^0 |y| dy = 16 \text{ sq. units}$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = 4x - x^2$ বক্ররেখা এবং x -অক্ষ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে-

[KU 11-12]

- A. 16/3 বর্গ একক B. 8/3 বর্গ একক
C. 32/3 বর্গ একক D. 4/3 বর্গ একক

[SOL] $y = 4x - x^2$ ও x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র

ক্ষেত্রফল $= \int_0^4 (4x - x^2) dx$

$= \left[4 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^4$
 $= \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4$
 $= 2 \times 16 - \frac{64}{3} = \frac{96-64}{3} = \frac{32}{3}$ বর্গ একক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x^2 = 4y$ পরাবৃত্ত এবং $x = 2y$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল-

[IU:17-18,D]

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

[SOL] $x^2 = 4y$ (i) এবং $x = 2y$

$\therefore (2y)^2 = 4y$ বা, $4y^2 - 4y = 0 \therefore y = 0, 1$

$\therefore \int_0^1 (2\sqrt{y} - 2y) dy = 2 \left[\frac{2}{3} y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\frac{4-3}{6} \right) = \frac{1}{3}$

02. $y = x^2$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x = 1$, $x = 7$ রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রফল-

[IU 16-17; MBSTU. 18-19]

- A. $\frac{3414}{3}$ B. $\frac{342}{3}$ C. $\frac{352}{3}$ D. $\frac{332}{3}$

[SOL] সীমা: $x = 1$, $x = 7$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \int_1^7 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^7 = \frac{1}{3} (7^3 - 1^3) = \frac{342}{3}$ বর্গ একক

03. $x - y + 2 = 0$ এবং $y = x^2$ দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে-

[IU 07-08, RU 08-09]

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 9/2

[SOL] প্রদত্ত $x - y + 2 = 0$ এবং $y = x^2$ সমীকরণ সমাধান করে পাই, $x = 2$ এবং $x = -1$.

$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \int_{-1}^2 (y_1 - y_2) dx = \int_{-1}^2 (x^2 - x - 2) dx$

$= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right]_{-1}^2 = \left[\left(\frac{8}{3} - 2 - 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) \right] = -\frac{9}{2}$ sq. units.

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \frac{9}{2}$ sq. units. Ans. [ক্ষেত্রফল ঋণাত্মক হতে পারে না]

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ বক্ররেখাটির ক্ষেত্রফল কত?

[BRUR. 15-16; কু.বো. ২০১২; রা.বো. ২০০৮; দি.বো. ২০১৪; ব.বো. ২০১৬; সি.বো. ২০০৮]

- A. $\pi^2 a$ B. πab C. $\pi^2 b$ D. $\pi^2 ab$

[SOL] $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; বক্ররেখাটির ক্ষেত্রফল $= \pi ab$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y^2 = 4x$ এবং $x^2 = 4y$ পরাবৃত্তদ্বয়ের সাধারণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[JKNU:17-18, SUST. 11-12; MBSTU. 19-20]

- A. $\frac{16}{5}$ B. 20 C. $\frac{16}{3}$ D. 25

[SOL] $y^2 = 4.1.x$ (i); $x^2 = 4.1.y$ (ii)

দ্বারা আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} \cdot 1.1 = \frac{16}{3}$

PART B ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = x^3 \ln x$ বক্ররেখার প্রথম চতুর্থাংশে $x = 8$ রেখার সাথে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

[SUST-B. 19-20]

- A. $\frac{9}{25} (160 \ln 2 - 31)$ B. ∞ C. $-\infty$
D. 0 E. 1

[SOL] $y = 0 \Rightarrow x^3 \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 0$

$\therefore x = 1$ [$x = 0$ হলে $\ln(0)$ হয়ে যায় তাই $0 < x < 1$ এর জন্য $y = x^3 \ln x$ বক্ররেখাটি চতুর্থ চতুর্থাংশে অবস্থান করে, কারণ $0 < x < 1$ এর জন্য $\ln x < 0$]

$\therefore A = \int_1^8 x^3 \ln x dx$

$= \left[\ln x \times \frac{x^4}{4} - \int \frac{1}{x} \times \frac{x^4}{4} dx \right]_1^8$

$= \left[\frac{3}{4} \ln x \times x^4 - \left(\frac{3}{4} \right)^2 \times x^4 \right]_1^8$

$= \frac{9}{25} \left(\frac{5}{3} \ln 8 \times 8^5 - 8^5 - 0 + 1 \right)$

$= \frac{9}{25} (160 \ln 2 - 31)$

By using Calculator we

get, $\int_1^8 x^3 \ln x dx$
 $= 28.7653$

Option A থেকে পাই,

$\frac{9}{25} (160 \ln 2 - 31)$
 $= 28.7653$

02. $[0, 2\pi]$ ব্যবধিতে $y = \sin x$ এবং $y = \cos x$ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [SUST-A. 19-20]

A. 1 B. 0 C. $2\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$ E. 2π

[S@Why] $y = \sin x$ এবং $y = \cos x$


তাহলে, $\sin x = \cos x$

$$\Rightarrow \tan x = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x = n\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$n = 0 \text{ হলে, } x = \frac{\pi}{4}$$

$$n = 1 \text{ হলে, } x = \frac{5\pi}{4}$$



$\therefore$ প্রদত্ত ব্যবধি $[0, 2\pi]$ এর মধ্যে সীমা $0, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, 2\pi$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ক্ষেত্রফল } A &= \left| \int_0^{\pi/4} (y_1 - y_2) dx \right| + \left| \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (y_1 - y_2) dx \right| + \left| \int_{5\pi/4}^{2\pi} (y_1 - y_2) dx \right| \\ &= \left| \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx \right| + \left| \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\cos x - \sin x) dx \right| + \left| \int_{5\pi/4}^{2\pi} (\cos x - \sin x) dx \right| \\ &= \left| [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} \right| + \left| [\sin x + \cos x]_{\pi/4}^{5\pi/4} \right| + \left| [\sin x + \cos x]_{5\pi/4}^{2\pi} \right| \\ &= \left| \left(\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 - \cos 0 \right) \right| + \left| \left(\sin \frac{5\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} \right) \right| \\ &\quad + \left| \left(\sin 2\pi + \cos 2\pi - \sin \frac{5\pi}{4} - \cos \frac{5\pi}{4} \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right| + \left| -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| + \left| 0 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right| \\ &= \left| \sqrt{2} - 1 \right| + \left| -\frac{4}{\sqrt{2}} \right| + \left| 1 + \sqrt{2} \right| = \sqrt{2} - 1 + 2\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$


03. $xy = P^2, y = 0, x = 1$ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [SUST. 13-14]

A. 0 B. $P^2 \ln 2$ C. $P^2 \ln \frac{1}{2}$ D. $\ln \frac{1}{2}$ E. $\ln 3$

[S@Why] $xy = P^2$ বা, $y = \frac{P^2}{x}$; $y = 0, x = 1$ and $x = 2$

$$\int_1^2 y dx = \int_1^2 \frac{P^2}{x} dx = P^2 [\ln x]_1^2 = P^2 (\ln 2 - \ln 1) = P^2 \ln 2$$

04. নিচের চিত্রে প্রদত্ত সীমার মধ্যে $y - kx^2$ ফাংশন ও x -অক্ষের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? [SUST: 11-12]



A. 0 B. 12 C. 4 D. 36 E. 7

[S@Why] $y - kx^2$ চিত্র হতে $x = 4$ এবং $y = 3$ বসালে পাই

$$3 = k \cdot 4^2 \text{ বা, } k = \frac{3}{16} \therefore y = \frac{3}{16} x^2$$


$$\therefore \int_0^4 \frac{3}{16} x^2 dx = \frac{3}{16} \int_0^4 x^2 dx = \frac{3}{16} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4$$

$$= \frac{1}{16} [x^3]_0^4 = \frac{1}{16} [4^3 - 0] = \frac{1}{16} 4^3 = 4$$

05. $y = 3x + \frac{6}{x^2} - 5, x > 0$ হলে, পাশের ছবিতে দাগানো অংশের ক্ষেত্রফল কত? [SUST 06-07]

A. -6 B. 6

C. 7.5 D. 7



[S@Why] সীমা $x = 1, x = 3$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \int_1^3 y dx = \int_1^3 \left(3x + \frac{6}{x^2} - 5 \right) dx$$

$$= \left[3 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{6}{x} - 5x \right]_1^3 = \left(3 \cdot \frac{3^2}{2} - \frac{6}{3} - 15 \right) - \left(\frac{3}{2} - 6 - 5 \right) = 6 \text{ Ans.}$$

06. $y = 3x$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = 1$ ও $x = 2$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে? [SUST. 05-06]

A. 3 B. 6 C. $9/2$ D. $5/2$

[S@Why] সীমা: $x = 1, = 2$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \int_1^2 y dx = \int_1^2 3x dx = 3 \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 3 \times \left(\frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) = \frac{9}{2}$$

07. $f(x) = x^3, y = 0$ এবং $x = b$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল- [SUST 04-05]

A. bx^3 B. 0 C. $\frac{b^4}{4}$ D. $\frac{b^2}{4}$

[S@Why] সীমা: $x = 0, x = b$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \int_0^b y dx = \int_0^b x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^b = \frac{b^4}{4}$$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y^2 = 2x$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে- [JUST- 18-19; PUST. 19-20]

A. $1/3$ B. $2/3$ C. $4/3$ D. $8/3$

[S@Why] $y^2 = 2x = 4 \times \frac{1}{2} \times x \therefore a = \frac{1}{2}$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{8}{3} a^2 = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{3}$$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y^2 = 4x$ অধিবৃত্ত এবং $y = 2x - 4$ রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল কত? [MBSTU-A. 19-20]

A. 9 বর্গ একক B. 10 বর্গ একক C. 11 বর্গ একক D. 12 বর্গ একক

[S@Why] ক্ষেত্রফল = $\left| \int_{-2}^4 \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y}{2} - 2 \right) dy \right|$

$$\begin{aligned} &= \left| \left[\frac{y^3}{12} - \frac{y^2}{4} - 2y \right]_{-2}^4 \right| \\ &= \left| \left(\frac{64}{12} - \frac{16}{4} - 8 \right) - \left(-\frac{8}{12} - \frac{4}{4} + 4 \right) \right| \\ &= \left| \left(\frac{16}{3} - 4 - 8 \right) - \left(-\frac{2}{3} - 1 + 4 \right) \right| \\ &= \left| \left(\frac{16 - 12 - 24}{3} \right) - \left(\frac{-2 - 3 + 12}{3} \right) \right| \\ &= \left| \left(\frac{-20}{3} - \frac{7}{3} \right) \right| \\ &= \left| \frac{-20 - 7}{3} \right| = \left| \frac{-27}{3} \right| = 9 \text{ বর্গ একক} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^2 &= 4x \text{ এবং } y = 2x - 4 \\ \Rightarrow x &= \frac{y+4}{2} \\ \therefore y^2 &= 4 \left(\frac{y+4}{2} \right) \\ \Rightarrow y^2 - 2y - 8 &= 0 \\ \Rightarrow y^2 - 4y + 2y - 8 &= 0 \\ \Rightarrow y(y-4) + 2(y-4) &= 0 \\ \Rightarrow (y-4)(y+2) &= 0 \\ y &= 4, -2 \end{aligned}$$

02. $f(x) = x^2, y = 0$ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল-

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

[S@Why] $f(x) = y = x^2, y = 0, x = 2$

$$\therefore y = (2)^2 = 4 \therefore y = 0, 4$$

$$\int_0^4 \sqrt{y} dy = \frac{2}{3} [y^{3/2}]_0^4 = \frac{2}{3} [(2^2)^{3/2} - 0] = \frac{2}{3} \times 8 = \frac{16}{3}$$

03. $y = \sqrt{1-x^2}$, x -অক্ষ এবং y -অক্ষ দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল- [MBSTU: 15-16, A]
- A. π B. 2π C. 4π D. $\frac{\pi}{4}$
- [S@Why]** $y = \sqrt{1-x^2}$ বা, $y^2 = 1-x^2$ বা, $x^2 + y^2 = 1^2$
ব্যাসার্ধ = 1, ক্ষেত্রফল = $\pi \cdot 1^2 = \pi$
১ম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রফল = $\frac{\pi}{4}$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. x -অক্ষ এবং $y = \sin x$ বক্ররেখার একটি চাপ দ্বারা গঠিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে? [PSTU: 16-17, A. 13-14; KU. 12-13; HSTU. 13-14; BSMRSTU. 17-18]
- A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
- [S@Why]** x -অক্ষ, $x=0$ এবং $x=\pi$ আর $y = \sin x$
 $\therefore$ চাপ দ্বারা গঠিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল- $\int_0^\pi y dx = \int_0^\pi \sin x dx = -[\cos x]_0^\pi = 2$

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x = 2$, $x = 3$, $y = 0$ এবং $y = x^2 + 2$ রেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [BSFMSTU. 19-20]
- A. 8.666 B. 8.333 C. 4.333 D. 16.666
- [S@Why]** ক্ষেত্রফল = $\int_2^3 (x^2 + 2) dx = \left[\frac{x^3}{3} + 2x \right]_2^3$
 $= \left(\frac{3^3}{3} + 2 \times 3 - \frac{2^3}{3} - 2 \times 2 \right) = \frac{27}{3} + 6 - \frac{8}{3} - 4$
 $= \frac{27 + 18 - 8 - 12}{3} = \frac{25}{3} = 8.33$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x^2 + y^2 = 36$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ১ম ও ২য় চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি কত? [BSMRSTU- 18-19]
- A. 36π B. 9π C. 18π D. 27π
- [S@Why]** $x^2 + y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$
 $\Delta = \pi \times 6 \times 6 = 36\pi$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $xy = 1$ অধিবৃত্ত, x -অক্ষ এবং $x = 1$ ও $x = 2$ রেখা দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [PSTU. 19-20]
- A. 2 B. 1 C. $\frac{3}{4}$ D. $\ln 2$
- [S@Why]** $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখা দুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $c^2 \ln \left| \frac{b}{a} \right|$
 $\therefore xy = 1$ অধিবৃত্ত, x অক্ষ এবং $x = 1$ ও $x = 2$ রেখা দুটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $1 \ln \left| \frac{2}{1} \right| = \ln 2$

STEP 04 PRIME TEST

Time: 15

01. $y^2 = 6x$ পরাবৃত্ত ও $y = x$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের কর।
- A. 4 unit B. $\frac{128}{3}$ unit C. $\frac{28}{3}$ unit D. 6 unit
02. $f(x) = x^2$, $y = 0$ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল-
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

03. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx$ এর মান কত?
- A. $\frac{3}{e^2}$ B. $\ln \frac{3}{2}$ C. $\ln 2$ D. e^2
04. $\int_{\sqrt{e}}^1 x \ln \frac{1}{x} dx$ এর মান কত?
- A. $e+1$ B. $\frac{1}{e}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $e + \frac{1}{2}$
05. $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ এর মান কত?
- A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$
06. $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx =$ কত?
- A. $\frac{3}{18}$ B. $\frac{7}{18}$ C. $\frac{7}{36}$ D. $\frac{14}{9}$
07. $\int_0^a \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$ এর মান কোনটি?
- A. 1 B. π C. $\frac{\pi}{2} - 1$ D. $\frac{\pi}{2} + 1$
08. $\int_0^1 x e^x dx$ এর মান কত?
- A. 0 B. -1 C. -1 D. e
09. $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \cdot \sin x dx$ এর মান-
- A. 0 B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{7}{3}$
10. $\int_2^5 \frac{dx}{x^2 - 4x + 13} = ?$
- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{12}$
11. $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx$ এর মান কত?
- A. $\frac{4}{15}$ B. $\frac{2}{15}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{8}{15}$
12. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t dt}{\sqrt{9 - \sin^2 t}}$ এর মান কত?
- A. $\sin^{-1} \frac{2}{5}$ B. $\sin^{-1} \frac{1}{3}$ C. $\sin^{-1} \frac{2}{7}$ D. $\frac{1}{5}$
13. $\int_{-1}^1 |x| dx$ এর মান-
- A. 2 B. -1 C. 1 D. 0
14. $\int \frac{e^x (1 + \sin x)}{(1 + \cos x)} dx = ?$
- A. $\log |\tan x| + c$ B. $e^x \tan \frac{x}{2} + c$ C. $e^x \cot x + c$ D. $\sin \log x + c$

15. $\int 5\sqrt{e^{2+4x}} dx =$ কত?

A. $\frac{5}{2} e^{1+2x} + c$

B. $5\sqrt{e^{1+2x}} + c$

C. $\frac{5}{4} \sqrt{e^{2+4x}} + c$

D. $\frac{\sqrt{5}}{4} \sqrt{e^{2+4x}} + c$

16. $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx = ?$

A. $x + c$

B. $\sqrt{\sin x} + c$

C. $\sin 2x + c$

D. 0

17. $\int \frac{dx}{(e^x + e^{-x})^2} = ?$

A. $\frac{1}{2(e^{2x} + 1)} + c$

B. $\frac{-1}{2(e^{2x} + 1)} + c$

C. $\frac{1}{2e^{2x}} + c$

D. $\frac{-1}{2e^{2x}} + c$

18. $\int \cos x e^{\sin x} dx$ এর যোগজ-

A. $e^{\cos x} + c$

B. $e^{\sin x} + c$

C. $\cos x + c$

D. $\tan x + c$

19. $\int (e^x + \frac{1}{x})(e^x + \ln x) dx = ?$

A. $\frac{1}{2}(e^x + \ln x) + c$

B. $\frac{1}{2}(e^x + \frac{1}{x}) + c$

C. $\frac{1}{2}(e^x + \ln x)^2 + c$

D. $\frac{1}{2}(e^x + \frac{1}{x})^2 + c$

20. $\int \frac{1+x}{1-x} dx = ?$

A. $\sin^{-1} x + c$

B. $\sqrt{1-x^2} + c$

C. $-\sqrt{1-x^2} + c$

D. $\sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

21. $\int \frac{dx}{1+\sin x}$ এর মান কত?

A. $\sec x + \tan x + c$

B. $\tan x - \sec x + c$

C. $\tan x + \sec x + c$

D. কোনোটিই নয়

22. $\int x e^x dx$ কত?

A. $x e^x + e^x + c$

B. $x e^x - e^x + c$

C. $\frac{x^2 e^x}{2} + c$

D. $x^2 e^2 + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{36-x^2}} =$ কত?

A. $\sin^{-1} x + c$

B. $\sin^{-1} \frac{x}{6} + c$

C. $\frac{1}{6} \sin^{-1} x + c$

D. $\frac{1}{6} \sin^{-1} \frac{x}{6} + c$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{25-16x^2}}$ এর মান কত?

A. $\frac{1}{5} \sin^{-1} \frac{5x}{4} + c$

B. $\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{5} + c$

C. $\frac{1}{5} \tan^{-1} \frac{4x}{5} + c$

D. $\frac{1}{4} \tan^{-1} \frac{5x}{4} + c$

25. $\int \cos^2 2x dx = ?$

A. $\frac{\sin^2 2x}{2} + k$

B. $\frac{2}{3} \sin^2 2x + k$

C. $4 \sin 2x \cos 2x + k$

D. $\frac{1}{8} (4x + \sin 4x) + k$

OMR SHEET

01. A B C D E

09. A B C D E

17. A B C D E

02. A B C D E

10. A B C D E

18. A B C D E

03. A B C D E

11. A B C D E

19. A B C D E

04. A B C D E

12. A B C D E

20. A B C D E

05. A B C D E

13. A B C D E

21. A B C D E

06. A B C D E

14. A B C D E

22. A B C D E

07. A B C D E

15. A B C D E

23. A B C D E

08. A B C D E

16. A B C D E

24. A B C D E

25. A B C D E

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা						
01	D	$y^2 = 6x = 4 \cdot \frac{3}{2} \cdot x \dots\dots (i)$ এবং $y = x \dots\dots (ii)$ দ্বারা আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল $\frac{8}{3} \frac{a^2}{m^3} = \frac{8}{3} \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 6$						
02	D	$f(x) = y = x^2, y = 0, x = 2$ $\therefore y = (2)^2 = 4 \therefore y = 0, 4$ $\int_0^4 \sqrt{y} dy = \frac{2}{3} [y^{\frac{3}{2}}]_0^4 = \frac{2}{3} [(2^2)^{\frac{3}{2}} - 0] = \frac{2}{3} \times 8 = \frac{16}{3}$						
03	B	$\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx = [\ln(1+e^x)]_0^{\ln 2} = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$						
04	C	$\int_{\sqrt{e}}^1 x \ln \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int_{\sqrt{e}}^1 x \ln x^{-1} dx = -2 \int_{\sqrt{e}}^1 x \ln x dx \Rightarrow 2 \int_1^{\sqrt{e}} x \ln x dx$ এখন, $\int x \ln x dx = \ln x \int x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int x dx \right\} dx$ $= \frac{x^2 \ln x}{2} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4}$ $\therefore 2 \int_1^{\sqrt{e}} x \ln \frac{1}{x} dx = 2 \left[\frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} \right]_1^{\sqrt{e}}$ $= 2 \left[\left(\frac{e \ln \sqrt{e}}{2} - \frac{e}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) \right]$ $= 2 \left(\frac{e \ln e}{4} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} \right) = 2 \left(\frac{e}{4} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} \right) = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$						
05	A	$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^1 \frac{x}{1+(x^2)^{\frac{1}{2}}} dx$ ধরি, $x^2 = z$ বা, $2x dx = dz$ এবং $x = 0$ হলে $z = 0$ ও $x = 1$ হলে $z = 1$ $\therefore \int_0^1 \frac{x}{1+(x^2)^{\frac{1}{2}}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x dx}{1+(x^2)^{\frac{1}{2}}}$ $= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dz}{1+z^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} [\tan^{-1} z]_0^1$ $= \frac{1}{2} [\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0)] = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{8}$						
06	B	$\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$ ধরি, $1+3x^4 = z^2$ <table border="1" data-bbox="1220 1859 1492 1948"><tr><td>x</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	x	1	0	z	2	1
x	1	0						
z	2	1						
07	C	$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = [\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}]_0^1 = \left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) - (0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1$						

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা						
08 B		$\int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 e^x (x-1+1) dx = \int_0^1 e^x \{(x-1)+1\} dx$ $[\because \int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c]$ $= [e^x (x-1)]_0^1 = [e(1-1) - e^0(0-1)] = 1$						
09 D		$\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x dx$ $= \int_2^1 z^2 (-dz) = -\left[\frac{z^3}{3}\right]_2^1$ $= -\left[\frac{1}{3} - \frac{8}{3}\right] = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ $\therefore \sin x dx = -dz$ <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>$\pi/2$</td></tr> <tr> <td>z</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>	x	0	$\pi/2$	z	2	1
x	0	$\pi/2$						
z	2	1						
10 D		$\int \frac{dx}{2x^2 - 4x + 13} = \int \frac{dx}{2x^2 - 4x + 4 + 9} = \int \frac{dx}{2x^2 + (x-2)^2}$ $\left[\because \int \frac{f'(x) dx}{a^2 + \{f(x)\}^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left\{\frac{f(x)}{a}\right\} + c\right]$ $= \frac{1}{3} \left[\tan^{-1} \frac{x-2}{3}\right]_2^x = \frac{1}{3} \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$						
11 C		$\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \cos x dx$ $= \int_0^{\pi/2} \cos x (1 - \sin^2 x) dx$ $\therefore \int_0^1 (1 - z^2) dz = \int_0^1 dz - \int_0^1 z^2 dz$ $= [z]_0^1 - \left[\frac{z^3}{3}\right]_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ $\therefore \cos x dx = dz$ <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>$\pi/2$</td></tr> <tr> <td>z</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	x	0	$\pi/2$	z	0	1
x	0	$\pi/2$						
z	0	1						
12 B		$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t dt}{\sqrt{9 - \sin^2 t}}$ $\text{ধরি, } \sin t = z \text{ বা, } \cos t dt = dz$ $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{9 - z^2}} dz = \left[\sin^{-1} \frac{z}{3}\right]_0^1 = \left[\sin^{-1} \left(\frac{1}{3}\right) - \sin^{-1} 0\right] = \sin^{-1} \frac{1}{3}$						
13 C		$\int_{-1}^1 x dx = \int_{-1}^0 x dx + \int_0^1 x dx$ $= -\int_{-1}^0 x dx + \int_0^1 x dx = -\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1$ $= -\left(0 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - 0\right) = 1$						
14 B		$\int \frac{e^x (1 + \sin x)}{(1 + \cos x)} dx = \int e^x \left(\frac{1}{1 + \cos x} + \frac{\sin x}{1 + \cos x}\right) dx$ $= \int e^x \left(\frac{1}{2 \cos^2 \left(\frac{x}{2}\right)} + \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \left(\frac{x}{2}\right)}\right) dx = \int e^x \left(\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2}\right) dx$ $[\because \int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c] = e^x \tan \frac{x}{2} + c$						

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
15 A		$\int 5\sqrt{e^{2-4x}} dx = 5 \int (e^{2-4x})^{\frac{1}{2}} dx$ $= 5 \int e^{1-2x} dx = 5 \frac{e^{1-2x}}{-2} = -\frac{5}{2} (e^{1-2x}) + c$
16 A		$\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx = \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}} dx$ $= \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int (1) dx = x + c$
17 B		$\int \frac{dx}{(e^x + e^{-x})^2} = \int \frac{dx}{\left(\frac{e^{2x} + 1}{e^x}\right)^2}$ $= \int \frac{e^{2x} dx}{(e^{2x} + 1)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z^2} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{z}\right) + c$ $= -\frac{1}{2(e^{2x} + 1)} + c$ $\text{ধরি, } e^{2x} + 1 = z$ $\Rightarrow 2e^{2x} dx = dz$ $\Rightarrow e^{2x} dx = \frac{1}{2} dz$
18 B		$\int \cos x \cdot e^{\sin x} dx = \int e^{\sin x} \cdot d(\sin x) = e^{\sin x} + c$
19 C		$\int \left(e^x + \frac{1}{x}\right) (e^x + \ln x) dx = \int (e^x + \ln x)^1 \cdot \left(e^x + \frac{1}{x}\right) dx$ $= \frac{1}{2} (e^x + \ln x)^2 + c \left[\int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c\right]$
20 D		$\int \frac{\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x} \sqrt{1+x}} dx = \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ $= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ $= \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} dx \left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c\right]$ $= \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{1-x^2} + c$ $= \sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$
21 B		$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x} dx = \int \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx$ $= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$ $= \int \sec^2 x dx - \int \sec x \tan x dx$ $= \tan x - \sec x + c$
22 B		$\int x e^x dx = x \int e^x dx - \int \left\{\frac{d}{dx}(x) \int e^x dx\right\} dx$ $= x e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x e^x - e^x + c$
23 B		$\int \frac{dx}{\sqrt{36 - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{6^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{6} + c$
24 B		$\int \frac{dx}{\sqrt{25 - 16x^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2 - x^2}} = \frac{1}{4} \sin^{-1} \left(\frac{4x}{5}\right) + c$
25 D		$\int \cos^2 2x dx = \frac{1}{2} \int 2 \cos^2 2x dx$ $= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x$ $\therefore \int \cos^2 2x dx = \frac{1}{8} (4x + \sin 4x) + k$



STEP 01 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও গাণিতিক উদাহরণ সমাধান

STEP 02 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. দুটি ভেক্টর $\vec{u}$ এবং $\vec{v}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত হলে $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$ এবং $|\vec{u} \times \vec{v}| = 3\sqrt{3}$ হবে? [GST-A. 20-21]

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

[S@Why] $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$ ধরি অন্তর্ভুক্ত কোণ θ ; $|\vec{u} \times \vec{v}| = 3\sqrt{3}$

$$\therefore \tan \theta = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{\vec{u} \cdot \vec{v}} = \frac{3\sqrt{3}}{9} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ \therefore \theta = 30^\circ$$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $4\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? [JnU. 16-17]

- A. 45° B. 90° C. 180° D. 0°

[S@Why] অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{uv} \right)$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{6 - 2 + 3}{\sqrt{4 + 1 + 9} \cdot \sqrt{9 + 4 + 1}} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{7}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = 60^\circ$$

02. $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $4\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? [JnU. 16-17]

- A. 45° B. 90° C. 180° D. 0°

[S@Why] অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{uv} \right)$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{8 + 2 + 18}{\sqrt{14} \times \sqrt{56}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{28}{\sqrt{784}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{28}{28} \right) = 0^\circ$$

03. $\hat{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\hat{b} = 4\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে P এর মান কত? [JnU. 13-14; CU-F. 11-12; DU. 04-05]

- A. $-\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{2}$
C. $\frac{2}{7}$ D. $-\frac{2}{7}$

[Ans B]

04. $\hat{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\hat{b} = 4\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে P এর মান কত? [JnU. 13-14; CU-F. 11-12; DU. 04-05]

- A. $-\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{2}{7}$ D. $-\frac{2}{7}$

[S@Why] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow 8 - 2p - 1 = 0 \therefore p = \frac{7}{2}$

05. $\vec{A} = 3\hat{i} - 7\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 5\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [JnU. 12-13]

- A. 90° B. 0°
C. 45° D. 60°

[S@Why] অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} \right)$
 $= \cos^{-1} \left(\frac{15 - 21 + 6}{\sqrt{67} \times \sqrt{38}} \right) = \cos^{-1} (0) = 90^\circ$

06. $\vec{A} = 3\hat{i} - 7\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 5\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [JnU. 12-13]

- A. 90° B. 0° C. 45° D. 60°

[S@Why] অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{uv} \right)$
 $= \cos^{-1} \left(\frac{15 - 21 + 6}{\sqrt{9 + 49 + 9} \times \sqrt{25 + 9 + 4}} \right)$
 $= \cos^{-1} \left(\frac{0}{\sqrt{9 + 49 + 9} \times \sqrt{25 + 9 + 4}} \right) \therefore \theta = 90^\circ$

07. $\vec{a} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b} = ?$ [JnU. 10-11]

- A. 3 B. 4 C. -3 D. -4

[S@Why] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 0 - 6 = -3$

08. ভেক্টর $\vec{OA} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ এবং ভেক্টর $\vec{OB} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $|\vec{AB}|$ এর মান- [JnU. 09-10; DU-7Clg. 19-20; CU-F. 12-13]

- A. $4\sqrt{19}$ B. 2 C. $2\sqrt{19}$ D. $4\sqrt{29}$

[S@Why] $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$
 $\Rightarrow (4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}) - (2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}) = 2\hat{i} - 6\hat{j} + 6\hat{k}$
 $\therefore |\vec{AB}| = \sqrt{4 + 36 + 36} = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\vec{A} = \sqrt{3}\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = \sqrt{3}\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ হলে A ভেক্টরের উপর B ভেক্টরের অভিক্ষেপ হবে কোনটি? [KU. 19-20, 16-17]

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1
C. $\frac{4}{\sqrt{5}}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{4}$

[Ans C]

02. $b\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ও $2b\hat{i} - b\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে b কত হবে? [KU. 18-19]


- A. 3, -5 B. -2, 1 C. -1, 2 D. 5, 7

[S@Why] ভেক্টরদ্বয় লম্ব হলে তাদের ডট গুণফল 0 (শূন্য) হয়
 $\therefore 2b^2 - 2b - 4 = 0 \Rightarrow b^2 - b - 2 = 0 \therefore b = 2, -1$

03. দুটি ভেক্টর 'a' এবং 'b' এর আরম্ভ বিন্দু একই হলে b এবং a এর অন্তঃস্থ কোণের সংযোগ রেখাংশ দ্বারা নির্দেশিত ভেক্টরের মান হলে- [KU. 15-16]

- A. a - b B. b - a C. a + b D. -a - b

[S@Why]



04. $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b} = 5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপাংশ হবে- [KU. 14-15]

- A. $\hat{a}$ B. $\frac{1}{a}$ C. $\frac{1}{2} \vec{a}$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] উপাংশ $= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{a} \hat{a} = \frac{10 - 3 - 4}{\sqrt{4 + 1 + 4}} \hat{a} = \frac{3}{3} \hat{a} = \hat{a}$

05. যদি $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হয়, তবে $\vec{a} + \vec{b}$ এবং $\vec{a} - \vec{b}$ এর মধ্যবর্তী কোণের মান হবে-
A. 45° B. 90° C. 30° D. 120° [KU. 14-15, 12-13]

SOWhy $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$; $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$
 $\vec{a} + \vec{b} = 4\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$; $\vec{a} - \vec{b} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$

$\vec{a} + \vec{b}$ ও $\vec{a} - \vec{b}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}{|\vec{a} + \vec{b}| \cdot |\vec{a} - \vec{b}|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-8 + 3 + 5}{\sqrt{16 + 1 + 1} \cdot \sqrt{4 + 9 + 25}} \right) = \cos^{-1}(0) = 90^\circ$$

06. $\vec{v}$ এবং $-\vec{v}$ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রী?
A. 0° B. 180° C. 360° D. 90° [KU. 13-14]

SOWhy $\vec{v}$ এবং $-\vec{v}$ পরস্পর বিপরীতমুখী বলে মধ্যবর্তী কোণ 180°

07. $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরটি z-অক্ষের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তা কত? [KU. 12-13]
A. $\cos^{-1} \frac{2}{3}$ B. $\cos^{-1} \left(\frac{-1}{3} \right)$ C. 60° D. 45°

SOWhy Type-2 অনুসারে z অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ,

$$\theta = \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \cos^{-1} \frac{2}{3}$$

08. a-এর মান কত হলে $a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $2\hat{i} - a\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হবে?
A. -2 B. -1 C. 2 D. 1 [KU. 12-13; CU. 05-06]

SOWhy $2a + 2a - 4 = 0 \Rightarrow a = 1$

09. যে ভেক্টরের মডুলাস ও দিক স্থির অথচ অবস্থান স্থির নয় তাকে বলা হয়-
A. সমান ভেক্টর B. বিপরীত ভেক্টর C. শূন্য ভেক্টর D. মুক্ত ভেক্টর [KU. 11-12]

SOWhy যে ভেক্টরের মডুলাস ও দিক স্থির অথচ অবস্থান স্থির নয় তাকে মুক্ত ভেক্টর বলে।

10. যদি $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ একক ভেক্টর হয় এবং $(\vec{a} + \vec{b})$ ও একটি একক ভেক্টর হয়, তবে $\vec{a}$ এবং $\vec{b}$ এর মধ্যে কোণ কত? [KU. 09-10]

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

SOWhy [if $R = P = Q$ then $\alpha = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$] Here, $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ একক

ভেক্টর এবং তাদের লব্ধি $(\vec{a} + \vec{b})$ ও একটি একক ভেক্টর,

$$\therefore \vec{a} \text{ এবং } \vec{b} \text{ এর মধ্যে কোণ} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow P = Q = R \text{ হলে, } \alpha = 120^\circ$$

বিকল্প পদ্ধতি: $(\vec{a} + \vec{b})^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta$

$$1^2 = 1^2 + 1^2 + 2 \cos \theta; \cos \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}$$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. m এর মান কত হলে $2\hat{i} + m\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $6\hat{i} - 3\hat{j} - 9\hat{k}$ পরস্পর সমান্তরাল হবে?
A. 1 B. -1 C. 3 D. $2/3$ [CoU. 19-20; IU. 07-08]

SOWhy $2\hat{i} + m\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $6\hat{i} - 3\hat{j} - 9\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল

$$\therefore \frac{2}{6} = \frac{m}{-3} \text{ বা, } m = -1$$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. তিনটি ভেক্টর A, B ও C সমতলীয় না হওয়ার শর্ত-
A. $(A \times C) \cdot B = 0$ B. $(B \times C) \cdot A = 0$ C. $(A \times C) \cdot C = 0$ D. $(C \times A) \cdot B = 0$ [IU-D. 19-20]

Ans C

02. $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $-\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ- [IU. 18-19]
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

SOWhy $\theta = \cos^{-1} \frac{1 \times (-1) + 2 \times 1 + (-2) \times (-1)}{\sqrt{1 + 4 + 1} \cdot \sqrt{1 + 1 + 4}}$
 $= \cos^{-1} \frac{3}{6} = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = 60^\circ$

03. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b}$ হলে $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [IU. 17-18, A]
A. 45° B. 60° C. 90° D. 180°

SOWhy $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b}$ হলে $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ $= 90^\circ$

04. $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের অংশক- [IU. 17-18]
A. $\frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$ B. $\frac{1}{6}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$

C. $\frac{1}{9}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$ D. $\frac{1}{12}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$

SOWhy $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$; $\vec{b} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$

$$\vec{a} \text{ ভেক্টর বরাবর } \vec{b} \text{ ভেক্টরের অংশক} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}|} \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{(6 - 3 - 2)}{\sqrt{9} \cdot \sqrt{9}} \cdot \frac{2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{3} = \frac{1}{9}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$$

05. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু দুইটি যথাক্রমে $\vec{A} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল- [IU. 17-18; BSMRSTU. 19-20]

A. $10\sqrt{2}$ sq. unit B. $10\sqrt{3}$ sq. unit
C. $10\sqrt{10}$ sq. unit D. $-3\sqrt{10}$ sq. unit

Ans B

06. $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর তিনটি সমতলীয় হলে a এর মান- [IU. 17-18]

A. $-31/3$ B. $-31/4$ C. $-31/15$ D. $-31/6$

Ans A

07. যে কোন ভেক্টরের একক ভেক্টর বা ঐ ভেক্টর বরাবর সমান্তরাল একক ভেক্টর-এই দুটি কথার অর্থ- [IU. 17-18]

A. একই নয় B. বিপরীত
C. একই D. কোনটিই নয়

Ans C

08. $7\hat{i} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ এর অভিক্ষেপ- [IU. 16-17]

A. $\frac{25}{\sqrt{65}}$ B. $\frac{25}{\sqrt{55}}$ C. $\frac{32}{\sqrt{65}}$ D. $\frac{25}{\sqrt{45}}$

SOWhy ধরি, $\vec{A} = 7\hat{i} + 4\hat{k}$; $\vec{B} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$

$$\vec{A} \text{ ভেক্টরের উপর } \vec{B} \text{ ভেক্টরের অভিক্ষেপ} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}|} = \frac{28 + 0 + 4}{\sqrt{7^2 + 4^2}} = \frac{32}{\sqrt{65}}$$

09. নিচের কোন ভেক্টরটির সকল ভেক্টরের উপর লম্ব?
A. শূন্য ভেক্টর B. একক ভেক্টর
C. অবস্থান ভেক্টর D. বিন্দু ভেক্টর [IU-E. 15-16]

Ans B

10. যদি $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ হয় তা হলে $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ হবে- [IU. 14-15]

A. $-\frac{13\sqrt{2}}{10}$ B. $-\frac{13}{7}$ C. $-\frac{13}{10\sqrt{7}}$ D. $-\frac{13}{5\sqrt{2}}$

SOWhy অভিক্ষেপ $= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{2 \times 3 + (-1) \times 4 + 3 \times (-5)}{\sqrt{3^2 + 4^2 + (-5)^2}} = \frac{6 - 4 - 15}{\sqrt{50}} = -\frac{13}{5\sqrt{2}}$

01. 4 একক এবং 2 একক মানের দুইটি ভেক্টর $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ পরস্পর 120° কোণে
ক্রিয়াশীল হলে, $\vec{P} \cdot \vec{Q} = ?$
A. 8 B. -8 C. 4 D. -4 [MBSTU-C. 19-20]

S.O Why? $\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQ \cos \theta = 4.2 \cos(120^\circ) = 4.2 \left(-\frac{1}{2}\right) = -4.2$

02. $\vec{B} = 4i - 4j + 7k$ ভেক্টরের দিকে $\vec{A} = i - 2j + k$ এর অংশক হবে- [MBSTU-C. 19-20]
- A. $\frac{9}{17} (4i - 4j + 7k)$
- B. $\frac{9}{19} (4i - 4j + 7k)$
- C. $\frac{19}{81} (4i - 4j + 7k)$
- D. $\frac{17}{9} (4i - 4j + 7k)$
- $\hat{}$ $\hat{}$ $\hat{}$
- Ans C**

03. $\vec{A} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টর দুইটি যে সামান্তরিকের
সন্নিহিত বাহু, তার ক্ষেত্রফল-
A. $\sqrt{3}$ B. $6\sqrt{3}$ C. $\sqrt{6}$ D. $6\sqrt{6}$

SO Why $\bar{A} \times \bar{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = -6\hat{i} - 12\hat{j} - 6\hat{k}$

$$\therefore \text{Magnitude } \bar{A} \times \bar{B} = \sqrt{(-6)^2 + (-12)^2 + (-6)^2} = 6\sqrt{6}$$

০১. ভেক্টর $\cos\alpha\cos\beta \hat{i} + \cos\alpha\sin\beta \hat{j} + \sin\alpha \hat{k}$ একটি - [BSMRSTU-B. 19-20]
 A. শূন্য ভেক্টর B. একক ভেক্টর C. দ্রুত ভেক্টর D. কোনোটিই নয়

S@why ধরি, $A = \cos\alpha \cos\beta \hat{i} + \cos\alpha \sin\beta \hat{j} + \sin\alpha \hat{k}$
 $\therefore |\vec{A}| = \sqrt{\cos^2\alpha \cos^2\beta + \cos^2\alpha \sin^2\beta + \sin^2\alpha}$
 $= \sqrt{\cos^2\alpha (\cos^2\beta + \sin^2\beta) + \sin^2\alpha} = \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = 1$

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রে $\vec{AB} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\vec{AC} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ হলে $\vec{BC}$ এর দৈর্ঘ্য কত? [NSTU-19-20]
- A. $\sqrt{5}$ B. $6\sqrt{2}$ C. $\sqrt{73}$ D. $\sqrt{89}$

SA Why $\vec{AB} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$; $\vec{AC} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$

$$\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = -\hat{i} + 2\hat{j} \quad \therefore |\vec{BC}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ দুইটি ভেক্টর হলে, $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ কত? [PSTU. 19-20]
- A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{11}{3}$ D. $\frac{13}{3}$ **Ans D**

A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{11}{3}$ D. $\frac{13}{3}$ **Ans D**

১১. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১১
০১. $a = a_1 + a_2 + a_3$ এর একক ভেক্টর এর জন্য, [BSFMSTU. 19-20]

(i) $\frac{a}{|a|}$ (ii) $|a| = 1$

(iii) $|a| \neq 0$ হলে, নিচের কোনটি সত্য-

A. (i) & (ii) B. (i) & (iii) C. (i) D. (ii) & (iii)

S(B) Why $a = a_1 + a_2 + a_3$ এর একক ভেক্টরের জন্য

(i) $\frac{a}{|a|}$ या शक्ति (ii) $|a| = 1$ या शक्ति नष्ट (iii) $|a| \neq 1$ या शक्ति

অধ্যায়
০৫
প্রথম পত্র

বিন্যাস ও সমাবেশ

প্রথম অংশ: বিন্যাস

STEP 01 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও স্যামান্টাল তথ্যসহ সমাধান

STEP 02 ANALYSIS OF GST QUESTION

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. JAGANNATH শব্দটির বর্ণগুলোকে “স্বরবর্ণগুলো (Vowels) সর্বদা একসাথে থাকবে এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলো (Consonants) সর্বদা একসাথে থাকবে”- এই শর্তে কতভাবে বিন্যস্ত করা যায়? [JnU. 17-18]

A. $6!$ B. $\frac{6!}{3!2!}$ C. $\frac{7!}{2!}$ D. $\frac{3!}{3!2!}$

So Why JAGANNATH শব্দটিতে মোট বর্ণ 9টি বার মধ্যে স্বরবর্ণ 3টি (3টি A) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ 6টি (2টি N)।

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা} = 2! \times \frac{3}{3} \times = 6!$$

02. বাস্তববর্ণগুলোকে বিজোড় স্থানে রেখে "EQUATION" শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়? [JnU. 08-09, 05-06; JU. 06-07; KU 07-08; RU. 05-06]
- A. 2080
B. 2880
C. 1090
D. 2456

SB Why EQUATION শব্দটিতে মোট বর্ণ ৪টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩টি, স্বরবর্ণ ৫টি। ৪টি অবস্থান বিজোড় (প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম)

সুতরাং 3টি ব্যঞ্জনবর্ণকে 4টি বিজেড স্থানে সাজানোর উপায় = 4P_3
এবং বাকী 5টি স্থানে 5টি স্বরবর্ণ সাজানো যায় = 5! ভাবে
 $\therefore$ মোট বিন্যাস সংখ্যা = ${}^4P_3 \times 5! = 2880$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. ADMISSION শব্দটির A ও D কে দুই প্রান্তে রেখে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে? [KU. 19-20]

A. 2020 B. 2025
C. 2520 D. 2525

So why ADMISSION শব্দটির প্রথমে A ও শেষে D কে রেখে
সাজানো সংখ্যা = $\frac{7}{2 \mid 2}$ A

--	--	--	--	--	--	--

 D

এবং প্রথমে D ও শেষে A রেখে সাজানো সংখ্যা = $\frac{7}{2 \mid 2}$

D						A
---	--	--	--	--	--	---

$$A \text{ ও } D \text{ কে দুই প্রান্তে রেখে সাজানো সংখ্যা} = \frac{7}{2 \mid 2} + \frac{7}{2 \mid 2} = 2520$$

02. ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 3:5$ হলে n এর ধনাত্মক মান কোনটি?

[KU-15-16, 14-15; RU-09-10]

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

[S@Why] ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 3:5$

$$\Rightarrow \frac{(2n+1)}{(2n+1-n+1)} : \frac{(2n-1)}{(2n-1-n)} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{(2n+1)}{(n+2)} : \frac{(2n-1)}{(n-1)} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{(2n+1)2n(2n-1)!}{(n+2)(n+1)n(n-1)!} : \frac{(2n-1)!}{(n-1)!} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{2n(2n+1)}{n(n+1)(n+2)} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{4n+2}{n^2+n+2n+2} = \frac{3}{5} \Rightarrow 20n+10 = 2n^2+9n+6$$

$$\Rightarrow 3n^2-11n-4=0 \Rightarrow 3n^2-12n+n-4=0$$

$$\Rightarrow 3n(n-4)+1(n-4)=0 \Rightarrow (3n+1)(n-4)=0 \therefore n=4, -\frac{1}{3}$$

03. কোন অংকের পুনরাবৃত্তি না করে 0, 3, 5, 6, 8 অংকগুলো দ্বারা 4000 এর চেয়ে বড় কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়?

[KU-13-14]

A. 168 B. 186 C. 268 D. 286

[S@Why] 4000 এর চেয়ে বড় চার অংকবিশিষ্ট সংখ্যা হল $= {}^4P_3 \times 3 = 72$ আবার, পাঁচ অংকবিশিষ্ট সংখ্যা $= {}^5P_5 - {}^4P_4 = 96$

$\therefore$ মোট সংখ্যা = $72 + 96 = 168$ টি

04. যদি ${}^nP_4 = 14n^2 P_3$ হয়, তবে n এর মান কত?

[KU-12-13; BSMRSTU-A-19-20; BRU-D-13-14]

A. 7 বা 8 B. 8 বা 9 C. 9 বা 10 D. 10 বা 11

[S@Why] ${}^nP_4 = 14n^2 P_3$

$$\Rightarrow n(n-1)(n-2)(n-3) = 14n^2(n-2)(n-3)(n-4)$$

$$\Rightarrow n(n-1) = 14(n-4) \Rightarrow n^2 - 15n + 56 = 0$$

$$\Rightarrow (n-7)(n-8) = 0 \therefore n = 7 \text{ অথবা } 8$$

05. একটি পদে 3 জন প্রার্থী এবং 5 জন লোকের ভোটে নির্বাচিত হবে। কত প্রকারে ভোট দেয়া যেতে পারে?

[KU-12-13]

A. 243 B. 245 C. 244 D. 10

[S@Why] (প্রার্থী)³ = $3^5 = 243$

06. LOVE শব্দটি স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি না রেখে কত ভাবে সাজানো যায়-

[KU-11-12]

A. 24 B. 18 C. 12 D. 6

[S@Why] সাজানো সংখ্যা = $4! - 3! \times 2! = 12$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. DIGICICELL শব্দটির সবগুলো বর্ণ ব্যবহার করে যতগুলো বিন্যাস সংখ্যা পাওয়া যায়-

[IU-A-19-20]

A. 10120 B. 10140 C. 10160 D. 10080

[S@Why] DIGICICELL শব্দটির সবগুলো বর্ণ ব্যবহার করে বিন্যাস

$$\frac{10!}{3! \times 2! \times 2!} = 151200 \text{ Ans: } 151200$$

02. যদি Ride শব্দটির অক্ষরগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয় তবে কতগুলি বিন্যাস স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হবে?

[IU-A-17-18]

A. 6 B. 11 C. 12 D. 24

[S@Why] RIDE শব্দটিতে মোট অক্ষর = 4টি

$$\text{স্বরবর্ণ} = I, E = 2 \text{টি} \therefore \text{স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হবে এরূপ বিন্যাস} = \frac{4!}{2} \times 2 = 12$$

03. 'Laughter' শব্দটির অক্ষরগুলি নিয়ে 'Later' দিয়ে শুরু এরূপ শব্দের সংখ্যা-

[IU-E-14-15]

A. 5040 B. 40320 C. 6 D. 60

[S@Why] LAUGHTER শব্দটিতে মোট অক্ষর = 8টি

LATER দিয়ে শুরু করতে হবে যেখানে অক্ষর = 5টি

$$\text{বিন্যাস যোগ্য অক্ষর} = 8 - 5 = 3 \therefore \text{সাজানো যাবে} = 3! = 6$$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. EQUATION শব্দ হতে প্রতিবারে 3টি স্বরবর্ণ ও 2টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায়-

[BRUR-D-19-20, 17-18; DU-19-20]

A. 360 B. 3600 C. 1800 D. 5400

[S@Why] EQUATION শব্দটিতে স্বরবর্ণ = 5 এবং ব্যঞ্জন = 3

$$3 \text{টি স্বরবর্ণ ও } 2 \text{টি ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে সাজানো যাবে} = {}^5P_3 \times {}^3P_2 = 360$$

02. nP_r এর জন্য কোনটি সঠিক?

[BRUR-15-16]

A. $r \geq n$ B. $r \leq n$ C. $n \leq r$ D. $n < r$ [Ans] B

03. যদি BRUR এর টেলিফোন নম্বরগুলো শুধুমাত্র 0 ও 1 অংক দুটি দ্বারা গঠিত হয় এবং প্রতিটি টেলিফোন নম্বরে 10টি করে অংক থাকে, তবে BRUR মোট কতগুলো টেলিফোন সংযোগ দেওয়া যাবে?

[BRUR-15-16]

A. 100 B. 1000 C. 1024 D. 10^{10} [S@Why] টেলিফোন সংখ্যা = $(10)^{\text{সংখ্যা}} = (10)^2 = 100$

04. a, b, c, d, e, f অক্ষরগুলো থেকে 3টি অক্ষর দ্বারা গঠিত বিন্যাসের সংখ্যা নির্ণয় কর। যেখানে প্রতিটি বিন্যাসে কমপক্ষে একটি স্বরবর্ণ বর্তমান থাকবে?

[BRU-12-13]

A. 93 B. 96 C. 106 D. 36

[S@Why] a, b, c, d, e, f শব্দটিতে মোট অক্ষর = 6টি শব্দ হবে 3 অক্ষরবিশিষ্ট। স্বরবর্ণ = a, e = 2টি যেখানে কমপক্ষে 1টি স্বরবর্ণ থাকবে।

$$\text{প্রতিবারে 3টি করে নিয়ে বিন্যাস} = {}^6P_3$$

$$\text{সবগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে বিন্যাস} = {}^4P_3$$

$$\text{কমপক্ষে 1টি স্বরবর্ণ নিয়ে বিন্যাস} = {}^6P_3 - {}^4P_3 = 96$$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. 5 টি মুদ্রা 4টি দানবস্ত্রে কতভাবে ফেলা যায়?

[JKNIU-18-19]

A. 4^4 B. 4^5 C. 5^4 D. 5^5 [S@Why] (দানবস্ত্র)⁵ = $(4)^5$

02. কতভাবে 5 জন লোক একটি লাইনে দাঁড়াতে পারে?

[JKNIU-18-19]

A. 24 B. 120 C. 720 D. 5040

[S@Why] 5 জন লোক এক লাইনে দাঁড়াতে পারে = $5! = 120$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. 9 সংখ্যক উপাদান থেকে একবারে কতগুলো উপাদান নিলে তাদের বিন্যাস ও সমাবেশ সমান হবে?

[SUST-B-19-20]

A. 0 এবং 1 B. 1 এবং 8 C. 0 এবং 9

D. 1 এবং 9 E. 0 এবং 8

[S@Why] ${}^9P_0 = 9$ এবং ${}^9C_0 = 9$; আবার ${}^9P_1 = 9$ এবং ${}^9C_1 = 9$

02. 0, 1, 2, 6 অংকগুলি একবার করে ব্যবহার করে 3 দ্বারা বিভাজ্য মোট কতটি (এক অংকের, দুই অংকের, তিন অংকের ও চার অংকের) সংখ্যা গঠন করা যাবে?

[SUST-B-16-17]

A. 18 B. 30 C. 24

D. 36 E. 32

[S@Why] 1 অংকের সংখ্যা 6, 2 অংকের সংখ্যা 12, 21, 60 অংকের সংখ্যা গঠনে আমরা খেয়াল রাখব যে সংখ্যাগুলোর অংকের সমষ্টি যাতে 3 দ্বারা বিভাজ্য হয়। তাহলে 3 অংকের সংখ্যা গঠন-

0 না দিলে $1 + 2 + 6$, 3 দ্বারা বিভাজ্য কাজেই 3! সংখ্যক সংখ্যা

1 না দিলে $6 + 2 + 0$, 3 দ্বারা বিভাজ্য না

2 না দিলে $6 + 1 + 0$, 3 দ্বারা বিভাজ্য না

6 না দিলে $1 + 2 + 0$, 3 দ্বারা বিভাজ্য

কাজেই এরূপ সংখ্যা আছে = $2 \times 2 \times 1 = 4$ টি।

4 অংকের বেলায় $1 + 2 + 6 + 0$, 3 দ্বারা বিভাজ্য।

কাজেই প্রথমে 0 বাদে বাকি সংখ্যা বসবে। মোট = $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$ টি

মোট = $1 + 3 + 6 + 4 + 18 = 32$ টি।

03. 0, 1, 2, 3, 4 অঙ্কগুলি একবার মাত্র ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্কের মোট কতটি জোড় সংখ্যা গঠন করা যাবে? [SUST. 15-16]
- A. 54 B. 60 C. 72 D. 96 E. 120
- [S@Why]** জোড় সংখ্যা হতে হলে শেষে 0, 2 বা 4 হতে হবে।
 $\therefore$ জোড় সংখ্যা = $4! + (4! - 3!) + (4! - 3!) = 60$
04. বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় 4 জন ছেলে ও 2 জন মেয়েকে এক সারিতে বসানো হবে। কতভাবে বসানো সম্ভব যেনো 2 জন মেয়ে সবসময় পাশাপাশি বসে? [SUST. 12-13]
- A. 60 B. 120 C. 240 D. 360 E. 270
- [S@Why]** ছেলে = 4 জন এবং মেয়ে = 2 জন।
 $\therefore$ 2 জন মেয়েকে এক সাথে বসানো সম্ভব = $(6 - 2 + 1)! \times 2! = 5! \times 2! = 240$
05. 2, 3, 7, 8 দ্বারা গঠিত 7200 এর চেয়ে বড় সংখ্যা কয়টি? [SUST. 07-08]
- A. 24 B. 6 C. 12 D. 10
- [S@Why]** মোট গঠিত সংখ্যা = $\frac{4!}{4} \times 2 = 12$ [সহস্র শতক দশক একক]
 (সহস্রের ঘরে 7 ও 8 বসতে পারে)
06. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই অঙ্কগুলো দ্বারা কোন অংক পুনরাবৃত্তি না করে 30000 এবং 60000 এর মাঝে মোট কয়টি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা লিখা যাবে? [SUST. 07-08]
- A. 1440 B. 2160 C. 720 D. কোনটিই নয়
- [S@Why]** অযুতের ঘরে বসার যোগ্যসংখ্যা = (3, 5, 4) = 3 টি
 $\therefore$ মোট গঠিত সংখ্যা = $\frac{7P_5}{7} \times 3 = 108$ [অযুত সহস্র শতক দশক একক]
07. দুইজন 'খ' ইউনিটের পরীক্ষার্থীকে পাশাপাশি না বসিয়ে সাতজন 'ক' ইউনিটের পরীক্ষার্থী ও পাঁচজন 'খ' ইউনিটের পরীক্ষার্থীকে এক লাইনে কত প্রকারে সাজানো যায়? [SUST. 06-07]
- A. $7! \times 7P_5$ B. $7! \times 8P_5$ C. $7! \times 7P_8$ D. কোনটিই নয়
- [S@Why]** 'ক' ইউনিটের পরীক্ষার্থী 7 জন। (যারা সংখ্যায় বেশি)
 'খ' ইউনিটের পরীক্ষার্থী 5 জন। (তারা ১ম বসবে)
 7 জন 'ক' ইউনিটের পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফাঁকা জায়গা 8টি।
 8টি ফাঁকা স্থানে 'খ' ইউনিটের 5 জন বসতে পারে $8P_5$ উপায়ে এবং 'ক' ইউনিটের 7 জন নিজেদের মধ্যে $7!$ উপায়ে বসতে পারে।
 $\therefore$ মোট বিন্যাস = $7! \times 8P_5$
08. Zigzag শব্দটির অক্ষরগুলোকে মোট কতভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকারে সাজানো যায়? [SUST. 03-04]
- A. 720 B. 1440 C. 360 D. 180
- [S@Why]** ZIGZAG শব্দটিতে মোট 6টি অক্ষর আছে যার 2টি G এবং 2টি Z $\therefore$ মোট সাজানোর উপায় = $\frac{6!}{2!2!} = 180$
09. Parallel শব্দের সবগুলো অক্ষর নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মোট কত ভাবে সাজানো যায়? [SUST. 01-02; MBSTU. 12-13; রা.বো. ২০১১, ০৩; সি.বো. ১১; চ.বো. ২০১২]
- A. 3360 B. 3630 C. 6330 D. 3300
- [S@Why]** Parallel শব্দটিতে মোট 8টি বর্ণ আছে যার 2টি A, 3টি L
 $\therefore$ মোট সাজানোর সংখ্যা = $\frac{8!}{2!3!} = 3360$
- মামা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়**
01. একটি প্রতিষ্ঠানের দশজন কর্মী মিটিং এর সময় প্রধান কর্মকর্তার আসনটি নির্দিষ্ট রেখে একটি গোল টেবিলের চারপাশে কতভাবে বসতে পারে? [JUST-A. 19-20]
- A. 3628900 B. 362880 C. 1814400 D. 1815400
- [S@Why]** গোল টেবিলের চারপাশে বসতে পারবে = $(10 - 1)! = 9! = 362880$

02. যশোর শহরের টেলিফোন নাম্বার 42, 43 দিয়ে শুরু এবং 5 অঙ্ক বিশিষ্ট হলে মোট সম্ভাব্য সংযোগ সংখ্যা কত? [JUST-A. 19-20]
- A. 10^3 B. 10^5 C. 2×10^3 D. 2×10^5
- [S@Why]** মোট সম্ভাব্য সংযোগ সংখ্যা
- | | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| 4 | 2,3 | | | |
|---|-----|--|--|--|
- ${}^2P_1 \times {}^{10}P_1 \times {}^{10}P_1 \times {}^{10}P_1$
 $= 2 \times 10^3$
03. ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম 10টি বর্ণ হতে প্রত্যেকবার 5টি বর্ণ নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যাবে? [JUST. 18-19]
- A. 25240 B. 28240 C. 30240 D. 35240
- [S@Why]** ${}^{10}P_5 = 30240$
04. 'JESSORE' শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যায়? [JUST. 18-19]
- A. 2520 B. 1260 C. 2540 D. 1220
- [S@Why]** JESSORE শব্দটিতে মোট শব্দ n = 7
 যেখানে, S = 2টি, E = 2টি
 শব্দগুলিকে সাজানো যাবে = $\frac{7!}{2!2!} = 1260$
05. যশোর শহরের টেলিফোন নম্বর 72, 73 বা 76 দিয়ে শুরু এবং 6 অঙ্ক বিশিষ্ট হলে মোট সম্ভাব্য সংযোগ কত? [JUST. 12-13]
- A. 10^6 B. 10^4 C. 3×10^6 D. 3×10^4
- [S@Why]**
- | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 7 | 2 | | | | |
| 7 | 3 | | | | |
| 7 | 6 | | | | |
- 72, 73 বা 76 হতে পারে = ${}^3P_1 = 3$
 অবশিষ্ট ঘর ফাঁকা = 4, যাদের সাজানো যাবে = 10^4
 নির্ণেয় সংযোগ = 3×10^4
06. 2 জন CSE ছাত্রকে পাশাপাশি না বসিয়ে 6 জন EEE এর ছাত্র ও 3 জন CSE ছাত্রকে কত রকমে একটি লাইনে সাজানো যায়? [JUST. 12-13]
- A. 320 B. 2520 C. 151200 D. 86400
- [S@Why]** CSE ছাত্র = 3 জন, EEE ছাত্র = 6 জন
 2 জন CSE ছাত্র পাশাপাশি বসবে না।
 $\therefore$ EEE এর 6 জন ছাত্র বসতে পারবে = 6!
 CSE এর 3 জন ছাত্র বসতে পারবে = 7P_3
 নির্ণেয় বিন্যাস = ${}^7P_3 \times 6! = 151200$
- মামা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়**
01. 'ELECTION' শব্দটির অক্ষরগুলি একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যাবে? [MBSTU. 18-19]
- A. 10160 B. 30160 C. 20160 D. 40320
- [S@Why]** ELECTION শব্দটির অক্ষরগুলিকে
- একটি নিয়ে সাজানো যাবে = $\frac{8}{2}$ [$\because$ 2টি E রয়েছে] = 20160
02. গ্রামীণফোন কোম্পানি বাজারে যে মোবাইল সংযোগ দিচ্ছে তা 11 অঙ্কের প্রথম তিনটি অঙ্ক 017 হলে সর্বোচ্চ কতটি সংযোগ দিতে পারবে? [MBSTU. 16-17]
- A. 10^7 B. 10^8 C. 10^{10} D. 10^{11}
- [S@Why]** গ্রামীণফোনের সংযোগ = 11 অঙ্কের।
 তার মধ্যে 017 থাকবে স্থির।
 $\therefore$ পরিবর্তনযোগ্য ডিজিট = $11 - 3 = 8$
 $\therefore$ সর্বোচ্চ সংযোগ দিবে = $(10)^8$

03. স্বরবর্ণগুলিকে পাশাপাশি রেখে TANGAIL শব্দটিকে কত রকমে সাজানো যায়? [MBSTU. 15-16]

A. 160 B. 360 C. 320 D. 120

[S@Why] TANGAIL শব্দটিতে মোট অক্ষর = 7টি

A, A = 2 টি স্বরবর্ণ = A, A, I = 3 টি

স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিন্যাস

$$= (7 - 3 + 1)! \times \frac{3!}{2!} = 5! \times \frac{3!}{2!} = 120 \times \frac{3 \times 2}{2} = 360$$

04. পুনরাবৃত্তি না করে 1, 2, 4, 5, 6 অঙ্কগুলো দিয়ে কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে? [MBSTU. 14-15]

A. 40 B. 60 C. 80 D. 100

[S@Why] 1, 2, 4, 5, 6 মোট অঙ্ক = 5টি

সংখ্যা গঠন করা যাবে = $5! = 120$

[B] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[B]**

01. "EQUATION" শব্দটির বর্ণগুলো কত উপায়ে পুনর্বিন্যস্ত করা যাবে? [BSMRSTU-B. 19-20]

A. 40319 B. 40320
C. 40330 D. কোনোটিই নয়

[S@Why] পুনর্বিন্যাস = মোট বিন্যাস - 1 = $40320 - 1 = 40319$

02. প্রথম ও শেষ বর্ণটির অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে BSMRSTU শব্দটি কত প্রকারে পুনর্বিন্যাস করা যাবে? [BSMRSTU. 18-19]

A. 60 B. 59 C. 119 D. কোনটিই নয়

[S@Why] BSMRSTU শব্দটিতে মোট অক্ষর = 7

প্রথম অক্ষর (B) ও শেষ অক্ষর (U) অপরিবর্তিত রেখে বিন্যাসযোগ্য অক্ষর = 5টি। যেখানে S = 2টি

$$\therefore \text{বিন্যাস} = \frac{5!}{2!} = 60 ; \text{পূর্ববিন্যাস} = 60 - 1 = 59$$

03. GOPALGANJ শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে কত প্রকারে সাজানো যাবে? [BSMRSTU. 14-15]

A. 7560 B. 15120
C. 30240 D. 90720

[S@Why] GOPALGANJ শব্দটিতে মোট অক্ষর = 9টি

স্বরবর্ণ = O, A, A = 3টি

ব্যঞ্জনবর্ণ = G, P, L, G, N, J = 6টি

স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে বিন্যাস

$$= \frac{(9 - 3 + 1)!}{2!} \times \frac{3!}{2!} = \frac{7!}{2!} \times \frac{3!}{2!} = 7560$$

[B] নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[B]**

01. "TEXTILE" শব্দটির সবগুলো অক্ষর (বিদ্যমান পুনরাবৃত্তিসহ) একত্রে নিয়ে কত ভাবে সাজানো যায় যেন প্রথম ও শেষ অক্ষর সর্বদা E হয়? [NSTU: 19-20; MBSTU: 13-14]

A. 1260 B. 120
C. 60 D. 80

[S@Why] TEXTILE শব্দটির বর্ণগুলো হতে

দুটি E কে প্রথম ও শেষে স্থির রেখে অবশিষ্ট 5টি বর্ণ

দ্বারা অবশিষ্ট 5টি স্থান পূরণ করার উপায়

E [] [] [] [] E

$$= \frac{5!}{2!} = 60$$

02. "BANGLADESH" শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা "NOAKHALI" শব্দটির বিন্যাস সংখ্যার কত গুণ? [NSTU: 18-19]

A. 10 B. 50
C. 70 D. 90

[S@Why] BANGLADESH শব্দটিতে মোট অক্ষর

$$= 10 \text{ টি যেখানে } A = 2 \text{ টি } \therefore \text{সাজানো যাবে} = \frac{10!}{2!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{2!}$$

NOAKHALI শব্দটিতে মোট অক্ষর 8 এবং A = 2টি

$$\therefore \text{সাজানো যাবে} = \frac{8!}{2!}$$

BANGLADESH কে NOAKHALI এর তুলনায় সাজানো যাবে = $10 \times 9 = 90$ উপায়ে।

[B] হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[B]**

01. FRIDAY শব্দটির প্রথমে F এবং শেষে Y রেখে কতগুলো শব্দ গঠন করা যাবে? [HSTU. 18-19]

A. 720 B. 120 C. 18 D. 24

[S@Why] FRIDAY শব্দটিতে মোট অক্ষর = 6

১ম F এবং শেষে Y রেখে বিন্যাস = $4! = 24$

[B] পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[B]**

01. 0, 1, 2 অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত তিন অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কতটি? [PSTU: 17-18; HSTU. 16-17]

A. 6 B. 4 C. 18 D. 27

[S@Why] 0, 1, 2 এখানে মোট অর্থযুক্ত সংখ্যা হবে

$$= 3! - 2! = 6 - 2 = 4$$

02. স্বরবর্ণগুলোকে পৃথক না রেখে TECHNOLOGY শব্দটির অক্ষরগুলোকে একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যাবে? [PSTU. 16-17]

A. 120960 B. 40320
C. 1814400 D. 362880

[S@Why] TECHNOLOGY শব্দটিতে স্বরবর্ণ (E, O, O) = 3টি

শব্দটিতে মোট অক্ষর = 10

$\therefore$ স্বরবর্ণগুলোকে পৃথক না রেখে সাজানো যাবে

$$= (10 - 3 + 1)! \times \frac{3!}{2!} = 8! \times 3 = 120960$$

03. টেলিফোন ডায়ালে 0 থেকে 9 পর্যন্ত লেখা থাকে। যদি Pabna City-এর টেলিফোন নম্বরগুলো 5 অংকবিশিষ্ট এবং প্রথম দুটি অংক 07 হয়, তবে ঐ শহরের কত জনকে টেলিফোন সংযোগ দেওয়া যাবে? [PSTU. 16-17]

A. 90,001 B. 90,000 C. 1000 D. 10,000

[S@Why] টেলিফোন সংখ্যা = $(10)^{5-2} = (10)^3 = 1000$

04. PSTU শব্দটির সব অক্ষর ব্যবহার করে কত উপায়ে সাজানো যাবে? যেখানে P প্রথমে থাকবে। [PSTU. 12-13]

A. 10 B. 6 C. 12 D. 8

[S@Why] P S T U শব্দটিতে অক্ষর = 4

P ১ম রেখে সাজানো যাবে = $3! = 6$

P [] [] []

[B] বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[B]**

01. ELEPHANT শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে কত প্রকারে সাজানো যায়? [BSFMSTU. 19-20]

A. 720 B. 2160
C. 4320 D. 20160

[S@Why] ELEPHANT শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একটি ধরে মোট বিন্যাস

$$= \frac{6!}{2!} \text{ এবং স্বর বর্ণগুলোর (E, E, A) নিজেদের মধ্যে বিন্যাস} = \frac{3!}{2!} = 3$$

$$\therefore \text{স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে সাজানো সংখ্যা} = \frac{6!}{2!} \times 3 = 2160$$

03. THESIS শব্দটির বর্ণগুলো হতে 4টি নিয়ে মোট সমাবেশ সংখ্যা হল- [IU 16-17, RU 16-17, JU. 09-10, 05-06; CoU 07-08; MBSTU. 19-20; KUET. 10-11]

A. 14 B. 12 C. 15 D. 11

[S@Why] 2টি s ও 2টি ভিন্ন নিয়ে বাছাই = $1 \times {}^4C_2 = 6$

সব ভিন্ন নিয়ে বাছাই = ${}^5C_4 = 5$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাবেশ = $5 + 6 = 11$ $\therefore$ মোট বাছাই = $6 + 5 = 11$

04. প্রত্যেকবার চারটি করে অক্ষর নিয়ে "Examination" শব্দটি অক্ষরগুলো হতে মোট কয়টি বিন্যাস গঠন করা যায়? [IU: 15-16; BSMRSTU. 18-19; KUET: 14-15]

A. 2424 B. 2454 C. 2490 D. 2443

[S@Why] EXAMINATION শব্দটিতে মোট অক্ষর = 11টি

প্রতিবারে নিতে হবে 4টি; ভিন্ন অক্ষর = 5টি; A = 1 জোড়া, I = 1 জোড়া, N = 1 জোড়া

নির্বাচনের ভিত্তি	সমাবেশ	বিন্যাস
(i) 3 জোড়া হতে 2 জোড়া	${}^3C_2 = 3$	$3 \times \frac{3!}{2!2!} = 18$
(ii) 3 জোড়া হতে 1 জোড়া এবং ভিন্ন অক্ষর হতে দুইটি নিলে	${}^3C_1 \times {}^7C_2 = \frac{63}{63}$	$63 \times \frac{4!}{2!} = 756$
(iii) ভিন্ন অক্ষর হতে 4টি অক্ষর নিলে	${}^8C_4 = 70$	$70 \times 4! = 1680$
মোট		2,454

05. একজন শিক্ষার্থীকে 8টি প্রশ্ন থেকে প্রথম 3টি হতে অবশ্যই 2টি এবং অবশিষ্ট হতে 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সে কত প্রকার উত্তর দিবে- [IU 15-16]

A. 60 B. 15 C. 20 D. 30

[S@Why] উত্তর দেওয়ার সংখ্যা = ${}^3C_2 \times {}^5C_3 = 3 \times 10 = 30$

06. একজন মন্ত্রী, দুই জন প্রতিমন্ত্রী ও 16 জন এম.পি. নিয়ে কোন একটি পরিষদ গঠিত। একজন মন্ত্রী ও কেবল একজন প্রতিমন্ত্রীকে সর্বদা অন্তর্ভুক্ত রেখে পাঁচজনের কতকগুলো বিভিন্ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে? [IU: 13-14]

A. 560 B. 1120 C. 1100 D. 2240

[S@Why] মন্ত্রী 1 জন প্রতিমন্ত্রী (2) M.P. (16)

1 1 3

$\therefore$ কমিটি = ${}^1C_1 \times {}^2C_1 \times {}^{16}C_3 = 1120$

07. প্রত্যেক সারির মাঝ বরাবর প্যাসকেলের ত্রিভুজ Symmetric কারণ- [IU 12-13]

A. ${}^nP_r = {}^nC_r$ B. ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ C. ${}^nP_r = {}^nP_{n-r}$ D. ${}^nC_r = {}^nC_{r-n}$

[S@Why] প্রত্যেক সারির মাঝ বরাবর প্যাসকেলের ত্রিভুজ Symmetric কারণ ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

08. 20 সদস্য বিশিষ্ট একটি ফুটবল দল থেকে একজন অধিনায়ক ও একজন সহ অধিনায়ক কতভাবে নির্বাচন করা যাবে? [IU: 11-12]

A. 20 B. 190 C. 380 D. 760

[S@Why] অধিনায়ক নির্বাচন করা যায় ${}^{20}C_1 = 20$

সহ অধিনায়ক " " ${}^{19}C_1 = 19$

$\therefore$ মোট নির্বাচন = $20 \times 19 = 380$

[B] বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় [B]

01. যদি ${}^nC_4 + {}^nC_3 = 70$ হয়, তবে $n = ?$ [BRUR-E. 19-20; JKKNIU. 18-19]

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

[S@Why] $n = 7$ হলে ${}^7C_4 + {}^7C_3 = \frac{7!}{4!3!} + \frac{7!}{3!4!}$

$= \frac{2 \cdot 7!}{3!4!} = 70 \therefore$ L.H.S = R.H.S

02. একজন ভর্তি পরীক্ষার্থীকে 12টি প্রশ্ন থেকে 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাকে প্রথম 5টি থেকে 4টি প্রশ্ন বাছাই করতে হলে, কত প্রকারে প্রশ্নগুলো বাছাই করা যেতে পারে? [BRUR-E. 13-14; য.বো: 06; য.বো: 02, 07; সি.বো: 01]

A. 100 B. 1000 C. 150 D. 105

[S@Why] 1ম গ্রুপে প্রশ্ন (5) 2য় গ্রুপে প্রশ্ন (7)

4 2

$\therefore$ প্রশ্ন পত্র বাছাই করা যাবে ${}^5C_4 \times {}^7C_2 = 105$

[B] জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় [B]

01. 16 বাছ বিশিষ্ট একটি বহুভুজের কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখা দ্বারা কতগুলো ত্রিভুজ গঠন করা যাবে? [JKKNIU: 12-13]

A. 360 B. 460

C. 160 D. 560

[S@Why] বাহুর সংখ্যা $n = 16$

$\therefore$ গঠিত ত্রিভুজ এর সংখ্যা = ${}^{16}C_3 = 560$

02. 'PROFESSOR' শব্দটির অক্ষরগুলো হতে প্রতিবার 4টি করে অক্ষর নিয়ে কতভাবে সাজানো যাবে? [JKKNIU: 12-13]

A. 738 B. 735 C. 711 D. কোনটিই নয়

[S@Why] PROFESSOR শব্দটিতে মোট অক্ষর = 9টি

R = 1 জোড়া, S = 1 জোড়া, O = 1 জোড়া ভিন্ন অক্ষর = 3টি

প্রতিবারে অক্ষর নিতে হবে = 4টি

নির্বাচনের ভিত্তি	সমাবেশ	বিন্যাস
(i) 3 জোড়া হতে 2 জোড়া	${}^3C_2 = 3$	$3 \times \frac{4!}{2!2!} = 18$
(ii) 3 জোড়া হতে 1 জোড়া এবং ভিন্ন হতে 2টি	${}^3C_1 \times {}^5C_2 = 30$	$30 \times \frac{4!}{2!} = 360$
(iii) ভিন্ন হতে 4টি	${}^6C_4 = 15$	$15 \times 4! = 360$
মোট =		738

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

[B] শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় [B]

01. ${}^nC_4 = 15$, ${}^{n+1}C_5 = 21$ হলে nP_5 এর মান কত? [SUST. 17-18]

A. 6 B. 6! C. 5 D. 5!

[S@Why] $\frac{{}^nC_4}{{}^{n+1}C_5} = \frac{15}{21} = \frac{5}{7} \Rightarrow \frac{n! \times 5! (n-4)!}{4! \times (n-4) \times (n+1)!} = \frac{5}{7} \Rightarrow n = 6$

$\therefore {}^nP_5 = 6P_5 = 6!$

02. 6 জন পুরুষ এবং 4 জন মহিলা থেকে পুরুষ মহিলা সমন্বয়ে 5 জনের একটি কমিটি কতভাবে গঠন করা যাবে, যাতে কমিটিতে মহিলার সংখ্যা বেশি থাকবে? [SUST. 17-18]

A. 60 B. 66 C. 80

D. 252 E. 864

[Ans B]

03. নিম্নে 5 সেট বাছাই দেয়া আছে। কোন সেটটি দ্বারা চতুর্ভুজ অঙ্কন করা সম্ভব? [SUST. 17-18]

A. 1, 10, 4, 5 B. 1, 12, 5, 4 C. 2, 3, 10, 4

D. 5, 7, 10, 2 E. 3, 4, 8, 20

[S@Why] এখানে, $2 + 5 + 7 > 10$

04. 12 বাছ বিশিষ্ট একটি বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা- [SUST. 16-17, 08-09, 05-06; CU 08-09, 07-08; IU 07-08]

A. 12 B. 24 C. 54 D. 36

[S@Why] কর্ণের সংখ্যা = ${}^{12}C_2 - 12 = 54$

05. 100 সংখ্যক ভিন্ন উপাদানের সেট থেকে কত সংখ্যক উপাদান নিলে বিন্যাস এবং সমাবেশ সংখ্যা সমান? [SUST. 15-16]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 99

[S@Why] ${}^{100}P_1 = 100$ and ${}^{100}C_1 = 100$

06. 14 জন ফুটবল খেলোয়াড় থেকে কয়জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যা ও বিন্যাস সংখ্যা সমান হবে? [SUST. 14-15]

A. 1 B. 2 C. 11 D. 13 E. 14

[S@Why] n সংখ্যক বস্তু হতে 1টি বস্তু নিয়ে সমাবেশ ও বিন্যাস সংখ্যা সমান হয়। অর্থাৎ, ${}^nC_1 = {}^nP_1$

07. দু'টি সমান্তরাল সরলরেখার যথাক্রমে 6 টি এবং 10 টি বিন্দু ব্যবহার করে কতগুলি ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব? [SUST. 12-13]

A. 420 B. 560

C. 720 D. 2520 E. 3360

[S@Why] ত্রিভুজ সংখ্যা = ${}^{16}C_3 - {}^{10}C_3 = 420$

08. দশ ভূজের কর্ণের সংখ্যা- [SUST:08-09; BUET:09-10,08-09,05-06; RU:10-11, 08-09; KU:18-19; CU:11-12,07-08; IU:07-08; CoU:16-17; BUET: 08-09; SUST: 05-06]

A. 45 B. 35 C. 50 D. 40

[S@Why] দশভূজের কর্ণের সংখ্যা = $^{10}C_2 - 10 = 45 - 10 = 35$

09. 8 জন ব্যক্তি থেকে 5 সদস্যের একটি কমিটি গঠন করতে হবে যাতে 3 জন বিশেষ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত একজন থাকবে। এরূপ কমিটির সংখ্যা- [SUST: 08-09; HSTU: 18-19]

A. 15 B. 55 C. 46 D. 48

[S@Why] কমিটি গঠনের সম্ভাব্য উপায়গুলো নিম্নরূপ:

উপায়	অবিশেষ ব্যক্তি (5)	বিশেষ ব্যক্তি (3)
(i)	4	1
(ii)	3	2
(iii)	2	3

∴ কমিটি গঠনের উপায় = $^5C_4 \times ^3C_1 + ^5C_3 \times ^3C_2 + ^5C_2 \times ^3C_3 = 15 + 30 + 10 = 55$

10. একটি টেনিস টুর্নামেন্টে 150 জন খেলোয়াড় আছে। একজন খেলোয়ার একটি ম্যাচ হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। টুর্নামেন্টে কতটি ম্যাচ খেলা হয়েছে? [SUST:06-07]

A. 75 B. 76 C. 149 D. 150

[S@Why] ম্যাচ সংখ্যা = $n - 1 = 150 - 1 = 149$

11. 8 জন লোক প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করলে করমর্দনের সংখ্যা হবে- [SUST:06-07]

A. 28 B. 8 C. 16 D. 24

[S@Why] করমর্দনের সংখ্যা = $^8C_2 = 28$

12. 15টি বিন্দু দিয়ে কয়টি কর্ণ আঁকা সম্ভব? [SUST: 03-04]

A. 450 B. 455 C. 540 D. 554

[S@Why] $^nC_2 - n = ^{15}C_2 - 15 = 90$

সুতরাং সঠিক উত্তর: 90

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. 'JASHORE' শব্দটির অক্ষরগুলি হতে প্রতিবার ৩টি করে বর্ণ নিয়ে কতবার বাছাই করা যাবে? [JUST-C: 19-20]

A. 60 B. 35 C. 25 D. 70

[S@Why] JASHORE শব্দটির অক্ষরগুলি হতে প্রতিবার 3টি করে বর্ণ নিয়ে বাছাই সংখ্যা = $^7C_3 = 35$

02. পাঁচটি সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন কত উপায়ে ভুলভাবে উত্তর দেয়া যাবে? [JUST: 18-19]

A. 41 B. 31 C. 21 D. 11

[S@Why] পাঁচটি প্রশ্ন হলো a, b, c, d, e

সবগুলো মিথ্যা হলে = 1

2টি সত্য এবং 3টি মিথ্যা হলে = $3 \times 3 = 9$

3টি সত্য এবং 2টি মিথ্যা হলে = $2 \times 2 = 4$

4টি সত্য এবং একটি মিথ্যা হলে = $1 \times 1 = 1$

1টি সত্য এবং 4টি মিথ্যা হলে = $4 \times 4 = 16$

= 31

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. 5 জন পুরুষ ও 4 জন মহিলার একটি দল থেকে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা নিয়ে কতভাবে একটি কমিটি গঠন করা যাবে? [MBSTU-A: 19-20]

A. 30 B. 25 C. 20 D. 18

[S@Why] 5 জন পুরুষ ও 4 জন মহিলার একটি দল থেকে 1 জন পুরুষ ও 2 জন মহিলা নিয়ে কমিটি গঠন করার উপায় = $^5C_1 \times ^4C_2 = 30$

02. 1, 2, 3, 4 দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সরলরেখা দ্বারা কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যাবে? [MBSTU-C: 19-20; BUET: 13-14]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[S@Why] (1, 2, 3), (1, 2, 4) ও (1, 3, 4) সমাবেশের জন্য ত্রিভুজ হবে না।

∴ 1, 2, 3, 4 দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সরলরেখা দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের সংখ্যা

= $^4C_3 - 3 = 4 - 3 = 1$

03. 14 জন খেলোয়াড় থেকে 11 জনের একটি ক্রিকেট টিম কত ভাবে গঠন করা যাবে? [MBSTU-A: 14-15]

A. 340 B. 364 C. 375 D. 380

[S@Why] মোট খেলোয়াড় = 14 জন; খেলোয়াড় নিতে হবে = 11 জন
ক্রিকেট টিম গঠন করা যাবে = $^{14}C_{11} = ^{14}C_3 = 364$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $^{2n}C_m = ^{2n}C_{m-2}$ হলে 'm' এর মান- [BSMRSTU-B: 19-20; RU: 17-18]

A. n+1 B. n C. n-1 D. n(n-1)

[S@Why] $^{2n}C_m = ^{2n}C_{m-2}$ হলে $m + m - 2 = 2n$ হবে

∴ $2m - 2 = 2n \Rightarrow 2m = 2n + 2 \Rightarrow m = n + 1$

02. কোনো পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে 6 বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ন্যূনতম নম্বর পেতে হয়। একজন পরীক্ষার্থী কত প্রকারে অকৃতকার্য হবে? [BSMRSTU-B: 19-20; BUTex: 13-14]

A. 43 B. 53 C. 63 D. 73

[S@Why] মোট অকৃতকার্য হওয়ার উপায় = $2^6 - 1 = 63$

03. 0, 1, 3, 5, 7, 9 সংখ্যাগুলোকে বাহুর দৈর্ঘ্য ধরে কতগুলো ত্রিভুজ গঠন করা যায়? [BSMRSTU: 17-18]

A. 10 B. 6 C. 5 D. 3

[S@Why] 0, 1, 3, 5, 7, 9; গঠিত এর সংখ্যা = $^6C_3 = 10$

যে কোন দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর হলে ত্রিভুজ গঠিত হবে।

[1, 3, 5] [1, 3, 7] [1, 5, 7] [1, 7, 9]

[1, 5, 9] [1, 3, 9] [3, 5, 9] এই কবিনেশনগুলো ত্রিভুজের শর্ত পূরণ করে না। সুতরাং অর্থযুক্ত ত্রিভুজ = $10 - 7 = 3$ টি

04. একজন লোকের 4 জন বন্ধু রয়েছে। তিনি কত উপায়ে তার এক বা একাধিক বন্ধুকে দাওয়াত করতে পারবে? [BSMRSTU: 08-09; HSTU: 08-09; BAU: 02-03, 01-02; BUTex: 13-14]

A. 14 B. 15 C. 4 D. 16

[S@Why] 4 জন বন্ধুর এক বা একাধিক বন্ধুকে দাওয়াত দেয়া যাবে = $2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. n সংখ্যক ভিন্ন জিনিস হতে প্রত্যেকবার অন্তত একটি জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যক কত? [HSTU-D: 16-17]

A. $2^n - 1$ B. nP_1 C. nC_1 D. 2^n **[Ans C]**

02. একজন সংকেত কারকের ছয়টি পতাকা আছে, যাদের একটি সাদা, দুইটি সবুজ এবং তিনটি লাল। সে একসঙ্গে 5টি পতাকা ব্যবহার করে কয়টি বিভিন্ন সংকেত দিতে পারবে? [HSTU-B: 14-15]

A. 50 B. 60 C. 90 D. 100

[S@Why] সাদা পতাকা (1) সবুজ পতাকা (2) লাল পতাকা (3)

(i) 1 2 2

(ii) 1 1 3

(iii) 0 2 3

(i) এর জন্য সংকেত সংখ্যা = $\frac{5!}{2!2!} = 30$

(ii) এর জন্য সংকেত সংখ্যা = $\frac{5!}{3!} = 20$

(iii) এর জন্য সংকেত সংখ্যা = $\frac{5!}{2!3!} = 10$

নির্ণয়ে মোট সংকেত = $30 + 20 + 10 = 60$

03. একটি গলফ ম্যাচের খেলা শেষে প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সাথে করমর্দন করলেন। করমর্দনের সংখ্যা 91 হলে কত জন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন? [HSTU-B: 14-15, 15-16]

A. 33 জন B. 22 জন C. 12 জন D. 14 জন

[S@Why] From (D) Option = $^{14}C_2 = 91$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি 15 ভূজ ক্ষেত্রের 15টি শীর্ষ বিন্দু দ্বারা গঠিত কর্ণের সংখ্যা কত? [PSTU: 19-20]

A. 80 B. 85 C. 90 D. 105

[S@Why] 15 ভূজ ক্ষেত্রের 15টি শীর্ষ বিন্দু দ্বারা গঠিত কর্ণের সংখ্যা

= $^{15}C_2 - 15 = 90$

অধ্যায় ০৬ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

STEP 01 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামালাল ভাষাসহ সমাধান

STEP 02 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $2 \cos^2 x + 3 \cos x = 2$, $0 < \theta < 2\pi$ এর সমাধান সেট- [GST-A. 2022-2023]

- A. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$ B. $\left\{\frac{\pi}{3}, \pi\right\}$ C. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$ D. $\left\{\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right\}$

[S@Why] $2 \cos^2 x + 3 \cos x = 2 \Rightarrow 2 \cos^2 x + 4 \cos x - \cos x - 2 = 0$
 $\Rightarrow 2 \cos x (\cos x + 2) - 1(\cos x + 2) = 0 \Rightarrow (\cos x + 2)(2 \cos x - 1) = 0$
 হয়, $\cos x + 2 = 0$ অথবা, $2 \cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \cos x = -2$; যা অসম্ভব

$$\therefore \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \therefore x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

এখন, $n = 0$ হলে $x = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$; $n = 1$ হলে $x = \frac{7\pi}{3}$ এবং $\frac{5\pi}{3}$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} [\because 0 < \theta < 2\pi]$$

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়]

01. $\cot A = \frac{12}{5}$ হলে $\sin A + \cos A$ এর মান কত?

[RU. 18-19, DU. প্রযুক্তি. 19-20; JnU. 15-16]


- A. $\frac{13}{17}$ B. $-\frac{7}{13}$ C. $\frac{17}{13}$ D. $-\frac{13}{17}$

[S@Why] দেওয়া আছে, $\cot A = \frac{12}{5}$

$\therefore$ পাশের চিত্র হতে পাই,

$$\sin A = \frac{5}{13} \text{ এবং } \cos A = \frac{12}{13}$$

$$\therefore \sin A + \cos A = \frac{5}{13} + \frac{12}{13} = \frac{17}{13}$$



02. $\cos A = \frac{12}{13}$ হলে $\tan 2A$ সমান কত? [JnU. 16-17]


- A. $\pm \frac{120}{119}$ B. $\pm \frac{5}{12}$ C. $\frac{144}{169}$ D. $\frac{25}{144}$

[S@Why] দেওয়া আছে, $\cos A = \frac{12}{13}$

পাশের ত্রিভুজ হতে পাই, $\tan A = \frac{5}{12}$

$$\Rightarrow \tan^2 A = \frac{25}{144}$$

$$\therefore \tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} = \frac{2 \cdot \frac{5}{12}}{1 - \frac{25}{144}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{119}{144}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{144}{119} = \frac{120}{119}$$



03. কোনটি সঠিক নয়?

[JnU. 09-10]

- A. $\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec} \theta$ B. $\sec(-\theta) = -\sec \theta$
 C. $\cos(-\theta) = \cos \theta$ D. $\cot(-\theta) = -\cot \theta$

[S@Why] $\sec(-\theta) = \sec \theta$

04. $\tan x$ এর পর্যায়কাল-

- A. 2π B. π C. 3π D. 4π

[S@Why] $\tan/\cot$ এর পর্যায়কাল $= \pi$

[খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়]

01. 5 cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের একটি চাপ কেন্দ্রে 40° কোণ উৎপন্ন করলে ঐ চাপের দৈর্ঘ্য কত cm? [KU. 19-20]

- A. 3.491 B. 3.520 C. 3.641 D. 4.00

[S@Why] $S = r\theta = 0.05 \times \frac{40\pi}{180}$
 $= 0.0349\text{m} = 3.49 \text{ cm}$

$$r = 5\text{cm} = 0.05 \text{ m}$$

$$\theta = 40^\circ = \frac{40 \times \pi}{180}$$

02. $\cos \theta = \frac{4}{5}$ হলে $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$ এর মান কত? [KU. 17-18; MBSTU. 19-20]

- A. $\frac{4}{25}$ B. $\frac{7}{25}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{25}{32}$

[S@Why] $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = 2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{16}{25} - 1 = -\frac{9}{25}$

03. θ কোণ শূন্য থেকে বেড়ে 90° হলে $\cos \theta$ অনুপাত-

[KU. 09-10]

- A. 1 থেকে কমে 0 হয় B. 0 থেকে কমে -1 হয়
 C. -1 থেকে কমে 0 হয় D. 0 থেকে কমে 1 হয়


[Ans A]

04. যদি $5 \tan \theta = 4$ হয় তাহলে $\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta} = ?$ [KU. 09-10, JUST. 16-17]

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{5}{16}$ C. $\frac{5}{14}$ D. $\frac{1}{8}$

[S@Why] $5 \tan \theta = 4 \Rightarrow \tan \theta = \frac{4}{5}$

$$\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta} = \frac{5 \times \frac{4}{\sqrt{41}} - 3 \times \frac{5}{\sqrt{41}}}{\frac{4}{\sqrt{41}} + 2 \times \frac{5}{\sqrt{41}}} = \frac{5}{14}$$



05. একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ 70° ও 90° । 3য় কোণটির মান রেডিয়ানে কত? [KU. 03-04; HSTU. 05-06; BRU. 13-14; JUST. 05-06]

- A. 20° B. $\frac{\pi}{6}$
 C. $\frac{\pi}{9}$ D. $\frac{\pi}{12}$

[S@Why] তৃতীয় কোণটির মান

$$= 180^\circ - (70^\circ + 90^\circ) = 20^\circ = 20 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9} \text{ রেডিয়ান}$$

[কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়]

01. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6000 km। ঢাকা এবং রাজশাহী পৃথিবীর কেন্দ্রে $\frac{\pi}{60}$ রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করলে ঢাকা এবং রাজশাহীর দূরত্ব কত? [CoU. 19-20]

- A. 314.3 km B. 325.5 km
 C. 337.5 km D. 347.5 km

[S@Why] $S = r\theta = 6000 \times \frac{\pi}{60} = 100 \times \pi = 314.3 \text{ km}$

02. $\tan \theta = \frac{3}{4}$ হলে, $\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta}$ এর মান কত? [CoU. 19-20]

- A. 7 B. $\frac{1}{7}$ C. $-\frac{1}{7}$ D. -7

[S@Why] $\tan \theta = \frac{3}{4}$, $\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = \frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1} = \frac{\frac{3}{4} - 1}{\frac{3}{4} + 1} = -\frac{1}{7}$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোট্যনজেন্ট ফাংশনের মৌলিক পর্যায়?

[IU-18-19]

- A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{2}$

[S@Why] কোট্যনজেন্ট ফাংশনের মৌলিক পর্যায় = π

02. $\sin\theta$ ও $\cos\theta$ এর মান সব সময়-

[IU-17-18; SAU-05-06]

- A. -1 থেকে 0 B. 0 থেকে 1
C. -1 থেকে 1 D. $-\infty$ থেকে ∞

[S@Why] $\sin\theta, \cos\theta$ এর রেঞ্জ $[-1, 1]$

03. কোনটি জ্যামিতিক কোণ?

[IU-16-17]

- A. $-\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{4\pi}{3}$ C. $-\frac{4\pi}{3}$ D. 3π

[S@Why] জ্যামিতিক কোণ কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এবং এর মান 0° থেকে 360° এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

04. $y = \cot^3 x$ এর পর্যায়কাল-

[IU-12-13]

- A. π B. 3π C. 2π D. 4π

[S@Why] $y = \cot^3 x$ এর পর্যায়কাল = π

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়


01. যদি $\theta = \sin^{-1} \frac{3}{5}$ হয়, তাহলে $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$ এর মান-

[BRUR-E-19-20]

- A. $\frac{9}{25}$ B. $\frac{7}{25}$ C. $\frac{16}{27}$ D. $\frac{6}{25}$

[S@Why] $\theta = \sin^{-1} \frac{3}{5}$

$\sin\theta = \frac{3}{5}$



$\therefore \tan\theta = \frac{3}{4} \therefore \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2}{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{7}{25}$

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $\tan\theta = \sqrt{2x^2}$ হয় তবে $\cos 2\theta$ এর মান-

[BU-14-15]

- A. $\frac{1 - 5x^4}{1 + 2x^4}$ B. $\frac{1 + 2x^4}{1 - 2x^4}$
C. $\frac{1 - 2x^2}{1 + 2x^2}$ D. $\frac{1 + 4x^2}{1 - 4x^2}$

[S@Why] $\tan\theta = \sqrt{2x^2}$

$\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - (\sqrt{2x^2})^2}{1 + (\sqrt{2x^2})^2} = \frac{1 - 2x^4}{1 + 2x^4}$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় কোনটি?

[JKKNIU-19-20]

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. $\frac{3\pi}{2}$

[S@Why] $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায়

$= \frac{\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\tan\theta = \frac{3}{4}$ $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে $\cos 2\theta + \sin 2\theta = ?$ [SUST-14-15]

- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{6}{5}$ C. $\frac{11}{9}$ D. $\frac{23}{19}$ E. $\frac{31}{25}$

[S@Why] $\cos 2\theta + \sin 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} + \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$
 $= \frac{1 - \tan^2 \theta + 2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 2 \cdot \frac{3}{4}}{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2}$


$= \frac{1 - \frac{9}{16} + \frac{3}{2}}{1 + \frac{9}{16}} = \frac{\frac{16 - 9 + 24}{16}}{\frac{25}{16}} = \frac{31}{25}$

02. $\tan\theta = \frac{3}{4}$ $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে $\cos 2\theta + \sin 2\theta = ?$ [SUST-14-15]

- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{6}{5}$ C. $\frac{23}{19}$ D. $\frac{31}{25}$

[S@Why] $\tan\theta = \frac{3}{4}$; $\cos\theta = \frac{4}{5}$; $\sin\theta = \frac{3}{5}$

$\therefore \cos 2\theta + \sin 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 + 2\sin\theta \cos\theta$
 $= 2 \times \left(\frac{4}{5}\right)^2 - 1 + 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{32}{25} - 1 + \frac{24}{25} = \frac{32 - 25 + 24}{25} = \frac{31}{25}$



03. $\tan\theta = \frac{4}{3}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, $\sin\theta + \cos\theta =$ কত? [SUST-12-13]


- A. $3/7$ B. $4/7$ C. $5/7$ D. $7/4$ E. $7/5$

[S@Why] দেওয়া আছে, $\tan\theta = \frac{4}{3}$

পাশের চিত্র হতে পাই,

$\sin\theta = \frac{4}{5}$; $\cos\theta = \frac{3}{5}$

$\therefore \sin\theta + \cos\theta = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$



04. যদি $\sin\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta = m \cos\theta$ এবং $\sin\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta = n \cos\theta$ হলে,

$m^2 - n^2 = ?$ [SUST-10-11]

- A. $4mn$ B. $4\sqrt{mn}$ C. $\frac{1}{mn}$ D. $\frac{1}{\sqrt{mn}}$

[S@Why] $\sin\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta = m \cos\theta$

$\therefore \sin 45^\circ + \frac{1}{2} \sin 90^\circ = m \cos 45^\circ$ [$\theta = 45^\circ$ ধরে]

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} = m \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow m = 1.7071$

এবং $\sin 45^\circ - \frac{1}{2} \sin 90^\circ = n \cos 45^\circ$

$n = 0.2929 \therefore m^2 - n^2 = 2.828$

From Option B, $4\sqrt{1.707 \times 0.2929} = 2.828$

05. n বাহু বিশিষ্ট কোন সুস্থম বহুভুজ যে কোন বহিঃস্থ কোণের মান 72° হলে n এর মান কত?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 [SUST. 09-10]

[S@Why] বহিঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি $= 360^\circ$

1টি বহিঃস্থ কোণের মান $= \frac{360}{n}$ [n = বাহু বা ভুজ]

$$\text{বা, } 72 = \frac{360}{n} \Rightarrow n = 5$$

06. বৃত্তের যেকোন চাপ এর ব্যাসার্ধের অনুপাত হলো বৃত্তের কেন্দ্রে সেই চাপ দ্বারা উৎপন্ন কোণের-
A. π গুণ বড় B. π গুণ ছোট
C. সমান D. অসমান [SUST. 01-02]

[S@Why] $S = r\theta \Rightarrow \frac{S}{r} = \theta$

[M] মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 cm এবং বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 56° কোণ উৎপন্ন করলে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য হবে — cm।
A. 3.91 B. 3.81 C. 3.99 D. 3.71 [MBSTU-C. 19-20]

[S@Why] আমরা জানি,

$$S = r\theta = 0.04 \times \frac{56\pi}{180} = 0.0391 \text{ m} = 3.91 \text{ cm}$$

$$\theta = 56^\circ = \left(\frac{\pi \times 56}{180}\right)^\circ$$

$$r = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$$

02. যদি $\tan\theta = \frac{1}{2}$ এবং $\tan\phi = \frac{1}{3}$ হয় তবে $(\theta + \phi)$ এর মান কত?
A. $\frac{\pi}{6}$ B. π C. zero D. $\frac{\pi}{4}$ [MBSTU: 16-17]

[S@Why] $\tan\theta = \frac{1}{2}, \tan\phi = \frac{1}{3}$

$$\therefore \tan(\theta + \phi) = \frac{\tan\theta + \tan\phi}{1 - \tan\theta \tan\phi} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow \tan(\theta + \phi) = 1 \therefore \theta + \phi = \frac{\pi}{4}$$

[M] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. x বাস্তব সংখ্যার একটা চলক, $f(x) = (4\sin^2 x + 4\cos x + 1)^2$ এর সর্বোচ্চ মান কত?
A. $17 + 12\sqrt{2}$ B. 36 C. $48\sqrt{2}$ D. 8 [BSMRSTU-B. 19-20]

02. ABC সমকোণী ত্রিভুজ এবং B কোণ সমকোণ এবং BC বাহুর উপর যেকোনো একটি বিন্দু D। যদি AB = 10 মিটার, AC = 16 মিটার এবং AD = 14 মিটার হলে DC এর দৈর্ঘ্য কত?
A. 2.59 মিটার B. 2.69 মিটার C. 2.79 মিটার D. 2.49 মিটার [BSMRSTU-A. 19-20]


[S@Why] $AC^2 = AB^2 + BC^2$

$$BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{16^2 - 10^2} = 12.49$$

$$AD^2 = AB^2 + BD^2$$

$$BD = \sqrt{AD^2 - AB^2} = \sqrt{14^2 - 10^2} = 9.8$$

$$DC = BC - BD = 12.49 - 9.8 = 2.69 \text{ মিটার}$$



03. 5 একক উচ্চতার একজন ব্যক্তি $z = 10 \sin 2\pi x$ গ্রাফ ধরে X-অক্ষ বরাবর মূলবিন্দু ন্যূনতম কত দূরত্ব গেলে বিস্তার ও লোকটির উচ্চতা সমান হবে?
[BSMRSTU-A. 19-20]

A. π একক B. $\frac{\pi}{3}$ একক

C. $\frac{\pi}{12}$ একক D. $\frac{1}{12}$ একক

$$\text{[S@Why]} z = 10 \sin 2\pi x \Rightarrow 5 = 10 \sin 2\pi x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \sin 2\pi x \Rightarrow \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 2\pi x \Rightarrow 2\pi x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = \frac{1}{12}$$

[M] হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. $\sin(1110^\circ)$ এর মান কত?
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$ [HSTU. 18-19]

$$\text{[S@Why]} \sin(1110^\circ) = \sin(3 \times 360 + 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

02. একটি সুস্থম ষড়ভুজের প্রত্যেকটি বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কত?
A. 50° B. 60° C. 70° D. 80° [HSTU. 16-17]

[S@Why] সুস্থম ষড়ভুজের বহিঃস্থ একটি কোণের মান $= \frac{360}{6} = 60^\circ$

[M] নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. $\sec(-1755^\circ)$ এর মান নিচের কোনটি?
A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ [NSTU: B 14-15]

$$\text{[S@Why]} \sec(-1755^\circ)$$

$$= \frac{1}{\cos(1755^\circ)} = \frac{1}{\cos\left(20 \times \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$$

[M] পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. $y = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{2}$ ফাংশনটির পর্যায়কাল কত?
A. 2π B. 6π C. 12π D. কোনোটিই নয় [PSTU. 19-20]

$$\text{[S@Why]} \sin \frac{x}{3} \text{ এর পর্যায়} = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = \frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$$

$$\cos \frac{x}{2} \text{ এর পর্যায়} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$$

$$6\pi \text{ ও } 4\pi \text{ এর লসাগু} = 12\pi$$

$$\therefore y = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{2} \text{ ফাংশনটির পর্যায়কাল} = 12\pi$$

[M] বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[M]**

01. $50^\circ 37' 30''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।
A. $\frac{9\pi}{32}$ B. $\frac{9\pi}{16}$ C. $\frac{9\pi}{8}$ D. $\frac{9\pi}{4}$ [BSFMSTU. 19-20]

$$\text{[S@Why]} 50^\circ 37' 30'' = 50 + \frac{37}{60} + \frac{30}{60 \times 60} = 50.625^\circ$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\therefore 50.625^\circ = \frac{\pi}{180} \times 50.625 = \frac{9\pi}{32}$$

08. $f = \{(x, y) : x \in X, y \in Y \text{ এবং } x^2 + y^2 = 4\}$ অর্থটি কি? [KU: 12-13]
 A. ফাংশন B. ফাংশন নয় C. অর্থ D. কোনটিই নয়
[S@Why] এখানে, y এর একাধিক মানের জন্য x এর একটি মান পাওয়া যায়। তাই অর্থটি ফাংশন নয়।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $f(x) = 2x - 5$ এবং $g(x) = x^2 + 6$ হলে $f(g(5))$ এর মান কত? [CoU: 16-17]
 A. 57 B. 49 C. 31 D. 67

[S@Why] $f(x) = 2x - 5$ এবং $g(x) = x^2 + 6$
 $\therefore f(g(5)) = f(5^2 + 6) = f(31) = 2 \times 31 - 5 = 62 - 5 = 57$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $f(\theta) = \cos 2\theta - \sin 2\theta$ হলে θ এর যে মানের জন্য $f(\theta) = 0$ [IU-D: 19-20]
 A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{8}$

[S@Why] $f(\theta) = \cos 2\theta - \sin 2\theta \therefore \cos 2\theta - \sin 2\theta = 0$

$$\Rightarrow \cos 2\theta = \sin 2\theta \Rightarrow \tan 2\theta = 1 \Rightarrow 2\theta = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4} \therefore \theta = \frac{\pi}{8}$$

02. $f(x) = y = \sqrt{1-x^2}$; ($0 \leq x \leq 1$) হলে $f^{-1}(x) = ?$ [IU-A: 19-20]
 A. $\sqrt{1+y^2}$ B. $\sqrt{1-y^2}$ C. $\sqrt{1-x^2}$ D. $\sqrt{1+x^2}$

[S@Why] $f(x) = y = \sqrt{1-x^2}$

$$\Rightarrow y^2 = 1 - x^2 = x^2 = 1 - y^2; x = \sqrt{1-y^2} \therefore f^{-1}(x) = \sqrt{1-x^2}$$

03. $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3 + 1$ এবং $h(x) = x + 2$ হলে $\text{hogof} = ?$ [IU-D: 19-20]
 A. $X^6 + 3$ B. $X^6 + 6$ C. $X^6 + 8$ D. $X^3 + 3$

[S@Why] $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3 + 1$, $h(x) = x + 2$

$$\text{hogof} = h(g(f(x))) = h(g(x^2)) = h(x^6 + 1) = x^6 + 1 + 2 = x^6 + 3$$

04. যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে $f(y)$ এর মান কত? [IU: 17-18, 15-16; CU: 07-08; BUTex: 06-07; RU: 16-17; চ.বো. ২০১২, ০৮, ০৫; জ.বো. ২০১৪, ১৩, ০২; রা.বো. ২০১৬, ১২, ০৮; কু.বো. ২০১৩, ০৬; সি.বো. ২০১৩, ০৯; ব.বো. ২০১১, ০৭, ০৮; দি.বো. ২০১৪, ০৯; মাদ্রাসা বোর্ড: ২০১৪, ১১; KU: 15-16; JU: 09-10]

- A. x B. $f(x)$ C. y D. $\frac{4y-7}{2y-4}$ E. 1

[S@Why] এখানে, $y = \frac{4x-7}{2x-4}$ এবং $f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$

$$\therefore f(y) = \frac{4y-7}{2y-4} = \frac{4 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 7}{2 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 4} = \frac{16x - 28 - 14x + 28}{8x - 14 - 8x + 16} = \frac{2x}{2} = x$$

05. $\cot \theta$ এর ডোমেন ও রেঞ্জ- [IU 17-18]
 A. $\mathbb{R}, [-1, 1]$ B. $\mathbb{R}, \mathbb{R}$

- C. $\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $\mathbb{R} - \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R}$

[S@Why] $\cot \theta$ এর ডোমেন $= \mathbb{R} - \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$, রেঞ্জ $R_f = \mathbb{R}$

06. $f(x) = 3\cos|x|$ এর সীমা কত? [IU 17-18]
 A. $-1 \leq f(x) \leq 1$ B. $-3 \leq f(x) \leq 3$ C. $0 \leq f(x) \leq 3$ D. $0 \leq f(x) \leq 1$

[S@Why] $f(x) = 3\cos|x|$; $\cos x$ এর ক্ষেত্রে $-1 \leq \cos x \leq 1$

$$\therefore f(x) \text{ ফাংশনের সীমা } -3 \leq 3\cos x \leq 3 \therefore -3 \leq f(x) \leq 3$$

07. যদি $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = 2x$ হয় তবে, $(f \circ g^{-1})(3)$ এর মান কত? [IU: 17-18]

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{5}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

[S@Why] $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = 2x$

$$\therefore g(x) = 2x \Rightarrow g\left(\frac{y}{2}\right) = y \Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y}{2} \Rightarrow g^{-1}(3) = \frac{3}{2}$$

$$\therefore f \circ g^{-1}(3) = f(g^{-1}(3)) \Rightarrow f \circ g^{-1}(3) = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

08. $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x > 3 \\ x^2-4, & -2 \leq x \leq 3 \\ 4x+1, & x < -2 \end{cases}$ হলে $f(-3)$ এর মান কত? [IU 16-17]
 A. -7 B. 5 C. -5 D. -11 **[Ans D]**

09. বাস্তবমান বিশিষ্ট ফাংশন $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ এর ডোমেন এবং রেঞ্জ যথাক্রমে- [IU 16-17; RU 12-13; IU: 15-16]

- A. $\mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}, \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ B. $\mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}, \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}$

- C. $\mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}, \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ D. $\mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}, \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}$

[S@Why] $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$

ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদি $2x+1 \neq 0$ হয়,

$$\therefore x \neq -\frac{1}{2} \text{ হয়। } D_f = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}; R_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

10. যখন θ কোণ রেডিয়ানে পরিমাপ করা হয় তখন $\sin \theta$, $\cos \theta$ ইত্যাদি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতকে কি ফাংশন বলা হয়? [IU: 16-17]

- A. সরলরেখার ফাংশন B. অবৃত্তীয় ফাংশন
 C. বৃত্তীয় ফাংশন D. সময়ের ফাংশন **[Ans C]**

11. $f(x) = |2x-3|$ হলে, $f(-2)$ এর মান কত? [IU 15-16; HSTU: 15-16, 14-15]
 A. 12 B. 6 C. 7 D. 9

[S@Why] $f(-2) = |2(-2)-3| = |-4-3| = |-7| = 7$

12. ফাংশন f কে $f(x) = x^3$ যেখানে $-3 \leq x \leq 4$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলো, $f(-4)$ এর মান হবে- [IU: 14-15]

- A. 64 B. -64 C. সংজ্ঞায়িত নয় D. সংজ্ঞায়িত

[S@Why] $f(x) = x^3$ যেখানে $-3 \leq x \leq 4$

$$\therefore f(-4) = (-4)^3 = -64 \text{ যা অসংজ্ঞায়িত।}$$

13. $A \rightarrow B$ এর বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান থাকার শর্তসমূহ হল- [IU 12-13]

- A. এক-এক এবং সর্বগ্রাহী উভয় ধরনের ফাংশন
 B. $A=B$ এবং এক-এক ফাংশন
 C. $B=A$ এবং সর্বগ্রাহী ফাংশন

D. $A \subset B$, এক-এক এবং সর্বগ্রাহী ফাংশন

[S@Why] See 'Classification of Function'

14. যদি $f(x) = \sin x$ হয় তবে f একটি- [IU: 12-13]

- A. এক-এক ফাংশন B. জোড় ফাংশন
 C. বিজোড় ফাংশন D. কোনটিই নয়

[S@Why] $f(x) = \sin x$ হয় তবে f একটি বিজোড় ফাংশন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = |x|$ ফাংশনটির ডোমেন কত? [BRUR-D: 19-20]

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[0, \infty)$ C. $(-\infty, \infty)$ D. $(-\infty, 0)$

[S@Why] $y = |x|$ এর $D_f = \mathbb{R}$ বা, $(-\infty, \infty)$

02. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ফাংশনের রেঞ্জ কত? [BRUR: 17-18; MBSTU: 16-17; CU: 08-09, 05-06, 04-05, 03-04; HSTU: 07-08, 05-06; SAU: 07-08, 03-04, 02-03; BAU: 18-19]

- A. $[-1, 1]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, 1]$ D. $[-1, 1]$

[S@Why] $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

$$1-x^2 \geq 0 \Rightarrow x \leq \pm 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1 \text{ অর্থাৎ ডোমেন } = [-1, 1]$$

$$f(1) = \sqrt{1-(1)^2} = 0, f(-1) = \sqrt{1-(1)^2} = 0$$

$$f(0) = \sqrt{1-(0)^2} = 1 \therefore \text{রেঞ্জ } [0, 1]$$

03. $f: R \rightarrow R$, যেখানে $f(x) = x^2$, $f^{-1}(36) = ?$ [BRUR: 15-16, ঢা.বো. ২০০৮]
 A. -6 B. 6 C. -6 এবং 6 D. -3 এবং -6
SCoWhy $f: R \rightarrow R; f(x) = x^2 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x}$
 $\Rightarrow f^{-1}(36) = \sqrt{36} = \pm 6 = 6$ অথবা -6
04. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ এর সীমা কত? [BRUR: 13-14]
 A. $\{y: 0 \leq y \leq 2\}$ B. $\{y: 0 < y < 2\}$
 C. $\{y: 0 \leq x \leq 2\}$ D. None
SCoWhy $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ এর সীমা $[0, \sqrt{4}] = [0, 2]$

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

01. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$ এর ডোমেন সেট- [BU: 15-16]
 A. $(2, \infty]$ B. $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$ C. $\{2, -2\}$ D. $[-2, 2]$
SCoWhy $f(x) = \sqrt{x^2-4}$
 $x^2-4 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 4 \Rightarrow x \geq \pm 2 \therefore -2 \geq x \geq 2$
 $\therefore$ ডোমেন : $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
02. নিম্নের কোনটি এক-এক ফাংশন? [BU: 14-15]
 A. $f(x) = x^2 + 1$ B. $f(x) = \sin x + 3$
 C. $f(x) = \cos x - 5$ D. $f(x) = x^3 - 1$
SCoWhy পাওয়ার বিজোড় হলে ফাংশনটি এক-এক।
03. কোনটি এক-এক ফাংশন? [BU: 13-14]
 A. $f(x) = \sin x$ B. $f(x) = \cos x$
 C. $f(x) = x^2$ D. $f(x) = \frac{1}{x}$
Ans D

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. $f: A \rightarrow B$; একটি ফাংশন; যার কোডোমেন এবং রেঞ্জ একই। তাহলে ফাংশনটি কী হবে? [JKKNIU: 19-20]
 A. ফ্রব B. এক-এক C. সার্বিক D. বিপরীত
SCoWhy কোডোমেন এবং রেঞ্জ সমান হলে সার্বিক ফাংশন হবে।
02. $f(x) = \cos x$ এবং $g(x) = x^2$ হলে $\log\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$ এর মান কত? [JKKNIU: 17-18; CoU: 18-19]
 A. $\cos x^2$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
SCoWhy $f(x) = \cos x$ এবং $g(x) = x^2$
 $\log\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
03. $f(x) = \ln(x)$ এবং $\phi(x) = x^3$ হয়, তবে $f\{\phi(x)\}$ এর মান কত? [JKKNIU: 12-13]
 A. $3f(x)$ B. $4f(x)$ C. $5f(x)$ D. কোনটিই নয়
SCoWhy $f(x) = \ln(x)$ এবং $\phi(x) = x^3$
 $f\{\phi(x)\} = f\{x^3\} = \ln x^3 = 3 \ln(x) = 3f(x)$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি f একটি এক-এক বাস্তব ফাংশন এবং $f(a^2 + 1) = f(4a)$ হয়, তবে a এর মান কোনটি? [SUST-B: 19-20]
 A. $2 + \sqrt{3}$ B. 1 C. -1
 D. 0 E. $2 + i\sqrt{3}$
SCoWhy $f(a^2 + 1) = f(4a) \Rightarrow a^2 + 1 = 4a \Rightarrow a^2 - 4a + 1 = 0$
 $\therefore a = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2}$
 $= \frac{2(2 \pm \sqrt{3})}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$

02. $f(x) = -|x+1| + 2$ ফাংশনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [SUST-A: 19-20]
 A. সর্বনিম্ন মান 1 B. সর্বোচ্চ মান 1 C. সর্বোচ্চ মান 2
 D. সর্বনিম্ন মান 2 E. সর্বনিম্ন মান 0
SCoWhy $f(x) = -|x+1| + 2$ এর ডোমেন $= R = (-\infty, \infty)$
 $f(-3)$ $f(-2)$ $f(-1)$ $f(0)$ $f(1)$ $f(2)$
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 0 1 2 1 0 -1

- $\therefore f(x) = -|x+1| + 2$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান 2
 03. $f(x) = |2x-1|$ ফাংশনের রেঞ্জ কত? [SUST-A: 19-20]
 A. $(0, \infty)$ B. $[0, \infty)$ C. $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$
 D. $[1, \infty)$ E. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$

- SCoWhy** $f(x) = |2x-1|$ ফাংশনের রেঞ্জ $R_f = [0, \infty)$
04. $f(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$ ফাংশনের ডোমেন কত? [SUST-B: 19-20]
 A. $(-\infty, 1)$ B. $(-\infty, 0]$ C. $(-\infty, 1]$ D. $(-\infty, 0)$ E. $[0, \infty)$
SCoWhy $f(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$ ফাংশনের
 ডোমেন, $D_f = \{\ln(1-x)\} \geq 0$ এবং $1-x > 0$
 $\Rightarrow \ln(1-x) \geq 0 \Rightarrow 1 > x$
 $\Rightarrow 1-x \geq e^0 \Rightarrow x < 1 \Rightarrow 1-x \geq 1 \Rightarrow -x \geq 0$
 $\Rightarrow x \leq 0$ এবং $x < 1 = (-\infty, 0]$

05. যদি $e^y = x^x$ হয় তাহলে y এর ডোমেন কোনটি? [SUST 17-18]
 A. R B. $R - \{0\}$ C. $\{x: x \leq 0\}$
 D. $\{x: x \geq 0\}$ E. $\{x: x > 0\}$
SCoWhy দেওয়া আছে, $e^y = x^x$ বা, $y = x \ln x$
 $\therefore$ ফাংশনটির ডোমেন হবে $x > 0$ যেহেতু $\ln x$ এর ডোমেন $x > 0$ হয়।

06. $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$ হলে $f(x+1)$ এর ডোমেন হবে- [SUST 16-17]
 A. $R - \{2\}$ B. $R - \{-2, 2\}$
 C. $R - \{-3, 1\}$ D. $R - \{1, 3\}$ E. $R - \{-2, 0, 2\}$
SCoWhy $f(x) = \frac{1}{x^2-4} \therefore f(x+1) = \frac{1}{(x+1)^2-4} = \frac{1}{x^2+2x+1-4}$
 $= \frac{1}{x^2+2x-3} = \frac{1}{x^2+3x-x-3}$
 $= \frac{1}{x(x+3)-1(x+3)} = \frac{1}{(x+3)(x-1)}$

ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদি $(x+3)(x-1) \neq 0$ হয়
 $\therefore x \neq -3, 1 \therefore D_f = R - \{-3, 1\}$

07. $f(x) = \log_a|x|$ হলে $f(x)$ এর ডোমেন D এর জন্য কোন শর্ত সঠিক? [SUST: 16-17]
 A. $D \subset R$ B. $D = \{x|x \in Z\}$ C. $D = \{x|x \in N\}$
 D. $D = \{x|x \geq 0\}$ E. $D = \{x|x > 0\}$
SCoWhy লগারিদম ফাংশন এর ডোমেন $x > 0$ এবং রেঞ্জ R
08. যদি $e^y = x^x$ হয় তাহলে y এর ডোমেন কোনটি? [SUST: 16-17]
 A. R B. $R - \{0\}$ C. $\{x: x \leq 0\}$ D. $\{x: x > 0\}$
SCoWhy $e^y = x^x \Rightarrow y = x \ln(x) \therefore$ ডোমেন $= \{x: x > 0\}$

09. $f(x) = -(x-5)^4$ ফাংশনের গুরুমান কত? [SUST: 15-16; NSTU: 18-19]
 A. -5 B. -1 C. 0 D. 5 E. 625

SCoWhy এখানে, $(x-5)^4 \geq 0 \therefore -(x-5)^4 \leq 0$ সর্বদাই।
 অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে $f(x) = -(x-5)^4$ ফাংশনের মান সর্বোচ্চ 0 হতে পারে।
 $\therefore$ ফাংশনটির গুরুমান = 0

10. বাস্তব ফাংশন $f(x) = x^2 + 1$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x)$ এর মান শূন্য হবে? [SUST: 14-15]
 A. -1 B. 0 C. 1 D. 2 E. কোন মান নেই
SCoWhy $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x = i$
 শুধুমাত্র বাস্তব মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- S ⓑ Why** $f(x) = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow 1-x^2 \geq 0$
 $\Rightarrow 1 \geq x^2 \Rightarrow x^2 \leq 1 \therefore$ ডোমেন: $-1 \leq x \leq 1$

04. $y = \sin^{-1}x$ ফাংশনটির রেঞ্জ-

[MBSTU-A. 19-20]

- A. $-\infty < y < \infty$ B. $-1 \leq y \leq 1$ C. $-2\pi \leq y \leq 20D$ D. $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

S@Why $y = \sin^{-1}x$ এর রেঞ্জ $-\infty < y < \infty$

05. $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ যথাক্রমে- কত?

[MBSTU. 18-19; RUET. 14-15; CU. 16-17; JU. 16-17; IU. 14-15; JUST. 16-17]

- A. $\{x \in \mathbb{R} : x > 3\}$ B. $\{x \in \mathbb{R} : x \neq -3\}$
C. $\{x \in \mathbb{R} : x \neq 3\}$ D. $\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq 3\}$

S@Why $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ ফাংশনের ডোমেন হবে $9-x^2 \geq 0$ হলে।
অর্থাৎ $x \leq \pm 3$ হলে। ফাংশনের ডোমেন $-3 \leq x \leq 3$

06. $f(x) = \cos^{-1}x$ বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন হলে এর ডোমেন হবে-

[MBSTU. 17-18]

- A. $[1, -1]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, \pi]$ D. $[-\infty, \infty]$

S@Why $f(x) = \cos^{-1}x$

07. $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায়? [MBSTU. 16-17]

- A. $-1 \leq x < 1$ B. $-\infty < x \leq 1$ C. $1 < x \leq 2$ D. $-1 \leq x < 2$

S@Why $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$

$f'(x) = 6x - 6 \therefore 0 = 6x - 6 \Rightarrow x = 1$

08. $f(x) = \sqrt{-x}$ ফাংশনটির ডোমেন-

[MBSTU. 15-16]

- A. অসংজ্ঞায়িত B. $(-\infty, 0]$ C. $[0, \infty)$ D. কাল্পনিক

S@Why $f(x) = \sqrt{-x} \therefore x \leq 0 \therefore$ ডোমেন $(-\infty, 0]$

৷ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **৷**

01. $f(x) = |x|$; $x \in \mathbb{R}$ ফাংশনটির range কত? [BSMRSTU-B. 19-20]

- A. $[0, \infty)$ B. $\mathbb{R}$ C. $(-\infty, \infty)$ D. $(-\infty, 0)$

S@Why $f(x) = |x| \therefore$ রেঞ্জ $R_f = [0, \infty)$

02. $f(x) = x^2 + 3|x|$ এবং $g(x) = 1 - x^2$ হলে, $f\{g(-\sqrt{2})\} =$ কত?

[BSMRSTU-B. 19-20; KU. 17-18]

- A. 4 B. 18 C. -4 D. 14

S@Why $f(x) = x^2 + 3|x|$;

$g(x) = 1 - x^2 \therefore g(-\sqrt{2}) = 1 - (-\sqrt{2})^2 = 1 - 2 = -1$

$f\{g(-\sqrt{2})\} = f(-1) = (-1)^2 + 3|-1| = 4$

03. নিচের কোন ক্রমজোড় এর সেট ফাংশন নয়? [BSRMSTU. 18-19]

- A. $\{(1, 2), (1, 3)\}$ B. $\{(-2, 4), (2, 4)\}$
C. $\{(1, 5), (2, 6)\}$ D. $\{(1, 5), (2, 8)\}$

S@Why একটি অর্থ ফাংশন হওয়ার শর্ত: ক্রমজোড়গুলোর ১ম পদ ভিন্ন হতে হবে।

04. যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $f(x) = \sin x + 1$, তাহলে ফাংশনটির রেঞ্জ কত?

[BSMRSTU. 18-19]

- A. $[-1, 1]$ B. $(-1, 1)$ C. $[0, 2]$ D. $(-4, 2)$

S@Why $f(x) = \sin x + 1$

$\sin x$ এর সীমা $-1 \leq \sin x \leq 1$

$\therefore -1 + 1 \leq \sin x + 1 \leq 1 + 1 \Rightarrow 0 \leq \sin x + 1 \leq 2 \Rightarrow [0, 2]$

05. $f(x) = \frac{ax+b}{cx-a}$ হলে $f^{-1}(x)$ এর জন্য কোনটি সত্য?

[BSRMSTU. B 14-15; য.বো: ২০০৭; সি.বো: ২০ ০১, ০৭; কু.বো: ২০ ০১]

- A. $\frac{ax+b}{cx-a}$ B. $\frac{ab-cx}{ax-cx}$ C. $\frac{ax-b}{cx-a}$ D. $\frac{cx-a}{ax+b}$

S@Why $f(x) = \frac{ax+b}{cx-a} \therefore f'(x) = \frac{ax+b}{cx-a} = y = f(x)$

৷ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **৷**

01. $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে $f(\cos \theta)$ এর মান কোনটি?

[HSTU. 18-19]

- A. $\cos \theta$ B. $\sin \theta$ C. $\cot \frac{\theta}{2}$ D. $\tan^2 \frac{\theta}{2}$

S@Why $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$

$\therefore f(\cos \theta) = \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta} = \frac{2\sin^2 \frac{\theta}{2}}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}} = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

02. $f(x) = e^x$ হলে $f(\ln x)$ এর মান কোনটি?

[HSTU. F, 16-17]

- A. x B. $\frac{1}{x}$ C. e^x D. $\ln x$

S@Why $f(x) = e^x, f(\ln x) = e^{\ln x} = x$

03. $f(x) = x^2 + 3|x|$ এবং $g(x) = 1 + x^2$ হলে, $(g \circ f)(2) = ?$

[HSTU. 16-17; BSMRSTU. 13-14]

- A. 101 B. 100 C. 110 D. 40

S@Why $f(x) = x^2 + |x|$ এবং $g(x) = 1 + x^2$

$\therefore g \circ f(2) = g(2^2 + 3|2|) = g(10) = 1 + 10^2 = 101$

04. $f(x) = \frac{x-a}{x} + \frac{b-x}{x-b}$ হলে $f(a) =$ কত? [HSTU. 08-09; IU. 02-03; RUET. 04-05;

রা.বো: ২০১৩; সি.বো: ২০১২; য.বো: ২০০৮, ১৩; কু.বো: ২০০১, ০৮; ঢা.বো: ২০০৭; য.বো: ২০০৮]

- A. 0 B. 1 C. -b D. -1

S@Why $f(x) = \frac{x-a}{x} + \frac{b-x}{x-b}$

$\therefore f(a) = \frac{a-a}{a} + \frac{b-a}{a-b} = 0 + \frac{-(a-b)}{a-b} = -1$

৷ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **৷**

01. $f(x) = \log(2+3x)$ এর ডোমেন এবং রেঞ্জ হলো-

[NSTU. 18-19]

- A. $D_f = \left(-\frac{2}{3}, \infty\right), R_1 = \mathbb{R}$ B. $D_f = \left(-\frac{3}{4}, \infty\right), R_1 = \mathbb{R} - \{3\}$

- C. $D_f = \left(-\frac{2}{3}, \infty\right), R_1 = \mathbb{R} - (2)$ D. $D_f = \left(-\infty, \frac{2}{3}\right), R_1 = \mathbb{R}$

S@Why $2+3x > 0 \Rightarrow 3x > -2 \Rightarrow x > -\frac{2}{3}$

$\therefore$ ডোমেন: $\left(-\frac{2}{3}, \infty\right)$ এবং রেঞ্জ: $\mathbb{R}$

02. নিচের কোন সম্পর্কটি ফাংশন নয়?

[NSTU. A, 14-15]

- A. $y = 2$ B. $x = -5$ C. $f(x) = 0$ D. $x^2 + y^2 = 16$

S@Why Option D তে y এর একাধিক মানের জন্য x এর একটি মান পাওয়া যায়। তাই সেটি ফাংশন নয়।

03. $f(y) = \frac{1+y^2+y^4}{y^2}$ হলে, $f\left(\frac{1}{x}\right)$ কত?

[NSTU. A, 14-15]

- A. $f(x)$ B. x C. $1/x$ D. $f(y)$

S@Why $f(y) = \frac{1+y^2+y^4}{y^2}$

$\therefore f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^4}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{x^2+x^2+1}{\frac{1}{x^2}} = \frac{x^4+x^2+1}{\frac{1}{x^2}} \times x^2$
 $= \frac{x^4+x^2+1}{x^2} = \frac{1+x^2+x^4}{x^2} = f(x)$

৷ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **৷**

01. মনে করি $A = (-1, 1)$ এবং $f: A \rightarrow A$ কে $f(x) = x^3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা

হলে তাহলে-

[PSTU. 11-12]

- A. f একটি সর্বস্বাধী ফাংশন B. f একটি সংযোজিত ফাংশন

- C. f একটি ধ্রুবক ফাংশন D. কোনটিই নয়

S@Why $f(x) = x^3$ ফাংশনটির ডোমেন: $D_A = (-1, 1)$

কোডোমেন $= (-1, 1)$ ফাংশনটি সর্বস্বাধী।

অধ্যায় ০৩ জটিল সংখ্যা

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।


TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় সংক্রান্ত	**
02	$A + iB$ আকারে প্রকাশ করে মান নির্ণয় সংক্রান্ত	**
03	i এর ঘাত (Powers of i) সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ	***
04	বর্গমূল (Square roots) নির্ণয় সংক্রান্ত	***
05	ঘনমূল (Cubic roots) নির্ণয় সংক্রান্ত	***
06	চারতম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত	***
07	জটিল সংখ্যার ছয়তম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত	***
08	এককের ঘনমূল (Cubic roots of unity) সংক্রান্ত	*
09	জটিল রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	***
10	সঞ্চারণপথের (Locus) প্রকৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত	***

TOPIC 01 মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় সংক্রান্ত

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্গুমেন্টের মান:

- $z = x$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = 0$
- $z = iy$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = \frac{\pi}{2}$
- $z = -x$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = \pi$
- $z = -iy$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = -\frac{\pi}{2}$
- $z = x + iy$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- $z = -x + iy$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- $z = -x - iy$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = \pm \pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- $z = x - iy$ এর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট, $\theta = 2\pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$ বা $-\tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$

Note: $z^n = (x + iy)^n$ হলে আর্গুমেন্ট হবে $n\theta$



LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $-1 + i$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? [JU: 18-19, 14-15; RU: 18-19; NSTU: 19-20; BSFMSTU: 19-20]

Solve $-1 + i$ এর আর্গুমেন্ট $\theta = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{1}{-1} \right| = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$

MEx 02 $z_1 = 2 + i$ এবং $z_2 = 3 + i$ হলে $z_1 z_2$ এর মডুলাস কত? [JU-A: 16-15; BSFMSTU: 19-20; JUST-C: 15-16]

Solve $|z_1 z_2| = |(2 + i)(3 + i)| = |5 + 5i| = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$

ASPECT SPECIAL:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = \sqrt{2^2 + 1^2} \times \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{5} \times \sqrt{10} = 5\sqrt{2}$$

TOPIC 02 $A + iB$ আকারে প্রকাশ করে মান নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: $A + iB$ আকারে প্রকাশ করার জন্য হরের অনুবন্ধী দ্বারা ধর ও লবকে গুণ করতে হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 যদি $\sqrt{a + ib} = x + iy$ হয় তবে দেখাও যে $\sqrt{a - ib} = x - iy$ [BUET: 03-04; BUTex: 03-04; RUET: 17-18, 07-08, 03-04]

Solve দেওয়া আছে, $\sqrt{a + ib} = x + iy$
 $\Rightarrow a + ib = x^2 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) \therefore a = x^3 - 3xy^2$
 $b = 3x^2y - y^3 \therefore a - ib = x^3 - 3xy^2 - 3ix^2y + iy^3$
 $\Rightarrow a - ib = x^3 - 3x^2iy + 3x(iy)^2 - (iy)^3 \Rightarrow a - ib = (x - iy)^3$
 $\therefore \sqrt{a - ib} = x - iy$ (Showed)

MEx 02 $\frac{2 + 3i}{2 - i} = P + iQ$, P ও Q বাস্তব সংখ্যা হলে, $Q = ?$

[DU: 96-97; CoU: 19-20; ব.বো: ২০১৯]

Solve $\frac{2 + 3i}{2 - i} = \frac{2 + 3i}{2 - i} \times \frac{2 + i}{2 + i} = \frac{4 + 8i + 3i^2}{4 - i^2} = \frac{1 + 8i}{5} = \frac{1}{5} + i\frac{8}{5}$
 $\therefore \frac{2 + 3i}{2 - i} = P + iQ = \frac{1}{5} + i\frac{8}{5} \therefore Q = \frac{8}{5}$

TOPIC 03 i এর ঘাত (Powers of i) সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ

$i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = i^2 \cdot i = -i, i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$
 যদি n ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয় তবে
 $i^{4n} = (i^4)^n = 1^n = 1, i^{4n+1} = i^{4n} \cdot i = 1 \cdot i = i$
 $i^{4n+2} = i^{4n} \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1, i^{4n+3} = i^{4n} \cdot i^3 = 1 \cdot (-i) = -i$
 $\therefore i$ এর ঘাত পরপর চারটি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যা হলে তাদের যোগফল শূন্য হবে।
 অর্থাৎ $1 + i + i^2 + i^3 = 0$ অনুরূপভাবে,
 $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$, যেখানে n যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\frac{i^{176}}{2i + \frac{1}{i^{33}}} = ?$ [JUST- 18-19]

Solve $\frac{i^{4 \times 44}}{2i + \frac{1}{i^{32} \cdot i}} = \frac{1}{2i + \frac{1}{i}} = \frac{1}{2i - i} = \frac{1}{i} = -i$

TOPIC 04 বর্গমূল (Square roots) নির্ণয় সংক্রান্ত

$z = x + iy$ হলে, $\sqrt{x + iy} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{(\sqrt{r+x}) + i(\sqrt{r-x})\}$;

$z = x - iy$ হলে, $\sqrt{x - iy} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{(\sqrt{r+x}) - i(\sqrt{r-x})\}$;

যেখানে $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $-8 - 6\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল হলো-

[RU: 17-18, CU: 14-15, JU: 05-06; BUTex: 16-17]

Solve $-8 - 6\sqrt{-1} = -8 - 6i = 1 - 9 - 6i = 1^2 + (3i)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 3i = (1 - 3i)^2$
 $\therefore -8 - 6\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল $= \pm (1 - 3i)$

গণিত ২য় পত্র

TOPIC 02 $\sqrt{i} + \sqrt{-i} = ?$ [JnU. 14-15, 12-13; BUET. 05-06; JUST. 17-18]

Solve $\sqrt{i} + \sqrt{-i} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2i} + \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (-2i)}$
 $= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (1^2 + i^2 + 2 \cdot 1 \cdot i)} + \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (1^2 + i^2 - 2 \cdot 1 \cdot i)}$
 $= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (1 + i)^2} + \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (1 - i)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + i + 1 - i) = \frac{2}{\sqrt{2}}$
 $\therefore \sqrt{i} + \sqrt{-i} = \sqrt{2}$

TOPIC 05 ঘনমূল (Cubic roots) নির্ণয় সংক্রান্ত

যেকোনো বাস্তব সংখ্যা a^3 এর তিনটি ঘনমূল হচ্ছে a , $a\omega$ এবং $a\omega^2$

Technique:
 (i) $\sqrt[3]{a^3} = a, a\omega, a\omega^2 = a, a \left(\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \right), a \left(\frac{-1 - 1\sqrt{-3}}{2} \right)$
 (ii) $\sqrt[3]{-a^3} = -a, -a\omega, -a\omega^2$

$= -a, -a \left(\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \right), -a \left(\frac{-1 - 1\sqrt{-3}}{2} \right)$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\sqrt[3]{-64}$ এর ঘনমূল হবে-

Solve $\sqrt[3]{-64} = -4\sqrt{3}$

TOPIC 06 চারতম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: (i) $\sqrt[4]{a^4} = \pm a, \pm ai$
 (ii) $\sqrt[4]{-a^4} = \pm \frac{a}{\sqrt{2}} (1 \pm i)$ (iii) $\sqrt[4]{-a^2} = \pm \sqrt{\frac{a}{2}} (1 \pm i)$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\sqrt[4]{-81}$ মান কত?

Solve $\sqrt[4]{-81} = \sqrt[4]{-9^2} = \pm \sqrt{\frac{9}{2}} (1 \pm i) = \pm \frac{3}{\sqrt{2}} (1 \pm i)$

TOPIC 07 জটিল সংখ্যার ছয়তম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique:
 (i) $\sqrt[6]{a^6} = \pm a, \pm a\omega, \pm a\omega^2$ (ii) $\sqrt[6]{-a^6} = \pm ai, \pm ai\omega, \pm ai\omega^2$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\sqrt[6]{-64}$ এর সম্ভাব্য মান কত?

Solve $\sqrt[6]{-64} = \sqrt[6]{-2^6} = \pm 2i, \pm 2i\omega, \pm 2i\omega^2$
 $= \pm 2i, \pm i \pm \sqrt{3}, \pm i \pm \sqrt{3} = \pm 2i, \pm (\sqrt{3} \pm i)$

TOPIC 08 এককের ঘনমূল (Cubic roots of unity) সংক্রান্ত

এককের ঘনমূলের বৈশিষ্ট্য:
 ঘনমূল তিনটির একটি বাস্তব (1) এবং অপর দুটি জটিল সংখ্যা (ω, ω^2)।
 কাল্পনিক ঘনমূলদ্বয় একটি অপরটির অনুবন্ধী।

$\omega = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}); \quad \omega^2 = \frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 যদি ω এককের একটি কাল্পনিক জটিল ঘনমূল হয়, তবে $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 = ?$ [DU. 11-12, 05-06, 01-02, 97-98; JU. 16-17, 05-06, JnU. 08-09, CU. 07-08; DU-7Clg. 19-20]

Solve $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2$
 $= (-\omega - \omega)^2 + (-\omega^2 - \omega^2)^2 = 4\omega^2 + 4\omega^4 = 4\omega^2 + 4\omega = 4(\omega + \omega^2) = -4$

TOPIC 09 জটিল রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ

MEEx 01 $x = -1 + i$ হলে, $x^3 + 3x^2 + 4x + 7$ এর মান- [JU. 16-17; KU. 14-15, JnU. 06-07; DU. 05-06]

Solve মান $= c - (a^2 + b^2) = 7 - 2 = 5$

TOPIC 10 সঞ্চারণপথের (Locus) প্রকৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: $z = x + iy$ এর সঞ্চারণপথের সমীকরণের প্রকৃতি নির্ণয়:

সমীকরণ:	প্রকৃতি:
i. $ z = a$	বৃত্ত
ii. $ z - a = b$	বৃত্ত
iii. $z\bar{z} = a^2$	বৃত্ত
iv. $ z + a = z + b $	সরলরেখা
v. $ az + b = cz + d $	বৃত্ত
vi. $ z + a + z + b = c$	উপবৃত্ত
vii. $ z + a - z + b = c$	অধিবৃত্ত

এখানে, a, b, c সবগুলোই ধ্রুবক।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $z = x + iy$ হলে, $|z - 8| + |z - 8| = 20$ কি নির্দেশ করে? [RU-F. 15-16; ব.বো:14; রা.বো:10; য.বো:05; য.বো:05]

Solve i. $|az + k_1| = |az + k_2|$ বৃত্ত নির্দেশ করে।
 ii. $|z + k_1| = |z + k_2|$ সরল রেখা নির্দেশ করে।
 iii. $|z + k_1| + |z + k_2| = k$ উপবৃত্ত নির্দেশ করে।

MEEx 02 $z = x + iy$ হলে $|z - 3| = 9$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণপথটি হবে- [IU. 16-17; IU. 10-11, 07-08; MBSTU:15-16, A; HSTU. 14-15, B. 15-16]

Solve $|z - 3| = 9$
 $\Rightarrow |x + iy - 3| = 9$
 $\Rightarrow \sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = 81$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 72 = 0$ [যা একটি বৃত্তের সমীকরণ]

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যারালাল ভাষাসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $(3\sqrt{3} - 3i)(-3\sqrt{3} + 9i)$ এর মডুলাস = ? [GST-A. 2022-2023]
 A. $54\sqrt{3}$ B. $27\sqrt{3}$ C. $36\sqrt{3}$ D. $45\sqrt{3}$

SC Why $(3\sqrt{3} - 3i)(-3\sqrt{3} + 9i)$ এর মডুলাস $= (\sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 3^2})$
 $(\sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + 9^2})$; $[\because |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|] = 6 \times 6\sqrt{3} = 36\sqrt{3}$

02. অসমান x ও y এর যে কোন একটির বর্গ অপরটির সমান হলে সম্পর্কটি - [GST-A. 21-22]

A. $x = y - 1$ B. $x = y + Z$
 C. $x = -y + 2$ D. $x = -y - 1$

SC Why যেহেতু x ও y যে কোনো একটি বর্গ অপরটির সমান
 $\therefore x^2 = y$ (i); $y^2 = x$ (ii)

(i) - (ii) করে পাই, $x^2 - y^2 = y - x$
 $\Rightarrow (x - y)(x + y) = y - x$

$\Rightarrow (x - y)(x + y) = y - x$

$\Rightarrow (x - y)(x + y) = -(x - y)$

$\Rightarrow x + y = -1 \Rightarrow x = -1 - y$

ASPECT SPECIAL: আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূলের ক্ষেত্রে একটি মূল অপরটির বর্গ হয় এবং $1 + \omega + \omega^2 = 0$

$\therefore 1 + x + y = 0 \Rightarrow x = -y - 1$ ধরি, $x = \omega \therefore y = \omega^2$

03. যদি $\alpha = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ এবং $\beta = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$ হয়, তবে এদের সম্পর্ক কী?

[GST-A. 21-22, SUST. 13-14]

A. $\alpha = -\beta^2$ B. $\alpha = \beta^2$ C. $\alpha^3 = 1 - \beta^2$ D. $\alpha^3 = 1 + \beta^2$

S@Why $\alpha = \frac{1-\sqrt{-3}}{2}$

$\beta = \frac{1-\sqrt{-3}}{2} \therefore \beta = \omega^2$

$\therefore \alpha = \omega; \alpha = \beta^2$

$\Rightarrow \beta^2 = (\omega^2)^2 \Rightarrow \beta^2 = \omega^4 \therefore \beta^2 = \omega$

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $i^2 = -1$ হলে $\frac{i-i^{-1}}{i-2i^{-1}}$ এর মান- [JnU. 14-15, 12-13; CoU. 19-20]

A. 0 B. $-2n$ C. $2n$ D. -2

S@Why $\frac{i-i^{-1}}{i-2i^{-1}} = \frac{i+i}{i+2i} = \frac{2}{3}$

02. $\cos \pi + i \sin \pi = ?$ [JnU. 09-10]

A. 0 B. i C. -1 D. 1

S@Why $\cos \pi + i \sin \pi = -1 + i \cdot 0 = -1$

03. যদি $x = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ হয়, তবে $x^3 + x^{-3}$ এর মান- [JnU. 09-10]

A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. 4 D. $\frac{1}{4}$

S@Why $x = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} = \omega$ [$\omega \rightarrow$ এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল]

$\therefore$ প্রদত্ত রাশি $= x^3 + x^{-3} = \omega^3 + \omega^{-3} = 1 + 1 = 2$

04. এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে $(1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^4)(1+\omega^8)$ এর মান- [JnU. 07-08]

A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{10}$ D. 1

S@Why $(1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^4)(1+\omega^8) = (1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega)(1+\omega^2)$
 $= (-\omega^2)(-\omega)(-\omega^2)(-\omega) = 1$

05. যদি ω এককের একটি জটিল ঘনমূল হয়, তবে $(1-\omega-\omega^2)^3 + (1-\omega+\omega^2)^3$ এর সমান- [JnU. 05-06]

A. 8 B. -8 C. 0 D. 16

S@Why $(1-\omega-\omega^2)^3 + (1-\omega+\omega^2)^3 = (1+1)^3 + (-2\omega)^3 = 8-8=0$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $z = x+iy$ হয়, তবে $|z+i| = |\bar{z}+2|$ দ্বারা নির্দেশিত সম্ভার পথের নাম কি হবে? [KU. 18-19]

A. সরলরেখা B. বৃত্ত C. উপবৃত্ত D. অধিবৃত্ত

S@Why $|z+i| = |\bar{z}+2|$

$\Rightarrow |x+iy+i| = |x-iy+2|$

$\Rightarrow \sqrt{x^2+(1+y)^2} = \sqrt{(x+2)^2+y^2}$

$\Rightarrow x^2+1+2y+y^2 = x^2+4x+4+y^2$

$\Rightarrow 4x-2y+3=0$ [যা সরলরেখার সমীকরণ]

02. $z = 1 - \frac{i}{1-i}$ জটিল সংখ্যাটির মডুলাস ও আর্গুমেন্ট-

A. 1, 0 B. $1, \frac{\pi}{2}$ C. $1, \pi$ D. $1, \frac{3\pi}{2}$

[KU. 17-18; DU. 15-16]

S@Why $1 - \frac{i}{1-i} = 1 - \frac{i}{1-i} = 1 - (1+i) = -i$

$\therefore$ মডুলাস $= \sqrt{0^2+(-1)^2} = 1$ এবং আর্গুমেন্ট $= \pi + \tan^{-1}\left(\frac{1}{0}\right) = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$ [KU. 16-17]

03. $3-5i$ এর মডুলাস কত? A. $\sqrt{28}$ B. $\sqrt{34}$ C. $\sqrt{37}$ D. $\sqrt{42}$

S@Why মডুলাস $= \sqrt{3^2+(-5)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$

[KU. 14-15; 07-08]

04. $\sqrt{-64}$ এর সম্ভাব্য মান কত? A. ± 2 B. $\pm(\sqrt{3} \pm i)$ C. $\pm \sqrt{3}i$ D. $\pm 2i^2$

S@Why $\sqrt{-64} = \sqrt{-2^6} = \pm 2i, \pm 2i\omega, \pm 2i\omega^2$

$= \pm 2i, \pm i \pm \sqrt{3}, \pm i \pm \sqrt{3} = \pm 2i, \pm(\sqrt{3} \pm i)$

05. $x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = 0$ সমীকরণটির একটির মূল বাস্তব হলে অপর মূল দুটি কত? [KU. 11-12]

A. $3+2i$ এবং $3-2i$ B. $2+3i$ এবং $2-3i$
 C. $3+4i$ এবং $3-4i$ D. $4+3i$ এবং $4-3i$

S@Why $x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = 0$

$\Rightarrow x = 1, 2+3i, 2-3i$

06. $x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\sqrt{-1})$ হলে, $x^6 + x^4 + x^2 + 1$ এর মান নির্ণয় কর। [KU. 11-12]

A. 0 B. 1 C. i D. -1

S@Why দেওয়া আছে, $x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\sqrt{-1}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$

$\therefore x^2 = \frac{1}{2}(1+i)^2 = \frac{1}{2}(1+2i+i^2) = \frac{1}{2} \cdot 2i = i$

$\therefore x^6 + x^4 + x^2 + 1 = (x^2)^3 + (x^2)^2 + x^2 + 1 = i^3 + i^2 + i + 1$
 $= -i - 1 + i + 1 = 0$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{1}{1+i}$ কে $A+iB$ আকারে প্রকাশ করলে B-এর মান কত? [CoU. 18-19]

A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. -1

S@Why $\frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{1^2-(i)^2} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(1+\omega-\omega^2)^3 - (1-\omega+\omega^2)^3$ এর মান- [IU-D. 19-20; BU. 14-15]

A. 0 B. 1 C. ω D. ω^2

S@Why $(1+\omega-\omega^2)^3 - (1-\omega+\omega^2)^3$
 $= (-2\omega^2)^3 - (-2\omega)^3 = -8\omega^6 + 8\omega^3 = -8+8=0$

02. এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে $(1+\omega-\omega^2)^4 + (1-\omega+\omega^2)^4$ এর মান- [IU. 18-19, 14-15]

A. -8 B. 16 C. 9 D. -16

S@Why $(-2\omega^2)^4 + (-2\omega)^4 = 16\omega^8 + 16\omega^4$
 $= 16(\omega^2 + \omega) = -16$

03. $i^{4n+7} + i^{-(4n+7)}$, $n \in \mathbb{N}$ এর মান কত? [IU-A. 17-18]

A. -1 B. $-i$ C. i D. 0

S@Why $i^{4n+7} + i^{-(4n+7)} = i^7 + i^{-7} = -i + \frac{1}{-i} = -i + i = 0$

04. $z = x+iy$ হলে $|z-3| = 9$ দ্বারা নির্দেশিত সম্ভারপথটি হবে- [IU: 17-18, 16-17, 10-11, 07-08; MBSTU: 15-16, A; HSTU. 14-15, B. 15-16]

A. বৃত্ত B. উপবৃত্ত C. পরাবৃত্ত D. অধিবৃত্ত

S@Why $|z-3| = 9 \Rightarrow |x+iy-3| = 9 \Rightarrow \sqrt{(x-3)^2+y^2} = 9$
 $\Rightarrow x^2+y^2-6x-72=0$ [যা একটি বৃত্তের সমীকরণ]

05. $\sqrt[3]{i}$ এর একটি মান $-i$ হইলে অপর মানটি কত? [IU. 16-17; RU. 08-09]
 A. $\frac{1}{2}(i \pm \sqrt{3})$ B. $\frac{1}{2}(-i \pm \sqrt{3})$ C. $-\frac{1}{2}(-i \pm \sqrt{3})$ D. $-\frac{1}{2}(-i - \sqrt{3})$

[S@Why] $\sqrt[3]{i} = \sqrt[3]{-i^3} = -i, -i\omega, -i\omega^2$
 $= -i, -\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i), -\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i) = -i, \frac{1}{2}(i \pm \sqrt{3})$

06. $(-1 + \sqrt{3})^4 + (-1 - \sqrt{3})^4$ এর মান কত? [IU. 16-17; JUST-A. 19-20; সি.বো: 15; ব.বো: 06, 08; ক.বো: 03, 08, 10, 13; য.বো: 08, 13; জ.বো: 09, 16; চ.বো: 10; A. 16 B. -16 C. 15 D. ± 16

[S@Why] $(-1 + \sqrt{3})^4 + (-1 - \sqrt{3})^4$
 $= 2^4 \left\{ \left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \right)^4 + \left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \right)^4 \right\}$
 $= 16(\omega^4 + \omega^8) = 16\{\omega + \omega^2\} = 16(-1) = -16$

07. $\{2 + i\sqrt{x^2 - 4}\}$ এর বর্গমূল কত? [IU. 15-16]
 A. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{x+2} + i\sqrt{x-2})$ B. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{x-2} + i\sqrt{x-1})$
 C. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{x-2} + i\sqrt{x+1})$ D. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{x-2} + i\sqrt{x-1})$

[S@Why] $\{2 + i\sqrt{x^2 - 4}\} = (2 + i\sqrt{x+2}\sqrt{x-2})$
 $= \frac{1}{2}(4 + 2i\sqrt{x+2}\sqrt{x-2})$
 $\therefore$ বর্গমূল $= \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{x+2} + i\sqrt{x-2}) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{x+2} + i\sqrt{x-2})$

08. $(3 + 4i)$ ও $(-3 - 4i)$ জটিল সংখ্যার মডুলাসের পার্থক্য হবে- [IU. 14-15]
 A. 1 B. 0 C. 6 D. 8

[S@Why] $3 + 4i$ এর মডুলাস $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
 এবং $-3 - 4i$ এর মডুলাস $= \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$
 $\therefore$ মডুলাসের পার্থক্য $= 5 - 5 = 0$

09. $(3 + 4i)^{\frac{1}{2}} + (3 - 4i)^{\frac{1}{2}}$ এর মান হবে- [IU. 14-15]
 A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

[S@Why] $\frac{1}{\sqrt{3+4i}} + \frac{1}{\sqrt{3-4i}} = \frac{1}{\sqrt{(2+i)^2}} + \frac{1}{\sqrt{(2-i)^2}}$
 $= \frac{1}{2+i} + \frac{1}{2-i} = \frac{2-i+2+i}{2^2-i^2} = \frac{4}{5}$

10. $4i$ এর বর্গমূল- [IU. 11-12]
 A. $\pm \sqrt{2}(1+i)$ B. $\pm \sqrt{2}(1-i)$ C. $\pm \sqrt{2}(i-1)$ D. $\pm \sqrt{2}(i+2)$

[S@Why] $\therefore \sqrt{4i} = \sqrt{2 \times 2i} = \sqrt{2 \times (1+2i-1)} = \sqrt{2 \times (1+2i+i^2)} = \sqrt{2 \times (1+i)^2} = \pm \sqrt{2}(1+i)$

11. $12 + 5i$ জটিল সংখ্যার মডুলাস ও আর্গুমেন্ট হবে- [IU. 10-11; PSTU. 11-12]
 A. 13, $\tan^{-1} \frac{5}{12}$ B. 12, $\tan \frac{5}{12}$ C. 13, $\tan \frac{12}{5}$ D. 12, $\tan^{-1} \frac{5}{12}$

[S@Why] $12 + 5i$ এর মডুলাস $= \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$
 আর্গুমেন্ট, $\tan \theta = \frac{5}{12} \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{5}{12}$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$ হয়, তবে n এর সর্বনিম্ন অখণ্ড মান- [BRUR-E. 19-20]
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

[S@Why] $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1 \Rightarrow \left\{ \frac{(1+i) \times (1+i)}{(1-i) \times (1+i)} \right\}^n = \left\{ \frac{(1+i)^2}{1-i^2} \right\}^n = 1$
 $\Rightarrow \left\{ \frac{1+2i+i^2}{1-(-1)} \right\}^n = 1 \Rightarrow \left\{ \frac{2i}{2} \right\}^n = 1 \Rightarrow i^n = 1$
 $\therefore n = 4$ হলে $i^4 = 1$ হবে $\therefore n$ এর সর্বনিম্ন অখণ্ড মান 4 হবে।

02. যদি $a = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ হয়, তবে $a^6 = ?$ [BRUR-E. 19-20]
 A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

[S@Why] $a = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \Rightarrow a^2 = \frac{(1+i)^2}{2} \Rightarrow a^2 = \frac{1+2i+i^2}{2} = i$
 $\therefore a^6 = (a^2)^3 = (i)^3 = -i$

03. $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\dots}}}}$ এর সবচেয়ে কাছাকাছি মান- [BRUR-E. 19-20]
 A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $1 + \sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

[S@Why] ধরি, $x = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\dots}}}}$
 $\Rightarrow x^2 = 2 + \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\dots}}} \Rightarrow x^2 = 2 + x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$
 $x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2)}}{2 \times 1} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2, -1$

04. $z = x + iy$ হলে, $|z-1| + |z+1| = 4$ দ্বারা বর্ণিত সম্ভারপথ- [BRUR-D. 17-18]
 A. বৃত্তাকার B. পরাবৃত্তাকার C. অধিবৃত্তাকার D. উপবৃত্তাকার

[S@Why] $z = x + iy \therefore |z-1| + |z+1| = 4$
 $|z+k_1| + |z+k_2| = k_3$ উপবৃত্ত নির্দেশ করে।
 $|z+k_1| - |z+k_2| = k_3$ অধিবৃত্ত নির্দেশ করে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি ω এককের একটি জটিল ঘনমূল হয়, তবে $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8 = ?$ [BU. 11-12]
 A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

[S@Why] $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8$
 $= \omega + \omega^2 + 1 + \omega + \omega^2 + 1 + \omega + \omega^2 = -1$

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. i^{999} এর মান কত? [এখানে i কাল্পনিক সংখ্যা] [JKKNTU. 19-20]
 A. i B. $-i$ C. 1 D. -1

[S@Why] $i^{999} = i^{249 \times 4 + 3} = i^{249 \times 4} \cdot i^3 = 1 \cdot i^3 = -i$

02. $a = -1 + i\sqrt{2}$ হলে, $a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 7$ এর মান কত? [JKKNTU. 18-19]
 A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

[S@Why] $a = -1 + i\sqrt{2}$ বা, $(a+1)^2 = (i\sqrt{2})^2$
 বা, $a^2 + 2a + 3 = 0 \therefore a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 7$
 $= a^4 + 2a^3 + 3a^2 + 2a^3 + 4a^2 + 6a - a^2 - 2a - 3 + 10$
 $= a^2(a^2 + 2a + 3) + 2a(a^2 + 2a + 3) - 1(a^2 + 2a + 3) + 10 = 10$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(1 + ai)^2$ জটিল রাশিটির আর্গুমেন্ট (argument) $\frac{\pi}{4}$ হলে a এর মান কত? [SUST. 17-18]
 A. $1 \pm \sqrt{2}$ B. $-1 \pm \sqrt{2}$ C. $2 \pm \sqrt{2}$ D. $2 \pm \sqrt{2}$

[S@Why] $(1 + ai)^2 = (1 - a^2) + 2ai$
 $\therefore$ আর্গুমেন্ট $= \tan^{-1} \left(\frac{2a}{1-a^2} \right)$ বা, $\frac{\pi}{4} = \tan^{-1} \left(\frac{2a}{1-a^2} \right)$
 বা, $1 = \frac{2a}{1-a^2}$ বা, $a^2 + 2a - 1 = 0$ বা, $a = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$

02. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ এর সঠিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি?

[SUST. 16-17, B; সি.বো: 2003]

- A. $(a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$
 B. $(a+b+c)(a-b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$
 C. $(a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$
 D. $(a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2-c\omega)$

[S@Why] $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

$$= (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$$

03. $x^4 = 1$ সমীকরণটির মূলগুলির বর্গের সমষ্টি কত?

[SUST. 15-16]

- A. 1+i B. 1-i C. 0 D. 3 E. 2

[S@Why] $x^4 = 1$

$$\text{বা, } x^4 - 1^4 = 0 \text{ বা, } (x^2)^2 - (1^2)^2 = 0$$

$$\text{বা, } (x^2 + 1^2)(x^2 - 1^2) = 0$$

$$\text{বা, } (x^2 + 1)(x+1)(x-1) = 0 \therefore x = 1, -1$$

$$\text{আবার, } x^2 + 1 = 0 \text{ বা, } x^2 - i^2 = 0$$

$$(x+i)(x-i) = 0 \text{ বা, } x = i, -i$$

$$\text{মূলগুলো} = 1, -1, i, -i$$

$$\text{যাদের বর্গের সমষ্টি} = (1)^2 + (-1)^2 + (i)^2 + (-i)^2 = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$$

04. 8 এর অবান্তর ঘনমূল কোন সমীকরণকে সিদ্ধ করে?

[SUST. 14-15]

- A. $x^2 + 2x + 1 = 0$ B. $x^2 + 4x + 4 = 0$ C. $x^2 + 2x + 4 = 0$
 D. $x^2 + 1 = 0$ E. $x^2 - 2 = 0$

[S@Why] $x = z^3, x = \sqrt[3]{8}$

$$\text{বা, } x^3 = 8 \text{ বা, } x^3 - 2^3 = 0$$

$$\text{বা, } (x-2)(x^2 + 2x + 4) = 0 \therefore x^2 + 2x + 4 = 0$$

05. যদি $x = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ এবং $y = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$ হয়, তবে x এবং y এর

মধ্যে সম্পর্ক কি?

[SUST. 13-14]

- A. $x = y^3$ B. $x^2 = y$ C. $x + y^2 = 1$
 D. $x^2 = y$ E. $xy + 1 = 0$

[S@Why] $x = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}) = \omega$

$$y = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}) = \omega^2$$

কেননা এককের জটিল ঘন মূল দুয়ের একটি বর্গ করলে অপরটি পাওয়া যায়।

06. কোনটি $x^3 = 1$ এর সমাধান নয়?

[SUST. 11-12]

- A. 1 B. $\frac{(-1-i\sqrt{3})}{2}$
 C. $\frac{(-1+i\sqrt{3})}{2}$ D. $\frac{\cos 2\pi}{3} + \frac{i \sin 2\pi}{3}$

[S@Why] $x^3 = 1, x = \sqrt[3]{1} = 1, \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i), \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$

07. কোনটি $x^3 = 8$ এর সমাধান নয়-

[SUST. 09-10]

- A. 2 B. $-1 + i\sqrt{3}$ C. $-1 - i\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}(1+i)$

[S@Why] A অপশনে, $(2)^3 = 8$

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2, 2\omega, 2\omega^2$$

$$= 2, (-1 + i\sqrt{3}), (-1 - i\sqrt{3})$$

08. $\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^7 + \left(\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)^7 = ?$

[SUST-D. 08-09]

- A. 2 B. -1 C. 2ω D. $2\omega^2$

[S@Why] $\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^7 + \left(\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)^7$

উক্ত মান দুয় প্রত্যেক এককের ঘনমূল

$$\therefore \omega^7 + (\omega^2)^7 = \omega + \omega^2 = -1$$

09. $(1+i)/(1-i)$ এর মডুলাস কত?

[SUST. 05-06]

- A. i B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 0

[S@Why] $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{1+1} = i$

$$\therefore (1+i)/(1-i) \text{ এর মডুলাস} = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

ASPECT SPECIAL: $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{1^2 + 1^2}}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 1$

10. যদি $z = x + iy$ হয়, তবে $|z-2| = |z-4|$ দ্বারা বর্ণিত সঞ্চারণ পথ-

[SUST. 05-06]

- A. ইলিপস B. প্যারাবোলা C. বৃত্ত D. সরলরেখা

[S@Why] $|z-2| = |z-4|$

$$\Rightarrow |x+iy-2| = |x+iy-4|$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{(x-4)^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 = (x-4)^2 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = x^2 - 8x + 8$$

$$\Rightarrow x = 1 \text{ ইহা সরলরেখার সমীকরণ।}$$

11. $|z-3| = 2|z+3|$ সমীকরণের সমতুল্য সমীকরণ-

[SUST. 04-05]

- A. $(x+5)^2 + y^2 = 16$ B. $x^2 + y^2 = 16$
 C. $x^2 = y+5$ D. $x^2 + (y+5)^2 = 16$

[S@Why] $|z-3| = 2|z+3|$

$$\text{বা, } \sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x+3)^2 + y^2}$$

$$\text{বা, } x^2 + y^2 - 6x + 9 = 4x^2 + 4y^2 + 24x + 36$$

$$\text{বা, } 3(x^2 + y^2) + 30x = -27 \text{ বা, } x^2 + y^2 = -9$$

$$\text{বা, } (x+5)^2 + y^2 = -9 + 25 \text{ বা, } (x+5)^2 + y^2 = 16$$

12. নিচের কোনটি সত্য? (যেখানে $i^2 = -1$ এবং n ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা)

[SUST-A. 04-05]

- A. $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = 1$ B. $i^3 + i^5 + i^7 = i$
 C. $(1+i)^2 \cdot (1+i)^2 = -4$ D. $i^{4n} + i^{-4n} = 2$

[S@Why] $i^{4n} = 1$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{i^{176}}{2i + \frac{1}{i^{33}}} = ?$

[JUST-18-19]

- A. 0 B. 1 C. i D. -i

[S@Why] $\frac{i^{4 \times 44}}{2i + \frac{1}{i^{32} \cdot i}} = \frac{1}{2i + \frac{1}{i}} = \frac{1}{2i - i} = \frac{1}{i} = -i$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. জটিল সংখ্যা $-3i$ এর পোলার রূপ হবে-

[MBSTU-C. 19-20]

- A. $3e^{2\pi i}$ B. $3e^{3\pi i}$ C. $3e^{\frac{1}{2}\pi i}$ D. $3e^{\frac{3\pi}{2}i}$

[S@Why] $-3i$; $r = \sqrt{0^2 + 3^2} = 3$; $\theta = \frac{3\pi}{2}$

$$\therefore \text{পোলার আকার} = re^{i\theta} = 3e^{\frac{3\pi}{2}i}$$

02. এককের কাল্পনিক ঘনমূলদ্বয় x এবং y হলে $(1-x)(1-y)$ এর মান কোনটি? [MBSTU-A. 16-17]
- A. 2
B. -2
C. 3
D. -3
- SC Why** $(1-x)(1-y) = (1-\omega)(1-\omega^2) = 1 - \omega^2 - \omega + \omega^3 = 2 - (\omega + \omega^2) = 2 - (-1) = 2 + 1 = 3$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\omega^{3n+4} = ?$ [BSMRSTU-A. 19-20]
- A. ω
B. ω^4
C. 1
D. 0
- SC Why** $\omega^{3n+4} = \omega^{3n} \cdot \omega^4 = \omega^4 = \omega$

02. $\omega^{97} = ?$ [BSMRSTU-B. 19-20]
- A. 1
B. ω
C. ω^2
D. 2
- SC Why** $\omega^{97} = \omega^7 = \omega^1 = \omega$

03. $i^{-49} = ?$ [BSMRSTU. 18-19; BRU-E. 19-20]
- A. i
B. 1
C. $-i$
D. কোনটিই নয়
- SC Why** $\frac{1}{i^{49}} = \frac{1}{i^{48} \cdot i} = \frac{1}{i} = -i$

04. যদি $(x - ai)$ এবং $(-b + iy)$ পরস্পর অনুবন্ধী হয়, তবে x ও y এর নিচের কোনটি? [BSMRSTU-A. 16-17]
- A. $x = -b, y = a$
B. $x = b, y = -a$
C. $x = -b, y = -a$
D. $x = b, y = -a$
- SC Why** $x + ai = -b + iy$
বা, $x - iy = -b - ai$
 $\therefore x = -b$ এবং $y = +a$

05. কোন ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু হলো আর্গন্ড চিত্রে $z, z + iz$ এবং iz এই তিনটি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং $|z| = 4\sqrt{2}$ হয়, তবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? [BSMRSTU:16-17,B]
- A. 32 বর্গএকক
B. 16 বর্গএকক
C. 48 বর্গএকক
D. 64 বর্গএকক

SC Why এখানে, $z = x + iy = (x, y)$
 $\therefore iz = i(x + iy) = ix - y = -y + ix = (-y, x)$
 $\therefore z + iz = x + iy + ix - y = x - y + i(x + y) = (x - y, x + y)$
আমরা জানি, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -y & x & 1 \\ x-y & x+y & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} [y^2 + x^2]$
 $= \frac{1}{2} \sqrt{(x^2 + y^2)} = \frac{1}{2} |z|^2 = \frac{1}{2} \times (4\sqrt{2})^2 = 16$ বর্গএকক

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\left| \frac{z-3}{z+3} \right| = 2$ দ্বারা নির্দেশিত সমীকরণের সম্ভাব্য পথ- [HSTU. 18-19]
- A. বৃত্ত
B. পরাবৃত্ত
C. উপবৃত্ত
D. অধিবৃত্ত

Ans A

02. $-2\sqrt{3} + 6i$ এর আর্গমেন্ট কোনটি? [HSTU. 15-16]
- A. $-\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$
D. $-\frac{2\pi}{3}$

SC Why $-2\sqrt{3} + 6i$ এর আর্গমেন্ট
 $\theta = \pi - \tan^{-1} \frac{6}{2\sqrt{3}} = \pi - \tan^{-1} \sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 + 5\omega^3 = ?$ [NSTU-A. 14-15]
- A. 0
B. 1
C. -4
D. 9
- SC Why** $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 + 5\omega^3 = (-2\omega)^2 + (-2\omega^2)^2 + 5 = 4(\omega + \omega^2) + 5 = -4 + 5 = 1$

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $z = 3 + 2i$ হলে, $|z|^2 + 2\bar{z}z + |z| |z| = ?$ [PSTU. 19-20]
- A. 52
B. 39
C. 23
D. কোনটিই নয়

SC Why $z = 3 + 2i \Rightarrow \bar{z} = 3 - 2i$
 $|z|^2 + 2\bar{z}z + |z| |z| = |3 + 2i|^2 + 2\bar{z}z + |3 + 2i| |3 + 2i|$
 $= (\sqrt{3^2 + 2^2})^2 + 2(3 + 2i)(3 - 2i) + (\sqrt{3^2 + 2^2})(\sqrt{3^2 + 2^2})$
 $= 13 + 2(9 - 4i^2) + 13 = 26 + 2(9 + 4) = 52$

02. $z = x + iy$ হলে $|z| = 0$ এর সম্ভাব্য পথ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? [PSTU. 19-20]
- A. -1
B. 1
C. 0
D. i

SC Why $z = x + iy$ হলে $\bar{z} = x - iy$ এবং $|z| = 0$
 $\Rightarrow \sqrt{x^2 + (-y)^2} = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0 \therefore r = 0$

03. $x - iy = i^3 + i^2 + i$ হলে $\frac{x}{y}$ এর মান কত? [PSTU. 17-18, B]
- A. i
B. $-i$
C. 1
D. Undefined

SC Why $x - iy = i^3 + i^2 + i = -i - 1 + i = -1 = -1 + 0i$
 $\therefore x = -1$ এবং $y = 0, \frac{x}{y} = \frac{-1}{0} = \text{Undefined}$

04. $i + i^2 + i^3 + i^4$ এর মান কোনটি? [PSTU-A. 16-17; HSTU. 16-17]
- A. 0
B. 1
C. -1
D. i

SC Why $i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$

05. যদি $z = x + iy$ হয়, $|z - 5| = 3$ তবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? [PSTU-A. 14-15, 13-14; HSTU. 16-17]
- A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

SC Why $z = x + iy$ এবং $|z - 5| = 3$
 $\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = 3$

STEP 04

PRIME TEST

Time: 15

01. $x^4 = 1$ সমীকরণটির মূলগুলির বর্গের সমষ্টি কত?
- A. $1 + i$
B. $1 - i$
C. 0
D. 3

02. $\left(\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \right)^{3n} + \left(\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \right)^{3n} = ?$
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

03. $1 - \frac{i}{1 - \frac{1}{1 + i}}$ এর আর্গমেন্ট কত?
- A. $-\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. 0

04. $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = ?$
- A. $2|z_1|^2$
B. $|z_1|^2 + |z_2|^2$
C. $2\{|z_1|^2 + |z_2|^2\}$
D. $4|z_2|^2$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
02	C	$\omega^{3n} + (\omega^2)^{3n} = 1 + 1 = 2$
03	A	$1 - \frac{i}{1-i} = 1 - \frac{i}{1-i} = 1 - (1+i) = -i \therefore \text{আর্গমেন্ট} = \frac{-\pi}{2}$
04	C	$ z_1 + z_2 ^2 + z_1 - z_2 ^2 = (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 2(x_1^2 + x_2^2) + 2(y_1^2 + y_2^2) = 2(x_1^2 + y_1^2) + 2(x_2^2 + y_2^2) = 2\{ z_1 ^2 + z_2 ^2\}$
05	B	$2x + i(x^2 - 1) = \frac{1}{2} \{(x+1)^2 - (x-1)^2 + 2i(x+1)(x-1)\} = \frac{1}{2} \{(x+1) + (x-1)i\}^2 \therefore \text{বর্গমূল} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{(x+1) + i(n-1)\}$
06	C	$(x-1)^3 = -27 \Rightarrow \left(\frac{x-1}{-3}\right)^3 = 1 \Rightarrow \frac{x-1}{-3} = 1, \omega, \omega^2 \Rightarrow x-1 = -3, -3\omega, -3\omega^2 \therefore x = -2, 1-3\omega, 1-3\omega^2$
07	D	$\frac{(1+i)^2}{3-i} = \frac{2i}{3-i} = \frac{2i(3+i)}{10} \therefore \text{বাস্তব অংশ} = -\frac{2}{10} = -\frac{1}{5}$
08	A	$(1+i+i^2+i^3) + (1^4+i^5+i^6+i^7) + \dots + (i^{2012} + i^{2013} + i^{2014} + i^{2015}) = (1+i+i^2+i^3) + (1+i+i^2+i^3) + \dots + (1+i+i^2+i^3) = 0 \quad [(1+i+i^2+i^3) = 0]$
09	A	$i^{57} + \frac{1}{i^{25}} = i + \frac{1}{i} = 0$
10	B	$\arg(a+ib)^3 = 3\arg(a+ib) = 3 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$
11	C	$(-2+2i)^{\frac{1}{3}} = (1-3+3i-i)^{\frac{1}{3}} = (1+i^3+3i+3i^2)^{\frac{1}{3}} = 1+i$
12	A	$x = \frac{1}{2}(-1+\sqrt{3})$ এবং $y = \frac{1}{2}(-1-\sqrt{3})$ $x = \omega, \omega^2 = y$ $\therefore \omega^2 + \omega\omega^2 + \omega^4 = \omega^2 + \omega^3 + \omega \Rightarrow 1 + \omega + \omega^2 = 0$
13	D	$x = \sqrt{-1+x} \Rightarrow x^2 = -1+x \Rightarrow x^2 - x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2}$
14	B	
15	C	$\sqrt{2}x = -1+i \therefore x = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i) = \sqrt{-i}$ এখন $x^4 \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4}\right) = x^4 + x^2 + 1 = (\sqrt{-i})^4 + (\sqrt{-i})^2 + 1 = (-i)^2 - i + 1 = i^2 - i + 1 = -1 - i + 1 = -i$
16	D	$\omega^3 + \sqrt{3}i^3 = 1 + \sqrt{3}(-i) = 1 - \sqrt{3}i$ $\therefore r = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2;$ $\theta = -\tan^{-1} \left \frac{-\sqrt{3}}{1} \right = -\frac{\pi}{3}$ $\therefore \text{পোলার আকার} = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} - i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
17	C	$\text{Arg}(i+1) = \tan^{-1} \left \frac{1}{1} \right = \frac{\pi}{4}; \text{Arg}(i-1) = \pi - \tan^{-1} \left \frac{1}{-1} \right = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ $\therefore \text{Arg} \left\{ \frac{(i+1)^2}{(i-1)^4} \right\} = 2\text{Arg}(i+1) - 4\text{Arg}(i-1) = 2 \times \frac{\pi}{4} - 4 \times \frac{3\pi}{4} = -\frac{5\pi}{2} = -2\pi - \frac{\pi}{2} \therefore \text{মূল্য আর্গমেন্ট} = -\frac{\pi}{2}$
18	C	$\frac{1}{\omega^{2015}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2017}} = \frac{\omega}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2016} \cdot \omega}$ $= \frac{\omega}{\omega^{2016} \left[\omega + 1 + \frac{1}{\omega} \right]} = \frac{1}{(\omega^3)^{672}} \left[\omega + 1 + \frac{\omega^2}{\omega^3} \right]$ $= \frac{1}{1^{672}} [\omega + 1 + \omega^2] = 1 \times 0 = 0$
19	A	$x+iy = \sqrt{\frac{1+i}{1-i}} \Rightarrow x+iy = \left \frac{1+i}{1-i} \right ^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1$ $\Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} = 1 \Rightarrow x^2+y^2 = 1$
20	C	$\frac{2^n}{(1-i)^{2n}} + \frac{(1+i)^{2n}}{2^n} = \frac{2^n}{\{(1-i)^2\}^n} + \frac{\{(1+i)^2\}^n}{2^n}$ $= \frac{2^n}{(-2i)^n} + \frac{(2i)^n}{2^n} = \frac{1}{(-i)^n} + i^n = \frac{1}{(-i)^n} + \frac{1}{(-i)^n} = \frac{2}{(-i)^n}$
21	A	$\arg z_1 = -\tan^{-1} \left(\frac{1}{1} \right) = -\frac{\pi}{4}$ এবং $\arg z_2 = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi}{6}$ $\therefore \arg \left(\frac{z_2}{z_1} \right) = \arg z_2 - \arg z_1 = \frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi+3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$
22	B	$(1+ai)^2 = (1-a^2) + 2ai$ $\therefore \text{আর্গমেন্ট} = \tan^{-1} \left(\frac{2a}{1-a^2} \right)$ বা, $\frac{\pi}{4} = \tan^{-1} \left(\frac{2a}{1-a^2} \right)$ বা, $1 = \frac{2a}{1-a^2}$ বা, $a^2 + 2a - 1 = 0$ বা, $a = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$
23	C	$\frac{2+3i}{2-i} = \frac{2+3i}{2-i} \times \frac{2+i}{2+i} = \frac{4+8i+3i^2}{4-i^2} = \frac{1+8i}{5} = \frac{1}{5} + i\frac{8}{5}$ $\therefore \frac{2+3i}{2-i} = P+iQ = \frac{1}{5} + i\frac{8}{5} \therefore Q = \frac{8}{5}$
24	D	$a = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \Rightarrow a^2 = \frac{(1+i)^2}{2}$ $\Rightarrow a^2 = \frac{1+2i+i^2}{2} = i$ $\therefore a^6 = (a^2)^3 = (i)^3 = -i$
25	D	$x = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} = \omega$ $\therefore x^{101} + x^{200} = \omega^{101} + \omega^{200}$ $= \omega^{99} \cdot \omega^2 + \omega^{198} \cdot \omega^2 = 1 \cdot \omega^2 + 1 \cdot \omega^2 = 2\omega^2 = 2x^2$

অধ্যায় ০৪

বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণের বৈশিষ্ট্য	**
02	দ্বিঘাত সমীকরণে নিচায়কের ব্যবহার	*
03	মূল ও অজানা মান নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ	**
04	মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয়	*
05	সমীকরণের মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	***
06	দ্বিঘাত সমীকরণের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান সংক্রান্ত	**
07	ভাগশেষ উপপাদ্য সংক্রান্ত	*
08	শর্তমূলক গাণিতিক প্রয়োগ	***

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

TOPIC 01 আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণের বৈশিষ্ট্য

- আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণ : $ax^2 + bx + c = 0$
- দ্বিঘাত হবার শর্ত $a \neq 0$
 - $b = 0$ এবং $c < 0$ হলে মূলদ্বয় সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় এবং a ও c একই চিহ্নের হলে মূলদ্বয় জটিল, বিপরীত চিহ্নের হলে মূলদ্বয় বাস্তব হয়।
 - $c = 0$ হলে সমীকরণটির একটি মূল শূন্য হয়।
 - $b = c = 0$ হলে সমীকরণটির দুটি মূলই সমান এবং শূন্য।
 - $c = a$ হলে সমীকরণটির একটি মূল অপরটির উল্টা।
 - a ও c ধনাত্মক এবং b ঋণাত্মক হলে সমীকরণটির দুটি মূলই যোগবোধক হয়।
 - a ও c ঋণাত্মক এবং b ধনাত্মক হলে সমীকরণটির দুটি মূলই বিয়োগবোধক হয়।
 - $a + b + c = 0$ হলে একটি মূল 1 এবং অন্যটি c/a হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $ax^2 + bx + c = 0$ এর একটি মূল অপরটির উল্টা এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে যদি- [JU. 05-06; CU. 08-09]

Solve $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল $= \frac{c}{a}$

যেহেতু একটি মূল অপরটির উল্টা এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত $\therefore \frac{c}{a} = -1$

$\Rightarrow c = -a \therefore c + a = 0$

MEx 02 k এর মান কত হলে $(k^2 - 3)x^2 + 3kx + (3k + 1) = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর উল্টো হবে? [IU. 17-18; RU. 17-18, 08-09, 07-08; JU. 05-06]

Solve $(k^2 - 3)x^2 + 3kx + (3k + 1) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল $= \frac{3k + 1}{k^2 - 3}$

[যেহেতু সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর বিপরীত] $\frac{3k + 1}{k^2 - 3} = 1$

$\Rightarrow k^2 - 3 = 3k + 1$

$\Rightarrow k^2 - 3k - 4 = 0$

$\Rightarrow (k - 4)(k + 1) = 0$

$\therefore k = 4$ or -1

TOPIC 02 দ্বিঘাত সমীকরণে নিচায়কের ব্যবহার

- দ্বিঘাত সমীকরণ $ax^2 + bx + c = 0$ এর নিচায়ক/পৃথায়ক/নিরূপক $(b^2 - 4ac)$ কে D দ্বারা সূচীত করা হয়।
- দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি D এর উপর নির্ভর করে।
- $D = 0$ হলে মূলদ্বয় বাস্তব, সমান, মূলদ এবং সমান মূলদ্বয় $= -\frac{b}{2a}$
 - $D > 0$ হলে মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হয়।
 - D পূর্ণবর্গ হলে মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান হয়।
 - $D < 0$ হলে মূলদ্বয় অবাস্তব/জটিল/কাল্পনিক, অসমান ও পরস্পরের অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হয়।
 - $D = 0$ হলে $ax^2 + bx + c$ দ্বিঘাত রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $x^2 + kx + 1 = 0$ সমীকরণের k এর মান কত হলে মূলদ্বয় জটিল হবে? [JU. 14-15; BU. 11-12; CoU. 19-20; RU. 17-18; DU. 02-03]

Solve $x^2 + kx + 1 = 0$

জটিল হবে যখন, $k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 < 0 \Rightarrow k^2 < 4 \Rightarrow -2 < k < 2$

MEx 02 k -এর মান কত হবে $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$ সমীকরণটির মূল দুইটি সমান হবে? [JU. 16-17, 09-10; CU. 14-15, 12-13, 09-10, 07-08, 03-04, 02-03; KU. 09-10, 05-06, 03-04; RU. 17-18, 12-13, 06-07; BRU. 15-16]

Solve $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$

বা, $x^2 + 2x(k - 3) + (k - 1) = 0 \dots\dots\dots (i)$

(i) এর মূলদ্বয় পরস্পর সমান। $\therefore \{2(k - 3)\}^2 = 4(k - 1)$

বা, $(k - 3)^2 = (k - 1)$ বা, $k^2 - 6k + 9 - k + 1 = 0$

বা, $k^2 - 7k + 10 = 0$ বা, $k^2 - 2k - 5k + 10 = 0$

বা, $k(k - 2) - 5(k - 2) = 0$ বা, $(k - 2)(k - 5) = 0 \therefore k = 2, 5$

TOPIC 03 মূল ও অজানা মান নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ

- $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ এবং $\alpha\beta = \frac{c}{a}$; মূলদ্বয়ের অন্তর, $|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$

□ $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটি α, β, γ হলে,

$\sum \alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$ $\sum \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$

$\sum \alpha\beta\gamma = \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $3x^2 - 2x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি কত? [DU. 98-99; CU. 06-07, IU. 04-05; JUST-C. 19-20; JU. 12-13, 11-12; HSTU. 06-07, 05-06; RU. 18-19, 08-09; MBSTU. 14-15; JUST. 14-15]

Solve $3x^2 - 2x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β হলে

$\alpha + \beta = \frac{2}{3}$ এবং $\alpha\beta = \frac{1}{3}$

$\therefore$ মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি $= \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$

$= \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{9}$

MEx 02 $4x^3 + 16x^2 - 9x - 36 = 0$ সমীকরণটির দুইটি মূলের যোগফল শূন্য হলে, সমীকরণটির সমাধান হবে- [RU. 17-18; MBSTU. 16-17; BRU. 11-12; CU. 05-06; IU. 10-11]

Solve ধরি, মূলদ্বয় $a, -a$ এবং b ; $\therefore a - a + b = -\frac{16}{4}$

$\therefore$ অপর মূলটি $= -4$

TOPIC 04 মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয়

- দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুটি α, β হলে সমীকরণটি: $(x - \alpha)(x - \beta) = 0$
 $\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$
- ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটি α, β, γ হলে সমীকরণটি:
 $(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) = 0$
 $\Rightarrow x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$
- ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটি α, β, γ হলে সমীকরণটি: $(x - \text{একটি মূল})$
 (অপর মূলদ্বয় বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ) $= 0$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

- MEX 01** পূর্ণসংখ্যা সহগসহ দ্বিমাত্রিক সমীকরণ, যার একটি মূল $\sqrt{-5} - 1$
 [JU. 16-17; DU. 13-14; HSTU. 14-15; RU. 13-14]
- Solve** ধরি, $x = \sqrt{-5} - 1$

$$\Rightarrow x + 1 = \sqrt{-5} \Rightarrow (x+1)^2 = (\sqrt{-5})^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = -5 \Rightarrow x^2 + 2x + 6 = 0$$

$$\therefore \text{নির্ণয় সমীকরণ, } x^2 + 2x + 6 = 0$$

TOPIC 05 সমীকরণের মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

- $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β, γ হলে-
- $-\alpha, -\beta, -\gamma$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(-x) = 0$
 - $\frac{n}{\alpha}, \frac{n}{\beta}, \frac{n}{\gamma}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f\left(\frac{n}{x}\right) = 0$
 - $-\frac{n}{\alpha}, -\frac{n}{\beta}, -\frac{n}{\gamma}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f\left(-\frac{n}{x}\right) = 0$
 - $n\alpha, n\beta, n\gamma$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f\left(\frac{x}{n}\right) = 0$
 - $(\alpha + h), (\beta + h), (\gamma + h)$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(x - h) = 0$
 - $(\alpha - h), (\beta - h), (\gamma - h)$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(x + h) = 0$
 - α^2, β^2 মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(\pm\sqrt{x}) = 0$
 - $(\alpha + \beta)$ এবং $\alpha\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ
 $x^2 - \{(\alpha + \beta) + \alpha\beta\}x + (\alpha + \beta)\alpha\beta = 0$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

- MEX 01** $x^2 - 7x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় হতে 2 কম মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি-
 [DU. 18-19, 11-12, 07-08; IU. 15-16]

Solve $x^2 - 7x + 2 = 0 \therefore (x + 2)^2 - 7(x + 2) + 2 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + 4x + 4 - 7x - 14 + 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 8 = 0$

- MEX 02** $6x^2 - 5x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ মূল বিশিষ্ট

সমীকরণটি হবে- [DU. 04-05, 95-96; JnU. 05-06]

Solve $f\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \therefore 6\left(\frac{1}{x}\right)^2 - 5\left(\frac{1}{x}\right) + 1 = 0$
 $\Rightarrow \frac{6 - 5x + x^2}{x^2} = 0 \therefore x^2 - 5x + 6 = 0$

TOPIC 06 দ্বিঘাত সমীকরণের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান সংক্রান্ত

□ $ax^2 + bx + c = 0$ রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান $= c - \frac{b^2}{4a}$

- $a > 0$ (x^2 এর সহগ ধনাত্মক) হলে মান সর্বনিম্ন
- $a < 0$ (x^2 এর সহগ ঋণাত্মক) হলে মান সর্বোচ্চ

□ সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের ক্ষেত্রে, $x = -\frac{b}{2a}$ হবে

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

- MEX 01** $x^2 - 3x + 5$ এর ন্যূনতম মান-
 [DU. 06-07, 03-04; JnU. 07-08, RU. 08-09, NSTU. 09-10; CoU. 18-19]

Solve $ax^2 + bx + c$ রাশিটির ক্ষুদ্রতম মান বা লঘু মান $= c - \frac{b^2}{4a}$
 $\therefore x^2 - 3x + 5$ এর ন্যূনতম মান $= 5 - \frac{(-3)^2}{4 \cdot 1} = \frac{11}{4}$

TOPIC 07 ভাগশেষ উপপাদ্য সংক্রান্ত

- ভাগশেষ উপপাদ্য (Remainder Theorem): কোন বহুপদী $f(x)$ কে $(x - a)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে $f(a)$ অর্থাৎ x এর পরিবর্তে a বসিয়ে যে মান পাওয়া যায় তাই ভাগশেষ।
- উৎপাদক উপপাদ্য (Factor theorem): x চলকযুক্ত কোন বহুপদী রাশিতে x এর স্থানে a বসালে যদি মান শূন্য হয় তবে $x - a$ এই রাশিটির একটি উৎপাদক হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

- MEX 01** k -এর মান কত হলে $x^2 - 3x + 2 + k = 0$ সমীকরণের $(x - 3)$ একটি উৎপাদক হবে? [JU-D. 19-20]

Solve $x^2 - 3x + 2 + k = 0$ এর একটি উৎপাদক $(x - 3)$ হলে, সমীকরণটিতে $x = 3$ বসালে, k এর মান পাওয়া যাবে।
 $3^2 - 3 \times 3 + 2 + k = 0 \therefore k = -2$

TOPIC 08 শর্তমূলক গাণিতিক প্রয়োগ

- যা সরাসরি মনে রাখাই ভালো:
- $x^2 - px + q$ ও $x^2 - qx + p$ রাশিদ্বয়ের একটি সাধারণ উৎপাদক থাকার শর্ত, $p + q + 1 = 0$
 - $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ এবং $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ সমীকরণ দুটির দুটি মূলই সাধারণ হওয়ার শর্ত- $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$
 - $x^2 - px + q = 0$ ও $x^2 - qx + p = 0$ সমীকরণের একটি সাধারণ মূল থাকার শর্ত, $p + q + 1 = 0$
 - $x^2 - bx + c = 0$ ও $x^2 - cx + b = 0$ এর মূলদ্বয়ের পার্থক্য একটি দ্রুত রাশি হবার শর্ত, $b + c + 4 = 0$
 - $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূল দুইটির পার্থক্য 1 হলে, $p^2 = 1 + 4q$ হবে।
 - $ax^2 + bx + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $m:n$ হলে,

$$\sqrt{\frac{m}{n}} + \sqrt{\frac{n}{m}} + \sqrt{\frac{b}{a}} = 0$$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

- MEX 01** $px^2 + qx + 1, qx^2 + px + 1$ রাশি দুটির একটি সাধারণ উৎপাদক থাকতে পারে যদি- [JU. 06-07, 05-06; KU. 03-04; RU. 06-07; NSTU. 04-05; RU. 02-03]

Solve $px^2 + qx + 1, qx^2 + px + 1$ রাশি দুটির একটি সাধারণ উৎপাদক থাকার শর্ত $p + q + 1 = 0$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামালাল তথ্যসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. $y = x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots \infty$ হলে $x = ?$ [GST-A. 2022-2023]

A. $\frac{y}{1-y}$ B. $\frac{y}{1+y}$ C. $\frac{-y}{1+y}$ D. $\frac{y}{y-1}$

S(A) Why $y = x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots \infty$

$$\Rightarrow -y = -x + x^2 - x^3 + x^4 + \dots \infty$$

$$\Rightarrow 1 - y = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \dots \infty$$

$$\Rightarrow 1 - y = (1 + x)^{-1} \Rightarrow \frac{1}{1-y} - 1 = x \Rightarrow x = \frac{y}{1-y}$$

13. k এর মান কত হলে $(k+1)x^2 + 2(k+3)x + 2k+3$ রাশিটি একটি পূর্ণ বর্গ হবে?
 A. 3, 2 B. -3, -2 C. 3, -2 D. -3, 2
[S.O.Why] নিচায়ক, $D = \{2(k+3)\}^2 - 4(k+1)(2k+3)$
 $= 4k^2 + 24k + 36 - 8k^2 - 20k - 12$
 $= -4k^2 + 4k + 24 = -4(k^2 - k - 6) = -4(k-3)(k+2)$
 রাশিটি একটি পূর্ণ বর্গ হবে যদি নিচায়কের মান 0 হয়।
 $\therefore -4(k-3)(k+2) = 0 \therefore k = 3, -2$
14. $x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = 0$ সমীকরণের একটি মূল 1 হলে অপর মূল দুইটি :
 A. $2 \pm 3i$ B. $2 + 3i$ C. $2 - 3i$ D. $x - 1$
[S.O.Why] যেহেতু সমীকরণের একটি মূল 1, সেহেতু সমীকরণটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে হয়, $x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = 0$
 $\Rightarrow x^3 - x^2 - 4x^2 + 4x + 13x - 13 = 0$
 $\Rightarrow x^2(x-1) - 4x(x-1) + 13(x-1) = 0$
 $\Rightarrow (x-1)(x^2 - 4x + 13) = 0 \therefore x^2 - 4x + 13$ এর সমাধান,
 $x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2}$
 $= \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$
15. **ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়**
01. কোন দ্বিঘাত সমীকরণের নিচায়কের মান ঋণাত্মক উক্ত সমীকরণের মূলদ্বয়-
 A. জটিল ও সমান B. মূলদ ও সমান C. বাস্তব ও অসমান D. জটিল ও অসমান
[S.O.Why] দ্বিঘাত সমীকরণের নিচায়কের মান ঋণাত্মক হলে মূলদ্বয় জটিল ও অসমান হবে।
02. $px^2 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha\beta$ এর মান-
 A. $\frac{r}{p}$ B. $\frac{p}{r}$ C. $-\frac{q}{p}$ D. $\frac{q}{p}$
[S.O.Why] $px^2 + qx + r = 0 \therefore \alpha\beta = \frac{r}{p}$
03. $x^3 - 3x^2 + 4x - 10$ কে $x+2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ-
 A. -48 B. -54 C. -28 D. -18
[S.O.Why] $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 10$
 $f(x)$ কে $x+2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ, $f(-2)$
 $\therefore f(-2) = 3(-2)^3 - 3(-2)^2 + 4(-2) - 10 = -24 - 12 - 8 - 10 = -54$
04. $3x^2 - 10x + k = 0$ সমীকরণের দুটি মূল $\alpha, \frac{1}{\alpha}$ হলে k এর মান-
 A. 2 B. $\frac{1}{3}$ C. 3 D. $\frac{1}{2}$
[S.O.Why] $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{k}{3} \therefore k = 3$
05. k এর মান কত হলে $(k^2 - 3)x^2 + 3kx + (3k + 1) = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর উল্টো হবে?
 A. 4, -1 B. -4, 1 C. 4, 2 D. 1, 4
[S.O.Why]
 $(k^2 - 3)x^2 + 3kx + (3k + 1) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল = $\frac{3k+1}{k^2-3}$
 [যেহেতু সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর বিপরীত]
 $\frac{3k+1}{k^2-3} = 1$
 $\Rightarrow k^2 - 3 = 3k + 1 \Rightarrow k^2 - 3k - 4 = 0$
 $\Rightarrow (k-4)(k+1) = 0 \therefore k = 4 \text{ or } -1$
06. $x^3 - 4x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো a, b, c হলে Σc^3 এর মান কত?
 A. 3 B. -3 C. -9 D. 9
[S.O.Why] See Topic-03
07. $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূলদ্বয়ের অনুপাত 3:4 হলে সহগগুলোর মধ্যে সঠিক সম্পর্কটি হলো-
 A. $12b^2c = 49a$ B. $12b^2c = 7ac$ C. $49b^2 = 12ac$ D. $12b^2 = 49ac$
[S.O.Why] $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $m:n$ হলে,
 $mnb^2 = (m+n)^2 ac$
08. প্রত্যেক n -ঘাতের বহুপদী সমীকরণ $f(x) = 0$ এর কেবলমাত্র কত সংখ্যক মূল আছে?
 A. $n-1$ B. $n+1$ C. n D. $n+2$
[Ans C]
09. $x^2 - 6x + 7 = 0$ এর দ্বিঘাত সমীকরণ যার দুটি মূল α ও β হলে সমীকরণটির মূলদ্বয় কেমন হবে?
 A. মূলদ B. অমূলদ C. সমান D. অবাস্তব
[S.O.Why] $x^2 - 6x + 7 = 0$ এর নিচায়ক $D = (-6)^2 - 4 \times 7 \times 1$
 $= 36 - 28 = 8 > 0 \therefore$ মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান।
10. k এর মান কত হলে, $x^2 - (k+7)x + 27 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির তিনগুণ হবে।
 A. 4, -19 B. 5, -19 C. 5, -18 D. 5, -79
[S.O.Why] একটি মূল α হলে অপরটি 3α
 $\therefore \alpha + 3\alpha = k+7 \Rightarrow 4\alpha = k+7 \Rightarrow \alpha = \frac{k+7}{4}$
 এবং $3\alpha^2 = 27 \Rightarrow \alpha^2 = 9 \Rightarrow \left(\frac{k+7}{4}\right)^2 = 9$
 $\Rightarrow (k+7)^2 = 16 \cdot 9 \Rightarrow k+7 = \pm 12 \Rightarrow k = 5, -19$
11. $x^2 + x + 1 = 0$ সমীকরণের মূল α ও β হলে α^2 ও β^2 মূলবিশিষ্ট সমীকরণ হবে-
 A. $x^2 - x + 7 = 0$ B. $x^2 + x + 1 = 0$ C. $x^2 - x + 2 = 0$ D. $x^2 + 2x - 2 = 0$
[S.O.Why] $f(\pm\sqrt{x}) = 0 \therefore (\pm\sqrt{x})^2 \pm \sqrt{x} + 1 = 0$
 $\Rightarrow x \pm \sqrt{x} + 1 = 0 \Rightarrow x+1 = \pm\sqrt{x}$
 $\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = x \therefore x^2 + x + 1 = 0$
12. $(a+b)x^2 - (a+b+c)x + \frac{c}{2} = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সর্বদাই-
 A. বাস্তব B. মূলদ ও অসমান C. জটিল ও অসমান D. বাস্তব ও অসমান
[S.O.Why] নিচায়ক $= \{-(a+b+c)\}^2 - 4 \cdot (a+b) \cdot \frac{c}{2}$
 $= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca - 2ac - 2bc$
 $= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab = (a+b)^2 + c^2 > 0$
 $\therefore$ মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান।
13. $x^3 - 3x^2 + 9x + 27$ এর একটি মূল 3 হলে অপর মূল দুটি-
 A. -3, 3 B. 3, 3 C. -3, 3i D. 3, 3i
[S.O.Why] $x^3 - 3x^2 + 9x + 27$ প্রদত্ত একটি মূল $\alpha = 3$
 From A option, $-3 + 3 + 3 = 3$; সমীকরণ থেকে পাই $-\frac{3}{1} = 3$
14. একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল 2 - i হলে, সমীকরণটি হবে-
 A. $x^2 - 4x + 5 = 0$ B. $x^2 + 4x - 5 = 0$ C. $x^2 - 5x - 4 = 0$ D. $x^2 - 4x - 5 = 0$
[S.O.Why] See Topic-04.

04. $x^3 + (2a-3)x^2 - 8ax + 6a = 0$, $a \neq 0$ সমীকরণের একটি মূল 3 এবং অপর মূলদ্বয় সমান হলে a এর মান কত? [SUST. 17-18]
 A. -2, 1 B. -2, -1 C. -2, 2 D. -2, -2 E. 2, 2
 [S@Why] মূলত্রয় 3, p, p
 সুতরাং $3 + p + p = -(2a-3) \Rightarrow p = a$
 এখন $3 \times p \times p = -6a$
 $\Rightarrow 3p^2 = -6a \Rightarrow 3a^2 = -6a \Rightarrow a = -2$ [$\because a \neq 0$]
 আবার, $3 \times p + 3 \times p + p^2 = -8a \Rightarrow -6a + a^2 = -8a \therefore a = -2$
05. $x^3 - 1 = 0$ সমীকরণের মূলগুলির যোগফল কত? [SUST. 17-18]
 A. 0 B. -1 C. 2 D. -2
 [S@Why] $1 + \omega + \omega^2 = 0$
06. $y = (x^2 - 1)(x^4 - 10)$ বক্ররেখাটি x অক্ষকে কতবার ছেদ করবে? [SUST. 16-17]
 A. 8 B. 6 C. 4 D. 5 E. 2
 [S@Why] $y = (x^2 - 1)(x^4 - 10) = 0$
 $\therefore x = \pm 1, \pm \sqrt[4]{10} \therefore$ ছেদবিন্দু 4টি
07. a এর কোন মানসমূহের জন্য $x + 2y + 3z = 10$, $(a-1)y + 3z = a + 4$, $az = 3$ সমীকরণত্রয়ের সমাধান পাওয়া যাবে? [SUST. 16-17]
 A. $a \in (-\infty, 0)$ B. $a \in [1, \infty)$
 C. $a \in [0, 1]$ D. $a \in (0, 1)$ E. $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
 [S@Why]
 (e) $z = \frac{3}{a} \therefore (a-1)y + 3 \cdot \frac{3}{a} + a + 4 \Rightarrow y = \frac{a+4-\frac{9}{a}}{a-1} = \frac{a^2+4a-9}{a(a-1)}$
 $x + 2y + 3z = 10$ বিধায় y, z সংজ্ঞায়িত হলে x সংজ্ঞায়িত।
 y, z অসংজ্ঞায়িত যখন $a = 0$ অথবা $a = 1 \therefore$ শর্ত $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
08. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের ক্ষেত্রে $9ac = 2b^2$ হলে তার মূলদ্বয়ের ধরণ হবে- [SUST. 16-17]
 A. উভয়ই অবাস্তব B. উভয়ই সমান
 C. একটি অপরটির $\frac{3}{2}$ গুণ D. একটি অপরটির 2 গুণ
 E. একটি অপরটির 3 গুণ
 [S@Why] $2b^2 = 9ac \therefore 2(b^2 - 4ac) = 2b^2 - 8ac = 9ac - 8ac = ac = \frac{2}{9}b^2$
 $\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \frac{b}{3}}{2a} = \frac{b}{2a} \left(-1 \pm \frac{1}{3}\right)$
 $\therefore x = -\frac{2}{3} \times \frac{b}{2a}, -\frac{4}{3} \times \frac{b}{2a}$ মানে মূলগুলো একটি অপরটির দ্বিগুণ।
 বুদ্ধির কাজ হল option এ মান বসিয়ে check. মানে সুবিধামতো a, b, c ধরা। যেমন, $a = 1, c = 8, b = 6$ ধরলে,
 $x^2 + 6x + 8 = 0$ এর মূলদ্বয় $-2, -4$ একে অপরের দ্বিগুণ।
09. $x^2 - 7x + ab = 0$ এর মূলদ্বয় ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা হলে a ও b এর সঠিক মান হবে- [SUST. 16-17]
 A. $a = 3, b = 4$ B. $a = 3, b = 7$
 C. $a = 2, b = 4$ D. $a = 6, b = 3$ E. $a = 5, b = 2$

[S@Why] মূলদ্বয় c এবং $c+1$ হলে,

$$x^2 - (c+c+1)x + (c^2+c) = 0$$

$$\therefore 2c+1=7, c=3 \therefore a, b=3, 4$$

10. যদি $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের $b^2 - 4ac$ পূর্ণবর্গসংখ্যা হয় যেখানে $b^2 - 4ac \neq 0$ তবে সমীকরণটির মূলদ্বয় হবে- [SUST. 14-15]
 A. বাস্তব ও সমান B. জটিল সমান C. জটিল অসমান
 D. মূলদ ও সমান E. মূলদ ও অসমান

[S@Why] D পূর্ণবর্গ এবং $D \neq 0$ বলে।

11. যদি $x^2 + qx - 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হয় তবে, $\frac{\alpha}{\beta^2}$ ও

$$\frac{\beta}{\alpha^2}$$
 মূলদ্বয় দ্বারা গঠিত সমীকরণ কোনটি? [SUST. 14-15]

- A. $x^2 - x + q = 0$ B. $x^2 + q(q^2 + 3)x - 1 = 0$
 C. $x^2 - x + q(q^2 + 3) = 0$ D. $3x^2 + qx + 1 = 0$
 E. $qx^2 - x + 1 = 0$

[S@Why] $\alpha + \beta = -q$ এবং $\alpha\beta = -1$

$$\therefore \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = (-q)^3 - 3(-1)(-q) = -q^3 - 3q$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ, } x^2 - \left(\frac{\alpha}{\beta^2} + \frac{\beta}{\alpha^2}\right)x + \frac{\alpha}{\beta^2} \cdot \frac{\beta}{\alpha^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha^2\beta^2}x + \frac{1}{\alpha\beta} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{-q^3 - 3q}{(-1)^2}x + \frac{1}{-1} = 0 \Rightarrow x^2 + (q^3 + 3q)x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + q(q^2 + 3)x - 1 = 0$$

12. মূলদ সহগবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন কর যার একটি মূল $\frac{1}{2 - \sqrt{5}}$? [SUST. 13-14, IU. 07-08]

- A. $x^2 + 4x - 2 = 0$ B. $x^2 + 4x - 1 = 0$
 C. $x^2 + 2x - 1 = 0$ D. $x^2 - 4x - 1 = 0$

[S@Why]

$$\text{একটি মূল} = \frac{1}{2 - \sqrt{5}} = \frac{2 + \sqrt{5}}{(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})} = \frac{2 + \sqrt{5}}{-1} = -2 - \sqrt{5}$$

$$\therefore \text{অপর মূলটি} = -2 + \sqrt{5}$$

$$\text{নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল} = -2 - \sqrt{5} - 2 + \sqrt{5} = -4$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল} = (-2 - \sqrt{5}) \times (-2 + \sqrt{5}) = -1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ } x^2 + 4x - 1 = 0$$

13. $x^2 + ax + 8 = 0$ এর একটি মূল 4 এবং $x^2 + ax + b = 0$ এর মূলদ্বয় সমান হলে b এর মান কত? [SUST. 12-13, BUET. 09-10, CUET. 11-12]
 A. 4 B. 8 C. 9
 D. 12 E. 32

[S@Why] $x^2 + ax + 8 = 0$ এর একটি মূল 4.

$$\therefore 4^2 + a \times 4 + 8 = 0 \therefore a = \frac{-24}{4} = -6.$$

$$\therefore x^2 + ax + b = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + b = 0 \text{ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে, } (-6)^2 - 4 \times 1 \times b = 0 \therefore b = \frac{36}{4} = 9.$$

14. $9x^2 - 6px + q^2$ এর সর্বনিম্ন মান কোনটি? [SUST. 12-13]

- A. $p^2 - q^2$ B. $q^2 - p^2$ C. $p^2 + q^2$
D. $p^2 + 2q^2$ E. $q^2 + 2p^2$

[S@Why] সর্বনিম্ন মান $= c - \frac{b^2}{4a} = q^2 - \frac{(-6p)^2}{4 \times 9} = q^2 - p^2$

15. a এর মান কিরূপ হলে $ax^2 + 2bx + b^2/a$ এর একটি সর্বোচ্চ মান থাকবে? [SUST. 08-09]

- A. $a > 0$ B. $a < 0$ C. $a = 0$ D. $a > 1$

[S@Why] x^2 এর সহগ ঋণাত্মক হলে সর্বোচ্চ মান থাকবে, $a < 0$

মাতাশ্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = (x + 5)^2 + 4$ ফাংশনটির সর্বনিম্ন মান কত? [JUST. 18-19; IU. 07-08]

- A. 10 B. 23 C. 4 D. 0

[S@Why] $y = (x + 5)^2 + 4 = x^2 + 10x + 25 + 4 = x^2 + 10x + 29$

এর সর্বনিম্ন মান $= c - \frac{b^2}{4a} = 29 - \frac{10^2}{4} = \frac{116 - 100}{4} = 4$

02. মূলদ সহগবিশিষ্ট কোন দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $-\frac{1}{2-\sqrt{5}}$ হলে

সমীকরণটি-

- A. $x^2 + 4x - 2 = 0$ B. $x^2 + 4x - 1 = 0$
C. $x^2 + 2x - 1 = 0$ D. $x^2 - 4x - 1 = 0$

[S@Why] সমীকরণের একটি মূল $-\frac{1}{2-\sqrt{5}}$ হলে $x = -\frac{1}{2-\sqrt{5}}$

$$\Rightarrow x = -\frac{2+\sqrt{5}}{2^2 - (\sqrt{5})^2} = -\frac{2+\sqrt{5}}{-1} = 2 + \sqrt{5}$$

$$\therefore (x-2)^2 = (\sqrt{5})^2 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 5 \Rightarrow x^2 - 4x - 1 = 0$$

03. $px^2 + 3x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হতো যদি-

- A. $p = \frac{9}{16}$ B. $p > 169$ C. $p < \frac{9}{16}$ D. $p > \frac{9}{16}$

[S@Why] $px^2 + 3x + 4$ এখানে $b^2 = 4ac$

$$\text{বা, } (3)^2 = 4 \cdot 4p \text{ বা, } p = \frac{9}{16}$$

04. $-5, -7$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ হবে- [JUST. 12-13]

- A. $x^2 - 12x + 35 = 0$ B. $x^2 + 12x + 35 = 0$
C. $-5x^2 + 7x + 35 = 0$ D. $9x^2 - 5x - 35 = 0$

[S@Why] See Topic-04.

05. মূলদ সহগ বিশিষ্ট সমীকরণের একটি মূল $\frac{1}{3+i\sqrt{2}}$ হলে সমীকরণটি হবে- [JUST. 12-13]

- A. $x^2 + 4x - 1 = 0$ B. $11x^2 - 6x + 1 = 0$
C. $2x^2 - 6x + 7 = 0$ D. $x^2 - 6x + 11 = 0$

[S@Why] See Topic-04.

মাতাশ্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে, $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$ এর

মান- [MBSTU-C. 19-20]

- A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. 0 D. $\frac{2}{3}$

[S@Why] $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{2}{1} = -2; \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma = \frac{-3}{1} = -3$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{4}{1} = -4 \therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\beta\gamma + \alpha\gamma + \alpha\beta}{\alpha\beta\gamma} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$$

02. $1 + i\sqrt{2}$ মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি হবে- [MBSTU-C. 17-18]

- A. $x^2 - 2x + 3 = 0$ B. $x^2 - 2x - 3 = 0$
C. $x^2 - 2x + 1 = 0$ D. $x^2 - 2x - 1 = 0$

[S@Why] See Topic-04.

03. $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল 2 হলে অপর মূলটি কত? [MBSTU-C. 16-17]

- A. 3 B. 4 C. -3 D. -7

[S@Why] $x^2 - 5x + c = 0$ এর একটি মূল α, β অপর মূল $\beta = ?$

$$\therefore \alpha + \beta = 5 \text{ বা, } 2 + \beta \text{ বা, } \beta = 3$$

04. $16x^2 + kx + 25 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে k -এর মান- [MBSTU. 14-15]

- A. ± 16 B. ± 20 C. ± 25 D. ± 40

[S@Why] $16x^2 + kx + 25 = 0$ মূলদ্বয় সমান।

$$\therefore k^2 = 4 \cdot 25 \cdot 16 \text{ বা, } k = \pm 40$$

05. $x^2 - 2x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $-\alpha, -\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ

হবে- [MBSTU. 12-13; JnU. 08-09]

- A. $x^2 - 2x + 3 = 0$ B. $x^2 + 2x + 3 = 0$
C. $x^2 - 2x + 1 = 0$ D. $x^2 + 2x - 3 = 0$

[S@Why] $x^2 - 2x + 3 = 0$ এর মূলদ্বয় α, β

$$\therefore (-\alpha, -\beta) \text{ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ, } (-x)^2 - 2(-x) + 3 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 + 2x + 3 = 0$$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $f(x) = 0$ একটি বহুপদী সমীকরণ এবং $f(a) = 0$ হয়, তবে $x = a$ কে

বহুপদী সমীকরণটির কি বলে? [BSMRSTU-A. 16-17]

- A. উৎপাদক B. সহগ C. মূল D. ভাগশেষ **[Ans A]**

02. $3x^2 - 5x + k = 0$ সমীকরণে k এর মান কত হলে মূলদ্বয় সমান হবে?

[BSMRSTU. 16-17, 13-14]

- A. 0 B. $\frac{25}{12}$ C. $\frac{5}{3}$ D. 25

[S@Why] $3x^2 - 5x + k = 0$ (i)

$$(i) \text{ এর মূলদ্বয় সমান : } b^2 = 4ca \text{ বা, } (-5)^2 = 4 \cdot k \cdot 3 \text{ বা, } K = \frac{25}{12}$$

03. যদি a ও b বাস্তব এবং $2bx^2 + 2(a+b)x + 3a = 2b$ সমীকরণের একটি

বাস্তবমূল অপর বাস্তব মূলের দ্বিগুণ হয়, তবে নিচের কোনটি সত্য?

[BSMRSTU. 16-17, B; রা.বো: 2004; চ.বো: 2010; জ.বো: 2001; সি.বো: 2006]

- A. $a = 11b$ B. $a = b$ C. $4c = b$ D. $4a = 11b$

[S@Why] $2bx^2 + 2(a+b)x + 3a = 2b$ এর একটি মূল, অপরটির দ্বিগুণ।

$$\therefore \frac{(2+1)^2}{2} = \frac{2(a+b)^2}{2b(3a-2b)} \text{ বা, } \frac{9}{2} = \frac{4(a+b)^2}{2b(3a-2b)}$$

$$\text{বা, } 4(a^2 + 2ab + b^2) = 9(3ab - 2b^2)$$

$$\text{বা, } 4a^2 + 8ab + 4b^2 - 27ab + 18b^2 = 0$$

$$\text{বা, } 4a^2 - 19ab + 22b^2 = 0$$

$$\text{বা, } 4a^2 - 8ab - 11ab + 22b^2 = 0$$

$$\text{বা, } 4a(a-2b) - 11b(a-2b) = 0$$

$$\text{বা, } (a-2b)(4a-11b) = 0$$

$$\therefore a = 2b \text{ এবং } 4a = 11b$$

04. $2x^2 - 2(a+b)x + a^2 + b^2 = 0$ সমীকরণটির মূলদ্বয় বাস্তব হবে, নিচের কোন শর্তটির জন্য? [BSMRSTU-B. 14-15]

- A. $a = \frac{b}{2}$ B. $a = 1 - b$ C. $a = b$ D. $a + b = 0$

[S@Why] $2x^2 - 2(a+b)x + a^2 + b^2 = 0$

$$\text{নিশ্চয়ক, } D = \{-2(a+b)^2\} - 4(a^2 + b^2)^2$$

$$= 4\{a+b\}^2 - 2(a^2 + b^2)^2 = -4(a+b)^2$$

$$\text{মূলদ্বয় বাস্তব হবে যদি } a + b = 0$$

07. $6x^2 - x + 13 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে $\Sigma (\alpha - \beta)^2$ এর মান কত?
A. $-\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{6}$ C. 1 D. -1
08. $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের মূলগুলোর বিপরীত মূলগুলো দ্বারা গঠিত সমীকরণ হলো-
A. $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ B. $x^3 + qx^2 + rx + p = 0$
C. $rx^3 + qx^2 + px + 1 = 0$ D. $rx^3 - qx^3 + px - 1 = 0$
09. যদি $\alpha - \beta = 8$ ও $\alpha^3 - \beta^3 = 152$ হয়, তবে α ও β মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি হলো-
A. $x^2 - 8x - 12 = 0$ B. $x^2 - 2x - 15 = 0$
C. $x^2 + 12x + 15 = 0$ D. $x^2 + 15x + 2 = 0$
10. $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুটি সমান হবে যদি-
A. $b^2 > 4ac$ B. $b^2 < 4ac$ C. $b^2 = 4ac$ D. $b = 0$
11. সমীকরণ $\frac{1}{x - \sqrt{3}k} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x + \sqrt{3}k} = 0$ এর সমাধান-
A. $0, \pm\sqrt{3}k$ B. $0, \pm\sqrt{-3}k$ C. $0, \pm k$ D. $\pm k$
12. যদি দ্বিঘাত সমীকরণ $x^2 - 11x + a = 0$ ও $x^2 - 14x + 2a = 0$ এর একটি সাধারণ মূল থাকে তবে 'a' মানসমূহ হবে-
A. 0, 24 B. 0, -24 C. 1, -1 D. -2, 1
13. $(x + \alpha)(x - \beta) + (9x - \beta)(x + \gamma) + (x + \gamma)(x + \alpha) = 0$ সমীকরণের মূলগুলির যোগফল শূন্য হবে, যদি-
A. $\alpha + \beta + \gamma = 0$ B. $\alpha = \beta + \gamma$ C. $\beta = \alpha + \gamma$ D. $\gamma = \alpha + \beta$
14. $2x^2 + 6x + 5 = 0$ সমীকরণটির মূলের প্রকৃতি নির্ণয় কর।
A. Complex & unequal B. Complex & equal
C. Real & unequal D. None of these
15. যদি $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হয়, তাহলে $\frac{q}{p-a}$ ও $\frac{q}{p-b}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি হবে-
A. $x^2 - qx + p = 0$ B. $x^2 - px + q = 0$
C. $px^2 - qx + q = 0$ D. $qx^2 - px + p = 0$
16. $2x^2 + 2x - k = 0$ রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে যখন k এর মান-
A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $-\frac{2}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$
17. $y = (x^2 - 1)(x^4 - 10)$ বক্ররেখাটি x অক্ষকে কতবার ছেদ করবে?
A. 8 B. 6 C. 4 D. 5
18. $x^3 + bx^2 - ax + 1 = 0$ সমীকরণের একটি মূল -1 এবং অন্য মূলগুলো সমান হলে a এর মান কোনটি?
A. 2 B. 0 C. 1 D. -1
19. $x^2 - 7x + ab = 0$ এর মূলদ্বয় ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা হলে a ও b এর সঠিক মান হবে-
A. $a = 3, b = 4$ B. $a = 3, b = 7$
C. $a = 2, b = 4$ D. $a = 6, b = 3$
20. $x^3 - 1 = 0$ সমীকরণের মূলগুলির যোগফল কত?
A. 0 B. -1 C. 2 D. -2
21. α এর মান কত হলে $\alpha x^2 + 3x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব ও অসমান হবে?
A. $\alpha < \frac{16}{9}$ B. $\alpha > \frac{9}{16}$ C. $\alpha < \frac{9}{16}$ D. $\alpha > -\frac{16}{9}$

22. λ এর মান কত হলে $x^2 + \lambda = 6x$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে?
A. 3 B. 6 C. 9 D. -1
23. k এর কোন মানের জন্য $2x^2 - kx + 1 = 0$ এর একটি মূল অপর মূলের বর্গের চারগুণের সমান হবে?
A. $\frac{1}{2}$ B. 3 C. 1 D. -3
24. $2x^2 - 5x + 20 = 0$ সমীকরণের মূল দুটি $\frac{1}{\alpha}$ এবং $\frac{1}{\beta}$ হলে $(\alpha + \beta)$ এর মান কত?
A. $\frac{1}{4}$ B. $-\frac{9}{2}$ C. 4 D. 02
25. কোন শর্তে $x^3 - mx^2 + nx + r = 0$ সমীকরণের দুইটি মূলের সমষ্টি শূন্য হবে?
A. $mn - r = 0$ B. $mn + r = 0$ C. $mr + n = 0$ D. $mr - n = 0$

OMR SHEET		
01. (A) (B) (C) (D) (E)	09. (A) (B) (C) (D) (E)	17. (A) (B) (C) (D) (E)
02. (A) (B) (C) (D) (E)	10. (A) (B) (C) (D) (E)	18. (A) (B) (C) (D) (E)
03. (A) (B) (C) (D) (E)	11. (A) (B) (C) (D) (E)	19. (A) (B) (C) (D) (E)
04. (A) (B) (C) (D) (E)	12. (A) (B) (C) (D) (E)	20. (A) (B) (C) (D) (E)
05. (A) (B) (C) (D) (E)	13. (A) (B) (C) (D) (E)	21. (A) (B) (C) (D) (E)
06. (A) (B) (C) (D) (E)	14. (A) (B) (C) (D) (E)	22. (A) (B) (C) (D) (E)
07. (A) (B) (C) (D) (E)	15. (A) (B) (C) (D) (E)	23. (A) (B) (C) (D) (E)
08. (A) (B) (C) (D) (E)	16. (A) (B) (C) (D) (E)	24. (A) (B) (C) (D) (E)
		25. (A) (B) (C) (D) (E)

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	D	$x^2 - 2x + 9 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে, $x^2 + kx + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $m\alpha, m\beta$ $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = 9, m^2\alpha\beta = 1$ $\Rightarrow m = \pm \frac{1}{3} \therefore k = -m(\alpha + \beta) = \pm \frac{2}{3}$
02	C	$x^2 + ax + 8 = 0$ এর একটি মূল 4 $\therefore 4^2 + a \times 4 + 8 = 0 \therefore a = \frac{-24}{4} = -6$ $\therefore x^2 + ax + b = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে, $D = (-6)^2 - 4 \times 1 \times b = 0 \therefore b = \frac{36}{4} = 9$
03	C	$x^2 - 2x + 5 = (x - 1)^2 + 4$ $\therefore$ ন্যূনতম মান পাওয়া যাবে যখন $(x - 1)^2 = 0$ $\therefore$ ন্যূনতম মান = 4
04	B	সর্বনিম্ন মান = $c - \frac{b^2}{4a} = q^2 - \frac{(-6p)^2}{4 \times 9} = q^2 - p^2$
05	A	$3x^2 - 4x - 5 = 0$ হতে 1 কম বিশিষ্ট মূল হবে $(x + 1)$ $\therefore 3(x + 1)^2 - 4(x + 1) - 5 = 0$ $\Rightarrow 3x^2 + 6x + 3 - 4x - 4 - 5 = 0 \Rightarrow 3x^2 + 2x - 6 = 0$
06	C	একটি মূল $1 + \sqrt{3}$ হলে অপর আর একটি মূল $1 - \sqrt{3}$ এবং তৃতীয় মূল γ এখন, $x^3 - 7x^2 + 8x + 10 = 0$ হতে, $\alpha + \beta + \gamma = 7$ $\Rightarrow (1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3}) + \gamma = 7 \Rightarrow \gamma = 5$ $\therefore$ অপর মূলদ্বয় = $1 - \sqrt{3}, 5$

প্রশ্ন উত্তর	ব্যাখ্যা
07 C	$\Sigma (\alpha - \beta)^2 = (\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2$ $= 2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$ $= 2\{(\alpha + \beta + \gamma)^2 - 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)\}$ $= 2\left(0^2 - 3 \cdot \frac{-1}{6}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$
08 D	$x^3 - px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β, γ হলে, $\alpha + \beta + \gamma = p$; $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q$; $\alpha\beta\gamma = r$ $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma} = \frac{q}{r}$; $\frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{\beta} \times \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{r}$ $\therefore rx^3 - qx^2 + px - 1 = 0$ সমীকরণটি উপযুক্ত শর্তদ্বয় পূরণ করে। Shortcut: উক্ত সমীকরণে x কে $\frac{1}{x}$ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে, $\frac{1}{x} - \frac{p}{x^2} + \frac{q}{x} - r = 0$ $\Rightarrow rx^3 - qx^2 + px - 1 = 0$
09 B	$\alpha - \beta = 8$; $\alpha^3 - \beta^3 = 152 \Rightarrow (\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) = 152$ $\Rightarrow 8(\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + 3\alpha\beta) = 152$ $\Rightarrow (\alpha - \beta)^2 + 3\alpha\beta = 19 \Rightarrow 8^2 + 3\alpha\beta = 19$ $\Rightarrow \alpha\beta = -15 \dots (i) \Rightarrow \beta = -\frac{15}{\alpha} \dots (ii)$ Now, $\alpha - \beta = 8 \Rightarrow \alpha + \frac{15}{\alpha} = 8 \Rightarrow \alpha^2 + 15 - 8\alpha = 0$ $\therefore \alpha = \frac{8 \pm \sqrt{8^2 - 4 \cdot 15}}{2 \cdot 1} = 5, 3 \therefore \beta = -\frac{15}{5} = -3$ বা, $\beta = -\frac{15}{3} = -5 \therefore$ মূলদ্বয় $(5, -3)$ বা $(3, -5)$ $\therefore$ সমীকরণ: $(x - 5)(x + 3) = 0$ অথবা, $(x - 3)(x + 5) = 0$ $\therefore x^2 - 2x - 15 = 0$
10 C	মূলদ্বয় সমান হলে $D = 0 \therefore b^2 - 4ac = 0$
11 D	এখানে, $x \neq 0$; কারণ x হারে আছে। $\frac{1}{x - \sqrt{3}k} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x + \sqrt{3}k} = 0 \Rightarrow \frac{2x^2 + x^2 - 3k^2}{x(x^2 - 3k^2)} = 0$ $\Rightarrow 3x^2 - 3k^2 = 0 \therefore x^2 - k^2 = 0 \therefore x = \pm k$
12 A	সাধারণ মূল α হলে, $\alpha^2 - 11\alpha + a = 0$ $\frac{\alpha^2 - 14\alpha + 2a = 0}{(-)}, 3\alpha = a$ $\therefore \alpha = \frac{a}{3} \therefore \frac{a^2}{9} - \frac{11a}{3} + a = 0$ বা, $a^2 - 33a + 9a = 0$ বা, $a(a - 24) = 0 \therefore a = 0, 24$
13 C	$x^2 + (\alpha - \beta)x - \alpha\beta + x^2 + (\gamma - \beta)x - \beta\gamma + x^2 + (\alpha + \gamma) + \alpha\gamma = 0$ $\Rightarrow 3x^2 + (\alpha - \beta + \gamma - \beta + \alpha + \gamma)x - \alpha\beta - \beta\gamma + \alpha\gamma = 0$ $\Rightarrow 3x^2 + \{2(\alpha + \gamma) - 2\beta\}x - \alpha\beta - \beta\gamma + \alpha\gamma = 0$ ধরি, সমীকরণের মূলদ্বয় a_1, b_1 $\therefore a_1 + b_1 = -\frac{\{2(\alpha + \gamma) - 2\beta\}}{3} = 0 \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta$
14 A	$D = b^2 - 4ac = 36 - 40 = -4 < 0$; তাই মূলদ্বয় জটিল ও অসমান।

প্রশ্ন উত্তর	ব্যাখ্যা
15 B	প্রশ্নমতে, $\alpha + \beta = p$ এবং $\alpha\beta = q$ $\therefore \frac{p}{p - \alpha} = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta - \alpha} = \alpha$ এবং $\frac{p}{p - \beta} = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta - \beta} = \beta$ $\therefore$ সমীকরণটি $\Rightarrow x^2 - px + q = 0$
16 D	$D = 0 \Rightarrow 4 + 8k = 0 \therefore k = -\frac{1}{2}$
17 C	$y = (x^2 - 1)(x^4 - 10) = 0$ $\therefore x = \pm 1, \pm \sqrt[4]{10} \therefore$ ছেদবিন্দু 4টি
18 C	ধরি, অপর মূল দুটি $\alpha, \alpha \therefore \alpha + \alpha - 1 = -b$ $\Rightarrow 2\alpha - 1 = -b$ এবং $\alpha \cdot \alpha \cdot (-1) = -1$ $\Rightarrow \alpha = \frac{1 - b}{2} \dots (i) \quad \alpha^2 = 1 \dots (ii)$ $\therefore$ একটি মূল $= -1 \therefore (-1)^3 + b(-1)^2 - a(-1) + 1 = 0$ $\Rightarrow -1 + b + a + 1 = 0$ $\Rightarrow a = -b \dots (iii)$ (i) ও (iii) হতে পাই, $\left(\frac{1 - b}{2}\right)^2 = 1$ $\Rightarrow \frac{1 - b}{2} = 1 \Rightarrow 1 - b = 2 \Rightarrow b = -1$ (iii) নং হতে $a = -(-1) = 1$
19 A	মূলদ্বয় c এবং $c + 1$ হলে, $x^2 - (c + c + 1)x + (c^2 + c) = 0$ $\therefore 2c + 1 = 7, c = 3 \therefore a, b = 3, 4$
20 A	$1 + \omega + \omega^2 = 0$
21 C	নিচায়ক $= 3^2 - 4 \cdot \alpha \cdot 4 > 0$ $\Rightarrow 9 - 16\alpha > 0 \Rightarrow 16\alpha < 9 \Rightarrow \alpha < \frac{9}{16}$
22 C	$x^2 + \lambda = 6x$ বা, $x^2 - 6x + \lambda = 0$ উহার মূলদ্বয় সমান $\Rightarrow b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot \lambda \cdot 1 = 0 \Rightarrow 36 - 4\lambda = 0 \therefore \lambda = 9$
23 B	শর্তমতে, $\beta = 4\alpha^2$ $\therefore$ ধরি, $2x^2 - kx + 1 = 0$ এর মূলদ্বয় $\alpha, 4\alpha^2$ $\therefore \alpha \times 4\alpha^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha^3 = \frac{1}{8} \therefore \alpha = \frac{1}{2}$ আবার, $\alpha + 4\alpha^2 = \frac{k}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{k}{2}$ $\Rightarrow \frac{1}{2} + 1 = \frac{k}{2} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{k}{2} \therefore k = 3$
24 A	$2x^2 - 5x + 20 = 0$ এর মূলদ্বয়, $\frac{1}{\alpha}$ এবং $\frac{1}{\beta}$ $\therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{5}{2}$ এবং $\frac{1}{\alpha\beta} = \frac{20}{2} = 10$ বা, $\alpha\beta = \frac{1}{10}$ $\therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{5}{2}$ বা, $\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5}{2}$ বা, $\frac{\alpha + \beta}{\frac{1}{10}} = \frac{5}{2}$ বা, $\alpha + \beta = \frac{5}{2} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{4}$
25 B	$x^3 - mx^2 + nx + r = 0 \dots (i)$ ধরি মূলদ্বয় α, β, γ দেওয়া আছে $\alpha + \beta = 0$ এখন $\alpha + \beta + \gamma = m \therefore \gamma = m$ (i) নং সমীকরণে $x = \gamma = m$ বসালে নির্ণেয় শর্ত পাওয়া যাবে। $m^3 - m \cdot m^2 + mn + r = 0 \therefore mn + r = 0$



STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টি প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	সমীকরণের জ্যামিতিক প্রকৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত	*
02	পরাবৃত্তের সমীকরণ হতে বিভিন্ন Parameter নির্ণয় সংক্রান্ত	***
03	পরাবৃত্তের স্পর্শক ও স্পর্শ বিন্দু নির্ণয়	***
04	উপকেন্দ্রিক/ ফোকাস দূরত্ব সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	***
05	সমীকরণ থেকে বিভিন্ন উপাদান বের করা সংক্রান্ত	***
06	উপবৃত্তের পরামিতিক স্থানাঙ্ক সংক্রান্ত	**
07	বিভিন্ন উপাদান থেকে উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	***
08	উপকেন্দ্র ও দিকাক্ষের দূরত্ব সংক্রান্ত	*
09	স্পর্শক সম্পর্কিত	**
10	জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	**
11	সমীকরণ থেকে বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করা সংক্রান্ত	*

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

পরাবৃত্ত [PARABOLA]

কণিক এর প্রাথমিক তথ্য

- উৎকেন্দ্রিকতা, e এর বিভিন্ন মানের জন্য সম্ভারপথের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়।
 $\Rightarrow e = 0$ হলে, সম্ভারপথটি একটি বৃত্ত।

- $\Rightarrow e = \infty$ হলে, সম্ভারপথটি একটি সরলরেখা।
 $\Rightarrow e = 1$ হলে, সম্ভার পথ হয় পরাবৃত্ত (Parabola)।
 $\Rightarrow 0 < e < 1$ হলে, সম্ভার পথ হয় উপবৃত্ত (Ellipse)।
 $\Rightarrow e > 1$ হলে, সম্ভার পথ হয় অধিবৃত্ত (Hyperbola)।

TOPIC 01 সমীকরণের জ্যামিতিক প্রকৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণ
 $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ সমীকরণটিতে।

i) পরাবৃত্ত হবে যদি $\Delta \neq 0$ এবং $h^2 = ab$ হয়।

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$$

ii) উপবৃত্ত হবে যদি $\Delta \neq 0$ এবং $h^2 < ab$ হয়।

iii) অধিবৃত্ত হবে যদি $\Delta \neq 0$ এবং $h^2 > ab$ হয়।

iv) জোড়া সরলরেখা হবে যদি $\Delta = 0$ হয়।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $xy = 2$ সমীকরণটি হবে- [JU. 18-19; RU. 09-10; SUST. 08-09]

Solve $xy = a$ অধিবৃত্তের সমীকরণ।

MEx 02 $9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y - 124 = 0$ সমীকরণ দ্বারা সূচিত কণিকটি কি নির্দেশ করে? [RU. 14-15]

Solve $9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y - 124 = 0$

x^2 এবং y^2 এর সহগ ভিন্ন এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত তাই সমীকরণটি একটি অধিবৃত্ত।

TOPIC 02 পরাবৃত্তের সমীকরণ হতে বিভিন্ন Parameter নির্ণয় সংক্রান্ত

□ Required Formulas for Parabola:

Parameter	$y^2 = 4ax$ আকারের পরাবৃত্ত	$x^2 = 4ay$ আকারের পরাবৃত্ত
চিত্র		
1. শীর্ষবিন্দু	(0, 0)	(0, 0)
2. উপকেন্দ্র/ফোকাস	(a, 0)	(0, a)
3. অক্ষরেখার সমীকরণ	$y = 0$	$x = 0$
4. নিয়ামক/দিকাক্ষের সমীকরণ	$x + a = 0$	$y + a = 0$
5. উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ	$x - a = 0$	$y - a = 0$
6. উপকেন্দ্রিক লম্ব/ন্যূনতম দৈর্ঘ্য	$ 4a $	$ 4a $
7. উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক	(a, 2a) এবং (a, -2a)	(2a, a) এবং (-2a, a)
8. উপকেন্দ্রিক/ ফোকাস দূরত্ব	$ a+x $	$ a+y $

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- (i) শীর্ষবিন্দু (0, 0) বলতে বুঝায় $x = 0$ ও $y = 0$
(ii) উপকেন্দ্র/ফোকাস (a, 0) বলতে বুঝায়, $x = a$ ও $y = 0$

(iii) উপকেন্দ্র/ফোকাস (0, a) বলতে বুঝায়, $x = 0$ ও $y = a$

(iv) প্রথমে সূত্র লিখতে হবে তারপর সূত্রের $x/y/a$ এর জায়গায় প্রশ্নের সমীকরণের $x/y/a$ বসাতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $x^2 + 4x + 2y = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু-
[DU. 12-13, JU. 12-13, 11-12, CU. 11-12]

Solve $x^2 + 4x + 2y = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 4 = -2y + 4$
 $\Rightarrow (x+2)^2 = -2(y-2) \therefore$ শীর্ষ বিন্দু $(-2, 2)$ Ans.

MEx 02 $3y^2 = 5x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হলো-
[CU. 16-17; JU. 15-16, RU. 08-09, KU. 03-04]

Solve $3y^2 = 5x \Rightarrow y^2 = \frac{5}{3}x$

$\Rightarrow y^2 = 4\left(\frac{5}{12}\right)x$ কে পরাবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$ এর সমীকরণের সাথে

তুলনা করে পাই, $a = \frac{5}{12} \therefore$ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $\equiv (a, 0) \equiv \left(\frac{5}{12}, 0\right)$

এবং উপকেন্দ্রিক লম্ব $= 4a = 4 \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{3}$

TOPIC 03 পরাবৃত্তের স্পর্শক ও স্পর্শ বিন্দু নির্ণয়

Technique:

i) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের-

ii) স্পর্শক $y = mx + c$ হলে $c = \frac{a}{m}$

iii) স্পর্শক, $y = mx + c$ হলে স্পর্শ বিন্দু $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$

iv) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্তের-

i) (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $x \cdot x_1 = 2a(y + y_1)$

ii) স্পর্শক $y = mx + c$ হলে $c = -am^2$ এবং স্পর্শবিন্দু $(2am, am^2)$

iii) একটি সরলরেখা একটি বক্ররেখাকে স্পর্শ করলে সরলরেখার সমীকরণ হতে যে কোন একটি চলকের মান বক্ররেখার সমীকরণে বসিয়ে প্রাপ্ত দ্বিঘাত সমীকরণটির নিশ্চায়কের মান শূন্য হয়।

□ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুতে অংকিত স্পর্শক:

i) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুতে অংকিত স্পর্শক y অক্ষ বরাবর, যার সমীকরণ $x = 0$

ii) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুতে অংকিত স্পর্শক x অক্ষ বরাবর, যার সমীকরণ $y = 0$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $y = kx$ সরলরেখাটি $y = x^2 + 4$ বক্ররেখার স্পর্শক হলে k এর একটি মান-
[DU. 18-19]

Solve $y = kx$ এবং $y^2 = x^2 + 4 \therefore kx = x^2 + 4 \Rightarrow x^2 - kx + 4 = 0$
 $\therefore$ স্পর্শক হলে স্পর্শ $k^2 = 4 \cdot 1 \cdot 4 \therefore k = \pm 4$

MEx 02 $y + x + k = 0$ রেখাটি $y^2 = x$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে k -এর মান কত?
[RU. 09-10; JUST. 18-19]

Solve $y = -x - k, y^2 = x \therefore a = \frac{1}{4} \therefore -k = \frac{1/4}{-1} \Rightarrow \frac{1}{4}$

TOPIC 04 উপকেন্দ্রিক/ ফোকাস দূরত্ব সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ

Technique: (i) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপরস্থ (x, y) বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= |a + x|$

(ii) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্তের উপরস্থ (x, y) বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= |a + y|$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপরস্থ কোন বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব 8 হলে, ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক-
[KU. 14-15; CU. 14-15; RU. 05-06]

Solve $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের সমীকরণকে $y^2 = 4ax$ সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই, $a = 2 \therefore$ নির্ণেয় বিন্দুর ভূজ $= 8 - a = 8 - 2 = 6$

এই মান সমীকরণে বসিয়ে পাই $y^2 = 48 \therefore y = \pm 4\sqrt{3}$

$\therefore$ পরাবৃত্তের উপরস্থ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv (6, \pm 4\sqrt{3})$

উপবৃত্ত

Required Formulas for Ellipse

Parameter	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; a > b$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; b > a$
চিত্র		

01. কেন্দ্র	(0, 0)	(0, 0)
02. বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য/শীর্ষস্থলের দূরত্ব	2a	2b
03. ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য	2b	2a
04. বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ	y = 0	x = 0
05. ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ	x = 0	y = 0
06. বৃহৎ অক্ষের প্রান্তবিন্দু/শীর্ষবিন্দু	(± a, 0)	(0, ± b)
07. ক্ষুদ্র অক্ষের প্রান্তবিন্দু	(0, ± b)	(± a, 0)
08. বিকেন্দ্রিকতা/উৎকেন্দ্রতা	$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$	$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$
09. উপকেন্দ্র/ফোকাস	(± ac, 0)	(0, ± be)
10. উ. লম্বের দৈর্ঘ্য	$2b^2/a$	$2a^2/b$
11. উ. লম্বের সমীকরণ	x = ± ac	y = ± be
12. ফোকাসদ্বয়ের দূরত্ব	2ac	2be
13. দিকাক্ষ/নিয়ামকের সমীকরণ	x = ± a/e	y = ± b/e

TOPIC 05 সমীকরণ থেকে বিভিন্ন উপাদান বের করা সংক্রান্ত

Technique: প্রদত্ত উপবৃত্তের সমীকরণটিকে $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ আকারে প্রকাশ করতে হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $25x^2 + 16y^2 = 400$ এর উৎকেন্দ্রিকতা হবে-

[DU. 19-20, 17-18; JU. 12-13, 09-10; BSFMSU. 19-20; DU. 11-12, 07-08, 05-06, 97-98; CoU. 08-09, 07-08; JU. 18-19]

Solve দেওয়া আছে, $25x^2 + 16y^2 = 400$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$$

MEx 02 কোন উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব উপবৃত্তটির বৃহৎ অক্ষের অর্ধেক হলে উৎকেন্দ্রিকতা- [JU. A 16-17; BUET. 11-12; ব.বো. ২০১১]

Solve $\frac{2b^2}{a} = \frac{2a}{2} \Rightarrow a^2 = 2b^2$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{2b^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

TOPIC 06 উপবৃত্তের পরামিতিক স্থানাঙ্ক সংক্রান্ত

Technique: $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ আকারের কোনো উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উপবৃত্তের উপরস্থ p(x, y) বিন্দুর পরামিতিক স্থানাঙ্ক (acosθ, bsinθ)

যেখানে, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{ay}{bx}\right)$ হলো p(x, y) বিন্দুর উপকেন্দ্রিক কোণ।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 $25x^2 + 16y^2 = 400$ উপবৃত্তের (4, 0) বিন্দুতে উপবৃত্তটির পরামিতিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

Solve $25x^2 + 16y^2 = 400$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1;$$

$$a = 4, b = 5;$$

$$(4, 0) \text{ বিন্দুতে পরামিতিক স্থানাঙ্ক } (4\cos\theta, 5\sin\theta)$$

TOPIC 07 বিভিন্ন উপাদান থেকে উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique:

(i) যদি উপকেন্দ্র (α, β) নিয়ামক ax + by + c = 0 এবং উৎকেন্দ্রিকতা হয় e তবে উপবৃত্তের সমীকরণ, $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = e^2 \frac{(ax+by+c)^2}{a^2+b^2}$

(ii) (h, k) কেন্দ্রবিশিষ্ট উপবৃত্তের সমীকরণ, $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার উপকেন্দ্র (1, -1) দিকাক্ষের সমীকরণ x - y + 2 = 0 এবং উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{\sqrt{2}}$ [CU. 18-19]

Solve $(x-1)^2 + (y+1)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{(x-y+2)^2}{(\sqrt{2})^2}$
সমাধান করে, $3x^2 + 3y^2 + 2xy - 12x + 12y + 4 = 0$

TOPIC 08 উপকেন্দ্র ও দিকাক্ষের দূরত্ব সংক্রান্ত

Technique:

(i) $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে (α, β) হতে নিয়ামকের দূরত্ব, $\frac{a}{e}$ এবং উপকেন্দ্রের দূরত্ব ae (যেখানে a > b এবং $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$)

(ii) $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে (α, β) হতে নিয়ামকের দূরত্ব, $\frac{b}{e}$ এবং উপকেন্দ্রের দূরত্ব be (যেখানে b > a এবং $e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$)

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 একটি উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব ক্ষুদ্র অক্ষের অর্ধেক; e এর মান কৌণটি? [JU. 17-18; CU. 11-12; RU. 08-09; BU. 18-19]

Solve $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব = $\frac{2b^2}{a}$ এবং ক্ষুদ্র অক্ষ = 2b;

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{2b^2}{a} = b \therefore \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

TOPIC 09 স্পর্শক সম্পর্কিত

গণিত ২য় পত্র

Technique:

(i) $y = mx + c$ রেখা $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত: $c^2 = a^2m^2 + b^2$; ($m \neq 0$)

(ii) $y = mx + c$ সরলরেখাটি $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের স্পর্শক হলে, স্পর্শ

বিন্দুর স্থানাঙ্ক: $\left(\pm \frac{a^2m}{\sqrt{a^2m^2 + b^2}}, \pm \frac{b^2}{\sqrt{a^2m^2 + b^2}} \right)$

(iii) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 c-এর মান কত হলে $2y + 2x = c$ সরলরেখাটি $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ উপবৃত্তের স্পর্শক হবে?

Solve $2y = -2x + c \Rightarrow y = -x + \frac{c}{2}$; $m = (-1)$, $a^2 = 20$, $b^2 = 5$ [JU. 16-17]

$$\therefore \left(\frac{c}{2}\right)^2 = a^2m^2 + b^2 \Rightarrow \frac{c^2}{4} = 20(-1)^2 + 5$$

$$\Rightarrow c^2 = 25 \times 4 \therefore c = \pm 10$$

TOPIC 10 জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের একটি জ্যা (x_1, y_1) বিন্দুতে সমন্বিত হলে জ্যা এর সমীকরণ $b^2 \cdot x \cdot x_1 + a^2 \cdot y \cdot y_1 = b^2 \cdot x_1^2 + a^2 \cdot y_1^2$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ উপবৃত্তের একটি জ্যা $(1, -2)$ বিন্দুতে সমন্বিত হয়; জ্যাটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [SUST. 16-17]

Solve $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ অর্থাৎ $9x^2 + 16y^2 = 144$ উপবৃত্তের যে জ্যা $(1, -2)$ বিন্দুতে সমন্বিত হয় তার সমীকরণ, $9 \cdot x \cdot 1 + 16 \cdot y \cdot (-2) = 9 \cdot 1^2 + 16 \cdot (-2)^2$
 $\Rightarrow 9x - 32y = 9 + 64 \Rightarrow 9x - 32y = 73$

অধিবৃত্ত

Required Formulas for Hyperbola

Parameter	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$
চিত্র		
01. কেন্দ্র	(0, 0)	(0, 0)
02. শীর্ষবিন্দু	($\pm a, 0$)	(0, $\pm b$)
03. আড় অক্ষের দৈর্ঘ্য/ শীর্ষদ্বয়ের দূরত্ব	2a	2b
04. অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য	2b	2a
05. বিকেন্দ্রিকতা/ উৎকেন্দ্রিকতা	$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$	$e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}}$
06. উপকেন্দ্র/ ফোকাস	($\pm ae, 0$)	(0, $\pm be$)
07. দিকাক্ষ/নিয়ামকের সমীকরণ	$x = \pm \frac{a}{e}$	$y = \pm \frac{b}{e}$
08. উ. লম্বের দৈর্ঘ্য	$\frac{2b^2}{a}$	$\frac{2a^2}{b}$
09. উ. লম্বের সমীকরণ	$x = \pm ae$	$y = \pm be$
10. উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব	2ae	2be

বিশেষ দ্রষ্টব্য: “মনে রাখতে হবে, কখনও কখনও $xy = 1$ বা $xy = 2$ অধিবৃত্তের সমীকরণ হয়।”

TOPIC 11 সমীকরণ থেকে বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করা সংক্রান্ত

Technique: প্রদত্ত সমীকরণ কে $\frac{(y-\beta)^2}{b^2} - \frac{(x-\alpha)^2}{a^2} = 1$

অথবা $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} - \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ আকারে প্রকাশ করতে হবে
অতঃপর, এখান থেকে উপকেন্দ্রিক লম্ব, উপকেন্দ্র, শীর্ষ
নিয়ামক রেখা, অক্ষরেখা ইত্যাদি নির্ণয় করতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ অধিবৃত্ত এর নিয়ামক রেখা এর সমীকরণ কোনটি? [JnU. 15-16; RU. 18-19; ঢা.বো. ২০১৫, ১১, ০৭; রা.বো. ২০০৬, ১২; দি.বো. ২০১২; চ.বো. ২০১০, ০৫, মা.বো. ২০১০]

Solve $c = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4} \therefore$ নিয়ামকের সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{c} = \pm \frac{4}{5}$
 $\Rightarrow x = \pm \frac{16}{5} \Rightarrow 5x = \pm 16$

STEP 03 কিংড স্যালেন প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যালাল ভ্যাসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. যে কণিকের প্যারামিতিক সমীকরণ $x = 3 + at^2$, $y = 2at$ সেটার শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক-

- A. (0, 0) B. (2, 0) C. (3, 0) D. (2, 3)

SOWhy $x = 3 + at^2$
 $\Rightarrow \frac{x-3}{a} = t^2$ (i)

$y = 2at$
 $\Rightarrow t = \frac{y}{2a}$ (ii)

(i) হতে পাই, $\Rightarrow \frac{x-3}{a} = \frac{y^2}{4a^2} \Rightarrow y^2 = 4(x-3) \therefore$ শীর্ষ = (3, 0)

02. $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{14} = 1$ উপবৃত্তের নিয়ামক রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত একক?

- A. 7 B. 14 C. 15 D. 30

SOWhy $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{14} = 1$
 $\Rightarrow \frac{x^2}{(\sqrt{30})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{14})^2} = 1$
 $\therefore c = \sqrt{1 - \frac{14}{30}} = \sqrt{\frac{16}{30}} = \frac{4}{\sqrt{30}}$

$\therefore$ নিয়ামক রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \pm \frac{2a}{e} = \frac{2 \times \sqrt{30}}{\frac{4}{\sqrt{30}}} = \frac{30}{2} = 15$

03. $2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$ উপবৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি?

- A. (2, 1) B. (-2, 1) C. (1, 2) D. (1, -2)


SOWhy $2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 8x = -(y^2 - 2y + 1) = -(y-1)^2$
 $\Rightarrow 2(x^2 - 4x + 4) + (y-1)^2 = 8 \Rightarrow \frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{8} = 1 \therefore$ কেন্দ্র = (2, 1)

ASPECT SPECIAL কেন্দ্র = $\left(\frac{x \text{ এর সহগ}}{(-2) \times x^2 \text{ এর সহগ}}, \frac{y \text{ এর সহগ}}{(-2) \times y^2 \text{ এর সহগ}} \right)$
 $= \left(\frac{-8}{(-2) \times 2}, \frac{-2}{(-2) \times 1} \right) = (2, 1)$

04. $x^2 - 8x + 4y - 4 = 0$ কণিকটির দিকাক্ষের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক-

- A. (4, 6) B. (4, -6)
C. (-4, -6) D. (6, 4)

SOWhy $x^2 + 8x + 4y - 4 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 8x + 16 = -4y + 4 + 16$
 $\Rightarrow (x-4)^2 = -4(y-5) = 4(-1)(y-5)$



নিয়ামকের পাদবিন্দু: $y - 5 = -(-1) \Rightarrow y = 6 \therefore x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$
 $\therefore$ নিয়ামকের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক, $(x, y) = (4, 6)$
05. $2x^2 + 3y^2 - 12x + 12y + 29 = 0$ কণিকটির উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? [GST-A. 21-22]

- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ D. $2\sqrt{\frac{2}{3}}$

SOWhy $2x^2 + 3y^2 - 12x + 12y + 29 = 0$
 $\Rightarrow 2x^2 - 12x + 3y^2 + 12y = -29$
 $\Rightarrow 2x^2 - 12x + 18 + 3y^2 + 12y + 12 = 1$
 $\Rightarrow 2(x-3)^2 + 3(y+2)^2 = 1 \Rightarrow \frac{(x-3)^2}{\frac{1}{2}} + \frac{(y+2)^2}{\frac{1}{3}} = 1$

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

06. $(y + \sqrt{3})^2 = 8(x + 3)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি? [GST-C. 20-21]

- A. $(2, -\frac{\pi}{3})$ B. $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$ C. $(2, \frac{4\pi}{3})$ D. $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$

SOWhy $(y + \sqrt{3})^2 = 8(x + 3) = 4.2(x + 3)$
উপকেন্দ্র $(X, Y) = (a, 0) \therefore x + 3 = 2 \Rightarrow x = -1$

এবং $y + \sqrt{3} = 0 \Rightarrow y = -\sqrt{3}$
 $\therefore$ উপকেন্দ্র $= (-1, -\sqrt{3}) = (\sqrt{1^2 + 3}, \pi + \tan^{-1} \sqrt{3}) = (2, \frac{4\pi}{3})$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $2x^2 + 3y^2 = 1$ উপবৃত্তের (ellipse) উপকেন্দ্রিক লম্বের (latus rectum) দৈর্ঘ্য কত? [JnU. 17-18; JU. 15-16; ঢা.বো. ২০১৪, ০৬; সি.বো. ২০১১]

- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

SOWhy $2x^2 + 3y^2 = 1$ বা, $\frac{x^2}{\frac{1}{2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1$ ($a > b$)

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

02. $4x^2 + 9y^2 = 36$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [JnU. 15-16]

- A. 6π বর্গ একক B. 2π বর্গ একক
C. 8π বর্গ একক D. 12π বর্গ একক

SOWhy প্রদত্ত উপবৃত্তের সমীকরণ, $4x^2 + 9y^2 = 36$

বা, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ বা, $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1 \therefore$ ক্ষেত্রফল $= \pi \cdot 3 \cdot 2 = 6\pi$ বর্গ একক

03. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ অধিবৃত্ত এর নিয়ামক রেখা এর সমীকরণ কোনটি?

[JnU. 15-16; RU. 18-19; ঢা.বো. ২০১৫, ১১, ০৭; রা.বো. ২০০৬, ১২; দি.বো. ২০১২; চ.বো. ২০১০, ০৫, মা.বো. ২০১০]

- A. $5x = 16$ B. $5x = \pm 16$
C. $5x = 48$ D. $x = 16$

SOWhy $e = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$

$\therefore$ নিয়ামকের সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{4}{5} \Rightarrow x = \pm \frac{16}{5} \Rightarrow 5x = \pm 16$

04. P এর মান কত হলে $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{p} = 1$ উপবৃত্তি (6, 4) বিন্দু দিয়ে যাবে? [JnU. 09-10]
- A. 52 B. $\frac{5}{2}$ C. 25 D. $\frac{2}{5}$
- SO Why** $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{p} = 1$ উপবৃত্তি (6, 4) বিন্দুগামী
 $\therefore \frac{6^2}{100} + \frac{4^2}{p} = 1 \Rightarrow \frac{16}{p} = 1 - \frac{36}{100} = \frac{64}{100} \therefore p = 25$
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়**

01. $y^2 = 4p(x - 2)$ পরাবৃত্তি (3, -4) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে p এর মান কত? [KU. 19-20]
- A. -4 B. 1 C. 2 D. 4
- SO Why** $y^2 = 4p(x - 2)$ পরাবৃত্তি (3, -4) বিন্দুগামী
 $\therefore (-4)^2 = 4p(3 - 2) \Rightarrow 16 = 4p \therefore p = 4$

02. (4, 3/2) এবং (3, 2) বিন্দুগামী একটি উপবৃত্তের অক্ষদ্বয়, স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় বরাবর হলে উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রতা কত? [KU. 18-19]
- A. $2\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

SO Why ধরি, উপবৃত্তের সমীকরণ, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\left(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right)$ (3, 2) বিন্দুগামী

$$\Rightarrow \frac{16}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1 \text{ ----- (i)}$$

$$(i) \times 9 \Rightarrow \frac{144}{a^2} + \frac{81}{4b^2} = 9 \text{ এবং } \frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \text{ ----- (ii)}$$

$$(ii) \times 16 \Rightarrow \frac{144}{a^2} + \frac{64}{b^2} = 16$$

$$\therefore \text{বিয়োগ করে } \frac{81}{4b^2} - \frac{64}{b^2} = -7 \Rightarrow \frac{1}{b^2} \left(\frac{81}{4} - 64 \right) = -7$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b^2} \left(\frac{81 - 256}{4} \right) = -7 \Rightarrow \frac{-175}{4b^2} = -7$$

$$\Rightarrow b^2 = \frac{175}{28} = \frac{25}{4} \Rightarrow b = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{9}{a^2} + \frac{4 \times 1}{25} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{9}{a^2} = 1 - \frac{4}{25} \Rightarrow \frac{9}{a^2} = \frac{21}{25} \Rightarrow a = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{25 - \frac{25}{3}}{25}} = \sqrt{\frac{75 - 25}{25 \times 3}} = \sqrt{\frac{50}{75}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

03. $3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হলো- [KU. 15-16]
- A. $\pm \frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

SO Why $3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}x)^2 + 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}x + (\sqrt{3})^2 = 4y + 5 + 3$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}x + \sqrt{3})^2 = 4(y + 2) \Rightarrow 3(x + 1)^2 = 4(y + 2)$$

$$\Rightarrow (x + 1)^2 = \frac{4}{3}(y + 2) \therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{4}{3}$$

04. $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপরিস্থিত কোন বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব 8 হলে, ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক- [KU. 14-15; CU. 14-15; RU. 05-06]
- A. $(6, \pm 4\sqrt{3})$ B. $(16, \pm 4\sqrt{3})$ C. $(6, \pm 7\sqrt{3})$ D. কোনটিই নয়

SO Why $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের সমীকরণকে $y^2 = 4ax$ সমীকরণের সাথে

তুলনা করে পাই, $a = 2$

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্দুর ভূজ = $8 - a = 8 - 2 = 6$; এই মান সমীকরণে বসিয়ে পাই $y^2 = 48$

$\therefore y = \pm 4\sqrt{3} \therefore$ পরাবৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv (6, \pm 4\sqrt{3})$

05. P এর মান কত হলে $4x^2 + py^2 = 80$ উপবৃত্তি (0, ± 4) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করবে? [KU. 03-04; PUST. 11-12; রা.বো. ২০১০; য.বো. ২০০৮]
- A. 4 B. 6 C. 8 D. 5

SO Why যেহেতু $4x^2 + py^2 = 80$ উপবৃত্তি (0, ± 4) বিন্দুগামী
 $\therefore 0 + 16p = 80 \therefore p = 5$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ অধিবৃত্তের আড় অক্ষের সমীকরণ- [IU-A. 19-20]
- A. $x = 0$ B. $y = 0$ C. $x = a$ D. $y = b$

SO Why $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ অধিবৃত্তের আড় অক্ষের সমীকরণ, $y = 0$

02. $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ অধিবৃত্তের অসীমতট রেখার দৈর্ঘ্য- [IU-D. 19-20]
- A. $x = +\frac{b}{a}y$ B. $x = +\frac{a}{b}y$ C. $y = +\frac{b}{a}x$ D. $y = +\frac{a}{b}x$

SO Why $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \therefore$ অধিবৃত্তের অসীমতটের দৈর্ঘ্য $y = \pm \frac{a}{b}x$

03. $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [IU-A. 19-20]
- A. $x = a$ B. $y = 0$ C. $x = 0$ D. $y = b$

SO Why $y^2 = 4ax$ ($a > 0$)
 পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শক y অক্ষ এবং y অক্ষের সমীকরণ $x = 0$

04. $y = x + 3$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য- [IU. 17-18]
- A. 3 B. 4 C. 12 D. 16

SO Why $y = x + 3$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে $3 = \frac{a}{1}$ হবে

$\therefore y^2 = 4.3.x = 12x \therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = 12

05. (3, 6) বিন্দুতে $y^2 = 12x$ পরাবৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ- [IU. 17-18]
- A. $x - y + 9 = 0$ B. $x + y + 9 = 0$
 C. $x - y + 3 = 0$ D. $x + y + 3 = 0$

SO Why (3, 6) দিয়ে Option Test. Answer (C).

06. $9x^2 + 4y^2 = 36$ উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? [IU. 16-17; JU. 09-10]
- A. 3/8 B. 2/9 C. 8/3 D. -8/3

SO Why $9x^2 + 4y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

$\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য = $\frac{2a^2}{b} = \frac{2 \times 4}{3} = \frac{8}{3}$

07. p এর মান কত হলে $px^2 + 4y^2 = 1$ উপবৃত্তি ($\pm 1, 0$) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে? [IU. 16-17; CU. 15-16; RU. 09-10]
- A. 4 B. 2 C. -5 D. 1

SO Why যেহেতু $px^2 + 4y^2 = 1$ উপবৃত্তি ($\pm 1, 0$) বিন্দুগামী

$\therefore p + 0 = 1 \therefore p = 1$

08. $(x^2/25) + (y^2/9) = 1$ উপবৃত্তের দিকাক্ষের সমীকরণ- [IU. 14-15]
- A. $4p = \pm 25$ B. $y = 4ax$ C. $5y = \pm 16$ D. $4x = \pm 25$

SO Why $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$

$\therefore$ দিকাক্ষের সমীকরণ, $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{5}{4} = \pm \frac{25}{4} \Rightarrow 4x = \pm 25$

09. $y = mx + c$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করে। $a = 8$ এবং $m = 2$ হলে, c এর মান- [IU. 12-13]
- A. -4 B. 4 C. -5 D. 5

SO Why $y = mx + c$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করে।

$\therefore c = \frac{a}{m} = \frac{8}{2} = 4$

10. অধিবৃত্তের সমীকরণ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ হলে, উপকেন্দ্রিক শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে-

A. $(\pm a, 0)$ B. $(a, 0)$ C. $(a, 0)$ D. (a, y) [IU. 12-13]

[S@Why] $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ এর উপকেন্দ্রিক শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(\pm a, 0)$

11. $y^2 - x^2 = 4$ হাইপারবোলার শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক-

A. $(0, \pm 2)$ B. $(0, \pm 1)$ C. $(\pm 2, 0)$ D. $(\pm 1, 0)$ [IU. 05-06; CU. 12-13]

[S@Why] $y^2 - x^2 = 4 \Rightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = 1$

সমীকরণকে $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই, $a = 2$

$\therefore$ হাইপারবোলার শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv (0, \pm a) \equiv (0, \pm 2)$

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y = 2x + b$ রেখাটি $y^2 = 16x$ পরাবৃত্তের স্পর্শক হলে b এর মান কত? [BU. 18-19]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[S@Why] $y = 2x + b$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের স্পর্শক হলে $b = \frac{4}{2} = 2$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $2x^2 - 4xy + 3y^2 - x + y - 1 = 0$ সমীকরণের জ্যামিতিক রূপ কোনটি?

[SUST-B. 19-20]

A. অধিবৃত্ত B. পরাবৃত্ত C. উপবৃত্ত D. বৃত্ত E. জোড়া সরলরেখা

[S@Why] $2x^2 - 4xy + 3y^2 - x + y - 1 = 0$ কে $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $h = -2, a = 2, b = 3$
 $\therefore h^2 - ab = 4 - 6 < 0$
 $\therefore$ সমীকরণটি উপবৃত্তের

02. $4x^2 - 9y^2 - 8x + 18y - 41 = 0$ কণিকের অসীমতটখয়ের ঢালের গুণফল কত? [SUST-B. 19-20]

A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{4}{9}$ C. $\frac{4}{9}$ D. -1 E. $-\frac{2}{3}$

[S@Why] $4x^2 - 9y^2 - 8x + 18y - 41 = 0$
 $\Rightarrow 4(x^2 - 2x) - 9(y^2 - 2y) = 41$
 $\Rightarrow 4(x^2 - 2x + 1) - 9(y^2 - 2y + 1) = 41 + 4 - 9$
 $\Rightarrow 4(x - 1)^2 - 9(y - 1)^2 = 36 \Rightarrow \frac{(x - 1)^2}{3^2} - \frac{(y - 1)^2}{2^2} = 1$

$\therefore$ অসীমতটখের সমীকরণ $(y - 1) = \pm \frac{2}{3}(x - 1)$

$\therefore$ অসীমতটখের ঢালের গুণফল $= \frac{2}{3} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{9}$

03. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ উপবৃত্তটি X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে A, B, C ও D বিন্দুতে ছেদ করে। ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত একক? [SUST. 17-18]

A. 9 B. 16 C. 24 D. 25 E. 36

[S@Why] ABCD চতুর্ভুজটি একটি রম্বস হবে।
উপবৃত্তের অক্ষগুলো রম্বসের কর্ণ হবে।

$\therefore$ উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষ $= 2.4 = 8$ এবং ক্ষুদ্র অক্ষ $= 2.3 = 6$

$\therefore$ রম্বসের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল $= \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$

04. $x^2 + 4xy + 4y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$ কীসের সমীকরণ? [SUST. 17-18]

A. যুগল সরলরেখা B. বৃত্ত C. উপবৃত্ত D. পরাবৃত্ত E. অধিবৃত্ত

[S@Why] $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $a = 1, h = 2, b = 4 \therefore h^2 - ab = 2^2 - 1.4 = 0$
 $\therefore$ সমীকরণটি পরাবৃত্ত।

05. $3y + 7 = 0$ সরলরেখাটি $3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0$ কণিকের কিসের সমীকরণ নির্দেশ করে? [SUST. 17-18]

A. উপকেন্দ্রিক লম্বের B. স্পর্শকের C. অভিলম্বের D. অক্ষরেখা E. নিয়ামকের

[S@Why] $3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0$
 $\Rightarrow (\sqrt{3}x)^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{3}x + (\sqrt{3})^2 = 4y + 5 + (\sqrt{3})^2$
 $\Rightarrow (\sqrt{3}x + \sqrt{3})^2 = 4(y + 2)$
 $\Rightarrow 3(x + 1)^2 = 4(y + 2) \Rightarrow (x + 1)^2 = \frac{4}{3}(y + 2)$

নিয়ামকের সমীকরণ $Y = -a, y + 2 = -\frac{1}{3} \Rightarrow 3y + 6 = -1 \Rightarrow 3y + 7 = 0$

06. $4(x - 2)^2 + 5(y - 3)^2 = 20$ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত একক? [SUST. 16-17]

A. $2\sqrt{5}\pi$ B. $5\sqrt{2}\pi$ C. 20π D. 10π E. 9π

[S@Why] প্রদত্ত উপবৃত্তের সমীকরণ, $4(x - 2)^2 + 5(y - 3)^2 = 20$
বা, $\frac{(x - 2)^2}{5} + \frac{(y - 3)^2}{4} = 1 \therefore$ ক্ষেত্রফল $= \pi \cdot \sqrt{5} \cdot 2 = 2\sqrt{5}\pi$ বর্গ একক

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু হবে- [MBSTU-A. 19-20]

A. $(1, 2)$ B. $(2, 1)$ C. $(2, -1)$ D. $(-2, 1)$

[S@Why] $y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$
 $\Rightarrow y^2 - 2y + 1 = 4x - 9 + 1 \Rightarrow (y - 1)^2 = 4x - 8$
 $\Rightarrow (y - 1)^2 = 4(x - 2) \therefore$ শীর্ষবিন্দু $(X, Y) = (0, 0)$
 $\Rightarrow (x - 2, y - 1) = (0, 0) \Rightarrow (x, y) = (2, 1)$

02. e যদি $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা হয়, যেখানে $a > b$, তবে নিচের কোনটি সত্য? [MBSTU-A. 19-20]

A. $a^2(e^2 - 1) = b^2$ B. $b^2(1 - e^2) = a^2$ C. $b^2(e^2 - 1) = a^2$ D. $b^2 = a^2(1 - e^2)$

[S@Why] $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা $= e$ এবং $a > b$
 $\therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \Rightarrow e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \Rightarrow e^2 a^2 = a^2 - b^2$
 $\Rightarrow a^2 - e^2 a^2 = b^2 \Rightarrow b^2 = a^2(1 - e^2)$

03. $x = 3\tan\theta; y = 2\sec\theta$ অধিবৃত্তের কার্ভেসীয় সমীকরণ হবে- [MBSTU-C. 19-20]

A. $x^2 - y^2 = 1$ B. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ D. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$

[S@Why] $x = 3\tan\theta; y = 2\sec\theta$
 $\Rightarrow \tan\theta = \frac{x}{3} \dots\dots\dots(i)$
 $\Rightarrow \sec\theta = \frac{y}{2} \dots\dots\dots(ii)$


$(i)^2 - (ii)^2 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = \tan^2\theta - \sec^2\theta = -(\sec^2\theta - \tan^2\theta)$
 $\Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = -1 \Rightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$

18. $y^2 = 4px$ পরাবৃত্তটি (3, -2) বিন্দু দিয়ে গমন করলে এর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 A. $\frac{1}{3}; (0,0)$ B. $\frac{4}{3}; (0,0)$ C. $\frac{4}{3}; (\frac{1}{3}, 0)$ D. $\frac{4}{3}; (0, \frac{1}{3})$
19. পরাবৃত্তের সমীকরণ কর যার উপকেন্দ্র (0, -4) এবং দিকাক্ষ $y-4=0$
 A. $x^2 = 16y$ B. $y^2 = 16x$ C. $x^2 + 10x = 0$ D. $x^2 + 16y = 0$
20. একটি অধিবৃত্তের অক্ষ দুইটি স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটি বরাবর। অধিবৃত্তটি (-2, 1) এবং (-3, -2) বিন্দুগামী হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 A. $3x^2 - 5y^2 = 7$ B. $5x^2 - 3y^2 = 7$
 C. $3y^2 - 5x^2 = 7$ D. $5y^2 - 3x^2 = 7$
21. $x^2 - 8y^2 = 2$ অধিবৃত্তের দিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 A. $2x = \pm 3$ B. $4\sqrt{2}y = \pm 3$ C. $3y = \pm\sqrt{2}$ D. $3x = \pm 4$
22. $(y + \sqrt{3})^2 = 8(x + 3)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি?
 A. $(2, -\frac{\pi}{3})$ B. $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$ C. $(2, \frac{4\pi}{3})$ D. $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$
23. $x^2 + 4x + 2y = 0$ এর উপকেন্দ্রিক লম্ব অনুভূমিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করবে?
 A. 0° B. 180° C. 60° D. 90°
24. $3y + 7 = 0$ সরলরেখাটি $3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0$ কনিকের কিসের সমীকরণ নির্দেশ করে?
 A. উপকেন্দ্রিক লম্বের B. স্পর্শকের C. অভিলম্বের D. নিয়ামকের
25. $4(x-2)^2 + 5(y-3)^2 = 20$ বক্ররেখা ঘারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত একক?
 A. $2\sqrt{5}\pi$ B. $5\sqrt{2}\pi$ C. 20π D. 10π


OMR SHEET

01. A B C D E	09. A B C D E	17. A B C D E
02. A B C D E	10. A B C D E	18. A B C D E
03. A B C D E	11. A B C D E	19. A B C D E
04. A B C D E	12. A B C D E	20. A B C D E
05. A B C D E	13. A B C D E	21. A B C D E
06. A B C D E	14. A B C D E	22. A B C D E
07. A B C D E	15. A B C D E	23. A B C D E
08. A B C D E	16. A B C D E	24. A B C D E
		25. A B C D E

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	B	$4x^2 - 9y^2 - 16x + 18y - 29 = 0$ $\Rightarrow 4(x^2 - 4x + 4) - 9(y^2 - 2y + 1) = 36$ $\Rightarrow \frac{(x-2)^2}{3^2} - \frac{(y-1)^2}{2^2} = 1$ $\therefore$ অসীমতটদ্বয়: $(y-1) = \pm \frac{2}{3}(x-2) \Rightarrow 3(y-1) = \pm(x-2)$ (+) নিয়ে, $3y-3 = 2x-4 \therefore 2x-3y-1=0$ (-) নিয়ে, $3y-3 = -2x+4 \therefore 2x+3y-7=0$
02	B	উপকেন্দ্রিক লম্ব = $\frac{2b^2}{a}$ ও বৃহৎ অক্ষ = $2a$ $\frac{2b^2}{a} = \frac{2a}{2} \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2} \therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
03	B	$y = -(x-1)^2$ এর x অক্ষের ছেদবিন্দু $\equiv (1, 0)$ ও y অক্ষের ছেদবিন্দু $\equiv (0, -1)$ । 

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
04	D	$y^2 = 9x \therefore y = 12$ হলে, $x = 16$ $\therefore$ উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= a + x = \frac{9}{4} + 16 = 18\frac{1}{4}$
05	C	$\frac{a}{e} - ae = 16 \Rightarrow a(\frac{5}{3} - \frac{3}{5}) = 16$ $\Rightarrow a = 15; b^2 = a^2(1 - e^2) = 144 \therefore$ লম্ব $= \frac{2b^2}{a} = 19.2$
06	D	$3x^2 + 4y^2 = 12 \Rightarrow 3x^2 + 4(2x+c)^2 = 12$ $\Rightarrow 3x^2 + 4(4x^2 + 4cx + c^2) = 12$ $\Rightarrow 19x^2 + 16cx + 4c^2 - 12 = 0$; এখানে নিশ্চায়ক = 0 হবে। $\therefore D = (16c)^2 - 4 \cdot 19 \cdot (4c^2 - 12) = 0 \Rightarrow 256c^2 - 304c^2 + 912 = 0$ $\Rightarrow 64c^2 - 76c^2 + 228 = 0 \Rightarrow c^2 = 19 \Rightarrow c = \sqrt{19}$
07	C	শর্তমতে, $c = \frac{a}{m}$ $\left \begin{matrix} c=2 \\ m=2 \end{matrix} \right.$ $\Rightarrow a = cm = 2 \times 2 = 4$ $\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য $= 4 \times a = 4 \times 4 = 16$
08	B	ধরি $y = mx + c$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ এর স্পর্শক। $\therefore m^2x^2 + 2mcx + 4ax + c^2 = 0 \dots\dots\dots (i)$ স্পর্শকের জন্য স্পর্শবিন্দু একটি তাই (i) এর মূলও একটি। $(2mc - 4a)^2 - 4m^2c^2 = 0 \Rightarrow m^2c^2 + 4a^2 - 4acm - m^2c^2 = 0$ $\Rightarrow a^2 = acm \Rightarrow m = \frac{a}{c} \therefore$ স্পর্শকারী সরলরেখা: $y = mx + \frac{a}{m}$
09	B	$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1 \dots (i); 2x^2 + 2y^2 + 12x - 16y - 13 = 0$ $\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x - 8y - \frac{13}{2} = 0 \dots (ii)$ (ii) নং বৃত্তের কেন্দ্র $C \equiv (-3, 4)$ (i) নং উপবৃত্তের ফোকাস বিন্দুদ্বয় $A = (0.5 \times \frac{25-16}{25}) \equiv (0, 3)$ এবং $B \equiv (0.5 \times \frac{25-16}{25}) = (0, -3)$ $\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \times 3(3+3) - 9 \therefore$ ক্ষেত্রফল = 9
10	D	$b = 5, \frac{b}{e} = \frac{25}{3}$; By solving, $e = \frac{3}{5} \therefore \sqrt{1 - \frac{a^2}{25}} = \frac{3}{5} \Rightarrow a = 4$ $\therefore \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} \Rightarrow 25x^2 + 16y^2 = 400$
11	B	উপবৃত্তটি, $\frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 1 \therefore e = \sqrt{\frac{6^2 - 5^2}{6^2}} = \frac{\sqrt{11}}{6}$ $8x^2 + 9y^2 = 162$
12	B	$\Rightarrow \frac{x^2}{\frac{162}{8}} + \frac{y^2}{\frac{162}{9}} = 1 \therefore e = \sqrt{\frac{\frac{162}{8} - \frac{162}{9}}{\frac{162}{8}}}; e = \sqrt{\frac{\frac{1}{8} - \frac{1}{9}}{\frac{1}{8}}} = \frac{1}{3}$
13	B	$y^2 = 4(-a)x$; দিকাক্ষ $x = -(-a)$ or, $x = a$ or, $x - a = 0$
14	A	$y = (\frac{x}{2})^2 = \frac{1}{4}x^2 \Rightarrow x^2 = 4y \Rightarrow x^2 = 4 \cdot 1 \cdot y (a = 1)$ উপকেন্দ্র, $(0, a) \equiv (0, 1)$
15	C	$t = \frac{y}{2a}; x = a \cdot \frac{y^2}{4a^2} \Rightarrow y^2 = 4ax \rightarrow$ পরাবৃত্ত

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা	গণিত
16	C	 $y^2 = 4x \Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = 4$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2}{y}$ ঢাল = ∞ মূলবিন্দুতে ঢাল, $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{0} = \infty$	
17	C	প্রশ্নমতে, সমীকরণ: $(x-0)^2 = 4a(y-2)$ (2, 5) বিন্দুগামী $\therefore (2-0)^2 = 4a(5-2) \Rightarrow 4a = \frac{4}{3}$ অর্থাৎ সমীকরণ: $x^2 = \frac{4}{3}(y-2) \Rightarrow 3x^2 = 4(y-2)$	
18	C	$y^2 = 4px \Rightarrow (-2)^2 = 12p \Rightarrow p = \frac{1}{3}$ $\therefore y^2 = \frac{4}{3}x$ $\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্ব = $\frac{4}{3}$ $\therefore$ উপকেন্দ্র $(\frac{1}{3}, 0)$	
19	D	$x^2 + (y+4)^2 = (y-4)^2$ $\Rightarrow x^2 + (y+4)^2 - (y-4)^2 = 0 \Rightarrow x^2 + 16y = 0$ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(-2, 1) \Rightarrow \frac{4}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1$ ----- (i) $(-3, -2) \Rightarrow \frac{9}{a^2} - \frac{4}{b^2} = 1$ ----- (ii) Solving (i) এবং (ii) $a^2 = \frac{7}{3}$; $b^2 = \frac{7}{5}$ $\therefore \frac{3x^2}{7} - \frac{5y^2}{7} = 1 \Rightarrow 3x^2 - 5y^2 = 7$	
20	A		
21	D	$x^2 - 8y^2 = 2 \Rightarrow \frac{x^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{y^2}{(1/2)^2} = 1 \Rightarrow e = \sqrt{1 + \frac{1}{8}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}$ দিকাক্ষের সমীকরণ $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}}{3} = \pm \frac{4}{3} \therefore 3x = \pm 4$	
22	C	$(y + \sqrt{3})^2 = 8(x + 3) \Rightarrow (y + \sqrt{3})^2 = 4 \cdot 2(x + 3)$ উপকেন্দ্র (X, Y) = (a, 0) $\therefore x + 3 = 2 \Rightarrow x = -1$ $y + \sqrt{3} = 0 \Rightarrow y = -\sqrt{3}$ $\therefore (x, y) = (-1, -\sqrt{3})$ $\therefore$ উপকেন্দ্র $\equiv (-1, -\sqrt{3}) \equiv (\sqrt{1^2 + 3}, \pi + \tan^{-1} \sqrt{3}) \equiv (2, \frac{4\pi}{3})$	
23	A	$x^2 + 4x + 2y = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 4 = -2y + 4$ $\Rightarrow (x+2)^2 = -2(y-2) = 4(-\frac{1}{2})(y-2)$ $\therefore$ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ $Y = a$ $y - 2 = -\frac{1}{2}$; $y = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} \Rightarrow 2y = 3$ $2y = 3$ রেখাটির ঢাল $\tan \theta = 0$ $\therefore$ রেখাটি আনুভূমিকের সাথে $\theta = \tan^{-1} 0 = 0^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে। $3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0$ $\Rightarrow (\sqrt{3}x)^2 + 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}x + (\sqrt{3})^2 = 4y + 5 + (\sqrt{3})^2$ $\Rightarrow (x+1)^2 = \frac{4}{3}(y+2)$	
24	D	নিয়ামকের সমীকরণ $Y = -a, y + 2 = -\frac{1}{3}$ $\Rightarrow 3y + 6 = -1 \Rightarrow 3y + 7 = 0$ প্রদত্ত উপবৃত্তের সমীকরণ, $4(x-2)^2 + 5(y-3)^2 = 20$ বা, $\frac{(x-2)^2}{5} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$ $\therefore$ ক্ষেত্রফল = $\pi \cdot \sqrt{5} \cdot 2 = 2\sqrt{5}\pi$ বর্গ একক	
25	A		

অধ্যায়
০৭
দ্বিতীয় পত্র

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন

প্রথম অংশ

STEP 01 SUGGESTION	এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।
---------------------------	---

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের সূত্রাবলী সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ	**
02	বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের রূপান্তর করে মান নির্ণয় সংক্রান্ত	***
03	বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের প্রমাণ সংক্রান্ত সমস্যা	*

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের প্রাথমিক তথ্য

⇒ $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta, \sec\theta, \operatorname{cosec}\theta, \cot\theta$ এগুলো বৃত্তীয় ফাংশন।

$\Rightarrow \sin^{-1}x, \cos^{-1}x, \tan^{-1}x, \sec^{-1}x, \operatorname{cosec}^{-1}x, \cot^{-1}x$ এগুলো বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন।

TOPIC 01 বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের সূত্রাবলী সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ

Technique: বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

প্রয়োজনীয় সূত্র		শর্ত
1.	$\sin^{-1}x \pm \sin^{-1}y = \sin^{-1} \left\{ x\sqrt{1-y^2} \pm y\sqrt{1-x^2} \right\}$	$xy \leq 1$
2.	$\cos^{-1}x \pm \cos^{-1}y = \cos^{-1} \{ xy \pm \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} \}$	$xy \leq 1$
3.	$\tan^{-1}x \pm \tan^{-1}y = \tan^{-1} \frac{x \pm y}{1 \pm xy}$	$xy \leq 1$
4.	$\tan^{-1}x + \tan^{-1}y + \tan^{-1}z = \tan^{-1} \frac{x+y+z-xyz}{1-yz-zx-xy}$	$yz+zx+xy \leq 1$
5.	$2\tan^{-1}x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$	
6.	$\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \sin^{-1}x + \sec^{-1} \frac{1}{x}$ $= \operatorname{cosec}^{-1} \frac{1}{x} + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$	
7.	$\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \tan^{-1}x + \tan^{-1} \frac{1}{x}$ $= \cot^{-1} \frac{1}{x} + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$	
8.	$\sec^{-1}x + \operatorname{cosec}^{-1}x = \frac{\pi}{2}$	
9.	$2\tan^{-1}x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$	
10.	$2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(2x^2-1)$	
11.	$2\sin^{-1}x = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$	
12.	$3\tan^{-1}x = \tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$	

	প্রয়োজনীয় সূত্র	শর্ত
13.	$3\cos^{-1}x = \cos^{-1}(4x^3 - 3x)$	
14.	$3\sin^{-1}x = \sin^{-1}(3x - 4x^3)$	

Note: উপরোক্ত সূত্রে মুখ্যমান ব্যবহার করে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে যদি শর্ত মেনে চলা হয়। বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী মনে রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সবশেষে কোণের মান বের করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মানের সীমা ও শর্তাবলী খেয়াল রাখতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{\pi}{2}$ হলে কোনটি সঠিক? [DU. 17-18;

KU. 17-18; IU. 14-15, 07-08, 04-05; RU. 12-13, 06-07; CoU. 18-19; BUET. 10-11]

Solve $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin^{-1}x = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}y$

$$\Rightarrow x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}y\right) = \cos(\sin^{-1}y)$$

$$\Rightarrow x = \cos\cos^{-1}\sqrt{1-y^2}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{1-y^2} \Rightarrow x^2 = 1-y^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 1 \text{ Ans.}$$

MEx 02 $\tan(\tan^{-1}3 - \tan^{-1}2)$ এর মান হবে কোনটি? [JU-D. 19-20]

Solve $\tan(\tan^{-1}3 - \tan^{-1}2) = \tan \tan^{-1} \frac{3-2}{1+3 \cdot 2} = \frac{1}{7}$

TOPIC 02 বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের রূপান্তর করে মান নির্ণয় সংক্রান্ত

Technique:01 বিপরীত বৃত্তীয় ত্রিকোণমিতিক ফাংশনবিশিষ্ট সংযোজিত রাশির মান বের করতে হলে যদি দেখা যায় যে কোন problem-এ প্রথমে ও শেষে যথাক্রমে $\sin$ ও $\cos^{-1}$ অথবা $\cos$ ও $\sin^{-1}$ থাকে, এবং তারপর ভিতরে যথাক্রমে $\cot^{-1}$ ও $\tan$ অথবা $\tan^{-1}$ ও $\cot$ থাকে, তাহলে শেষে যে রাশিটি থাকবে, তাই উত্তর হবে।

অনুরূপভাবে, যদি কোন problem-এ প্রথমে এবং শেষে যথাক্রমে $\tan$ ও $\cot^{-1}$ অথবা $\cot$ ও $\tan^{-1}$ থাকে, এবং তারপর ভিতরে যথাক্রমে $\sin^{-1}$ ও $\cos$ অথবা $\cos^{-1}$ ও $\sin$ থাকে, তাহলে শেষে যে রাশিটি থাকবে, তাই উত্তর হবে।

- (i) $\sin \cot^{-1} \tan \cos^{-1}x$ এর মান- **Ans.** x
(ii) $\cos \tan^{-1} \cot \sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$ এর মান- **Ans.** $\sqrt{1-x^2}$
(iii) $\tan \sin^{-1} \cos \cot^{-1}\sqrt{x}$ এর মান- **Ans.** $\sqrt{x}$
(iv) $\cot \cos^{-1} \sin \tan^{-1}\frac{1}{x}$ এর মান- **Ans.** $\frac{1}{x}$

Technique:02 পাশাপাশি দুইটা ফাংশন গুণ আকারে থাকলে, শেষ ফাংশনটাকে আগের ফাংশনে convert করতে হবে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\operatorname{sincot}^{-1} \operatorname{tancos}^{-1}x = ?$ [RU. 17-18, 15-16, 12-13, 09-10, 08-09, 06-07; KU. 14-15; JnU. 14-15; CU. 12-13, 04-05]

Solve $\operatorname{sincot}^{-1} \operatorname{tancos}^{-1}x = x$

MEx 02 $\operatorname{costan}^{-1} \operatorname{cotsin}^{-1}x = ?$ [RU. 15-16, 12-13, 09-10; DU. 11-12; JU. 09-10; BU. 14-15; KUET. 13-14]

Solve $\operatorname{costan}^{-1} \operatorname{cotsin}^{-1}x = x$

TOPIC 03 বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের প্রমাণ সংক্রান্ত সমস্যা

Technique: এক্ষেত্রে যা চাওয়া হয়েছে তার সাথে মিল রেখে সমাধান করে এগিয়ে যেতে হবে। কোনো সমস্যা সমাধানের একাধিক পদ্ধতি থাকতে পারে। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বেছে করাই উত্তম।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 যদি $x = \operatorname{sincos}^{-1}y$ হয়, তবে $x^2 + y^2$ এর মান কত? [IU. 16-17 BUET. 11-12]

Solve $x = \sin \cos^{-1}y = \sin\left(\sin^{-1}\left(\pm \frac{\sqrt{1-y^2}}{1}\right)\right) = \pm \sqrt{1-y^2}$
 $\Rightarrow x^2 = 1 - y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নাল তথ্যসংগ্রহ সমাধান

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $\sin^{-1}x = \theta$ হয়, তবে $\cos\theta$ -এর মান কত? [JnU. 13-14; JU. 09-10]

- A. $1-x^2$ B. $\sqrt{1-x^2}$ C. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ D. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

SC Why $\sin^{-1}x = \theta \Rightarrow x = \sin\theta$

$$\therefore \cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{1 - x^2}$$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $2\sin^{-1}x = \sin^{-1}y$ সমীকরণে $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে y এর মান কত? [KU. 19-20]

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

SC Why $2\sin^{-1}x = \sin^{-1}y$

$$\Rightarrow 2\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sin^{-1}y \quad \because x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{\pi}{3} = \sin^{-1}y \Rightarrow y = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin(120) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

02. $\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{8}$ এর মান কত? [KU. 16-17; IU. 12-13]

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

SC Why $\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{8}$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

03. $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x$ এবং $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x$ এর মান যথাক্রমে- [KU. 16-17]

- A. $\pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$
D. $-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ E. $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}$

SC Why $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ এবং $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

04. $\sin^{-1}(-\cos x) + \sin^{-1}(\cos 3x)$ এর মান কত?

- A. $2x$ B. $-2x$ C. $\frac{x}{2}$ D. $-\frac{x}{2}$ [KU. 11-12]

[S@Why] $\sin^{-1}(-\cos x) + \sin^{-1}(\cos 3x)$
 $= -\sin^{-1}(\cos x) + \sin^{-1}(\cos 3x)$
 $= -\sin^{-1}\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin^{-1}\sin\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) = -\frac{\pi}{2} + x + \frac{\pi}{2} - 3x = -2x$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\sec^2(\tan^{-1} 2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1} 3)$ এর মান- [IU. 17-18; RU. 09-10, 08-09]

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

[S@Why] $\sec^2(\tan^{-1} 2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1} 3)$
 $= 1 + \tan^2(\tan^{-1} 2) + 1 + \cot^2(\cot^{-1} 3)$
 $= 1 + \{\tan(\tan^{-1} 2)\}^2 + 1 + \{\cot(\cot^{-1} 3)\}^2$
 $= 1 + 2^2 + 1 + 3^2 = 15$

02. যদি $x = \sin \cos^{-1} y$ হয়, তবে $x^2 + y^2$ এর মান কত? [IU. 16-17 BUET. 11-12]

- A. 2 B. 1 C. -1 D. -2

[S@Why] $x = \sin \cos^{-1} y = \sin\{\sin^{-1}(\pm \sqrt{1-y^2})\} = \pm \sqrt{1-y^2}$
 $\Rightarrow x^2 = 1 - y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$

03. $\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^{-1} \frac{1+x^2}{2x} = ?$ [IU. 14-15]

- A. $\cot^{-1} x$ B. $\tan^{-1} x$ C. $\sin^{-1} 2x$ D. $\cot^{-1} 2x$

[S@Why] $\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^{-1} \frac{1+x^2}{2x} = \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \frac{1}{2} \cdot 2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} x$

04. $\tan \cos^{-1} x - \sin \cot^{-1} \frac{1}{2} = 0$ হলে এর মান নিচের কোনটি? [IU. 11-12, 08-09]

- A. $\sqrt{5}/2$ B. $\sqrt{5}/3$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{5}/4$

[S@Why] $\tan \cos^{-1} x - \sin \cot^{-1} \frac{1}{2} = 0$

$= \tan \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \sin \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} = 0 = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \frac{2}{\sqrt{5}} = 0$

$\Rightarrow \frac{1-x^2}{x^2} = \frac{4}{5} \Rightarrow 5 - 5x^2 = 4x^2$

$\Rightarrow 9x^2 = 5 \therefore x = \frac{\sqrt{5}}{3}$


PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $x = \sqrt{2}$ হয়, তবে $\cos \sin^{-1} \tan \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ এর মান কত? [SUST-B: 19-20; IU: 16-17]

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ B. 0 C. $\sqrt{2}$ D. 1 E. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

[S@Why] $\cos \sin^{-1} \tan \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
 $= \cos \sin^{-1} \tan \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} [\because x = \sqrt{2}]$
 $= \cos \sin^{-1} \tan \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $= \cos \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$



02. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) = ?$ [SUST. 17-18]

- A. $\tan^{-1} \left(\frac{x}{y + \sqrt{y^2 - x^2}} \right)$ B. $\tan^{-1} \left(\frac{y}{x + \sqrt{y^2 - x^2}} \right)$
C. $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{y-x}{y+x}} \right)$ D. $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{y+x}{y-x}} \right)$
E. $2 \tan^{-1} \left(\frac{x}{y + \sqrt{y^2 - x^2}} \right)$

[S@Why] ধরি, $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) = \theta \Rightarrow \frac{x}{y} = \sin 2\theta$
এখন, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{2 \cos^2 \theta}$ [লব ও হরকে $2 \cos \theta$ দ্বারা গুণ করে]
 $= \frac{\sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta} = \frac{\sin 2\theta}{1 + \sqrt{1 - \sin^2 2\theta}}$
 $= \frac{\frac{x}{y}}{1 + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} = \frac{\frac{x}{y}}{1 + \sqrt{\frac{y^2 - x^2}{y^2}}} = \frac{x}{y + \sqrt{y^2 - x^2}} \therefore \theta = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y + \sqrt{y^2 - x^2}} \right)$

03. $y = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}} \right]$ এর সঠিক সম্বন্ধিত্ত্ব রূপ কোনটি? [SUST. 16-17]

- A. $x = 2y$ B. $x = 4y$ C. $x + 4y = 0$ D. $x - y = 0$

[S@Why] $y = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}} \right]$
 $= \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[\frac{2 \sin \frac{x}{2}}{2 \cos \frac{x}{2}} \right] = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[\tan \frac{x}{2} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2} = \frac{x}{4} \therefore x = 4y$

04. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} + \cot^{-1} x$ এর মান কত? [SUST. 14-15; JUST. 18-19]

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{\pi}{2}$ C. $\pm \frac{\pi}{2}$ D. 0

[S@Sol] $\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} + \cot^{-1} x = \frac{1}{2} \cdot 2 \tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$

05. $y = 2 \cos^{-1} x$ এবং $y = 2 \sin^{-1} x$ বক্ররেখাগুলোর ছেদবিন্দু কোনটি? [SUST. 14-15]

- A. $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{4}\right)$ B. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{6}\right)$ C. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{3}\right)$ D. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{2}\right)$

[S@Why] $y = 2 \cos^{-1} x = 2 \sin^{-1} x \therefore \cos^{-1} x = \sin^{-1} x$
 $\Rightarrow \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} x = \sin^{-1} x \therefore 2 \sin^{-1} x = \frac{\pi}{2} \therefore x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ এবং $y = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

06. $\operatorname{cosec}^{-1}(5/4) + \sec^{-1}(5/4)$ এর মান কত? [SUST. 12-13]

- A. $-\pi/4$ B. $-\pi/2$ C. 0 D. $\pi/4$ E. $\pi/2$



[S@Why] $\operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{5}{4} \right) + \sec^{-1} \left(\frac{5}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$

দ্বিতীয় অংশ

07. $(\cot^{-1}3 + \operatorname{cosec}^{-1}\sqrt{5}) =$ কত?

- A. π B. 2π C. $\pi/3$
D. $\pi/4$ E. $\pi/6$

[SUST. 11-12]

[S@Why] $\cot^{-1}3 + \operatorname{cosec}^{-1}\sqrt{5}$ 

$$= \tan^{-1}\frac{1}{3} + \tan^{-1}\frac{1}{2}$$

$$= \tan^{-1}\frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \tan^{-1}1 = \frac{\pi}{4} \text{ (Ans.)}$$

08. $\sin \cot^{-1} \tan \cos^{-1}(2x^2) = 1$, x এর মান কত?

[SUST. 11-12]

- A. 1, 1 B. 2, 1/2 C. $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$
D. 2, -2 E. $-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}$

[S@Why] $\sin \cot^{-1} \tan \cos^{-1}(2x^2) = 1 \Rightarrow 2x^2 = 1 \therefore x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 09. যদি $\tan^{-1}2 + \tan^{-1}3 + \tan^{-1}4 = \theta$ হয়, $\tan \theta = ?$

[SUST. 08-09; NSTU: 19-20; PSTU: 19-20]

- A. 9 B. 7/2
C. 3/5 D. 4/5

[S@Why] $\tan^{-1}2 + \tan^{-1}3 + \tan^{-1}4 = \theta$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\frac{2+3+4-2 \cdot 3 \cdot 4}{1-2 \cdot 3-3 \cdot 4-4 \cdot 2} = \theta$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\frac{9-24}{1-6-12-8} = \theta \Rightarrow \tan^{-1}\frac{-15}{-25} = \theta$$

$$\therefore \tan \theta = \tan\left(\tan^{-1}\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{3}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{3} = ?$

[JUST-A. 19-20]

- A. $\sin^{-1}2$ B. $\tan^{-1}2$ C. $\cos^{-1}2$ D. $\sec^{-1}2$

[S@Why] $\cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{3}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{3}$

$$= \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{1}{3}$$

$$= \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{2 \cdot \frac{1}{3}}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}$$

$$= \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{3}{5}$$

$$= \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} = \tan^{-1}2$$

02. $\sin^2\left(\cos^{-1}\frac{1}{3}\right) - \cos^2\left(\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = ?$

[JUST. 18-19]

- A. 2/5 B. 2/9
C. 5/8 D. 3/7

[S@Why] $1 - \left\{\cos\left(\cos^{-1}\frac{1}{3}\right)\right\}^2 - 1 + \left\{\sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}^2$

$$= 1 - \frac{1}{9} - 1 + \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	সাধারণ সূত্রাবলী সংক্রান্ত সমস্যা	**
02	$a \cos \theta + b \sin \theta = c$ আকৃতির ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ	**
03	বর্গসূত্রের প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা	**
04	$\sin, \cos$ বিজোড় সংখ্যক সমীকরণ সংক্রান্ত সমস্যা	**
05	কতগুলো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত গুণ আকারে থাকলে	**
06	$\sin, \cos, \tan, \sec$ এর দ্বিঘাতরাশি সম্বলিত পদ থাকলে	*

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

□ প্রয়োজনীয় সূত্র:

01. $\sin \theta = \sin \alpha \Leftrightarrow \theta = n\pi + (-1)^n \alpha$ 02. $\cos \theta = \cos \alpha \Leftrightarrow \theta = 2n\pi \pm \alpha$

03. $\tan \theta = \tan \alpha \Leftrightarrow \theta = n\pi + \alpha$ 04. $\sin \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = n\pi$

05. $\cos \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ 06. $\tan \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = n\pi$

07. $\sin \theta = 1 \Leftrightarrow \theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$ 08. $\sin \theta = -1 \Leftrightarrow \theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}$

09. $\cos \theta = 1 \Leftrightarrow \theta = 2n\pi$ 10. $\cos \theta = -1 \Leftrightarrow \theta = (2n+1)\pi$

TOPIC 01 সাধারণ সূত্রাবলী সংক্রান্ত সমস্যা

MEx 01 n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান

কোনটি? [DU. 96-97; RU. 12-13; ব. বো. ২০১৯]

[Solve] $\sin 2\theta = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \therefore 2\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$
 $\Rightarrow \theta = \frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{12}$ here, $n \in \mathbb{Z}$ Ans.

TOPIC 02 $a \cos \theta + b \sin \theta = c$ আকৃতির ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ

[Technique] এ ধরনের অংকে উভয়পক্ষকে $\sqrt{a^2+b^2}$ দ্বারা ভাগ করে $\cos(A \pm B)$ এর সূত্র প্রয়োগ করাই উত্তম।

ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ: (সকল ক্ষেত্রে $n \in \mathbb{Z}$ হবে)

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEx 01 $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান- [DU. 11-12, 04-05; KU. 09-10; RU. 09-10, 08-09; JUST. 11-12; DU-প্রশ্ন: 19-20]

[Solve] উভয় পক্ষকে $\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\therefore \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta = 1$$

$$\text{বা, } \cos \frac{\pi}{3} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{3} \sin \theta = 1$$

$$\text{বা, } \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 1$$

$$\therefore \theta - \frac{\pi}{3} = 2n\pi \therefore \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{3}; n \in \mathbb{Z}$$

TOPIC 03 বর্গসূত্রের প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা

গণিত ২য় পত্র

Technique:

অবাস্তব মূল: ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ সমাধান করার সময় সমীকরণের উভয়পক্ষে বর্গ করলে প্রাপ্ত সমাধানের মূলগুলোর প্রত্যেকটি প্রদত্ত সমীকরণটি সিদ্ধ করে না। যে মূলগুলো সিদ্ধ করে না তাদেরকে অবাস্তব মূল বলে।

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEX 01 $2\cos 2\theta + 2\sqrt{2} \sin \theta = 3$ হলে θ এর মান- [JnU. 08-09; DU. 07-08; NSTU. 07-08; RU. 06-07; BUET. 08-09]

Solve $2\cos 2\theta + 2\sqrt{2} \sin \theta = 3$
এখানে θ এর পরিবর্তে $\frac{\theta}{2}$ বসানোর পর যেটি দ্বারা সিদ্ধ হবে সেটি হবে সঠিক উত্তর।
 $\theta = 45^\circ$ বসালে ডান পক্ষের সমান মান অর্থাৎ 3 পাওয়া যায়।

TOPIC 04 sin, cos বিজোড় সংখ্যক সমীকরণ সংক্রান্ত সমস্যা

Technique:

যখন সমীকরণে $\sin$ এবং $\cos$ কোণের বিজোড় সংখ্যক পদ থাকে তখন $\sin A \pm \sin B$, $\cos A \pm \cos B$ এর সূত্র ব্যবহার করলে সহজ হবে।

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEX 01 $\sin \theta + \sin 3\theta + \sin 2\theta = 1 + \cos 2\theta + \cos \theta$ [BUET. 08-09; RUET. 15-16; চ. বো. ২০০৮]

Solve $\sin \theta + \sin 3\theta + \sin 2\theta = 1 + \cos 2\theta + \cos \theta$
 $\Rightarrow 2\sin 2\theta \cos \theta + 2\sin \theta \cos \theta = 2\cos^2 \theta + \cos \theta$
 $\Rightarrow 2\sin \theta \cos \theta (2\cos \theta + 1) = \cos \theta (2\cos \theta + 1)$
 $\Rightarrow \cos \theta (2\sin \theta - 1)(2\cos \theta + 1) = 0$
 $\cos \theta = 0$ Or, $\sin \theta = \frac{1}{2}$ Or, $\cos \theta = -\frac{1}{2}$
 $\therefore \theta = \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$, $\theta = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$, $n \in \mathbb{Z}$

TOPIC 05 কতগুলো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত গুণ আকারে থাকলে

Technique:

[$\sin$ এবং $\cos$ গুণ আকারে থাকলে $\sin A \cdot \cos B$; $\cos A \cdot \sin B$; $\cos A \cdot \cos B$; $\sin A \cdot \sin B$; এর সূত্রগুলো ব্যবহার করলে সহজ হবে।]

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEX 01 $4 \cos x \cos 2x \cos 3x = 1$; $0 < x < \pi$ [CUET. 08-09; KUET. 6-7; ঢা. বো. ২০০৭; রা. বো. ২০১৫, ১২, ০৯; দি. বো. ২০১৬, ১৪, ১১; চ. বো. ২০০১৪, ০৬; ব. বো. ২০১৬; কু. বো. ২০১২; সি. বো. ২০১১, ৮; মাদ্রাসা বো. ২০১৪]

Solve $4 \cos x \cos 2x \cos 3x = 1$
 $\Rightarrow 2\cos 2x (\cos 4x + \cos 2x) = 1$
 $\Rightarrow 2\cos 2x \cos 4x + 2\cos^2 2x - 1 = 0$
 $\Rightarrow 2\cos 2x \cos 4x + \cos 4x = 0$
 $\Rightarrow \cos 4x (2\cos 2x + 1) = 0$
So, $\cos 4x = 0 \Rightarrow 4x = (2n+1)\frac{\pi}{2} \therefore x = (2n+1)\frac{\pi}{8}$
অথবা, $2\cos 2x + 1 = 0$
 $\Rightarrow \cos 2x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$
 $\therefore 2x = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$
 $x = n\pi \pm \frac{\pi}{3} \therefore x = \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{8}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}$

TOPIC 06 sin, cos, tan, sec এর দ্বিঘাতরাশি সম্বলিত পদ থাকলে

Technique:

এক্ষেত্রে পূর্ণ বর্গ রাশি বানাতে হবে অথবা দ্বিঘাত রাশির ন্যায় সমাধান করতে হবে।

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEX 01 $\sin^2 \theta - 3\cos^2 \theta = 0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান- [DU. 10-11]

Solve $\sin^2 \theta - 3\cos^2 \theta = 0 \Rightarrow 4\sin^2 \theta \cos^2 \theta - 3\cos^2 \theta = 0$
 $\Rightarrow \cos^2 \theta (4\sin^2 \theta - 3) = 0$; but, $\cos^2 \theta \neq 0 \therefore 4\sin^2 \theta - 3 = 0$
 $\Rightarrow 4\sin^2 \theta - 3\sin^2 \theta - 3\cos^2 \theta = 0$
 $\sin^2 \theta - 3\cos^2 \theta = 0 \Rightarrow \tan^2 \theta - 3 = 0$
 $\therefore \tan \theta = \pm \sqrt{3} = \tan \left(\pm \frac{\pi}{3} \right) \therefore \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যামালাল ভ্যাসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. যদি $\tan \left(\sin^{-1} \sqrt{1-x^2} \right) = \sin \left(\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$ হয় তাহলে $x = ?$ [GST-A. 2022-2023]

A. $\pm \frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

S@Why $\tan \left(\sin^{-1} \sqrt{1-x^2} \right) = \sin \left(\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$

$\Rightarrow \tan \left(\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right) = \sin \left(\sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$

$\Rightarrow \tan \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \sin \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \frac{1-x^2}{x^2} = \frac{4}{5}$

$\Rightarrow 5 - 5x^2 = 4x^2 \Rightarrow 9x^2 = 5 \therefore x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$

02. যদি $\sec^{-1} 3 = \tan^{-1} x$ হয়, তবে x এর মান কত? [GST-C. 20-21]

A. 3 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

S@Sol $\tan^{-1} x = \sec^{-1} 3 = \tan^{-1} \sqrt{3^2 - 1} \therefore x = 2\sqrt{2}$

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

01. n একটি পূর্ণ সংখ্যা হলে $\cos \theta = 0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান- [JnU. 17-18; BUTex. 09-10]

A. $\theta = 2n\pi$ B. $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$

C. $\theta = n\pi + (-1)^n \alpha$ D. $\theta = n\pi$

S@Why As a formula.

02. n একটি পূর্ণ সংখ্যা হলে $\sin \theta = 0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান- [JnU. 17-18]

A. $\theta = n\pi$ B. $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ C. $\theta = 2n\pi$ D. $\theta = 2n\pi \pm \alpha$

S@Why As a formula.

03. $2(\cos x + \sec x) = 5$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান- [JnU. 15-16; DU. 06-07]

A. $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ B. $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ C. $2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ D. $n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

S@Why $2\cos x + \frac{2}{\cos x} = 5$ বা, $2\cos^2 x - 5\cos x + 2 = 0$

বা, $(\cos x - 2)(2\cos x - 1) = 0$ বা, $\cos x = \frac{1}{2}$ [$\therefore \cos x - 2 \neq 0$]

বা, $\cos x = \cos \frac{\pi}{3} \therefore x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

04. $\cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি?

[JnU. 12-13]

- A. $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ B. $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ C. $2n\pi \pm \frac{\pi}{8}$ D. $n\pi \pm \frac{\pi}{8}$

[S@Why] $\cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4} \Rightarrow 2\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4} \Rightarrow \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{8}$

05. $2\cos 2\theta + 2\sqrt{2} \sin \theta = 3$ হলে θ এর মান-

[JnU. 08-09; DU. 07-08; NSTU. 07-08; RU. 06-07; BUET. 08-09]

- A. $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ B. $n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ C. $2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ D. $n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

[S@Why] $2\cos 2\theta + 2\sqrt{2} \sin \theta = 3$

এখানে θ এর পরিবর্তে অপশনের মান বসানোর পর যেটি দ্বারা সিদ্ধ হবে সেটি হবে সঠিক উত্তর।

$\theta = 45^\circ$ বসালে ডান পক্ষের সমান মান অর্থাৎ 3 পাওয়া যায়।

06. $2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \sqrt{3}$ হলে θ এর মান-

[JnU. 09-10]

- A. $2n\pi \pm \pi/6$ B. $n\pi \pm \pi/6$ C. $2n\pi \pm \pi/12$ D. $n\pi \pm \pi/12$

[S@Why] $2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \sqrt{3}$

$$\Rightarrow 2\cos 2\theta = \sqrt{3} \Rightarrow \cos 2\theta = \sqrt{3}/2 = \cos \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow 2\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{6} \therefore \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{12}$$

[খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়]

01. $\tan \theta + \tan 2\theta + \sqrt{3} \tan \theta \tan 2\theta = \sqrt{3}$ হলে θ এর মান কত? (যখন n এর মান শূন্য বা পূর্ণসংখ্যা)

[KU. 18-19; IU. 15-16 ব. বো. ২০০৯; য. বো. ২০০৬; রা. বো. ২০০৬; চ. বো. ২০১১, ০৯]

- A. $\frac{n}{3} + \frac{\pi}{7}$ B. $\frac{n\pi}{3} + \frac{\pi}{7}$ C. $\frac{n}{3} + \frac{\pi}{9}$ D. $\frac{n\pi}{3} + \frac{\pi}{9}$

[S@Why] $\tan \theta + \tan 2\theta + \sqrt{3} \tan \theta \tan 2\theta = \sqrt{3}$

$$\tan \theta + \tan 2\theta = \sqrt{3}(1 - \tan \theta \tan 2\theta)$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \theta + \tan 2\theta}{1 - \tan \theta \tan 2\theta} = \sqrt{3} \Rightarrow \tan(\theta + 2\theta) = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \tan 3\theta = \tan \frac{\pi}{3} \therefore 3\theta = n\pi + \frac{\pi}{3} \therefore \theta = \frac{n\pi}{3} + \frac{\pi}{9}$$

02. $\cos 2x + \sin x = 1$ সমীকরণটির সমাধান হবে-

[KU. 12-13]

- A. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$ B. $2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$
C. $(2n+1)\frac{2\pi}{3}$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] $\cos 2x + \sin x = 1 \Rightarrow 1 - 2\sin^2 x + \sin x = 1$

$$\Rightarrow -2\sin^2 x + \sin x = 0 \Rightarrow \sin x(1 - 2\sin x) = 0$$

$$\therefore \sin x = 0 \Rightarrow x = n\pi$$

$$\text{Or, } 1 - 2\sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$$

03. θ ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ হলে, $2\sin^2 \theta = 3\cos \theta$ সমীকরণের θ এর মান কত?

[KU. 12-13; RU. 09-10]

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

[S@Why] $2\sin^2 \theta = 3\cos \theta$

$$\Rightarrow 2(1 - \cos^2 \theta) = 3\cos \theta \Rightarrow 2 - 2\cos^2 \theta - 3\cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta + 3\cos \theta - 2 = 0 \Rightarrow 2\cos^2 \theta + 4\cos \theta - \cos \theta - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (2\cos \theta - 1)(\cos \theta + 2) = 0$$

যেহেতু, $\cos \theta + 2 = 0 \Rightarrow \cos \theta = -2$ প্রযোজ্য নয়।

$$\therefore 2\cos \theta - 1 = 0 \Rightarrow 2\cos \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \therefore \theta = 60^\circ$$

[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়]

01. $\cos \theta = -1$ হলে θ এর সাধারণ মান-

[IU-A. 19-20; BUTEX. 13-14; চ. বো. ২০১৭]

- A. $(2n+1)\pi$ B. $(4n+1)\frac{\pi}{2}$ C. $(4n+1)\pi$ D. $(2n+1)\frac{\pi}{2}$

[S@Why] $\cos \theta = -1$; $\theta = (2n+1)\pi$

02. $\sin \theta = -1$ হলে, θ এর সাধারণ মান-

[IU-D. 19-20; রা. বো. ২০১৬]

- A. $(4n+1)\frac{\pi}{2}$ B. $(4n-1)\frac{\pi}{2}$ C. $(2n+1)\frac{\pi}{2}$ D. $(2n-1)\frac{\pi}{2}$

[S@Why] $\sin \theta = -1$; $\theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}$

03. $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \sqrt{3}$, ($0 < \theta < 2\pi$) হলে θ এর মান- [IU. 16-17; DU. 14-15]

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

[S@Why] $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \sqrt{3}$

$$\Rightarrow 1 + \cos \theta = \sqrt{3} \sin \theta \Rightarrow \sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin \theta - \frac{1}{2} \cdot \cos \theta = \frac{1}{2} \quad [\text{উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\pi}{3} \cdot \sin \theta - \cos \frac{\pi}{3} \cdot \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \theta + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

04. $\sec^2 \frac{x}{2} = 2\sqrt{2} \tan \frac{x}{2}$ হলে x এর সাধারণ মান- [IU. 16-17; BUTEX. 05-06]

- A. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}$ B. $n\pi + \frac{\pi}{2}$
C. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{2}$ D. $n\pi + \frac{\pi}{4}$

[S@Why] $\sec^2 \frac{x}{2} - 2\sqrt{2} \tan \frac{x}{2} = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} - 2\sqrt{2} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = 0 \Rightarrow \frac{1 - 2\sqrt{2} \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \sqrt{2} \sin x}{\cos^2 \frac{x}{2}} = 0 \Rightarrow 1 - \sqrt{2} \sin x = 0 \Rightarrow \sqrt{2} \sin x = 1$$

$$\Rightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{4} \therefore x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4} [n \in \mathbb{Z}]$$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়]

01. $\sin x = -1$, $0 < x < 3\pi$ এর সমাধান সেট কোনটি?

[SUST. 15-16]

- A. $\left\{-\frac{\pi}{2}\right\}$ B. $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$
C. $\left\{-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$ D. $\left\{\frac{3\pi}{2}\right\}$

[S@Why] Option Test.

১. n পূর্ণ সংখ্যা হলে, $\sin\left\{n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}\right\}$ এর মান কত?

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ D. 1

[S@Why] $n = 0$ ধরে, $\sin\left\{n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}\right\} = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

২. $\tan 2x \tan x = 1$ সমীকরণে x এর কোন দুটি মানই সঠিক নয়? [SUST. 11-12; BU.Tex. 13-14; JU. 17-18; CU. 15-16; IU. 11-12, 08-09, RU. 09-10, 06-07; KU. 06-07; RUET. 13-14; BUET. 06-07; CUET. 13-14]

- A. $\frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ B. $\frac{13\pi}{6}, \frac{15\pi}{6}$ C. $\frac{8\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}$
D. $\frac{13\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ E. $\frac{19\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}$

[S@Why] $\tan 2x \cdot \tan x = 1$

$$\Rightarrow \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \cdot \tan x = 1 \Rightarrow 2 \tan^2 x = 1 - \tan^2 x \Rightarrow 3 \tan^2 x = 1$$

$$\therefore \tan x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan\left(\pm \frac{\pi}{6}\right) \quad x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

৩. $\cos \theta - \cos 7\theta = \sin 4\theta$ সমীকরণে θ এর মান-

- A. $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{3}$ B. $\frac{n\pi}{3} + \frac{\pi}{16}$
C. $\frac{n\pi}{3} + (-1)^n \frac{\pi}{18}$ D. $\frac{n\pi}{3} + (-1)^n \frac{\pi}{6}$

[S@Why] $\cos \theta - \cos 7\theta = \sin 4\theta$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{\theta + 7\theta}{2} \sin \frac{7\theta - \theta}{2} = \sin 4\theta \Rightarrow 2 \sin 4\theta = 1$$

$$\Rightarrow \sin 4\theta = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \therefore 4\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{n\pi}{4} + (-1)^n \frac{\pi}{24} \text{ here, } n \in \mathbb{Z}$$

৪. $\cos 3\theta = \cos 2\theta$ হলে $\theta = ?$

- A. $n\pi$ বা $2n\pi$ B. $\frac{2}{5}n\pi$ বা $2n\pi$
C. $(2n+1)\frac{\pi}{2}$ বা $n\pi$ D. $(4n+1)\frac{\pi}{2}$ বা $n\pi$

[S@Why] $\cos 3\theta = \cos 2\theta$

$$\Rightarrow \cos 2\theta - \cos 3\theta = 0$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{5\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} = 0$$

$$\therefore \frac{5\theta}{2} = 0 \Rightarrow \frac{5\theta}{2} = n\pi \Rightarrow \theta = \frac{2}{5}n\pi$$

$$\text{or, } \sin \frac{\theta}{2} = 0 \Rightarrow \frac{\theta}{2} = n\pi \therefore \theta = 2n\pi \text{ here, } n \in \mathbb{Z}$$

৫. সমাধান কর: $2 \sin x \sin 3x = 1$; যখন $0 < x < 2\pi$

- A. $x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ B. $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ C. $x = n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ D. $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

[S@Why] $2 \sin x \sin 3x = 1$

$$\Rightarrow \cos(x - 3x) - \cos(x + 3x) = 1 \Rightarrow \cos 2x - \cos 4x = 1$$

$$\Rightarrow \cos 2x = 1 + \cos 4x \Rightarrow \cos 2x = 2 \cos^2 2x \Rightarrow \cos 2x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos 2x = \cos \frac{\pi}{3} \Rightarrow 2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}; x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

৬. $\ln \sin \theta = 0, \cos \theta = ?$

- A. 1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[S@Why] $\ln \sin \theta = 0$

$$\text{বা, } \ln \sin \theta = \ln(1) \text{ বা, } \sin \theta = 1 \text{ বা, } \theta = 90^\circ \therefore \cos 90^\circ = 0$$

STEP 04 PRIME TEST Time: 15

০১. $1 + \sec^2(\cot^{-1} 2) + 1 + \operatorname{cosec}^2(\tan^{-1} 2) = ?$

- A. $\frac{7}{2}$ B. 8 C. $\frac{9}{2}$ D. 0

০২. $\sin(\pi \cos \theta) = \cos(\pi \sin \theta)$ হলে θ এর মান কোনটি?

- A. $\pm \frac{\pi}{4} + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$ B. $\pm \frac{\pi}{2} + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$
C. $\pm \frac{\pi}{4} + \sin^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$ D. $\pm \frac{\pi}{2} + \sin^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$

০৩. $\sec^2(\tan^{-1} 2) + \sin \cot^{-1} \tan \cos^{-1} x$ এর মান হবে-

- A. x B. x + 5 C. x^2 D. $x^2 + 5$

০৪. $\sin\left[\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]$ এর মান হবে-

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

০৫. যদি $x = \sin \cos^{-1} y$ হয়, তবে $x^2 + y^2$ এর মান হবে-

- A. 2 B. 1 C. -1 D. 0

০৬. সমাধান কর: $2 \tan^{-1}(\cos x) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} x)$

- A. $n\pi \pm (-1)^n \frac{\pi}{4}$ B. $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$
C. $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ D. $n\pi + \frac{\pi}{4}$

০৭. $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2, (0^\circ < \theta < 360^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

- A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

০৮. যদি $\sin^{-1} \frac{2a}{1+a^2} - \cos^{-1} \frac{1-b^2}{a+b^2} = 2 \tan^{-1} x$ হয়, তাহলে x এর মান হবে:

- A. a + b B. $\frac{1+ab}{a-b}$ C. a - b D. $\frac{a-b}{a+ab}$

০৯. $\cos \tan^{-1} \cot \sin^{-1} x$ এর মান কত?

- A. -x B. $\frac{\pi}{2} - x$ C. x D. $\frac{\pi}{2} + x$

১০. যদি $\sin^{-1} + \sin^{-1} y = \frac{\pi}{2}$ হয় তবে, $x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 1

১১. $\tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{2}$ এর মান কোনটি?

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{4}$

১২. $\cos(\pi \sqrt{x-4}) \cos(\pi \sqrt{x}) = 1$ এর কয়টি সমাধান পাওয়া যাবে?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. > 2

13. $\sin^{-1}(1)$ এর মান ($n = 1, 2, 3, \dots$)

- A. $\frac{n\pi}{2}$ B. $\frac{(n+1)\pi}{2}$ C. $\frac{(2n+1)\pi}{2}$ D. $2n\pi + \frac{\pi}{2}$

14. $2(\sin \theta \cos \theta + \sqrt{3}) = \sqrt{3} \cos \theta + 4 \sin \theta$ and $0 < \theta < 360^\circ$ then, $\theta = ?$

- A. $30^\circ, 150^\circ$ B. $90^\circ, 0^\circ$
C. $60^\circ, 120^\circ$ D. $45^\circ, 135^\circ$

15. $\operatorname{cosec} x = 2$ এবং $\cot x = -\sqrt{3}$ হলে কোনটি সত্য—

- A. $\sin x = -\frac{1}{2}$ B. $\sec x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

16. $\cot^2 \theta - 2\sqrt{2} \operatorname{cosec} \theta + 3 = 0$ হলে, θ এর মান কত?

- A. $\pm 45^\circ$ B. $\pm 135^\circ$
C. 135° D. None

17. $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ হলে θ এর মান—

- A. 30° B. 45° C. 60° D. None

18. $3\tan^2 \theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot \theta}$ হলে $\theta = ?$

- A. $30^\circ, 150^\circ$ B. $30^\circ, 120^\circ$
C. $150^\circ, 270^\circ$ D. $30^\circ, 180^\circ$

19. $\cos 9x \cos 7x = \cos 5x \cos 3x$ হলে $x = ?$

- A. $\frac{n\pi}{12}, \frac{n\pi}{4}$ B. $2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$
C. $n\pi \pm \frac{\pi}{12}$ D. None

20. $\sin 3\theta + \sin 5\theta + \sin 7\theta + \sin 9\theta = 0$ হলে $\theta \neq ?$

- A. $\frac{n\pi}{6}$ B. $(2n+1)\frac{\pi}{4}$
C. $(2n+1)\frac{\pi}{2}$ D. All

21. $2\sin 2\theta + 3\cos \theta = 0$ হলে $\cos \theta = ?$

- A. $n\pi + (-1)^n \sin^{-1} \frac{3}{4}$ B. $n\pi$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 0

22. $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \frac{\pi}{2}$ হলে, $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y$ কত?

- A. 0 B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π

23. $\cos^3 \left(\cot^{-1} \cot \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) = ?$

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{8}$ D. $3\sqrt{\frac{3}{8}}$

24. n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\cos 3\theta = -\frac{1}{2}$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি?

- A. $\frac{2}{3}n\pi - \frac{\pi}{9}$ B. $\frac{2}{3}n\pi + \frac{\pi}{9}$
C. $\frac{1}{3}n\pi \pm \frac{\pi}{9}$ D. $\frac{2}{3}n\pi \pm \frac{\pi}{9}$

25. $\cot^2 \theta - (\sqrt{3} + 1) \cot \theta + \sqrt{3} = 0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, $\theta = ?$



- A. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{5}$ D. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}$

OMR SHEET

01. A B C D E	09. A B C D E	17. A B C D E
02. A B C D E	10. A B C D E	18. A B C D E
03. A B C D E	11. A B C D E	19. A B C D E
04. A B C D E	12. A B C D E	20. A B C D E
05. A B C D E	13. A B C D E	21. A B C D E
06. A B C D E	14. A B C D E	22. A B C D E
07. A B C D E	15. A B C D E	23. A B C D E
08. A B C D E	16. A B C D E	24. A B C D E
		25. A B C D E

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	C	$1 + \sec^2(\cot^{-1} 2) + 1 + \operatorname{cosec}^2(\tan^{-1} 2)$ $= 1 + 1 + \tan^2(\cot^{-1} 2) + 1 + 1 + \cot^2(\tan^{-1} 2)$ $= 4 + \tan^2(\cot^{-1} 2) + \cot^2(\tan^{-1} 2)$ $= 4 + \left\{ \tan\left(\tan^{-1} \frac{1}{2}\right) \right\}^2 + \left\{ \cot\left(\cot^{-1} \frac{1}{2}\right) \right\}^2 = 4 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$
02	A	$\sin(\pi \cos \theta) = \cos(\pi \sin \theta) \Rightarrow \sin(\pi \cos \theta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \pi \sin \theta\right)$ $\Rightarrow \pi \cos \theta = \frac{\pi}{2} \pm \pi \sin \theta \Rightarrow \cos \theta \pm \sin \theta = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ $\Rightarrow \theta = \pm \frac{\pi}{4} + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$
03	B	$\sec^2(\tan^{-1} 2) = 1 + \tan^2(\tan^{-1} 2)$ $\therefore \sec^2(\tan^{-1} 2) + \sin \cot^{-1} \tan \cos^{-1} x = 5 + x$ $[\because \sin \cot^{-1} \tan \cos^{-1} x = x]$
04	B	$\sin \left[\cos^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right]$ $= \sin [120^\circ + 30^\circ] = \sin 150^\circ = \frac{1}{2}$
05	B	$x = \sin \cos^{-1} y \Rightarrow \cos^{-1} y = \sin^{-1} x$ $\Rightarrow \sin^{-1} x = \sin^{-1} \sqrt{1-y^2} \Rightarrow x = \sqrt{1-y^2}$ $\Rightarrow x^2 = 1-y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
06	D	$2 \tan^{-1}(\cos x) = \tan^{-1} \frac{2 \cos x}{1 - \cos^2 x}$ $\therefore \frac{2 \cos x}{\sin^2 x} = \frac{2}{\sin x}$ $\Rightarrow \tan x = 1 \Rightarrow x = n\pi + \frac{\pi}{4}$	16	C	
07	B	$\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta = 1$ $\Rightarrow \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Rightarrow \theta - \frac{\pi}{3} = 2n\pi \Rightarrow \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{3}$ $n = 0, n \in \mathbb{Z} \therefore \theta = \frac{\pi}{3} \text{ বা } 60^\circ$	17	B	$\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ $\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta = 1$ $\Rightarrow \sin 45^\circ \sin \theta + \cos 45^\circ \cos \theta = 1$ $\Rightarrow \cos(\theta - 45^\circ) = \cos 0$ $\Rightarrow \theta - 45^\circ = 0 \therefore \theta = 45^\circ$
08	D	$\sin^{-1} \frac{2a}{1+a^2} - \cos^{-1} \frac{1-b^2}{a+b^2} = 2 \tan^{-1} x$ $\Rightarrow 2 \tan^{-1} a - 2 \tan^{-1} b = 2 \tan^{-1} x$ $\Rightarrow \tan^{-1} a - \tan^{-1} b = \tan^{-1} x$ $\Rightarrow \tan^{-1} \frac{a-b}{1+ab} = \tan^{-1} x \therefore x = \frac{a-b}{a+ab}$	18	B	$3 \tan^2 \theta - 2\sqrt{3} \tan \theta + 1 = 0$ $\Rightarrow (\sqrt{3} \tan \theta - 1)^2 = 0$ $\Rightarrow \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} = 30^\circ, 120^\circ$
09	C	$\cos \tan^{-1} \cot \sin^{-1} x = \cos \tan^{-1} \cot \cot^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ $= \cos \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \cos \cos^{-1} x = x$   Fig-1 Fig-2	19	A	$2 \cos 9x \cos 7x = 2 \cos 5x \cos 3x$ $\Rightarrow \cos 16x + \cos 2x = \cos 8x + \cos 2x$ $\Rightarrow 2 \sin 12x \sin 4x = 0$ $\Rightarrow x = \frac{n\pi}{12}, \frac{n\pi}{4}$
10	D	$\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow \sin^{-1}(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}) = \frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$	20	D	$(\sin 9\theta + \sin 3\theta) + (\sin 7\theta + \sin 5\theta) = 0$ $\Rightarrow 2 \sin 6\theta (\cos 3\theta + \cos \theta) = 0$ $\Rightarrow 2 \sin 6\theta \cos 2\theta \cos \theta = 0$ $\Rightarrow \theta = \frac{n\pi}{6}, (2n+1)\frac{\pi}{4}, (2n+1)\frac{\pi}{2}$
11	A	$\tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$	21	D	$2.2 \sin \theta \cos \theta + 3 \cos \theta = 0$ $\Rightarrow \cos \theta (4 \sin \theta + 3) = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0$
12	B	$x = 4 \text{ হলে, } \cos 0^\circ \cdot \cos(2\pi) = 1$	22	C	$\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} x + \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} y = \frac{\pi}{2}$ $\therefore \sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{\pi}{2}$
13	D	$\sin \theta = 1; \theta = (4n+1)\frac{\pi}{2} = 2n\pi + \frac{\pi}{2} [n \in \mathbb{Z}]$	23	B	$\cos^3 \left(\cot^{-1} \cot \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$ $= \cos^3 \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$
14	C	$2(\sin \theta \cos \theta + \sqrt{3}) = \sqrt{3} \cos \theta + 4 \sin \theta;$ $\theta = 60^\circ \text{ ও } 120^\circ \text{ উভয়ের জন্য L.H.S. = R.H.S. হয়।}$	24	D	$\cos 3\theta = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$ $\therefore 3\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ $\Rightarrow \theta = \frac{2}{3}n\pi \pm \frac{\pi}{9} \text{ here, } n \in \mathbb{Z}$
15	C	$\operatorname{cosec} x = 2; \cot x = -\sqrt{3} \Rightarrow \frac{\cos x}{\sin x} = -\sqrt{3}$ $\Rightarrow \cos x \operatorname{cosec} x = -\sqrt{3} \Rightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\text{আবার, } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x \operatorname{cosec} x} = \frac{1}{-\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$	25	D	$\cot^2 \theta - (\sqrt{3} + 1) \cot \theta + \sqrt{3} = 0$ $\Rightarrow \cot^2 \theta - \sqrt{3} \cot \theta - \cot \theta + \sqrt{3} = 0$ $\Rightarrow \cot \theta (\cot \theta - \sqrt{3}) - 1 (\cot \theta - \sqrt{3}) = 0$ $\Rightarrow (\cot \theta - \sqrt{3})(\cot \theta - 1) = 0 \therefore \cot \theta - \sqrt{3} = 0$ $\text{বা, } \cot \theta = \sqrt{3} \text{ বা, } \theta = \frac{\pi}{6}$ $\text{আবার, } \cot \theta - 1 = 0 \text{ বা, } \cot \theta = 1$ $\text{বা, } \theta = \frac{\pi}{4} \therefore \theta = \frac{\pi}{6} \text{ এবং } \frac{\pi}{4}$


MEEx 01 দুইটি সমমানের ভেক্টর একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান যে কোন একটি ভেক্টরের সমান। ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

Solve ধরি, বলদ্বয় P , P এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ α প্রশ্নমতে, লব্ধি বল R হলে, $R^2 = P^2 + P^2 + 2P^2 \cos \alpha$ বা, $2P^2 \cos \alpha = -P^2$
বা, $\cos \alpha = -\frac{1}{2} \therefore \alpha = 120^\circ$


TOPIC 02 লম্বাংশ উপপাদ্য সংক্রান্ত

Technique:

লম্বাংশ উপপাদ্য (Resolved part's Theorem): একটি বিন্দুতে কোন নির্দিষ্ট দিকে দুই বা, ততোধিক বলের লম্বাংশের বীজগাণিতিক যোগফল একই দিক বরাবর তাদের লব্ধির লম্বাংশের সমান।



P ও Q এর লব্ধি বল R হলে, লম্বাংশ উপপাদ্য অনুসারে,
 $R \cos \theta = P \cos \alpha + Q \cos \beta$.



চিত্রের বলগুলোর লব্ধি R হলে, লম্বাংশ উপপাদ্য অনুযায়ী,

$$R \cos \theta = P_1 \cos \alpha_1 + P_2 \cos \alpha_2 + P_3 \cos \alpha_3 + \dots = X$$

$$R \sin \theta = P_1 \sin \alpha_1 + P_2 \sin \alpha_2 + P_3 \sin \alpha_3 + \dots = Y$$

$$\therefore \text{লব্ধির মান } R = \sqrt{X^2 + Y^2} \text{ লব্ধির দিক, } \theta = \tan^{-1} \frac{Y}{X}$$

Note: i) দুই এর অধিক বলের লব্ধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লম্বাংশ উপপাদ্য ব্যবহার করতে হবে।

ii) P , Q , R মানের তিনটি সমতলীয় বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে। P ও Q , Q ও R এবং R ও P এর মধ্যবর্তী কোণ যথাক্রমে α , β এবং γ হলে বলত্রয়ের লব্ধি,

$$F = \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2 + 2PQ \cos \alpha + 2QR \cos \beta + 2PR \cos \gamma}$$

iii) বলত্রয় সমান্তর ধারায় এবং সমান কোণে ক্রিয়ায় থাকলে লব্ধি $R = \sqrt{3} \times$ সমান্তর ধারায় সাধারণ অন্তর।

iv) তিনটি সমমানের বল এমনভাবে ক্রিয়া করে যেন যে কোন দুইটি বলের মধ্যবর্তী কোণ 120° হয়, তবে লব্ধি শূন্য।


v) চারটি সমমানের বল কোন বিন্দুতে এমন ভাবে ক্রিয়া করে যেন পর পর দুইটি বলের মধ্যবর্তী কোণ $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$ হয় তবে লব্ধি শূন্য।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 একটি লোক লাঠির একপ্রান্তে বাঁধা একটি বোঝা কাঁধে বহন করছে। বোঝাটির ওজন w এবং লোকটির কাঁধ হতে বোঝাটির ও লোকটির হাতের দূরত্ব যথাক্রমে $1m$ এবং $0.5m$, লোকটির কাঁধের উপর চাপ কত? [JUST-A. 16-17; BSMRSTU. 16-17; BUET. 07-08]

Solve কাঁধের উপর চাপ $= R$

$$\therefore R = \frac{w}{x} = \frac{w(1+0.5)}{0.5} = \frac{w \times 1.5}{0.5} = 3w$$



TOPIC 03 লামির উপপাদ্য সংক্রান্ত

Technique: লামির উপপাদ্য (Lami's Theorem):

এক বিন্দুতে ভিন্ন রেখা বরাবর ক্রিয়ায় তিনটি একতলীয় বল সাম্যাবস্থায় থাকলে, প্রত্যেকটি বলের মান অপর দুটি বলের অন্তর্ভুক্ত কোণের সাইনের সমানুপাতিক।


পাশের চিত্রের ক্ষেত্রে, লামির উপপাদ্য অনুসারে,

$$\frac{P}{\sin \angle YOZ} = \frac{Q}{\sin \angle ZOX} = \frac{R}{\sin \angle XOY}$$

আবার, যেকোনো বলের মান অপর বল দুটির লব্ধির মানের সমান হবে। যেমন:

$$Q = \sqrt{P^2 + R^2 + 2PR \cos \beta}$$

$$P = \sqrt{Q^2 + R^2 + 2QR \cos \alpha}$$



LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 যদি কোন কনার উপর ক্রিয়ায় দুইটি বলের লব্ধি একটি বলের উপর লম্ব এবং এর মান অপরটির মানের এক-তৃতীয়াংশের সমান হয় তবে বলদ্বয়ের মানের অনুপাত হবে— [BUET. 12-13]

Solve From the fig.

$$\frac{P}{\sin(\alpha - 90^\circ)} = \frac{Q}{\sin 90^\circ} = \frac{Q/3}{\sin \alpha}$$

$$\therefore \frac{Q}{1} = \frac{Q}{3 \sin \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{3}$$

$$\text{Again, } \cos \alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ [স্পষ্টত } \alpha \text{ স্থূলকোণ]}$$

এখন, P বরাবর লম্বাংশ

$$P + Q \cos \alpha = 0 \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{P}{Q} \Rightarrow -\frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{P}{Q} \Rightarrow P:Q = 2\sqrt{2}:3$$

TOPIC 04 তিনটি বল সাম্যাবস্থায় থাকার শর্ত সংক্রান্ত সমস্যা

Technique: বলের ত্রিভুজ সূত্র (Triangle of forces): একটি বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি বলকে কোন ত্রিভুজের তিনটি বাহু ধারা একইক্রমে মানে ও দিকে সূচিত করা গেলে বলত্রয় সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি করে।

Note: একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু ধারা তিনটি বলকে দিকে, মানে ও একই ক্রমে প্রকাশ করতে হলে যে কোন দুটি বলের যোগফল তৃতীয়টি অপেক্ষা বৃহত্তর হতে হয়।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 নিম্নের কোন বলত্রয় ত্রিভুজের বাহু ধারা দিকে, মানে ও একই ক্রমে প্রকাশ করলে স্থিতিবাহ্য থাকবে? [DU. 99-00, 96-97; RU. 06-07]

Solve একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু ধারা তিনটি বলকে দিকে, মানে ও একই ক্রমে প্রকাশ করতে হলে যে কোন দুটি বলের যোগফল তৃতীয়টি অপেক্ষা বৃহত্তর হতে হয়।

MEEx 02 12N ও 8N দুটি সমান্তরাল বল 10 মিটার লম্বা একটি হালকা দণ্ডের দুই প্রান্তে কার্যকর হলে বৃহত্তর বল হতে লব্ধি যতদূরে ক্রিয়া করে- [IU-A. 19-20]

Solve বৃহত্তর বল হতে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দুর দূরত্ব = AC
 $\therefore \frac{12}{BC} = \frac{8}{AC} \Rightarrow \frac{12}{AB-AC} = \frac{8}{AC}$
 $\Rightarrow 12AC = 8(AB-AC)$
 $\Rightarrow 12AC = 8 \cdot 10 - 8AC$ [∵ AB = 10 মিটার]
 $\Rightarrow 20AC = 80$
 $AC = 4$ মিটার


TOPIC 05 সদৃশ সমান্তরাল বলের ক্ষেত্রে লব্ধি ও লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু নির্ণয়

Technique:

P, Q সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি R হলে- $R = P + Q$ এবং $\frac{P}{BC} = \frac{Q}{AC} = \frac{R}{AB}$

সূত্র হিসেবে মনে রাখার উপায়:

- (i) P ও Q দুইটি সমান্তরাল সমমুখী বল হলে, P এর ক্রিয়ারেখা সমান্তরাল রেখা তার ক্রিয়াবিন্দুকে x দূরত্বে সরালে লব্ধি $\frac{Px}{P+Q}$ দূরে সরে যাবে।
- (ii) P ও Q দুইটি সমান্তরাল সমমুখী বল পরস্পর অবস্থান বিনিময় করলে লব্ধি $\frac{P-Q}{P+Q}$ d দূরত্বে সরে যাবে। [d হচ্ছে P ও Q এর ক্রিয়ারেখার দূরত্ব]
- (iii) P ও Q দুইটি সমান্তরাল সমমুখী বল A ও B তে ক্রিয়ারত এবং এদের পরিমাপ x একক করে বাড়ালে লব্ধি $d = \frac{x}{P-Q}$, AB দূরত্ব সরে যাবে।



Note: সদৃশ সমান্তরাল বলের ক্ষেত্রে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু বলদ্বয়ের সংযোগকারী রেখার মধ্যে অবস্থিত যে কোন এক বিন্দুতে ক্রিয়া করে

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 P ও Q দুটি সদৃশ সমান্তরাল বল। কি শর্তে P ও Q পরস্পর স্থান বিনিময় করলে এদের লব্ধির স্থান পরিবর্তন হয় না? [RU-C. 11-12; CU. 05-06]

Solve


P = Q হলে বলদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলেও লব্ধির স্থান পরিবর্তিত হবে না।

TOPIC 06 ত্রিভুজ সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ

Technique:

এসব ক্ষেত্রে সমান্তরাল বলের TOPIC এবং ত্রিভুজের গুণাবলি ব্যবহার করে হিসাব করতে হবে।

ΔABC এর A, B, C তে তিনটি সমমুখী সমান্তরাল বল $\vec{P}$, $\vec{Q}$, $\vec{R}$ ক্রিয়া করলে এবং



লব্ধি O বিন্দুগামী হলে:

- (i) O বিন্দু ভরকেন্দ্র হলে, $P = Q = R$
 (ii) O বিন্দু অন্তঃকেন্দ্র হলে, $P : Q : R = \sin A : \sin B : \sin C$
 (iii) O বিন্দু পরিকেন্দ্র হলে, $P : Q : R = \sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 কোন একটি বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি বল ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে, যেখানে ১ম ও ২য় বলের অন্তর্গত কোণ 90° এবং ২য় ও ৩য় বলের অন্তর্গত কোণ 120° । তাহলে বল তিনটির অনুপাত কত? [KU. 14-15]

Solve

$$\frac{P}{\sin 120^\circ} = \frac{Q}{\sin(90^\circ + 60^\circ)} = \frac{R}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{Q}{\cos 60^\circ} = \frac{R}{1} \Rightarrow \frac{P}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{Q}{\frac{1}{2}} = \frac{R}{1}$$

$$\therefore P : Q : R = \frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{1}{2} : 1 = \sqrt{3} : 1 : 2$$
STEP 03 বিভাজ্য বলের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নাল ভাষাসহ সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. তিনটি সমতলীয় বল P, Q এবং R কোনো বিন্দুতে ক্রিয়া করে সাম্যাবস্থায় আছে।

যদি P এবং Q এর মান যথাক্রমে $5\sqrt{3}N$ ও $5N$ এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণ $\frac{\pi}{2}$ হয়

তাহলে R, Q এর সঙ্গে কত কোণ তৈরি করবে?


[GST-A. 2022-2023]

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

SCoWhy ধরি, R ও Q এর মধ্যবর্তী কোণ γ এবং এখানে P ও Q এর লব্ধি বল হিসেবে R বলটি কাজ করছে।

$$\tan \theta = \frac{5\sqrt{3} \sin 90^\circ}{5 + 5\sqrt{3} \cos 90^\circ} = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \gamma = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$



02. F এবং 2F মানের দুটি সমবিন্দু বলের লব্ধির ক্রিয়াদিক এবং একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত 2F এবং 2F + 2 মানের বলদ্বয়ের লব্ধির ক্রিয়াদিক একই হলে F এর মান কত একক?

[GST-A. 21-22]

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 4


S²B Solⁿ সদৃশ কোণে ত্রিভুজের ধর্ম হতে,

$$\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{EC} = \frac{AH}{AG}$$

$$\Rightarrow \frac{2F}{2F+2} = \frac{F}{2F}$$

$$\Rightarrow 4F = 2F + 2$$

$$\Rightarrow F = 1$$



জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. দুইটি সমান বেগের মধ্যবর্তী কোণ α এবং লক্কি যেকোন বেগের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে θ এর মান কোনটি?
- A. $\frac{\alpha}{3}$ B. 2α C. α D. $\frac{\alpha}{2}$ [JnU. 17-18]

[S.O.Why]

ধরি, সমান বেগের মান = P লক্কি যে কোন বেগের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে লক্কির দিক,

$$\tan \theta = \frac{P \sin \alpha}{P + P \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \tan \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\alpha}{2} : \text{দুটি বল সমান অর্থাৎ } P = Q \text{ হলে } \theta = \frac{\alpha}{2}$$

02. 4N এবং 5N বল দুইটির মধ্যবর্তী কোণ কত হলে লক্কি 9N হবে? [JnU. 17-18]
- A. 45° B. 0° C. 30° D. 60°

[S.O.Why]

$$9^2 = 4^2 + 5^2 + 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 40 \cos \alpha = 40 \Rightarrow \cos \alpha = 1 \therefore \alpha = 0^\circ$$

03. 2N এবং 5N মানের দুইটি বল পরস্পর লম্ব দিকে ক্রিয়া করে। তাদের লক্কির মান কত? [JnU. 11-12, 07-08]
- A. $\sqrt{29}N$ B. $2\sqrt{5}N$ C. $6N$ D. $7N$

[S.O.Why]

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}N$$

04. কোন বিন্দুতে দুইটি বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল। বৃহত্তর উপাংশ 20N এবং তাদের লক্কি ক্ষুদ্রতর উপাংশের সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে। ক্ষুদ্রতর উপাংশ কত? [JnU. 06-07]
- A. 5N B. 10N C. 20N D. 15N

[S.O.Why]

$$\text{ক্ষুদ্রতম বলটি } Q \text{ হলে, } \tan 90^\circ = \frac{20 \sin 120}{Q + 20 \cos 120}$$

$$\Rightarrow Q + 20 \cos 120^\circ = 0 \therefore Q = 10N.$$

05. লামির উপপাদ্য কোনটি? [JnU. 10-11]

$$A. \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

$$B. P^2 + Q^2 = R^2$$

$$C. S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$D. \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \sin^2 \gamma$$

[S.O.Why]

$$\text{লামির উপপাদ্য } \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. 16N ও 11N বিসদৃশ সমান্তরাল বলদ্বয় 5m দূরত্বে অবস্থিত। যদি পরবর্তীতে বলদ্বয় 18N ও 13N হয়, তাহলে লক্কির সরণ কত m? [KU. 19-20]
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[S.O.Why]

$$\text{লক্কির সরণ} = \frac{\text{বলদ্বয়ের দূরত্ব} \times \text{বল বৃদ্ধি}}{\text{বলদ্বয়ের পার্থক্য}} = \frac{5 \times 2}{16 - 11} = \frac{10}{5} = 2$$

02. কোন একটি বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি বল ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে, যেখানে 1ম ও ২য় বলের অন্তর্গত কোণ 90° এবং ২য় ও ৩য় বলের অন্তর্গত কোণ 120° । তাহলে বল তিনটির অনুপাত কত? [KU. 14-15]

$$A. P:Q:R = \sqrt{2}:1:2$$

$$B. P:Q:R = 2:1:\sqrt{2}$$

$$C. P:Q:R = 3:1:\sqrt{2}$$

$$D. P:Q:R = \sqrt{3}:1:2$$

[S.O.Why]

$$\frac{P}{\sin 120^\circ} = \frac{Q}{\sin (90^\circ + 60^\circ)} = \frac{R}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{\sqrt{3}} = \frac{Q}{\cos 60} = \frac{R}{1} \Rightarrow \frac{P}{\sqrt{3}} = \frac{Q}{\frac{1}{2}} = \frac{R}{1}$$

$$\therefore P:Q:R = \frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{1}{2} : 1 = \sqrt{3}:1:2$$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. দুটি সমান বলের লক্কি বলদ্বয়ের গুণফলের বর্গমূল হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ- [IU-D. 19-20]
- A. 0° B. 30° C. 60° D. 120°

[S.O.Why]

$$P \text{ মানের দুটি বলের লক্কি } R \text{ হলে } R = 2P \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right)$$

$$\text{শর্তমতে, } R = \sqrt{P \cdot P} = P$$


$$\Rightarrow 2P \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) = P \Rightarrow \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 60^\circ \therefore \alpha = 120^\circ$$

02. 12N ও 8N দুটি সমান্তরাল বল 10 মিটার লম্বা একটি হালকা দণ্ডের দুই প্রান্তে কার্যকর হলে বৃহত্তর বল হতে লক্কি যতদূরে ক্রিয়া করে- [IU-A. 19-20]
- A. 2 মিটার B. 4 মিটার C. 6 মিটার D. 8 মিটার

[S.O.Why]

$$\text{বৃহত্তর বল হতে লক্কির ক্রিয়াবিন্দুর দূরত্ব} = AC$$

$$\therefore \frac{12}{BC} = \frac{8}{AC} \Rightarrow \frac{12}{AB - AC} = \frac{8}{AC}$$



$$\Rightarrow 12AC = 8(AB - AC) \Rightarrow 12AC = 8 \cdot 10 - 8AC \quad [\because AB = 10 \text{ মিটার}]$$

$$\Rightarrow 20AC = 80 \therefore AC = 4 \text{ মিটার}$$

03. কোন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন রেখা বরাবর ক্রিয়ারত তিনটি একতলীয় বল সাম্যাবস্থায় থাকলে, তাদের প্রত্যেকটির মান অপর দুইটির অন্তর্গত কোণের সাইনের সমানুপাতিক। নিচের যে সূত্রটি সত্য- [IU. 18-19]

A. বলের ত্রিভুজ সূত্র

B. বলের সামান্তরিকের সূত্র

C. লামির উপপাদ্য

D. লামির উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য

[S.O.Why]

লামির উপপাদ্য: কোন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন রেখা বরাবর ক্রিয়ারত তিনটি একতলীয় বল সাম্যাবস্থায় থাকলে, তাদের প্রত্যেকটির মান অপর দুটির অন্তর্গত কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

04. একটি বিন্দুতে 7N, 13N, 19N বলদ্বয় একই ক্রমে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের লক্কির মান কত? [IU. 17-18]
- A. -9N B. $-3\sqrt{3}N$ C. $6\sqrt{3}N$ D. $\sqrt{3}N$

[S.O.Why]

7, 13, 19 একক মানের বলগুলো সমান্তর ধারা গঠন করে যার সাধারণ অন্তর 6N

$$\therefore \text{লক্কি} = \sqrt{3} \times \text{বেগগুলোর সাধারণ অন্তর} = \sqrt{3} \times 6 = 6\sqrt{3}N$$

05. 3P এবং 2P বলদ্বয়ের লক্কি R। প্রথম বল দ্বিগুণ করলে লক্কির পরিমাণও দ্বিগুণ হয়। বলদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ- [IU. 16-17; RU. 15-16; DU. 14-15, 12-13, 09-10; CU. 06-07; DU-7 Clg. 19-20; BUET. 03-04; KU. 18-19]
- A. 130° B. 120° C. 110° D. 100°

[S.O.Why]

একটি বলের সাথে যদি লক্কি ও সমহার বৃদ্ধি পায় তাহলে, মধ্যবর্তী কোণ = 120°

06. 3P এবং 5P মানের দুইটি বল পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়া করে। তাদের লক্কির মান কত? [IU. 17-18, 16-17, 15-16; DU. 97-98, 99-00, 95-96; DU. 7 Clg. 18-19, RU. 09-10, 06-07]
- A. 3P B. $2\sqrt{2}P$ C. $\sqrt{34}P$ D. $\sqrt{43}P$

[S.O.Why]

$$\text{লক্কির মান } R \text{ হলে, } R^2 = (3P)^2 + (5P)^2$$


$$\text{বা, } R^2 = 34P^2 \therefore R = \sqrt{34}P$$

07. ক্রমানুসারে কোন বর্গক্ষেত্রের বাহুগুলো বরাবর P, 2P এবং 3P মানের বলগুলো ক্রিয়া করছে। লক্কির মান- [IU. 13-14, E]
- A. $4P\sqrt{2}$ B. $3P\sqrt{2}$ C. $2P\sqrt{2}$ D. $P\sqrt{2}$

[S.O.Why]

$$\text{চিত্র হতে P ও 3P বলের লক্কি} = 3P - P = 2P$$

$$\therefore 2P \text{ ও } 2P \text{ বলদ্বয়ের লক্কি } R = 2P\sqrt{2}$$



08. একই বিন্দুতে ত্রিভুজের তিনটি বল যদি পরিমানে ও দিকে একটি ত্রিভুজের ত্রিমাত্রিকভাবে তিনটি বাহু দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তবে তিনটি বলের লব্ধি হবে- [IU. 12-13]

A. 0 B. 1 C. ∞ D. কোনটিই নয়

[S@Why] তিনটি বল যদি পরিমাণে ও দিকে একটি ত্রিভুজের ত্রিমাত্রিকভাবে তিনটি বাহু দ্বারা সূচিত হয় তাহলে তিনটি বলের লব্ধি শূন্য-

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = 0$$

[II] বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় **[II]**

01. একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি কৌণিক বিন্দুতে P ও 2P মানের দুটি বল ক্রিয়া করছে। এদের লব্ধি হবে- [BRUR-E. 19-20]

A. $P\sqrt{7}$ B. 2P C. $P\sqrt{5}$ D. 9P

[S@Why] $R = \sqrt{P^2 + (2P)^2 + 2 \cdot P \cdot 2P \cos 60^\circ}$

[$\because$ সমবাহু ত্রিভুজ $\theta = 60^\circ$]

$$= \sqrt{P^2 + 4P^2 + 4P^2 \cos 60^\circ}$$

$$= \sqrt{5P^2 + 4P^2 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{5P^2 + 2P^2} = \sqrt{7P^2} = \sqrt{7} P$$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION


[II] শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[II]**

01. একজন লোক কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে 15 কি.মি. উত্তর দিকে গেল এবং সেখানে থেকে 10 কি.মি. পূর্ব দিকে যাওয়ার পর 5 কি.মি. দক্ষিণ দিকে গেল। লোকটি যাত্রা স্থান থেকে কত কি.মি. দূরে অবস্থান করছে? [SUST. 14-15]

A. 10 B. 20 C. 30
D. $10\sqrt{2}$ E. $5\sqrt{14}$

[S@Why]

চিত্র হতে $OC = \sqrt{10^2 + 10^2}$
 $= 10\sqrt{2}$



02. এক বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বলের ক্রিয়া রেখার মধ্যবর্তী কোণ α । α এর কোন মানটির জন্য বলদ্বয়ের লব্ধির মান বৃহত্তম হবে? [SUST. 08-09; MBSTU. 18-19]

A. $\alpha = 90^\circ$ B. $\alpha = 180^\circ$ C. $\alpha = 0^\circ$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] $\alpha = 0^\circ$ হলে লব্ধি সর্বোচ্চ হবে।

03. শ্রোতের বেগের মানের $\sqrt{2}$ গুণ মানের বেগে সাঁতার কেটে একজন সাঁতারু নদীর অপর পাড়ে সোজাসুজি গিয়ে পৌঁছল। নদীর তীরের সাথে সাঁতারু বেগের নতি নির্ণয় কর। [SUST-A. 07-08]

A. 120° B. 130° C. 135° D. 65°

[S@Why] $\tan 90^\circ = \frac{\sqrt{2} u \sin \alpha}{u + \sqrt{2} u \cos \alpha}$ বা, $\frac{1}{0} = \frac{\sqrt{2} u \sin \alpha}{1 + \sqrt{2} \cos \alpha}$

বা, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ বা, $\alpha = 135^\circ$

04. ABCD বর্গক্ষেত্রের AB, AC, AD বরাবর যথাক্রমে, 2, $3\sqrt{2}$ এবং 3 এককের তিনটি বল ক্রিয়াশীল। লব্ধিবলের মান এবং AB রেখার সাপেক্ষে লব্ধির দিক বের করে। [SUST. 07-08]


A. $\sqrt{71}$ একক ; $\tan^{-1} \frac{6}{7}$ B. $\sqrt{42}$ একক ; $\tan^{-1} \frac{4}{5}$

C. $\sqrt{61}$ একক ; $\tan^{-1} \frac{6}{5}$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] AB বরাবর উপাংশ = $2 + 3\sqrt{2} \cos 45^\circ + 3 \cos 90^\circ = 5$

AD বরাবর উপাংশ = $3 + 3\sqrt{2} \cos 45^\circ + 2 \cos 90^\circ = 6$

$\theta = \tan^{-1} \frac{6}{5}$ ও লব্ধি = $\sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{61}$



05. দুটি অসদৃশ সমান্তরাল বল R ও S এর ক্রিয়া রেখার অবস্থান পরিবর্তন করলে ও এদের লব্ধির ক্রিয়াবিন্দুর অবস্থান পরিবর্তিত হয় না। এক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য? [SUST. 04-04, B]

A. $\frac{R}{S} = 1$ B. $\frac{R}{S} = 2$ C. $\frac{R}{S} = 3$ D. কোনটিই নয়

[S@Why] যখন $\frac{R}{S} = 1$ বা, $R = S$ হবে তখন উপরোক্ত তথ্যটি সত্য।

[II] যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[II]**


01. একটি লোক লাঠির একপ্রান্তে বাঁধা একটি বোঝা কাঁধে বহন করছে। বোঝাটির ওজন w এবং লোকটির কাঁধ হতে বোঝাটির ও লোকটির হাতের দূরত্ব যথাক্রমে 1m এবং 0.5m, লোকটির কাঁধের উপর চাপ কত? [JUST-A. 16-17; BSMRSTU. 16-17; BUET. 07-08]

A. 3W B. W
D. 2W E. 2.5W

[S@Why] কাঁধের উপর চাপ = R

$$\therefore R = \frac{wl}{x} = \frac{w(1+0.5)}{0.5}$$

$$= \frac{w \times 1.5}{0.5} = 3w$$



[II] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[II]**

01. যদি ABC ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র G হয় তাহলে O বিন্দুতে কার্যরত $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ ও $\vec{OC}$ বলদ্বয়ের লব্ধি কত? [BSMRSTU. 15-16]

A. 3G B. 4G
C. 1G D. 4.5G

[Ans A]

02. একটি 125N ওজনের গোলক ছাদের দুই প্রান্তের সাথে বাঁধা একটি দড়ির মধ্যে বাঁধা আছে। দড়িটির দুই প্রান্ত ছাদের সাথে 37° ও 53° কোণ তৈরি করলে দড়ির দুই প্রান্তে টান- [BSMRSTU. 14-15]

A. 75.1N, 99.9N B. 75N, 50N
C. 100N, 25N D. 60N, 65N


[S@Why] লামীর উপপাদ্য অনুসারে,

$$\frac{T_1}{\sin W \wedge T_2} = \frac{T_2}{\sin W \wedge T_1} = \frac{W}{\sin T_1 \wedge T_2}$$

$$\Rightarrow \frac{T_1}{\sin(90 - 37)} = \frac{T_1}{\sin(90 - 53)} = W$$

$$\Rightarrow T_2 = w \cos 53 = 125 \cos 53 = 75.226$$

$$\text{এবং } T_1 = w \cos 37 = 125 \cos 37 = 99.829$$



[II] মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[II]**

01. এক বিন্দুতে 45° কোণে ক্রিয়াশীল P ও $\sqrt{2}N$ বলের লব্ধি $\sqrt{10}N$ হলে, P এর মান হবে- [MBSTU-C. 19-20]

A. 2N B. 3N
C. 5N D. 7N

[S@Why] $(\sqrt{10})^2 = p^2 + (\sqrt{2})^2 + 2p\sqrt{2} \cos 45^\circ$

$$\Rightarrow 10 = p^2 + 2 + 2p \Rightarrow 8 = p^2 + 2p$$

$$\Rightarrow p^2 + 2p - 8 = 0 \Rightarrow p^2 + 4p - 2p - 8 = 0$$


$$\Rightarrow p(p+4) - 2(p+4) = 0$$

$$\Rightarrow (p-2)(p+4) = 0 \therefore p = 2, -4$$

STEP 04 PRIME TEST

Time: 15

01. দুটি সমান বলের লব্ধির বর্গ বলদ্বয়ের গুণফলের 3 গুণ। বলদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত?
A. 60° B. 120° C. 30° D. None
02.  চিত্রে AB তক্তার ওজন 100kg ও দৈর্ঘ্য 5 মিটার। BC = 2 মিটার হলে এবং তক্তা না উল্টিয়ে বালকটি B প্রান্তে পৌঁছালে, বালকের ওজন কত?

- A. 50 kg B. 25 kg C. 15 kg D. None
03. 12 m লম্বা একটি ভারী সুষম দণ্ডের এক প্রান্তে 9 kg ওজন ঝুলানো আছে। উক্ত প্রান্ত থেকে 5.25 m দূরে যদি একটি খুঁটির উপর দণ্ডটি ভূমির সমান্তরালে অবস্থান করে তবে দণ্ডটির ওজন হবে-
A. 65 kg B. 61 kg C. 63 kg D. 47.25 kg
04. কোন কণার উপর একই সময়ে ক্রিয়াশীল তিনটি বেগ যথাক্রমে 7ms^{-1} , 8ms^{-1} এবং 13ms^{-1} কণাটি স্থির থাকলে ক্ষুদ্রতর বেগদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ হবে-
A. 30° B. 60° C. 45° D. 90°
05. 20 কেজি ওজনের একটি বস্তুর সাথে দুটি রশি বেঁধে দু'জন লোক তা বহন করছে। রশিদ্বয় ঝাড়া রেখার সাথে সমান 45° করে কোণ উৎপন্ন করে। রশিদ্বয়ের টান হবে-


- A. $10\sqrt{2}$, $10\sqrt{2}$ kg - wt B. $20\sqrt{2}$, $20\sqrt{2}$ kg - wt
C. 20, 20 kg - wt D. 10, 10 kg - wt
06. অনুভূমিক দিকে এবং অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে ক্রিয়াশীল দুটি বল 5 একক ভরবিশিষ্ট বস্তুকে স্থিরভাবে ধরে রাখে। বল দুটির মান কত?
A. $\frac{5}{\sqrt{3}}$, 10 B. $5\sqrt{3}$, 10
C. 5, 10 D. $5, 10\sqrt{3}$
07. একজন লোক তার কাঁধের উপর একটি লাঠির প্রান্তে বেঁধে একটি বোঝা বহন করবে। তার হাত ও কাঁধের উপরে চাপ কিভাবে পরিবর্তিত হবে?
A. $R \propto x^2$ B. $R \propto \frac{1}{x^2}$
C. $R \propto \frac{1}{x}$ D. $R \propto x$

08. এক বিন্দুতে $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$ এবং $3\sqrt{3}$ মানের বলদ্বয় একই ক্রমে পরস্পর 60° কোণে ক্রিয়া করে। এদের লব্ধির মান নির্ণয় কর।
A. $\frac{7\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$ C. 57 D. $\sqrt{57}$
09. কোন একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুইটি বলের লব্ধির মান $\sqrt{10}$ N এবং তাদের মধ্যকার কোণ 45° । উহাদের একটি বলের মান $\sqrt{2}$ N হলে অন্যটি কত নির্ণয় কর।
A. -5N B. 2N C. -3N D. 7N
10. 20cm বাহুবিশিষ্ট সমবাহু $\triangle ABC$ এর BC, CA এবং AB বাহু বরাবর যথাক্রমে ক্রিয়াশীল 7, 5 ও 3 একক বলগুলির লব্ধির মান কত এবং উহার কার্যেরূপে BC বাহুকে কোথায় ছেদ করে?
A. 2 একক এবং বহিঃস্থভাবে BC কে 20 cm দূরে
B. $\sqrt{3}$ একক এবং বহিঃস্থভাবে BC কে 15 cm দূরে
C. $3\sqrt{3}$ একক এবং বহিঃস্থভাবে BC কে 25 cm দূরে
D. $2\sqrt{3}$ একক এবং বহিঃস্থভাবে BC কে 30 cm দূরে

11. ভূমির ওপর ঝাড়া ভাবে দণ্ডায়মান একটি টেলিগ্রাফ থামের সাথে 20 মিটার দীর্ঘ একটি শক্ত দড়ির এক প্রান্ত বাঁধা আছে এবং অপরপ্রান্ত ধরে একটি লোক নির্দিষ্ট বল প্রয়োগে টানছে। থামটির কোন স্থানে দড়ি বাঁধলে লোকটির পক্ষে তা উল্টিয়ে ফেলা সহজতম হবে?
A. $10\sqrt{3}$ m B. 10m
C. $5\sqrt{2}$ m D. $10\sqrt{2}$ m
12. 2N ও 5N মানের দুইটি বল এক বিন্দুতে পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান কোনটি?
A. 12N B. 10N C. 8N D. 2N
13. ভূমির সাথে α কোণে হেলানো এক সমতলের উপর w ওজনের একটি বস্তুকে তলের সমান্তরালে P বল প্রয়োগ করে স্থির রাখা যায়। আবার পৃথকভাবে ভূমির সমান্তরালে Q বল প্রয়োগ করে ও বস্তুটিকে স্থির রাখা সম্ভব। $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ হলে নিচের কোনটি সত্য?
A. $P > Q$ B. $P = Q$ C. $P < Q$ D. $P = Q \tan \alpha$
14. দুইটি বল p ও 2p একটি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল। যদি বল দুইটি 2p ও 2p + 8 পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তবে লব্ধির দিক অপরিবর্তিত থাকে তাহলে p এর মান-
A. 2 B. 8 C. 4 D. 1
15. 10kg ওজনের একটি ঝুলন্ত বস্তুকে দুটি বল দ্বারা টেনে রাখা হয়েছে। তাদের একটি আনুভূমিক এবং অপরটি আনুভূমিকের সাথে 60° কোণে ক্রিয়ারত আছে। আনুভূমিক দিকে ক্রিয়ারত বলের মান কত?
A. $10\sqrt{3}$ kg B. $\frac{10}{\sqrt{3}}$ kg C. $\frac{10}{3}$ kg D. None
16. কোন বিন্দুতে P এবং 2P মানের দুটি বল ক্রিয়াশীল। প্রথমটিকে দ্বিগুণ করলে এবং দ্বিতীয়টির মান 8 একক বৃদ্ধি করলে লব্ধির দিক অপরিবর্তিত থাকে। P বলের মান নির্ণয় কর?
A. 12 units B. 8 units C. 4 units D. None
17. 20 মি. দীর্ঘ একটি ভারী সুষম তক্তা দুটি খুঁটির উপর আনুভূমিকভাবে সাম্যাবস্থায় রয়েছে। প্রথম খুঁটি তক্তাটির এক প্রান্তে এবং দ্বিতীয় খুঁটি তক্তাটির অপর প্রান্ত থেকে 5 মি. দূরে অবস্থিত। তক্তাটিকে না উল্টিয়ে দ্বিতীয় প্রান্তে যদি সর্বোচ্চ 50 কেজি ওজন ঝুলানো যায়। সেক্ষেত্রে তক্তাটির ওজন হবে-
A. 33.33 kg B. 50 kg C. 25 kg D. None
18. কোন বিন্দুতে দুইটি বল 120° কোণে ক্রিয়াশীল। বৃহত্তর বলটির মান 10N এবং তাদের ক্ষুদ্রতর বলের সাথে সমকোণ উৎপন্ন করলে ক্ষুদ্রতম বলের মান-
A. 4N B. 5N C. 6N D. 8N
19. 20 মিটার দীর্ঘ 225 কেজি ওজন বিশিষ্ট AB একটি সুষম বীম এর দুই প্রান্তে দুটি পিলারের উপর অবস্থিত। 75 কেজি ওজনের একটি লোক বীমের উপর A প্রান্ত হতে কত দূরে দাঁড়ালে পিলার দুটির উপর চাপের অনুপাত 3:2 হবে।
A. 2 মিটার B. 4 মিটার
C. 6 মিটার D. 8 মিটার
20. কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত p এবং 2p মানের বলদ্বয়ের লব্ধি যদি p এর ক্রিয়ারেখার উপর লম্ব হয় তবে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত?
A. 135° B. 60° C. 45° D. 120°
21. 4P এবং 3P বল দুইটি O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল এবং 5P তাদের লব্ধি। যদি কোন ছেদক তাদের ক্রিয়ারেখাকে যথাক্রমে L, M, N বিন্দুতে ছেদ করে, তবে নিম্নের কোনটি সঠিক?
A. $\frac{4}{AD} = \frac{2}{AB} + \frac{5}{AC}$ B. $\frac{4}{AD} = \frac{5}{AB} + \frac{2}{AC}$
C. $\frac{4}{AD} = \frac{9}{AB} + \frac{2}{AC}$ D. $\frac{4}{AD} = \frac{5}{AB}$

22. P, Q, R বল তিনটি কোন ত্রিভুজের A, B, C শীর্ষ বিন্দু হতে যথাক্রমে তাদের বিপরীত বাহুর লম্বাভিমুখী দিকে ক্রিয়ারত থেকে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে। কোনটি সঠিক?

A. $\frac{P}{a} = \frac{Q}{b} = \frac{R}{c}$

$$B. \frac{P}{\cos A} = \frac{Q}{\cos B} = \frac{R}{\cos C}$$

$$C. \frac{P}{\sin A} = \frac{Q}{\cos B} = \frac{R}{\tan C}$$

D. $P = Q = R$

23. 31 মিঃ দীর্ঘ একটি সুতার প্রান্তদ্বয় একই অনুভূমিক রেখায় 25 মিঃ দূরে অবস্থিত দুইটি বিন্দুতে আবদ্ধ আছে। সুতাটির এক প্রান্ত হতে 7 মিঃ দূরে তার সাথে 5 কেজি ওজনের একটি বস্তু সংযুক্ত করা হল। সুতাটির প্রত্যেক অংশের টান নির্ণয় কর।

A. $\frac{24}{5}, \frac{7}{5}$

B. $\frac{24}{3}, \frac{7}{5}$

C. $\frac{24}{5}, \frac{8}{5}$

D. $\frac{29}{3}, \frac{27}{8}$

24. দুইটি সমান বেগের মধ্যবর্তী কোণ α এবং লব্ধি যেকোন বেগের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে θ এর মান কোনটি?


A. $\frac{\alpha}{3}$

B. 2α

$\dot{C}_\alpha$

D. $\frac{a}{2}$

25. নিম্নের চিত্রানুযায়ী A বিন্দুতে একটি কণা T, S, P ও W পরিমাণের বল দ্বারা স্থিতিবস্থায় থাকে, তবে T কত?



A. W + P

B. W - P

C. $\frac{W}{P}$









D. $\frac{P^2}{W}$

OMR SHEET		17. (A) (B) (C) (D) (E)
01. (A) (B) (C) (D) (E)	09. (A) (B) (C) (D) (E)	18. (A) (B) (C) (D) (E)
02. (A) (B) (C) (D) (E)	10. (A) (B) (C) (D) (E)	19. (A) (B) (C) (D) (E)
03. (A) (B) (C) (D) (E)	11. (A) (B) (C) (D) (E)	20. (A) (B) (C) (D) (E)
04. (A) (B) (C) (D) (E)	12. (A) (B) (C) (D) (E)	21. (A) (B) (C) (D) (E)
05. (A) (B) (C) (D) (E)	13. (A) (B) (C) (D) (E)	22. (A) (B) (C) (D) (E)
06. (A) (B) (C) (D) (E)	14. (A) (B) (C) (D) (E)	23. (A) (B) (C) (D) (E)
07. (A) (B) (C) (D) (E)	15. (A) (B) (C) (D) (E)	24. (A) (B) (C) (D) (E)
08. (A) (B) (C) (D) (E)	16. (A) (B) (C) (D) (E)	25. (A) (B) (C) (D) (E)

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	A	$3R^2 = R^2 + R^2 + 2R^2 \cos \theta$ $\Rightarrow \frac{R^2}{2R^2} = \cos \theta$ $\Rightarrow \theta = 60^\circ$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
02	B	D বিন্দুর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে, $0.5(100 + W) = 2.5 W$ $\Rightarrow W = 25 \text{ kg}$
03	C	সমান্তরাল বলের সূত্র $\frac{9}{0.75} = \frac{W}{5.25} = \frac{R}{6}$ $\therefore \frac{9}{0.75} = \frac{W}{5.25}$ $\Rightarrow W = 63 \text{ kg}$
04	B	কণাটি স্থির থাকলে 7m/s ও 8m/s এর লব্ধি হবে 13m/s এর সমান ও বিপরীতমুখী $\therefore (13)^2 = (7)^2 + (8)^2 + 2 \cdot 7 \cdot 8 \cos \alpha$ [সামান্তরিক সূত্র] $\Rightarrow \cos \alpha = \frac{13^2 - 7^2 - 8^2}{2 \times 7 \times 8} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$
05	A	$\frac{T_1}{\sin 135^\circ} = \frac{T_2}{\sin 135^\circ} = \frac{20}{\sin 90^\circ}$ $\therefore T_1 = 10\sqrt{2}; T_2 = 10\sqrt{2}$
06	B	সাম্যাবস্থায়, $\frac{P}{\sin 120^\circ} = \frac{Q}{\sin 90^\circ} = \frac{5}{\sin 150^\circ}$ $\angle POQ = 150^\circ$ $Q = 10; P = 5\sqrt{3}$
07	C	ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হবে।
08	D	$R \cos \theta = 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \cos 60^\circ + \sqrt{3} \cos 120^\circ$ $= 3\sqrt{3} + \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{2}$ $R \sin \theta = 0 + 2\sqrt{3} \sin 60^\circ + \sqrt{3} \sin 120^\circ$ $= 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$ $R = \sqrt{\left(\frac{7\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{9}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{147}{4} + \frac{81}{4}} = \sqrt{\frac{228}{4}} = \sqrt{57} \text{ unit}$
09	B	$R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta$ $\Rightarrow 10 = 2 + Q^2 + 2\sqrt{2} Q \cos 45^\circ \Rightarrow 8 = Q^2 + 2Q$ $\Rightarrow Q^2 + 2Q - 8 = 0$ $\therefore Q = 2, -4 \text{ কিন্তু, } Q \neq -4 \therefore Q = 2$

উত্তর		গণিত ২য় পত্র	ব্যাখ্যা	
10	D		$F \cos \theta = 7 \cos 0^\circ + 5 \cos 120^\circ + 3 \cos 240^\circ = 3$ $F \sin \theta = 7 \sin 0^\circ + 5 \sin 120^\circ + 3 \sin 240^\circ = \sqrt{3}$ $\therefore F = 2\sqrt{3}$  যেহেতু একমাত্র Option D তে লব্ধি = $2\sqrt{3}$ একক	
11	D		CD = 20m, B বিন্দুর সাপেক্ষে F বলের ভ্রামক যত বেশি হবে, লোকটির পক্ষে খাম উল্লিখে ফেলা তত সহজ হবে। B বিন্দুর সাপেক্ষে F বলের ভ্রামকের মান- $= F \cdot BE = F \cdot DB \sin \theta$ $= F \cdot CD \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{F \cdot CD}{2} \sin 2\theta$ ভ্রামকের মান সর্বাধিক হবে যদি $\sin 2\theta$ এর মান 1 হয় অর্থাৎ $\theta = 45^\circ$ হয় এখন, $BC = CD \sin \theta = 20 \times \sin 45^\circ = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \text{m}$ সুতরাং, ভূমি থেকে $10\sqrt{2} \text{m}$ উঁচুতে দড়ি বাঁধতে হবে। BD = 20m. ধরি, A তে বাঁধতে হবে। এখন, $BE = BC \sin \theta = AC \cos \theta \sin \theta$ $= 20 \sin \theta \cos \theta = 10 \sin 2\theta$ উল্লিখে ফেলা সহজ হবে যদি F বলের মোমেন্ট সর্বাধিক হয়। B এর প্রেক্ষিতে F বলের মোমেন্ট = $F \cdot BE$ $= 10 F \sin 2\theta$ মোমেন্ট সর্বোচ্চ হবে যদি $\sin 2\theta = 1$ $\Rightarrow \theta = 45^\circ$ হয়। আর $\theta = 45^\circ$ হলে $x = 20 \sin 45^\circ = 10\sqrt{2}$। Shortcut: রাশিটি থামের $\frac{1}{\sqrt{2}}$ দৈর্ঘ্য বাধলে Moment সর্বোচ্চ হয়। 	
12	D		$\therefore$ লব্ধির মান = 2N 	
13	C		$P = W \sin \alpha, Q = W \tan \alpha$ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \rightarrow \tan \alpha > \sin \alpha$ $\therefore Q > P$	
14	C		$\frac{P}{2p} = \frac{P + 2P}{2P + (2P + 8)} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{3P}{4P + 8}$ $\Rightarrow 4P + 8 = 6P \therefore P = 4$	
15	B		$\frac{W}{\sin 120^\circ} = \frac{P}{\sin 150^\circ}$ $\Rightarrow P = \frac{10 \sin 150^\circ}{\sin 120^\circ}$ $= \frac{10}{\sqrt{3}} \text{kg}$ 	
16	C		$\frac{P}{2P} = \frac{2P}{(2P + 8)} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{2P}{2P + 8}$ $\Rightarrow 4P = 2P + 8$ বা, $2P = 8 \therefore P = 4$	
17	B		$W \times OC = 50 \times BC$ $\Rightarrow W \times (10 - 5) = 50 \times 5$ $\therefore W = 50 \text{kg} - \text{wt}$ 	
18	B		$P + Q \cos \alpha = 0$ $P = -Q \cos \alpha = -10 \cos 120^\circ$ $P = 5$ 	
19	A		$\sum M_A = 0$ $\therefore 75x + 225 \times 10 = 120 \times 20$ $\therefore x = 2 \text{m}$ 	
20	D		P বরাবর লম্বাংশ $P + 2p \cos \alpha = 0$ $\Rightarrow \cos \alpha = -\frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 120^\circ$ 	
21	B		$\frac{R}{AD} = \frac{P}{AC} + \frac{Q}{AB}$ [লম্বাংশ উপপাদ্য মতে $R_x = P_x + Q_x$] $\therefore \frac{4}{AD} = \frac{5}{AB} + \frac{2}{AC}$	
22	A		$\vec{P} + \vec{Q} + \vec{R} = 0 \Rightarrow \frac{P}{\sin \text{EOF}} = \frac{Q}{\sin \text{DOF}} = \frac{R}{\sin \text{DOE}}$ $\Rightarrow \frac{P}{\sin A} = \frac{Q}{\sin B} = \frac{R}{\sin C}$ $\therefore \frac{P}{a} = \frac{Q}{b} = \frac{R}{c}$	
23	A		$24^2 + 7^2 = 25^2 \therefore \frac{T_1}{BC} = \frac{T_2}{AB} = \frac{W}{AC}$ $\therefore T_1 = \frac{24}{5} \therefore T_2 = \frac{7}{5}$ ধরি, সমান বেগের মান = P লব্ধি যে কোন বেগের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে লব্ধির দিক,	
24	D		$\tan \theta = \frac{P \sin \alpha}{P + P \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \tan \frac{\alpha}{2}$ $\Rightarrow \theta = \frac{\alpha}{2}$; দুটি বল সমান অর্থাৎ $P = Q$ হলে $\theta = \frac{\alpha}{2}$	
25	B		বলগুলো স্থিতিস্থাপক থাকে $\therefore$ P এবং P-এর উপর লম্ব বরাবর বলগুলোর লম্বাংশের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য। $\therefore P \cos 0^\circ + T \cos 90^\circ + S \cos (90^\circ + 45^\circ) + W \cos 270^\circ = 0$ বা, $P - S \sin 45^\circ$ বা, $P = \frac{S}{\sqrt{2}}$ ----- (i) এবং $P \sin 0^\circ + T \sin 90^\circ + S \sin (90^\circ + 45^\circ) + W \sin 270^\circ = 0$ বা, $T + S \cos 45^\circ - W = 0$ বা, $T + \frac{S}{\sqrt{2}} - W = 0$ $\therefore T = W - \frac{\sqrt{2}P}{\sqrt{2}} = W - P$	



সমজলে চলমান বস্তুর গতি

STEP 01 SUGGESTION এ অধ্যায় থেকে ০১-০২ টা প্রশ্ন আসতে পারে।

TOPIC NO.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	গুরুত্ব
01	বেগের সামান্তরিক সূত্র সংক্রান্ত সমস্যাবলী	**
02	নৌকা, নদী ও শ্রোত সংক্রান্ত	***
03	গড়বেগ, আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত	*
04	গতির সাধারণ সূত্রাবলীর ব্যবহার সংক্রান্ত	***
05	t-তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব	***
06	বুলেটের ক্রিয়ায় তক্তার বেগ, সরণ ও সংখ্যা সংক্রান্ত	**
07	তীর্থকভাবে নিক্ষিপ্ত/প্রাসের গতিসংক্রান্ত সমস্যাবলী	**
08	উল্লেখ্য নিক্ষিপ্ত/গড়ন্ত বস্তুর গতি বিষয়ক	***
09	h-উচ্চতা হতে উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি	***

STEP 02 DISCUSSION সাজেশনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রয়োগ

গতিবিদ্যার প্রাথমিক ধারণা

□ গতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন অবস্থার v-t গ্রাফ:


গ্রাফ নং	অবস্থা	v-t গ্রাফ
01	স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করলে	
02	নির্দিষ্ট বেগে যাত্রা শুরু করলে	
03	সমবেগে যাত্রা করলে	
04	সমমন্দনে যাত্রা করলে	
05	সমত্বরণে যাত্রা শুরু করে সমমন্দনে যাত্রা শেষ হলে	
06	স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে যথাক্রমে সমত্বরণ, সমবেগ ও সমমন্দনে গেলে	

TOPIC 01 বেগের সামান্তরিক সূত্র সংক্রান্ত সমস্যাবলী

Technique:

P ও Q মানের দুটি সমবিন্দু বেগের মধ্যবর্তী কোণ α এবং লব্ধি R হলে,

- $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$
- যদি লব্ধি R, Q বেগের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে তবে $\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$



- $\alpha = 0$ হলে বৃহত্তম লব্ধি, $R_{\max} = P + Q$
- $\alpha = 180^\circ$ হলে ক্ষুদ্রতম লব্ধি, $R_{\min} = P - Q$
- $\alpha = 90^\circ$ হলে লব্ধি, $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$

এবং $\tan \theta = \frac{Q}{P}$

vi. $P = Q$ হলে $R = \sqrt{P^2 + P^2 + 2P^2 \cos \alpha}$
 $= \sqrt{2P^2(1 + \cos \alpha)} = \sqrt{2P^2 \cdot 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}$
 $= 2P \cos \frac{\alpha}{2}$

অর্থাৎ, $\theta = \frac{\alpha}{2}$;

অর্থাৎ দুটি সমমানের বেগের লব্ধি তাদের অন্তর্গত কোণকে সমদ্বিখলিত করে।

LAW STORMING MODEL EXAMPLE

MEEx 01 একটি কণার উপর 2m/sec, 3m/sec. ও 5m/sec. মানের তিনটি বেগ এমন তিনটি দিকে আরোপ করা হলো যেন কণাটি স্থিতিশীল থাকে। ক্ষুদ্রতম মানের বেগ দুটির মধ্যবর্তী কোণের পরিমাপ কত? [DU. 10-11]

Solve ক্ষুদ্রবেগ দুটির মধ্যবর্তী কোণ α হলে,
 $5^2 = 2^2 + 3^2 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cos \alpha$
 $\Rightarrow 12 \cos \alpha = 12 \Rightarrow \cos \alpha = 1$
 $\therefore \alpha = \cos^{-1}(1) = 0^\circ$

TOPIC 02 নৌকা, নদী ও শ্রোত সংক্রান্ত

□ নৌকার বেগ P, শ্রোতের বেগ Q এবং নদীর প্রস্থ d হলে-

- শ্রোতের অনুকূলে বেগ $= P + Q$
- শ্রোতের প্রতিকূলে বেগ $= P - Q$
- ন্যূনতম দূরত্বে নদী পার/ সোজাসুজি নদী পার/ সমকোণে পৌছানো/ লম্বালম্বিভাবে নদী পার হতে লব্ধি বেগ $R = \sqrt{P^2 - Q^2}$

(iv) শ্রোতের অনুকূলে যেতে প্রয়োজনীয় সময়, $t_1 = \frac{d}{P + Q}$ [$s = vt$]

(v) শ্রোতের প্রতিকূলে যেতে প্রয়োজনীয় সময়, $t_2 = \frac{d}{P - Q}$

ন্যূনতম দূরত্বে পারাপার প্রয়োজনীয় সময় $t = \frac{d}{\sqrt{P^2 - Q^2}}$

(vi) ন্যূনতম সময়ে নদী পারাপারের ক্ষেত্রে লব্ধি বেগ $R = P \sin \alpha$ এবং নদী পারাপারের জন্য সময় $t = \frac{d}{P \sin \alpha}$

□ $\alpha = 90^\circ$ হলে অর্থাৎ P ও Q পরস্পর লম্ব হলে (নদীর প্রস্থ বরাবর যাত্রা শুরু করলে) সবচেয়ে কম সময়ে নদী পার হবে এবং এই সময় $t_{\min} = \frac{d}{P}$

$\Rightarrow \cos \alpha = -\frac{P}{Q}$

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEx 01 শ্রোতহীন অবস্থায় 100 m প্রশস্ত একটি নদী একজন সাতার 4 মিনিটে সোজাসুজি পার হতে পারে। কিন্তু শ্রোত থাকলে এ একই পথে তিনি নদীতে 5 মিনিটে অতিক্রম করতে পারেন। শ্রোতের গতিবেগ নির্ণয় কর। [BUET. 03-04; RUET. 12-13, 10-11, 06-07; RU. 09-10; IU. 15-16; KU. 09-10]

Solve $u = \frac{100}{4} = 25 \text{ m/min}$ [s = vt]

সোজাসুজি পার হবার ক্ষেত্রে লব্ধি বেগ = $\sqrt{u^2 - v^2} = \frac{100}{5}$
 $\Rightarrow u^2 - v^2 = 20^2$
 $v^2 = u^2 - 20^2 = 25^2 - 20^2 = 15 \text{ m/min}$

TOPIC 03 গড়বেগ, আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত

Type-01: (আপেক্ষিক বেগ)

Technique:

- দুটি বস্তু যখন একই দিকে গমন করে, তখন
 A বস্তুর সাপেক্ষে B বস্তুর আপেক্ষিক বেগ = $V_B - V_A$ এবং
 B বস্তুর সাপেক্ষে A বস্তুর আপেক্ষিক বেগ = $V_A - V_B$
- দুটি বস্তু যখন পরস্পর বিপরীত দিকে গমন করে, তখন
 A বস্তুর সাপেক্ষে B বস্তুর আপেক্ষিক বেগ = $V_A + V_B$
 B বস্তুর সাপেক্ষে A বস্তুর আপেক্ষিক বেগ = $V_A + V_B$

Type-02: (গড় বেগ)

Technique:

গড় দ্রুতি = $\frac{\text{মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}}$
 গড় বেগ = $\frac{\text{সরণ}}{\text{মোট সময়}}$

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEx 01 A ও B দুইটি বস্তু পূর্ব পশ্চিম 70m লম্ব একটি সোজা রাস্তার দুইপ্রান্ত থেকে বিপরীত মুখে যথাক্রমে 40m/sec এবং 30m/sec বেগে যাত্রা শুরু করল। A এর সাপেক্ষে B এর আপেক্ষিক বেগ হবে- [BSMRSTU-A. 17-18]

Solve $V_{AB} = V_B + V_A = 40 + 30 = 70 \text{ m/sec}$

TOPIC 04 গতির সাধারণ সূত্রাবলীর ব্যবহার সংক্রান্ত

- $v = u + ft$
- $s = ut + \frac{1}{2} ft^2$
- $v^2 = u^2 + 2fs$
- $s = \left(\frac{u+v}{2}\right)t$
- সমবেগের ক্ষেত্রে $s = vt$
- $F = ma = m \frac{v-u}{t} = m \frac{\Delta v}{t} = m \frac{dv}{dt}$

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEx 01 একটি চলন্ত ট্রেন ব্রেক করে 10 সেকেন্ডে থামিয়ে দেওয়া হলো। ট্রেনটির গড় মন্দন 70 m/sec^2 হলে এর গতিবেগ কত ছিল? [DU. 18-19]

Solve শেষ $v = u + at$
 $\Rightarrow 0 = u + (-70) \cdot 10 \Rightarrow u = 700 \text{ m/sec}$

MEx 02 একটি গাড়ি হিরাবহা হতে সমত্বরণে চলা শুরু করে 5.0 সেকেন্ডে 75 মি/সে: গতিবেগে প্রাপ্ত হল। গাড়িটির ত্বরণ- [JnU. 15-16, 12-13; DU. 04-05]

Solve এক্ষেত্রে, $u = 0 \text{ m/s}$, $v = 75 \text{ m/s}$, $t = 5 \text{ s}$

$\therefore$ গাড়িটির ত্বরণ $a = \frac{v-u}{t} = \frac{75-0}{5} = 15 \text{ m/s}^2$

TOPIC 05 t-তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব

- t-তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব $S_{th} = u + \frac{1}{2}f(2t-1)$
- আদিবেগসহ কোন বস্তু সমত্বরণে t_1 -তম সেকেন্ডে s_1 ও t_2 -তম সেকেন্ডে s_2 দূরত্ব অতিক্রম করলে ত্বরণ $a = \frac{s_1 - s_2}{t_1 - t_2}$

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEx 01 স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা করে একটি কণা 3 সেকেন্ডে 18m অতিক্রম করলে 8র্থ সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? [JU. 18-19]

Solve $18 = 0 \times 3 + \frac{1}{2}f \times 3^2 \Rightarrow f = \frac{18 \times 2}{9} = 4 \text{ ms}^{-2}$

$\therefore S_{4th} = u + \frac{1}{2}f(2t-1) = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times (2 \times 4 - 1) = 14 \text{ m}$

TOPIC 06 বুলেটের ক্রিয়ায় তক্তার বেগ, সরণ ও সংখ্যা সংক্রান্ত

Technique:

- বেগের মান = $\sqrt{\text{ভেদকৃত তক্তার সংখ্যা}}$
- কোন গুলির বেগ n গুণ করা হলে গুলিটি n^2 টি তক্তা ভেদ করবে।
- একটি বুলেট m সংখ্যক তক্তা ভেদ করতে পারে। যদি এর বেগ n গুণ করা হয়, তবে এ বুলেট দ্বারা মোট ভেদকৃত তক্তার সংখ্যা = $m \times n^2$
- একটি বুলেট m সংখ্যক তক্তা ভেদ করতে পারে। এ বেগ বৃদ্ধির কারণে যদি এ বুলেট দ্বারা ভেদকৃত তক্তার সংখ্যা n হলে বুলেটটির বেগ $v = \sqrt{\frac{n}{m}}$ গুণ।
- কোন গুলি একটি তক্তা ভেদ করতে তার বেগের $\frac{1}{n}$ অংশ হারালে খেমে যাবার পূর্বে সেটি মোট তক্তা ভেদ করতে = $\frac{n}{2}$ টি (দশমিক বাদ দিয়ে শুধু পূর্ণমান)।

- একটি বুলেট কোন দেয়ালের মধ্যে s দূরত্ব যাওয়ার পর যদি এর বেগ $\frac{1}{n}$ অংশ হারায়, তবে এ বুলেট দ্বারা আরও অতিক্রান্ত দূরত্ব/সরণ = $\frac{(n-1)^2}{2n-1} \times s$

Note: হারানো বেগ = $\frac{1}{2}$ বা আদিবেগের অর্ধেক হলে দূরত্ব/সরণ = $\frac{s}{3}$; $\frac{1}{3}$ হলে সরণ = $\frac{s}{8}$, 75% হলে দূরত্ব বা সরণ = $\frac{s}{15}$

LAW STORMING

MODEL EXAMPLE

MEx 01 একটি বুলেট কোন দেয়ালের মধ্যে 2 ইঞ্চি ঢুকান পর উহার অর্ধেক বেগ হারায়। বুলেটটি দেয়ালের মধ্যে আরও কত দূর ঢুকবে? [JU. 16-17; IU. 16-17; RU. 16-17; DU. 09-10; CoU. 18-19]

Solve এক্ষেত্রে, $\frac{1}{n} = \frac{1}{2} \therefore n = 2, s = 2$

$\therefore x = \frac{s}{n^2 - 1} = \frac{2}{2^2 - 1} = \left(\frac{2}{3}\right)$

TOPIC 07 তীর্থকভাবে নিক্ষেপ/প্রাসের গতিসংক্রান্ত সমস্যাবলী

□ প্রক্ষেপক/ প্রাস:

আনুভূমিকের সাথে কোন বস্তুকে তীর্থকভাবে শূন্যে নিক্ষেপ করা হলে ঐ নিক্ষেপ বস্তুকে প্রাস/ প্রক্ষেপক বলে।


→ যে বিন্দু হতে বস্তুকে নিক্ষেপ করা হয় তাকে প্রক্ষেপক বিন্দু বলে এবং যে বেগে নিক্ষেপ করা হয় তাকে নিক্ষেপন বেগ বলে।

□ প্রাসের গতি:

O বিন্দু হতে একটি প্রাসকে u আদিবেগে আনুভূমিকের সাথে α কোণে নিক্ষেপ করলে প্রাসটি t সময় পর P(x,y) বিন্দুতে এসে v বেগ প্রাপ্ত হলে-

→ X-অক্ষ বরাবর u এর উপাংশ = $u \cos \alpha$

→ Y - " " u " " = $u \sin \alpha$

□ কোন বস্তুকে u আদিবেগে আনুভূমিকের সাথে α কোণে নিক্ষেপ করলে-

i. উত্থানকাল $t_1 = \frac{u \sin \alpha}{g}$

ii. পতনকাল $t_2 = \frac{u \sin \alpha}{g}$

iii. বিচরণকাল/উড্ডয়নকাল $T = t_1 + t_2 = \frac{2u \sin \alpha}{g}$

iv. সর্বাধিক উচ্চতা, $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

v. আনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$

vi. সর্বাধিক আনুভূমিক পাল্লা $R_{\max} = \frac{u^2}{g}$ [যখন $\alpha = 45^\circ$]

অর্থাৎ কোন বস্তুকে আনুভূমিকের সাথে 45° কোণে নিক্ষেপ করা হলে বস্তুর পাল্লা সর্বাধিক হবে।

vii. আনুভূমিক দূরত্ব, $x = u \cos \alpha t$ [$s = ut + \frac{1}{2}gt^2$ সূত্র হতে এবং আনুভূমিক দিকে $g = 0$]

viii. উল্লম্ব দূরত্ব $y = u \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$

ix. α কোণে নিক্ষেপ কোন প্রাস আনুভূমিক x দূরত্বে অবস্থিত y উচ্চতায় কোন বস্তুকে আঘাত করলে, $y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \alpha}$

x. $\alpha = 45$ হলে $\tan \alpha = \frac{4H}{R} \Rightarrow 4H_{\max} = R$

□ বিভিন্ন এককে অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মান-

C.G.S পদ্ধতি	F.P.S পদ্ধতি	M.K.S পদ্ধতি
$g = 981 \text{ cm/sec}^2$	$g = 32 \text{ ft/sec}^2$	$g = 9.81 \text{ m/sec}^2$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 যদি u বেগে আনুভূমিকের সাথে α কোণে প্রক্ষিপ্ত বস্তু T সময়ে তার গতিপথের সর্বোচ্চ উচ্চতা H এ পৌঁছায়, তবে $\frac{H}{T^2}$ হবে।

[DU. 17-18, 01-02; IU. 14-15; JnU. 07-08]

Solve উত্থানকাল t এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা H হলে $t = \frac{u}{g}$ এবং $H = \frac{u^2}{2g}$ [সর্বোচ্চ উচ্চতার ক্ষেত্রে]

$$\therefore \frac{H}{t^2} = \frac{\frac{u^2}{2g}}{\left(\frac{u}{g}\right)^2} = \frac{g}{2}$$

MEx 02 32 ft/sec আদিবেগে এবং ভূমির সাথে 30° কোণে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা হলো। ইহার আনুভূমিক পাল্লা- [DU. 13-14; JnU. 17-18; JU. 18-19]

Solve আনুভূমিক পাল্লা,

$$R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{(32)^2 \cdot \sin 2 \cdot 30^\circ}{32} = 16\sqrt{3} \text{ ft}$$

TOPIC 08 উল্লম্ব নিক্ষেপ/পড়ন্ত বস্তুর গতি বিষয়ক

উল্লম্ব গতির ক্ষেত্রে-

i. $v = u \pm gt$

ii. $h = ut \pm \frac{1}{2}gt^2$

iii. $v^2 = u^2 \pm 2gh$

iv. উত্থানকাল = পতনকাল

Note: A. বস্তু উপর হতে নিচে পড়লে '+' এবং নিচে হতে উপরে উঠলে '-' হবে।

B. পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে $u = 0$ হবে।

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 10 মি./সে. বেগে খাড়া উর্ধ্বগামী একটি বেলুন থেকে এককণা পান্থ ফেলে দেয়া হল। পান্থরখন্ডটি 10 সেকেন্ডে ভূমিতে পতিত হলে, কত মিটার উচ্চতা থেকে পান্থরখন্ডটি ফেলা হয়েছিল? [RU. 17-18; BUET. 13-14; CUET. 14-15; BUTex. 13-14]

Solve h উচ্চতা হতে পান্থরখন্ডটি পতিত হলে,

$$h = -10 \times 10 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 10^2 = 390 \text{ m.}$$

MEx 02 100 মিটার উঁচু পাহাড় থেকে একটি পান্থর ছেড়ে দিলে ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগবে? [NSTU. 19-20]

Solve $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 100}{9.8}} = 4.52 \text{ sec}$

TOPIC 09 h-উচ্চতা হতে উর্ধ্ব নিক্ষেপ বস্তুর গতি

i. ভূমির উর্ধ্ব h উচ্চতা হতে u বেগে উল্লম্বভাবে উপরে নিক্ষেপ একটি বস্তু কণা t সময়ে ভূমিতে v বেগে পতিত হলে-

A. $h = -ut + \frac{1}{2}gt^2$ (ii) $v = -u + gt$

ii. পড়ন্ত বস্তু পতনের শেষ t sec এ h দূরত্ব অতিক্রম করলে পতনের মোট সময় = $\left(\frac{t}{2} + \frac{h}{gt}\right) \text{ sec}$

LAW STORMING | MODEL EXAMPLE

MEx 01 কোন স্তম্ভের শীর্ষ হতে 19.5m/sec বেগে খাড়া উপরের দিকে একটি কণা 5 sec পরে স্তম্ভের পাদদেশে পতিত হলে স্তম্ভের উচ্চতা- [DU. 11-12, 07-08, 05-06; JnU. 06-07]

Solve এক্ষেত্রে, $u = 19.5 \text{ m/s}$,
 $t = 5 \text{ s}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

$$\therefore h = -u + \frac{1}{2}gt^2$$

$$= -19.5 \times 5 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 = 25 \text{ m}$$

[∵ স্তম্ভের শীর্ষ হতে বস্তু খাড়া উপরে প্রক্ষিপ্ত হয়]

STEP 03 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নের ভিত্তিতে সমাধান

STEP 01 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. ভূমি থেকে শূন্যে নিক্ষেপিত একটি বল 100 মিটার দূরে ভূমিতে ফিরে আসে। সেটির বিচরণপথের সর্বাধিক উচ্চতা $\frac{75}{4}$ মিটার হলে নিক্ষেপণ কোণ কত? [GST-A. 2022-2023]

- A. $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ B. $\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$ C. $\sin^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$ D. $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$
- [S@Why]** $\tan \alpha = \frac{4H}{R} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{4 \times \frac{75}{4}}{100}$
 $\Rightarrow \tan \alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \frac{3}{4} \therefore \alpha = \cos^{-1} \frac{4}{5}$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

[Jগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়]

01. প্রোতের বেগের মানের $\sqrt{2}$ গুণ মানের বেগে সোতার কেটে একজন সোতার নদীর অপর পাড়ে সোজাসুজি গিয়ে পৌঁছল। নদীর তীরের সাথে সোতার বেগের নতি নির্ণয় কর। [RU. 17-18, IU. 07-08]

- A. 90° B. 105° C. 135° D. 150°
- [S@Why]** সোতার বেগ u এবং প্রোতের বেগ v হলে, সোজাসুজিভাবে পার হতে উৎপন্ন কোণ, $\cos \alpha = \left(-\frac{v}{u}\right)$
 $\therefore$ তীরের সাথে সোতার বেগের নতি, $\alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 135^\circ$

02. 32 ft/sec আদিবেগে এবং ভূমির সাথে 15° কোণে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা হলো। ইহার আনুভূমিক পাল্লা কত হবে? [JnU. 17-18]

- A. $16\sqrt{3}$ ft B. 32 ft C. 16 ft D. $32\sqrt{3}$ ft
- [S@Why]** আনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{(32)^2 \sin 2 \cdot 15^\circ}{32} = 16$ ft

03. একটি বস্তু উপর থেকে মুক্তভাবে 4 সেকেন্ডে পড়ল। বস্তুটি শেষের 2 সেকেন্ডে কত ফুট পড়েছিল? [JnU. 16-17]

- A. 128 ft B. 16 ft C. 96 ft D. 192 ft
- [S@Why]** 4 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব $= \frac{1}{2} \times 32 \times 4^2 = 256$ ফুট

আবার, প্রথম 2 সেকেন্ডে পড়েছিল $= \frac{1}{2} \times 32 \times 2^2 = 64$ ফুট
 $\therefore$ শেষের 2 সেকেন্ডে পড়েছিল $= (256 - 64) = 192$ ফুট

04. একটি গাড়ি স্থিরাবস্থা হতে সমত্বরণে চলা শুরু করে 5.0 সেকেন্ডে 75 মি/সে: গতিবেগে প্রাপ্ত হল। গাড়িটির ত্বরণ- [JnU. 15-16, 12-13; DU. 04-05]

- A. 15 m/s^2 B. 12 m/s^2 C. 18 m/s^2 D. 7 m/s^2
- [S@Why]** এক্ষেত্রে, $u = 0 \text{ m/s}$, $v = 75 \text{ m/s}$, $t = 5 \text{ s}$
 $\therefore$ গাড়িটির ত্বরণ $a = \frac{v - u}{t} = \frac{75 - 0}{5} = 15 \text{ m/s}^2$

05. একটি গাড়ি স্থিরাবস্থা থেকে সমত্বরণে চলা শুরু করে 5 sec এ 80 m/s গতিবেগে প্রাপ্ত হল। গাড়িটির ত্বরণ- [JnU. 12-13]

- A. 15 m/s^2 B. 20 m/s^2 C. 16 m/s^2 D. 30 m/s^2
- [S@Why]** $a = \frac{v - u}{t} = \frac{80 - 0}{5} = 16 \text{ m/s}^2$

06. $s = 6 + 4t - t^2$ হলে 2 সে. পর এর ত্বরণ কত হবে? [JnU. 11-12]

- A. 4 m/s^2 B. -4 m/s^2 C. 2 m/s^2 D. -2 m/s^2
- [S@Why]** $v = \frac{ds}{dt} = 4 - 2t \Rightarrow a = \frac{dv}{dt} = -2$
 $\therefore$ 2 সে. পর ত্বরণ $= -2 \text{ m/s}^2$

07. একটি প্রক্ষেপকের সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছাবার সময়কাল কত? [JnU. 11-12; RU. 16-17]

- A. $\frac{u^2}{g}$ B. $\frac{u \sin \alpha}{g}$ C. $\frac{u \sin \alpha}{2g}$ D. $\frac{u}{2g}$
- [S@Why]** সরাসরি সূত্র।

[খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়]

01. একটি বস্তু উল্লম্ব ভাবে নিক্ষেপিত হলে সর্বাধিক উচ্চতা ও ঐ উচ্চতায় পৌঁছাবার সময় কত হবে? [KU. 18-19]

- A. $\frac{u^2}{2g}, \frac{u}{2g}$ B. $\frac{u^2}{2g}, \frac{u}{g}$ C. $\frac{u^2}{g}, \frac{u}{g}$ D. $\frac{u^2}{g}, \frac{2u}{g}$
- [S@Why]** সূত্র

02. 15 kg ভরের একটি গোলা 6.56 ft দীর্ঘ একটি কামানের নলের মুখ থেকে 4 m/s বেগে নির্গত হয়। গোলাটির উপর প্রযুক্ত বলের মান কত? [KU. 17-18]

- A. 60 N B. 90 N C. 120 N D. 60 kg-wt
- [S@Why]** প্রযুক্ত বলের মান,
 $F = ma = m \frac{v^2}{2s} = 15 \times \frac{4^2}{2 \times 2} = 60 \text{ N}$ Ans. [6.56 ft = 1.999m]

03. একটি কণাকে $a \text{ m/sec}$ আদিবেগে আনুভূমিক রেখার সঙ্গে 30° কোণে প্রক্ষেপ করা হল। কণাটির সর্বাধিক উচ্চতা b মিটার হলে, $b = ?$ [KU. 17-18; DU. 97-98]

- A. $\frac{a^2}{2g}$ B. $\frac{a^2}{4g}$ C. $\frac{a^2}{8g}$ D. $\frac{a^2}{2g^2}$
- [S@Why]** জানা আছে যে, সর্বাধিক উচ্চতা, $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

এক্ষেত্রে, $H = b$, $u = a \text{ m/s}$, $\alpha = 30^\circ$
 $\therefore b = \frac{a^2 \sin^2 30^\circ}{2g} = \frac{a^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2g} = \frac{a^2}{8g}$

04. কোন সাইকেল আরোহী একখানা ইঞ্জিনের 84 মিটার পশ্চাৎ হতে 20 মিটার/সে. সমবেগে ইঞ্জিনের দিকে যাত্রা শুরু করল। একই সময়ে ইঞ্জিনটি 2 মিটার/সে.² সমত্বরণে সম্মুখের দিকে যাত্রা শুরু করল। তারা প্রথম কখন মিলিত হবে? [KU. 16-17; IU. 11-12]

- A. 5 সেকেন্ড পর B. 6 সেকেন্ড পর C. 8 সেকেন্ড পর D. 7 সেকেন্ড পর
- [S@Why]** তারা t সেকেন্ড পর মিলিত হবে।

সাইকেল আরোহীর অতিক্রান্ত দূরত্ব $= vt = 20t$
 এবং ইঞ্জিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব $= \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times t^2 = t^2$;
 প্রশ্নমতে, $t^2 = 84 + 20t$
 $\therefore t = 6 \text{ s}, 14 \text{ s}$

05. চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির $\frac{1}{6}$ হলে, 12 মি./সে. আদিবেগে নিক্ষেপিত বস্তু চাঁদের তল হতে কত মিটার উপরে উঠতে পারে? [KU. 15-16]

- A. 44.08 B. 45.08 C. 46.08 D. 47.08
- [S@Why]** $H = \frac{u^2}{2g_1} = \frac{12^2}{2 \times \left(\frac{g}{6}\right)} = \frac{144 \times 6}{2 \times 9.8} = 44.08 \text{ m}$

06. আনুভূমিকের সাথে α কোণে u বেগে প্রক্ষিপ্ত কণার আনুভূমিক পাল্লা $R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$ । প্রক্ষেপণ কোণ α কত হলে R বৃহত্তম হবে? [KU. 14-15; ব.বো. ২০১৯]

- A. 30° B. 60° C. 45° D. 90°
- [S@Why]** $\alpha = 45^\circ$ হলে পাল্লা সর্বোচ্চ হয়।

07. একটি কণা v বেগে নিক্ষেপ হলে যদি তার আনুভূমিক পাল্লা বৃহত্তম উচ্চতায় দ্বিগুণ হয়, তবে তার আনুভূমিক পাল্লা-

[KU. 14-15]

A. $\frac{8v^2}{5g}$ B. $\frac{v^2}{5g}$ C. $\frac{2v^2}{5g}$ D. $\frac{4v^2}{5g}$

[SOWhy] আনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{v^2 \sin 2\alpha}{g}$ এবং

বৃহত্তম উচ্চতা, $H = \frac{v^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

$\therefore$ প্রশ্নমতে, $R = 2H \Rightarrow \frac{v^2 \sin 2\alpha}{g} = 2 \times \frac{v^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

$\Rightarrow 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin^2 \alpha \Rightarrow 2 \cos \alpha = \sin \alpha$

$\Rightarrow \tan \alpha = 2 \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} 2 \Rightarrow 2\alpha = 2 \tan^{-1} 2$

$\Rightarrow 2\alpha = \sin^{-1} \frac{2.2}{1+2^2} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{4}{5}$

$\therefore$ আনুভূমিক পাল্লা = $\frac{v^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{4v^2}{5g}$

08. শূন্যে নিক্ষেপ একটি পাথর ঋতুর সর্বাধিক পাল্লার মান 120ft হলে সর্বোচ্চ উচ্চতার মান-

[KU. 12-13]

A. 60ft B. $60\sqrt{3}$ ft
C. 120ft D. 240 ft


[SOWhy] সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{R_{\max}}{2} = \frac{120}{2} = 60$ ft

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি বাঘ 20 মিটার দূরত্বে একটি হরিণকে দেখতে পেয়ে স্থিরাবস্থা থেকে 3 মিটার/সেকেন্ড² ত্বরণে হরিণটির পশ্চাতে দৌড়ালো। হরিণটি 13 মিটার/সেকেন্ড² সমবেগে চললে, আদি অবস্থান হতে কত দূরত্বে বাঘ হরিণটিকে ধরবে?

[IU. 18-19; KUET. 16-17]

A. 120 B. 130
C. 140 D. 150

[SOWhy] $x = 13t$ (i) 

$x + 20 = 0 + \frac{1}{2} \times 3 \times t^2$

(ii) - (i)

$20 = \frac{1}{2} \times 3t^2 - 13t$

$\Rightarrow 20 = \frac{3t^2 - 26t}{2} \Rightarrow 3t^2 - 26t - 40 = 0$

$\Rightarrow 3t^2 - 30t + 40 - 40 = 0$

$\Rightarrow 3t(t - 10) + 4(t - 10) = 0$

$t = 10, t = -\frac{4}{3} [\therefore t \neq -\frac{4}{3}]$

$\therefore x = 13 \times 10 = 130$

$x + 20 = 130 + 20 = 150$ m

$\therefore$ 150m দূরে বাঘ হরিণটিকে ধরবে।

02. অবাধে পড়ন্ত কোনো বস্তু 4-তম সেকেন্ডে কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে?

[IU. 17-18]

A. 50.2 B. 44.3
C. 39.2 D. 34.3

[SOWhy] $S_{th} = u + \frac{1}{2} f(2t-1) = 0 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times (2 \times 4 - 1) = 34.3$ m

03. 60ft/sec গতিবেগে চলন্ত একটি গাড়ীকে 5ft/sec² মন্দন সৃষ্টি করে ষ্টেশনে থামানো হলো। ব্রেক প্রয়োগের স্থান হতে ষ্টেশনের দূরত্ব কত? [IU. 14-15]

A. 200 ft B. 350 ft C. 360 ft D. 270 ft

[SOWhy] এখানে, আদিবেগ,

$u = 60$ ft/sec, শেষবেগ, $v = 0$ ft/sec এবং

মন্দন, $f = 5$ ft/sec²; ধরি, দূরত্ব = s

$\therefore v^2 = u^2 - 2fs \Rightarrow s = \frac{u^2 - v^2}{2f} = \frac{60^2 - 0^2}{2 \times 5} = 360$ ft

04. একটি কণা সমত্বরণে চলে তার গতির সপ্তম ও একাদশতম সেকেন্ড যথাক্রমে 80m এবং 120m দূরত্ব অতিক্রম করল। কণাটি 18 সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? [IU-E. 14-15]

A. 3600m B. 4890m C. 1890m D. 2.4km

[SOWhy] $a = \frac{120 - 80}{11 - 7} = 10$ ms⁻²

$s_7 = u + \frac{1}{2} a(2t - 1)$

বা, $80 = u + \frac{1}{2} \times 10(2 \times 7 - 1)$ বা, $80 = u + 65$ বা, $u = 15$

$S_{18} = ut + \frac{1}{2} at^2 = 15 \times 18 + \frac{1}{2} \times 10 \times (18)^2 = 1890$ m

05. একটি বস্তুকে u বেগে ভূমির সাথে α কোণে নিক্ষেপ করা হলে h উচ্চতায় বস্তুটির বেগ হবে- [IU. 12-13]

A. $(u^2 - 2gh)^{0.5}$ B. $(u^2 + 2gh)^{0.5}$ C. $u^2 + 2gh$ D. $u^2 - 2gh$

[SOWhy] সরাসরি সূত্র।

06. প্রক্ষেপকের সর্বাধিক পাল্লার নিক্ষেপন কোণ- [IU. 11-12; রা.বা. MCQ. ২০১৯]

A. 50° B. 45° C. 40° D. 54°

[SOWhy] সর্বাধিক পাল্লায়, $\alpha = 45^\circ$

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. আঁকাবাঁকা পথে চলন্ত কোন কণা-

[BRUR-D. 13-14]

A. সমদ্রুতি বিশিষ্ট হয় B. সমাবেশ বিশিষ্ট হয়
C. সমবেগ ও সমদ্রুতি বিশিষ্ট হয় D. কোনটিই নয়

[Ans D]

PART B ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. 20 kg ভরের একটি বালক 10 m ব্রিজ থেকে নদীর পানিতে লাফ দিচ্ছে, পানি থেকে 5 m উঁচুতে পৌঁছানোর পর তার ওজন- [SUST. 10-11]

A. 198 N B. 99 N C. 20 N D. 0 N

[SOWhy] মুক্তভাবে পড়ন্ত অবস্থায় ওজন 0 হয়।

02. একটি খাড়া দেয়ালের পাদদেশ হতে ভূমি বরাবর 10 cm দূরত্বে কোন বিন্দু হতে 45° কোণে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা হ'ল। বস্তুটি ঠিক দেয়ালের উপর দিয়ে গেল এবং দেয়ালের অপর পাশে 10 cm দূরত্বে গিয়ে মাটিতে পড়ল। দেয়ালটির উচ্চতা কত? [SUST. 06-07]

A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 100 cm

[SOWhy] খাড়া দেয়ালের পাদদেশ হতে ভূমি বরাবর x দূরত্বে কোন বিন্দু হতে 45° কোণে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা হলে এবং বস্তুটি ঠিক দেয়ালের উপর দিয়ে যেয়ে দেয়ালের অপর পাশে y দূরত্বে মাটিতে পড়লে-

দেয়ালটির উচ্চতা, $h = \frac{xy}{x+y} = \frac{10 \times 10}{10+10} = 5$ cm

03. একটি বস্তু স্থির অবস্থা হতে যাত্রা শুরু করে 5ft/s² সমত্বরণে চলতে লাগলো। 5 সে. পরে বস্তুর বেগ হবে- [SUST. 07-08]

A. 5 ft/sec B. 25 ft/sec C. 15 ft/sec D. 10 ft/sec

[SOWhy] $a = 5$ ft/sec², $t = 5$ sec, $u = 0$, $v = ?$

$v = u + at \Rightarrow v = 0 + 5 \times 5 = 25$ ft/sec

০৪. 3 m/s^2 মন্দনে সরলপথে চলত একটি গাড়ি 150m পথ চলার পর থেমে গেলে গাড়িটির আদিবেগ-
 A. 20 মি/সে. B. 30 মি/সে. C. 40 মি/সে. D. 50 মি/সে.
 [SUST. 07-08]

[SUST. 07-08] $f = 3 \text{ m/s}^2$, $s = 150 \text{ m}$, $v = 0$, $u = ?$
 $v^2 = u^2 - 2fs$
 বা, $0 = u^2 - 2 \times 3 \times 150$
 বা, $u^2 = 900$ বা, $u = 30$

আবার, $a = \frac{u^2}{2s}$ বা, $u = \sqrt{2 \times 3 \times 150} = 30 \text{ m/s}$

০৫. কোন একটি বস্তুকে g এর অধীকারে সমান আদিবেগে পৃথিবী হতে খাড়া উপরের দিকে ছুড়ে দেওয়া হল। বস্তুটি কতক্ষণ পর জু-পৃষ্ঠে পতিত হবে-
 A. 1 সে. B. 1/2 সে. C. 2 সে. D. 1/4 সে.
 [SUST. 05-06]

[SUST. 05-06] $T = \frac{2u}{g} = \frac{2 \times (g/2)}{g} = 1 \text{ s}$

০৬. স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ 13 km/hr, যদি শ্রোতের বেগ 4 km/hr হয়, তাহলে শ্রোতের দিকে নৌকাটির 68 km অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?
 A. 2 hr B. 3 hr C. 4 hr D. 5 hr
 [JUST-A. 19-20]

[JUST-A. 19-20] সময় = $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{মোট বেগ}} = \frac{68}{13 + 4} = 4 \text{ hr}$

০৭. একটি কণা যদি একাদশ সেকেন্ডে 720 সে.মি. এবং পঞ্চদশ সেকেন্ডে 960 সে.মি. দূরত্ব অতিক্রম করে তবে কণাটির ত্বরণ কত?
 A. 30 cm/s^2 B. 40 cm/s^2 C. 50 cm/s^2 D. 60 cm/s^2
 [JUST-A. 19-20]

[JUST-A. 19-20] $a = \frac{960 - 720}{15 - 11} = \frac{240}{4} = 60 \text{ cm/s}^2$

০৮. দুটি ট্রেন বিপরীতমুখী হয়ে প্রাটিকর্মে একটি স্থির মানুষকে অতিক্রম করতে 27 sec এবং 17 sec সময় নেয়। ট্রেন দুটি একে অপরকে অতিক্রম করতে 23 sec সময় নিলে তাদের গতির অনুপাত কত?
 A. 1:3 B. 3:2 C. 3:4 D. None
 [JUST-A. 19-20]

[JUST-A. 19-20] $S_1 = 27V_1$ এবং $S_2 = 17V_2$
 $\therefore \frac{S_1 + S_2}{V_1 + V_2} = 23 \Rightarrow S_1 + S_2 = 23V_1 + 23V_2$
 $\Rightarrow 27V_1 + 17V_2 = 23V_1 + 23V_2 \Rightarrow 4V_1 = 6V_2 \therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{2}$
 $\therefore V_1 : V_2 = 3 : 2$

০৯. ভূমির সাথে 90° কোণে v বেগে নিক্ষেপিত কোন প্রক্ষেপকের সর্বাধিক উচ্চতা হবে-
 A. v^2/g B. $v^2/2g$ C. $2v^2/g$ D. $v^2/4g$
 [JUST. 18-19; BUTex. 10-11]

[JUST. 18-19; BUTex. 10-11] সরাসরি সূত্র।

১০. একজন মোটরসাইকেল চালক 40 ms^{-1} বেগে $x \text{ km}$ গেল এবং 60 ms^{-1} বেগে ফিরে এল। তার গড় গতিবেগ কত?
 A. 20 ms^{-1} B. 20 kms^{-1} C. 48 ms^{-1} D. 1000 ms^{-1}
 [JUST-B. 17-18]

[JUST-B. 17-18] $\bar{v} = \frac{2}{\frac{1}{40} + \frac{1}{60}} = \frac{2 \times 120}{5} = 48 \text{ ms}^{-1}$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১১. একটি গাড়ি সোজা উত্তর দিকে 90 m পথ 15 s সময়ে অতিক্রম করে। পরবর্তীতে গাড়িটি দ্রুত ঘুরে দক্ষিণ দিকে 40 m দূরত্ব 5 s সময়ে অতিক্রম করে। এই 20 s সময়কালে গাড়িটির গড় বেগের মান কত?
 A. 2.5 m/s B. 5.0 m/s C. 6.5 m/s D. কোনোটিই নয়
 [BSMRSTU-B. 19-20]

[BSMRSTU-B. 19-20] গড়বেগ = $\frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট সময়}} = \frac{90 - 40}{15 + 5} = 2.5 \text{ m/s}$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. একটি গাড়ী 5 m/s বেগে সুস্থম ত্বরণে সোজা পথে চলে 100 m দূরত্ব অতিক্রম করার পর বেগ 25 m/s হলে, গাড়ীটির ত্বরণ হবে-
 A. 1.5 m/s^2 B. 2 m/s^2 C. 3 m/s^2 D. 4 m/s^2
 [MBSTU-C. 19-20]

[MBSTU-C. 19-20] $v^2 = u^2 + 2as$
 $\Rightarrow a = \frac{v^2 - u^2}{2s} = \frac{25^2 - 5^2}{2 \times 100} = 3 \text{ ms}^{-2}$

০২. u গতিবেগ এবং আনুভূমিক সাথে α কোণে প্রক্ষিপ্ত বস্তুকণার দীর্ঘতম আনুভূমিক পাল্লা কত?
 A. $u^2/2g$ B. u^2/g C. u/g^2 D. $u/2g^2$
 [MBSTU. 18-19]

[MBSTU. 18-19] সরাসরি সূত্র।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 100 মিটার উঁচু পাহাড় থেকে একটি পাথর ছেড়ে দিলে ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগবে?
 A. 3.19 B. 3.91 C. 4.25 D. 4.52
 [NSTU. 19-20]

[NSTU. 19-20] $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 100}{9.8}} = 4.52 \text{ sec}$

STEP 04 PRIME TEST Time: 15

০১. 4 গ্রাম ভরের একটি বস্তু 6 মিটার উচ্চ স্থান হতে পতিত হয়ে কাদায় 5 সে.মি. প্রবেশ করে স্থির হয়ে পড়লো। ভরটির উপর কাদার গড় ধাক্কার পরিমাণ কত?
 A. 18.973N B. 9.486N C. 4.7432N D. 2.3716N

০২. হিতাবস্থায় 36kg ভরের একটি বস্তুর উপর কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির গতিবেগ এক মিনিট পর ঘটায় 15km হবে?
 A. 2.5 N B. 9.0 N C. 25.0 N D. 2.9 N

০৩. 5kg ভরের একটি বস্তু মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 40m/sec বেগে নিচে পড়ছে। কি পরিমাণ সমবল তাকে 4sec সময়ে থামিয়ে দিবে? [$g = 9.8 \text{ m/sec}^2$]
 A. 99.0N B. 99.2N C. 99.5N D. 99.4N

০৪. মসৃণ পুলির উপর দিয়ে অতিক্রান্ত একটি সুতার এক প্রান্তে আটকানো 9kg ভরের একটি বস্তু 6kg ভরের একটি বস্তুকে টেনে উপরে তুলছে। বস্তু দুইটির সাধারণ ত্বরণ হবে-
 A. 1.662 ms^{-2} B. 1.762 ms^{-2} C. 1.862 ms^{-2} D. 1.962 ms^{-2}

০৫. একটি বুলেট লক্ষ্যবস্তুর 3 cm ভিতরে প্রবেশ করতে তার অর্ধেক বেগ হারায়। লক্ষ্যবস্তুর প্রতিরোধ সুস্থম হলে বুলেটটি আর কতদূর প্রবেশ করবে?
 A. 0.5cm B. 1.0cm C. 1.5cm D. 2.0cm

০৬. চাঁদের বায়ুশূন্য স্থানে স্থিরাবস্থা থেকে একটি পালক ও একটি সীসার বলকে ফেলা হলো। পালকের ত্বরণ হবে-
 A. সীসার বলের চেয়ে বেশি B. সীসার বলের সমান
 C. সীসার বলের চেয়ে কম D. 98 ms^{-2}

০৭. নদীর শ্রোতের দ্বিগুণ বেগে ও শ্রোতের সাথে লম্বভাবে একটি নৌকার দাঁড় টানা হচ্ছে। নৌকাটি অপর তীরে যাত্রা বিন্দুর ঠিক বিপরীত স্থান থেকে 2.5 কি.মি. ভাটিতে পৌছাল। নদীটির প্রস্থ কত?
 A. 2.5km B. 4km C. 3km D. 5km

০৮. একটি মসৃণ পুলির উপর দিয়ে গমনকারী একটি হালকা রশির প্রান্তদ্বয়ে সংযুক্ত বস্তুর সাধারণ ত্বরণ 54.5 cm/s^2 হলে বস্তু দুইটির ভরের অনুপাত হবে-
 A. 21 : 17 B. 23 : 19 C. 19 : 17 D. 19 : 15


০৯. একটি খাড়া দেয়ালের পাদদেশ থেকে ভূমি বরাবর 147 m দূরত্বে কোন বিন্দু থেকে একটি বস্তু 49 ms^{-1} বেগে আনুভূমিকের সাথে α কোণে ছোড়া হল।
 $\alpha = 60^\circ$ হলে বস্তুটি দেয়ালের যে বিন্দুতে আঘাত করবে তার উচ্চতা নির্ণয় কর। ($g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$)
 A. 26.01 m B. 78.03 m C. 254.61 m D. 46.20 m





10. AB সরলরেখার সাথে 60° কোণে A বিন্দু হতে একটি কণা যাত্রা করে। BA সরলরেখার সাথে 30° কোণে B বিন্দু হতে একই সময়ে অপর একটি কণা ঘন্টায় 10 km সমবেগে যাত্রা করে এবং কিছুক্ষণ পর প্রথম কণার সাথে মিলিত হয়। প্রথম কণার বেগ নির্ণয় কর।
 A. $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ km h}^{-1}$ B. $\frac{20}{\sqrt{3}} \text{ km h}^{-1}$ C. $\frac{10}{\sqrt{3}} \text{ km h}^{-1}$ D. $\frac{4}{\sqrt{3}} \text{ km h}^{-1}$
11. এক ব্যক্তি ঘন্টায় 5km বেগে উত্তর দিকে 10 km হাঁটার পর পশ্চিম দিকে 3 ঘন্টার 12km পথ হাঁটল। তার গড় বেগ কত হবে?
 A. $\frac{22}{5} \text{ km per hour}$ B. $\frac{2\sqrt{61}}{8} \text{ km per hour}$
 C. $\frac{2\sqrt{61}}{5} \text{ km per hour}$ D. None of the above
12. 10 ফুট দৈর্ঘ্যের একই মই একটি খাড়া দেয়ালের (y বরাবর) সাথে হেলানো আছে। যদি মইটির মেঝে সংলগ্ন প্রান্ত v বেগে দেয়াল হতে (x বরাবর) দূরে সরতে থাকে তবে দেয়াল সংলগ্ন প্রান্তের বেগ কত?
 A. v B. $-\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} yv$ C. $-\frac{x}{y} v$ D. None
13. 0.25 Kg এবং 0.50 Kg ভরের দুইটি বস্তু যথাক্রমে h_1 এবং h_2 উচ্চতা হতে মুক্তভাবে পড়ে একই সমান গতিশক্তিতে ভূপৃষ্ঠে পড়ল। h_1/h_2 এর মান নির্ণয় কর।
 A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{11}{15}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{2}{1}$
14. একটি উঁচু টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু হতে এটি বল 21 m/s গতিবেগ অনুভূমিক দিকে নিক্ষেপ করা হলো। বলটি টাওয়ারের পাদদেশ 84 m দূরে ভূমিতে আঘাত করলে টাওয়ারের উচ্চতা কত?
 A. 30 m B. 39 m C. 45 m D. None
15. 10m/sec বেগে উর্ধ্বগামী কোন বেলুন হতে একটি পাথরের টুকরা ফেলে দেওয়ার 10sec পর মাটিতে পড়ে। পাথরটি ফেলে দেওয়ার সময় বেলুনের উচ্চতা কত ছিল?
 A. 590 m B. 390 m C. 49 m D. 490 m
16. কুমার ভিতর একটি পাথর ছেড়ে দেওয়ায় $3\frac{1}{2}$ sec পর পাথরটি পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। যদি শব্দের বেগ 327m/s হয়, তবে কুমার গভীরতা হবে-
 A. 45.5 m B. 54.5 m
 C. 50.0 m D. None of these
17. u বেগে এবং অনুভূমিকের সাথে 45° কোণে প্রক্ষিপ্ত কণার আনুভূমিক পাল্লা হল-
 A. $\frac{u^2}{2g}$ B. $\frac{u^2}{\sqrt{2}g}$ C. $\left(\frac{u}{\sqrt{g}}\right)^2$ D. None
18. একটি টাওয়ারের 90m দূর হতে 30° নিক্ষেপণ কোণে একটি বন্দুকের গুলি ছোড়া হল। টাওয়ারের উচ্চতা যদি 15 m হয় তবে গুলিটি টাওয়ারের শীর্ষ বিন্দুতে আঘাত করে। গুলির আদিবেগ কত?
 A. 37.8m/s B. 67.8m/s
 C. 38.7m/s D. None
19. একটি বিমান অবতরণকালে কোন এক সময় (400,800) বিন্দুতে অবস্থান করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানটি (400,0) বিন্দুতে অবস্থান করে, তাহলে বিমানটি কি হবে?
 A. বিধ্বস্ত হবে B. বিধ্বস্ত হবে না
 C. আরও উর্ধ্বমুখী হবে D. কোনটি হবে না
20. গাছ থেকে 2 কেজি ভরের একটি নারিকেল নিচের দিকে পড়ছে। বাতাসের বাধা 7.6N হলে নারিকেলের ত্বরণ কত?
 A. 43.3 m/sec² B. 12 m/sec²
 C. 6 m/sec² D. 4 m/sec²
21. 50kg ভরের একজন লোক 327cm/s² ত্বরণে চলমান একটি লিফটে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে আরোহণের সময় লিফটের মেঝের ওপর আরোপিত চাপ হবে-
 A. 101.1N B. 6.54N C. 65.4N D. 654N
22. 4 গ্রাম ভরের একটি বস্তু 6 মিটার উচ্চ স্থান হতে পতিত হয়ে কাদায় 5 সে.মি. প্রবেশ করে স্থির হয়ে পড়লো। ভরটির উপর কাদার গড় ধাক্কার পরিমাণ কত?
 A. 18.973N B. 9.486N
 C. 4.7432N D. 2.3716N
23. কোন সরলরেখায় সমত্বরণে চলমান কোন বিন্দুর ধারবাহিক t_1, t_2, t_3 সময়ে বেগ যথাক্রমে v_1, v_2, v_3 হলে $\frac{v_1 - v_2}{v_2 - v_3} = ?$
 A. $\frac{t_1 + t_2}{t_2 + t_3}$ B. $\frac{t_1 - t_2}{t_2 - t_3}$ C. $\frac{t_1 + t_2}{t_2 - t_3}$ D. $\frac{t_1 - t_2}{t_2 + t_3}$
24. u আদিবেগে চলন্ত কণা প্রদত্ত দূরত্বের অর্ধেক f সুস্থম ত্বরণে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক f' সমত্বরণে গমন করে। এখন কণাটি প্রদত্ত দূরত্বের সমস্ত পথ নিচের কোন ত্বরণে চললে একই সময় লাগবে?
 A. f+f' B. f-f' C. 2(f+f') D. $\frac{1}{2}(f+f')$
25. ভূমিতে পতিত একটি বোমা ফাটলে তার কণাগুলো u গতিবেগে ছুটে থাকে। ভূমির যে অংশ নিয়ে কণাগুলো ছড়িয়ে পড়বে তার ক্ষেত্রফল কত?
 A. $\pi u^2 g$ B. $\frac{\pi u^2}{g}$ C. $\frac{\pi u^4}{g^2}$ D. $\frac{\pi u^4}{g}$

OMR SHEET

01. A B C D E	09. A B C D E	17. A B C D E
02. A B C D E	10. A B C D E	18. A B C D E
03. A B C D E	11. A B C D E	19. A B C D E
04. A B C D E	12. A B C D E	20. A B C D E
05. A B C D E	13. A B C D E	21. A B C D E
06. A B C D E	14. A B C D E	22. A B C D E
07. A B C D E	15. A B C D E	23. A B C D E
08. A B C D E	16. A B C D E	24. A B C D E
		25. A B C D E

Answer Analysis

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	C	$mg(h+x) = Fx \Rightarrow F = \frac{mg(h+x)}{x} = 4.7432N$
02	A	$F = ma = 36 \times \frac{15/3.6}{60} = 2.5N$
03	A	$F = m(g+a) = 5 \times \left(9.8 + \frac{v}{t}\right) = 5 \left(9.8 \times 1 + \frac{40}{4}\right) = 99N$
04	D	সাধারণ ত্বরণ:  $f = \frac{9-6}{9+6} \times 9.81 = 1.962m/s^2$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
05 B		কাজ শক্তি উপপাদ্য প্রয়োগ করলে অঙ্ক সবচেয়ে Short হয়। ধরি, $F =$ বাধাদানকারী বল; AB অংশে, $F(3) = \frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{u}{2}\right)^2 \dots (i)$ BC অংশে, $FS = \frac{1}{2}m\left(\frac{u}{2}\right)^2 \dots (ii)$ (ii) $\div$ (i) $\frac{S}{3} = \frac{\frac{u^2}{4}}{u^2 - \frac{u^2}{4}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}}$ $\Rightarrow \frac{S}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow S = 1\text{cm}$ Shortcut: S দূরত্ব অতিক্রম করে $\frac{1}{n}$ অংশ বেগ হারালে আরো x দূরত্ব অতিক্রম করলে $x = \frac{s(n-1)^2}{(2n-1)}$
06 B		বায়ুশূন্য স্থানে সব পড়ন্তবস্তুর ত্বরণ সমান। ধরি, t সময় লাগে অপর তীরে পৌছাতে। $\therefore t = \frac{d}{u} = \frac{d}{2v}$ এখন, $2.5 = v \times t$ বা, $2.5 = v \times \frac{d}{2v} = \frac{d}{2}$ $\therefore d = 5\text{km}$
07 D		
08 C		$\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \times g = f \Rightarrow \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \times 980 = 54.5$ $\Rightarrow \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} = \frac{980}{54.5}$ $\Rightarrow \frac{(980 + 54.5)}{(980 - 54.5)} = 1.11777 \left[\frac{19}{17} = 1.11765 \right]$
09 B		$y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_o^2 \cos^2 \alpha} \Rightarrow y = 78.03 \text{ m}$
10 C		$CD = x \sin 60^\circ = BC \sin 30^\circ$ $\Rightarrow x = \frac{BC \sin 30^\circ}{\sin 60^\circ}$ $\Rightarrow vt = \frac{10t \sin 30^\circ}{\sin 60^\circ} \Rightarrow v = \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ kmh}^{-1}$
11 C		$t_1 = \frac{10}{5} = 2 \text{ hr}; t_2 = 3 \text{ hr}; s = \sqrt{10^2 + 12^2} = 2\sqrt{61} \text{ km}$ $\therefore \text{গড়বেগ} = \frac{2\sqrt{61}}{2+3} = \frac{2\sqrt{61}}{5} \text{ kmhr}^{-1}$
12 C		$v = \frac{dx}{dt}; x^2 + y^2 = 10^2$ $\Rightarrow 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow xv + y \frac{dy}{dt} = 0$ $\Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}v \text{ (Ans.)}$ 
13 D		$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \times 2gh = mgh$ $E \propto nh \therefore m_1h_1 = m_2h_2 \Rightarrow \frac{h_1}{h_2} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{0.50}{0.25} = \frac{2}{1}$
14 D		$t = \frac{x}{v_{x0}} = \frac{84}{21} = 4\text{s}; y = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 4^2 = 78.4\text{m}$
15 B		$h = -vt + \frac{1}{2}gt^2 = -10 \times 10 + 4.9 \times 10^2 = 390\text{m}$
16 B		ধরি, কুপের গভীরতা = h পতনের সময় = t শব্দ উপরে আসার সময় = $\frac{h}{327} \therefore t + \frac{h}{327} = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{327} = \frac{7}{2}$ $\sqrt{h} = x$ ধরে, $\frac{x^2}{327} + x \cdot \frac{\sqrt{2}}{g} = \frac{7}{2} \Rightarrow x = 7.379 \Rightarrow h = 54.5\text{m}$
17 C		u বেগে ও অনুভূমিকের সাথে 45° কোণে নিষ্ক্ষিপ্ত কণার আনুভূমিক পাল্লা বা সর্বাধিক আনুভূমিক পাল্লা = $\frac{u^2}{g} = \left(\frac{u}{\sqrt{g}}\right)^2$
18 A		$x = u \cos 30^\circ \cdot t = 90$ $\Rightarrow ut = \frac{180}{\sqrt{3}}$ $h = 15 = u \sin 30^\circ \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$ $\Rightarrow 15 = \frac{1}{2} \cdot \frac{180}{\sqrt{3}} - 4.9t^2 \Rightarrow t = 2.75\text{s} \therefore u = \frac{180}{\sqrt{3} \cdot 2.75} = 37.8\text{ms}^{-1}$ 
19 A		বিমানের গতিপথের গ্রাফ অর্থাৎ বিধ্বস্ত হবে। 
20 C		নারিকেলের ত্বরণ = $g - \frac{\text{বাতাসের বাধা}}{\text{নারিকেলের ভর}} = 9.8 - \frac{7.6}{2} = 6 \text{ ms}^{-2}$
21 D		আরোপিত চাপ = $m(g+a) = 50 \times (9.8 + 3.27) = 653.5\text{N} \approx 654\text{N}$
22 C		$mg(h+x) = Fx \Rightarrow F = \frac{mg(h+x)}{x} = 4.7432\text{N}$
23 B		$v = u + at$ এটি $y = mx + c$ আকৃতির $\therefore$ সরলরেখাটির ঢালের রাশিমালা, $\frac{v_1 - v_2}{t_1 - t_2} = \frac{v_2 - v_3}{t_2 - t_3}$ $\Rightarrow \frac{v_1 - v_2}{v_2 - v_3} = \frac{(t_1 - t_2)}{(t_2 - t_3)}$
24 D		
25 D		$R_{\max} = \frac{u^2}{g} \therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \pi R_{\max}^2 = \frac{\pi u^4}{g^2}$

অধ্যায়

বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

দ্বিতীয় পত্র

STEP 01

বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নের ভিত্তিতে সমাধান


STEP 02

ANALYSIS OF GST QUESTION

01. যদি $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(x)$ একটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশন হয়, যেখানে $f(a) f(b) > 0$, তবে উক্ত ব্যবধিতে $f(x) = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল থাকবে- [GST-A. 21-22]
 A. জোড় সংখ্যক B. মাত্র ২টি C. মাত্র ১টি D. বিজোড় সংখ্যক

SQ Why $f(x)$, $[a, b]$ ব্যবধিতে যেহেতু $f(a)f(b) > 0$
 $\therefore$ হয় $f(a)$ এবং $f(b)$ উভয় ধনাত্মক
 অথবা, $f(a)$ এবং $f(b)$ উভয় ঋণাত্মক
 আবার, শুধুমাত্র জোড় সংখ্যক ঋণাত্মক সংখ্যা গুণ করলে আমরা ধনাত্মক সংখ্যা পাবো। তাই মূল থাকবে জোড় সংখ্যক।

ASPECT SPECIAL:





চিত্র হতে ছেদবিন্দু, ৪টি অর্থাৎ জোড় সংখ্যক, একইভাবে দেখানো যাবে অসংখ্য জোড় সংখ্যক ছেদবিন্দু।

02. $P = \{(x, y) : 0 < x < 2, 0 \leq y \leq 2\}$ এবং $Q = \{(x, y) : 1 < x < 3, 1 \leq y \leq 3\}$ হলে $P \cap Q = ?$ [GST-A. 21-22]

- A. $\{(x, y) : \leq x, y \leq 3\}$ B. $\{(x, y) : 1 < x < 3, 1 \leq y \leq 3\}$
 C. $\{(x, y) : 1 < x < 2, 1 \leq y \leq 2\}$ D. $\{(x, y) : 1 < x, y \leq 2\}$

SQ Why $P = \{(x, y) : 0 < x < 2, 0 \leq y \leq 2\}$
 $Q = \{(x, y) : 1 < x < 3, 1 \leq y \leq 3\}$

এখন P_x এর জন্য সংখ্যা দেখা,



$\therefore P \cap Q = 1 < x < 2$

03. $\mathbb{R}$ এর একটি উপসেট $S = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা কত? [GST-C. 20-21]

- A. -1 B. 0 C. 1 D. i

SQ Why এটি একটি সীমিত সেট তাই উপসীমা 1 এবং নিম্নসীমা $0 \in S$

Or, $\frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \dots$

$\therefore \frac{1}{n} \geq 0 \therefore$ বৃহত্তম নিম্নসীমা = 0

04. বাস্তব সংখ্যা $|x - 1| \geq 1$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি? [GST-C. 20-21]

- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1) \cup [1, \infty)$ C. $(\infty, 0) \cup [2, \infty)$ D. $(0, 2)$

SQ Why $|x - 1| \geq 1 \therefore x - 1 \geq 1$ অথবা $x - 1 \leq -1$

$\therefore x \geq 2$ অথবা $x \leq 0 \therefore$ সমাধান সেট, $S = (-\infty, 0] \cup [2, \infty)$

PART (A) ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. $|2x - 5| < 3$ অসমতার (inequality) সমাধান কোনটি? [JnU. 17-18]

- A. $3 < x < 5$ B. $1 < x < 4$ C. $1 < x < 2$ D. $2 > x > 1$

SQ Why $|2x - 5| < 3 \Rightarrow -3 < 2x - 5 < 3 \Rightarrow 2 < 2x < 8 \Rightarrow 1 < x < 4$

02. $x \leq \frac{1}{2}$ বা $x \geq \frac{9}{2}$ কে পরমমান আকারে প্রকাশ করলে হবে- [JnU. 15-16]

- A. $|2x - 5| \leq 4$ B. $|5 - 2x| \geq 4$ C. $|5 - 2x| \leq 4$ D. $|5 - 2x| \leq \frac{1}{4}$

SQ Why $x \leq \frac{1}{2}$ বা $x \geq \frac{9}{2}$ কে একত্রে লিখলে অসমতাটি দাঁড়ায়,

$$\frac{9}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -9 \geq -2x \geq -1 \Rightarrow -4 \geq 5 - 2x \geq 4 \Rightarrow |5 - 2x| \geq 4$$

03. বাস্তব সংখ্যায় $|3 - 2x| \leq 1$ অসমতার সমাধান- [JnU. 14-15]
 A. $1 < x < 2$ B. $1 \leq x \leq 2$ C. $x \leq 1$ or $x \geq 2$ D. $1 < x \leq 2$

SQ Why $|3 - 2x| \leq 1 \Rightarrow |2x - 3| \leq 1$
 $\Rightarrow -1 \leq 2x - 3 \leq 1 \Rightarrow 2 \leq 2x \leq 4 \therefore 1 \leq x \leq 2$

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$ এর সরল মান $\frac{43}{60}$ অপেক্ষা বৃহত্তর হলে অসমতার রূপ কি? [KU. 16-17]

- A. $\frac{6x}{5} > \frac{43}{60}$ B. $\frac{5x}{6} > \frac{43}{60}$ C. $\frac{x}{6} > \frac{43}{60}$ D. $5x > \frac{43}{60}$

SQ Why $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} > \frac{43}{60} \Rightarrow \frac{5x}{6} > \frac{43}{60}$

02. $4 < x < 10$ অসমতাকে পরমমান চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করলে হবে-

[KU. 15-16, RU. 13-14; MBSTU: 15-16; SUST: 05-06]

- A. $|x - 4| < 10$ B. $|10 - x| < 4$ C. $|x - 7| > 4$ D. $|x - 7| < 3$

SQ Why $\frac{4+10}{2} = 7 \therefore 4 - 7 < x - 7 < 10 - 7$

$$\Rightarrow -3 < x - 7 < 3 \Rightarrow |x - 7| < 3$$

03. $\|2 - 6\| - \|1 - 9\|$ এর মান কত? [KU. 12-13]

- A. 8 B. -4 C. 4 D. 12

SQ Why $\|2 - 6\| - \|1 - 9\| = \|-4\| - \|-8\| = |4 - 8| = |-4| = 4$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. $|x - 1| = |3x - 4|$ এর সমাধান- [IU-D. 19-20]

- A. $\frac{3}{2}, \frac{5}{6}$ B. $\frac{3}{2}, \frac{5}{4}$ C. $\frac{5}{4}, \frac{3}{4}$ D. $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}$

SQ Why $|x - 1| = |3x - 4| \Rightarrow x - 1 = \pm(3x - 4)$

(+) নিয়ে $2x = 3; x = \frac{3}{2}$ এবং (-) নিয়ে $x - 1 = -(3x - 4) \Rightarrow 4x = 5; x = \frac{5}{4}$

02. $x^2 - 8x < 33$ এর সমাধান হলো- [IU. 18-19]

- A. $-3 < x < 11$ B. $3 < x < -7$ C. $-3 < x < -3$ D. $-3 > x > 11$

SQ Why $x^2 - 8x < 33 \Rightarrow x^2 - 8x - 33 < 0$

$$\Rightarrow x^2 - 11x + 3x - 33 < 0 \Rightarrow x(x - 11) + 3(x - 11) < 0$$

$$\Rightarrow (x - 11)(x + 3) < 0 \Rightarrow -3 < x < 11$$

03. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা- [IU. 18-19]

- A. -7 B. $\frac{7}{22}$ C. π D. $-\frac{7}{22}$

SQ Why অমূলদ সংখ্যা π

04. $f(x) = 2x - 5$ হলে $\frac{1}{|f(x)|} > 5$ অসমতার সমাধান কোনটি? [IU. 17-18, 16-17]

- A. $\left(\frac{12}{5}, \frac{13}{5}\right)$ B. $\left(-\infty, \frac{12}{5}\right) \cup \left(\frac{13}{5}, +\infty\right)$

- C. $\left(\frac{12}{5}, \frac{5}{2}\right) \cap \left(\frac{5}{2}, \frac{13}{5}\right)$ D. $\left(\frac{12}{5}, \frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{13}{5}\right)$

SQ Why $\frac{1}{|2x - 5|} > 5 \Rightarrow |2x - 5| < \frac{1}{5}$ but, $x \neq \frac{5}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{1}{5} < 2x - 5 < \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{12}{5} < x < \frac{13}{5} \therefore \text{নির্ণেয় সমাধান} = \left(\frac{12}{5}, \frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{13}{5}\right)$$

05. N, Z, Q ও R যথাক্রমে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা, মূলদ সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যার সেট হলে এদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক- [IU. 16-17, 05-06; BSMRSTU. 19-20]

- A. $N \subset Q \subset Z \subset R$ B. $N \subset Z \subset Q \subset R$

- C. $Q \subset N \subset Z \subset R$ D. $R \subset Q \subset Z \subset N$

SQ Why $N \subset Z \subset Q \subset R$

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. পরম মান চিহ্ন ব্যবহার করে $-7 < 3x - 4 < -1$ অসমতাটি প্রকাশ করে। [MBSTU: 18-19, 17-18; BUET: 10-11; NSTU: 14-15; JU: 16-17; SUST: 07-08]

A. $|x - 4| < -3$ B. $|x| < 1$ C. $|3x - 4| < -3$ D. $|3x - 4| < 3$

S@Why $-7 < 3x - 4 < -1 \Rightarrow -7 + 4 < 3x - 4 + 4 < -1 + 4$
 $\Rightarrow -3 < 3x < 3 \Rightarrow -1 < x < 1 \Rightarrow |x| < 1$

02. $|2x - 5| > 4$ অসমতাটির সমাধান কোনটি? [MBSTU-A. 16-17]

A. $x > \frac{1}{2}, x > \frac{9}{2}$ B. $x > \frac{1}{2}, x < \frac{9}{2}$ C. $x < \frac{1}{2}, x < \frac{9}{2}$ D. $x < \frac{1}{2}, x > \frac{9}{2}$

S@Why $|2x - 5| > 4$ বা, $-4 > 2x - 5 > 4$

$\Rightarrow -4 + 5 > 2x > 4 + 5$ বা, $1 > 2x > 9 \Rightarrow \frac{1}{2} > x > \frac{9}{2} \therefore x > \frac{9}{2}, x < \frac{1}{2}$

03. $2 \leq 2x - 8 < 10$ অসমতার সমাধান কোনটি? [MBSTU-A. 13-14]

A. $9 \leq x < 5$ B. $5 \leq x < 9$ C. $-1 \geq x > 3$ D. $-3 \leq x < 1$

S@Why $2 \leq 2x - 8 < 10 \Rightarrow 10 \leq 2x < 10 + 8 \Rightarrow 10 \leq 2x < 18 \Rightarrow 5 \leq x < 9$

বদরুশ শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. C, R, Q, Z ও N দ্বারা যথাক্রমে জটিল সংখ্যা, বাস্তব সংখ্যা, মূলদ সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা ও স্বাভাবিক সংখ্যার সেট বুঝানো হলে নিচের কোনটি সঠিক? [BSMRSTU. 18-19]

A. $N \subseteq R \subseteq Q \subseteq C$ B. $R \subseteq C$ ও $Q \subseteq Z$
 C. $N \subseteq Q \subseteq C \subseteq R$ D. $N \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$ **Ans D**

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a + b = a + c$ হয় তবে, কোনটি সঠিক? [HSTU. 15-16]

A. $a \neq b$ B. $b = c$ C. $a = b$ D. $a = c$

S@Why $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a + b = a + c$ বা, $b = c$

02. $(x + y, x^2 + y^2) = (2, 4)$ হলে $x^2 - y^2$ এর মান কত? [HSTU. 14-15, B]

A. ± 2 B. ± 4 C. ± 6 D. ± 8

S@Why $x + y, x^2 + y^2$ বা, $(x + y)^2 - 2xy = 4$

বা, $(2)^2 - 2xy = 4$ বা, $2xy = 0$; $(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$

বা, $(x - y)^2 = 4$ বা, $x - y = \pm 2$

$\therefore x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = 2(\pm 2) = \pm 4$

03. যদি $A = \{x : x^2 = 9, 2x = 4\}$ এবং $B = \{x : x + 8 = 8\}$ হয়। তবে $A \cup B$ এর মান কোনটি? [HSTU. 13-14]

A. $\emptyset$ B. $\{0\}$ C. $(\emptyset)$ D. কোনটিই নয়

S@Why $A = \{x : x^2 = 9, 2x = 4\} \therefore x = \pm 3, x = 2$

$A = \{\pm 3, 2\}$ এবং $B = \{x : x + 8 = 8\}$ বা, $B = \{0\} \therefore A \cup B = \{\pm 3, 2, 0\}$

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনটি মৌলিক সংখ্যা? [NSTU. 19-20]

A. 1 B. 101 C. 1111 D. 11111

S@Why 11111 is divisible by 41

1111 is divisible by 11

101 is prime

02. কোন সংখ্যাটি অমূলদ? [NSTU. 14-15; BSFMSTU. 19-20; IU. 16-17]

A. $\sqrt{32}$ B. 3.251251.... C. 4.25 D. $11/3$ **Ans A**

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. a ও b সহমৌলিক এবং $\frac{a}{b} \in \mathbb{R}$ হলে b এর মান কত? [PSTU. 17-18, B]

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

S@Why a, b সহমৌলিক $a, b \in \mathbb{N}$, given, $\frac{a}{b} \in \mathbb{N} \therefore b = 1$

সহ মৌলিক সংখ্যা : দুটি সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক। ব্যতিত অন্য কোন সংখ্যা না পাওয়া গেলে।

02. ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা $a < b$ এর জন্য নিচের কোনটি সত্য? [PSTU-A/A₂. 17-18]

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ C. $\frac{1}{a} = \frac{1}{b}$ D. কোনটিই নয়

S@Why $a < b$ বা, $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

অধ্যায় ০২
দ্বিতীয় পত্র

যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম

STEP 01 দ্বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যারালেল তথ্যসহ সমাধান

STEP 02 ANALYSIS OF GST QUESTION

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

01. দুটি সংখ্যার যোগফল 24 সংখ্যাভয়ের গরিষ্ঠ গুণফল কত? [JnU. 09-10]

A. 144 B. 140 C. 280 D. 288

S@Why দুটি সংখ্যার যোগফল 24

গরিষ্ঠ মান পাওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাটিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হবে।

$\therefore 24 = 12 + 12 \therefore$ গুণফল $= 12 \times 12 = 144$

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

01. একজন ছাত্র 5 টাকা দরে x টি পেন্সিল এবং 10 টাকা দরে $x + 5$ টি খাতা অর্ধ 125 টাকায় ক্রয় করলে ঐ ছাত্র সর্বাধিক কয়টি পেন্সিল ক্রয় করেছেন? [CoU. 19-20]

A. $x \leq 5$ B. $x \geq 5$
 C. $x = 6$ D. $x > 6$


S@Why $5x + 10(x + 5) \leq 125 \Rightarrow x + 2(x + 5) \leq 25$

$\Rightarrow x + 2x + 10 \leq 25 \Rightarrow 3x \leq 15 \Rightarrow x \leq 5$

02. $z = 3x + 4y, x + y \leq 7, 2x + 5y \leq 20, x, y \geq 0$ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটির সর্বোচ্চ মান কত? [CoU: 17-18; BUTex: 13-14; MBSTU: 16-17]

A. 30 B. 21 C. 23 D. 16

S@Why $x + y \leq 7 \Rightarrow \frac{x}{7} + \frac{y}{7} \leq 1$



এবং $2x + 5y \leq 20 \Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{y}{5} \leq 1$

এখন $x + y = 7$ (i)

এবং $2x + 5y = 20$ (ii)

(ii) $- 2 \times$ (i) $\Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = 2$ এবং $x = 5 \therefore E(5, 2)$

এখন, সমাধান বিন্দুর $O(0, 0), A(7, 0), E(5, 2)$ এবং $D(0, 5)$

$\therefore O(0, 0)$ বিন্দুতে, $z = 3x + 4y = 0$

$A(7, 0)$ বিন্দুতে, $z = 3 \times 7 + 4 \times 0 = 21$

$B(0, 5)$ বিন্দুতে, $z = 3 \times 0 + 4 \times 5 = 20$

$E(5, 2)$ বিন্দুতে, $z = 3 \times 5 + 4 \times 2 = 23$

$\therefore$ সর্বোচ্চ মান $= 23$

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

01. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কোনটি? [IU. 15-16]

A. যোগাশ্রয়ী সমীকরণ জোট সমাধান B. সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ লাভ
 C. অসমতার সমাধান সেট নির্ণয় D. অসমতার লেখচিত্র অংকন

S@Why সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ লাভ।

02. যোগাত্মকী প্রোগ্রাম মডেল তৈরি করেন-

[IU. 12-13]

A. L.V. Kantorovich
C. Arionarayan

B. A.C. Das
D. Bartrand Russell

[Ans A]

03. যোগাত্মকী প্রোগ্রাম উদ্ভাবনকারী গণিতবিদ L.V. Kantorovich কোন দেশের নাগরিক-

[IU-F. 12-13]

A. Australia
C. Russia

B. USA
D. Denmark

[Ans C]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x + y \leq 1, y \leq 1, x, y \geq 0$ শর্তবলী সাপেক্ষে $2x + y$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

[JKKNIU. 19-20]

A. 1
C. 3
B. 2
D. 5

[S@Why] $x + y \leq 1; y \leq 1, x, y \geq 0$
অসমতাগুলোর সমীকৃত রূপ:


$$\frac{x}{1} + \frac{y}{1} = 1 \dots (i) \text{ এবং } y = 1 \dots (ii)$$

$$O(0,0) \text{ বিন্দুতে } z = 2.0 + 0 = 0$$

$$A(1,0) \text{ বিন্দুতে } z = 2.1 + 0 = 2$$

$$B(0,1) \text{ বিন্দুতে } z = 2.0 + 1 = 1$$

$$\therefore Z_{\max} = 2$$



PART B ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION


শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x_1 + 2x_2 \leq 10, x_1 + x_2 \geq 1, x_2 \leq 4, x_1, x_2 > 0$ শর্ত সাপেক্ষে $z = x_1 + 2x_2$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

[SUST. 18-19]

A. 8
D. 12
B. 5
E. 13
C. 10

[S@Why] $x_1 + 2x_2 \leq 10 \Rightarrow \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{5} = 1$



$$\text{এবং } x_1 + x_2 \geq 1 \Rightarrow \frac{x_1}{1} + \frac{x_2}{1} = 1 \text{ ও } x_2 \leq 4 \Rightarrow x_2 = 4$$

$$\text{আবার, } x_1 + 2x_2 = 10$$

$$x_2 = 4; x_1 = 2$$

$$\text{ছেদ বিন্দু } (2, 4)$$

$$A(10,0) \text{ তে } z = x_1 + 2x_2 = 10 + 0 = 10$$

$$E(2,4) \text{ তে } z = 2 + 2 \times 4 = 10$$

$$F(0,4) \text{ তে } z = 0 + 2 \times 4 = 8$$

$$D(0,1) \text{ তে } z = 0 + 2 = 2$$

$$C(1,0) \text{ তে } z = 1 + 2 \times 0 = 1$$

$$\therefore \text{সর্বোচ্চ মান} = 10$$

02. একটি ছাপাখানায় 100 বই ছাপাতে 12,000 টাকা খরচ হয় এবং 150 বই ছাপাতে 16000 টাকা খরচ হয়। বই ছাপানোর খরচ বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পেলে 200 বই ছাপাতে কত টাকা খরচ হবে?

[SUST. 17-18]

A. 18,000
C. 24,000
B. 20,000
D. 26,000

[S@Why] সম্পর্কটি $y = mx + c$ যেখানে x বইয়ের সংখ্যা ও y খরচের পরিমাণ

$$\therefore 16000 = m \times 150 + c \text{ এবং } 12000 = m \times 100 + c$$

$$\text{সুতরাং } m = 80; c = 4000$$

$$\text{বই সংখ্যা} = 200 \text{ হলে খরচ} = 200 \times 80 + 4000 = 20000 \text{ টাকা}$$

03. এক ব্যক্তি 10kg চাল বিক্রি করে 3 কেজি চিনি কেনার পর তার হাতে 550 টাকা থাকলো। অন্য ব্যক্তি 5 কেজি চাল বিক্রি করে 7 কেজি চিনি কেনার পর তার হাতে কোনো টাকা থাকলো না। প্রতি কেজি চিনির দাম কত?

[SUST-A. 17-18]

A. 30
D. 60
B. 40
E. 70
C. 50

[S@Why] ধরি, 1 kg চালের দাম = x টাকা

এবং 1 kg চিনির দাম = y টাকা

$$1\text{ম শর্ত মতে পাই, } 10x - 3y = 550 \dots (i)$$

$$2\text{য় শর্ত মতে পাই, } 5x - 7y = 0 \Rightarrow 10x - 14y = 0 \dots (ii)$$

$$(i) - (ii) \Rightarrow 11y = 550 \Rightarrow y = 50$$

$$\therefore \text{প্রতি kg চিনির দাম} = 50 \text{ টাকা।}$$

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x + y \leq 8, x \geq 4, y \leq 4$ শর্তে $z = x + 2y$ এর সর্বোচ্চ মান- [JUST-C. 19-20]

A. 4
B. 8
C. 12
D. 16

[S@Why] $x + y \leq 8; x \geq 4, y \leq 4$

অসমতাগুলোর সমীকৃত রূপ:

$$\frac{x}{8} + \frac{y}{8} = 1 \dots (i)$$

$$x = 4 \dots (ii)$$


$$y = 4 \dots (iii)$$

$$A(8,0) \text{ বিন্দুতে } z = 8 + 2.0 = 8$$

$$B(4,4) \text{ বিন্দুতে } z = 4 + 2.4 = 12$$

$$C(4,0) \text{ বিন্দুতে } z = 4 + 2.0 = 4$$

$$\therefore Z_{\max} = 12$$



মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $x + y \geq 6, 2x + y \geq 8, x \geq 0, y \geq 0$ শর্তাধীনে $z = 3x + 2y$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

[MBSTU-C. 19-20]

A. 8
B. 12
C. 14
D. 15

[S@Why] $x + y \geq 6,$

$$2x + y \geq 8, x \geq 0, y \geq 0$$

সমীকৃত রূপ: $x + y = 6$

$$\Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{6} = 1 \dots (i)$$

$$\text{এবং } 2x + y = 8$$

$$\Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{8} = 1 \dots (ii)$$


$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং এর ছেদবিন্দু } (2, 4)$$

$$A(6,0) \text{ বিন্দুতে } z = 3 \times 6 + 0 = 18$$

$$B(0,8) \text{ বিন্দুতে } z = 0 + 2 \times 8 = 16$$

$$C(2,4) \text{ বিন্দুতে } z = 3 \times 2 + 2 \times 4 = 14$$

$$\therefore Z_{\min} = 14$$



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. Feasible Region/ সম্ভাব্য সমাধান এলাকা কোন চতুর্ভুজে অবস্থান করে?

[BSMRSTU. 18-19]

A. ১ম
B. ২য়
C. ৩য়
D. যেকোনো চতুর্ভুজে

[S@Why] সম্ভাব্য সমাধান এলাকা, ১ম চতুর্ভুজে অবস্থান করবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

গণিত ২য় পত্র

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

01. $(1+x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে 21 তম পদ ও 22 তম পদ দুইটি সমান হলে, x এর মান কত? [IU. 17-18; KU. 11-12; CU. 11-12; JU. 05-06; ঢাবো. ২০১৩; ১০; সি.বো. ২০১৩; ০৯; ব.বো. ২০১৩, ১১, ০৮, ০৫; য.বো. ২০১৩; কু.বো. ২০১৬, ০৫; চ.বো. ২০১৪, ১২, ০৮, ০৫; রা.বো. ২০০৫; সি.বো. ২০১৪, ০৭]

- A. $\frac{7}{8}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{6}{7}$ D. $\frac{1}{7}$

[S@Why] $(1+x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে r ও $(r+1)$ তম পদ পরস্পর সমান হলে,
 $x = \frac{r}{n-(r-1)} = \frac{21}{44-(21-1)} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

02. $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^{18}$ -এর বিস্তৃতিতে x -বর্জিত পদটির মান কত?

- A. 18564 B. 16842 C. 24356 D. 12478

[S@Why] Here, $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^{18} = \left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{18} \therefore r = \frac{18 \times 1 - 0}{1 - (-2)} = 6$
 $\therefore x$ বর্জিত পদ = ${}^{18}C_6 \times (1)^{18-6} \times (-1)^6 = 18564$

03. $\left(3x^2 - \frac{1}{3x}\right)^5$ এর বিস্তৃতিতে x -এর সহগ কোনটি? [IU. 16-17; RU. 07-08; RUET. 12-13]

- A. $\frac{3}{10}$ B. $-\frac{3}{10}$ C. $-\frac{10}{3}$ D. $\frac{10}{3}$

[S@Why] $r = \frac{5 \times 2 - 1}{2 - (-1)} = 3$
 $\therefore x$ বর্জিত পদ = ${}^5C_3 \times (3)^{5-3} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{10}{3}$

04. $\left(\frac{3}{x} + \frac{x}{3}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের মান- [IU. 12-13, 10-11]

- A. ${}^{10}C_5$ B. ${}^{10}C_7$ C. ${}^{10}C_3$ D. ${}^{10}C_3$

[S@Why] বিস্তৃতির ঘাত জোড় সংখ্যা বলে একটি মধ্যপদ আছে।
 $\therefore$ মধ্যপদটি = $\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \left(\frac{10}{2} + 1\right) = 6$ তম পদ।
 $\therefore$ মধ্যপদটির মান = $T_{5+1} = {}^{10}C_5 \left(\frac{3}{x}\right)^{10-5} \left(\frac{x}{3}\right)^5 = {}^{10}C_5$

05. প্যাসকেলের ত্রিভুজের 5 তম সারির মধ্যপদ কোনটি? [IU. 11-12]

- A. 5 B. 7 C. 6 D. 10

[S@Why] প্যাসকেলের ত্রিভুজের 5 তম সারির মধ্যপদ 6।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\frac{1}{(1-x)(3-x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^{10} এর সহগ হবে- [BRUR-E. 19-20]

- A. $\frac{1}{2}(1+3^{-11})$ B. $\frac{1}{2}(1-3^{-11})$ C. $\frac{1}{2}(1-3^{10})$ D. $\frac{1}{2}(1+3^{10})$

[S@Why] $\frac{1}{(1-x)(3-x)} = \frac{1}{3(1-x)\left(1-\frac{x}{3}\right)}$
 $\therefore x^{10}$ এর সহগ = $\frac{1}{3} \cdot \frac{1^{10+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{10+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3^{11}}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{11}}\right)$

01. $n \in \mathbb{N}$ হলে $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম ও r তম পদের সহগের অনুপাত কত? [BU. 18-19]

- A. $\frac{n-r-1}{r}$ B. $\frac{n-r}{r}$ C. $\frac{n-r+1}{r}$ D. $\frac{{}^nC_{r+1}}{{}^nC_r}$

[S@Why] সরাসরি সূত্র।

02. একটি গুণোত্তর ধারার দ্বিতীয় ও পঞ্চম পদ যথাক্রমে -48 ও $\frac{3}{4}$ হলে সাধারণ অনুপাত কত? [BU. 18-19]

- A. $-\frac{3}{4}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

[S@Why] $ar = 48$ (i)
 $ar^4 = \frac{3}{4}$ (ii); (i) $\div$ (ii) $\rightarrow r^3 = \frac{1}{64} \therefore r = \frac{1}{4}$

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. $\left(2x^2 + \frac{1}{x^2} - 2\sqrt{2}\right)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে ধ্রুবক পদটি কত? [SUST-B. 19-20]

- A. 1 B. ${}^{24}C_{12} 2^{12}$ C. ${}^{12}C_6 2^6$ D. ${}^{24}C_{12} 2^6$ E. 0

[S@Why] $\left(2x^2 + \frac{1}{x^2} - 2\sqrt{2}\right)^{12} = \left\{\left(\sqrt{2}x\right)^2 - 2\sqrt{2}x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right\}^{12}$
 $= \left\{\left(\sqrt{2}x - \frac{1}{x}\right)^2\right\}^{12} = \left(\sqrt{2}x - \frac{1}{x}\right)^{24}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটি ধ্রুব পদ
 অর্থাৎ x বর্জিত। $\therefore r = \frac{24}{1+1} = 12 \therefore$ ধ্রুবপদটি = ${}^{24}C_{12} (\sqrt{2})^{12} = {}^{24}C_{12} 2^6$

02. $\frac{x}{(1-4x)(1-5x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $(5^r + k4^r)$ হলে k এর মান কত? [SUST. 16-17]

- A. 1 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$ E. 2

[S@Why] $\frac{x}{(1-4x)(1-5x)} = \frac{\frac{1}{4}}{\left(-\frac{1}{4}\right)(1-4x)} + \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{4}(1-5x)} = \frac{1}{1-5x} - \frac{1}{1-4x}$
 $= (1+5x+5^2x^2+\dots) + 5^r x^r + \dots - (1+4x+4^2x^2+\dots+4^r x^r+\dots)$
 $\therefore x^r$ এর সহগ = $5^r - 4^r \therefore k = -1$

03. $\left(2x^2 - 1/x\right)^9$ বিস্তৃতিতে ধ্রুবক পদটি কত? [SUST. 10-11]

- A. 2^0 B. 0 C. 360 D. 672

[S@Why] $18 - 2r - r = 0 \Rightarrow r = 6$
 ধ্রুবক পদ, ${}^9C_6 \cdot 2^3 \cdot (-1)^6 = 672$

04. $(1+x)^n = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^r (r+1)x^r + \dots$ হলে $n = ?$ [SUST. 10-11]

- A. -1 B. -2 C. -3 D. -4

[S@Why] $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^r (r+1)x^r + \dots$
 $\therefore n = -2$

অধ্যায় ১০ বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

প্রথম অংশ: বিস্তার পরিমাপ

STEP 01 বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও প্যাটার্নসহ সমাধান

STEP 02 ANALYSIS OF GST QUESTION

01. দুটি সংখ্যার গাণিতিক গড় 26 এবং গড় ব্যবধান 5 হলে সংখ্যা দুটি কী? [GST-C. 20-21]
A. 16, 36 B. 12, 40 C. 20, 32 D. 21, 31

[SOWhy] ধরি, সংখ্যা দুই x, y এবং $x > y$
দেওয়া আছে, $\frac{x+y}{2} = 26$ এবং $\frac{x-26}{2} = 5$

$\Rightarrow x + y = 52$ এবং $(x - 26) - (y - 26) = 10$
 $\therefore x + y = 52$ এবং $x - y = 10 \therefore x = 31, y = 21$

PART A ANALYSIS OF GENERAL UNIVERSITY QUESTION

01. তোমার 15 জন বন্ধুর বয়সের গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 10 ও 2 হলে বয়সের বিভেদাঙ্ক কত? [KU. 19-20]
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

[SOWhy] গড়, $\bar{x} = 10$; পরিমিত ব্যবধান, $\delta = 2$

বিভেদাঙ্ক $= \frac{\delta}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$

02. দুটি অসম রাশির গাণিতিক গড় এবং ভেদাঙ্ক যথাক্রমে 12 এবং 36 হলে রাশি দুটির মান কত? [KU. 19-20]
A. 14, 10 B. 15, 9 C. 16, 8 D. 18, 6

[SOWhy] $\frac{x_1 + x_2}{2} = 12 \Rightarrow x_1 + x_2 = 24 \Rightarrow x_2 = 24 - x_1$ ভেদাঙ্ক $\delta^2 = 36$

$\therefore$ পরিমিত ব্যবধান $\delta = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2}{2} - (\bar{x})^2}$

$\Rightarrow 6 = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2}{2} - (12)^2} \Rightarrow 6 = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 - 288}{2}}$

$\Rightarrow 36 = \frac{x_1^2 + (24 - x_1)^2 - 288}{2} \Rightarrow 72 + 288 = x_1^2 + (24 - x_1)^2$

$\Rightarrow x_1^2 + 24^2 - 48x_1 + x_1^2 = 360 \Rightarrow 2x_1^2 - 48x_1 + 216 = 0$

$\Rightarrow x_1^2 - 24x_1 + 108 = 0 \Rightarrow x_1^2 - 18x_1 - 6x_1 + 108 = 0$

$\Rightarrow x_1(x_1 - 18) - 6(x_1 - 18) = 0 \Rightarrow (x_1 - 6)(x_1 - 18) = 0$

$\Rightarrow x_1 = 6, 18 \Rightarrow x_1 = 6$ হলে $x_2 = 24 - 6 = 18$

$\Rightarrow x_1 = 18$ হলে $x_2 = 24 - 18 = 6$

01. প্রথম 10টি সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান- [IU-A. 19-20]
A. 2.87 B. 3.50 C. 4.27 D. 4.89

[SOWhy] $\delta = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{12}} = \sqrt{\frac{10^2 - 1}{12}} = \sqrt{\frac{99}{12}} = 2.87$

02. 4, 6, 7, 10 তথ্য সারির গড় ব্যবধান- [IU-D. 19-20]
A. 3.15 B. 2.75 C. 2.13 D. 1.88

[SOWhy] 4, 6, 7, 10 এর গড় $= \frac{27}{4} = 6.75 \therefore$ তথ্য সারি গড় ব্যবধান,
 $= \frac{|4 - 6.75| + |6 - 6.75| + |7 - 6.75| + |10 - 6.75|}{4} = 1.75$

03. Geometric mean, arithmetic mean থেকে সবসময়- [IU. 15-16]
A. ছোট হবে B. বড় হবে
C. সমান হবে D. ছোট বড় দুই রকমের হতে পারে
[SOWhy] $AM > GM > HM$

[] বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় **[]**

01. প্রথম 7টি স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান হবে- [BRUR-E. 19-20; NSTU. 18-19]
A. 2 B. 2.5 C. 1.9 D. 3

[SOWhy] $\delta = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{12}} = \sqrt{\frac{7^2 - 1}{12}} = \sqrt{4} = 2$

[] জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় **[]**

01. $-2a, -a, 0, a, 2a$ সংখ্যাগুলির গড় ব্যবধান কত? [JKKNU. 18-19]
A. $a\sqrt{2}$ B. $6a$ C. $\frac{6a}{5}$ D. $\frac{a}{\sqrt{3}}$

[SOWhy] প্রয়োজনীয় সূত্র দেখে নাও।

PART B ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION

[] শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[]**

01. 8, 9, 10, 11, 12 সংখ্যাগুলির বিভেদাঙ্ক কত? [SUST. 16-17, B]
A. 11.11 B. 12.12 C. 13.13 D. 14.14 E. 15.15

[SOWhy] $\sigma^2 = \frac{n^2 - 1}{12} = \frac{5^2 - 1}{12} = 2 \therefore \sigma = \sqrt{2}$

$\therefore C.V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 = \frac{\sqrt{2}}{10} \times 100 = 14.14$

02. $x, x+2, 7, 11$ ধনাত্মক সংখ্যাগুলির বর্গের গড় 51 হলে x এর মান কত? [SUST. 15-16]
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3

[SOWhy] প্রয়োজনীয় সূত্র দেখে নাও।

03. 3, 4, 6, 11 তথ্যসারির পরিমিত ব্যবধান কত? [SUST. 14-15]
A. $\frac{38}{4}$ B. $\frac{\sqrt{38}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{182}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{19}}{4}$ E. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[SOWhy] তথ্য সারির গড় মান $= \frac{3+4+6+11}{4} = 6$

$\therefore$ পরিমিত ব্যবধান $= \sqrt{\frac{(3-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (11-6)^2}{4}} = \frac{\sqrt{38}}{2}$

[] মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[]**

01. 2, 5, 4, 9, 7, 13 সংখ্যাগুলির মধ্যমা হবে- [MBSTU. 18-19]
A. 4 B. 8 C. 10 D. 6

[SOWhy] 2, 5, 4, 9, 7, 13
2, 4, 5, 7, 9, 13 যাদের মধ্যমা $= \frac{5+7}{2} = 6$

02. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ভেদাঙ্ক কত? [MBSTU-A. 17-18]
A. $\frac{n^2 - 1}{12}$ B. $\frac{n + 1}{6}$ C. $\frac{n^2 + 1}{12}$ D. $\frac{n(n + 1)}{12}$

[SOWhy] $\sigma^2 = \frac{n^2 - 1}{12}$

[] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় **[]**

01. পরিসর সম্পর্কে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? [BSMRSTU-B. 19-20]
A. $R = X_{\max} + X_{\min}$ B. $R = X_{\max} - X_{\min}$
C. $R = X_{\min} - X_{\max}$ D. কোনোটিই নয়

[SOWhy] পরিসর $= X_{\max} - X_{\min}$

02. পরিমিত ব্যবধানের সর্বনিম্ন মান কোনটি? [BSMRSTU. 18-19]
A. 0 B. 1 C. -1 D. কোনটিই নয়

[SOWhy] Standard deviation $= \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$

Formula থেকে বোঝাই যায় যে Standard deviation এর সর্বনিম্ন মান = 0

02. 15 জন বালক ও 12 জন বালিকার হাটার প্রতিযোগিতায় একত্রে একজন বালিকার প্রথম এবং একজন বালকের দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনা-
[IU: 14-15]

A. $\frac{15}{27}$
C. $\frac{12}{27} \cdot \frac{15}{26}$

B. $\frac{12}{27}$
D. $\frac{12}{26} \cdot \frac{15}{26}$

[SOWhy] মোট প্রতিযোগী = $15 + 12 = 27$ জন।

$\therefore$ বালিকার প্রথম হবার সম্ভাব্যতা = $\frac{12}{27}$

আবার, বালকের দ্বিতীয় হবার সম্ভাব্যতা = $\frac{15}{26}$

$\therefore$ নির্ণেয় সম্ভাব্যতা = $\frac{12}{27} \cdot \frac{15}{26}$

03. দুটি বর্জনশীল ঘটনা একত্রে ঘটার সম্ভাবনা কত?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0 [IU: 11-12]

PART (B) ANALYSIS OF SCIENCE & TECHNOLOGY QUESTION
[SOWhy] শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি A এবং B দুটি স্বাধীন ঘটনা হয় যেখানে $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, তবে $P(A' \cap B)$ এর মান কত (এখানে A' , A এর পূরক ঘটনা)? [SUST-B: 19-20]
A. 0.7 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.1 E. 1

[SOWhy] $P(A') = 1 - P(A) = 1 - 0.4 = 0.6$

$\therefore P(A' \cap B) = P(A') \cdot P(B) = (0.6) (0.5) = 0.3$

02. 0 হতে 30 পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার সেট থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা নেওয়া হলে সংখ্যাটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত? [SUST: 15-16]
A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{11}{15}$ D. $\frac{8}{15}$ E. $\frac{1}{15}$

[SOWhy] বিজোড় সংখ্যা = 15 টি;

মৌলিক সংখ্যা 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 = 9টি

$\therefore$ নির্ণেয় সম্ভাব্যতা = $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$

03. একটি তাসের প্যাকেট থেকে একটি তাস দৈবচয়নভাবে উঠানো হলো। তাসটি হরতন বা রাজা হবার সম্ভাবনা কত? [SUST: 08-09]
A. 1 B. 1/2 C. 4/13 D. 1/13

[Ans C]

04. A ও B এর একটি অংক সমাধান করতে পারার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{3}$ ও $\frac{1}{4}$ । তারা একত্রে সমাধানের চেষ্টা করলে অংকটি সমাধান করতে পারার সম্ভাবনা কত? [SUST: 05-06]
A. 1/2 B. 7/12 C. 1/12 D. 3/4

[SOWhy] A এর অংকটি করতে না পারার সম্ভাবনা = $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$; B এর

অংকটি করতে না পারার সম্ভাবনা = $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$;

$\therefore$ তারা একত্রে সমাধান করতে না পারার সম্ভাবনা = $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

$\therefore$ তারা একত্রে সমাধান করতে পারার সম্ভাবনা = $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

গণিত ২য় পত্র

[SOWhy] যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. 52 টি তাস থেকে 2 টি তাস নির্বাচনে টানা হলে তাস 2 টি একই রঙের রাজা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত? [JUST-A: 19-20]
A. 0.0045 B. 0.003 C. 0.0015 D. 0.006

[SOWhy] দুটি তাস টানা হলে,

দুটি তাসই কালো রাজা হওয়ার সম্ভাব্যতা = $\frac{2}{52} \times \frac{1}{51}$

দুটি তাসই লাল রাজা হওয়ার সম্ভাব্যতা = $\frac{2}{52} \times \frac{1}{51}$

$\therefore$ দুটি তাসই একই রং এর রাজা হওয়ার সম্ভাব্যতা

= $\frac{2}{52} \times \frac{1}{51} + \frac{2}{52} \times \frac{1}{51} = 0.0015$

02. 200 জন পরীক্ষার্থীর 40 জন গণিতে, 20 জন পরিসংখ্যানে ফেল করে এবং উভয় বিষয়ে 10 জন ফেল করে। একজন পরীক্ষার্থী দৈবভাবে নেওয়া হলে সে গণিতে ফেল কিন্তু পরিসংখ্যানে পাশ করার সম্ভাবনা কত? [JUST: 18-19]
A. $\frac{1}{20}$ B. $\frac{1}{10}$ C. $\frac{3}{20}$ D. $\frac{1}{5}$

[Ans C]

03. কোন বাগ্জে 6টি লাল ও 4টি সাদা বল আছে। পুনঃস্থাপন না করে 2টি বল নেয়া হলে বল দুইটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা হবে- [JUST-A: 14-15]
A. $\frac{2}{15}$ B. $\frac{7}{15}$ C. $\frac{8}{15}$ D. $\frac{1}{15}$ E. $\frac{4}{15}$

[SOWhy] লাল বল = 6

সাদা বল = 4

মোট বল = 10

$\therefore$ বল দুইটি সাদা হবার সম্ভাবনা = $\frac{{}^4C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{2}{15}$

04. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা-২০১৪ এ A ইউনিটে 9401 জন, B ইউনিটে 7889 জন, C ইউনিটে 4134 জন, D ইউনিটে 3615 জন এবং E ইউনিটে 823 জন নিবন্ধনকৃত পরীক্ষার্থী রয়েছে। একজন পরীক্ষার্থী C ইউনিটের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করলে, ঐ ইউনিটে তার ভর্তির সুযোগের সম্ভাব্যতা কত? C ইউনিটের আসন সংখ্যা 170। [JUST-C: 14-15]
A. $\frac{1}{170}$ B. $\frac{170}{4134}$ C. 1 D. $\frac{4134}{25862}$ E. $\frac{170}{25862}$

[SOWhy] A ইউনিট = 9401 জন; B ইউনিট = 7889 জন

C ইউনিট = 4134 জন; D ইউনিট = 3615 জন

E ইউনিট = 823 জন; C ইউনিটে আসন সংখ্যা = 170

C ইউনিটে 'মেধাতালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। ঐ ইউনিটে তার ভর্তির সুযোগের সম্ভাব্যতা = 1

[SOWhy] মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. P এবং Q দুটি সেট হলে $(P \setminus Q) \cap Q = ?$ [MBSTU-A: 19-20]
A. $P \setminus Q$ B. $P \cap Q$ C. P D. $\emptyset$

[SOWhy] $(P \setminus Q) \cap Q = \emptyset$

02. একটি থলেতে 4টি লাল, 3টি সবুজ এবং 5টি কালো বল রয়েছে। ঐ থলে থেকে একটি বল দৈবভাবে বের করলে, বলটির লাল হবার সম্ভাব্যতা কত? [MBSTU-A. 19-20]

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{5}$

[S@Why] 4টি লাল, 3টি সবুজ, 5টি কালো

∴ মোট বল = 12

∴ একটি বল দৈবভাবে বের করলে লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

03. একটি মুদ্রা তিনবারের নিক্ষেপ করা হল। উপরের পিঠে কোন হেড না আসার সম্ভাবনা- [MBSTU. 18-19]

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{6}$
C. $\frac{1}{3}$ D. 9

[S@Why] No Head → TTT ∴ $P = \frac{1}{8}$

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. De-Morgan's Law অনুসারে $(\overline{A \cap B})$ এর জন্য কোনটি সঠিক?

[BSMRSTU-B. 19-20]

- A. $\bar{A} \cap \bar{B}$ B. $\bar{A} + \bar{B}$
C. $(\bar{A} \cap \bar{B})$ D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

[S@Why] De-Morgan's Law $(\overline{A \cap B}) = \bar{A} \cup \bar{B}$

02. বর্জনশীল ঘটনার জন্য শর্ত কোনটি? [BSMRSTU-A. 19-20, 18-19]

- A. $P(A \cup B) = 1$ B. $P(A \cap B) = 1$
C. $P(A \cup B) = 0$ D. $P(A \cap B) = 0$

[S@Why] বর্জনশীল ঘটনার শর্ত: $P(A \cap B) = 0$

03. 5 থেকে 30 পর্যন্ত যে কোনো একটি সংখ্যা নিলে সেই সংখ্যাটি মৌলিক অথবা 5 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাব্যতা কত? [BSMRSTU-B. 19-20]

- A. $\frac{10}{26}$ B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{11}{26}$ D. কোনোটিই নয়

[S@Why] 5 থেকে 30 পর্যন্ত একটি সংখ্যা নিলে সংখ্যাটি মৌলিক বা 5 এর

গুণিতক হওয়ার সম্ভাব্যতা = $\frac{8}{26} + \frac{6}{26} - \frac{1}{26} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}$

04. $P(A) = 0.7$ এবং $P(A \cap B) = 0.3$ হলে, $P(B/A) = ?$ [BSMRSTU. 18-19]

- A. $\frac{3}{7}$ B. $\frac{7}{3}$
C. 0.7 D. 0.3

[Ans A]

05. Feasible Region/ সম্ভাব্য সমাধান এলাকা কোন চতুর্ভুজে অবস্থান করে?

[BSMRSTU. 18-19]

- A. ১ম B. ২য়
C. ৩য় D. কোনোটিই নয়

[Ans A]

06. 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা নেওয়া হল। সংখ্যাটি বর্গসংখ্যা না হওয়ার সম্ভাব্যতা কত? [BSMRSTU. 18-19]

- A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{1}{10}$
C. $\frac{9}{11}$ D. $\frac{10}{11}$

[S@Why] 1 থেকে 99 পর্যন্ত বর্গ হয় এরূপ = $\sqrt{99} = 9.94 = 9$ টি

∴ সংখ্যাটি বর্গ না হবার সম্ভাব্যতা = $1 - \frac{9}{99} = 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$

07. একটি বস্ত্রে 6টি সাদা ও 5টি লাল বল আছে। তা হতে পুনঃস্থাপন করে 2টি বল নেয়া হল। বল দুটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত? [BSMRSTU-B. 16-17; BUET. 04-05]

- A. $\frac{6}{11}$ B. $\frac{36}{11}$
C. $\frac{5}{11}$ D. $\frac{36}{121}$

বাক্স

সাদা = 6

লাল = 5

মোট = 11

[S@Why]

∴ পুনঃস্থাপন করলে বলদুটি সাদা হবে = $\frac{6}{11} \times \frac{6}{11} = \frac{36}{121}$

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. প্রথম বুড়িতে 3টি কাঁচা আম ও 2টি পাকা আম আছে। দ্বিতীয় বুড়িতে 2টি কাঁচা আম ও 5টি পাকা আম আছে। নিরপেক্ষভাবে উভয় বুড়ি থেকে 1টি করে আম তোলা হলে অন্তত 1টি পাকা আম পাবার সম্ভাব্যতা কত? [PSTU-A/A₂. 16-17]

- A. $\frac{29}{35}$ B. $\frac{11}{35}$
C. $\frac{6}{35}$ D. 1

[S@Why]

১ম বুড়ি

কাঁচা আম = 3টি

পাকা আম = 2টি

মোট = 5টি

কাঁচা আম = 2টি

পাকা আম = 5টি

মোট = 7টি

i. 1টি পাকা আম পাবার সম্ভাব্যতা = $\frac{2}{5} \times \frac{2}{7}$ বা, $\frac{3}{5} \times \frac{5}{7}$

∴ অন্তত 1টি পাকা আম পাবার সম্ভাব্যতা = $\left(\frac{4}{35} + \frac{15}{35} + \frac{10}{35}\right) = \frac{29}{35}$

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

01. 0, 1, 2 দ্বারা গঠিত তিন অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যাকে 10 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাব্যতা হবে- [BSFMSTU. 19-20]

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{1}{6}$

[S@Why] 0, 1, 2 অংকগুলো দ্বারা 3 অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করা যাবে = ${}^3P_3 - {}^2P_2 = 4$ টি এবং অংকগুলো দ্বারা 3 অঙ্ক বিশিষ্ট 10 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা গঠন করা যাবে 2টি

∴ 0, 1, 2 অংকগুলো দ্বারা 3 অঙ্কবিশিষ্ট 10 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাব্যতা = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$