

জীববিজ্ঞান

গুরুত্ব বুঝে অধ্যয়ন

অধ্যয়নভিত্তিক সূচিপত্র

নিভা সবার প্রায়াজন

অধ্যায় ক্রমঃ	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র		
অধ্যায় - ০১	কোষ ও এর গঠন	৬৫৩
অধ্যায় - ০২	কোষ বিভাজন	৬৬২
অধ্যায় - ০৩	কোষ রসায়ন	৬৬৬
অধ্যায় - ০৪	অণুজীব	৬৭১
অধ্যায় - ০৫	শৈবাল ও ছত্রাক	৬৭৭
অধ্যায় - ০৬	ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা	৬৮০
অধ্যায় - ০৭	নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৬৮২
অধ্যায় - ০৮	টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র	৬৮৬
অধ্যায় - ০৯	উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	৬৮৯
অধ্যায় - ১০	উদ্ভিদ প্রজনন	৬৯৫
অধ্যায় - ১১	জীব প্রযুক্তি	৬৯৭
অধ্যায় - ১২	জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ	৭০০


অধ্যায় ক্রমঃ	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র		
অধ্যায় - ০১	প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস	৭০৪
অধ্যায় - ০২	প্রাণীর পরিচিতি	৭০৯
অধ্যায় - ০৩	পরিপাক ও শোষণ	৭১৫
অধ্যায় - ০৪	রক্ত ও সংগলণ	৭১৯
অধ্যায় - ০৫	শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া	৭২৫
অধ্যায় - ০৬	বর্জ্য ও নিষ্কাশন	৭২৮
অধ্যায় - ০৭	চলন ও অঙ্গচালনা	৭৩১
অধ্যায় - ০৮	সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ	৭৩৫
অধ্যায় - ০৯	মানব জীবনের ধারাবাহিকতা	৭৪১
অধ্যায় - ১০	মানবদেহের প্রতিরক্ষা	৭৪৪
অধ্যায় - ১১	জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন	৭৪৭
অধ্যায় - ১২	প্রাণীর আচরণ	৭৫৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা বইটির জীববিজ্ঞান অংশের

বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানতে আসপেক্ট বায়োলজি বইটি দেখ!!!!!!

দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেশসেরা

আসপেক্ট সিরিজ-এর বইগুলো সর্বদাই অতুলনীয়



অধ্যায়
০১

কোষ ও এর গঠন

জীববিজ্ঞান
১ম পত্র

সাজেশনস	RATINGS		
	★★★	★★	★
কোষ	কোষের প্রকারভেদ, প্রাথমিক কথা	আবিষ্কার ও আবিষ্কারক	আদিকোষ ও প্রকৃতকোষ
কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু	কোষপ্রাচীর, প্রাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস	কোষঝিল্লি, রাইবোসোম, গলগিবস্তু	লাইসোসোম, সেন্ট্রিওল, ER
বংশগতি	ক্রোমোসোম, DNA	নিউক্লিক এসিড, RNA	কোড ও কোডন

TOPIC-01

কোষীয় অঙ্গাণুর আবিষ্কার ও বিভিন্ন নাম

আবিষ্কারের গণ্ডে আবিষ্কারকের সাথে	কি নামে ডাকিব তোমায়
- কোষ- রবার্ট হুক (1665) - প্রোটোপ্লাজম/প্রোটোপ্লাস্ট- পার্কিনজে - কোষ প্রাচীর- রবার্ট হুক - নিউক্লিয়াস- রবার্ট ব্রাউন (1831) - মাইটোকন্ড্রিয়া- কলিকার (1850) (নামাকারক-কার্ল বেভা) - গলগি বস্তু- ক্যামিলো গলগি (1898) - লাইসোসোম- আলেকজান্ডার ফ্রেমিং - রাইবোসোম- প্যালাড - নিউক্লিক এসিড- মিশার - প্রাস্টিড- শিম্পার - প্রাজমা মেমব্রেন- কার্ল নাগেলী (1855) - পারঅক্সিসোম- দ্য দু'বে - জিন- মেডেল - কৃত্রিম জিন/ জেনেটিক কোড- হর গোবিন্দ খোরানা - জীবিত কোষ পর্যবেক্ষণ- লিউয়েন হুক - ক্রোরোপ্লাস্ট- শিম্পার (1883)	- মাইটোকন্ড্রিয়া- শক্তি ঘর বা পাওয়ার হাউজ - রাইবোসোম- প্রোটিন ফ্যাক্টরি - ক্রোরোপ্লাস্ট- শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু, কোষের রান্নাঘর, শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা। - গলগি বডি- লাইসোসোম, ডিকটিয়োসোম, ট্রাফিক পুলিশ, কার্বহাইড্রেট ফ্যাক্টরি, ইডিওসোম - লাইসোসোম- আত্মঘাতী থলিকা, সুইসাইডাল স্কোয়াড, এনজাইমের আঁধার - নিউক্লিয়াস- কোষের প্রাণ কেন্দ্র - প্রোটোপ্লাজম- জীবনের ভৌত ভিত্তি - ক্রোমোসোম- বংশগতির ভৌত ভিত্তি - এনজাইম- প্রোটিন তৈরীর ফার্ম/ কর্মী - অ্যামাইনো এসিড- প্রোটিন তৈরীর কাঁচামাল - RNA- প্রোটিন তৈরীর ব্রু-প্রিন্ট - DNA- প্রোটিন তৈরীর মাস্টার প্র্যান বলা হয়

TOPIC-02

প্রাথমিক কথা

- জীবের গঠন ও কার্যিক একককে কোষ বলে
- সবচেয়ে ছোট কোষ মাইকোপ্লাজমা (PPL- Pleuron Pneumonia Like Organism)
- সবচেয়ে বড় কোষ উট পাখির ডিম (17×12.5 সে.মি.)
- মানবদেহে সবচেয়ে দীর্ঘতম কোষ হচ্ছে নিউরন কোষ (1.37 মিটার লম্বা)
- জীববিদ্যার যে শাখায় কোষ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি বলে।
- রবার্ট হুক কোষ বিদ্যার জনক তবে, আধুনিক কোষ বিদ্যার জনক সোয়ানসন
- "Cell" শব্দের প্রবর্তক - রবার্ট হুক
- কোষ তত্ত্ব: জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী শ্লেইডেন ও প্রাণীবিজ্ঞানী থিওডোর সোয়ান (১৮৩৮-১৮৩৯) সালে কোষ তত্ত্ব প্রদান করেন। ১৮৫৫ সালে আবার ভার্ল কোষ তত্ত্ব প্রদান করেন।
- এভেসিমবায়োসিস: নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট একটি পোষক কোষে বায়বীয় ও ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে টিকে থাকার প্রক্রিয়াকে বলা হয় এভেসিমবায়োসিস।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
কোষপ্রাচীর	থাকে, সেলুলোজ নির্মিত, পুরু, ভেদ্য	থাকে না
মাইক্রোভিলাই	থাকে না	থাকে
প্রাস্টিড	থাকে (ব্যতিক্রম-ছত্রাক)	থাকে না
সেন্ট্রোজোম	থাকে না	থাকে
লাইসোসোম	থাকে না	থাকে
পিনোসাইটিক গহ্বর	গঠিত হয় না	গঠিত হয়
প্রাজমোডেজমাটা	গঠিত হয়	হয় না

TOPIC-03

কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু পরিচিতি

01. কোষপ্রাচীর:

- উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য।
- দুটি পাশাপাশি কোষের প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে নলাকার সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হয় একে প্রাজমোডেজমাটা বলে।
- মুখোমুখি দুটি কূপকে পিট পেয়ার বলে।
- মাইসেলিকে কোষপ্রাচীরের ক্ষুদ্রতম একক ধরা হয়।
- কোষপ্রাচীরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান সেলুলোজ।
- সেলুলোজ অণু $\xrightarrow{1000-3000}$ সেলুলোজ চেইন $\xrightarrow{100}$ মাইসেলি $\xrightarrow{20}$ মাইক্রোফাইব্রিল $\xrightarrow{250}$ ম্যাক্রোফাইব্রিল $\rightarrow$ কোষপ্রাচীর।

02. নিজীব বস্তু: তিনভাগে করা যায়:

- সঞ্চিত পদার্থ- সঞ্চিত পদার্থের অধিকাংশই সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে বিরাজ করে। উদাহরণ- শর্করা, আমিষ, চর্বি।
- নিঃসৃত পদার্থ: প্রধান নিঃসৃত পদার্থ- PHEN

P	H	E	N
পিগমেন্ট	হরমোন	এনজাইম	নেকটার

- বর্জ্য পদার্থ: প্রধান খনিজ ক্রিস্টাল হলো ক্যালসিয়াম অক্সালেট। এরা সূচের মত অবস্থান করলে র্যাফাইড বলে, আঙ্গুরের খোকার মত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ক্রিস্টালকে সিষ্টোলিথ বলে। উদাহরণ- রেজিন, ট্যানিন, গাম, ল্যাটেক্স, অ্যালকালয়েড, জৈব এসিড, উদ্বায়ী তেল, খনিজ পদার্থ।

03. প্রোটোপ্লাজম: কোষের অভ্যন্তরে অর্ধ-সচ্ছ, আঠালো, এবং জেলির ন্যায় অর্ধ তরল, কলয়ডাল ধর্মী সজীব পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজমের জৈবিক বৈশিষ্ট্যই জীবের বৈশিষ্ট্য (হাস্কলের মতে, প্রোটোপ্লাজম জীবনের ভৌত ভিত্তি)।

04. কোষঝিল্লী: লিপিড, মেমব্রেন প্রোটিন, গ্রাইকোক্যালিক্স ও কোলেস্টেরল দ্বারা গঠিত যা বৃহৎ অণু সংশ্লেষ করে (মোট ওজনের ৭৫ ভাগই লিপিড)।

মতবাদের নাম	প্রবক্তা
প্রোটিন ক্রিস্টাল মডেল	Vanderkoff ও Green
একক পর্দা হাইপোথিসিস	রবার্টসন
মাইসেলার মডেল	Hiller ও Hoffman
Sandwich model	Danielli & Davson, দ্বিতরী
Fluid Mosaic model/ আইসবার্গ মডেল/হিমশেল	Singer ও Nicholson, দ্বিতরী- সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য

05. সাইটোপ্লাজম: সাইটোপ্লাজমের মাতৃকাকে হ্যালালোপ্লাজম বা সাইটোসোল বলে।

06. রাইবোসোম:

- সর্বজনীন অঙ্গাণু।
- E.Coli কোষের শুষ্ক ওজনের ২২ ভাগই রাইবোসোম।
- 70S (50S + 30S সাব ইউনিট) রাইবোসোমে 52 প্রকারের প্রোটিন অণু ও 3 প্রকারের rRNA থাকে।
- 80S (60S + 40S সাব ইউনিট) রাইবোসোমে 80 প্রকারের প্রোটিন অণু ও 4 প্রকারের rRNA থাকে।
- রাসায়নিক গঠন $\rightarrow$ প্রোটিন + rRNA।

07. গলগি বডি:

- লাইসোসোম তৈরি করে।
- কোষ বিভাজনকালে কোষপ্রেট তৈরি করে।
- শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম তৈরি করে।
- মাইটোকন্ড্রিয়া ATP সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম সৃষ্টি করে।

08. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম: পরিণত কোষে সাইটোপ্লাজমে যে জালিকা বিন্যাস দেখা যায় তাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে।

- অমসৃণ জালিতে RNA ও গ্লাইঅক্সিসোম নামক ক্ষুদ্রাকার কণা থাকতে পারে।
 - অমসৃণ রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশকে মাইক্রোসোম বলে।
 - ১৫ ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়।
 - পরিণত লোহিত কণিকা ও আদিকোষ ছাড়া প্রায় সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে থাকে।
- সি → সিস্টারনি (শাখাখীন); ভে → ভেসিকল (বর্তুলাকার);
ট → টিউবিউলস (শাখাখিত)।

09. মাইটোকন্ড্রিয়া: মাইটোকন্ড্রিয়াতে ক্রিস্টি, অক্সিজোম, ম্যাট্রিক্স, বৃত্তাকার DNA বিদ্যমান

- RBC-তে থাকে না। 100/70 প্রকারের এনজাইম ও কো-এনজাইম রয়েছে।
- শক্তি ঘর বা Power House বলা হয়।

➤ সংখ্যা: প্রতিটি উদ্ভিদ কোষে 300-400টি এবং প্রাণী কোষে 200-300টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। তবে যকৃত কোষে 1000 বা ততোধিক (Amoeba তে আরো বেশি) থাকে।

10. প্রাস্টিড: প্রাস্টিড ৩ প্রকার-

- ক্লোরোপ্রাস্ট- সবুজ অঙ্গে (পাতা) পাওয়া যায়।
- ক্রোমোপ্রাস্ট- রঙিন অংশে (ফুলের পাপড়ি) পাওয়া যায়।
- লিউকোপ্রাস্ট- ভূমিস্থ কান্ড: অ্যামাইলোপ্রাস্ট- স্টার্চ, ইলায়োপ্রাস্ট- চর্বি, অ্যালিউরোপ্রাস্ট- প্রোটিন।

(a) লিউকোপ্রাস্ট $\xrightarrow{\text{আলো}}$ ক্রোমোপ্রাস্ট, ক্লোরোপ্রাস্ট।

(b) ক্রোমোপ্রাস্ট $\xrightarrow{\text{আলোর অনুপস্থিতিতে}}$ লিউকোপ্রাস্ট।

(c) ক্রোমোপ্রাস্ট $\xrightarrow{\text{আলো}}$ ক্রোমোপ্রাস্ট।

* ক্রোরোপ্রাস্টে গ্রানা, থাইলাকয়েড, কোয়ান্টোজোম, স্ট্রোমা বিদ্যমান।

* শৈবালের ক্রোরোপ্রাস্টে বৈচিত্র্য বেশি।

➤ বিভিন্ন আকৃতির ক্রোরোপ্রাস্ট:

- পেয়ালাকৃতি- *Chlamydomonas* • সর্পিলাকার- *Spirogyra*
- জালিকাকার- *Oedogonium* • তারাকার- *Zygnema*
- বেষ্ট বা ফিতা বা আংটি আকৃতি- *Ulothrix* • গোলাকার- *Pithophora*

11. সেন্ট্রিয়োল:

- স্বপ্রজননক্ষম অঙ্গানু।
- একজোড়া সেন্ট্রিয়োলকে একত্রে ডিপ্লোসোম বলে।
- সেন্ট্রিয়োলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরল পদার্থকে সেন্ট্রিওফিয়া বলে।
- সেন্ট্রিয়োল প্রাচীর ৯টি ত্রয়ী অণুনালাকা দিয়ে গঠিত।
- সেন্ট্রিয়োল DNA, RNA থাকে না।
- কোষ বিভাজনের মাকুতস্থ গঠন করে।
- শুক্রাণুর লেজ গঠন করে।

12. কোষীয় কঙ্কাল: সকল প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলোর অন্তর্ভুক্তি স্থানে কতগুলো সূত্রক সম্মিলিত ভাবে জালিকার ন্যায় গঠন তৈরী করে। এদের কোষীয় কঙ্কাল বা সাইটোস্কেলিটন বলে।

13. পারঅক্সিসোম: বিষাক্ত H_2O_2 কে ক্যাটালেজ এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে H_2O এবং O_2 এ রূপান্তর করে কোষকে রক্ষা করে।

- প্রাণীর কিডনি ও লিভার কোষে বেশি থাকে।

14. কোষ গহ্বর: প্রোটোপ্লাজম নিয়ে গঠিত যে পাতলা পর্দা কোষ গহ্বরকে বেষ্টিত করে রাখে তাকে টনোপ্লাস্ট বা টনোপ্লাজম বলে।

- এ পর্দা রাবার জাতীয়। কোষ গহ্বরের অভ্যন্তরের রসকে কোষ রস বলে।

15. নিউক্লিয়াস: শুক্রাণুর 90% নিউক্লিয়াস।

- একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষকে সিনোসাইট বলে।
- সিনোসাইটের উদাহরণ: (ভূপেন বস)।
ভূ- *Vaucheria* পেন- *Penicillium*
ব- *Botrydium* স- *Sphaeroplea, Saprolegnia*
- যাদের নিউক্লিয়াস থাকে না বা নাই:

Mnemonic : অণুর Red Sea তে লাল নিউক্লিয়াস নাই-

ছন্দ	অণুর	Red	Sea	লাল
তথ্য	অনুচক্রিকা	লোহিত রক্তকণিকা (RBC)	সীতকোষ	লেপ কোষ

TOPIC-04

বংশগতীয় বস্তু

০১. ক্রোমোসোম: কোষস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন, ধারণকারী নিউক্লিয়োপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সব সূত্রাকৃতির ক্ষুদ্র বংশগতির উপাদান মিউটেশন, প্রকরণ প্রভৃতি কাজে ভূমিকা পালন করে এরাই ক্রোমোসোম।

➤ ভৌত গঠন:

- ক্রোমাটিন: ক্রোমোসোমের মূল উপাদান।
i. হেটারোক্রোমাটিন- অধিক কুণ্ডলিত, নিষ্ক্রিয় DNA ধারণ করে।
ii. ইউক্রোমাটিন- কম কুণ্ডলিত, অধিক সক্রিয় DNA ধারণ করে।
- ক্রোমাটিড: ক্রোমোসোম লম্বালম্বি ভাবে দুটি অংশে বিভক্ত হয় প্রত্যেকটি অংশকে ক্রোমাটিড বলে।
- অন্যান্য অংশ: সেন্ট্রোমিয়ার, বাহু, কাইনেটোকোর, ক্রোমোমিয়ার, স্ট্রোম কুণ্ডন, স্যাটেলাইট, টেলোমিয়ার (জরা রোধ করে), ম্যাট্রিক্স, পেলিকুল (ক্রোমোসোমের বাইরে পাতলা আবরণ) ইত্যাদি থাকে।

➤ ক্রোমোসোম সংখ্যা:

নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
পাট	14	কিউলেব্র মশা	6
পিয়াজ	16	মানুষ	46
মুলা	18	গরু	60
ভুট্টা	20	গিনিপিগ	64
ধান	24	ঘোড়া	64
টমেটো	24	কবুতর	80
গম (6 প্রস্থি)	42	গোলআলু	48

০২. নিউক্লিক এসিড:

(a) ১ অণু নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক + ১ অনু পেন্টোজ শ্যুগার → নিউক্লিোসাইড + ১ অনু ফসফেট → নিউক্লিোটাইড

➤ DNA: Deoxyribonucleic acid- এর অ্যাক্রোনিম একে জীবনের আণবিক ভিত্তি বলা হয়। এটি রঞ্জিতকরনে Feulgen stain ব্যবহৃত হয়।

ভৌত গঠন:

- পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট Deoxyribose শ্যুগার।
- চার ধরনের নাইট্রোজেনাস ক্ষারক- অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C), থাইমিন (T)
- Chargaff's rules অনুযায়ী নাইট্রোজেনাস ক্ষারকের অর্ধেক হবে পিউরিন (A,G) এবং অর্ধেক পাইরিমিডিন (T, C)।

➤ RNA: Ribonucleic acid- এর অ্যাক্রোনিম।

- RNA এক সূত্রক যার প্রধান কাজ প্রোটিন তৈরী, নিসল কণা তৈরী হয় RNA থেকে।
- ১টি কোষের সাইটোপ্লাজমে ৯০ ভাগ এবং নিউক্লিয়াসে ১০ ভাগ RNA থাকে।

ভৌত গঠন:

- পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট Ribose শ্যুগার
- চার ধরনের নাইট্রোজেনাস ক্ষারক- অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C), ইউরাসিল (U)
- ফসফেট শ্যুগার

Dhaka তে University নাই, Romna তে Thana নাই			
DNA	Uracil	RNA	Thyamine

> রেট্রিকেশন DNA থেকে তৈরী প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিলিপন বা রেপ্লিকেশন।
এমোজোনীয় এনজাইম: [*তারকা চিহ্নিতগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ]

এনজাইম	কাজ
টপোআইসোমারেজ	DNA অণুকে অতি মাত্রায় প্যাচানো অবস্থা থেকে মুক্ত করে রাখে।
হেলিকেস*	দুটি হেলিক্সের মাঝে হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে দিয়ে সূত্র দুটি পৃথক করে।
SSBP/HDP	একক হেলিক্সের সাথে জড়িয়ে থেকে পিছন দিকে পুনঃপাক সৃষ্টি প্রতিহত করে।
DNA পলিমারেজ	নিউক্লিওটাইড অণু যুক্ত করে 5' প্রান্ত থেকে 3' প্রান্ত নির্দেশিত পরিপূরক স্ট্র্যান্ড বা শিকল গঠন করে থাকে। DNA প্রফ রিডিং করে।
প্রাইমের*	RNA প্রাইমার যুক্ত করে।
লাইগেজ	ছোট ছোট DNA খণ্ডের মধ্যে (ওকজাকিক) বন্ধনী সৃষ্টি ও মেরামত সাধন করে।
গাইরেজ (দু'প্রকার) (আদি কোষে)	অনুলিপনশীল DNA অণুর প্রতি পাক খুলে দেয়, আবার DNA অণুর অনুলিপন শেষে অতি পাক তৈরি করে।

> Transcription: DNA অণুকে প্রোথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে RNA অণুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে Transcription বলে।

Reverse Transcription: RNA কে টাঁচ হিসেবে ধরে নিয়ে কমপ্লিমেন্টারি DNA তৈরি। উদাহরণ: HIV

> ট্রান্সলেশন: mRNA থেকে প্রোটিন তৈরি প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সলেশন।

ট্রান্সলেশন হলো DNA-এর ভাষাকে mRNA-এর এর মাধ্যমে প্রোটিনের ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করা।

> জিনের বিভিন্ন একক:

- রেকন (Recon) : জিন রিকমিনেশন এর একক।
- মিউটন (muton) : জিন মিউটেশনের একক বলা হয়।
- সিস্ট্রন (Cistron): জিন কার্যের একক।
- রেপ্লিকন (Replicon) : DNA এর যে অংশ DNA এর অনুলিপন নিয়ন্ত্রণ করে তাকে রেপ্লিকন বলে।

> জেনেটিক কোড:

- তিনটি করে নিউক্লিওটাইডের বিশেষ বিন্যাসকে কোডন বলে।
- জেনেটিক ইনফরমেশন এর মূল একক ট্রিপলেট। দেহে ৬৪ ধরনের কোডন থাকে।
- Start Codon- AUG (মিথিওনিন); Stop Codon-UAA, UAG, UGA।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোষের বিলম্বিত অঙ্গাণু- ক্রোমোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, লাইসোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিয়াস, মাইক্রোবডিলা।
- কোষের বিলম্বিত অঙ্গাণু-রাইবোজোম, সেন্ট্রিওল, মাইক্রোটিউবুল, মাইক্রোফিলামেন্ট, ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট, প্রোটিনোজোম।
- কোষীয় বস্তু বা সেল ইনক্লুশন- সঞ্চিত খাদ্যবস্তু, ক্ষরিত পদার্থ এবং বর্জ্য পদার্থসমূহ।
- উদ্ভিদকোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য- কোষপ্রাচীর।
- জড় পদার্থ নির্মিত মৃত কোষপ্রাচীর থাকে- উদ্ভিদকোষে।
- কোষপ্রাচীর থাকে না- প্রাণিকোষ, পরাগরেণু ও উদ্ভিদের জননকোষে।
- কোষগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখে- কোষপ্রাচীর।
- পূর্ণ বিকশিত উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীর- ৩ স্তরবিশিষ্ট।
- এক স্তরবিশিষ্ট হলো- মধ্যপর্দা।
- কোষপ্রাচীরের দুটি কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ স্তর বা পর্দা- মধ্যপর্দা।
- মধ্যপর্দার সূচনা ঘটে- টেলোফেজ পর্যায়ে।
- মধ্যপর্দা পূর্ণতা পায়- সাইটোকাইনেসিস পর্যায়ে।
- সেকেন্ডারি কোষপ্রাচীরের তিনটি স্তর হলো- অন্তঃস্তর, মধ্যস্তর ও বহিঃস্তর।
- কোষপ্রাচীর প্রাধানত গঠিত হয়- Cellulose দিয়ে।
- সেকেন্ডারি কোষপ্রাচীর গঠনের উপাদান- সুবেরিন ও লিগনিন।

- কোষপ্রাচীর গঠনের ক্রমসিদ্ধি হিসেবে কাজ করে- Xyloglucan।
- কোষপ্রাচীরে মুখোমুখি অবস্থিত দুটি কূপকে বলা হয়- পিট পেয়ার বা পিট জোড়।
- প্রোটোপ্লাজমের সূতার মতো অংশ হলো- প্রাজমোডেসমা।
- পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদান ঘটায়- প্রাজমোডেসমাটি।
- কোষপ্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক- মাইসেলি।
- প্রতিটি মাইসেলিতে সেলুলোজ অণুর সংখ্যা- প্রায় ১০০টি।
- কোষপ্রাচীর গঠনের মূল একক- মাইক্রোফাইব্রিল।
- মাইক্রোফাইব্রিলের আঁচ গঠন করে- মাইসেলি।
- কয়টি মাইক্রোফাইব্রিল মিলিত হয়ে একটি ম্যাক্রোফাইব্রিল গঠিত হয়- ২৫০টি।
- অনেকগুলো ম্যাক্রোফাইব্রিল মিলিত হয়ে গঠন করে- তন্তু।
- কোষপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত কোষের সমুদয় সজীব ও নির্যীব পদার্থ হলো- প্রোটোপ্লাস্ট।
- হাল্কা মতে জীবনের ভৌত ভিত্তি হলো- প্রোটোপ্লাজম।
- কোষের সজীব বা জীবন্ত বস্তু- প্রোটোপ্লাজম।
- প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ- ৭০-৯০%।
- পানির চেয়ে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি- প্রোটোপ্লাজমের।
- প্রোটোপ্লাজমের নামকরণ বা প্রবর্তন করেন- পারকিনজি (১৮৪০)।
- প্রোটোপ্লাজমের চলনকে বলে- সাইক্রোসিস।
- প্রোটোপ্লাজমকে বেষ্টনকারী বৈষম্যভেদ্য পর্দা- কোষঝিল্লি।
- বায়োমেমব্রেন বলা হয়- কোষঝিল্লিকে।
- কোষঝিল্লির প্রধান গঠন উপাদান- লিপিড ও প্রোটিন।
- কোষপর্দার স্থানে স্থানে যে ভাঁজ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয়- মাইক্রোভিলি।
- প্রাজমোমেমব্রেন কোন প্রক্রিয়ায় কঠিন ও তরল বস্তু গ্রহণ করে- ফ্যাসোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস।
- প্রাজমোমেমব্রেন গঠন সম্পর্কীয় স্যাভউইচ মডেল প্রস্তাব করেন- Danielli & Davson (1935)।
- একক পর্দা (ইউনিট মেমব্রেন) মডেল প্রস্তাব করেন- Robertson (1959)।
- প্রাজমোমেমব্রেন গঠনের সর্বাধিক স্বীকৃত ও আধুনিকতম মডেল- ফুইড মোজাইক মডেল বা আইসবার্গ মডেল।
- ফুইড মোজাইক মডেল প্রস্তাব করেন- Singer & Nicolson (1972)।
- কোষঝিল্লির স্তর- ২টি।
- কোষঝিল্লির প্রোটিন- ৩ ধরনের।
- প্রাজমোমেমব্রেনের ফুইড মোজাইক মডেলের তরল অংশটি হলো- লিপিড।
- গ্রাইকোলিপিড ও গ্রাইকোপ্রোটিনকে একত্রে বলা হয়- গ্রাইকোক্যালিক্স।
- বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তি ও কোষের চিহ্নিতকারক হিসেবে কাজ করে- গ্রাইকোক্যালিক্স।
- কোষঝিল্লির অনেকটা তরল পদার্থের ন্যায় আচরণ করাকে বলা হয়- Flip-flop movement।
- কোষঝিল্লির শুষ্ক ওজনের মোট শুষ্ক ওজনের-৭৫ ভাগ লিপিড।
- কোষঝিল্লির প্রোটিনসমূহের অধিকাংশই প্রকৃতি হলো- এনাজাইম।
- কোষের বিভিন্ন প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনার কাজ করে- কোষঝিল্লি।
- নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের অবশিষ্ট অংশই- সাইটোপ্লাজম।
- সাইটোপ্লাজমের তরল অংশকে বলা হয়- সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা বা ধাত্র।
- সাইটোপ্লাজমের মাতৃকাকে বলা হয়- হায়ালোপ্লাজম বা সাইটোসল।
- সাইটোপ্লাজমের মাতৃকার কোষ অঙ্গাণু ও নির্যীব বস্তুগুলোকে একত্রে বলা হয়- ট্রোফোপ্লাজম।
- সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকার বহিঃস্থ অপেক্ষাকৃত বেশি ঘন অঞ্চল হলো- এন্ডোপ্লাজম।
- সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকার কেন্দ্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন অঞ্চল হলো- এন্ডোপ্লাজম।
- কোষঝিল্লির চারদিকে সাইটোপ্লাজমের হালকা স্তরকে বলা হয়- টনোপ্লাজম/টনোপ্লাস্ট।
- জীবের সকল বিপাকীয় কাজের নিয়ন্ত্রক- সাইটোপ্লাজম।
- বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ধারণ করে- সাইটোপ্লাজম।
- কোষের অভ্যন্তরের pH রক্ষা করে- সাইটোপ্লাজম।
- কোষের সাইটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ- ৬৫-৯৬% (উদ্ভিদ কোষে ৭৫% এবং প্রাণিকোষে ৬৭%)।
- সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত পানিতে দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব পদার্থের সংখ্যা- ৩৬।
- সাইটোপ্লাজমের দৃশ্যমান ফাঁকা অংশ- কোষগহ্বর।
- কোষগহ্বরের অভ্যন্তরের রস- কোষরস (টনোপ্লাজম)।

- ♦ রাইবোজোম আবিষ্কার করেন এবং মাইক্রোজোম নাম দেন- Alber Claude (1954)।
- ♦ প্রোটিন ফ্যাক্টরি বা প্রোটিন সংশ্লেষণের যন্ত্র- রাইবোজোম।
- ♦ ক্ষুদ্রাকার রাইবোজোম হলো- রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন কণা (RNP)।
- ♦ কোষের সার্বজনীন অঙ্গাণু- রাইবোজোম।
- ♦ আদিকোষী রাইবোজোমের উপএকক বা সাব-ইউনিট- 50S ও 30S।
- ♦ প্রকৃতকোষী রাইবোজোমের উপএকক- 60S ও 40S।
- ♦ রাইবোজোমের বড় উপএককে সাইট বা অঞ্চল থাকে- 8টি (E-সাইট, P-সাইট, A-সাইট ও mRNA এর সংযুক্তির স্থান)।
- ♦ রাইবোজোমের প্রধান উপাদান- প্রোটিন ও RNA (এদের অনুপাত ১:১)
- ♦ mRNA-এর সঙ্গে বহু রাইবোজোম যুক্ত হয়ে যে রাইবোজোম শৃঙ্খল তৈরি হয় তাকে- পলিরাইবোজোম থেকে- ৫-৫০টি।
- ♦ কোনো জীবকোষে প্রাপ্ত রাইবোজোমের একটি উপ-একক 40S হলে, অপরটি- 60S।
- ♦ কোষ 'Translation' প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অঙ্গাণুটি হলো- রাইবোজোম।
- ♦ গলজি বস্তুর আবিষ্কারক- C. Golgi (1889)।
- ♦ গলজি বস্তুকে বলা হয় কোষের- প্যাকেজিং কেন্দ্র বা কোষের ট্রাফিক পুলিশ।
- ♦ উদ্ভিদ কোষে গলজি বডি বলা হয়- কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি।
- ♦ ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন-C ও ভিটামিন-K, ATPase ও ট্রান্সফারেজ এনজাইম পাওয়া যায়- গলজি বস্তুতে।
- ♦ কোষ বিভাজনকালে কোষপ্রেট তৈরি করে- গলজি বস্তু।
- ♦ শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম গঠনে সহায়তা করে- গলজি বস্তু।
- ♦ লাইসোজোমের নামকরণ করেন- de Duve (1955)।
- ♦ লাইসোজোমকে বলা হয়- কোষের পাকস্থলী/সুসাইডাল স্ফোড/আত্মঘাতী থলিকা/ডাইজেস্টিভ ব্যাগ।
- ♦ অন্তঃকোষীয় পরিপাকে সাহায্য করে- লাইসোজোম।
- ♦ উদ্ভিদকোষে লাইসোজোমের অপর নাম- Spherosome বা Oleosome।
- ♦ অটোলাইসিস বা অটোফ্যাগি ঘটে- লাইসোজোমে।
- ♦ কোষে কেরাটিন প্রস্তুত করে- লাইসোজোম।
- ♦ কোন কোষীয় অঙ্গাণু জীবদেহের অকেজো কোষ ধ্বংস করে- লাইসোজোম।
- ♦ লাইসোজোম তৈরি করে- গলজি বস্তু।
- ♦ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবিষ্কার, নামকরণ ও প্রত্যক্ষ করেন- Porter (1945)।
- ♦ সর্বপ্রথম কোন কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবিষ্কৃত হয়- মুরগীর জরীপ কোষে।
- ♦ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে দানাদার বস্তু হলো- রাইবোজোম।
- ♦ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অনুপস্থিত- আদিকোষে।
- ♦ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের অবস্থান- সাইটোপ্লাজমে।
- ♦ অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশকে বলা হয়- মাইক্রোজোম।
- ♦ প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে- এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম।
- ♦ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে এনজাইম বিদ্যমান- ১৫ ধরনের।
- ♦ গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কোন জোড়াটি অধিক মিলসম্পন্ন- গলজি বস্তু ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়া প্রথম প্রত্যক্ষ ও আবিষ্কার করেন- Kolliker (1850)।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন- Benda (1898)।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়াকে বায়োপ্লাস্ট নামে অভিহিত করেন- Altman (1894)।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয়- কনড্রিওজোম ও প্রাজমোজোম।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় কোষের- শক্তিশ্রম বা পাওয়ার হাউস।
- ♦ ক্রেবস চক্র, ফ্যাটি এসিড চক্র, ETC, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন প্রভৃতি ঘটে- মাইটোকন্ড্রিয়নে।
- ♦ সাধারণত উদ্ভিদের প্রতিকোষে মাইটোকন্ড্রিয়া সংখ্যা- ৩০০-৪০০।
- ♦ কোষে অন্তঃসিমেথোজীবী বা এন্ডোসিমবায়োট হিসেবে থাকে- মাইটোকন্ড্রিয়ন ও ক্রোরোপ্লাস্ট।
- ♦ কোষের অর্ধস্বনির্ভরশীল অঙ্গাণু- মাইটোকন্ড্রিয়ন ও ক্রোরোপ্লাস্টে।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়নে আঙ্গুরের মতো প্রবর্তক হল- ক্রিস্টি।
- ♦ ATP সিঙ্থেসেজ নামক- গোলাকার বস্তু পাওয়া যায়- মাইটোকন্ড্রিয়নে
- ♦ ক্রিস্টি ধারণ করে- মাইটোকন্ড্রিয়া।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়নের শুষ্ক ওজনে প্রোটিনের পরিমাণ- ৬৫%।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রায় কত ধরনের এনজাইম ও কো-এনজাইম পাওয়া যায়- 100 ধরনের।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়নে পাওয়া যায়- ভিটামিন-E।
- ♦ ক্ষুদ্র গোলাকার DNA পাওয়া যায়- মাইটোকন্ড্রিয়নে।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়নের রাইবোজোমের প্রকৃতি- 70S।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়ার বিন্দি- লিপো-প্রোটিন সমৃদ্ধ।
- ♦ মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃপর্দার বিশেষ ফসফোলিপিড হলো- কার্ডিওলিপি।
- ♦ লিপিড সংশ্লেষণের সকল এনজাইম থাকে- মাইটোকন্ড্রিয়নে।
- ♦ প্রাস্টিড কত প্রকার- ৩ প্রকার (লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্রোরোপ্লাস্ট)।
- ♦ সাধারণত প্রাস্টিড থাকে না- প্রাণিকোষ ও ছত্রাকে।
- ♦ বর্ণহীন প্রাস্টিড- লিউকোপ্লাস্ট।
- ♦ সূর্যের আলো পৌঁছায় না- লিউকোপ্লাস্টে।
- ♦ স্টার্চ বা শ্বেতসার সঞ্চয় করে- অ্যামাইলোপ্লাস্ট।
- ♦ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ সঞ্চয় করে- অ্যালিউরোপ্লাস্ট।
- ♦ তেল ও গ্লেহ বা লিপিড জাতীয় পদার্থ সঞ্চয় করে- ইল্যায়োপ্লাস্ট।
- ♦ জ্যাঙ্কোফিলের বর্ণ- হলুদ।
- ♦ সবুজ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের প্রাস্টিডগুলোকে বলা হয়- ক্রোমোপ্লাস্ট।
- ♦ ফল ও বীজের বিস্তরণে ভূমিকা রাখে- ক্রোমোপ্লাস্ট।
- ♦ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে- অ্যামাইলোপ্লাস্ট।
- ♦ সর্বপ্রথম উদ্ভিদকোষে সবুজ বর্ণের প্রাস্টিড লক্ষ করেন এবং ক্রোরোপ্লাস্ট নামকরণ করেন- Schimper (1883)।
- ♦ সবুজ বর্ণের প্রাস্টিড- ক্রোরোপ্লাস্টকে।
- ♦ উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষে কতটি ক্রোরোপ্লাস্ট থাকে- ১০-৪০টি।
- ♦ *Chlamydomonas*-এর ক্রোরোপ্লাস্ট- পেয়লাকার।
- ♦ *Spirogyra*-এর ক্রোরোপ্লাস্ট- সর্পিলাকার বা ফিতাকৃতি।
- ♦ ক্রোরোপ্লাস্টে জ্যাঙ্কোফিল অণু বিদ্যমান- ৩০০-৪০০টি।
- ♦ ক্রোরোপ্লাস্টের ম্যাট্রিক্সকে বলা হয়- স্ট্রোমা।
- ♦ প্রতিটি ক্রোরোপ্লাস্টে গ্রানার সংখ্যা প্রায়- 40-60টি।
- ♦ থাইলাকয়েড থাকে- ক্রোরোপ্লাস্টে।
- ♦ প্রতিটি গ্রানামে থাইলাকয়েডের সংখ্যা- 10-100টি।
- ♦ গ্রানাম চক্রের সংযোগ সাধনকারী নালিকার নাম- স্ট্রোমা ল্যামেলি।
- ♦ কোয়ান্টোজোম পাওয়া যায়- ক্রোরোপ্লাস্টে।
- ♦ সেন্দ্রিওল আবিষ্কার করেন- Van Benden (1887)।
- ♦ সেন্দ্রিওল নামকরণ করেন- T. Boveri (1888)।
- ♦ কোষের স্বপ্রজননক্ষম অঙ্গাণু- সেন্দ্রিওল।
- ♦ সেন্দ্রিওলের অংশ- ৩টি।
- ♦ সেন্দ্রিওলের প্রাচীরে কয়টি ত্রয়ী অনুনালিকা থাকে- ৯টি।
- ♦ সেন্দ্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে বলা হয়- সেন্ট্রোফিয়ার।
- ♦ সেন্ট্রোফিয়ারসহ সেন্দ্রিওলকে বলা হয়- সেন্ট্রোজোম।
- ♦ সেন্দ্রিওলের প্রধান গঠন উপাদান- লিপিড, প্রোটিন ও ATP।
- ♦ শুক্রাণুর লেজ গঠনে সাহায্য করে- সেন্দ্রিওল।
- ♦ নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও প্রথম বর্ণনা করেন- Robert Brown (1831)
- ♦ নিউক্লিয়াসকে বলা হয়- কোষের মস্তিষ্ক বা প্রাণকেন্দ্র বা কেন্দ্রিকা।
- ♦ বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট গঠনকে বলা হয়- সিনোসাইট।
- ♦ কোষের ১০-১৫% স্থান দখল করে থাকে- নিউক্লিয়াস।
- ♦ কোন অঙ্গাণুটির ৯০% অংশই নিউক্লিয়াস- শুক্রাণু।
- ♦ কোষের মাঝখানে অবস্থান করে- নিউক্লিয়াস।
- ♦ নিউক্লিয়াসের আবরণীকে বলা হয়- নিউক্লিওপর্দা।
- ♦ নিউক্লিয়াসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান- ২টি (প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড)।
- ♦ নিউক্লিওপর্দায় বেষ্টিত অর্ধতরল জেলিসদৃশ পদার্থটি - নিউক্লিওপ্লাজম।
- ♦ নিউক্লিওপ্লাজমের অপর নাম- ক্যারিওলিফ।
- ♦ নিউক্লিওলাস প্রথম আবিষ্কার করেন- Fontana (1781)।
- ♦ নিউক্লিওলাসের রাসায়নিক উপাদান- DNA, RNA ও প্রোটিন।
- ♦ নিউক্লিওলাইডের ভাভার হিসেবে কাজ করে- নিউক্লিওলাস।
- ♦ কোষস্থ খনিজ ক্রিস্টাল- ক্যালসিয়াম অক্সালেট।
- ♦ কোষস্থ খনিজ ক্রিস্টাল সুচের মতো হলে তাকে বলা হয়- র্যাফাইড।
- ♦ আঙ্গুরের থোকার মতো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ক্রিস্টাল হলো- সিস্টোলিথ।
- ♦ নিউক্লিয়াসের হেটারোক্রোমাটিনযুক্ত অঞ্চলকে বলা হয়- ক্যারিওজোম।

- বংশগতির ধারক ও বাহক- ক্রোমোজোম।
- বংশগতির ভৌত ভিত্তি হিসেবে অভিহিত হয়- ক্রোমোজোম।
- সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন- Strasburger (1875)।
- সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম শব্দটি ব্যবহার করেন- Waldeyer (1888)।
- সর্বপ্রথম মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রকাশ করেন- Painter (1921)।
- সপুষ্পক উদ্ভিদে সর্বনিম্ন সংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া গেছে- *Haplopappus gracilis*।
- সপুষ্পক উদ্ভিদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া গেছে- *Poa littorosa*।
- প্রাণীতে সর্বনিম্ন সংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া গেছে- *Ascaris megalocephala sub. sp. univalens*।
- প্রাণীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া গেছে- *Aulacantha sp.*।
- মানবদেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা- ৪৬টি (২৩ জোড়া)।
- ক্রোমোজোমের কোন অংশটি নিউক্লিওলাসের পুনর্গঠন (নিউক্লিওলাস গঠন) অঞ্চল নামে পরিচিত- গৌণ কুঞ্চন।
- ক্রোমোজোমকে রঞ্জিত করলে এর মধ্যবর্তী অরঙিন অংশ- সেন্ট্রোমিয়ার।
- কোনটি বংশগতির সক্রিয় অংশ- ইউক্রোমাটিন।
- কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো V, L, J ও I এর আকার ধারণ করে- অ্যানাফেজ।
- ক্রোমোজোমের মাঝখানে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করলে তাকে বলা হয়- মেটাসেন্ট্রিক।
- সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে অবস্থান করলে তাকে বলা হয়- টেলোসেন্ট্রিক।
- ক্রোমাটিনকে পুঁতির মালার মতো দেখালে তাকে বলা হয়- নিউক্লিওজোম।
- মানুষের একটি কোষে নিউক্লিওজোমের সংখ্যা- প্রায় 3×10^7 টি।
- ক্রোমাটিনের একক- নিউক্লিওজোম।
- SAT কথাটির অর্থ- Sine Acid Thymonucleic।
- স্যাটেলাইট থাকে- ছোলার 1নং ক্রোমোজোমে এবং মানুষের 13, 14, 15, 21 ও 22 তম ক্রোমোজোমগুলোতে।
- ক্রোমোজোমের ৯০% গঠন করে- DNA।
- ক্রোমোজোমে প্রোটিনের পরিমাণ- ৫-৫%
- ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান- প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড (DNA ও RNA) ও কিছু ধাতব আয়ন।
- বংশগতীয় বস্তুর প্রধান উপাদান হচ্ছে- নিউক্লিক এসিড (DNA ও RNA)।
- অনেকের মতে, DNA।
- সর্বপ্রথম নিউক্লিক এসিড আবিষ্কার করেন এবং এদের নাম দেন নিউক্লিন - Miescher (1869)।
- নিউক্লিনকে নিউক্লিক এসিড নামে অভিহিত করেন- Altman, 1889।
- নিউক্লিক এসিডকে DNA এবং RNA ভাগ করেন- Lavine।
- নিউক্লিক এসিডে নাইট্রোজেনের পরিমাণ- ১৫%।
- অসংখ্য নিউক্লিওটাইড এর পলিমার- নিউক্লিক এসিড।
- নিউক্লিওটাইডের মূল উপাদানগুলো হলো- পেটোজ সুগার, নাইট্রোজেন বেস ও ফসফোরিক এসিড বা অজৈব ফসফেট।
- নিউক্লিওটাইডের মূল উপাদানগুলো হলো- পেটোজ, সুগার ও নাইট্রোজেন বেস।
- নিউক্লিওটাইড = নিউক্লিওটাইড + অজৈব ফসফেট।
- পিউরিন- এর সাধারণ সংকেত- $C_5H_4N_4$ ।
- পাইরিমিডিন-এর সাধারণ সংকেত- $C_4H_4N_2$ ।
- পিউরিন বেসগুলো হলো- অ্যাডিনিন এবং গুয়ানিন।
- পেটোজ সুগার- রাইবোজ (RNA-তে) ও ডিঅক্সিরাইবোজ (DNA-তে)।
- পাইরিমিডিন বেসগুলো হলো- সাইটোসিন, থাইমিন (DNA-তে থাকে) এবং ইউরাসিল (RNA-তে থাকে)।
- DNA এর নাইট্রোজেন বেসগুলো হলো- অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন।
- RNA এর নাইট্রোজেন বেসগুলো হলো- অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল।
- নিউক্লিওটাইডের পেটোজ সুগারের কত নম্বর কার্বনে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হয়- ১ নম্বর।
- নিউক্লিওটাইড গঠনের ক্ষেত্রে পেটোজ সুগারের ১ নম্বর কার্বন, পিউরিনের ৯নং স্থানের কিংবা পাইরিমিডিনের ১নং স্থানের নাইট্রোজেনের সাথে গ্রাইকোসাইড বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে।
- নিউক্লিওটাইডের পেটোজ সুগারের 3'-OH বা 5'-OH এর সাথে একটি ফসফেট, এস্টার বন্ধনী বা ফসফোএস্টারবন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড গঠিত।

- জীবের বংশগতীয় পদার্থ- DNA।
- বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি বা মাস্টার মলিকিউল হলো- DNA।
- ক্রোমোজোমের মূল রাসায়নিক উপাদান- DNA।
- জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক- DNA।
- DNA অণুর মূল কাঠামো- নিউক্লিওটাইড।
- DNA অণুর ডাবল হেলিক্স মডেল প্রদান করেন- Watson & Crick (1953)।
- DNA অণুর দ্বিসূত্রক মডেল আবিষ্কারের কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- Watson, Crick ও উইলকিন্স (1962)।
- DNA-এর পরিমাণ কোন এককে প্রকাশ করা হয়- পিকোগ্রাম।
- দ্বিসূত্রক নিউক্লিক এসিডের নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারকের ক্রম- ATGC।
- অ্যাডিনিন (A) থাইমিনের (T) সাথে যুক্ত হয়- ২টি হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে।
- গুয়ানিন (G) সাইটোসিনের (C) সাথে যুক্ত হয়- ৩টি হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে।
- DNA অণুর ডাবল হেলিক্সের প্রতিটি সম্পূর্ণ প্যাচ বা ঘূর্ণনের দূরত্ব- 3.4 nm ($= 3.4 \text{ nm}$)।
- DNA অণুর হেলিক্সের ব্যাস- 2.0 nm ।
- DNA অণুর হেলিক্সে কতটি নিউক্লিওটাইডের পর একেটি প্যাচ সম্পন্ন হয়- ১০টি।
- DNA অণুর হেলিক্সের এক ধাপ থেকে অপর ধাপের দূরত্ব- 3.4 nm ($= 3.4 \text{ nm}$)।
- DNA অণুর ডাবল হেলিক্সের প্রতি প্যাচে প্রায় কতটি হাইড্রোজেন বন্ড থাকে- ২৫টি।
- DNA এর পরিবর্তির মূল কারণ- মিউটেশন।
- রাইবোনিউক্লিওটাইডের পলিমারই হলো RNA।
- একটিমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড চেইন দ্বারা গঠিত- RNA।
- RNA সর্বদাই উৎপন্ন হয়- DNA থেকে।
- RNA-এর কত ভাগ সাইটোপ্লাজমে থাকে- প্রায় ৯০%।
- RNA-এর কত ভাগ নিউক্লিয়াসে থাকে- প্রায় ১০%।
- RNA জেনেটিক পদার্থরূপে কাজ করে- উদ্ভিদ ভাইরাসে।
- RNA সাধারণ কত প্রকার- ৫ প্রকার।
- একটি কোষের মোট RNA-এর শতকরা কত ভাগ mRNA-৫-১০ ভাগ।
- একটি কোষের মোট RNA-এর শতকরা কত ভাগ tRNA-প্রায় ১৫ ভাগ।
- একটি কোষের মোট RNA-এর শতকরা কত ভাগ rRNA-প্রায় ৮০-৯০ ভাগ।
- কোন RNA এর 3' প্রান্তে CCA লেজ আছে-tRNA।
- tRNA এর কোন প্রান্তে অ্যামিনো এসিড সংযুক্ত হয়-3' প্রান্তে।
- tRNA সবসময় কোন ধারায় বেস সজ্জিত থাকে-CCA।
- tRNA-তে কয়টি বেস নিয়ে অ্যান্টিকোডন বিদ্যমান- ৩টি।
- রাইবোনিউক্লিওটাইড প্রোটিন গঠন করে- rRNA।
- DNA অনুলিপন সম্পর্কে মডেল বা অনুকল্প সংখ্যা- ৩টি।
- DNA অণুর রিপ্রিকেশন কোন পদ্ধতিতে হয়- অ-সংরক্ষণশীল।
- DNA অনুলিপনের সময় হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙে কোন এনজাইম- হেলিকেস।
- DNA অনুলিপনের অত্যাবশ্যকীয় এনজাইম হলো- পলিমারেজ।
- DNA অনুলিপনে অনুলিপন ফর্ক উৎপন্ন হয়- Y আকৃতির।
- অপত্য DNA যে এনজাইমের প্রভাবে কুণ্ডলিত হয়- গাইরেজ।
- DNA অনুলিপনের নতুন সূত্র সবসময়ই বৃদ্ধি পায়-5' → 3' মুখী হয়ে।
- DNA অনুলিপনের সময় ছাঁচের বেসের অনুক্রম ACGT হলে নতুন সূত্রের ক্রম হবে- TGCA।
- DNA অনুলিপনে ল্যাগিং সূত্র সৃষ্টির সময় স্ট্র্যান্ড থ্রুথলোকে বলা হয়-ওকাজাকি থ্রু।
- অনুলিপনে DNA অণুর থ্রুথলো সংযুক্ত করে- লাইগেজ।
- DNA অনুলিপনে নতুন করে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরিতে সাহায্য করে কোন এনজাইম- লাইগেজ।
- DNA এর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে যে ভুল হয় তার নাম- Mismatch।
- Mismatch ভুলের কারণে মানুষের কোন রোগ হয়- কোলন ক্যান্সার।
- UV রশ্মি দ্বারা DNA-এর ক্ষত হলে মানুষে হয়- কিন ক্যান্সার।
- জীববিজ্ঞান কেন্দ্রীয় প্রত্যয়- রিপ্রিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন।
- DNA সংকেত mRNA-তে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া- ট্রান্সক্রিপশন।
- ট্রান্সক্রিপশন কোথায় সংঘটিত হয়- সাইটোপ্লাজমে (আদিকোষ) এবং নিউক্লিয়াসে (প্রকৃতকোষ)।
- RNA (mRNA) থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া- ট্রান্সলেশন।

> মিয়োসিসের গুরুত্ব:

Mnemonic: অতি প্রজাতির বৈচিত্র্যের জন্য মেডেলের কাছে গেল

ছন্দ	তথ্য
অতি	অভিব্যক্তি
প্রজাতির	প্রজাতির স্বকীয়তা ঠিক রাখা
বৈচিত্র্যের	বৈচিত্র্যের সৃষ্টি
জন্য	জননকোষ সৃষ্টি, অনুক্রম
মেডেলের	মেডেলের সূত্র
কাজে	ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব রাখা
গেল	গ্যামিট সৃষ্টি ও বংশবৃদ্ধি

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সর্বপ্রথম সামুদ্রিক স্যালামান্ডারের কোষ বিভাজন প্রত্যক্ষ এবং মাইটোসিস শব্দটি প্রবর্তন করেন W. Fleming।
- কোষের আবিষ্কার করেন Howard & Pelc।
- কোষের মাইটোসিসে ব্যয় হয় ৫-১০% সময়।
- নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম একবার করে বিভাজিত হয়- মাইটোসিসে।
- ক্রোমোজোমগুলোকে সর্বাধিক খাটো, মোটা ও স্পষ্ট হয়- মেটাফেজে।
- ক্রোমোজোম গতিপ্রাপ্ত হয় কোন ধাপে- অ্যানাফেজ।
- অপত্য ক্রোমোজোম মেরুমুখী হয়- অ্যানাফেজে।
- জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে- মাইটোসিস বিভাজনে।
- জীবনের যেকোনো ক্ষতস্থান পূরণ হয়- মাইটোসিস প্রক্রিয়ায়।
- সকল উন্নত প্রাণীর গ্যামিট সৃষ্টিতে ঘটে- মিয়োসিস কোষ বিভাজন।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে- একবার; কিন্তু সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস দু'বার বিভাজিত হয়।
- বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয় কোন উপধাপে- জাইগোটিন।
- মিয়োসিসের কোন উপ-পর্যায়ে নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় ঘটে- প্যাকাইটিনে।
- বাইভ্যালেন্টে সৃষ্ট চারটি ক্রোমাটিডকে একত্রে বলে- টেট্রাড।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে কায়াজমাটা দৃষ্টিগোচর হয়- প্যাকাইটিনে।
- ক্রসিংওভারের সময় সৃষ্ট কায়াজমার আকৃতি হয়- X এর মতো।
- কোষ বিভাজন কে আবিষ্কার করেন- ফ্রেমিং।
- মাইটোসিস অপর নাম- প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন।
- অনিকোষের (ব্যাক্টেরিয়া, এককোষী জীব) বিভাজন প্রক্রিয়া- অ্যামাইটোসিস।
- নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয়- ক্যারিওকাইনেসিস।
- সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয়- সাইটোকাইনেসিস।
- সাইটোপ্লাজমের বিভাজন শুরু হয়- টেলোফেজ দশায়।
- নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে প্রত্যক্ষ করে ক্যারিওকাইনেসিস নাম দেন- Schleicher।
- কোষ বিভাজনে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা দান করে- Cyclin Cdk যৌগ।
- কোষ বিভাজনে বাহ্যিক উদ্দীপনা প্রদান করে- বিভিন্ন হরমোন ও গ্রোথ ফ্যাক্টর।
- ইন্টারফেজ দশার নিউক্লিয়াস হলো- বিপাকীয় নিউক্লিয়াস।
- ইন্টারফেজ কী নাম পরিচিত- প্রস্তুতি পর্যায়।
- কোষের কোন পর্যায়ে DNA এর প্রতিলিপি ঘটে- ইন্টারফেজ।
- ইন্টারফেজ এর দশা বা উপপর্যায় কয়টি- ৩টি (G₁, S ও G₂ দশা)।
- কোষের G₁ দশায় কত শতাংশ সময় ব্যয় হয়- ৩০-৪০%।
- কোষের G₂ দশায় কত শতাংশ সময় ব্যয় হয়- ১০-২০%।
- কোষের S দশায় বা সংশ্লেষণ দশায় ব্যয়িত সময়- ৩০-৫০%।
- মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অপর নাম- সমীকরণিক বিভাজন বা পরোক্ষ বিভাজন।
- মাইটোসিসের ফলে একটি কোষ থেকে কয়টি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়- ২টি।
- অপত্য কোষ ও মাতৃকোষের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে- মাইটোসিসে।
- মাইটোসিস সংঘটিত হয়- দেহকোষে (ব্যতিক্রম-প্রাণীর স্নায়ুকোষ) ও জনন মাতৃকোষ ছাড়া জননাস্রের অন্যান্য কোষে।
- মাইটোসিসের কোন ধাপে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিয়ালাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে- মেটাফেজ।

- মাইটোসিস কোষবিভাজনের পর্যায়- ৫টি।
- মাইটোসিসের দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়ে- প্রোফেজ।
- কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়- প্রো- মেটাফেজ।
- ক্রোমোজোমীয় নৃত্য পরিলক্ষিত হয় কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে- প্রো মেটাফেজ।
- ক্রোমোজোম গুলো বিষুবীয় বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করে কোন ধাপে- মেটাফেজ।
- স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে ক্রোমোজোমের বিন্যস্ত হওয়াকে বলা হয়- মেটাকাইনেসিস।
- মেটাকাইনেসিস ঘটে- মেটাফেজ পর্যায়ে।
- ক্রোমোজোম গতিপ্রাপ্ত হয় কোন ধাপে- অ্যানাফেজ।
- মাইটোসিসের ক্ষণস্থায়ী পর্যায়- প্রো-মেটাফেজ।
- মাইটোসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের দ্বিতন হয় কোন পর্যায়ে- অ্যানাফেজ।
- অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমকে অ্যানাফেজ পর্যায়ে দেখতে কেমন- J-Shaped।
- মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি অপত্য ক্রোমোজোম পরিণত হয়- অ্যানাফেজ।
- কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো ক্রমশ সরু, লম্বা ও অদৃশ্য হয়- টেলোফেজ।
- মাইটোসিসের কোন পর্যায় বিলুপ্ত নিউক্লিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে- নিউক্লিয়ারের।
- টেলোফেজে স্যাট ক্রোমোজোমের গৌণ কুঞ্জে আবির্ভাব ঘটে- নিউক্লিয়ারের।
- টেলোফেজে শেষের দিকে কোন পর্যায়ে শুরু হয়- সাইটোকাইনেসিস।
- জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে- মাইটোসিস বিভাজন।
- দুটি উপায়ে কোষের মৃত্যু ঘটে, যথা- Necrosis (পুষ্টির অভাবে বা বিষাক্ত দ্রব্যের প্রভাবে মৃত্যু) এবং Apoptosis বা, Programmed cell Death
- মিয়োসিসের অপর নাম- হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন।
- মিয়োসিস কোথায় ঘটে- ডিপ্লয়েড ও পলিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোট।
- সকল উন্নত প্রাণীর গ্যামিট সৃষ্টিতে ঘটে- মিয়োসিস কোষ বিভাজন।
- মিয়োসিসে একটি মাতৃকোষ হতে কয়টি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়- ৪টি।
- কোন কোষ বিভাজনে অপত্যকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার অর্ধেক হয়- মিয়োসিস।
- পদ্ধতিগত ভাবে সম্পূর্ণ মিয়োসিসকে ভাগ করা হয়- ২ ধাপে।
- কোন বিভাজন মাইটোসিসের অনুরূপ- মিয়োসিস-২।
- মায়োসিসের ফলে সৃষ্টি হয়- গ্যামিট।
- স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে কোথায় মিয়োসিস ঘটে- জাইগোট।
- ডিপ্লয়েড জীবের জননকোষ সৃষ্টি হয়- মিয়োসিসে।
- বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের পুনর্বিন্যাস ঘটে- মিয়োসিসে।
- প্রোফেজ-১ এর কোন দশায় প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল অবিভক্ত থাকে- লেন্টোটিন।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজন কোন উপধাপে সিন্যাপসিস ঘটে- জাইগোটিনে।
- কোন উপ-পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড় বাঁধে- জাইগোটিনে।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রসিংওভার ঘটে- প্যাকাইটিন।
- কোন পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাইভ্যালেন্টের দুটি সেন্টোমিয়ার ও চারটি ক্রোমাটিড পরিলক্ষিত হয়- প্যাকাইটিন।
- হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় সৃষ্টি হলো- সিন্যাপসিস।
- জোড়বদ্ধ দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম হলো- বাইভ্যালেন্ট।
- একই ক্রোমোজোম হতে প্রাপ্ত দুটি ক্রোমাটিড- সিস্টার ক্রোমাটিড।
- নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়- ক্রসিং ওভার।
- মায়োসিসের প্রোফেজ-১ এর প্যাকাইটিন উপদশায় দৃশ্যমান 'X' আকৃতির অংশকে বলা হয়- কায়াজমা।
- মিয়োসিসের কোন পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পৃথক হয়- অ্যানাফেজ-১।
- ক্রসিংওভারের হার নির্ণয় করা হয়- ক্রোমোজোম ম্যাপে।
- নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের নির্দিষ্ট অংশ ভাঙ্গে- এন্ডোনিউক্লিয়েজ।
- কায়াজমা অংশে ক্রোমাটিডগুলো জোড়া দেয়- লাইগেজ এনজাইম।
- ক্রোমোজোম থেকে প্রাপ্তের দিকে কায়াজমার চলন- প্রান্তীয়গমন।
- ডিপ্লয়েড জীবের টার্মিনাল মায়োসিস, সপুষ্পক উদ্ভিদে-স্পোরিক মায়োসিস এবং ছত্রাক ও শৈবালে- জাইগোটিক মায়োসিস ঘটে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. জনসিং ওভার সম্পর্কে প্রথম ধারণা কে দেন?

[JU-D, Set-P, 2021-22; BSMRSTU-II, 18-19]

A. Flemming B. Strasburger C. Morgan D. Moore

[S@Why] থমাস হাট মর্গান (1866-1945) 1909 সালে ডুটা উদ্ভিদে প্রথম জনসিং ওভার সম্পর্কে ধারণা দেন। 1933 খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

02. বিভাজন ক্ষমতা নাই কোন কোষের? [CU, 15-16; JUST, 15-16; IU, 13-14; RU, 12-13]

A. পেশী কোষ B. স্নায়ু কোষ
C. জনন মাতৃকোষ D. আবরণী কোষ

03. নিচের কোনটিতে কোষ বিভাজন হয়?

A. RBC B. WBC C. স্নায়ু কোষ
D. ডিম্বাণু E. জনন মাতৃকোষ

04. স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে কোথায় মায়োসিস ঘটে?

[য.বো. ২০২০]

A. দেহকোষে B. জনন কোষে
C. জনন মাতৃ কোষে D. জাইগোটে

05. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু তৈরির জন্য মাইক্রোটবিউলস সৃষ্টি হয়?

[JU-D, Set-M, 23-24]

A. ইন্টারফেজ B. প্রো-মেটাফেজ C. টেলোফেজ D. সবকটিই

06. মাইটোসিস কোষ বিভাজন ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় যে দশায়—

[RU-C, পত্রা-২: 23-24]

A. G1 B. G2 C. S D. সবগুলো

07. পুষ্টির অভাবজনিত কোষের মৃত্যুকে কী বলে?

[সি.বো. ২০২২]

A. অ্যাপোপটোসিস B. ট্রিক্রোটোসিস C. নিউটোটপসিস D. নেক্রোসিস

08. ক্রোমোসোমীয় নৃত্য কোষ বিভাজনের কোন দশায় ঘটে?

[DU, 09-10; D. Board 15; RU-C, Jupiter-1, Set-1, 2021-22]

A. Prophase B. Prometaphase
C. Anaphase D. Telophase

09. ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্তকারী তন্তুকে কী বলা হয়?

[JU-D, Set-U, 23-24]

A. স্পিন্ডল ফাইবার B. ট্রাকশন ফাইবার
C. বাস্ট ফাইবার D. কোনটিই নয়

[S@Why] মাইটোসিসের প্রো-মেটাফেজ বা প্রাক-মধ্যপর্যায়:

- স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল বলে। ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্তকারী তন্তুকে ট্রাকশন ফাইবার বলা হয়।

- প্রাণিকোষে দুই মেরুতে অবস্থিত সেন্ট্রিওল থেকে অ্যাস্টার তন্তু বিচ্ছুরিত হয়।
- মাইটোটিক সেন্টার (মাইক্রোটবিউলস এর ব্যবস্থা করে) অবস্থান করে। প্রাণিকোষে এ কাজটি সেন্ট্রোসোম করে।

- ক্রোমোসোমীয় নৃত্য দেখা যায়।

10. কোষ বিভাজনের সময় বিষুবীয় অঞ্চলে ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে কি বলে?

[JU-D, Set-Q, 23-24]

A. সাইটোকাইনেসিস B. মেটোকাইনেসিস
C. ক্যারিওকাইনেসিস D. সবগুলো

11. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপে নিউক্লিওলাসের বিলুপ্তি ঘটে?

[JU-D, Set-H, 2022-23; DU-7Clg, 22-23]

A. প্রোফেজ B. ইন্টারফেজ C. অ্যানাফেজ D. টেলোফেজ

12. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করে?

[JU-D, Set-T, 2021-22; CoU, A, 19-20]

A. অ্যানাফেজ B. টেলোফেজ C. মেটাফেজ D. প্রোফেজ

13. উদ্ভিদ জননাসের গঠন ও বৃদ্ধি কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে?

[JU-D, Set-T, 2021-22]

A. মাইটোসিস B. মিয়োসিস
C. অ্যামাইটোসিস D. সাইটোকাইনেসিস

[S@Why] মাইটোসিস: মাইটোসিস প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন দৈহিক কোষে ঘটে থাকে, যেমন: উদ্ভিদের কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার শীর্ষ, মূলের বর্ধিষ্ণু শীর্ষ, ক্যাম্বিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলে মাইটোসিস হয়ে থাকে। জীবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাইটোসিস প্রক্রিয়ারই ফল। জননাসের গঠন এবং বৃদ্ধিও মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

14. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী পর্যায় কোনটি? [JU-D, Set-R, 2021-22]

A. প্রোফেজ B. প্রো-মেটাফেজ C. মেটাফেজ D. এনাফেজ

[S@Why] মাইটোসিসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় প্রোফেজ ও স্বল্পস্থায়ী পর্যায় প্রো-মেটাফেজ।

15. মাইটোসিস বিভাজনের কোন পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন হয়?

[JU-D, Set-N, 2021-22]

A. প্রো-মেটাফেজ B. মেটাফেজ C. এনাফেজ D. টেলোফেজ

16. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় কোনটি?

[JU-D, Set-H, 2021-22]

A. প্রোফেজ B. প্রো-মেটাফেজ C. মেটাফেজ D. এনাফেজ

[S@Why] মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় প্রোফেজ ও সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী পর্যায় প্রো-মেটাফেজ।

17. কোন দশায় নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে?

[JU, 17-18]

A. মেটোকাইনেসিস B. ইন্টারকাইনেসিস
C. ক্যারিওকাইনেসিস D. সাইটোকাইনেসিস

18. অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌছালেই কোন পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে?

[RU-C, সূত্রা-৩: 23-24]

A. প্রোফেজ B. মেটাফেজ C. অ্যানাফেজ D. টেলোফেজ

19. দেহের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার কোষ ছড়িয়ে পড়াকে কি বলে?

[RU-C, Jupiter-1, Set-1, 2021-22]

A. Oncogenesis B. Necrosis C. Metastasis D. Apoptosis

[S@Why] • টিউমার সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় Oncogenesis।

- কোষ চক্র বিনষ্টকারী জিন হলো Oncogene; যে সব রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে তা হলো Mutagens।

- মিউটাজেনিক পদার্থই Carcinogenic হয়।

- দেহের বিভিন্ন অংশে টিউমার ছড়িয়ে পড়া হলো Metastasis।

20. শীর্ষ ভাজক কলায় যে কোষ বিভাজন হয় তার নাম কি?

[CU, 12-13]

A. অ্যামাইটোসিস B. মাইটোসিস C. মিয়োসিস-1
D. মিয়োসিস-2 E. ডায়াকাইনেসিস

21. ক্রোমটিডের মেরুযুগী চলন কোষ বিভাজনের কোন ধাপে শুরু হয়?

[DU-7Clg, 19-20]

A. প্রোফেজ B. প্রোমেটাফেজ C. মেটাফেজ D. অ্যানাফেজ

22. কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোসোম গুলো পানি শোষণ করে ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে সরু ও লম্বা হয়?

[SUST, 04-05]

A. প্রোফেজ B. এনাফেজ C. মেটাফেজ D. টেলোফেজ

23. মানবদেহের ক্ষত নিরাময়ে কোনটি অপরিহার্য?

[MAT, 2021-22]

A. মাইটোসিস (mitosis) B. মিয়োসিস (meiosis)
C. অ্যামাইটোসিস (amitosis) D. সিনপসিস (synopsis)

[S@Why] বহুকোষী জীবদেহে সৃষ্ট যেকোন ক্ষতস্থানে Mitosis প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূরণ হয়।

- মিয়োসিস (meiosis): প্রজাতির স্বকীয়তা বজায় রাখা, জননকোষ সৃষ্টি করা।

- অ্যামাইটোসিস (amitosis): এককোষী জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া।

24. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে কি বলে?

[DAT, 18-19]

A. মেটোকাইনেসিস B. ডায়াকাইনেসিস
C. সাইটোকাইনেসিস D. ক্যারিওকাইনেসিস

25. নিচের কোন প্রক্রিয়াটি কোষের জেনেটিক্যাল নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু? [AFMC: 2021-22; MAT, 17-18; DAT, 19-20; NSTU, 19-20; CU-A, Shift-4, 20-21]

A. Epistasis B. Apoptosis C. Hypostasis D. Necrosis

[S@Why] Apoptosis এটি হলো কোষের জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু।

- Epistasis: একটি জিন যখন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

- Hypostasis: মৃত্যুর পরে বা সংবহন জটিলতার কারণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরের নিচের অংশে তরল বা রক্ত জমার প্রক্রিয়া।

- Necrosis: পুষ্টির অভাব হলে অথবা বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোষ মরে যায়।

26. মাইটোসিস এর কোন পর্যায়ে ক্রোমোজোম হতে পানি বিয়োজন ঘটে? [ই.বো. ২০২৩]
A. প্রোফেজ B. মেটাফেজ C. এনাফেজ D. টেলোফেজ (A)
27. ক্রোমোজোমের খাটো ও মোটা হওয়াকে বলে- [ম.বো. ২০২২]
A. সিন্যাপসিস B. বাইভ্যালেন্ট
C. অ্যাপোপটোসিস D. কনডেনসেশন (D)
28. মাইটোসিস বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমীয় মৃত্যু দেখা যায়? [চ.বো. ২১; দি.বো. ১৭]
A. প্রোফেজ B. মেটাফেজ C. এনাফেজ D. টেলোফেজ (A)
29. প্রোফেজ-1 এর কোন পর্যায়ে ক্যারাজমা সৃষ্টি হয়? [DU. 20-21]
A. লেন্টিটিন B. জাইগোটিন C. প্যাকাইটিন D. ডিপ্লোটিন (C)
30. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ট্রিটোডসমূহ পাওয়া যায়? [DU. 18-19]
A. লেন্টিটিন B. জাইগোটিন
C. প্যাকাইটিন D. ডায়াকাইনেসিস (C)
31. মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন উপধাপে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলো পরস্পরের সাথে জোড়া বাঁধে? [DU. 15-16; JU. 15-16; CU. 15-16, 14-15, 01-02; BU. 13-14; BAU. 04-05, 00-01; CU. 17-18]
A. লেন্টিটিন B. জাইগোটিন C. প্যাকাইটিন D. ডিপ্লোটিন (B)
32. প্রথম মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন উপদশায় ক্রসিং-ওভার ঘটে- [DU. 11-12, 00-01; MAT. 88-89; CU. 19-20, 15-16, 16-17, 09-10, 04-05, 00-01; JU. 11-12; JU. 15-16, 12-13, 07-08; JU-D, Set-H. 2021-22, 17-18; BAU. 01-02, 02-03; RU. 18-19, 17-18, 16-17]
A. লেন্টিটিন B. জাইগোটিন C. প্যাকাইটিন D. ডিপ্লোটিন (C)
33. 'মায়োসিস'-এর ফলে সৃষ্টি হয়- [DU. 05-06; HSTU. 16-17]
A. Gamete B. Meiocyte C. Mesophyll D. Zygote (A)
34. মেডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোন বিভাজনের মাধ্যমে? [JU-D, Set-P. 2021-22]
A. মাইটোসিস B. মিয়োসিস
C. অ্যামাইটোসিস D. ক্যারিওকাইনেসিস
- [S.C.Why]** মেডেলের সূত্রসমূহ সাধারণত বংশ পরম্পরায় অনুক্রম নিয়ে কাজ করে। মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে বংশগতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
35. হ্যাপ্লয়েড জীবে কোথায় মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয়? [CU-A. 23-24]
A. জনন-মাতৃকোষে B. জাইগোটে
C. দেহকোষে D. মাইক্রোস্পোর-এ
- [S.C.Why]** মিয়োসিস সংঘটনের স্থান:
• সর্বদা জনন মাতৃকোষে সম্পন্ন হয়।
• নিম্নশ্রেণির হ্যাপ্লয়েড জীবে নিষেকের পর জাইগোটে।
• উচ্চ শ্রেণির জীবে নিষেকের পূর্বে জনন মাতৃকোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টিকালে।
36. ক্রসিং ওভার কোন পর্যায়ে ঘটে? [AFMC. 22-23]
A. Zygotene B. Leptotene C. Pachytene D. Metaphase
- [S.C.Why]** প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে ননসিস্টার ক্রোমাটিডের জোড়াগুলিকে ক্যারাজমা/ক্যারাজমাটা (X-আকৃতির) বলে। ক্রোমোসোম অংশের এ বিনিময়কে ক্রসিং ওভার বলে।
37. সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন ঘটায়- [সি.বো. ২০২৩]
A. মেটাফেজ-২ B. প্রোফেজ-২ C. মেটাফেজ-১ D. প্রোফেজ-১ (A)
38. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে DNA- এর প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়? [Ref: হাফিজুর স্যার]
A. মেটাফেজ B. এনাফেজ C. প্রোফেজ D. ইন্টারফেজ (D)
39. ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক মোটা ও খাটো হয় কোন ধাপে? [Ref: আজিবুর স্যার]
A. প্রোফেজ B. মেটাফেজ C. এনাফেজ D. টেলোফেজ (B)

PRIME TEST

01. কোষ বিভাজন সর্বপ্রথম কোন প্রাণীদের মধ্যে লক্ষ্য করা হয়?
A. সামুদ্রিক তিমি B. ব্যাঙ
C. সামুদ্রিক কাছিম D. সামুদ্রিক স্যালামান্ডার
02. শ্লাইখার Mitosis বিভাজনের নাম দেন-
A. ইকুয়েশনাল ডিভিশন B. ক্যারিওকাইনেসিস
C. সাইটোকাইনেসিস D. কোনটিই নয়

03. কত সালে হ্রাসবুগার মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন?
A. ১৮৮০ B. ১৮৯২ C. ১৮৮৩ D. ১৮৮৮
04. মেটাফেজকে কী বলা হয়?
A. অন্তর্পর্যায় B. মধ্যপর্যায়
C. গতিপর্যায় D. প্রাকমধ্যপর্যায়
05. জীবজগতে কয় ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়?
A. ২ B. ৪ C. ৫ D. ৩
06. পর্যায়ক্রম অনুযায়ী নিম্নের কোনটি সঠিক?
A. $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$ B. $M \rightarrow S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2$
C. $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$ D. $M \rightarrow G_2 \rightarrow G_1$
07. কোষচক্র নিচের কোনগুলো নিয়ে গঠিত?
A. মাইটোসিস, মায়োসিস
B. G_1 , S ও G_2 দশা
C. প্রোফেজ, মেটাফেজ, এনাফেজ ও টেলোফেজ
D. ইন্টারফেজ ও মাইটোসিস
08. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোথায় Amitosis ঘটে?
A. জনপর্দায় B. মাছের ডিম গঠনের অন্তিম পর্যায়ে
C. জনথলিতে D. A ও C উভয়ই
09. কোনটিকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয়?
A. মাইটোসিস B. মায়োসিস
C. অ্যামাইটোসিস D. ইন্টারকাইনেসিস
10. প্রাণিকোষের সেট্রোল বিভক্ত হয়ে মেরুর দিকে যেতে থাকে মাইটোসিসের কোন ধাপে?
A. প্রোফেজ B. এনাফেজ
C. প্রো-মেটাফেজ D. টেলোফেজ
11. মাইটোসিস এনাফেজ দশার ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয়?
A. সেন্ট্রোমিয়ার সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত হয়
B. প্রতিটি ক্রোমাটিড অপত্য ক্রোমোসোমে পরিণত হয়
C. ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে
D. সেন্ট্রোমিয়ার পঁচাত্তরগামী ও বাহুবয় অগ্রগামী
12. লোহিত রক্তকোষের পুনরুৎপাদন হয় কোন প্রক্রিয়ায়?
A. মাইটোসিস B. মিয়োসিস
C. অ্যামাইটোসিস D. অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস
13. কোষকে বিভাজন হতে বিরত রাখায় ভূমিকা রাখে নিচের কোনটি?
A. P^{25} B. Al C. P^{53} D. P^{35}
14. মিয়োসিস প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নয়-
A. বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি B. ডিপ্লয়েড গ্যামেট সৃষ্টি
C. ক্যারাজমা সৃষ্টি D. ক্রসিং ওভার
15. মিয়োসিস-২ কে বলা হয়-
A. ইকুয়েশনাল ডিভিশন B. শ্লাইখারের বিভাজন
C. হ্রাসমূলক বিভাজন D. কোনটিই নয়
16. নিচের কোনটি মায়োসিসের শুরুত্ব নয়?
A. জননকোষ সৃষ্টি B. ক্ষতপূরণ C. বৈচিত্র্যের সৃষ্টি D. অভিযান্ত্রিক
17. মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোন কোষে ঘটে?
A. সকল জনকোষ B. দেহকোষ C. মূলের বর্ধিস্থ শীষ D. সবগুলো
18. ক্রসিং ওভারের কোন মডেল ব্যাপক গৃহীত?
A. ডাবল ক্রসিং B. ডাবল হেলিক্স C. ক্যারাজমেটিক D. হোয়াইট হাউস
19. ক্রোমোসোম ম্যাপিং-এ কোন বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়?
A. অ্যামাইটোসিস B. ক্রসিংওভার C. মিয়োসিস D. মাইটোসিস
20. অপত্য ক্রোমোজোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌঁছালে কোন পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে?
A. টেলোফেজ B. মেটাফেজ C. এনাফেজ D. প্রোফেজ

Answer Analysis

01.D	02.B	03.D	04.B	05.D	06.C	07.D	08.A	09.C	10.A
11.D	12.A	13.C	14.B	15.A	16.B	17.D	18.D	19.B	20.C

অধ্যায় ০৬	কোষ রসায়ন	জীববিজ্ঞান ১ম পত্র
---------------	------------	-----------------------

সাজেশন্স	RATINGS		
	★★★	★★	★
কার্বোহাইড্রেট	বিজারণ ক্ষমতা, মনোস্যাকারাইড	ডাইস্যাকারাইড	শুগার, পলিস্যাকারাইড
প্রোটিন ও অ্যামাইনো এসিড	অ্যামাইনো এসিড, সরল প্রোটিন	যুগ্ম প্রোটিন	দ্রবণীয় প্রোটিন
লিপিড	উদ্ভূত লিপিড, যৌগিক লিপিড	সরল লিপিড	—
এনজাইম	বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার, কো-এনজাইম	শ্রেণিবিভাগ	জৈবিক কার্যক্রম

TOPIC-01	কার্বোহাইড্রেট
----------	----------------

01. কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য ও কাজ:

- এরা আলোক সক্রিয়ক এবং আলোক সমাপ্ত গঠন করে।
- এরা অধিক তাপে অঙ্গারে পরিণত হয়।
- কার্বোহাইড্রেট এসিডের সাথে মিলে এস্টার গঠন করে।
- উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসাবে কাজ করে।
- প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ক্যালসিয় চক্র, ফ্রেস চক্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ চক্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

02. কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি	শ্রেণীবিভাগ	উদাহরণ
স্বাদ	শুগার	গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ
	নন-শুগার	স্টার্চ, সেনুলোজ, গ্লাইকোজেন
গঠন	মনোস্যাকারাইড	ট্রায়োজ* গ্লিসারালডিহাইড, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন
		টেট্রোজ ইরিট্রোজ, ইরিথ্রুলোজ
		পেন্টোজ* রাইবোজ, ডি-অক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ, জাইলোজ, অ্যারাবিনোজ, জাইলুলোজ
		হেক্সোজ গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ
		হেক্টোজ সেডোহেপ্টুলোজ, গ্লুকোহেক্টোজ
		অক্টোজ গ্লুকোঅক্টোজ
		ননোজ গ্লুকোননোজ
		ডেকোজ গ্লুকোডেকোজ
	ডাইস্যাকারাইড	
	অলিগোস্যাকারাইড (3-10 কার্বন বিশিষ্ট)	সুক্রোজ, ম্যাল্টোজ, ল্যাক্টোজ, সেলোবায়োজ
		ট্রাইস্যাকারাইড র্যাফিনোজ
		ট্রেট্রাস্যাকারাইড স্ট্যাকিওজ, স্কর্ডোজ
	পলিস্যাকারাইড	পেন্টাস্যাকারাইড ভার্বাকোজ
		গঠন সহায়ক সেনুলোজ, পেকটিক এসিড, হেমিসেনুলোজ, মিউসিলেজ
	সঞ্চিত	স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি	শ্রেণীবিভাগ	উদাহরণ
বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে	বিজারক কার্বোহাইড্রেট*	সকল মনোস্যাকারাইড ও ডাইস্যাকারাইড (সুক্রোজ ব্যতীত)
	অবিজারক কার্বোহাইড্রেট*	সুক্রোজ ও সকল পলিস্যাকারাইড
কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস		গ্লুকোসামিন ও গ্যালাক্টোসামিন

03. স্টার্চ:

- α-D গ্লুকোজের পলিমার [অ্যামাইলোজ (22%) ও অ্যামাইলোপ্যাকটিন (78%) সমন্বয়ে গঠিত]
- ধান, গম, আলু প্রধান উৎস। গোল আলুর স্টার্চ কণিকা বড় ও চালের স্টার্চ কণিকা ছোট।
- আয়োডিনে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে।
- ফেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।
- বীজ, ফল, কন্দ (Tuber) প্রভৃতি সঞ্চারী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে।

04. সেনুলোজ:

- β-D গ্লুকোজের পলিমার (তুলায় 94%, লিনেনে 90%, কাঠে 60%, তৃণলতায় 30-40%)।
- নাইট্রেট বিস্ফোরক ও অ্যানিটেট ফিল্মে ব্যবহৃত হয়।
- খিনলয়ের ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে সেনুলোজ ব্যবহৃত হয়।
- আয়োডিনে রং দেয় না।

TOPIC-02

অ্যামিনো এসিড ও প্রোটিন

01. কোন জৈব এসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব এসিড উৎপন্ন হয় তাকে অ্যামিনো এসিড বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে ২৮টির মতো অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়। এরা প্রোটিন সংশ্লেষ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, pH নিয়ন্ত্রণ করে, মেলানিন রঞ্জক ও ইউরিয়া সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

02. অ্যামিনো এসিডের প্রকারভেদ:

প্রকারভেদ	উদাহরণ
অ্যালিফাটিক	গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন
অ্যারোমেটিক	ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন
হেটেরোসাইক্লিক	ট্রিপটোফ্যান, প্রোলিন, হিস্টিডিন, হাইড্রক্সিপ্রোলিন
অম্লীয়	অ্যাস্পারটিক এসিড, গ্লুটামিক এসিড
ক্ষারীয়	লাইসিন, আরজেনিন, হিস্টিডিন
নিরপেক্ষ	টাইরোসিন
অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড [শিশুদের দেহে ১০টি, পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে ৮টি (আরজেনিন ও হিস্টিডিন থাকে না)]	ফিনাইল অ্যালানিন, ভ্যালিন, ট্রিপটোফ্যান, প্রিওনিন, আইসোলিউসিন, মেথিওনিন, হিস্টিডিন, আরজেনিন, লিউসিন, লাইসিন।
অনাত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড	এ অ্যামিনো এসিডগুলো মানবদেহে সংশ্লেষিত হয় কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডগুলো সংশ্লেষিত হয় না ফলে খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়।
নন প্রোটিন অ্যামিনো এসিড	- অরনিথিন (ইউরিয়া সংশ্লেষ করে) - সাইটুলিন - হেমোসেরিন (প্রোটিন অ্যামিনো এসিড সংশ্লেষ করে)
বিরল অ্যামিনো এসিড	হাইড্রক্সিপ্রোপিন

03. প্রোটিন এর বৈশিষ্ট্য ও কাজ:

- প্রোটিন পানিতে, লঘু অ্যাসিডে, ক্ষার ও যুগ্ম লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়।
- অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।
- হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে।
- এনজাইম হিসাবে জীবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তথা জীবদেহকে সচল রাখে।
- হিমোগ্লোবিন প্রোটিন প্রাণিদেহের সমস্ত কোষে অক্সিজেন সঞ্চালন করে।
- এক গ্রাম প্রোটিন জারণে ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

04. প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি	শ্রেণীবিভাগ	তথ্য ও উদাহরণ	
জৈবিক কার্যাবলি	গাঠনিক প্রোটিন	জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। উদাহরণ- কেরাটিন* (চুল, চুল, শিং, ক্ষুর, পালক ইত্যাদি), কোলাজেন (অস্থি, টেনডন, যোজক টিস্যু ইত্যাদি), ফাইব্রিন (সিঁক ও মাকড়সার জাল), ফেরোপ্রোটিন (পতঙ্গের বহিঃকঙ্কাল), কনজিন (তরুনাঙ্কিত), সেইন (অস্থিতে)।	
	কার্যকরী প্রোটিন	জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটরি প্রোটিনও বলা হয়। যেমন- এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শ্বাসরঞ্জক ইত্যাদি।	
আকৃতি অনুযায়ী	তন্তুময় (লম্বা তন্তুর ন্যায়)	কেরাটিন, কোলাজেন, ফাইব্রিন ইত্যাদি।	
	প্রোবিউলার (গোলাকৃতির)	মায়োগ্লোবিন, ইনসুলিন, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি।	
গঠন অনুসারে	প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি, কুয়ার্টারি		
ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে	সরল প্রোটিন	অ্যালবিউমিন*	রক্তরস, দুধ, মাংসপেশির মায়োগ্লোবিন, গম বীজে লিউকোসিন, শীম বীজে লিগুমেলিন, ডিমের সাদা অংশে ওভালবুমিন।
		প্রোবিউলিন	- বীজের লিউকোসিন, চীনা বাদামে এরাচিন*, আলুতে টিউবেরিন - অভোগ্লোবিউলিন- ডিমের কুসুম - ক্রিস্টালিন প্রোবিউলিন- চোখের লেপ - সিরাম প্রোবিউলিন- রক্তরস - মায়োসিন প্রোবিউলিন- মাংসপেশী - এভেস্টিন প্রোবিউলিন- তুলা, শন, পাট - লেগুমিন প্রোবিউলিন- মটর বীজে
		গ্লুটেলিন*	গমের গ্লুটেলিন এবং চালের অরাইজেনিন (শস্য দানায় এটি বেশি থাকে)।
		প্রোলামিন*	ভূট্টার জেইন, গম ও রাইয়ের গ্রিয়াডিন, যব ও বার্লির হার্ডিন*
		হিস্টোন	নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিক এসিড
		প্রোটামিন (সবচেয়ে ক্ষুদ্র)*	নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিক এসিড, নিউক্লিয়াস, স্যামন মাছের শুকনুতে প্রোটামিন থাকে। তাপে জমাট বাধে না।
		ফেরোপ্রোটিন*	প্রাণিদেহের হাড়, শিং, নখ, খুর, চুল-কেরাটিন ও চামড়ায়- কোলাজেন ও হাড়-টেনডন।

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি	শ্রেণীবিভাগ	তথ্য ও উদাহরণ
যুগ্ম প্রোটিন	লিপোপ্রোটিন	বিভিন্ন মেমব্রেনের সাংগঠনিক উপাদানরূপে, প্রাণীর রক্তরস, ডিমের সাদা অংশ।
	নিউক্লিওপ্রোটিন	নিউক্লিয়াস, ভাইরাস এবং রাইবোসোমে পাওয়া যায়।
	ফসফোপ্রোটিন	দুগের কেসিন, ডিমের ভাইটেলিন।
	গ্রাইকোপ্রোটিন/মিউকোপ্রোটিন	কোষ মেমব্রেন, লাল প্রাণীর মিউসিন, অস্থির ওসিওমিউকয়েড, ডিমের সাদা অংশ, জেলী ফিস।
	মেটালোপ্রোটিন	সাইটোক্রোম, (Mg, Mn, Fe, Zn) থাকে।
	ক্রোমোপ্রোটিন	হিমোগ্লোবিন, ক্রোরোফিল, ক্যারোটিন, ফাইকোবিলিনস, সাইটোক্রোম, মায়োগ্লোবিন
	ফ্ল্যাভোপ্রোটিন	FAD এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।
	পৌহ-পোরফাইরিন প্রোটিন	সাইটোক্রোম এর সাথে যুক্ত থাকে।
উৎপাদিত প্রোটিন		পেপটাইড, প্রোটাইয়েজ, পলিপেপটাইড, পেপটোন, ফাইব্রিন

TOPIC-03

লিপিড

01. লিপিডের বৈশিষ্ট্য ও কাজ:

- এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসাবে বিরাজ করে।
- লিপিড পানির চেয়ে হালকা; তাই পানিতে ভাসে।
- লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
- লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে।
- চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে জমা থাকে।
- বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সম্মাভিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।

02. লিপিডের শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি	শ্রেণীবিভাগ	তথ্য
রাসায়নিক গঠন	সরল লিপিড (স্নেহ)	স্নেহ দ্রব্য* (চর্বি ও তেল) চর্বি সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও তেল অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড দিয়ে তৈরি।
		মোম ফ্যাটি এসিড (অসম্পৃক্ত) + মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল।
	রাসায়নিক বন্ধন	সম্পৃক্ত (একক বন্ধন) লরিক এসিড, পামিটিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড, লিনোসেরিক এসিড।
		অসম্পৃক্ত (দ্বি বা ত্রিবন্ধন) অলিক এসিড, লিনোলিক এসিড, লিনোলেনিক এসিড।
	যৌগিক লিপিড	ফসফোলিপিড* লেসিথিন, সেফালিন, প্রাজমাথোজেন।
		গ্রাইকোলিপিড* সূর্যমুখী তুলার বীজে গ্রাইকোলিপিড পাওয়া যায়। উদ্ভিদের ফটোসিনথেটিক অঙ্গে গ্রাইকোলিপিড বেশি থাকে।
		সালফোলিপিড সালফার সমৃদ্ধ লিপিড।
		লিপোপ্রোটিন লিপিড + প্রোটিন।

- ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উৎস।
- আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে।
- স্টার্চ হাইড্রোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয়।
- আলু, ধান, গম, ভুট্টা কলা ইত্যাদি স্টার্চে শতকরা ২২ ভাগ অ্যামাইলোজ এবং ৭৮ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন থাকে।
- ফেহলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয়না।
- তুল্য সেলুলোজের পরিমাণ ৯৪%, লিনেনে ৯০% এবং কাঠে ৬০%।
- বস্ত্র ও বন শিল্পের প্রধান উপাদান সেলুলোজ।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিরাজ করে সেলুলোজ।
- সেলুলোজে নাইট্রেট বিকোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়।
- গ্লাইকোজেনের মূল গাঠনিক একক হলো $\alpha-D$ গ্লুকোজ।
- গ্লাইকোজেন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়না। আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে।
- OH গ্রুপ অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে (Galactosamine) গ্যালাক্টোসামিন হয়ে থাকে।
- তরুণস্থির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন।
- গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে তৈরি করে কাইটিন যা পতঙ্গ, কঁকড়া, পোবস্টার এবং ছত্রাক কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড।
- লিপিডের নির্দিষ্ট কোনো গলন্যক্ষ নেই।
- মোম জাতীয় লিপিড এ গ্রিসারোল এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরোল থাকে।
- ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্রিসারোল এস্টারকে বলা হয় স্নেহদ্রব্য।
- মোম সাধারণত কবুত, বোটা, পাতা ও ফলের ওপর প্রতিরোধক স্তর হিসেবে অবস্থান করে।
- লেন্থিন, সেকালিন, প্রাজমালোজেন ইত্যাদি কয়েকটি ফসফোলিপিডের নাম।
- ফসফোলিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
- যে গ্লাইকোলিপিডে সালফার থাকে তাকে সালফোলিপিড বলে।
- ব্যাকটেরিয়া ও সারানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান।
- হীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে।
- কোলেস্টেরল বেশি থাকলে রক্তনালি সঙ্ক হয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে যায় কলে করোনারি প্রমোডিস নামক হৃদরোগ হয়।
- টারপিনস সাধারণ সংকেত হলো $(C_5H_8)_n$ ।
- পুদিনা ও তুলসিতে উদারী তেল হিসেবে টারপিনস পাওয়া যায়।
- *Hevea brasiliensis* নামক উদ্ভিদ থেকে প্রাকৃতিক রাবার পাওয়া যায়।
- ক্যারোটিনয়েডস আলোক শোষণকারী পিগমেন্ট।
- বিটা ক্যারোটিন পাতায় আলোক শক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে।
- বিটা-ক্যারোটিন আলোক অনুপ্রাণন করে ফটোট্রপিজম ঘটায়।
- মানবদেহে বিটা-ক্যারোটিন ভেঙ্গে দুই অণু ভিটামিন-এ তৈরি করে যা থেকে পরে রডোপসিন তৈরি হয়।
- রডোপসিন দৃষ্টিশক্তি দান করে।
- রডোপসিনে Vit-A থাকে।
- ভিমের কুসুম, গাজর, টমেটো ইত্যাদি থেকে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়।
- Testosterone এবং Oestrogens হলো স্টেরয়েড হরমোন যা মেরুদণ্ডী প্রাণীতে যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।
- Cortisol কার্বেহাইড্রেট ও প্রোটিন হজম, লবণ ভারসাম্য, পানি ভারসাম্য এবং যৌন বিকাশে অবদান রাখে।
- ভিটামিন-E জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে।
- বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে মিলে সর্বমোট ২৮টির মতো অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে।
- গ্রিক Proteios হতে protein শব্দের উৎপত্তি।
- সব এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়।
- বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে।

- প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ।
- চুলে কেরাটিন থাকে।
- মানবদেহের চাহিদা অনুসারে মাত্র ৮টি অ্যামিনো এসিড কে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়।
- আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার।
- এনজাইমকে জৈব অণুঘটকও বলা হয়ে থাকে।
- অপিকারশ উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের ৫০-৮০% কার্বেহাইড্রেট থাকে।
- সরবিটল তৈরিতে গ্লুকোজ ব্যবহার হয়।
- ফলের রসে নেকটার এবং মধুতে অধিক পরিমাণে মুক্ত ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।
- রাইবোজ শর্করার গলন্যক্ষ ৯৫° সে।
- মধুর প্রধান কাঁচামাল হলো সুক্রোজ।
- অ্যামাইলোজে সাধারণত ২০০ হতে ১০০০ এবং অ্যামাইলোপেকটিনে ২০০ হতে ২০০০০০ গ্লুকোজ অণু থাকে।
- গোল আলুর স্টার্চ কণিকা বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা ক্ষুদ্রতম।
- গ্লাইকোজেন প্রাণী জগতের গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড।
- সেলুলোজ উদ্ভিদ জগতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড।
- সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন এ ৫১টি এবং বৃহৎ প্রোটিনে ৪০০০০ অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্ত থাকতে পারে।
- শুধুমাত্র *Escherichia coli* এর ১টি কোষে ৩০০০ ধরনের প্রোটিন থাকে।
- রক্তে LDL (Low Density Lipoprotein) বেশি থাকা ক্ষতিকর। কিন্তু HDL (High Density Lipoprotein) বেশি থাকা মঙ্গলজনক।
- সরল প্রোটিন এর মাঝে শুধু অ্যালবিউমিন ও গ্রোবিউলিন তাপে জমাট বাঁধে।
- এনজাইম যার উপরে কাজ করে তাকে সাবস্ট্রেট বলে।
- বিরল অ্যামিনো এসিড হলো- হাইড্রোক্সিপ্রোপিন।
- অ্যাসিড ও ক্ষার বিশিষ্ট অ্যামিনো এসিডের মূলককে বলা হয়- জুইটার আয়ন।
- ভিমের কুসুমে যে প্রোটিন বিদ্যমান অভোপ্রোবিউলিন।
- চুল, নখ, শিং, পালক, ক্ষুর ইত্যাদি গঠনকারী প্রোটিন হলো কেরাটিন।
- যে তাপমাত্রায় (°C) এনজাইম সক্রিয় হয়ে পড়ে- 40° সে. উপরে বা 0° সে. এর নিচে।
- যে সকল এনজাইম সক্রিয় অবস্থায় নিষ্কৃত হয় তাদের বলা হয় জাইমজ (Zymase)।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

০১. নিচের কোনটি ডাইস্যাকারাইড? [DU-15-16; DU-7th Clg-21-22]
 A. β -গ্লুকোজ B. ফ্রুক্টোজ
 C. মল্টোজ D. র্যাকিনোজ
০২. কোনটি প্রোটিন দ্বারা গঠিত নয়? [JU-D, Set-L-2022-23]
 A. ইনসুলিন B. ইন্টারফেরন
 C. ডেনিম D. কাইটিন
[SOD Why] কাইটিন: নাইট্রোজেন বিশিষ্ট জটিল পলিস্যাকারাইড। এটি বিশেষ প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর এবং কঁকড়া, পোবস্টার ইত্যাদির বহিঃকঙ্কালে কাইটিন থাকে।
০৩. কোনটি মনোস্যাকারাইড? [RU-C, বহু-৩: 23-24]
 A. রাইবোজ B. সুক্রোজ
 C. ল্যাকটোজ D. মল্টোজ
০৪. স্ট্যাকিওজ কোন ধরনের কার্বেহাইড্রেট? [JU-D, Set-D-20-21]
 A. ডাইস্যাকারাইড B. ট্রাইস্যাকারাইড
 C. টেট্রাস্যাকারাইড D. পেটাস্যাকারাইড
০৫. শক্তির প্রধান উৎস কোনটি? [CU-A, Shift-3: 20-21; JU-D, 14-15]
 A. প্রোটিন B. লিপিড
 C. এস্টার D. কার্বেহাইড্রেট
[SOD Why] কার্বেহাইড্রেট প্রধানত শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে প্রোটিন ও লিপিড দেহ গঠনের ভূমিকা পালন করে।

06. সেলুলোজ কত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডের পলিমার? [GST-A: 22-23]
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
[SOWhy] সেলুলোজ: সেলুলোজ উদ্ভিদের একটি প্রধান গাঠনিক পদার্থ। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। অসংখ্য β -D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β -1-4 কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ তৈরি করে। উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোনো কঙ্কাল নেই, সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ। সেলুলোজের আণবিক সংকেত: $(C_6H_{10}O_5)_n$ ।
07. নিচের কোনটি রিডিউসিং স্যুগার? [CoU: A: 19-20; NSTU: Unit-A: 19-20]
A. গ্লুকোজ B. স্টার্চ C. সেলুলোজ D. গ্লাইকোজেন
[SOWhy] সুক্রোজ ব্যতীত সকল মনো ও ডাইস্যাকারাইড রিডিউসিং স্যুগার।
08. কোনটি ইক্ষু বা বিটের চিনি হিসাবে পরিচিত?
[IU: 18-19; S. Board: 17-18; DU: 7Clg-A: 20-21]
A. মল্টোজ B. সুক্রোজ C. গ্লুকোজ D. ফ্রুক্টোজ
[SOWhy] চিনি হলো একটি সাধারণ সুক্রোজ। ইক্ষু ও বিট থেকে চিনি পাওয়া যায়। ইক্ষুর রসে প্রায় 15% সুক্রোজ।
09. কোনটি রিডিউসিং শ্যুগার নয়?
[BU: 17-18; CU: 13-14; DU: 10-11, 00-01; JU: 16-17; IU: 13-14]
A. গ্লুকোজ B. সুক্রোজ C. রাইবোজ D. মল্টোজ
10. কার্বোহাইড্রেট থেকে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় কোন প্রক্রিয়ায়? [য. বো. ২০১৯]
A. সালোকসংশ্লেষণ B. আবাত শ্বসন
C. শ্বসন D. অভিশ্রবণ
11. নিচের কোনটি অ-প্রোটিনীয় অ্যামিনো এসিড? [DU: 17-18]
A. লিউসিন B. লাইসিন C. অরনিথিন D. ভ্যালিন
12. অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড কয়টি? [JU-D, Set-R: 2022-23]
A. ১০ B. ১২ C. ৯ D. ১১
[SOWhy] অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড: অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ৮টি। এরা দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না। শিশুদের জন্য আরজিনিন এবং হিস্টিডিন অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ১০টি।
13. হিমোগ্লোবিন কোন ধরনের প্রোটিন? [RU-C, সূরমা-৩: 23-24]
A. মেটালোপ্রোটিন B. গ্লাইকোপ্রোটিন
C. লিপোপ্রোটিন D. ক্রোমোপ্রোটিন
14. কোন কোলেস্টেরল মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়? [RU-C, Uranus-1, Set-1: 2021-22]
A. LDL B. HDL C. HPL D. PDL
[SOWhy] HDL বা High density lipoprotein মানবদেহের জন্য ভালো। এটি নারীদের দেহে পরিমাণে ও পুরুষদের দেহে পরিমাণে কম থাকে।
15. কোনটি ফসফোলিপিডের উদাহরণ? [চ. বো. ২০১৯]
A. লেসিথিন B. সুবেরিন C. কিউটিন D. টারপিন
16. প্রোটিন থেকে মোট কয়টি অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়?
[MAT: 04-05; RU: 14-15; CU: 12-13; CoU: 15-16]
A. 8 B. 20 C. 26 D. 64
17. কোনটি উদ্ভূত প্রোটিন? [DAT: 23-24]
A. Lipoprotein B. Fibrin C. Flavoprotein D. Histone
18. আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড নয় কোনটি? [JU-D, Set-D: 20-21]
A. অলিক B. লিনোলিক C. লিনোলেনিক D. স্টিয়ারিক
19. তুলার বীজে কোন ধরনের লিপিড শনাক্ত করা হয়েছে? [JU: Unit-D; Set-Q: 19-20]
A. গ্লাইকোলিপিড B. ফসফোলিপিড C. লেসিথিন D. সেফালিন
[SOWhy] উদ্ভিদের ফটোসিনথেটিক অঙ্গে ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে। ক্রোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনে গ্লাইকোলিপিড অধিক থাকে। সূর্যমুখী ও তুলার বীজ থেকে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে।
20. কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে? [JU-D; Set: 10, 17-18]
A. ভিটামিন-K B. ভিটামিন-D
C. ভিটামিন-A D. ভিটামিন-E

21. নিচের কোনটি পনির তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?
A. অ্যামাইলেজ B. রেনিন C. পেকটিনেজ D. জাইমেজ
22. কোনটি বিজারিত নিউক্লিওটাইড?
A. NADH B. ATP C. FAD D. NAD
[SOWhy] এক অণু নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক, এক অণু পেটোজ শ্যুগার এবং এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয় তাকে বলে নিউক্লিওটাইড। এর সাথে যখন এক অণু H^+ যুক্ত হয় তখন তাকে বিজারিত নিউক্লিওটাইড বলে। যেমন: NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) হলো একটি ডাইনিউক্লিওটাইড, যার সাথে একটি H^+ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে বিজারিত ডাইনিউক্লিওটাইড NADH (Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide)।
23. কো-এনজাইম নয় কোনটি?
A. CoA B. NAD⁺
C. FMN D. LTH
24. কোন এনজাইম স্টার্চকে ভেঙ্গে ডেক্সট্রিনে রূপান্তরিত করে?
A. α -অ্যামাইলেজ B. β -অ্যামাইলেজ
C. ক্যাটালেজ D. জাইমেজ
25. যে তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়—
A. 50-60°C B. 65-75°C
C. 80-90°C D. 95-100°C
[SOWhy] 40° সে. এর উপরে এবং 0° সে. বা তার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা দারুণভাবে কমে যায়। 35°C-40°C তাপমাত্রায় এনজাইমের বিক্রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি।
26. রক্তে ইউরিক এসিড সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়?
A. ইউরিয়েজ B. ইউরিকেজ
C. ইউরোবাইলেজ D. উপরের সবগুলো
27. পেকটিন এনজাইম ব্যবহার হয়—
A. ফলের রস উৎপাদনে B. পনির তৈরিতে
C. ক্ষত নিরাময়ে D. হজম সমস্যা দূর করতে
28. লাইপেজ এনজাইম তৈরিতে কোন অণুজীব ব্যবহৃত হয়?
A. *Aspergillus* B. *Penicillium*
C. *Bacillus ceceus* D. *Endothia parasitica*
29. কনজুগেটেড এনজাইমের প্রোটিন অংশকে বলে—
A. কো-এনজাইম B. অ্যাপোএনজাইম
C. কো-ফ্যাক্টর D. প্রোস্টেটিক গ্রুপ
30. কোন এনজাইমের অভাবে শ্বেতরোগ হয়?
A. স্ট্রেপটোকোকাস B. প্রোটিনেজ
C. টাইরোসিনেজ D. এনহাইড্রেজ
31. এনজাইমের কার্য ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়—
A. Ag B. Zn
C. Cu D. Mn
32. চোখের ছানির অঙ্গপাচারে যে এনজাইম ব্যবহার করা হয়—
[NSTU: Unit-A, 19-20; JUST: Unit-B, 19-20; IU: 13-14; SUST: 11-12]
A. পেপসিন B. ক্যাটালেজ
C. ট্রিপসিন D. সেলুলেজ
33. লাইপেজের কাজ—
[DAT: 22-23]
A. দই ও পনির শিল্পে ব্যবহৃত হয় B. স্টার্চ থেকে মদ উৎপাদনে
C. রক্ত জমাট বাধায় D. ঔষধ শিল্পে ঔষধ তৈরিতে
34. ফলের রস তৈরিতে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?
A. পেপেইন B. পেকটিনেজ C. সেলুলেজ D. প্রোটিনেজ
35. প্রোসেটিক গ্রুপ ATP যুক্ত এনজাইমকে কী বলে?
A. কো-এনজাইম B. কো-ফ্যাক্টর
C. আইসোমারেজ D. কার্বক্সিলেজ

PRIME TEST

১১. হৃদয়ের সন্ধিহলে দুটিকেই হিসেবে ব্যবহৃত হয়-

১১. হৃদয়ের সন্ধিহলে দুটিকেই হিসেবে ব্যবহৃত হয়-
 (A) কার্বোহাইড্রেট (B) লিপিড
 (C) প্রোটিন (D) এনজাইম
 ১২. প্রোটিন পদার্থ হিসেবে কোনটির ব্যবহার বহুল প্রচলিত?
 (A) মুকোজ (B) সেনুলোজ (C) স্টার্চ (D) সবগুলো

১৩. তরলিক এসিড তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
 (A) সেনুলোজ (B) ম্যানোজ (C) সুক্রোজ (D) স্টার্চ

১৪. ইন্ড, কন প্রভৃতি সঙ্করী অঙ্গে জমা থাকে-
 (A) স্টার্চ (B) গ্লাইকোজেন
 (C) সেনুলোজ (D) সবগুলো

১৫. বন ও বন শিল্পের প্রধান উপাদান-
 (A) সেনুলোজ (B) স্টার্চ
 (C) গ্লাইকোজেন (D) অ্যামাইলোজ

১৬. গ্লাইকোজেন কে আবিষ্কার করেন?
 (A) Robert Hooke (B) Claude Bernard
 (C) Alexander Flemming (D) Watson & Crick

১৭. কোনটি প্রাণিজ স্টার্চ?
 (A) সেনুলোজ (B) হেমিসেনুলোজ
 (C) পেকটিন (D) গ্লাইকোজেন

১৮. তরলিকের প্রধান দ্রব্য কী?
 (A) গ্লুকোসামিন (B) গ্যালাক্টোসামিন
 (C) কাইটিন (D) কোনোটিই নয়

১৯. প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক হলো-
 (A) অ্যাসিটিক এসিড (B) অ্যামিনো এসিড
 (C) সাইট্রিক এসিড (D) কার্বনিক এসিড

২০. ইন্ডিয়া সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে কোনটি?
 (A) সাইট্রুলিন (B) হেমোসেরিন
 (C) অরনিথিন (D) হাইড্রক্সিপ্রোপিন

২১. সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন কোনটি?
 (A) ফ্লোরোপ্রোটিন (B) প্রোলামিন (C) হিস্টোন (D) প্রোটামিন

২২. যুগ্ম প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে বলা হয়-
 (A) কনজুগেটেড প্রোটিন (B) এনজাইম
 (C) কো-এনজাইম (D) প্রোসথোটিক গ্রুপ

২৩. মটরে উৎপন্ন কোন প্রোটিনটি ব্যাথানাশক হিসেবে কাজ করে?
 (A) ইন্টারফেরন (B) লিউকোফেরন (C) ইন্টারলিউকিন (D) এন্ডোরফিন

২৪. উদ্ভিদসঙ্গে বিদ্যমান কোন স্টেরয়েড হ্রদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়?
 (A) অর্পাস্টেরল (B) স্টিগমাস্টেরল (C) ডিজিট্যালিন (D) কোলোস্টেরল

২৫. কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ইউরিয়েজ নামক এনজাইম কোষ হতে পৃথক করেন?
 (A) মিশার (B) ওয়াটসন (C) কুন (D) সামনার

২৬. কোনটি সরল এনজাইমের উদাহরণ?
 (A) FAD (B) সুক্রোজ (C) NAD (D) সবগুলো

২৭. সরল এনজাইম কত pH এর মধ্যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল?
 (A) 1-3 (B) 3-6 (C) 6-9 (D) 9-12

২৮. এনজাইমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে কোনটি?
 (A) Ag (B) Zn (C) Cu (D) Mg⁺⁺

২৯. মুকোজ ও গ্যালাক্টোজ এর সমন্বয়ে কোনটি গঠিত হয়?
 (A) সুক্রোজ (B) র্যাফিনোজ (C) ল্যাক্টোজ (D) ইরিথ্রোজ

৩০. স্টার্চ কিসের উপস্থিতিতে সুগারে পরিণত হয়?
 (A) জাইমেজ (B) ইনভার্টেজ (C) ডায়াস্টেজ (D) মল্টেজ

Answer Analysis

01.A	02.A	03.C	04.A	05.A	06.B	07.D	08.B	09.B	10.C
11.D	12.D	13.D	14.C	15.D	16.B	17.C	18.D	19.C	20.C

অধ্যায় ০৪

অনুর্জাব

জীববিজ্ঞান ১ম পত্র

সাজেশনস	RATINGS		
	***	**	*
ভাইরাস	ভাইরাসের গঠন, শ্রেণীবিন্যাস	অপকারিতা, উপকারিতা	ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য
ব্যাকটেরিয়া	ব্যাকটেরিয়ার গঠন, শ্রেণীবিন্যাস	অপকারিতা, উপকারিতা	ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য
ম্যালেরিয়া	বিভিন্ন পরজীবীর সুপ্তাবস্থা, জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ	ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ	ম্যালেরিয়ার ইতিহাস

TOPIC-01 ভাইরাস

- ভাইরাস অর্থ বিষ।
- ভাইরাস নিউক্লিক এসিড (কেন্দ্রে) ও প্রোটিন (আবরণ) দিয়ে গঠিত অতি আনুবীক্ষণিক বস্তু।
- ভিরিয়ন: Virus + infection, সংক্রমনক্ষম ভাইরাস।
- ভিরয়েড: নিউক্লিক এসিড (RNA), নারিকেল গাছে ক্যাডাং রোগের জন্য দায়ী।
- প্রিয়ন: নিউক্লিক এসিডবিহীন প্রোটিন আবরণ, মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের Kuru, গবাদি পশুর Scarpie ও ম্যাড কাউ রোগের জন্য দায়ী।
- Nucleocapsid: Virus – infection (সংক্রমনহীন ভাইরাস)।

ভাইরাসের শ্রেণীবিভাগ:

- দভাকার- আলফা মোজাইক, TMV, মাম্পস।
- গোলাকার- TIV, পোলিও, HIV, ডেঙ্গু।
- ঘনক্ষেত্রাকার- হার্পিস, ভ্যাক্সিনিয়া।
- ইমার্জিং ভাইরাস- HIV, Ebola, Nile virus, SARS।
- DNA ভাইরাস-

টিপুর ↓ TIV	ভাই ↓ ভ্যারিওলা	টিউ ↓ T ₂	ভ্যানিলা ↓ ভ্যাক্সিনিয়া
হতে ↓ হার্পিস, হেপটাইটিস বি	ফ্রালে ↓ ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস	এলো ↓ এডিনো ভাইরাস	

ভাইরাসঘটিত রোগ এবং তাদের পোষক:

রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাসের নাম
AIDS	মানুষ	HIV ভাইরাস
ডেঙ্গু	মানুষ	ফ্ল্যাভিভাইরাস
জলাতঙ্ক *	মানুষ	র্যাবিস ভাইরাস
গুটি বসন্ত	মানুষ	ভেরিওলা ভাইরাস
হাম	মানুষ	রুবিওলা ভাইরাস
ভাইরাল হেপটাইটিস	মানুষ	হেপটাইটিস-বি ভাইরাস
চিকুনগুনিয়া *	মানুষ	চিকুনগুনিয়া ভাইরাস
বার্ড ফ্লু *	হাঁস-মুরগি, পাখি	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H ₅ N ₁) ভাইরাস
জডিস *	মানুষ	হেপটাইটিস-বি ভাইরাস
Swine flue *	মানুষ, শূকর	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H ₁ N ₁) ভাইরাস

রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাসের নাম
ধানের টুংরো রোগ	ধান	টুংরো ভাইরাস
কলার বানচি টপ রোগ	কলা	বানচি টপ ভাইরাস
গোল আলুর মোজাইক রোগ	গোলআলু	পট্যাটো মোজাইক ভাইরাস
তামাকের মোজাইক রোগ *	তামাক	টোবাকো মোজাইক ভাইরাস
সিমের মোজাইক রোগ	সিম	বীন মোজাইক ভাইরাস
টমেটোর বৃশিস্টাট রোগ *	টমেটো	বৃশিস্টাট ভাইরাস

Mnemonic: ভাইরাসঘটিত রোগ:

হায়	হায়	দেশে	বসন্তের	মাস	এল	ভাইকে
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
হাম	হার্পিস	ডেঙ্গু	বসন্ত	মাম্পস	এডিনো	ভাইরাল হেপাটাইটিস

ফু	ইনফ্লুয়েঞ্জা	জ্বরে	পেলো
↓	↓	↓	↓
বার্ডফু, সোয়াইন ফু	ইনফ্লুয়েঞ্জা	জলাতঙ্ক	পোলিও

TMV সম্পর্কিত তথ্য:

- দভাকৃতির ভাইরাস।
- RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। একে ক্যাপসিড বলে।
- ২১৩০-২২০০ ক্যাপসোমিয়ার থাকে। প্রতিটিতে ১৫৮টি অ্যামিনো এসিড থাকে।
- ৬৫০০ নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। এর প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগই প্রোটিন।

T₂ ব্যাকটেরিওফায়:

- T₂ সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস।
- দেহকে ২টি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়: i. মাথা ও ii. লেজ।

হেপাটাইটিস ভাইরাস:

- পাঁচ প্রকার: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV
- এর জন্য পেটোভ্যালেট ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হয়।
- হেপাটাইটিস-সি কে বলা হয় তুষের আগুন বা হাড়ভাঙ্গা জ্বর।

ভাইরাসের উপকারিতা:

- যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear polyhydrosis virus কে পতঙ্গনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- লাল টিউলিপ ফুলে সাদা দাগ ফেলে এতে ফুলের সৌন্দর্য্য ও দাম বেড়ে যায়, একে ব্রোকেন টিউলিপ বলে।
- মিস্রো ভাইরাসের সাহায্যে অতিরিক্ত খরগোশ নিধন করা হয়।
- বিভিন্ন প্রকার প্রতিষেধক: পোলিও, বসন্ত, প্রেগ, জলাতঙ্ক, টাইফয়েড, জডিস।

ডেঙ্গুজ্বর:

কারণ:

- ভাইরাসের নাম ফ্লাভি ভাইরাস বা ডেঙ্গী ভাইরাস।
- এটি একটি RNA ভাইরাস।
- এই ভাইরাসের বাহক *Aedes Aegypti* L, *Aedes Albopictus* নামক মশকী।

লক্ষণ:

01. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর:

- জ্বর ১০৩-১০৫° ফারেনহাইট হয়ে থাকে।
- মেরুদণ্ডের ব্যাথা হলে কোমরে ব্যাথা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।
- শরীরে লালচে রঙের র্যাশ দেখা দিতে পারে।

02. হেমোরাজিক ডেঙ্গুজ্বর:

- রক্তে প্লেটলেট ভীষণ হ্রাস পায় ও রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।

03. ডেঙ্গু শক সিনড্রোম:

- হেমোকনসেনট্রেশন ঘটতে দেখা যায়।

ডেঙ্গুজ্বর নির্ণয়ে পরীক্ষা:

- সেরোলজি: রক্ত পরীক্ষায় NSI অ্যান্টিজেন এবং IgG ও IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রমিত রক্তে অ্যান্টিবডি পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- প্লেটলেট পরীক্ষা: রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ১৫০০০০/mm³ এর কম হলে নিচে নেমে আসে।
- সেল কালচার: রক্ত কণিকা কালচার করেও ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

পেপের রিংস্পট:

ভাইরাসের নাম: Papaya Ringspot Virus Type (PRSV-P)

রোগের বিস্তার: এফিড (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*) জাতীয় পতঙ্গ (জাব পোকা ও সাদা মাছি) দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদে মোজাইক রোগের সৃষ্টি করে।

TOPIC-02

ব্যাকটেরিয়া

- নামকরণ: জার্মান বিজ্ঞানী এরেনবার্গ ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে এর নামকরণ করেন।
- উৎপত্তি: গ্রীক শব্দ Bakterion = Little rod থেকে ব্যাকটেরিয়া শব্দের উৎপত্তি।
- তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা: ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
- ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক, রাইবোসোম ছাড়া অন্য কোনো ঋণাত্মক অণু থাকে না।
- বাধ্যতামূলক অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া-*Clostridium*।
- বাধ্যতামূলক বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া-*Azotobacter*।
- ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান।
- ফায় ভাইরাসের প্রতি এরা খুবই সংবেদনশীল।
- (- ১৭ থেকে ৮০)°C তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে।

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ ও রোগের কারণ:

রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়া
যক্ষ্মা	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
নিউমোনিয়া	<i>Diplococcus pneumoniae</i>
টাইফয়েড*	<i>Salmonella typhi</i>
কলেরা*	<i>Vibrio cholerae</i>
ডিপথেরিয়া	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
আমাশয়*	<i>Bacillus dysenteriae</i>
হুপিংকাশি*	<i>Bordetella pertussis</i>
টুংরোগ (গম)*	<i>Agrobacterium tritici</i>
রাইট রোগ (ধান)*	<i>Xanthomonas oryzae</i>
আঠাঝরা রোগ	<i>X. vasculorum</i>
ধনুষ্ঠংকার	<i>Clostridium tetani</i>
গরুর যক্ষ্মা	<i>Mycobacterium bovis</i>
ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স*	<i>Bacillus anthracis</i>
হাস-মুরগির কলেরা	<i>Bacillus avisepticus</i>
লেবুর ক্যান্ডার*	<i>Xanthomonas citri</i>
আপেলের ফায়ার রাইট*	<i>Erwinia amylovora</i>

উপকারিতা:

- *Azotobacter*, *Pseudomonas*, *Clostridium* সরাসরি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।
- *Bacillus subtilis* হতে সাবটিলিন, *Bacillus polymyxa* হতে পলিমিক্সিন ও *Actinomycetes* হতে স্ট্রেপটোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হয়।
- *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউল নাইট্রোজেন সংরক্ষণ করে।
- D.P.T, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়।
- *Bacillus thuringiensis* বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

- *Chloridium* এর সাহায্যে পাটের অংশ ছড়ানো হয়।
- *Amnibacter xylinum* দিয়ে ভিনেগার, *Bacillus lactacidi* দিয়ে ল্যাকটিক এসিড, *Chloridium acetobutylicum* দিয়ে আনিস্টোন প্রস্তুত করা হয়।
- পুনিচর্চা- *Zoogloa ramigera*, তেল অপসারণে-*Pseudomonas aeruginosa*, এবং বায়োপ্যাস উৎপাদনে-*Bacillus*, *E.coli*, *Chloridium*, *Methanococcus* ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

TOPIC-03

ম্যালেরিয়া

- **সূত্র:** সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া (অর্থ সুখিত বায়ু) শব্দটি ব্যবহার করেন।
- **চর্চা ম্যালেরিয়া:** ম্যালেরিয়া পরজীবী অবিচার করেন।
- **রেনাল বস:** আনেককিনিস মশকী ম্যালেরিয়ার পরজীবী বহন করে।
- **সার পাতিক ম্যালেরিয়া:** ম্যালেরিয়ার জীবন মশকীর সাহায্যে মানব দেহে সংক্রমিত হয়।

ম্যালেরিয়া পরজীবী:

Mnemonic: গমি চবি কামিলি মেকার

ম্যালেরিয়া পরজীবীর নাম	রোগের নাম	সূত্রবহুকাল
গ	মি	১১-১৬ দিন
<i>Plasmodium ovale</i>	মুদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	
চা	বি	১২-২০ দিন
<i>Plasmodium vivax</i>	বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	
কা	মিলি	৮-১৫ দিন
<i>Plasmodium falciparum</i>	মালিশিয়া টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	
মে	কার	১৮-৪০ দিন
<i>Plasmodium malariae</i>	কোরটান ম্যালেরিয়া	

ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিভিন্ন দশা ও বৈশিষ্ট্য:

দশা	বৈশিষ্ট্য
স্পোরোজোয়েট	মাকৃ অকৃতির, মানবদেহে প্রবেশকৃত প্রথম দশা।
ট্রিটোজোয়েট	গোলাকার অকৃতি।
সাইজন্ট	বহু নিউক্লিয়ার সর্পিলাকৃত দশা।
ট্রোফোজোয়েট	RBC'র প্রথম দশা।
সিগনেট রিং	সেখানে আকৃতির মতো।
অমিবিট্রোফ	সকলদর্শ করা দেহা ব্যত, বার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া শনাক্ত করা হয়।
ট্রোফোজোয়েট	পাইরোজেন নিয়ন্ত্রণ হয়, ফলে জ্বর আসে।
জোয়েট	কৃষ্ণের পার্শ্বের মতো। হিমোগ্লোবিন নামক বর্জ্য করিত হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণসমূহ:

- দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যাপসিন ১০৪°-১০৬° ক্যারেনাইটি পর্যন্ত জ্বর। মূলত ৪৮ ঘণ্টা পর পর জ্বর আসে। *P.vivax* জীবন দ্বারা সূত্র ম্যালেরিয়ার প্রথম লক্ষণ।
- তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর রক্তের সোদির কলিন ভাগের ফল রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- ৫ পর্যায়ে ট্রাই ও মাইক্স আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা:

- ক্লোরকুইন
- নিভাকুইন
- কুইনাইন (মূল ঔষধ যা সিনকোনা পাতের বাকল থেকে তৈরি হয়)
- ডেমেকুইন।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শাটিন শব্দ ভাইরাসের অর্থ- বিষ।
- ভাইরাসের জনক- W.M. Stanley।
- TMV কে তামাক পাতা থেকে কেসোসন প্রক্রিয়ায় পৃথক করেন এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- W.M. Stanley (1935 & 1946)।
- অসংখ্য অতিসূক্ষ্মজীবী ও ব্যাকটেরিয়ার পরজীবী- ভাইরাস।
- বিশেষ উপপরিভাষণ করে- HIV তে।
- একসূত্রক RNA দেহা ব্যত TMV।

- দ্বিসূত্রক RNA দেহা ব্যত - রিওভাইরাস।
- ভাইরাস গঠিত- প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড দ্বারা।
- AIDS রোগের প্যাথোজেন অবিদ্যুত হয় - ১৯৮৪ সালে।
- ভাইরাসের ক্যাপসিডের সাব ইউনিট হলো- ক্যাপসোমিয়ার।
- উপযুক্ত পোষক দেহে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে- ভাইরাস।
- ভাইরাস সর্বপ্রথম অবিদ্যুত হয়- তামাকের মোজাইক রোগ থেকে।
- টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের আকার- দণ্ডাকার।
- ফলকোকার বা পাউরুটি আকৃতির ভাইরাস- ভ্যাক্সিনিয়া।
- DNA ভাইরাস- ভ্যাক্সিনিয়া ও কাব।
- একসূত্রক DNA ভাইরাস- কোলিকাষ।
- দ্বিসূত্রক DNA ভাইরাস- ভ্যাক্সিনিয়া।
- পোলিও ভাইরাস- গোলাকার।
- জিকা ও HIV-RNA ভাইরাস।
- নিউক্লিক এসিডের ধরন অনুযায়ী ভাইরাস- ২ প্রকার।
- ভাইরাসের প্রোটিন আবরণ- অ্যান্টিজেনিক।
- প্রিয়ন হলো- সংক্রমক প্রোটিন কাইট্রিল।
- সংক্রমণকর ভাইরাসের কথাকে বলা হয়- ভিরিয়ন।
- SARS এর পূর্ণ রূপ- Severe Acute Respiratory Syndrome।
- ভাইরাসের প্রোটিন নির্মিত আবরণ- ক্যাপসিড।
- ব্যাকটেরিওফা - ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস।
- T₂ ব্যাকটেরিওফা-এর নিউক্লিক এসিড- দ্বিসূত্র DNA।
- E.coli এর দেহে সংক্রমণ সৃষ্টি করে- T₂ কাব ভাইরাস।
- T₂ কাব দেখতে- ব্যাঙাচি আকৃতির।
- T₂ কাব এর দেহ গঠিত- মাথা ও লেজ নিয়ে।
- T₂ কাব-এর মাথাটি- বড়তুজাকার।
- T₂ কাব-এর মাথা, কলার ও লেজ তৈরি - প্রোটিন দিয়ে।
- লাইটিক ফাভের অপর নাম- ভিরুলেন্ট কাব।
- T₂ ব্যাকটেরিওফাবে করটি জিন থাকে- ১৫০টি।
- T₂ কাবের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সময় লাগে- ৩০-৪০ মিনিট।
- জলাতর রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস- ব্যাবিস।
- মানবদেহে হাম, এইডস প্রভৃতির জন্য দায়ী- ভাইরাস।
- মদ শিল্পের ইস্টকে ধ্বংসকারী ভাইরাস- জাইমোফাষ।
- E.coli কে ধ্বংসকারী অপুজীব T₂ কাব।
- ভাইরাসকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে- জিন প্রকৌশলে।
- শস্যের ভাইরাসজনিত রোগের মধ্যে একটি হলো- লিফরোল।
- গরুর ভাইরাসজনিত একটি রোগ হলো- বসন্ত রোগ।
- ভাইরাসজনিত রোগ- পোলিও, বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, জলাতর, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, হেপাটাইটিস ইত্যাদি।
- সোয়াইন ফ্লু রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস- H₃N₂ (মানুষের) ও H₁N₂ (উকরের)।
- লাল টিউলিপ ফুলে বর্ণবিচ্যুতি সৃষ্টি করে- ভাইরাস।
- ভাইরাস সংক্রমিত একটি মারাত্মক রোগ - পোপের রিংস্পট।
- পোপের রিংস্পট সংক্রমিত হয়- PRSV দ্বারা।
- PRSV-এর বাহক হিসেবে রোগের বিস্তার ঘটায়- এফিড।
- পোপের রিংস্পট রোগ প্রথম লক্ষ করা যায়- ভারতের মহারাষ্ট্রে।
- PRSV ভাইরাসের দুটি টাইপ হলো- P টাইপ ও W টাইপ।
- PRSV- এর আকৃতি- দণ্ডাকৃতি।
- PRSV-এর আবরণী- অনুপস্থিত।
- পোপের রিংস্পট রোগে ভীষণভাবে কমে যায়- উদ্ভিদের বৃদ্ধি।
- Potyviridac গোত্রের অন্তর্ভুক্ত- PRSV।
- হেপাটাইটিস একটি- ভাইরাসজনিত রোগ।
- যকৃতের প্রদাহজনিত সমস্যা- হেপাটাইটিস।
- HAV হয়- এক্টারো ভাইরাসের কারণে।
- HVB এর সূত্রকাল- ৪৫-১৮০ দিন।

- ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়- এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগেনিতে।
- সাকনার্স রুপা দেখা যায়- অ্যামিবিয়ড ট্রাকোজোমেটে।
- ম্যালেরিয়া পরজীবী সিগনেট রিং সৃষ্টি করে- লোহিত রক্তকণিকায়।
- ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা- Mosquirix/RTSS।
- বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা- Mosquirix/RTSS।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের প্রোটিন আবরণকে বলে- [DU. 23-24]
A. ক্যাপসোমিয়ার B. ক্যাপসিড C. ভিরয়েডস D. গ্রাইকোপ্রোটিন
- [SOWHY]** TMV সম্পর্কিত তথ্য:
• দৈর্ঘ্য 280 nm (মতান্তরে 300 nm), দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় 17 গুণ।
• প্রস্থ 15 nm (মতান্তরে 18 nm)।
• RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। একে ক্যাপসিড (আবরণ) বলে।
• ক্যাপসিড বহু উপ-একক (ক্যাপসোমিয়ার) দিয়ে গঠিত।
• 2130-2200 ক্যাপসোমিয়ার থাকে। প্রতিটিতে 158টি অ্যামিনো এসিড থাকে।
• ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে একসূত্রক RNA কোর আছে। এটি 6500 নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। এর প্রায় শতকরা 95 ভাগই প্রোটিন।
02. সংক্রমণ করতে সক্ষম ভাইরাস কণাকে কি বলে? [DU. 13-14; JU. 14-15, 11-12; JUST. 12-13, 11-12]
A. নিউক্লিওক্যাপসিড B. পেপলোমিয়ার
C. ক্যাপসোমিয়ার D. ভিরিওন **[D]**
03. কোন ভাইরাসকে 'ভূষের আন্তন' বা 'নিরব ঘাতক' বলা হয়? [JU-D, Set-H. 23-24]
A. হেপাটাইটিস-C B. হেপাটাইটিস-E
C. ভ্যাক্সিনিয়া D. ইবোলা
- [SOWHY]** ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে যুক্তের প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বলে। পাঁচটি ভিন্ন ধরনের ভাইরাস হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। ভাইরাসগুলো হলো: হেপাটাইটিস A ভাইরাস (HAV), হেপাটাইটিস-B ভাইরাস (HBV), হেপাটাইটিস-C ভাইরাস (HCV), হেপাটাইটিস-D ভাইরাস (HDV) এবং হেপাটাইটিস-E ভাইরাস (HEV)। এর মধ্যে HCV কে ভূষের আন্তন বা নিরব ঘাতক বলা হয় কারণ এ রোগে আক্রান্তদের 5-10 বছরের মধ্যে কোনো লক্ষণ থাকে না।
04. কোনটি DNA ভাইরাস? [JU-D, Set-M. 23-24]
A. টোবাকো মোজাইক B. ফুলকপি মোজাইক
C. টারনিপ মোজাইক D. বীন ইয়েলো **[B]**
05. ভিরয়েডস কী? [JU-D, Set-O. 23-24]
A. একসূত্রক সংক্রামক RNA B. একসূত্রক সংক্রামক DNA
C. সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল D. দ্বিসূত্রক সংক্রামক RNA **[A]**
06. কোনটি নারিকেল গাছে ক্যাডাং রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী? [JU-D, Set-Q. 23-24]
A. প্রিয়ন B. ভিরয়েডস C. ভিরিয়ন D. ব্যাকটেরিয়া
- [SOWHY]** ভিরয়েডস সম্পর্কিত তথ্যাবলি:
• RNA থাকে, DNA থাকে না।
• প্রোটিন থাকে না।
• শুধু উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে (নারিকেল গাছে ক্যাডাং রোগ, হেপাটাইটিস-D, গোলআপু 'স্পিন্ডল টিউবার', অ্যাভোক্যাডোর 'সানবিচ' রোগ)।
07. ছত্রাককে আক্রমণকারী ভাইরাসকে কী বলে? [JU:Unit-D;Set-I,18-19]
A. স্যানোফায় B. মাইকোফায় C. ব্যাকটেরিওফায় D. ল্যামডাফায় **[D]**
08. দ্বিসূত্র বিশিষ্ট DNA ভাইরাসের উদাহরণ কোনটি? [JU:Unit-D;Set-D,18-19]
A. M13 B. T₂ C. ΦX174 D. Reovirus **[B]**
09. একসূত্র বিশিষ্ট DNA ভাইরাসের উদাহরণ কোনটি? [JU:Unit-D;Set-F,18-19]
A. T₂ B. M₁₃ C. Hepatitis D. Mu **[B]**
10. প্রাণীর 'ফুট এন্ড মাউথ' রোগসৃষ্টির জন্য দায়ী- [JU. 15-16]
A. ছত্রাক B. ব্যাকটেরিয়া
C. অ্যাকটিনোমাইসিটিস D. ভাইরাস **[D]**

11. HIV ভাইরাসে কোনটি নেই? [JU. 14-15; BSMRSTU. 11-12]
A. লিপিড বাইলয়ের আবরণ B. ক্যাপসিড
C. রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ D. DNA/Spike **[D]**
12. মানুষের গুটি বসন্ত রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস কোনটি? [JU. 13-14]
A. Varicella-Zoster virus B. Vaccinia virus
C. Rubella virus D. Variola virus **[D]**
13. কোনটি বার্ড ফ্লু ভাইরাস? [RU-C, সূরমা-৩: 23-24]
A. B₃N₃ B. B₃F₁ C. B₄F₂ D. H₃N₁ **[D]**
14. বাধ্যতামূলক পরজীবী বলা হয় কোনটিকে? [RU-C, মেঘনা-৩: 23-24]
A. ছত্রাক B. ব্যাকটেরিয়া C. ভাইরাস D. শৈবাল **[C]**
15. কোনটি ভাইরাস ঘটিত রোগ? [DU-7Clg. 22-23]
A. কলেরা B. যক্ষ্মা C. ডিপথেরিয়া D. ডেঙ্গু **[D]**
16. ডেঙ্গু জ্বরের জন্য দায়ী ভাইরাস কোনটি? [DU. 7Clg-A: 20-21; RU:F/C, 15-16]
A. Rhino Virus B. Variola Virus
C. Flavi virus D. H₁N₁
- [SOWHY]** ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কিত তথ্য:
• ভাইরাসের নাম ফ্লাভি ভাইরাস বা ডেঙ্গী ভাইরাস।
• এটি একটি RNA ভাইরাস।
• এই ভাইরাসের বাহক *Aede aegypti*, *Aedes albopictus* নামক মশকী।
17. ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তে কোনটির উপস্থিতি পাওয়া যায়? [KU. 19-20]
A. IgA B. IgK C. IgM D. IgE
- [SOWHY]** ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রক্তে IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিতি থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রমিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ চারজন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
18. ডেঙ্গু ভাইরাস এর আকৃতি কেমন? [CoU: A. 19-20]
A. গোলাকার B. দণ্ডাকার C. ডিম্বাকার D. ঘনক্ষেত্রাকার
- [SOWHY]** গোলাকার ভাইরাসের উদাহরণ: ডেঙ্গু, পোলিও, TIV, HIV
19. সাধারণ সর্দি কাশি কোন ভাইরাসের কারণে হয়? [GST-A. 23-24]
A. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস B. রাইনো ভাইরাস
C. রোটো ভাইরাস D. রেট্রো ভাইরাস **[B]**
20. কোনটি DNA ভাইরাসের উদাহরণ? [NSTU.14-15]
A. TMV B. র্যাবিস C. মিজলস D. এডিনো **[D]**
21. কোন রোগটি ভাইরাস জনিত নয়? [MBSTU. 13-14; DU. 08-09]
A. Mumps B. AIDS
C. Measles D. Tuberculosis **[D]**
22. রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ কোথায় থাকে? [SUST. 12-13, 13-14; JuU. 13-14]
A. ভাইরাস/HIV B. ব্যাকটেরিয়া/TMV
C. স্পাইরোগাইরা/T₂ phage D. প্রাণি/Influenza **[A]**
23. সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ভাইরাস কোনটি? [JUST. 11-12]
A. TMV B. র্যাবডো C. পোলিও D. HIV **[C]**
24. নিচের কোন রোগটি ভাইরাস দ্বারা হয়? [DAT. 19-20]
A. পোলিও B. ডিপথেরিয়া C. কলেরা D. টাইফয়েড **[A]**
25. পেপের রিং স্পট রোগের জীবাণু- [য.বো. ২০২৩]
A. DNA বহন করে B. মশা দ্বারা বাহিত হয়
C. দণ্ডাকৃতির D. Flaviviridae গোত্রের অন্তর্গত **[C]**
26. কোন ভাইরাসে DNA থাকে? [চ.বো. ২০১৯]
A. HIV B. TMV C. T₂ D. PRSV **[C]**
27. কোন ভাইরাসে এক সূত্রক DNA পাওয়া যায়? [ব.বো. ২০১৭]
A. কলিফায় B. ভ্যাক্সিনিয়া C. রিওভাইরাস D. TMV **[A]**
28. কোন অণুজীব নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সক্ষম? [DU. 18-19]
A. Bacillus B. Acetobacter C. Pseudomonas D. Nitrobacter **[C]**
29. কোনটি প্রোক্যারিওটিক?/আদিকোষের উদাহরণ- [DU. 13-14, 00-01; JU. 17-18, 11-12; BAU. 01-02, 09-10]
A. Agaricus B. Nostoc C. Riccia D. Zea mays **[B]**

- ## ☺ Answer Analysis ☺

01.B	02.A	03.C	04.A	05.B	06.B	07.A	08.C	09.B	10.C
11.A	12.B	13.B	14.C	15.A	16.D	17.B	18.D	19.C	20.D

শৈবাল ও ছত্রাক

সুজেন্দ্রনাম	★ ★ ★	★ ★	★
শৈবাল	সম্প্রতি খাদ্য, বৈশিষ্ট্য	প্রকারভেদ, গুরুত্ব	জনন
ছত্রাক	ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য ও গঠন	গুরুত্ব, সংগঠিত রোগ	জনন ও হাইফা

TOPIC-01 শৈবাল

০১. শৈবালের বৈশিষ্ট্য:
- দেহে জালুলার টিস্যু নেই।
 - সম্ভ্রিত খাদ্য শর্করা।
 - শৈবাল বিদ্যাকে Algology, গবেষণা করাকে Phycology বলে।
 - শৈবালে কখনও সত্যিকার মূল, কান্ড ও পাতা সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ এরা ব্যালয়েড (সমাল্পদেহী)।
 - কোষ প্রাচীর সেলুলোজ ও পেকটিন দ্বারা গঠিত।
 - একনজরে কিছু শৈবাল:

নাম	ফাইটোস্ট্রাটিন	বেনজিক	লিখোফাইট	এন্ডোফাইট	এপিফাইট
বৈশিষ্ট্য	সম্পূর্ণ ভাসমান	পানির নিচে আবদ্ধ	পাথরের গায়ে জন্মায়	উচ্চশ্রেণীর জীবের টিস্যু অভ্যন্তরে	শৈবালের গায়ে

০২. শৈবালের দৈহিক গঠন:

নাম	উদাহরণ
বাদামী শৈবাল (সবচেয়ে বড়, ৬০ মি. লম্বা হতে পারে)	<i>Macrocystis sp.</i>
এককোষী সচল শৈবাল বা জালেলায়ুজ*	<i>Chlamydomonas, Euglena</i>
নিচল এককোষী শৈবাল বা জালেলাবিহীন*	<i>Chlorella, Chlorococcum, Gloeocapsa</i>
সচল কলোনী (সিনোবায়াম)	<i>Pandorina, Volvox, Eudorina, Pyrobotrys</i>
নিচল কলোনী	<i>Hydrodictyon, Pediastrum, Eucapsis, Microcystis</i>
পামেলা দশা*	<i>Chlamydomonas, Chromulina</i>
পর্ব ও পর্বমধ্য বিশিষ্ট শৈবাল	<i>Chara, Nitella</i>
সর্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিল থ্যালাস	<i>Sargassum, Macrocystis</i>
দেহ লম্বা পাতার ন্যায়/ চ্যান্টা	<i>Ulva</i>
বহুকোষী অশাখ সূত্রবৎ	<i>Ulothrix, Spirogyra</i>
বহুকোষী শাখাযুক্ত সূত্রবৎ	<i>Cladophora, Pithophora, Trentipohlia, Chaetophora</i>
বহুকোষী হেটারোট্রোফিকাস	<i>Trentepohlia, Fritschilla, Chaetophora</i>
সাইফন সদৃশ/সিনোসাইট*	<i>Vaucheria, Botridium</i>

০৩. বিভিন্ন শৈবালের সম্ভ্রিত খাদ্য:

শৈবালের শ্রেণী	সম্ভ্রিত খাদ্য
Chlorophyta- সবুজ শৈবাল (Ulothrix)	Starch
Chrysophyta- গোড়েন ব্রাউন (Navicula)	Chrysolaminarin
Rhodophyta- লোহিত শৈবাল (Polysiphonia)	Floridian starch, Agar-agar, Carrageenan
Phaeophyta- বাদামী শৈবাল (Sargassum)	Laminarin, Mannitol, Algin
Pyrrhophyta- অগ্নি শৈবাল (Gymnodinium)	Paramylon
Euglenophyta- ইউগলেনোফাইট (Euglenophyta)	Paramylon/Paramylum
সীলান্ত-সবুজ শৈবাল (BGA)	Cyanophycean starch

০৪. শৈবালের জনন:

নাম	প্রকার	উদাহরণ
অঙ্গজ জনন	কোষের বিভাজন/বি-বিভাজন শর্তাধীন*	<i>Euglena, Chlorella, Ulothrix, Oedogonium, Nostoc, Oscillatoria</i>
	টিউবার বা বুলবিল সৃষ্টির মাধ্যমে	<i>Chara</i>
	কুঁড়ি সৃষ্টি বা বাতিল	<i>Protosiphon</i>
	হারমোণোনিয়াম এর মাধ্যমে*	<i>Nostoc, Oscillatoria</i>
	চলনেনু বা জুস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে	<i>Ulothrix, Oedogonium, Ectocarpus</i>
	অচলনেনু বা অ্যান্থ্রোপোর সৃষ্টির মাধ্যমে*	<i>Vaucheria, Microspora, Ulothrix</i>
অযৌন জনন	হিপনোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে	<i>Pediastrum, Sphaerella, Ulothrix</i>
	পামেলা দশার মাধ্যমে*	<i>Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix</i>
	অটোরেনু বা অটোস্পোর	<i>Chlorella, Scenedesmus</i>
	অ্যাকাইনিটির মাধ্যমে	<i>Nostoc, Pithophora, Cladophora, Revularia</i>
যৌন জনন	হোমোথ্যালিক (সহবাসী)	<i>Spirogyra</i>
	হেটারোথ্যালিক (পুং ও স্ত্রী জননকোষ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উৎপন্ন হয়)*	<i>Ulothrix, Chlamydomonas, Pandorina, Eudorina, Oedogonium, Fucus, Volvox, Vaucheria, Chara</i>

TOPIC-02 ছত্রাক

০১. ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য:

- ছত্রাক ফ্রোফিলবিহীন, অসবুজ, সালোকসংশ্লেষণের অক্ষম অপুষ্ক উদ্ভিদ।
- ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন নির্মিত।
- ছত্রাকের সম্ভ্রিত খাদ্য প্রধানত গ্লাইকোজেন, কখনো কখনো কিছু পরিমাণ ভলিউটিন, তৈলবিন্দু ও চর্বি থাকতে পারে।
- তীব্র অভিযোজন ক্ষমতা (কতক ৫° সে. নিম্নতাপমাত্রায় এবং কতক ৫০° সে.-এর তাপমাত্রায় জন্মতে পারে)।
- উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে শাখায় ছত্রাক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে মাইকোলজি (Mycology)।

০২. ছত্রাকের দৈহিক গঠন:

- ছত্রাকের দেহ সূত্রাকার, শাখাযুক্ত এবং আণুবীক্ষণিক এই সূত্রাকার শাখাকে হাইফা বলে।
- ছত্রাকের যে দৈহিক অংশ যা অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট সূত্রাকার হাইফি দ্বারা গঠিত তাকে মাইসেলিয়াম বলে।
- পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে হস্টোরিয়াম (Phytophthora) বলে।
- পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে রাইজয়েড (Rhizopus stolonifer) বলে।
- কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর ছত্রাকে মাইসেলিয়াম শক্ত রশির মত গঠন সৃষ্টি করে যাকে রাইজোমর্ফ (Agaricus) বলে।
- উদ্ভিদের সন্মূল বা মূলরোমের চারদিকে বা অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট ছত্রাক জালের মতো বেঁটন করে রাখে, এদেরকে মাইকোরাইজাল (Saprolegnia sp) ছত্রাক বলে।
- উদ্ভিদ মূল ও ছত্রাকের মধ্যকার এই এসোসিয়েশনকে বলা হয় মাইকোরাইজা (Mycorrhiza, Mycorrhizae)।
- বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রাচীরবিহীন মাইসেলিয়ামকে সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম (Rhizopus, Penicillium, Agaricus, Mucor, Saprolegnia) বলে এবং গ্রন্থ প্রাচীরযুক্ত মাইসেলিয়ামকে সেক্টেট মাইসেলিয়াম বলে।

02. লাইকেনের গুরুত্ব: মহাকোজ বা Reindeer মস বনগা হরিণসহ অন্যদের

- হুন্সা অঞ্চলের ফুটকোজ বা *Remora* খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটপতঙ্গের লার্ভার খাদ্য হিসেবেও (Calcaria, Lichenora) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
- জলাতঙ্কের ঔষধ হিসেবে *Peltigera* এবং ছপিং কফের নির্যাকের *Cladonia*, যক্ষ্মার ঔষুধ হিসেবে *Cetraria islandica* নামক *Cladonia* ব্যবহৃত হয়। এনজাইনা নামক মারাত্মক হৃদরোগে *Rocella mont* থেকে উৎপন্ন ইরিথ্রিন ব্যবহৃত হয়।
- মরুজ ক্রমাগমনে, পাথর থেকে মাটি তৈরি, নাইট্রোজেন সংরক্ষণে, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং পরিবেশ ও বায়ু দূষণের সূচক লাইকেন ব্যবহৃত হয়।
- *Usnea*, *Cladonia* ইত্যাদি লাইকেনের কোনো কোনো প্রজাতি আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে এবং বিভিন্ন লাইকেন দাবানল ছড়িয়ে সহায়তা করে। আইসল্যান্ড মস (*Cetraria islandica*). স্টোন (Endocarpon minutum), রক ফ্লাওয়ার (*Paramelia sp.*) ব্রেনটিল (*Cladonia rangiferina*) ইত্যাদি কতিপয় লাইকেনের নাম।

	নাম	বাসস্থান/বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
বাসস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ	কটিকোলাস	বাকল বা কাড	<i>Graphis, Parmelia</i>
	টেরিকোলাস	উষ্ণ ও অর্দ্র অঞ্চলের মাটি	<i>Collema tenax, Cora pavonia</i>
	স্যান্থ্রিকোলাস	পাথর বা শিলা খণ্ড	<i>Coloplecta, Xanthoria</i>
	লিগনিকোলাস	ডেজা কাঠ	<i>Calicicum, Piptoporus</i>
	ওমনিকোলাস	বিভিন্ন মাধ্যমে	<i>Lecanora dispersa</i>
	ফোলিকোলাস	ফার্ম বা সম্পৃক্ত উদ্ভিদের পাতায়	<i>Porina epiphylla</i>
বাহ্যিক গঠন অনুযায়ী (বিজ্ঞানী হব্রওয়ার্থ এবং হিলের মতে লাইকেন পাচ প্রকার)	লেথ্রোজ	হাইফি একটি অথবা একগুচ্ছ কোষকে আবৃত করে রাখে	<i>Lapraria incana</i>
	ক্রাসটোজ	চ্যাপ্টা এবং পোষক বস্তুর সাথে লেগে থাকে	<i>Strigula, Graphis, Lecanora, Cryptothecia, Diploicia.</i>
	ফোলিয়োজ	রাইজয়েড তুল্য রাইজাইন বের হয়	<i>Parmelia, Xanthoria, Peltigera, Flavoparmelia, Parmotrema.</i>
	ফ্রুটিকোজ	এ ধরণের লাইকেন বুলে থাকে	<i>Cladonia, Usnea, Letharia</i>
	সূত্রাকার	সামান্য কয়েকটি হাইফি দ্বারা আবৃত থাকে	<i>Ephebe, Racodium</i>
ছত্রাক সদস্যের ভিত্তিতে দুই প্রকার	• অ্যাসকোলাইকেন- লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে অ্যাসকোলাইকেন বলে। • ব্যাসিডিওলাইকেন- লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক ব্যাসিডিয়োমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে ব্যাসিডিয়োলাইকেন বলে।		

- ৩ সম্পূর্ণ ভাসমান শৈবালকে ফাইটোপ্রাষ্টন বলে।
- ৪ জলাশয়ে পানির নিচে আবদ্ধ শৈবালকে বেনথিক শৈবাল বলে।
- ৫ পাথরের গায়ে জন্মানো শৈবালকে লিথোফাইট বলে।
- ৬ *Ulothrix* একটি হেটেরোথ্যালিক (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ আলাদা) শৈবাল।
- ৭ ছত্রাক সম্বন্ধে স্টাডি করাকে বলা হয় মাইকেলজি বা ছত্রাকতত্ত্ব।
- ৮ ছত্রাকের অযৌন জননের প্রধান প্রক্রিয়া হলো স্পোর উৎপাদন প্রক্রিয়া।
- ৯ ছত্রাকের জননাস্থকে গ্যামিট্যাঞ্জিয়াম (বহুবচনে- গ্যামিট্যাঞ্জিয়া) বলা হয়।
- ১০ পুংগ্যামিট্যাঞ্জিয়ামকে অ্যানথেরিডিয়াম এবং স্ত্রী গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামকে উওগোনিয়াম বলা হয়।
- ১১ ছত্রাকের যৌন জননে প্রাথমিক ভাবে দু'টি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজমের মিলন ঘটে থাকে।
- ১২ ঘটে থাকে বলা হয় প্লাজমোগ্যামি এবং পরে নিউক্লিয়াস দু'টির মিলন ঘটে থাকে।
- ১৩ বলা হয় ক্যারিওগ্যামি। ক্যারিওগ্যামির মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি হয়।
- ১৪ অ্যাসকোমাইকোট বা স্যাক ফানজাই- তে অ্যাসকাস নামক নলের ভেতরে ৪ টি অ্যাসকোস্পোর তৈরি হয়।
- ১৫ ব্যাসিডিওমাইকোট বা ক্লাব ফানজাই-তে ব্যাসিডিওকার্প-এ সৃষ্ট ব্যাসিডিয়াম মাথায় ব্যাসিডিওস্পোর উৎপন্ন হয়।
- ১৬ মাশরুম নামে পরিচিত *Agaricus* ছত্রাক পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ১৭ মৃত্তিকাবাসী ছত্রাক থেকে সাইক্লোস্পোরিন ঔষধ তৈরি হয় যা মানুষের যে যে অঙ্গ দ্বীপ্প্রান্ত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ১৮ ছত্রাক পরিবেশ থেকে বিষাক্ত দূষক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করে পরিবেশকে বিষাক্ত পদার্থ থেকে দূষণমুক্ত করে।
- ১৯ যক্ষ্মার মতো ফুসফুসের *Coccidiomycosis* নামক রোগ হয়-এক প্রকার সাইক্লোস্পোরিন ফাংগাস দিয়ে।
- ২০ মাইসেলিয়াম থেকে ছাতার ন্যায় বায়বীয় অংশ সৃষ্টিকে ফ্রুটিফিকেশন বলা হয়।
- ২১ মাশরুমের কিছু প্রজাতি (*Agaricus xanthodermus*) বেশ বিষাক্ত।
- ২২ দাদ রোগ একটি ছোঁয়াচে চর্ম রোগ।
- ২৩ দাদ ছত্রাকঘটিত রোগ। উদ্ভিদ পরজীবী দ্বারা হয় বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে একে *tinea* বলে।
- ২৪ লাইকেন-এ যেহেতু ছত্রাক ও শৈবাল উভয়ই লাভবান হয় সেহেতু এদের মধ্যকার সমবায়েসিস প্রক্রিয়াটি হলো *mutualistic*।
- ২৫ লাইকেনের জনন: লাইকেন অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।
- ২৬ থ্যালাসের খডায়ন প্রক্রিয়ায় লাইকেনের অঙ্গজ জনন ঘটে থাকে।
- ২৭ *Rhodophyta* তে *Phycocyanine* ও *Phycocerythrin* থাকে।
- ২৮ পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণকারী শৈবালকে হস্টোরিয়াম বলে।
- ২৯ প্রথম আবিষ্কৃত পেনিসিলিন তৈরি করা হয় *Penicillium notatum* হতে।
- ৩০ বাণিজ্যিকভাবে পেনিসিলিন আবিষ্কার হয় *Penicillium chrysogenum* হতে।
- ৩১ অগ্নি শৈবালের আলোকশক্তি নির্গতকারী পদার্থ *luciferin*।
- ৩২ অগ্নি শৈবাল নামে পরিচিত পাইরোফাইট।

১. শৈবালে ফটোসিনথেসিস হয় পৃথিবীর ৬০ ভাগ।
২. এককোষী সচল শৈবাল *Chlamydomonas*।
৩. ভারতীয় জাতীয় শৈবাল *Navicula*।
৪. ভিটামিন সমৃদ্ধ শৈবাল হলো *Chlorella*।
৫. মাছের ফুলকাতে রোগ সৃষ্টি করতে পারে *Oedogonium*।
৬. ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন ও তৈল বিন্দু।
৭. ছত্রাককোষ বা হাইফাতে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকলে তাকে বলে মিনোসাইট।
৮. চিনিক্রে আলকোহলে রূপান্তরিত করে স্যাকারোমাইসেস (ইস্ট)।
৯. মশকুমের বৃদ্ধাকার অবস্থায় অবস্থানকে বলা হয় পরীচক্র।
১০. একটি ব্যানিডিয়ামে ব্যানিডিয়োস্পোর থাকে ৪টি।
১১. অল্প বিলম্বিত ক্ষমা রোগ সৃষ্টিকারী জীব হলো *Phytophthora*।
১২. অল্প অল্প রাইট রোগ সৃষ্টিকারী জীব হলো *Alternaria solani*।
১৩. বোর্নি মিশ্রণে থাকে কপার সালফেট, লাইম, পানি।
১৪. নন রোগের সৃষ্টিকারী ৩-৫ দিন।
১৫. লাইকেন এর শৈবাল অংশকে বলা হয় ক্রোমোডোরি।
১৬. কেলিড্রেজ লাইকেনের নিম্নতম রাইজওয়েড সদস্য প্রবর্তন করে হয়, তাকে বলে রাইজাইন।
১৭. সবচেয়ে সরল প্রকৃতির লাইকেন হলো লেপ্টোজ লাইকেন।
১৮. লাইকেন অব্যবহৃত জনন করে থাকে সোত্রোভিয়ার মাধ্যমে।
১৯. 'রেন্ডিয়ার মস' নামে পরিচিত লাইকেন *Cladonia rangiferina*।
২০. জলাতন রোগ ব্যবহৃত হয় *Peltigera*।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

১১. নিচের কোনটিতে এককোষী এবং হেটেরোসিস্ট পাওয়া যায়? [DU-24-21]

A. *Escherichia* B. *Nostoc* C. *Zygnema* D. *Chlorella*

[SOW] কতক শৈবালে কোষের পুরো প্রোটোপ্লাস্ট খাদ্য সংরক্ষণ করে এবং পুষ্টি প্রক্রিয়া বেষ্টিত হয়, তখন তাকে অ্যাকাইনিটি বলে। অনুকূল পরিবেশে অ্যাকাইনিটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন শৈবালে পরিণত হয়, যেমন- *Nostoc*, *Phytophthora*, *Gloeotrichia*, *Revularia* প্রভৃতি।
১২. নিচের কোনটিতে হরমোগোনিয়া থাকে? [DU-18-19]

A. *Sargassum* B. *Ocellularia* C. *Volvox* D. *Zygnema* **[B]**
১৩. কোন উদ্ভিদে প্রোটোপ্লাস্টে পাইরিনথ্রেড থাকে? [DU-08-09; RU-10-11; Set-1-24-21]

A. *Nostoc* B. *Ulothrix* C. *Nymphaea* D. *Cycas*

[SOW] *Ulothrix* এর প্রোটোপ্লাস্টে এক বা একাধিক পাইরিনথ্রেড আছে। পাইরিনথ্রেড হলো প্রোটিনজাতীয় পদার্থের চকচকে দানা। বার চারদিকে অনেক স্তর সর্চ থাকে।
১৪. শৈবালের সিলিকামের কোষ প্রাচীরকে কি বলে? [JU-D, Set-2-2022-23]

A. সিলিকাম B. ক্লিউল C. ক্যারাইন D. পাইরিনথ্রেড

[SOW] একটি পূর্ণ ভরার সিলিকামের কোষ প্রাচীরকে ক্লিউল বলে।
১৫. শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য নয়- [JU-D, Set-2-2022-23]

A. প্যারামাইসন B. ম্যানিটল C. ল্যামিনারিন D. ভলিউটিন **[D]**
১৬. *Pandorina* এর বৈশিষ্ট্য কোনটি? [JU-D, Set-F-2022-23]

A. সচল এককোষী B. নিশ্চল এককোষী C. সচল কলোনিয়াল D. বহুকোষী কলোনিয়াল **[C]**
১৭. নিচের এককোষী শৈবাল কোনটি? [JU, Unit-D, Set-D-18-19, 16-17]

A. *Volvox* B. *Spirogyra* C. *Chlorella* D. *Chaetophora* **[C]**
১৮. জলজীবী এককোষী শৈবাল কোনটি? [JU-D, Set-A-17-18]

A. *Chlamydomonas* B. *Chaetophora* C. *Chlorella* D. *Vaucheria* **[C]**
১৯. নিচের কোন শৈবাল থেকে এগার এগার পাওয়া যায়? [CU-A, Shift-2-20-21]

A. সবুজ শৈবাল B. অগ্নি শৈবাল C. বাদামী শৈবাল D. গুহিত শৈবাল **[D]**
২০. কোনটি এককোষী সচল শৈবালের উদাহরণ? [JU-18-19, 15-16]

A. *Chlorococcus* B. *Chlorolla* C. *Euglena* D. *Gloeocapsa* **[C]**

১১. "Pyrophyta" শ্রেণির শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য কোনটি? [BANKRUPT: Unit-24-20]

A. ক্রাইসোলামিনারিন B. প্যারামাইসন C. ম্যানিটল D. ক্যারাইন **[B]**
১২. কোন শৈবাল থেকে কলোনিয়াল শৈবাল সৃষ্টি হয়? [MAT-20-24]

A. *Sargassum* B. *Gracilaria* C. *Phytophthora* D. *Spirulina*

[SOW] ন্যানোক্লিউস্টার উপদান শৈবালের কলোনিয়াল *Phytophthora* শৈবাল দিয়ে তৈরি, এ ক্লিউস্টার দ্বারা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে সুরক্ষা পায়। এই ন্যানোক্লিউস্টারটি একটি সেলুলোজ ক্লিউস্টার, সেখানে একটি সাল ক্যাপসুলের মতো এবং এর চারদিকে সুরক্ষা (ছত্র) ১৭ ন্যানোক্লিউস্টার পানিবাহিত রোগজীবাণুসমূহের আকার সাধারণত ৩০-১০০ ন্যানোক্লিউস্টার হয়, তাই পানিতে থাকা সবধরনের রোগজীবাণু এই চারদিকে আটকা পড়ে যায়।
১৩. আণ্ডি আকৃতির ক্রোমোপ্লাস্ট পাওয়া যায় নিচের কোনটিতে? [R. S. ২০২১]

A. *Spirogyra* B. *Oedogonium* C. *Volvox* D. *Ulothrix* **[D]**
১৪. *Chlamydomonas* এর ক্রোমোপ্লাস্ট কোন ধরনের? [R. S. ২০২১]

A. জালিকার B. সর্পিলাকার C. পেরালা আকৃতির D. তারকাকার **[C]**
১৫. মানুষের দান রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের নাম- [DU-17-18, JU-15-16]

A. *Trichophyton rubrum* B. *Agaricus xanthodermus* C. *Phytophthora infestans* D. *Claviceps purpurea* **[A]**
১৬. কোন জীব চিনিক্রে মস রূপান্তরিত করে? [DU-10-13]

A. *Spirogyra* B. *Saccharomyces* C. *Euglena* D. *Penicillium* **[B]**
১৭. বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ও প্রু প্রাচীরবিশিষ্ট হাইফাকে কি বলে? [JU-D, Set-A-20-21]

A. অ্যাসোস্টেট হাইফেলিয়ার B. হস্টেলিয়ার C. সিনোসাইটিক হাইফেলিয়ার D. সোস্টেট হাইফেলিয়ার

[SOW] বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট প্রু প্রাচীরবিশিষ্ট হাইফেলিয়ারকে সিনোসাইটিক হাইফেলিয়ার (*Mucor*, *Saprolegnia*) বলে এবং প্রু প্রাচীরবিশিষ্ট হাইফেলিয়ারকে সোস্টেট হাইফেলিয়ার বলে।
১৮. অল্প ক্যাল রোগ সৃষ্টি করে কোনটি? [CU-A, Shift-2-20-21]

A. *Xanthomonas* B. *Streptomyces* C. *Escherichia coli* D. *Clostridium botulinum* **[B]**
১৯. বেকারি ইস্ট কোনটিকে বলা হয়? [CU-A, Shift-1-20-21]

A. *Saccharomyces cerevisiae* B. *Aspergillus flavus* C. *Agaricus bisporus* D. *Penicillium notatum*

[SOW] বেকারি ইস্ট বেকারি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। আসসায়ে বেকারি ইস্ট বলে। সাধারণত ইস্টজলা গাছের ব্যবহৃত হয়।
২০. কোন ছত্রাক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়? [MAT-22-23]

A. *Mucor pusillus* B. *Aspergillus flavus* C. *Agaricus campestris* D. *Saccharomyces* **[C]**
২১. ছত্রাক কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান কোনটি? [MAT-2021-22, 19-20]

A. Chitin B. Cellulose C. Strach D. Glycogen

[SOW] ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন নামক এক প্রকার জটিল পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত। যা মূলত গ্লুকোসামিনের পলিমার। এটি পতঙ্গ, কাকড়া, ও সোবোল এর গঠনিক পলিস্যাকারাইড। কাইটিন পৃথিবীতে প্রু পরিমাণে থাকা প্রু প্রাচীরের একটি।
২২. কোনটি রেন্ডিয়ার মস নামে পরিচিত? [DU-17-18]

A. *Endocarpon minutum* B. *Cladonia rangiferina* C. *Xanthoria* sp. D. *Peltigera* sp. **[B]**
২৩. জলজীবী লাইকেন নয়- [JU-D, Set-N-2022-23]

A. *Graphis scripta* B. *Parmotrema tinctorum* C. *Cryptothecia rubrocincta* D. *Diploicia canescens* **[B]**
২৪. রেন্ডিয়ার মস নামে পরিচিত- [JU-D, Set-R-2022-23]

A. *Centratia Islandica* B. *Endocarpon minutum* C. *Letharia vulpina* D. *Cladonia rangiferina* **[D]**

(1994) 1994

- A. জুয়েলার
B. আফ্রিকান
C. ইন্দোনেশিয়ান
D. অস্ট্রেলিয়ান

PRIME TEST

01. শাখাজে শাখা জন্মায় যে শৈবাল তাকে কী বলে?
(A) ডায়োসামাইট (B) মিথোসামাইট (C) ক্রিসিসাইট (D) জোয়েসামাইট
02. কোন শৈবালটির অনেকগুলো কোষ একসাথে কলোনি হিসেবে অবস্থান করে?
(A) *Fulva* (B) *Sargassum* (C) *Ulva* (D) *Chara*
03. *Chara* কোন ধরনের শৈবাল?
(A) সরসিফাইট (B) সমাধাসমী (C) হেটেরোট্রফিক (D) অসীমকৃতক
04. মিথোসামাইটিন এর সর্ব বীজপত্র?
(A) বাসমি (B) আল (C) হুসুম বাসমি (D) মিল
05. *Pyrrophysa* শৈবালে নিচের কোন পদার্থটি থাকে?
(A) Paramylon (B) Luciferin (C) Paramylon (D) Agar
06. নিচের কোনটির মাধ্যমে শৈবালের অঙ্গক জনন সম্পন্ন হয়?
(A) কোষের বিভাজন (B) পত্রায়ন (C) মর্জি (D) সমভাগে
07. কোন যৌন জনন পদ্ধতিটি উদ্ভূত প্রকৃতিয়?
(A) উগারি (B) অসিসোপ্যামি (C) অ্যানিসোপ্যামি (D) হেটেরোসোপ্যামি
08. এককোষীয় জুস্বেপের সৃষ্টি হলে কোষের সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাস্ট কোষটিকে ছাপাঙ্কিত হয়।
(A) হোডফাইট (B) জুস্বেপার (C) স্পোরোজিয়া (D) হিশমোস্পোর
09. সৃষ্টি শাখাটি মিলনের মাধ্যমে যে ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি করে তা কতটি হ্রাসকলাপক?
(A) ১ টি (B) ২ টি (C) ৩ টি (D) ৪ টি
10. কোনটি ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য নয়?
(A) জননক বহুকোষী (B) সুকোষিক (C) ট্রোসোফিসমিটিন (D) অসমুজ
11. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জীব হিসেবে কোনটিকে গণ্য করা হয়?
(A) ভিট্রি (B) হু জরাক (C) সাইকাস (D) হরি
12. উচ্চোপরি ছত্রাক শক্ত কঠিন ছত্রাক পটন সৃষ্টকারী মাইসেলিয়ামের বলে-
(A) ব্যাসিডিওম্যান্থ (B) হস্টেরিয়াম (C) মাইকোমর্ফ (D) মাইকোড
13. স্পোরোজিয়ারের কোষের উৎপন্ন হয়-
(A) সচল জুস্বেপার (B) সচল অ্যান্ড্রোসোপ্যামি
(C) কনিডিয়া (D) শ্যাণ্ডি
14. একজোড়া বিপরীত যৌনকর নিউক্লিয়ারবিশিষ্ট কোষের বলে-
(A) ডিমিকারিওট (B) ডিপ্লয়েড সেল (C) উকারিওট (D) হেটেরোসোমাস
15. ফ্রেমিং কোন ছত্রাক থেকে Penicillin আবিষ্কার করেন?
(A) *P. notatum* (B) *P. chrysogenum*
(C) *P. campestri* (D) কোনটিই নয়
16. কোনটির মাধ্যমে প্রাথমিক মাইসেলিয়াম থেকে যৌন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন হয়?
(A) ক্রিসিসোপ্যামি (B) প্রাক্সোসোপ্যামি (C) সোমোটোসোপ্যামি (D) রেটোসোপ্যামি
17. *Agaricus* এর বায়বীয় অংশকে কী বলে?
(A) গাইলিয়াম (B) মাইসেলিয়াম
(C) ব্যাসিডিওকার্প (D) গ্যামিমা
18. কোন মাশরুম প্রজাতিটি বেশ বিবাজ?
(A) *A. bisporus* (B) *A. bisporus*
(C) *A. xanthodermus* (D) *A. bisporus*
19. শৈবাল ও ছত্রাক সম্পূর্ণ শৃঙ্খল ধরনের যে উদ্ভিদ সৃষ্টি করে তাকে বলে-
(A) সাইকাস (B) লাইকেন (C) মস (D) ফার্ন
20. কোন লাইকেনটি রেইনডারের মস নামে পরিচিত?
(A) *C. rangiferina* (B) *A. bisporus*
(C) *R. fluitans* (D) সবগুলো

Answer Analysis

01.B	02.A	03.A	04.A	05.B	06.D	07.A	08.B	09.D	10.A
11.B	12.C	13.A	14.A	15.A	16.C	17.C	18.C	19.B	20.A

०६

ગ્રાહ્યકાર્થો ૩ (હેન્ટિલકાર્થો)

1990

नाम	RATINGS		
	***	**	*
रिचिया	रिचिया		-
प्रीत	प्रीत		-

TOPIC-01

ब्राह्मण इति

अथ, अन्तर्गतसंज्ञितं प्रमाणम्।

- বহুকেলী, বহুশুলক ও অসীমী উদ্ভিদ।
- এদের প্রায় প্যামিটোফাইট (বহুতল ও বহুকেলী উদ্ভিদ) তথা হায়ড্রয়েড।
- প্রায় হায়ড্রয়েড অর্থাৎ এহাকে পতিভার মূল, কাণ্ড ও পাতার বিভক্ত করা যায়, তবে মূল জাতীয় উদ্ভিদকে 'নরম কাণ্ড ও পাতার' মতো অংশে বিভক্ত করা যায়।
- মূল যেই, তবে মূলের পরিবর্তে এককেলী রাইজয়েড (মসূন ও অমসূন) কে কোনো কোনো প্রজাতিতে বহুকেলী ভেদে থাকে।
- প্রায় কোনো আকুলার টিস্যু নেই। প্রায় প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে পতিভার।
- প্রায় প্রায় উপ্যায়ান (কতু সিস্পল ও প্যামিটোর সাথে 'কুদ্র' ও পুণ্যপ্যামিটোর সিস্পল)।
- উপশল স্পোর একই আকার আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ হোমোম্পোরাল।
- প্রায়বর্তক প্যামিটোফাইট প্রধান এবং স্পোরোফাইট শৌণ।
- এদের জাইগোট থেকে রাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে জন সৃষ্টি হয়।
- প্রায়বর্তক অঙ্গ আকৃতির অনুপ্রবেশ বিদ্যমান।
- প্রায়বর্তক মূলবাসী হলেও পানির মাধ্যমে এদের অনেক দূরত্ব দ্বারা সম্প্রদর্শ হয় এবং এদের উভয় উদ্ভিদ বলা হয়। *Ricciocarpus natans*, *Riella* spp, *Riccia fluitans* ইত্যাদি প্রজাতি সম্প্রদর্শ প্রজাতি।

02. *Marchia* (Liver wort) मन्थन (विष) उपायः

- পরিবেশ দূষণের দূরক হিসেবে কাজ করে/ঘাটিতে জৈব পদার্থ সংযোগ দূষিকা রূপে *Nitrate*।
- খাদ্যশস্যে দ্বারা শাখাযুক্ত এবং মধ্য শিরাবিশিষ্ট।
- *Nitrate* খ্যানিট্রোজেনিক উদ্ভিদ।
- *Nitrate* খাদ্যশস্য একত্রে সোলাপের পাশড়ির মতো পোলাকার চক্রে জড়ান করে একে "গ্রেজেষ্ট" বলে।
- খাদ্যশস্যের উপরের পৃষ্ঠে বহুপাক্ষিকভাবে মধ্যশিরা আছে এবং শিরা বরাবর পাঁজ আছে।
- খাদ্যশস্যের প্রতিটি শাখার শীর্ষে একটি পাঁজ আছে, একে অগ্রস্থ পাঁজ বলে।
- খাদ্যশস্যের নিচের পৃষ্ঠ থেকে বহুদৈর্ঘ্যী স্কেল এবং একদৈর্ঘ্যী রাইজয়েড মুঠি হয়।
- বর্ষাকালে অধিক জন্মায়।

TOPIC-02

টেরিডোকাইটা

৩১. সেবিভোক্তা হিসাব বৈশিষ্ট্য:

- স্পোরোফাইট উদ্ভিদ (ডিপ্রয়েড)।
- অসুস্পক ও অবীজী উদ্ভিদ।
- সেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়।
- প্যামিডোফাইট পর্যায়কে প্রোথ্যালান্স বলে, যা থ্যালান্স প্রকৃতির।
- ভাস্কুলার টিস্যু আছে, জল সৃষ্টি হয়, অস্থানিক মূল বিদ্যমান।
- ব্রীজপ্যামিট সচল এবং আর্কিগোনিয়ামে উৎপন্ন হয়।
- জননায় বহুকোষী এবং জননাক্ষের চারদিকে বস্তুাকোষের বেষ্টনী থাকে।
- জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জসুকম (হিটারোমরফিক) আছে।
- অবিক্রাণে সালসো কাণ্ড রাইজোমে রূপান্তরিত হয়।
- ব্রী জননায় আর্কিগোনিয়াম (ফ্রস্কের মতো) এবং পুং জননায় অ্যোহেগিউরিয়া (মোশপতি, শোলাকার, ডিম্বাকার বা বেলনাকার)।

02. *Pteris* (সানফার্ন) সম্পর্কিত তথ্য:

- দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
- কাণ্ড রাইজোমের রূপান্তরিত হয়।
- রাইজোম র‍্যামেন্টাম নিয়ে আচ্ছাদিত থাকে।
- পাতা যৌগিক, কচি অবস্থায় কুণ্ডলিত থাকে।
- স্পোর একই রকম (হোমোস্পোরাস)।
- প্রোথ্যালাস সবুজ, হৃৎপিণ্ডাকার এবং সহবাসী।
- ফার্নের পাতাকে ফ্রন্ড বলে।
- কচি অবস্থায় পাতা কুণ্ডলিত থাকে। এই অবস্থাকে সারসিনেট ভার্নেশন বলে।
- ভাস্কুলার বাউল হ্যাড্রোসেন্ট্রিক।
- কুণ্ডলিত কচিপাতাকে ক্রোজিয়ার বলে।
- প্রতিটি পত্রকখণ্ডকে পিনা বলে, পাতায় র‍্যাকিস থাকে।

Must to Know:

- জলজ ফার্ন- *Azolla*, *Salvinia*
- ক্ষুদ্রতম ফার্ন- *Anogramma*
- হর্সটেইল- *Equisetum*
- এপিফাইট- *Selaginella oregana*

03. সোরাস:

- পাতার নিম্ন প্রান্তে স্পোরোজিয়াম গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।
- স্পোরোজিয়াম যে টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয় তাকে অমরা বলে।
- সোরাস উৎপাদনকারী পাতাকে স্পোরোফিল বলে।
- পিনা বাঁকা হয়ে Sorous কে ঢেকে রাখে একে False indusium/ অপ্রকৃত ইন্ডুসিয়াম বলে।

04. অ্যান্‌ড্রোজিটাম:

- প্রোথ্যালাসের নিচের দিকে থাকে।
- 32 বা 20-50টি শুক্রাণু মাতৃকোষ বা Androcytes থাকে।
- শুক্রাণু মাতৃকোষ রূপান্তরিত হয়ে বহুক্ষয়াজেলা যুক্ত শুক্রাণু (Antherozoid) গঠন করে।
- বলয়কোষ ও ঢাকনি কোষ দ্বারা গঠিত।

05. আর্কিগোনিয়াম:

- প্রোথ্যালাসের Apical notch এর কাছে থাকে
- গ্রীবা ও উদর (Venter) সহযোগে গঠিত
- ডিম্বাণু তৈরি হয়
- আর্কিগোনিয়াম থেকে ম্যালিক এসিড নিঃসৃত হয়, ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শৈবাল ও ছত্রাক হলো লোয়ার ক্রিস্টোগ্যামাস এবং ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদ হলো হায়ার ক্রিস্টোগ্যামাস।
- *Hepaticae* শ্রেণির সদস্যদেরকে লিভার ওয়ার্ট বলে।
- সফরী অঞ্চল: এ অঞ্চলটি কয়েক সারি বর্ণহীন প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং সাধারণত আন্তঃকোষীয় ফাঁক বিবর্তিত।
- *Riccia*-র পুংজননাসকে অ্যান্‌ড্রোজিটাম এবং স্ত্রীজননাসকে আর্কিগোনিয়াম বলে।
- পরিবেশ দূষণের সূচক হিসেবে কাজ করে *Riccia*।
- রোদে জন্মাতে পছন্দ করে বলে *Pteris* উদ্ভিদ সানফার্ন নামে পরিচিত
- ফার্ন এর পাতাকে ফ্রন্ড বলে।
- কুণ্ডলিতে কচি পাতাকে ক্রোজিয়ার বলে।
- ফার্ন এর শব্দপত্রকে র‍্যামেন্টাম বলে।
- ব্রায়োফাইটারদের প্রধান দশা গ্যামেটোফাইটিক।
- ব্রায়োফাইটার যৌন জনন- উগ্যামি প্রকৃতির।
- উচ্চর উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত- ব্রায়োফাইটা।
- প্রোটোনেমা পাওয়া যায়- মস উদ্ভিদে।
- আর্কিগোনিয়াম দেখতে ফ্রাক্সের মতো।
- অ্যান্‌ড্রোজিটামের আকৃতি নাসপাতির মতো।
- *Riccia*-র বায়ু প্রকোষ্ঠ থাকে- আন্তীকরণ অঞ্চলে।
- ভাস্কুলার ক্রিস্টোগ্যামাস বলা হয় Pteridophyta কে।

- অপুঙ্ক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত টেরিডোফাইটা।
- সোরাস উৎপাদনকারী পাতাকে বলে- স্পোরোফিল (Sporophyll)।
- ফার্নের যৌন জননের সময় শুক্রাণুকে আকৃষ্ট করার জন্য আর্কিগোনিয়াম থেকে নিঃসৃত হয় ম্যালিক এসিড।
- স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ জাইগোট।
- শাক হিসেবে খাওয়া হয় উদ্ভিদ *Pteris*।
- সমরেণু প্রসূ উদ্ভিদ- *Pteris*।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

[DU: 18-19]

01. যে ধরনের উদ্ভিদে পরিবহন তন্ত্র নেই? [DU: 18-19]
A. Bryophyta B. Pteridophyta
C. Gymnosperm D. Angiosperm
02. 'গিমা কাপ' যুক্ত ব্রায়োফাইট হল- [DU: 07-08; RU: 12-13, 12-13]
A. *Semibarbula* B. *Marchantia*
C. *Riccia* D. *Anthoceros*
03. শৈবাল ও ব্রায়োফাইটা কিভাবে বংশবৃদ্ধি করে? [JU-D, Set-N. 2021-22]
A. মুকুলোদগম B. দ্বিবিভাজন C. বাডিং D. স্বভায়ন
04. *Riccia fluitans* উদ্ভিদ জন্মে- [RU-C, Quartz-2: 22-23]
A. পুরাতন দেয়ালে B. গাছের উপরে C. মাটিতে D. জলাশয়ে
05. নিচের কোন উদ্ভিদে পরিবহনতন্ত্র নেই? [CU-A, Shift-2. 20-21]
A. ব্রায়োফাইটা B. টেরিডোফাইটা C. জিমোনোস্পার্ম D. এনজিওস্পার্ম
06. কোনটি পরিবেশ দূষণের সূচক হিসাবে কাজ করে? [MBSTU: Unit-B, 19-20; RU: 17-18]
A. *Riccia* B. *Agaricus* C. *Pteris* D. *Azolla*
07. মস (Bryophytes) এর স্ত্রী জননাসের নাম কি? [MAT: 19-20; KU: 15-16; CU: 13-14; HSTU: 12-13]
A. Gametangium B. Sporangium
C. Archegonium D. Antheridium
08. কোনটির পরিবহনতন্ত্র আছে কিন্তু ফুল হয় না? [DU: 19-20]
A. থ্যালোফাইটা B. ব্রায়োফাইটা C. টেরিডোফাইটা D. স্পার্মাটোফাইটা
09. টেরিডোফাইট উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [JU-D, Set-G. 20-21]
A. সুস্পষ্ট জনুক্রম অনুপস্থিত B. শোষণ প্রক্রিয়ায় পুষ্টি গ্রহণ করে
C. প্রোথ্যালাস বহুকোষী D. আর্কিগোনিয়াম গোলাকৃতির
10. ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের ভাস্কুলার বাউল কোন প্রকৃতির? [JU-D; Set: 10, 17-18]
A. সংযুক্ত B. লেন্টোসেন্ট্রিক C. হ্যাড্রোসেন্ট্রিক D. অরীয়
11. টেরিডোফাইটের জনুক্রমের প্রধান দশা- [JU: D, 15-16]
A. Haploid B. Tetraploid C. Diploid D. Triploid
12. *Riccia*-র বৈশিষ্ট্য কোনটি? [Ref: আজীবর স্যার]
A. দ্ব্যক্ষ শাখাযুক্ত থ্যালয়েড দেহ B. হৃৎপিণ্ডাকৃতির বিষমপৃষ্ঠ থ্যালাস
C. পাতায় উৎপন্ন সোরাসে রেণু উৎপন্ন হয় D. দেহে পরিবহন কলা উপস্থিত
13. কোনটি সানফার্ন? [Ref: আলীম স্যার]
A. *Riccia* B. *Equisetum* C. *Selaginella* D. *Pteris*

PRIME TEST

01. জ্ঞান উৎপাদনকারী উদ্ভিদসমূহ কী নামে পরিচিত?
 (A) Lower cryptogamous (B) Embryophyta
 (C) Thallophyta (D) Gymnosperm
02. নিম্নের কোনটি ব্রায়োফাইটের বৈশিষ্ট্য নয়?
 (A) জীবনচক্রে গ্যামিটোফাইট প্রধান
 (B) স্পোরোফাইট গৌণ
 (C) গ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল
 (D) স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের সাথে সর্বদা সংযুক্ত থাকে
03. নিচের কোনটি *Riccia* এর বৈশিষ্ট্য?
 (A) গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদ (B) দেহ থ্যালয়েড
 (C) থ্যালাস সবুজ, শায়িত ও দ্ব্যত্র শাখাবিশিষ্ট
 (D) সবগুলো
04. বাংলাদেশে কোন *Riccia* প্রজাতিটি শনাক্ত হয়েছে?
 (A) *R. bengalensis* (B) *R. dhakensis*
 (C) *R. chittagonensis* (D) সবগুলো
05. *Riccia* তে জনুক্রম-
 (A) অস্পষ্ট (B) হোমোমরফিক (C) হ্যাপ্রোবায়োটিক (D) হেটারোমরফিক
06. টেরিডোফাইটের কোন প্রজাতিটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?
 (A) *Dryopteris* (B) *Equisetum* (C) *Selaginella* (D) সবগুলো
07. সিলিকনের উৎস হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
 (A) *Lycopodium* (B) *Selaginella* (C) *Horsetail* (D) *Equisetum*
08. *Pteris* এর কুণ্ডলিত কচি পাতাকে কী বলে?
 (A) ক্রোজিয়ার (B) পিনা (C) সারসিনেট (D) গেমি
09. স্পোরোজিয়ামের গুচ্ছকে বলা হয়-
 (A) প্রাসেন্টা (B) সোরাস (C) ইডুসিয়াম (D) স্পোরোফিল
10. ফার্নের স্বপিত্তাকার সবুজ গ্যামিটোফাইটকে কী বলে?
 (A) থ্যালাস (B) প্রোথ্যালাস (C) টিউবার (D) গেমি
11. আর্কিগোনিয়াম কোন আকৃতির?
 (A) তারাকাকৃতি (B) গোলাকার (C) ফ্লাস্ক আকৃতির (D) অসম
12. ব্রায়োফাইটের জীবনচক্রে কোন জনুটি প্রকট দশা?
 (A) স্পোরোফাইটিক (B) গ্যামিটোফাইটিক (C) মিক্সোফাইটিক (D) থ্যালোফাইটিক
13. *Riccia* এর প্রধান দেহটি কেমন?
 (A) গ্যামিটোফাইটিক (B) স্পোরোফাইটিক (C) অশাখ (D) সূত্রাকার
14. লিভারওয়ার্ট (Liverwort) কোনটি?
 (A) *Riccia* (B) *Pteris* (C) *Agaricus* (D) *Ulothrix*
15. বাংলাদেশে ব্রায়োফাইটের কতটি গোত্র শনাক্ত করা হয়েছে?
 (A) ৩৪টি (B) ৩৩টি (C) ৩২টি (D) ৩৫টি
16. র্যামেন্টাম কোথায় পাওয়া যায়?
 (A) *Marchantia* (B) *Pteris* (C) *Equisetum* (D) *Sargassum*
17. টেরিসের পরিবহন কলাগুচ্ছ কোন ধরনের?
 (A) ক্রোমো কেন্দ্রিক (B) অরীয় (C) সংযুক্ত (D) জাইলেম কেন্দ্রিক
18. কোনটি ডিপ্লয়েড জীব?
 (A) *Riccia* (B) *Pteris* (C) *Ulothrix* (D) *Agaricus*
19. *Riccia* র শুক্রাণু আর্কিগোনিয়ামে কীভাবে পৌছায়?
 (A) শিশির বা বৃষ্টির পানিতে সাঁতার কেটে (B) বাতাসে ভেসে
 (C) কোন কিছু সাহায্য ছাড়াই (D) পতঙ্গের মাধ্যমে
20. নিচের কোনটি ব্রায়োফাইটের বৈশিষ্ট্য নয়?
 (A) যৌন জনন উগ্যামাস (B) দেহ স্পোরোফাইট
 (C) ভাস্কুলার টিস্যু নেই (D) জীবনচক্রে গ্যামিটোফাইট প্রধান

Answer Analysis

01.B	02.C	03.D	04.D	05.D	06.B	07.D	08.A	09.B	10.B
11.C	12.B	13.A	14.A	15.A	16.B	17.D	18.B	19.A	20.B

অধ্যায়
০৭

নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ

জীববিজ্ঞান
১ম পত্র

সাজেশনস	RATINGS		
	★★★	★★	★
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	সাইকাস	বৈশিষ্ট্য	-
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	-	-	বৈশিষ্ট্য
উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যাবলি	মূল, ফুল ও ফল, পুষ্পপত্র বিন্যাস	পুষ্পমঞ্জুরি	অমরাবিন্যাস
একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী	উদাহরণ	বৈশিষ্ট্য	-

TOPIC-01

নগ্নবীজী উদ্ভিদ

যেসব উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না বলে ফল উৎপন্ন হয় না এবং ইহা নগ্ন অবস্থায় জন্মে তাদেরকে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বলে।

- থিওফ্রাস্টাস এর Enquiry into plants গ্রন্থে সর্বপ্রথম Gymnosperm শব্দটি ব্যবহার করেন।
- পৃথিবীতে নগ্নবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাতশত।
- উদ্ভিদ স্পোরোফাইট এবং অসমরেনুপ্রসূ অর্থাৎ মাইক্রোস্পোর ও মেগাস্পোর তৈরি করে।
- নগ্নবীজী উদ্ভিদে যিনিষেক ঘটে না (ব্যতিক্রম: *Ephedra*-থেকে স্বসকটীয় গুহু ইফেড্রিন পাওয়া যায়), তাই শাঁস হ্যাপ্রয়েড এবং নিষেকের পূর্বে সৃষ্টি হয়।
- জাইলেম টিস্যুতে সত্যিকার ভেসেল কোষ থাকে না (ব্যতিক্রম: *Gnetum*) এবং ফ্লোয়েম টিস্যুতে সসীকোষ থাকে না।
- উদ্ভিদ দেহে ভাস্কুলার টিস্যু বিদ্যমান।
- জীবনচক্রে অসম (Heteromorphic) আকৃতির জনুক্রম বিদ্যমান।

➤ বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত নগ্নবীজী (৫ প্রকার) উদ্ভিদ:

- *Cycas pectinata* (চট্টগ্রামের বাড়িয়াডালা এলাকায় পাওয়া যায়)।
- *Podocarpus neriifolius* (বাঁশপাতা নামে পরিচিত)
- *Gnetum*- i. *G. montenum*, ii. *G. oblongum*, iii. *G. latifolium* (ফিশ পয়জন পাওয়া যায়)

➤ *Cycas* সম্পর্কিত তথ্যাবলি:

- *Cycas* কে পামফার্ন ও Living Fossil (জীবন্ত জীবাশ্ম) বলা হয়।
- *Cycas* উদ্ভিদ স্পোরোফাইটিক (দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত)
- পাতায় ট্রান্সফিউশন টিস্যু বিদ্যমান।
- পুংউদ্ভিদের মাইক্রোস্পোরোফিলগুলো একত্রিত হয়ে স্ট্রোবিলাস গঠন করে।
- *Cycas* এর শুক্রাণু সবচেয়ে বড়, লাটিমের মতো, সচল ও বহু ফ্লাজেল্লিফার।
- পাতা বৃহৎ, পক্ষল যৌগিক, কাণ্ডের মাথার দিকে সর্পিলাকারে সজ্জিত।
- কচি পাতার ভার্শন সারসিনেট (কুণ্ডলিত)।
- প্রাথমিক পর্যায়ে *Cycas* এর প্রধানমূল থাকে, *Cycas* এর মূলকে কেন্দ্রীয় মূল বা রুট টিউবারকুল (*Nostoc* এবং *Anabaena* দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে) বলে।
- *Cycas pectinata* উদ্ভিদের কচিপাতা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- *Cycas circinalis* এর স্কীতরুদ ও বীজ হতে এরাকট (বার্লি) প্রস্তুত করা হয়।
- *Cycas circinalis* এর কচিপাতা পাকস্থলীর পীড়া ও চর্মরোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- *Cycas revoluta* এর বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- স্বর্ণমণি হিসেবে *Cycas* বিক্রি করা হয়।
- কোনো কোনো প্রজাতির *Cycas* এর বীজ হতে সাণ্ড ও কাণ্ডের মজ্জা হতে মদ তৈরি করা হয়।

TOPIC-02

আবৃতবীজী উদ্ভিদ

➤ আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য:

- উদ্ভিদ স্পোরোফাইট (রেণুধর), পুষ্পক এবং ভাস্কুলার টিস্যু সমৃদ্ধ।
- গর্ভকেশর সাধারণত গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড এবং গর্ভমুন্ড-এ তিন অংশে বিভক্ত।

- ডাবল ফার্টিলাইজেশন অর্থাৎ দ্বিনিষেক ঘটে, তাই সস্য ট্রিপ্লয়েড।
- কোনো প্রকার আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় না।
- জাইলেম টিস্যুতে প্রকৃত ভেসেল কোষ এবং ফ্রেয়েম টিস্যুতে সঙ্গীকোষ থাকে।
- সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির আবৃতবীজী উদ্ভিদ হল *Wolffia arrhiza* (0.1 মি.মি.)
- আবৃতবীজী উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষ হল অস্ট্রেলীয় *Eucalyptus* প্রজাতি (৫০০ ফুট প্রায়)।

TOPIC-03

উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যাবলি

> ফুলের প্রকারভেদ:

ফুল		
প্রকারভেদ	উদাহরণ	
উভলিঙ্গ*	জবা, ধুতুরা	
সম্পূর্ণ	জবা, মটর, ধুতুরা	
অসম্পূর্ণ	লাউ, কুমড়া, রজনীগন্ধা	
সমাদ পুষ্প	ধুতুরা, জবা, বেগুন, সরিষা	
অসমাদ পুষ্প	শিম, মটরগুটি, অপরাজিতা, বক ফুল	
বহুপ্রতিসম	সরিষা, জবা, ধুতুরা	
অপ্রতিসম	অর্কিড, কলাবতী, সর্বজয়া	
এক প্রতিসম	শিম, অপরাজিতা	
সর্পিলাকার	শাপলা, স্বর্নচাপা	
গর্ভাশয়ের অবস্থান অনুযায়ী*		
প্রকারভেদ	পুষ্পাঙ্ক	উদাহরণ
গর্ভপাদ (Hypogynous)	উত্তল	সরিষা, জবা, ধান
গর্ভকটি (Perigynous)	অবতল	শিম, গোলাপ
গর্ভশীর্ষ (Epigynous)	পেয়ালাকৃতি	কুমড়া, পেয়ারা

> ফলের প্রকারভেদ:

ফল	
প্রকারভেদ	উদাহরণ
প্রকৃত	আম, জাম, লিচু, পেয়ারা
অপ্রকৃত*	চালতা, আপেল, ডুমুর, আনারস, কাঁঠাল
সরল	আম, শিম, মটর, ধান
ভচ্ছিত	স্বর্নচাপা, আতা, নয়নতারা
যৌগিক*	কাঁঠাল, বট, তুত, আনারস, ডুমুর
লিগিউম	শিম
ক্যাপসিউল	ধুতুরা, টেঁড়স, পাট, কার্পাস
কারিঅপসিস	ধান, গম, ভুট্টা
সিলিকুয়া*	সরিষা, মুলা
বেরি*	কাঁট বেরী: ক→কলা, ট→টমেটো
সাইজোকর্প	ধনে, গাজর, লজ্জাবতী
ছপ*	আম, কুল, আমড়া, নারিকেল
পেপো	শসা, কুমড়া
সরোসিস	আকাশ: আ→আনারস, কা→কাঁঠাল, শ→সরোসিস
হেসপেরিডিয়াম	লেবু, কমলা
নাট	বাদাম, সুপারি
পোম	আপেল, নাশপতি

> মূল সম্পর্কিত তথ্য:

- প্রধান মূল: দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। উদাহরণ: মুলা, গাজর, বীট।
- অস্থানিক মূল: কেয়া, বট, অশ্বখ, পাথরকুটি
- গুচ্ছ মূল: একবীজপত্রী উদ্ভিদ
- পরাশ্রয়ী মূল: অর্কিড

> পাতা সম্পর্কিত তথ্য:

- সম্পূর্ণ লিফ: জবা, আম, জাম, কাঁঠাল, ধান।
- কম্পাউন্ড লিফ: Mnemonic: গোলাপীর নীল আকাশ: গোলাপী→গোলাপ, র→রাধাচূড়া নী→নিম, নারিকেল, ল→লজ্জাবতী, কা→কামিনি, কৃষ্ণচূড়া, শ→সজিনা।

> পুষ্পপত্র বিন্যাস: মুকুলাবস্থায় বৃত্তাংশগুলো (অথবা পাপড়িগুলো) পরস্পরের সাথে কিভাবে বিন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয় এস্টিভেশন বা পুষ্পপত্রবিন্যাস।

ছন্দ	নাম	উদাহরণ*
ও	ওপেন বা মুক্ত	গন্ধরাজ, জবার উপবৃত্তি
ডাল,	ডালভেট বা প্রান্তস্পর্শী	আতা, আকন্দ, বাবলা, জবা ফুলের বৃত্তি
টু	টুইস্টেড বা পাকানো	জবা (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>) এর দলমণ্ডল, করবী
ই তো	ইমব্রিকেট	কৃষ্ণচূড়া (<i>Delonix regia</i>), বাদরলাঠি, কালকাসুন্দা (<i>Cassia sophera</i>)
ভেরি	ভেঞ্জিলারি	প্রজাপতিসম ফুল, মটরগুটি (<i>Pisum sativum</i>), শিম (<i>Lablab purpureus</i>), অপরাজিতা
কুইক	কুইনকানসিয়াল	পেয়ারা (<i>Psidium guajava</i>), সরিষা (<i>Brassica napus</i>)

> অমরাবিন্যাস বা প্রাসেটেশন:

গর্ভাশয়ের ভেতরে প্রাসেটের বিন্যাস পদ্ধতিতে বলা হয় প্রাসেটেশন বা অমরাবিন্যাস।

ছন্দ	নাম	উদাহরণ*
মর্জিনার	মার্জিনাল বা একপ্রান্তীয়	মটরগুটি (<i>Pisum sativum</i>), শিম (<i>Lablab purpureus</i>), অপরাজিতা
আপা	এ্যাপিকাল বা শীর্ষক	ধনিয়া (<i>Coriandrum sativum</i>), লালপাতা (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), ফ্রোন্টন
একশ	অ্যাক্সাইল বা অক্ষীয়	জবা, ধুতুরা, রজনীগন্ধা, টেঁড়স, বেগুন
সু	সুপারফিশিয়াল বা গাত্রীয়	শাপলা (<i>Nymphaea nouchali</i>), শালুক, পদ্ম (<i>Nelumbo nucifera</i>), শিয়াল কাটা
পুরী	প্যারাইটাল বা বহুপ্রান্তীয়	লাউ (<i>Lagenaria vulgaris</i>), শসা (<i>Cucumis sativus</i>), পেঁপে, কুমড়া, সরিষা
ফ্রিতে	ফ্রিসেন্দ্রাল বা মুক্তমধ্য	তুঁতে, নুনিয়া শাক, বনধনিয়া, ডায়াহুস
বৈচে	বেসাল বা মূলীয়	ত্রিধারা (<i>Tridax procumbens</i>), সূর্যমুখী (<i>Helianthus annuus</i>), ধান, গাঁদা

TOPIC-04

গোত্র পরিচিতি

> একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গোত্র:

আলোচ্য বিষয়	Poaceae (Graminae)- একবীজপত্রী	Malvaceae- দ্বিবীজপত্রী
মূল	গুচ্ছমূল	প্রধান মূলতন্ত্র
স্বরূপ	একবর্ষ, দ্বিবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীর্কণ্ড, গুল্ম বা কাঁঠল	বীর্কণ্ড, গুল্ম, বৃক্ষ
পাতা	সরল, একান্তর, লিগিউম বিশিষ্ট (ব্যতিক্রম- <i>Echinochloa</i>) সমান্তরাল শিরাবিন্যাসযুক্ত	সরল, জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, সবুজক
পুষ্পবিন্যাস	স্পাইকলেট	একক (সাইমোস)
অমরাবিন্যাস	মূলীয়	অক্ষীয়
ফল	কারিঅপসিস	ক্যাপসিউল, বেরি অথবা সাইজোকর্প
ফুল	ট্রাইমেরাস	পেন্টামেরাস
পরাগধানী	সর্বমুখ	একপ্রকোষ্ঠী ও বৃকাকার

আলোচ্য বিষয়	Poaceae (Graminae)- একবীজপত্রী	Malvaceae- দ্বিবীজপত্রী
গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ	<i>Bambusa bambos</i> (বঁশ) <i>Oryza sativa</i>* (ধান) <i>Saccharum officinarum</i> (আখ) <i>Triticum aestivum</i>* (গম) <i>Zea mays</i>* (ভুট্টা- কর্ণকোষ তৈরী) <i>Hordeum vulgare</i> (যব- হরলিঙ্গ তৈরী) <i>Cymbopogon citratus</i> (লেমন ঘাস- সুগন্ধী শিল্পে) <i>Phragmites karka</i> (শালিকগড়া) <i>Thysanolaema maxima</i> (কাউঘাস) <i>Cynodon dactylon</i>* (দুর্ঘাঘাস- রক্তপাত বন্ধ ও ক্ষত নিরাময়)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>* (জবা- রক্ত আমাশয় ও অর্ধরোগের ওষুধ) <i>Abelmoschus esculentus</i> (তেঁতুল- বহুমুত্র রোগের ওষুধ) <i>Gossypium herbaceum</i>* (কাপাস তুলা) <i>Hibiscus cannabinus</i> (কেনাক-মেন্টাপাট) <i>Hibiscus sabdariffa</i> (মেন্টাপাট) <i>Hibiscus mutabilis</i> (ফুল পত্র) <i>Thespesia populnea</i> (ইন্ডিয়ান টিলিপ-খেলনা, কৃষিকাজ, পেলিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়)।
উদাহরণ	ধান, গম, নারকেল, বঁশ, ঘুতুমারী, ইন্দু, কচু, কলা, ভুট্টা, খেজুর, যব, কুমারিকা, অর্কিড, ঘাস, পেয়াজ, রসুন, শতমূলী।	আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, ধুতুরা, তেঁতুল, ছোলা, রেড়ি, লাউ, শিম, কুমড়া, চা।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম বৃক্ষ-রেড ট্রি (*Sequoia sempervirens*)।
- বাংলাদেশে কত প্রজাতির নগ্নবীজী উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে- ৫।
- নগ্নবীজী উদ্ভিদের দেহ- স্পোরোফাইটিক।
- নগ্নবীজী উদ্ভিদে- গর্ভাশয় থাকে না, কাজেই ফল উৎপন্ন না। ভিতর উপস্থিত কিন্তু সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত।
- নিম্বোকে পূর্বে শস্য উৎপন্ন হয়- জিমানোস্পার্মে।
- নগ্নবীজী উদ্ভিদে পরাগায়ন হয়- বায়ুর মাধ্যমে।
- Cycas উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে- চট্টগ্রামের বারিয়াডালা বনে।
- পাম ফার্ন নামে পরিচিত- Cycas।
- Cycas- এর পাতা- পক্ষল যৌগিকপত্র।
- Cycas- এর এন্ডোস্পার্ম বা শস্য- হ্যাঙ্গ্রেড।
- Cycas- এর মূল- কোরালয়েড।
- Cycas- এর প্রধান মূল- বহুস্থায়ী।
- Cycas- এর কাণ্ড আবৃত থাকে- স্থায়ী পত্রমূল দ্বারা।
- Cycas- এর কোরালয়েড মূলে বাস করে- Anabaena এবং Nostoc।
- মিথোজীবিত লক্ষ করা যায়- Cycas pectinata।
- Cycas ও *Ginkgo biloba* হলো- জীবন্ত জীবাশ্ম।
- কোন সপুষ্পক উদ্ভিদে আর্কিগোনিয়া পাওয়া যায়- Cycas- এ।
- Cycas- এর স্ট্রোবিলাস- একলিঙ্গিক।
- উদ্ভিদকুলের সর্ববৃহৎ তরুণ পাওয়া যায়- Cycas- এ।
- Cycas-এর মেগাস্পোরোফাইল দেখতে- সাপের ফণার মতো।
- পুংলিঙ্গধরের প্রথম কোষ- পুরেণু।
- স্ত্রীলিঙ্গধরের প্রথম কোষ- স্ত্রীরেণু।
- মিউসিলেজযুক্ত কচি অঙ্গ থাকে- Malvaceae গোত্রে।
- বাংলাদেশ Malvaceae গোত্রের পাপরি বিন্যাস- টুইস্টেড।
- Malvaceae গোত্রের অমরাবিন্যাস- অক্ষীয়।
- জবা ফুল ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়- অর্ধরোগ ও রক্ত আমাশয় চিকিৎসায়।

- Malvaceae গোত্রের পরাগরেণু- বড় ও কষ্টকিত।
- বাংলাদেশে Malvaceae গোত্রের প্রজাতির সংখ্যা- ৪২টি।
- Malvaceae গোত্রের ফলের ধরন- কাপসুল।
- তেঁতুল যে রোগের উপশমে ব্যবহৃত হয়- বহুমুত্র।
- Malvaceae গোত্রের মূল- প্রধান মূল।
- Malvaceae গোত্রের পরাগধানী- বৃক্কাকার।
- Malvaceae গোত্রের পুষ্পবকের গঠন- একগুচ্ছক।
- Malvaceae গোত্রের দলের পুষ্পপত্র বিন্যাস- ভালভেট।
- Malvaceae গোত্রের উদ্ভিদ- জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), তেঁতুল (*Abelmoschus esculentus*), কাপাস তুলা (*Gossypium herbaceum*) ইত্যাদি।
- জাতীয় ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম- *Nymphaea nouchali*।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী উদ্ভিদগোষ্ঠী- আবৃতবীজী।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদ জন্মে না- এন্টাকটিকার।
- পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু আবৃতবীজী- *Shorea faguetiana*।
- পৃথিবীর/বিশ্বের সবচেয়ে ছোট আবৃতবীজী উদ্ভিদ- *Wolffia microscopica*।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী- *Wolffia arrhiza*।
- Magnoliophyta- এর অন্তর্গত শ্রেণির সংখ্যা- ২টি।
- Liliopsida বলতে বুঝায়- একবীজপত্রী উদ্ভিদ।
- Magnoliopsida বলতে বুঝায়- দ্বিবীজপত্রী।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদের সস্য- ট্রিপ্লয়েড।
- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আবৃতবীজীর সংখ্যা- ১০০০।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থল- নিরক্ষীয় অঞ্চল।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদকে Magnoliophyta- এর অন্তর্ভুক্ত করেন- ক্রনকুইস্ট।
- টেপাল কার অংশ- পুষ্পপুট।
- ফল পাকলে নিচ থেকে উপর বরাবর ফেটে যায়- সিলিকুয়া।
- শীর্ষদেশীয় অমরাবিন্যাস দেখা যায়- লালপাতা।
- বহুপ্রাচীর অমরা বিন্যাস- সরিষা/গেঁপে।
- কৃষ্ণচূড়া ফুলের পুষ্পবিন্যাস- ইন্ডিকেট।
- ইন্ডিকেট পুষ্পপত্রবিন্যাস পাওয়া যায়- কালকাসুন্দা।
- Poaceae গোত্রের পূর্ব নাম- Gramineae।
- Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের (ধানের) মঞ্জুরি- স্পাইকলেট।
- ধারেন গুণ্য গ্রুম- ২টি।
- Poaceae গোত্রের ফুলের উদ্ভিদের ধরন- ট্রাইমেরাস।
- Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের (ধানের) ফল- ক্যারিওপসিস।
- Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের পরাগধানী- সর্বমুখ।
- বাংলাদেশ প্রাণ বোঁশের প্রজাতির সংখ্যা- ২৮টি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

- নিচের কোনটিতে কোরালয়েড মূল পাওয়া যায়?
[DU. 20-21, 12-13; JU. 13-14, 11-12; CoU. 19-20; RU. 21-22]
A. Cycas B. Pinus
C. Hibiscus D. Ficus
SAW প্রাথমিক পর্যায়ে Cycas এর প্রধানমূল থাকে, Cycas এর মূলকে কোরালয়েড মূল বা রুট টিউবারকল (Nostoc এবং Anabaena দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে) বলে।
- কোন উদ্ভিদের তরুণ সর্ববৃহৎ?
[DU. 17-18; JU. 17-18; DU. 7Clg-A. 21-22; D. Board: 16-17; B. Board: 15-16]
A. Gnetum B. Ginkgo
C. Pinus D. Cycas
- পামফার্ন হিসেবে পরিচিত উদ্ভিদ কোনটি?
[JU-D, Set-D. 20-21, 17-18]
A. Cycas B. Cyathia C. Ginkgo D. Gnetum
SAW Cycas স্পোরোফাইটিক, বৃক্ষ জাতীয় কাণ্ডল উদ্ভিদ। এর কাণ্ড ও পাতা দেখতে অনেকটা পাম জাতীয় উদ্ভিদ বা ট্রি-ফার্নের কাণ্ড ও পাতার মতো, এ কারণে একে পামফার্ন বলা হয়।

১৪. কোন নগ্নবীজী উদ্ভিদে দ্বি-নিষেক ঘটে?

[JU-D, Set-H. 23-24]

- A. *Cycas* B. *Pinus*
C. *Gnetum* D. *Ephedra*

(D)

১৫. কোন উদ্ভিদ থেকে এরকট তৈরী করা হয়?

[JU-D, Set-M. 23-24]

- A. *Cycas circinalis* B. *Cycas revoluta*
C. *Cycas pectinata* D. *Cycas media*

(A)

১৬. নগ্নবীজী উদ্ভিদে কোনটি অনুপস্থিত?

[JU-D, Set-F. 2022-23]

- A. পাতা B. ফুল
C. ফল D. বীজ

(C)

১৭. নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে নিচের কোনটিতে দ্বি-নিষেক ঘটে?

[RU-C, Topaz-3: 22-23]

- A. *Cycas* B. *Pinus* C. *Gnetum* D. *Ephedra*

SOWHY নগ্নবীজী উদ্ভিদে দ্বি-নিষেক ঘটে না। ইফেড্রা ব্যতিক্রম এতে দ্বি-নিষেক ঘটে এবং শ্বাসকষ্টের গুরুত্ব ইফেড্রিন পাওয়া যায়।

১৮. কোনটির তরুণ ফ্রাজেলাবিহীন?

[BUP. 2021-22]

- A. *Ginkgophyta* B. *Cycadophyta*
C. *Gnetophyta* D. *Coniferophyta*

SOWHY নগ্নবীজী উদ্ভিদের তরুণ প্রকৃতি:

বিভাগ	তরুণ প্রকৃতি	বিভাগ	তরুণ প্রকৃতি
<i>Ginkgophyta</i>	ফ্রাজেলাযুক্ত	<i>Gnetophyta</i>	ফ্রাজেলাবিহীন
<i>Cycadophyta</i>	ফ্রাজেলাযুক্ত	<i>Coniferophyta</i>	ফ্রাজেলাবিহীন

১৯. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদ কোনটি? [JU-D, Set-T. 2021-22; CU.21-22]

- A. *Cydon dactylon* B. *Setaria italica*
C. *Panicum maliaceum* D. *Wolffia arrhiza*

SOWHY পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদ *Wolffia microscopia* (0.1 মি.মি.) ও ক্ষুদ্রতম নগ্নবীজী উদ্ভিদ *Zamia pygmaea*। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদ হলো *Wolffia arrhiza*।

২০. কোনটিতে গাভীর অমরা বিন্যাস পাওয়া যায়?

[DU. 18-19; JU. 11-12]

- A. *Oryza sativa* B. *Nelumbo nucifera*
C. *Helianthus annuus* D. *Portulaca oleracea*

(B)

২১. *Cucumis sativus* এর প্রাসেটেশন কোন প্রকৃতির?

[DU. 16-17]

- A. বেনাল B. শীর্ষক C. এক প্রান্তীয় D. প্যারাইটাল

(D)

২২. কোনটি *Poaceae* গোত্রের ফল?

[JU-D, Set-O. 23-24]

- A. সিলিকুলা B. ক্যাপসিউল C. ক্যারিওপসিস D. লোমেন্টাম

(C)

২৩. ক্যাপসুল জাতীয় ফল দেখা যায় কোন উদ্ভিদে?

[JU-D, Set-P. 2022-23]

- A. আপেল B. টেঁড়শ C. ধান D. টমেটো

(B)

২৪. কোন ফুলের পাপড়িগুলো Twisted aestivation?

[IU. 19-20; BSMRSTU. 19-20]

- A. আতা B. আকন্দ
C. গন্ধরাজ D. জবা

(D)

২৫. কোন উদ্ভিদটি মালভেসি (Malvaceae) গোত্রভুক্ত নহে?

[CU. 19-20]

- A. ভুট্টা B. জবা C. কার্পাস D. টেঁড়শ

(A)

২৬. কোন পরিবারের উদ্ভিদ থেকে তুলা পাওয়া যায়?

[DU-7Clg-A. 23-24]

- A. Fabaceae B. Poaceae C. Malvaceae D. Cyperaceae

(C)

২৭. কোন গোত্রে পালকের ন্যায় গর্ভমুণ্ড পাওয়া যায়?

[DU: A. 08-09]

- A. Cruciferae B. Solanaceae C. Gramineae D. Palmae

(C)

২৮. *Allium cepa* কোন গোত্রের উদ্ভিদ?

[DU. 98-99]

- A. Solanaceae B. Liliaceae
C. Malvaceae D. Cruciferae

(B)

২৯. Malvaceae গোত্রের দলের পুষ্পপত্র বিন্যাস কোন ধরনের?

[কৃ.বো. ২০২৩]

- A. ওপেন B. ভালভেট
C. ইমব্রিকেট D. টুইস্টেড

(D)

৩০. ধানে কোন ধরনের ফল দেখা যায়?

[দি.বো. ২০২২]

- A. ক্যাপসুল B. বেরি C. সিলিকুলা D. ক্যারিওপসিস

(D)

৩১. কোন গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু বৃহৎ ও কটকিত?

[Ref: হাসান স্যার]

- A. Poaceae B. Malvaceae C. Liliaceae D. Solanaceae

(B)

PRIME TEST

০১. বাংলাদেশে কত প্রজাতির নগ্নবীজী উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে?

- (A) ১৫ (B) ১০ (C) ৫ (D) ৩

০২. নগ্নবীজী উদ্ভিদের সস্য কলার প্রকৃতি কীরপ?

- (A) হ্যাগয়েড (B) ডিপ্লয়েড (C) ট্রিপ্লয়েড (D) টেট্রাপ্লয়েড

০৩. নিচের কোনটি বাংলাদেশে বাঁশ পাতা নামে পরিচিত?

- (A) *C. pectinata* (B) *G. montenum*
(C) *G. oblongum* (D) *P. neriifolius*

০৪. *Cycas* এর অস্থানিক মূল বলা হয় কোনটিকে?

- (A) কোরালয়েড মূল (B) শাঁসমূল (C) স্ট্রোবিলাস (D) গুচ্ছমূল

০৫. নিচের কোনটি জীবন্ত জীবাশ্ম নগ্নবীজী?

- (A) *Pteris* (B) *Ginkgo biloba* (C) *Riccia* (D) *Marchantia*

০৬. কোনটিকে পামফার্ন বলা হয়?

- (A) *Cycas* (B) *Pinus* (C) *Gnetum* (D) *Wolffia*

০৭. কোনটি টিউবার এর উদাহরণ?

- (A) আদা (B) হলুদ (C) আলু (D) পেঁয়াজ

০৮. সূর্যমুখীতে কোন ধরনের পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়?

- (A) ক্যাপিচুলাম (B) সাইমোস (C) রেসিম (D) স্প্যাডিক্স

০৯. কোনটি মুক্ত এস্টিভেশনের উদাহরণ?

- (A) আতা (B) আকন্দ (C) গন্ধরাজ (D) জবা

১০. অ্যানড্রিসিয়ামের প্রতিটি সদস্যকে কী বলা?

- (A) সেপাল (B) টেপাল (C) পেটাল (D) স্ট্যামেন

১১. পুষ্পপত্রের প্রতিটি সদস্যকে বলা হয়-

- (A) টেপাল (B) সেপাল (C) পেটাল (D) ল্যামিনা

১২. কোনটি সুপারফিশিয়াল প্রাসেটেশনের উদাহরণ?

- (A) শাপলা (B) ত্রিধারা (C) ধনিয়া (D) লাউ

১৩. নিচের কোনটি বীরুং জাতীয় উদ্ভিদ?

- (A) রঙ্গন (B) আম (C) দুর্বাঘাস (D) জবা

১৪. ক্যালিক্স এর প্রতিটি সদস্যকে কী বলা হয়?

- (A) সেপাল (B) এপিক্যালিক্স (C) পেটাল (D) করোলা

১৫. Poaceae গোত্রের অমরাবিন্যাস হলো-

- (A) গাভীর (B) মূলীয় (C) একপ্রান্তীয় (D) বহুপ্রান্তীয়

১৬. Malvaceae গোত্রের এস্টিভেশন হলো-

- (A) ওপেন (B) ভালভেট (C) ইমব্রিকেট (D) ডেকসিলারি

১৭. কোন উদ্ভিদটিতে লৌহ থাকায় নিয়মিত খেলে শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়?

- (A) *A. esculentus* (B) *G. herbaceum* (C) *H. mutabilis* (D) সবগুলো

১৮. Poaceae গোত্রের উদ্ভিদের ফল কোন ধরনের হয়?

- (A) ক্যাপসিউল (B) বেরি (C) লিগিউম (D) ক্যারিওপসিস

১৯. Malvaceae গোত্রের পুষ্পবিন্যাস হলো-

- (A) রেসিম (B) স্পাইকলেট (C) সাইমোস (D) স্প্যাডিক্স

২০. নিচের কোনটি Malvaceae গোত্রের উদ্ভিদ?

- (A) ধান (B) সরিষা (C) গম (D) টেঁড়শ

Answer Analysis

01.C	02.A	03.D	04.A	05.B	06.A	07.C	08.A	09.C	10.D
11.A	12.A	13.C	14.A	15.B	16.B	17.A	18.D	19.C	20.D

- কোন বর্ণ কণিকার জন্য ফলের রং হলুদ হয়- বিটাজ্যান্থিন।
- খনিজ লবণ শোষণের বিশেষ উপযোগী অম্ল- শীর্ষমূল।
- খনিজ লবণ শোষণের নিয়ন্ত্রণ করে- অক্সিজেন।
- ফসল ক্রয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে- অক্সিজেন।
- একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে অধিকতর কম স্থানের দিকে বিস্তার লাভ করার প্রক্রিয়াকে বলে- ব্যাপন।
- পত্রের রাতে খোলা ও দিনে বন্ধ থাকে- মরুজ উদ্ভিদে।
- একই দ্রাবকবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণকে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পৃথক রাখলে কোন প্রক্রিয়াটি ঘটে- অভিস্রবণ।
- P700 নামক প্রতিক্রিয়া রঞ্জক কোন বর্ণের আলোক সর্বাধিক শোষণ করে- অতি লাল।
- সূর্যালোকের শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়া- ফটোফসফোরাইলেশন।
- C₃ উদ্ভিদে কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় (ক্যালভিন চক্র) প্রথম স্থায়ী পদার্থ- 3-ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3-কার্বন)।
- 'ন অব মিনিমাম' প্রস্তাব করেন- বিজ্ঞানী লিবিগ।
- ফসলের গ্রাইকোলাইসিস ধাপে ১ অণু গ্লুকোজ ভেঙে কয় অণু পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন হয়- ২।
- ১ অণু গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন ২ অণু পাইরুভিক এসিড হতে ২ অণু CO₂, ২ অণু NADH + H⁺ এবং অ্যাসিটাইল CO-A সৃষ্টি হয়।
- মালিক এসিডকে প্রভাবিত করে- মালিক ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম।
- স্বাভাবিক ১ অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণজারিত হয়ে সর্বাধুনিক ধারনায় মোট ৩৬ অণু ATP (প্রচলিত ধারণায় ৩৮ অণু ATP) উৎপন্ন হয়, কিন্তু ETC-এ ৩২ অণু এবং ক্রেবস চক্র ২৪ অণু ATP উৎপন্ন হয়।
- কেমল পানীর প্রধান উপাদান- সাইট্রিক এসিড।
- চা পাতা প্রক্রিয়াজাকরণে সাহায্য করে- *Bacillus megatherium*।
- ব্যাকটেরিয়া কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- দুগ্ধ শিল্পে।
- অভ্যাবশ্যিক উপাদানের সংখ্যা (স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য)- ১৭ টি।
- উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস- ৮টি।
- উদ্ভিদ মাটি হতে শোষণ করে- নাইট্রোজেন।
- কোন আয়ন উদ্ভিদ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে শোষণ করে- K⁺, NO₃⁻।
- কোন আয়নের শোষণ হার সবচেয়ে মন্থর গতিতে চলে- SO₄²⁻, Ca²⁺।
- কোন উপাদানটি উদ্ভিদ মাটি থেকে অধিক মাত্রায় গ্রহণ করে- Mg⁺⁺।
- খনিজ লবণ পরিশোধিত হয়- আয়ন হিসেবে।
- মাটিস্থ উপাদান উদ্ভিদ শোষণ করে-মূলের দ্বারা।
- জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থের শোষণ নির্ভর করে- ঘনত্বের উপর।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে সাধারণত উদ্ভিদের লবণ পরিশোধন- বাড়ে।
- উদ্ভিদদেহে সন্ধান পাওয়া মৌলের সংখ্যা- ৫৭টি।
- বিপাকীয় শক্তির ব্যবহার ছাড়া শোষণ হলো- নিক্রিয় শোষণ।
- কোষের H⁺ আয়নের পরিবর্তে প্রবেশ করে- K⁺।
- কোষঝিল্লির বহিঃতলে জারণ ঘটে- সাইটোক্রোমের।
- সাইটোক্রোম বিজারিত হয়- কোষঝিল্লির অন্তঃতলে।
- উদ্ভিদের লবণ শোষণ দ্রুত হ্রাস করে- অক্সিজেনের নিম্নতাপমাত্রা।
- উদ্ভিদের বিপাকীয় ক্রিয়ার সাথে জড়িত- আলো।
- সেসিথিন মতবাদটি হলো- সক্রিয় পরিশোধন মতবাদ।
- সক্রিয় আয়ন শোষণ মতবাদ দেন- লুভেগার্ড।
- আয়ন বহনের জন্য প্রাজমামেমব্রেনের অভেদ্য অংশে থাকে- বাঁহক।
- উদ্ভিদদেহে প্রবেশের প্রধান অঙ্গ- পাতা।
- প্রবেশের হার বাড়ে কোন অবস্থায়- তাপমাত্রা বাড়ে।
- রক্ষীকোষের ঘিরে থাকে- সহকারী কোষ।
- রক্ষীকোষের কাজ- খাদ্য তৈরি।
- নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র দেখা যায়- মরুজ উদ্ভিদে।
- পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধের কারণ- রক্ষীকোষের টারগায় প্রোসার ও অসমোটিক প্রেসার।
- অসংখ্য ক্রোরোপ্লাস্ট থাকে- প্যালিসেড প্যারেনকাইমা।
- উদ্ভিদের কোন শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি ও পানির অপচয় হয়- প্রবেশন।

- প্রবেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক- আলো।
- বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে প্রবেশন- কমতে থাকে।
- রক্ষীকোষের আকৃতি-অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা বৃদ্ধাকার।
- স্টোমাটা খুলতে দায়ী- K⁺।
- পানি সাম্যতা রক্ষিত হয়- প্রবেশনের মাধ্যমে।
- পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে প্রবেশন হয়- ৯০-৯৫%।
- মূল ও কাণ্ডের অনুপাত বৃদ্ধি পেলে- প্রবেশনের হার বৃদ্ধি পায়।
- রক্ষীকোষ CO₂ এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে, পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।
- উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় ও প্রবেশন কম হয়- ৩৫° তাপমাত্রায়।
- কোষে অধিক পরিমাণ পানি প্রবেশ করে- অভিস্রবণিক চাপের ফলে।
- প্রবেশনের হার বেশি- প্রসারিত পাতায়।
- পাতায় পত্ররন্ধ্রের পরিমাণ বেশি হলে- প্রবেশন বেশি হয়।
- Photosynthesis শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন- বিজ্ঞানী বার্নেস।
- সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন- CO₂, H₂O, ক্রোরোফিল ও সূর্যালোক।
- কোন বিক্রিয়ার সময় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়- সালোকসংশ্লেষণে।
- সালোকসংশ্লেষণে আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন হয়- NADPH₂ ও ATP।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার CO₂ বিজারিত হয়ে তৈরি করে- শর্করা।
- সালোকসংশ্লেষণ এর প্রক্রিয়ার অপর নাম- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।
- কোন আলোতে সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ হয়- লাল।
- জ্যাকুফিলের বর্ণ- হলুদ।
- পিগমেন্ট সিস্টেম- I(PS-I) এর ক্রোরোফিল- P700।
- পিগমেন্ট সিস্টেম- I(PS-I) এর ক্রোরোফিল- P700।
- চলনশীল লিপিড- প্লাস্টোকুইনন।
- আয়রন-সালফার প্রোটিন- ফেরিডক্সিন।
- অচক্রিয় ফটোফসফোরাইলেশনের উৎপন্ন ATP এ সংখ্যা- ১।
- সূর্যালোকের শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়া- ফটোফসফোরাইলেশন।
- সালোকসংশ্লেষণে আলোক পর্যায়ে ঘটে- পানির ভাঙন।
- আলোক পর্যায়ে নির্গত হয়- O₂।
- ক্যালভিন চক্র CO₂ গ্রহীতা কে- রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট।
- 3PGA কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়- ক্যালভিন চক্র।
- সালোকসংশ্লেষণের ফটোলাইসিসে উৎপন্ন গ্যাস স্বসনের কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়- সাইট্রিক এসিড চক্র।
- C₃ উদ্ভিদ- অধিকাংশ নগ্নবীজী উদ্ভিদ, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস, সালোকসংশ্লেষণকারী শৈবাল, অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদ, বিশেষ করে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (যেমন: পাট, আম, জাম, লিচু ইত্যাদি)। বেশ কিছু একবীজপত্রী উদ্ভিদেও C₃ চক্র দেখা যায়। যেমন: ধান, কলা।
- হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র (C₄ চক্র) বা C₄ উদ্ভিদের উৎপন্ন ১ম স্থায়ী পদার্থ- অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড।
- ভুট্টা উদ্ভিদে এর গ্রাহক যৌগ কয় ধরনের- ২।
- দুই ধরনের ক্রোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়- আছে।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন খাদ্য- শর্করা।
- C₄ উদ্ভিদ - Poaceae, Cyperaceae ইত্যাদি গোত্রের একবীজপত্রী উদ্ভিদ যেমন: ইক্ষু, গম, ভুট্টা, ওট, বার্লি, মুখা, ঘাস, ইত্যাদি, এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ যেমন: *Euphorbia spp.*, *Amaranthus sp.* ইত্যাদি।
- যে কোষীয় অঙ্গাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি পেলে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমবে- ক্রোরোপ্লাস্ট।
- কত তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি।
- সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় শক্তি আসে- সূর্য হতে।
- সালোকসংশ্লেষণের সম্পন্ন হয়- পাতার মেসোফিলে।
- বাতাসে CO₂ এর ঘনত্ব- ০.০৩ - ০.০৪%।
- প্রবেশনের হার সর্বোচ্চ - ১০-২৫° সে. তাপমাত্রায়।
- প্রধান স্বসনিক উপাদান- শর্করা (গ্লুকোজ)।
- স্বসন প্রক্রিয়ায় কোনটি O₂ দ্বারা জারিত হয়- C₆H₁₂O₆ (শর্করা)।

অধ্যায়
১০

উদ্ভিদ প্রজনন

জীববিজ্ঞান
৯ম পত্র

সূচকসমূহ	RATINGS		
	***	**	*
১. গার্মিটোফাইট	-	-	পরগারের গঠন
২. গার্মিটোফাইট, ডিম্ব ও নিষেক	ডিম্বকের প্রকারভেদ, নিষেক	অণুপ্রাণের গঠন	দ্বী গার্মিটোফাইট
৩. উদ্ভিদ প্রজনন	অঙ্গভ	পার্শ্বোন্মোজেনেসিস	-

TOPIC-01

যৌন জনন

১. পরগারের পরিচয়:

পরগার	চারকোণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রতি কোণে ভেতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড় হয়। এসে মন সাইটোপ্লাজম এবং বড় নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষকে অর্কিস্পেরিয়ায় কোষ বলা হয়। অর্কিস্পেরিয়ায় কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে দেয়াল কোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষে পরিণত হয়। দেয়ালকোষ ৩-৫ স্তর বিশিষ্ট হয়।
চ্যাপেটাম	প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর হলো চ্যাপেটাম। চ্যাপেটাম বিলম্বিত হয়ে পরিশুদ্ধিত পরগারের পুষ্টি সাধন করে।
পরগার	পরগারের প্রাচীরের দেয়া অংশকে পরগার বলি। অর্ধকাংশ আবৃতবীজীতে ৪টি পরগার থাকে।

২. ডিম্বকের গঠন: একটি ডিম্বক নীচের সাতটি অংশ নিয়ে গঠিত:

- ডিম্বকনাড়ী
- ডিম্বক মূল
- ডিম্বকরক্ত
- অণুপ্রাণ
- ডিম্বকনাড়ী
- ডিম্বকরক্ত
- অণুপ্রাণ বা নিউসেলাস

৩. ডিম্বকের প্রকারভেদ:

ডিম্বকের প্রকারভেদ	উদাহরণ
উর্ধ্বমুখী*	গোল মরিচ, পানি মরিচ (বিষকাটালী), পানি ইত্যাদি
অধোমুখী বা নিম্নমুখী	মটর, ছোলা, শিম, রেড়ি ইত্যাদি। [অর্ধকাংশ আবৃতবীজী (75%) ডিম্বক এই প্রকারের]
পার্শ্বমুখী*	ভায়াভাস, কুসিপানা, পাপ (আফিম), পালক
বক্রমুখী*	সরিষা, কালকান্দু
কলমের বা সরসনোত্রীপাশ	ফণিমনসা
অর্ধ অধোমুখী	ছোটকুট

TOPIC-02

নিষেক

১. নিষেকক্রিয়া:

অপেক্ষাকৃত বড় ও নিশ্চল দ্বীগার্মিটের (ডিম্বাণু) সাথে ছোট ও সচল পুংগার্মিটের (তরুণ) সৌম মিলনকে ফার্টাইজেশন তথা নিষেকক্রিয়া, নিষেক বা গর্ভাধান বলে।

নিষেকের ধাপ:

(i) গর্ভমুখে পরগারের অঙ্কুরোদগম।

নাম	গর্ভাধানমুখী যাত্রাপথ	উদাহরণ
Porogamy	ডিম্বকরক্ত	আম, জাম
Chalazogamy	ডিম্বকমূল	Casuarina- কাউ
Mexogamy	ডিম্বকরক্ত	লাউ, কুমড়া

(ii) পরগারালিকার গর্ভাধানমুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি:

(iii) পরগারালিকার অণুপ্রাণিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নির্গতকরণ।

(iv) অণুপ্রাণিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন।

০২. দ্বি-নিষেক ক্রিয়া বা দ্বি-নিষেক (Double fertilization):

একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগার্মিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগার্মিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বি-নিষেকক্রিয়া বা দ্বি-গর্ভাধান প্রক্রিয়া বলে। দ্বি-নিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

০৩. নিষেকের পর গর্ভাধান ও ডিম্বকের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন:

নিষেকের পূর্বাবস্থা	নিষেক পরবর্তী অবস্থা
গর্ভাধান*	ফল
ডিম্বক*	বীজ
গর্ভাধান তরু*	ফল তরু
এন্ডাইন (ডিম্বক বহিরস্থ তরু)	ট্রিফা (বীজের বহিরস্থ তরু)
ইন্ডাইন (ডিম্বক অন্তস্থ তরু)	ট্রিফারেন (বীজের অন্তস্থ তরু)
নিউসেলাস* (অণুপ্রাণের টিউল)	অর্ধকাংশ নষ্ট হয়ে যায় তবে কিছুটা থাকলে পেরিস্পার্ম হয়
ডিম্বাণু*	ফল
এন্ডোস্পার্ম মাতৃকোষ (গৌল নিউক্লিয়াস)	সস্য বা এন্ডোস্পার্ম
সহকারী কোষ বা সিনারজিড	নষ্ট হয়ে যায়
প্রতিপাদ কোষ বা অ্যাক্টিপোডাল	নষ্ট হয়ে যায়
মাইক্লোপাইল	বীজের মাইক্লোপাইল
ডিম্বকরক্ত*	বীজরক্ত
ডিম্বক*	বীজ
ডিম্বকনাড়ী (ফিউসিকুলাস)	বীজের শোভা (বীজবৃত্ত)
ডিম্বকনাড়ী (হাইপোম)	বীজের নাড়ী (হাইপোম)
ডিম্বকমূল* (ক্যালোজ)	বীজ মূল (নষ্ট হয়ে যায়)

TOPIC-03

অযৌন জনন

০১. সেহ অঙ্গের মাধ্যমে প্রজনন:

i. স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়:

নাম	উদাহরণ
স্বজনন	শেবাণ, তরুণ, ব্রায়োফাইটা, Spirogyra, Oscillatoria, Ulothrix, Oedogonium.
মূল দ্বারা	মিষ্টি আলু, ভলিয়া, শতমূলী, কাকরোল, পটল, মূলা, ভলিম, অর্জিত।
স্বাভাবিক কাণ্ড	পান, আখ
অর্ধবায়বীয় কাণ্ড	ধানকুনি, স্ট্রাবেরি, কচুরিপানা, চোপা পানা, চন্দ্রমল্লিকা, কচু, আমকুল, কলম।
ভূনিম্নস্থ কাণ্ড	আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, আলু।
পর্বকাণ্ড	ফণিমনসা
সাকারের দ্বারা	কলা, পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ
মূলবিদ/কক্ষমূল	চুপরি আলু।

ii. কৃত্রিম প্রক্রিয়ায়:

- শাখা কলম বা কাটিং: গাছের পরিণত কাণ্ডে অংশ বিশেষ কেটে শিক মাটিতে পুঁতলে তাকে কি নাচুন উদ্ভিদ জন্মায়। জবা, আখ, গোলাপ, সজিনা পাতাবাহার প্রভৃতি।
- দাবাকলম: মাটি সংলগ্ন লম্বা শাখাকে মাটিতে ঢাপা দিলে শাখাটির পর্ব থেকে অস্থায়ীক মূল নির্গত হয়। লেবু, গুই, লিচু, সফেদা, আম্র, আপেল প্রভৃতি।
- জোড়কলম*: বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সাইয়ন (Scion) এবং সাইয়নকে যে উদ্ভিদের সাথে জোড়া দেয়া তাকে স্টক (Stock) বলা হয়। যেমন: আম, কুল, জাম।
- গুটিকলম: শক্ত কাঠযুক্ত যে কোন ফল গাছ, নির্বিচ্ছিন্ন অংশের বাকল ছাড়িয়ে সেখানে গোবর, মাটি ও বাড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। যেমন: লেবু, আম, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়।
- চোপ কলম: একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাণ্ডিক মুকুল সংযোজন করা হয়। কুল, গোলাপ
- টিউল কালচার: জারবেরা, আলু

02. জন্ম সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া:

- **অণুজেনি:** যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই জন্ম সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বিজে পরিনত হয় তাকে *পারথেনোগেনেসিস* বা অণুজেনি বলে।
- **পার্থেনোকার্পি:** পরাগযোগ ও নিষেক ছাড়া আবৃতবীজী উদ্ভিদের ডিম্বাণু থেকে বীজহীন ফল উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে পার্থেনোকার্পি বলে।
- **আপোম্পোরি:** ডিম্বকের সেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিম্বাণুতে জন্মগুলির ডিম্বাণুতে ডিম্বাণুটি হতে নিষেক ছাড়াই জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় আপোম্পোরি। আপোম্পোরি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ ডিম্বাণুতে হয় এবং মাতৃ উদ্ভিদের সমস্ত গুণসম্পন্ন হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে এরূপ হতে দেখা যায়।
- **অ্যাক্সেনজিটিভ এমব্রায়োনি:** ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের যেকোনো কোষ হতে জন্মগুলি গঠন ছাড়াই জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাক্সেনজিটিভ এমব্রায়োনি।
- **অ্যাপোগ্যামি:** ডিম্বাণু ছাড়া জন্মগুলির অন্য যেকোনো কোষ থেকে জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। এক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই জন্ম সৃষ্টি হয়। *Allium*-এ এরূপ লক্ষ্য করা যায়।
- **অ্যামোম্পোরি:** ডিম্বাণু, জন্মগুলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া জন্ম তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যামোম্পোরি।
- **সিউজোগ্যামি:** অ্যামোম্পোরি অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যকীয় হলে তাকে বলা হয় সিউজোগ্যামি। শীত তৈরির জন্যই পরাগায়নের প্রয়োজন হয়, জন্ম তৈরির জন্য নয়।

03. সংকরায়ন: ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরায়ন।

সংকরায়ন প্রক্রিয়া:

- প্যারোট নির্বাচন
- প্যারোটের কৃত্রিম অপরাগায়ন
- প্যারোট উদ্ভিদের ইমাকুলেশন: যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হবে তা যদি উভলিঙ্গ (এবং স্বপরাগী হয় অথবা প্রয়োজনে স্বপরাগী হতে পারে) হয় তাহলে ইমাকুলেশন করা হয়। পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর মোরে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় ইমাকুলেশন। এতে করে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না।

• ব্যাগিং • ক্রসিং • লেবেলিং

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্যামাস ধরনের।
- একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম বলে।
- পরাগরেণু (n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।
- পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। বড়টিকে বলা হয় নালিকা নিউক্লিয়াস এবং ছোটটিকে বলা হয় জনন নিউক্লিয়াস।
- অধিকাংশ উদ্ভিদে (যেমন- আম, জাম) পরাগনালিকা ডিম্বকরূপে পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে *porogamy* বলে।
- কিছু কিছু উদ্ভিদে পরাগনালিকা ডিম্বকমূল (যেমন-Casuarina-কাউ) নিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে *chalazogamy* বলে।
- কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে *mesogamy* বলে।
- অধিকাংশ উদ্ভিদে *porogamy* প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।
- দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (নগ্নবীজী উদ্ভিদের *Ephedra* তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয় ১৯৯০ সালে - এটি ব্যতিক্রম)।
- সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে গ্রিমিলন বলা হয়।
- সস্যাটিন্য প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।
- লিচু, কাঠলিচু, জায়ফলে ও শাপলা বীজে এরিল দেখা যায়।
- লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।
- আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অসৌন জনন হয়ে থাকে। পেনিসিলিয়ামের কনিডিয়া বা কনিডিওস্পোর, মিউকরের স্পোরোজিওস্পোর বা গনিডিয়া, অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই জন্ম সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বিজে পরিনত হয় তাকে *পারথেনোগেনেসিস* বা অণুজেনি বলে।
- হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে *পারথেনোকার্পি* বলে।
- লেবু, কমলাসবু ইত্যাদি।
- নিষেকবিহীন ছাড় অফলু থেকে জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে *আপোম্পোরি* বলে।
- ডিম্বকের সেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিম্বাণুতে জন্ম গুলির ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় আপোম্পোরি। (যেমন-Hieracium)।
- ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের সে কোনো কোষ হতে জন্মগুলি গঠন জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাক্সেনজিটিভ এমব্রায়োনি।
- ডিম্বাণু ছাড়া জন্মগুলির অন্য কোনো কোষ থেকে জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। (যেমন-Allium)।
- ডিম্বাণু, জন্মগুলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যামোম্পোরি। অ্যামোম্পোরি অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যকীয় হলে তাকে বলা হয় সিউজোগ্যামি।
- পরাগধানীর প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরকে বলে ট্যাপেটাম।
- পুষ্পের পুংজননাসত্তে বলা হয় Stamen।
- পরাগরেণুর কাইরের পুং, শব্দ ও ক্রিটিনিনসূত্ব ত্বককে বলে এন্ডাইন।
- একটি স্ত্রী স্ত্রী জন্মগুলি গঠনে অংশগ্রহণ করলে তাকে বলে মনোম্পোরিক প্রক্রিয়া।
- মনোম্পোরিক প্রক্রিয়ায় জন্মগুলি গঠিত হয় শতকরা প্রায় ৭৫ অংশ ক্ষেত্রে।
- ছাত্রাণুতে ততালু থেকে জন্ম সৃষ্টি হতে পারে- আমাক।
- ফুলের পুংকেশর অপসারণের প্রক্রিয়াকে বলে- ইমাকুলেশন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. পরাগধানীর প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরকে কি বলে? [JU-D, Set-A, 2022-23]
A. এপিডার্মিস B. যোজক কলা
C. স্পোরোজেনাস কোষ D. ট্যাপেটাম
02. পরাগনালিকার কোন কোষ থেকে শূন্যসূচী তৈরি হয়? [JU-D, Set-B, 2022-23]
A. জেনেরেট কোষ B. সহকারী কোষ C. প্রতিপাদ কোষ D. নালিকা কোষ
03. নিষিক্ত ডিম্বাণু কিসে পরিণত হয়? [DU, 2021-22]
A. ফলে B. এডোম্পোরি C. বীজে D. ফলত্বকে
[S@Wb] অপশনে সঠিক উত্তরটি নেই। সঠিক উত্তর হবে- জন্ম।
04. কোন ফলটিতে এরিল আছে? [DU, ৯৪-৯৫]
A. আম B. কলা C. লিচু D. অনাবস
[S@Wb] নিষেকের পর ডিম্বকের অভ্যন্তরে ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের ফলে ডিম্বকের ত্বক দুটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও তরু হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পানি হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও তরু হয়ে বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয় যাকে এরিল (Aril) বলে। লিচু, শাপলা বীজে, কাঠলিচু ও জায়ফলে এরূপ এরিল দেখা যায়। লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।
05. নিচের কোন ফলটি পারথেনোকারপিক? [DU-A, 22-23]
A. বেগুন B. আপেল C. কলা D. কাঁটাল
06. নিচের কোনটি মূলের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে? [JU-D, Set-L, 2022-23]
A. পেঁয়াজ B. শতমূলী C. কলা D. পুদিনা
07. পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রার ক্ষেত্রে ক্যালাজোগ্যামি দেখা যায় কোন্ উদ্ভিদে? [JU-D, Set-G, 20-21]
A. লাউ B. কুমড়া C. জাম D. কাউ
[S@Wb] পরাগনালীর গর্ভাশয়মুখী যাত্রার ধরন:
• Porogamy → আম, জাম
• Chalazogamy → কাউ
• Mesogamy → লাউ, কুমড়া।
08. ইমাকুলেশন প্রক্রিয়ায় ফুলের কোন অংশ কেটে ফেলা হয়? [JU-D, Set-T, 2021-22]
A. বৃতি B. দল C. পুংকেশর D. গর্ভদন্ত
09. নিচের কোনটি কাকের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে? [RU-C, বঙ্গ-৩: 23-24]
A. পাখরকুচি B. আদা C. কাকরোল D. পটল

- 1994年 2月 28日

ASPECT SERIES • ASPECT SERIES • ASPECT SERIES • ASPECT SERIES • ASPECT SERIES • ASPECT SERIES •

- এ ধরনের জীবকে GEO (Genetically Engineered organism) GMO (Genetically modified organism) LMO (Living modified organism) বা TO (Transgenic Organism) বলে।

➤ ধাপসমূহ:

- DNA নির্বাচন ও বাহক নির্বাচন (প্রাকমিত DNA)
- নির্বাচিত ও বাহক DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে রেক্সিকেশন এনজাইম দ্বারা কর্তন
- কর্তনকৃত DNA লাইগেজ এনজাইম দ্বারা জোড়া লাগানো
- অনুলীপনের জন্য পোষক (*E. coli*) নির্বাচন
- রিফ্রমেন্ট DNA কে *Agrobacterium* এ স্থানান্তর
- Agrobacterium* দ্বারা উদ্ভিদ কোষে স্থানান্তর

TOPIC-03

প্রাকমিত

- ক্রোমোসোম বহির্ভূত বৃত্তাকার DNA অণুকে প্রাকমিত বলা হয়।
- Laderberg (1952) *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্রাকমিতের সন্ধান পান।

➤ প্রাকমিত এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

- প্রাকমিত বৃত্তাকার দ্বি-সূত্রক DNA অণু।
- অণবিক ভর এর $10^3 - 200 \times 10^4$ dalton.
- অত্যন্ত দৃঢ় জিন ধারণ করে থাকে।
- রেক্সিকেশন এনজাইম দ্বারা আংশিক প্রাকমিতের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।
- কোনো কোনো প্রাকমিতের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন: Colicin, Vibriocin ইত্যাদি।
- অর্থ সংশ্লেষণশীল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীপন ক্ষমতা সম্পন্ন।

➤ প্রাকমিত এর প্রকারভেদ:

- F এবং F' প্রাকমিত: ব্যাকটেরিয়ার দেহে পিলি তৈরী করে।
- R প্রাকমিত: R₊ প্রাকমিত ওটি গুরুত্বপূর্ণ আন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
- কোল প্রাকমিত: কোলিসিন এর ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E. coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। ত্রিপ্রিওসিন সংবেদনশীল *Vibrio cholerae* কোষকে ধ্বংস করে দেয়।
- Virulence plasmid: ব্যাকটেরিয়াকে প্যাথোজেনে পরিণত করে। TI Plasmid (*Agrobacterium tumefaciens*) উপস্থিতির কারণে দ্বিবিজপত্রী উদ্ভিদে ক্রোমিড গল রোগ সৃষ্টি হয়।
- Degradative plasmid: অস্বাভাবিক বস্তুকে হজমে সহায়তা করে (টলুইন ও স্যালিসাইলিক এসিড)।

TOPIC-04

জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব

- সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন ব্যাকটেরিয়াম প্রাকমিত DNA এর মাধ্যমে ক্রোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবেদনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে 'নিফজিন' *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন PDH 45।
- সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিন সমৃদ্ধ ক্রোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।
- Bt বেতন: *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়ার কোষ থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন (CryI Ac) বেতনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেতনের নাম Bt বেতন।
- Bacillus subtilis* থেকে csp B জিন ভূটা উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে ভূটাকে বরা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে।
- Arabidopsis* থেকে At NHX1 জিন প্রবেশ করিয়ে 'পীনাট' উদ্ভিদকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু করা সম্ভব হয়েছে।

➤ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইনসুলিন:

- ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন ১৫০টি বেস নিয়ে গঠিত এবং ১১ কোমোসোমে থাকে।
- ইনসুলিন ৫১টি অ্যামাইনো এসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন।
- আমেরিকার Eli Lilly & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করে ইনসুলিন নামে। ফার্মেসিটেশন ট্যাঙ্ক থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী হয় ইনসুলিন নামে। ফার্মেসিটেশন ট্যাঙ্ক থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী হয় ইনসুলিন নামে। ফার্মেসিটেশন ট্যাঙ্ক থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী হয় ইনসুলিন নামে।

➤ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইন্টারফেরন:

- ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন।
- ইন্টারফেরনের আণবিক ওজন ২০০০০-৩০০০০ ডালটন।
- অনাক্রম্যত্বকে নিরস্ত্র করতে।
- NK কোষ এর ক্ষমতা ও কণাবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বধ দিয়ে।

TOPIC-05

জিনোম সিকোয়েন্স ও জিন ক্লোনিং

- মানবদেহে এক জোড়া বা দুইটি জিনোম আছে।
- একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট বলা হয়।
- পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি।
- বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও তার সহযোগীরা তোষা পাট (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনচক্র উন্মোচন করেছেন।

➤ কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য:

জীবের নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	আরওজাত
<i>E. coli</i>	১	৩২০০	৪.৬ মিলিয়ন
<i>Haemophilus influenzae</i>	১	১৭০০	১.৮ মিলিয়ন
ইউ	১৬	৬০০০	১২.১ মিলিয়ন
<i>Arabidopsis thaliana</i> (পুষ্পক উদ্ভিদ)	১০	২৫০০০	১০০ মিলিয়ন
মানুষ	৪৬	২৫০০০ (+বহু অপ্রকাশিত)	৩.২ বিলিয়ন

➤ জিন ক্লোনিং:

- কোনো কজিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং।
- বিনা ক্রাইটেরিয়াম (random) তৈরি ক্রোমোসোমের বণ্ড যা ভেক্টর-এ অন্তর্ভুক্ত করা। এগুলো জিন-লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।
 - সুনির্দিষ্ট mRNA থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে করা কমপ্লিমেন্টারি DNA
 - গবেষণাগারে অণবিক কেমিস্ট্রি কণ্ট্রোল বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত DNA বণ্ড বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং: বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং পদ্ধতি আছে।
 - DNA ক্লোনিং: রিকমিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে DNA ক্লোনিং করা হয় এটি জিন ক্লোনিং নামেও পরিচিত।
 - রিস্ট্রোভাকটী ক্লোনিং: জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA এর মাধ্যমে ভায় হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হলো রিস্ট্রোভাকটী ক্লোনিং। ডলি নামক ভেড়া(১৯৯৬) সৃষ্টি এই পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'Biotechnology' শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন- Karl Ereky
- টিস্যু কালচারের জনক- G. Haberlandt।
- কেনটি প্রাচীন জৈব প্রযুক্তি- টিস্যু কালচার।
- টিস্যু কালচারের জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদাংশ হলো- এক্সপ্লান্ট।
- টিস্যু কালচারের জন্য মৌলিক পুষ্টি- আবাদ মাধ্যম।
- টিস্যু কালচারে ব্যবহৃত উদ্ভিদের বিভাজনকম অঙ্গ- শীর্ষমুকুল।
- শীর্ষমুকুল, পরাগরেণু ব্যবহৃত হয়- টিস্যু কালচারে।
- টিটিপোটেনি নামকরণ করেন- Morgan।
- হ্যাঙ্গয়েড চারা উৎপাদন করা যায়- পরাগরেণু কালচার করে।

- পর্যাপ্ত আবাসের মাধ্যমে তৈরিকৃত উদ্ভিদ- হ্যাণ্ড্রেড।
- সংক্রিয় শক্তি কোন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত- টিস্যু কালচার।
- রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যায়- জ্বপ বা মেরিস্টেম কালচার করে।
- টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপন্ন জ্বপকে বলা হয়- সোম্যাটিক এমব্রায়ো।
- রিকমিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি প্রয়োগে সৃষ্ট জীবকে বলা হয়- ট্রান্সজেনিক জীব।
- জিন বা প্রাজমিডের নির্দিষ্ট অংশ কর্তনে ব্যবহৃত এনজাইম বা জৈবিক ছুরি বা বায়োজিক্যাল নাইফ বা আণবিক কাঁচি- রেস্ট্রিকশন এনজাইম।
- জিন বা DNA খণ্ডকে জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত এনজাইম-লাইগেজ।
- রিকমিনেন্ট DNA তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম হলো- DNA Ligase ও Restriction endonuclease।
- জ্বপিত পাওয়া যায়- ব্যাকটেরিয়ার (*E.coli*) সাইট্রোপ্রাজমে।
- সর্বপ্রথম *E.coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রাজমিত আবিষ্কার করেন- Laderberg।
- বর্তমানে কোনটি ব্যবহার করে রিকমিনেন্ট DNA শনাক্ত করা হয়- DNA প্রোব।
- টিকা তৈরি করা যায় কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে- জীবপ্রযুক্তি।
- SIT (Sterial Insect Technique) প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় কোন শিল্পে- কৃষি শিল্পে।
- দুগার রাইসে কোন ভিটামিন থাকে- ভিটামিন A।
- ইনসুলিন তৈরিতে ভাইরাসের সংক্রমণ, জলাতর ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে- ইন্টারফেরন।
- ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়- Interferon।
- ইন্টারফেরন ও ইনসুলিন কোন ধরনের পদার্থ- প্রোটিন।
- পানিতে তেল শোষণে ব্যবহৃত হয়- *Pseudomonas aeruginosa*।
- Bt- বেকেন উৎপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়- *Bacillus thuringiensis*।
- ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে প্রথম উৎপাদিত হয়- Human- α antitrypsin।
- ‘মাস্টার ব্লু-প্রিন্ট’ বলা হয়- জিনোমকে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. প্রাসমিড কে আবিষ্কার করেন? [DU: 14-15; JU: 17-18; RU: SG-2, 18-19; CU-A, Shift-I: 20-21]
- A. Altman B. Perter
C. Kollirer D. Laderberg
- SOWHY** ক্রোমোসোম বহির্ভূত বৃত্তাকার DNA কে প্রাসমিড বলে। সর্বপ্রথম প্রাসমিড আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ল্যাডারবার্গ।
02. কোন বিজ্ঞানী প্রথম প্রাসমিডের সন্ধান পান? [JU-D, Set-H: 2022-23]
- A. Walter Reed B. Gallow
C. Laderberg D. Bawden
- SOWHY** প্রাসমিড: ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্রাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু থাকে তাকে প্রাসমিড বলে। Laderberg (1952) *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্রাসমিডের সন্ধান পান। প্রাসমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে অনুলিখন (Replicate) করতে পারে।
03. বায়োটেকনোলজি শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন? [KU: 18-19; RU: 08-09]
- A. Karl Ereky B. Donald Parkinz
C. Robert Steave D. James Forklin
04. টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারাকে কী বলে? [JU-D, Set-H: 23-24]
- A. এক্সপ্লান্ট B. ক্যালাস
C. মুরুল D. প্র্যান্টলেট
- SOWHY** টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে পৃথকীকরণ অংশকে এক্সপ্লান্ট বলা হয় এবং টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে অগুচারা (Plantlet) বলা হয়।
05. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন হ্যাণ্ড্রেড উদ্ভিদ কোনটি? [JU-D, Set-R: 2022-23]
- A. AdhI B. স্বর্ণধান
C. পোমোটো D. জিনমুদ্রা-1 গম
- SOWHY** টিস্যুকালচারের মাধ্যমে হ্যাণ্ড্রেড উদ্ভিদ উৎপাদন: পরাগরেণু এবং পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে অ্যাক্সোজেনিক হ্যাণ্ড্রেড উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন: চীন দেশের গুয়ান-18 (অ্যাক্সোজেনিক হ্যাণ্ড্রেড ধান) ও

জিনমুদ্রা-1 (অ্যাক্সোজেনিক হ্যাণ্ড্রেড গম)। হ্যাণ্ড্রেড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *Poscaae*, *Solanaceae* ও *Brassicaceae* গোত্রের হ্যাণ্ড্রেড লাইন প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে।

06. জীব প্রযুক্তির (Biotechnology) কোন পদ্ধতিতে রোগমুক্ত উদ্ভিদ চারা উৎপাদিত হয়? [DU: 14-17, 18-19; RU: 18-19; CU: 18-20; JU: 13-14]
- A. জন কালচার B. পর্যাপ্তাধী কালচার
C. মেরিস্টেম কালচার D. ক্যালাস কালচার
07. কালচার মিডিয়ামকে ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়- [RU-C, Curriculum-I: 22-23]
- A. ভিটামিন B. সুক্রোজ
C. অ্যাপার D. ফাইটোহরমোন
- SOWHY** টিস্যু কালচারের মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি:
- বিভিন্ন ধরনের ঘৃণা ও পৌষ উপাদান, ভিটামিন, সুক্রোজ (২-৪%) ফাইটোহরমোন প্রভৃতি এ মিডিয়ামে থাকে প্রয়োজন। এ মাধ্যমকে ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন: অ্যাপার, সঠিক মাত্রায় মেশাতে হয়।
 - এর মধ্যে MS মিডিয়াম (Murashige and Skoog) ও B₂ মিডিয়াম (Gamborg) সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।
 - মিডিয়ামের pH 5.5-5.8 রাখা হয়। [RU: 11-12]
08. রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তির অনুজীব হলো- [RU: 11-12]
- A. *E. coli* B. *Agrobacterium tumefaciens*
C. উভয়ই D. কোনটিই নয়
09. মানুষের ভায়োবোসিস রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগের ইনসুলিন তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়/কোনটিতে ইনসুলিন তৈরির জিন সংযোজন করা হয়েছে? [DU: 17-18; RU: 18-19]
- A. *Nostoc* B. *Spirulina*
C. *E. coli* D. *Bacillus*
10. কোনটি তেল জাতীয় বর্জ্য অপসারণে ব্যবহৃত হয়? [JU-D, Set-A: 23-24]
- A. *Pseudomonas aeruginosa* B. *Clostridium acetobutylicum*
C. *Bacillus megaterium* D. *Rhizobium lentis*
- SOWHY** *Pseudomonas*, *Nocardia*, *Mycobacteria*, বিশেষ ধরনের ইস্ট ও মোশ জাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিজাইজ অনুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে। যা দ্বারা সমুদ্রের তেল নির্গমন করা হয়।
11. কোন জিনটি উদ্ভিদে কীটপতঙ্গরোধী বৈশিষ্ট্য প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়? [JU-D, Set-H: 23-24]
- A. *csp B* B. *At NHXI* C. *nif* D. *Bt*
- SOWHY** ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ রোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি: *Bacillus thuringiensis* (Bt) নামক মৃতিকাবাসী বহু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছে যা কীট-পতঙ্গনাশক। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে *Bacillus thuringiensis*-এর একটি জিন ভূত্বা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ক্ষতিকারক কর্তব্যের প্রতিরোধী ভূত্বা জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।
12. কোন উদ্ভিদে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো এসিডের জিন স্থানান্তর হয়েছে? [JU-D, Set-A: 23-24]
- A. সরষা B. জোতার ঘাস C. তুলা D. ভূটী
- SOWHY** উদ্ভিদের ওপত মান উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির স্থিতি: রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড স্টিকারী জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্রাসমিড DNA-এর মাধ্যমে জোতার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে।

PRIME TEST

01. ‘বায়োটেকনোলজি’ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন হাঙ্গেরীর কৃষি একোপলী-
 (A) Gottlieb Haberlandt (B) Karl Ereky
 (C) I. Potrykus (D) Novo Nordisk
02. কালচার মিডিয়াম ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান কোনটি?
 (A) সুক্রোজ (B) অ্যাপার
 (C) ফাইটোহরমোন (D) সবগুলো

০৩. হাফোফিল থেকে বিটা কার্বোফিল তৈরির কয়টি জিন পোটেন রাইসে প্রতিস্থাপিত হয়েছে?
- ① ১টি ② ২টি ③ ৩টি ④ ৪টি
০৪. ট্রান্সমেনিক উদ্ভিদ কি?
- ① নতুন প্রকার উদ্ভিদ ② বিকসিমেট DNA যুক্ত উদ্ভিদ
③ উদ্ভিদ ④ কোমটাই নয়
০৫. সর্বপ্রথম কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রাপ্তি আবিষ্কৃত হয়?
- ① *E. coli* ② *A. tumefaciens*
③ *V. cholerae* ④ *C. parvum*
০৬. বিকসিমেট DNA প্রতিবেদন বহুল ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়া কোমটাই?
- ① *Plasmidium* ② *Agrobacterium tumefaciens*
③ উদ্ভিদ ④ কোমটাই নয়
০৭. ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা মানব ইনসুলিন কী নামে পরিচিত ছিল?
- ① হো-ইনসুলিন ② হোমোজেন ③ মোডেলিন ④ হিউমুলিন
০৮. ইনসুলিন কত ধরনের আমিনো এসিড সমন্বয়ে গঠিত?
- ① ৫১ ② ১৬ ③ ১৭ ④ ১৮
০৯. ক্যালস স্ট্রিং জন্য প্রয়োজনীয় অংশমাত্রা-
- ① ১০' - ১৫' সে. ② ১৭' - ২০' সে.
③ ২০' - ২৭' সে. ④ ৩০' - ৩৫' সে.
১০. জিন এর ক্রোমি ঘট-
- ① ভেন্টের মাধ্যমে ② রিস্ট্রিক্টকটিক ক্রোমি দ্বারা
③ PCR প্রযুক্তির মাধ্যমে ④ সবগুলো
১১. কোন পদ্ধতিতে রিকসিমেট DNA কলিমিত জিন বদল করে কি অ শনাক্ত করা হয়?
- ① PCR পদ্ধতিতে ② Restrictiondigestion-এর মাধ্যমে
③ জেনেটিক প্রোব দ্বারা ④ সবগুলো
১২. নিম্নের কোন তথ্যটি ইন্টারফেরনের জন্য সঠিক?
- ① ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে
② Natural killer cells এর ক্ষমতা কমিয়ে দেয়
③ B & T লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে
④ আন্টিবডি উৎপাদন করে
১৩. জল পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA এর মাধ্যমে তার ছব্ব প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজনু সৃষ্টি করার কৌশলকে কী বলে?
- ① DNA ক্রোমি ② জিন ক্রোমি
③ রিস্ট্রিক্টকটিক ক্রোমি ④ সবগুলো
১৪. GMMs কি?
- ① রাসায়নিকভাবে রূপান্তরিত বস্তু ② গবেষণাগারে সৃষ্ট অণুজীব
③ বাণিজ্যিকভাবে রূপান্তরিত অণুজীব ④ কোনটিই নয়
১৫. জিন প্রকৌশলে DNA এর বর্তিত অংশ কোন এনজাইম জোড়া লাগায়?
- ① অ্যামাইলেজ ② এডেনিউরিয়েজ ③ লাইগেজ ④ লাইপেজ
১৬. পোন্ডেন রাইসে কোন ভিটামিন থাকে?
- ① এ ② বি ③ সি ④ ডি
১৭. মানুষের দেহকোষে সোমোসোমের সংখ্যা-
- ① ১ জোড়া ② ২২ জোড়া ③ ২৩ জোড়া ④ ৪৬ জোড়া
১৮. কোন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী তোষা পাটের জীবন রহস্য তথা জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করেছেন?
- ① ড. ইনাম আলী ② ড. আবুল হাসান ③ ড. মাহবুব আলম ④ ড. মাকসুদ আলম
১৯. কোন টিস্যুতে রোগজীবাণু থাকে না?
- ① জাইলেম ② মেরিস্টেম ③ ফ্লোয়েম ④ পেরিস্টেম
২০. বামনের টিক্সিসার রিকসিমেট DNA প্রযুক্তিতে উৎপাদিত কোন হরমোনটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?
- ① থাইরক্সিন ② সোমোট্রোফিন ③ ইনসুলিন ④ গ্লুকাগন

☺ Answer Analysis ☺

01.B	02.B	03.D	04.C	05.A	06.B	07.D	08.A	09.B	10.D
11.D	12.A	13.C	14.C	15.C	16.A	17.C	18.D	19.B	20.B

অম্বায়
৬২

জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

জীববিজ্ঞান
১ম পত্র

সাজেশনস	RATINGS		
	***	**	*
বস্তুসংস্থান	খাদকের শ্রেণিবিভাগ	পিরামিড	-
অভিযোজন	লোনা মাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ অভিযোজনের উদাহরণ	জলজ উদ্ভিদ	মরুজ উদ্ভিদ
প্রাণিজৈবিক অঞ্চল ও বাংলাদেশের বন্যজল	এভেমিক ফনা, বিলুপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ	প্রাণিজৈবিক অঞ্চল, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	বন্যজল

TOPIC-01 ইকোলজিক্যাল পিরামিড

01. Ecological পিরামিড:

- সংখ্যার পিরামিড: প্রতি খাদ্যতন্ত্রের জীবের সংখ্যা দেখায়।
- বায়োমাস/জীবতন্ত্রের পিরামিড: প্রতিটি খাদ্যতন্ত্রের মোট বায়োমাসের পরিমাণ দেখায়।
- শক্তির পিরামিড: প্রতিটি খাদ্যতন্ত্রের বায়োমাসে শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।
- উৎপাদক থেকে বিভিন্ন জীবতন্ত্রের মধ্য দিয়ে খাদ্যশক্তির প্রবাহকে খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন বলে।
- ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্যতন্ত্রকে ট্রফিক লেভেল (Trophic level) বলে।

02. শক্তিশ্রবাহ:

- পর্যায়- শক্তি অর্জন, শক্তির ব্যবহার, শক্তির স্থানান্তর
- বৈশিষ্ট্য:
 - শক্তির প্রবাহ একমুখী।
 - শক্তির মূল উৎস সৌরশক্তি।
 - সৌরশক্তি প্রথমে উৎপাদকের দেহে আহরিত হয় এবং পরে তা বিভিন্ন খাদকে স্থানান্তরিত হয়।
 - খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমবায় ঘটে।
 - শক্তি প্রবাহে থার্মোডিনামিক্স এর ১ম ও ২য় সূত্র সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।
- প্রবাহিত হওয়ার ধরণ: উৎপাদক, ভূগোষ্ঠী খাদক, মাংসাশী খাদক।

TOPIC-02 জীবের অভিযোজন

01. মরুজ উদ্ভিদ (জেরোফাইট):

- চারপ্রকার- খরা এড়ানো, কৌশলে খরা এড়ানো, খরা সহ্যকারী, খরা প্রতিরোধী।
- এদের মূল খুব গভীরে যায় অথবা মাটির কাছাকাছি অধিক জায়গা নিয়ে বিকৃত থাকে।
- মরুজ উদ্ভিদের প্রবেদন চাপ অধিক থাকে, ফলে নেতিয়ে না পড়ার সহ্য শক্তি বেড়ে যায়। পাতা ও কাণ্ডের বহিঃত্বকে কিউটিকল থাকে।
- কাণ্ডের মেকানিক্যাল টিস্যু ও পরিবহণ টিস্যু সুগঠিত, মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট ও ঘন সল্লিবেশিত। এটি পানির অপচয় রোধ, পানি ধরে রাখা এবং গাছকে খরাসহিষ্ণু করার কৌশল।
- উদাহরণ: ফনিমনসা (*Opuntia dillenii*), শতাব্দী উদ্ভিদ (*Agave americana*), খেজুর (*Phoenix sylvestris*, *P. dactylifera*, *P. acaulis*), করবী (*Nerium indicum*), ঘৃতকুমারী (*Aloe vera*), শতমূলী (*Asparagus racemosus*), আকন্দ (*Calotropis procera*), দুধ লতা (*Euphorbia tenucalli*), পাখরকুচি (*Bryophyllum*)।

02. জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রোফাইট):

- নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কান্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা মধ্যপর্ব বিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙ্গরবদ্ধ ভাসমান উদ্ভিদের কান্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।
- জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে মূল থাকে না বললেই চলে।

- কাত ও পাতার বহিঃস্থক ফিটিনয়ুস থাকে না, বা কম থাকে। পত্রকেন্দ্রের গ্রহণী কোষ নত থেকে পড়ে। এদের মূল ও কাত বড় বড় বায়ুকণ্ডী থাকে।
- মেকানিকাল টিস্যু খুবই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব শক্ত হয় না, অবিকল জলজ উদ্ভিদে অঙ্গ উগায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।
- প্রতিকারের ক্ষমতায় জলজ উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ:

মূল-জসমান জলজ	কুহিণা (Eichhornia crassipes), স্ট্রোফিল (Pistia stratiotes), ওলিফা (Wolffia), স্পাইরোডেলা (Spirodella)
মূলবদ্ধ পত্র-জসমান জলজ	মাপলা (Nymphaea nouchali), পদ্ম (Nelumbo nucifera), সিংগারা (Trapa), মাখনা (Euryale), পানিকলা (Ottelia)
মূলবদ্ধ-নিমজ্জিত জলজ	হাইড্রিলা (Hydrilla verticillata), পাতা শেওল (Vallisneria), পাতা কঁকি (Potamogeton)
মূল-নিমজ্জিত জলজ	কঁকি (Ceratophyllum), ন্যাজাস (Najas indica)
উচ্চ উদ্ভিদ	পানি মরিচ, হেলেন্ডা, কলমিলতা (Ipomoea aquatica), কেশরদাম (Ludwigia repens), ধান (Oryza sativa), ভশনি শাক (Marsilea minuta aquatica)

১১. লোনা মাটির উদ্ভিদ (হ্যালোফাইট):

- মূল জলমূল বা ঠেসমূল থাকে বা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত থাকে।
- অনেক উদ্ভিদে শ্বাসমূল বা নিউমেটোরফার থাকে। মাটির নিচের মূল থেকে শ্বাসমূল মাটির উপরে উঠে আছে। এদের গায়ে শ্বাসছিদ্র থাকে।
- লোনা মাটির উদ্ভিদে প্রবেশন কম হয়।
- অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়।

উদাহরণ: বেরা (Rhizophora conjugata), কেওড়া (Sonneratia apetala), পল (Xylocarpus moluccensis), গোলপাতা (Nipa fruticans), হারগোলা (Acanthus illicifolius), সুন্দরী (Heritiera fomes), গেওয়া (Excoecaria agallocha), ধুন্দুল (Xylocarpus granatum)।

TOPIC-03

প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল ও বনাঞ্চল

১১. প্রাণি ভৌগোলিক অঞ্চল এর শ্রেণীবিভাগ:

অঞ্চলের নাম	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম
প্যালিআর্কটিক অঞ্চল	চোবক মাছ, ব্ল্যাক ফিশ, হরিণ, ভালুক, ভোঁদর, বলগা হরিণ, উট, গরু, কবুতর, ফ্রেমিংগো, উটপাখি, পেলিকন, এলিগেটর প্যাডেল ফিস, সাকারফিস, ক্যাটফিস ইত্যাদি।
ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (বাংলাদেশ)	হাতি, বাঘ, গীবন, ভালুক, ওরাংউটাং, টাপীর, বাদুর, কবুতর, ফিঙে, কোকিল, ব্র বার্ড, ময়ূর, কুমির, ওইসাপ, কই, কাতলা, মৃগেল, ক্যাট ফিস, পাঙ্গাস, উড়ু ব্যাঙ, বনকই ইত্যাদি।
অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল	ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, কোয়েলা, ওমব্যট, গ্লাউপাস, অপোসাস, লায়ার বার্ড, ক্যাসোয়ারি কাকাতোয়া, টিয়া, এয়ু, বার্ডস অব প্যারাডাইস, কাঠঠোকরা, কিউই, ফেনোডন, টিফলপস, লাং ফিস, টুয়াটার, ক্যামোয়ারি ইত্যাদি।
নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল	ভালুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসাম, উটপাখি, রিয়া, অস্ট্রিচ, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিংবার্ড, কুমির, কচ্ছপ, কোরাল, সাপ, বোয়া, ভাইপার, বাইন মাছ, ক্যাটফিস, লার্গফিস, পিরানহা, অ্যানাকোভা, য়ায়াট টরটয়জ ইত্যাদি।
ইথিওপিয়ান অঞ্চল	পরিলা, শিম্পানজী, লেমুর, হাতি, ভোঁদর, হায়না, গভার, আর্মডিভো, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখি, বাজ, শকুন, সারস, ফিঙে, কুমির, ওইসাপ, বোয়া, পাইথন, ক্যাটফিস, লার্গফিস, বেবুন, আইবেক্স ইত্যাদি।
নিআর্কটিক অঞ্চল	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়াছা, নেকড়ে, মেরুশিয়াল, ভালুক, ক্যাঙ্গারু, বাইসন, লালহরিণ, পেলিকান, শকুন, টার্কিস, হামিংবার্ড, ফিঙে, কচ্ছপ, এলিগেটর, কুমির, প্রবাল, সাপ, স্যালামাভার, প্যাডেল ফিস, বো ফিন, সাকার ফিস, ক্যাটফিস, বাইসন ইত্যাদি।

- ওরিয়েন্টাল অঞ্চল: প্রধান চারটি উপ-অঞ্চলে ভাগ করা যায়-
i. ভারতীয় উপঅঞ্চল ii. ইন্দো-চীন উপঅঞ্চল
iii. ইন্দোমালয় উপঅঞ্চল iv. সিংহলীয় উপঅঞ্চল

02. সোয়াম্প ফরেস্ট: মিঠাপানি বা স্বাদুপানির জলাশয় দ্বারা জলাবদ্ধ বন। সিলেটের উত্তরাংশে জলাবদ্ধ বন (Swamp forest) আছে। এটি বাতারুল জলাবন হিসেবে পরিচিত। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ নল খাপড়া (Phragmites karka), কাশ (Saccharum spontaneum), ইকড়া বাস (Erianthus ravennae)। বৃক্কের মধ্যে হিজল (Barringtonia acutangula) এবং করচ গাছ (Pongamia pinnata) প্রধান। বাংলাদেশের একমাত্র বনা গোলাপ (Rosa involucrata) এখানে পাওয়া যায়।

TOPIC-04

বিশুদ্ধপ্রায় জীব ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

০১. বিশুদ্ধপ্রায় উদ্ভিদ:

উদ্ভিদের শ্রেণী	নাম/বৈজ্ঞানিক নাম
ফার্বর্গীয় উদ্ভিদ	Psilotum triquetrum Tectaria chattagramica
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	Cycas pectinata Podocarpus nerifolia Gnetum funiculare
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	কোরদ- Licuala peltata মল্লিকা কঁকি- Aldrovanda vesiculosa বাংলাদেশের এডেমিক { রোটোলা- Rotela cimpliciuscula ফুদে বড়লা- Knema bengalensis তালি পাম- Corypha taliera Roxb আগর- Aquillaria agallocha জলি গোলাপ- Rosa involucrata

০২. বিশুদ্ধপ্রায় প্রাণী:

প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
মিঠা পানির কুমির	Crocodylus palustris
রাজশকুন	Sarcogyps calvus
নীলগাই	Boselaphus tragocamelus
গুড়ক	Platanista gangetica
ঘড়িয়াল	Gavialis gangeticus
রয়েল বেঙ্গল টাইগার	Panthera tigris
বন কই	Manis pentadactyla
বেঙ্গল কুফ কাইটা	Kachuga kachuga
মহাশোল	Tor tor
উল্লুক	Hylobates hoolock
তক্তক	Gekko gekko
হাতি	Elephas maximus

০৩. ইনসিটু ও এক্স-সিটু কনজারভেশনের উদাহরণ:

ইনসিটু-কনজারভেশন	এক্স-সিটু সংরক্ষণ
স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।	জীবকে তার নিজস্ব বাসস্থান থেকে এনে অন্যত্র সংরক্ষণ।
• জাতীয় উদ্যান	• উদ্ভিদ উদ্যান বা
• ইকোপার্ক	বোটানিক্যাল গার্ডেন
• সাফারী পার্ক- বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, ডুলহাজরা, কক্সবাজার (প্রথম) ও বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, পাজীপুর (দ্বিতীয়)।	• বীজ ব্যাংক
• বন্যজীব অভয়ারণ্য	• জিন জিন ব্যাংক, জিন ব্যাংক
• গেম রিজার্ভ- টেকনাফ গেম রিজার্ভ (বর্তমানে এটি বন্য জীব অভয়ারণ্য)।	• চিড়িয়াখানা
• বিশ্ব ঐতিহ্য- সুন্দরবন (1997- ইউনেস্কো ও 1999- বাংলাদেশ সরকার)।	• ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ
	• ডিএনএ সংরক্ষণ
	• নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ
	• পরাগরেণু সংরক্ষণ।

২১. বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ কোথায় অবস্থিত?
A. রামসাগর B. ডুলহাজরা
C. মাধবকুন্ড D. টেকনাফ
২২. গোলপাতার বৈজ্ঞানিক নাম-
A. *Heritiera fomas* B. *Nipa fruticans*
C. *Excoecaria agallocha* D. *Phoenix palaudosa*
২৩. কোনটি সুন্দরবনে সাধারণত জন্মায় না?
A. হিতাল B. ধুন্দুল
C. টাইগার ফার্ন D. বাঁশ
২৪. *Ex-situ* কনজারভেশনের উদাহরণ হলো—।
A. সাফারি পার্ক B. ইকোপার্ক C. বোটানিক্যাল গার্ডেন
D. ন্যাশনাল পার্ক E. গেম রিজার্ভ
২৫. UNESCO কত সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ বলে ঘোষণা দিয়েছে?
A. ১৯৯৫ সালে B. ১৯৯৬ সালে C. ১৯৯৭ সালে
D. ১৯৯৮ সালে E. ১৯৯৯ সালে
২৬. সুন্দরবনের প্রাণি নয় কোনটি?
A. *Panthera tigris* B. *Elephas maximus*
C. *Apis dorsata* D. *Axis axis*
E. *Crocodylus porosus*
২৭. তেলা গর্জনের বৈজ্ঞানিক নাম কি?
A. *Dipterocarpus alatas* B. *Dipterocarpus costatus*
C. *Dipterocarpus gracilis* D. *Dipterocarpus turbinatus*
E. কোনটিই নয়
২৮. ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ কোনটি?
A. জাকুল B. তেঁতুল C. বট
D. পাইন E. গরান
২৯. 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' হলো-
A. উপাদক B. মুখ্য খাদক C. গৌণ খাদক
D. টারশিয়ারি খাদক E. বিয়োজক
৩০. উদ্ভিদ সংরক্ষণে (Conservation) প্রধান ভূমিকা পালন করে কোন সংস্থা?
A. ICBN B. ICNCP C. IUCN
D. IAPT E. UNDP
৩১. টিপাখি কোন মহাদেশে পাওয়া যায়?
A. অস্ট্রেলিয়া B. আফ্রিকা C. এশিয়া
D. এন্টার্কটিকা E. আমেরিকা

PRIME TEST

০১. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড় কোনটি?
A. হাকালুকি হাওড় B. টাঙ্গুয়ার হাওড়
C. কালঙ্গা হাওড় D. হাটহাজারী হাওড়
০২. ভূপৃষ্ঠের প্রধান ভেজিটেশন হলো-
A. লাইকেন B. মস
C. ঘাস D. পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ
০৩. সব জীবের সব কমিউনিটি মিলিতভাবে কী তৈরি করে?
A. পপুলেশন B. বায়োম
C. ইকোসিস্টেম D. বায়োস্ফিয়ার
০৪. সুন্দরবনে কোনটি জন্মে না?
A. বোহাল B. টাইগার ফার্ন
C. হারগোজা D. পীতরাজ
০৫. কোন স্তরের জীব সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহার করে?
A. চতুর্থ B. তৃতীয়
C. দ্বিতীয় D. উপাদক
০৬. যেসব উদ্ভিদ পানিতে জন্মে তাদের বলে-
A. জেরোফাইট B. হাইড্রোফাইট
C. এপিফাইট D. হ্যালোফাইট

০৭. বীজকে শুকিয়ে কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করলে বহুকাল সংরক্ষণ করা যায়?
A. -20°C B. -15°C
C. -10°C D. -5°C
০৮. নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড হয়-
A. শক্ত B. সরল
C. মোটা D. লম্বা মধ্যপর্ববিশিষ্ট
০৯. সর্বপ্রথম 'প্রজাতি' বা species শব্দটি কে ব্যবহার করেন?
A. John Ray B. Earnest Mayr
C. Dobzhansky D. E. P. Odum
১০. হ্রদের কোন অঞ্চলে ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্রাংকটন থাকে?
A. লিটোরাল B. লিমনেটিক
C. প্রোফান্ডাল D. পেলাজিক
১১. ওরিয়েন্টাল অঞ্চলটি কয়টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত?
A. ৩টি B. ৪টি
C. ৫টি D. ৬টি
১২. লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদকে কী বলে?
A. হ্যালোফাইট B. এপিফাইট
C. হাইড্রোফাইট D. জেরোফাইট
১৩. বায়োস্ফিয়ার ও এর সাথে ভৌত পরিবেশের আন্তঃক্রিয়াকে বলে-
A. ইকোসিস্টেম B. বায়োম
C. ইকোস্ফিয়ার D. মিথস্ক্রিয়া
১৪. জীব সম্প্রদায়ের স্তর বিন্যাস কয়টি?
A. ৫ B. ৬
C. ৩ D. ৮
১৫. ইকোসিস্টেমে শক্তির প্রবাহ কয়টি পর্যায়ভুক্ত?
A. ২ B. ৩
C. ৪ D. ৫
১৬. কোনটি শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নয়?
A. উভমুখী
B. মূল উৎস সৌরশক্তি
C. খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় ঘটে
D. সৌরশক্তি প্রথমে উপাদকের দেহে আহরিত হয়
১৭. মরু অঞ্চলে জন্মানো উদ্ভিদকে কী বলে?
A. জেরোফাইট B. এপিফাইট
C. হাইড্রোফাইট D. হ্যালোফাইট
১৮. কোনটি মূল্যবদ্ধ পত্রভাসমান জলজ উদ্ভিদ?
A. শাপলা B. হাইড্রিলা
C. কচুরিপানা D. কলমিলতা
১৯. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কোন বায়োমের অন্তর্গত?
A. নদী B. হ্রদ
C. হাওড়-বাওড় D. ওয়েটল্যান্ড
২০. কোনটি ইন সিটু কনজারভেশনের মাধ্যম নয়?
A. গেম রিজার্ভ B. ইকোপার্ক
C. বোটানিক্যাল গার্ডেন D. সাফারি পার্ক

Answer Analysis

01.A	02.C	03.D	04.D	05.D	06.B	07.A	08.D	09.A	10.B
11.B	12.A	13.C	14.A	15.B	16.A	17.A	18.A	19.D	20.C


অধ্যায় ০৯ প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

জীববিজ্ঞান
২য় পত্র

সাজেশনস্	RATINGS		
	★★★	★★★	★
প্রাণি জগতের শ্রেণীবিন্যাস	সিলোম, প্রতিসাম্য	জগন্তর, মেরুদণ্ড	খন্ডকায়ন, নটোকর্ড
বিভিন্ন পর্বের নাম, বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ সমূহ	কর্ডাটা, আর্থ্রোপোডা, নিভারিয়া	পরিফেরা, মলাস্কা	গ্রাটিহেলমিনথেস, নেমাটোডা, অ্যানিলিডা, একাইনোডার্মাটা

TOPIC-01 শ্রেণীবিন্যাস

- সিলোম:
 - অ্যাসিলোমেট বা সিলোমবিহীন: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes
 - স্যুডেসিলোমেট বা অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত: Loa Loa (চোখ কৃমি), Nematoda, Rotifera, Kinorhyncha
 - ইউসিলোমেট বা প্রকৃত সিলোমযুক্ত: Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata
- প্রতিসাম্য:
 - দ্বি-অরীয়- Ctenophora জাতীয় প্রাণীর দেহ (যেমন: *Ceoloplana*), Anthozoa
 - অপ্রতিসাম্য- *Pila globosa*, *Amoeba*, *Sponge*
 - দ্বিপার্শীয় প্রতিসাম্য- মানুষ, ব্যাঙ, প্রজাপতি
 - অরীয় প্রতিসাম্য- হাইড্রা, জেলিফিশ (*Aurelia*), সী অ্যানিমন (*Metridium*)
 - গোলায় প্রতিসাম্য- *Volvox*, *Radiolaria*, *Heliozoa*
- জগন্তর:



- নটোকর্ড:
 - নটোকর্ডযুক্ত- ব্যাঙ, সাপ, মানুষ, অ্যাসিডিয়া
 - নটোকর্ডবিহীন- কেঁচো, ঘাসফড়িং, মশা, প্রোটোজোয়া, একাইনোডার্মাটা
- খন্ডকায়ন:
 - সমখন্ডকায়ন- কেঁচো (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ), মানুষ (অভ্যন্তরীণ)
 - অসমখন্ডকায়ন- পতঙ্গ
 - খন্ডকায়নবিহীন- সমুদ্রতারা, ঝিনুক
- পৌষ্টিক নালী:
 - প্যারাজোয়া (নালিযুক্ত)- Porifera
 - এক্টারোজোয়া (নালিবিহীন)- Cnidaria থেকে Chordata

TOPIC-02 বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

- পরিফেরা (স্পঞ্জ/ছিদ্রাল প্রাণী):
- বৈশিষ্ট্য:

Mnemonic: নীল পরী কেন স্বপ্নে আসল।

নীল ↓ নালীতন্ত্র	পরী ↓ Pore (ছিদ্র)	কেন ↓ কোয়ানোসাইট	স্বপ্নে ↓ স্পঞ্জোসিল, স্পঞ্জিন, স্পিকিউল	আসলো ↓ অস্টিয়া, অসকুলাম
------------------------	--------------------------	-------------------------	--	--------------------------------

- উদাহরণ: *Spongilla lacustris* (মিঠা পানির স্পঞ্জ); *Cliona celata* (লাল স্পঞ্জ); *Scypha gelatinosum* (মটকা স্পঞ্জ)।

- নিভারিয়া (সমুদ্রের Rain forest বা সমুদ্রের ফুল):
- বৈশিষ্ট্য:

Mnemonic: সিলেটের মেসে পানির দ্বিতরী

সিলেটের ↓ সিলেটেরন	মেসে ↓ মেডুসা, মেসোপিয়া	পানির ↓ পদ্মপ, নিভোসাইট, নেমাটোসাইট
--------------------------	--------------------------------	---

- উদাহরণ: *Hydra viridis* (হাইড্রা); *Aurelia aurita* (জেলিফিশ); *Physalia physalis* (ফাইসেলিয়া); *Pennatula sulcata* (সমুদ্রের কলম)।
- গ্রাটিহেলমিনথেস (চ্যাপ্টা কৃমি):
- বৈশিষ্ট্য:

Mnemonic: শিখা আপু তিন বারের মত চোর

শিখা ↓ শিখাকোষ	আপু ↓ অ্যাসিলোমেট, প্যারেনকাইমা কোষ, পরজীবী	তিন বারের মত ↓ ত্রিতরী	চোর ↓ চোষক
----------------------	---	------------------------------	------------------

- উদাহরণ: *Fasciola hepatica* (দকৃত কৃমি); *Taenia solium* (কিতা কৃমি)
- নেমাটোডা (নলাকার প্রাণী):
- বৈশিষ্ট্য:

Mnemonic: Neymar এর সংশর কেটে, অতঃপর দ্বিপা ও সিউল গেল

Neymar ↓ Nematoda	সংশর ↓ রক্তসংবহনতন্ত্র নাই	কেটে ↓ কিউটিকুল Tube within a tube
-------------------------	-------------------------------------	---

অতঃপর ↓ অন্তঃপরজীবী	দ্বিপা ↓ দ্বিপার্শীয় প্রতিসম	সিউল গেল ↓ সিউডোসিলোমেট
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

- উদাহরণ: *Ascaris lumbricoides* (গোলকৃমি); *Wuchereria bancrofti* (ফাইলেরিয়া কৃমি); *Loa loa* (চোখ কৃমি)।
- মলাস্কা (কষোজ প্রাণী):
- বৈশিষ্ট্য:

Mnemonic: মেটাল হিমু আর্মি, র্যাবকে পিটায়

মেটাল ↓ ম্যাটল	হিমু ↓ হিমোসিল, হিমোসায়ানিন	আর্মি ↓ অ্যামিবোসাইট	র্যাব ↓ র্যাডুলা	কে ↓ কাইটিন
----------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------

- উদাহরণ: *Pila globosa* (আপেল শামুক); *Loligo edulis*; *Lamellidens marginalis* (বাদু পানির ঝিনুক); *Sepia officinalis* (ক্যাটল ফিশ)।
- অ্যানিলিডা (অঙ্গুরীমাল প্রাণী):
- বৈশিষ্ট্য:

Mnemonic: ATN এর PC বন্ধ ও খণ্ড খণ্ড

A ↓ Annelida	T ↓ Trochophore	N ↓ Nephridia	
P ↓ Parapodia	C ↓ Cuticle	বন্ধ ↓ বন্ধ সংবহনতন্ত্র	বড় বড় ↓ প্রকৃত বৃষ্টকায়ন

- উদাহরণ: *Metaphire posthuma* (কেঁচো); *Hirudinaria manillensis* / *medicinalis* (জৌক); *Tubifex tubifex* (রক্ত কীট)।

- ৬ প্রবাল গঠনকারী উপাদান হলো- ক্যালসিয়াম ও চুন।
- ৬ কলা সংগঠন মাত্রার পর্ব হলো- Cnidaria
- ৬ নিভারিট্যানদের সংশ্লিষ্ট অঙ্গাণু হলো- সেমাস্টোসিট।
- ৬ Cnidaria পর্বের প্রাণীদের দেহাকাকারের গহন হলো- সিলেস্টেরন।
- ৬ সিলেস্টেরনের কাজ- পরিপাক-সংরক্ষণ।
- ৬ কোন পর্বের প্রাণীরা স্বতন্ত্রপাতি প্রদর্শন করে- Cnidaria
- ৬ কোরালস ও জেলিফিশ হলো- Cnidaria পর্বের।
- ৬ সাগর-পাখা কলা হয়- Cnidaria পর্বের গণনিয়াক।
- ৬ প্রথম দ্বিহস্ত্রী প্রাণীবিংশ পর্ব- Platyhelminthes।
- ৬ Platyhelminthes পর্বের প্রাণীদের কলা হয়- চ্যাপ্টাকৃমি (flat worm)।
- ৬ প্রথম টিসু-অঙ্গ মাত্রার গঠন দেখা যায়- Platyhelminthes পর্বে।
- ৬ শিখা কোষ (রেচনকাকার কোষ) কোন পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য- Platyhelminthes
- ৬ ফলক কৃমির বৈজ্ঞানিক নাম- *Fasciola hepatica*।
- ৬ Nematoda পর্বের নামকরণ করেন- Gegenbaur (1851)।
- ৬ Nematoda পর্বের প্রাণীদের সাধারণ নাম- সুতাকৃমি বা গোলকৃমি।
- ৬ অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন সম্পন্ন প্রাণী দেখা যায় প্রথম কোন পর্বে- Nematoda
- ৬ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পৌষ্টিকনাশি বিদ্যমান থাকে কোন পর্বের প্রাণীদের- Nematoda
- ৬ যৌন দ্বিহস্ত্রী কোন পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়- Nematoda
- ৬ গোলকৃমির লার্ভা দশার নাম- হ্যাণ্ডিডিফর্ম।
- ৬ *Loa loa* কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত- Nematoda
- ৬ Mollusca পর্বের নামকরণ করেন- Johnston।
- ৬ নরম দেহ বা কফোজ প্রাণী নামে পরিচিত- Mollusca পর্বের প্রাণী।
- ৬ প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব- Mollusca
- ৬ Mollusca পর্বের প্রাণীর দেহ আবরণের নাম- ম্যাটল।
- ৬ Mollusca পর্বের প্রাণীদের খোলক তৈরি হয়- ম্যাটলের স্রবণে।
- ৬ Mollusca পর্বের প্রাণীদের সংবেদনতন্ত্র- অর্ধমুক্ত ধরনের।
- ৬ Mollusca পর্বের প্রাণীদের Shell তৈরি হয়- ক্যালসিয়াম।
- ৬ মূল বিবরে 'র্যাডুলা' নামক অংশ থাকে কোন পর্বের প্রাণীতে- Mollusca
- ৬ Annelida পর্বের প্রাণীদের কলা হয়- 'Ringed worms' বা অঙ্গুরমালা।
- ৬ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেহ দেখা যায়- Annelida পর্বের প্রাণীদের।
- ৬ Annelida পর্বের প্রাণীদের লার্ভার নাম- ট্রোকোফোর।
- ৬ Annelida পর্বের প্রাণীদের পদান রেচন অঙ্গ- নেফ্রিডিয়া।
- ৬ চলন অঙ্গ সিটি বা প্যারাপো দেখা যায়- Annelida পর্বে।
- ৬ ফেটোর বায়োলাজিক্যাল নাম- *Metaphire posthuma*।
- ৬ Arthropoda পর্বের নামকরণ করেন- Von Siebold (1845)।
- ৬ প্রাণিজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব- Arthropoda (প্রায় ৮০%)।
- ৬ কোন পর্বের প্রাণীরা সন্ধিপদী প্রাণী হিসেবে পরিচিত- Arthropoda
- ৬ হিমোসিল পাওয়া যায়- Arthropoda-পর্বে।
- ৬ Arthropoda পর্বের প্রাণীর সংবেদনতন্ত্র কোন ধরনের রক্তপূর্ণ-হিমোলিম্ব।
- ৬ Arthropoda পর্বের প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ- মালপিজিয়ান নালিকা।
- ৬ পলদা চিওঁড়র বৈজ্ঞানিক নাম- *Macrobrachium rosenbergii*।
- ৬ Echinodermata পর্বের নামকরণ করা হয়েছে কোন বৈশিষ্ট্য থেকে- কাঁটাময় ত্বক।
- ৬ কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক- Echinodermata
- ৬ বহিঃকঙ্কাল কষ্টকময়- Echinodermata পর্বের।
- ৬ সমুদ্রতারা এর প্রতিসাম্যতা- পঞ্চদ্বয়ীয়।
- ৬ Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীদের চলন অঙ্গ- নালিকা পদ।
- ৬ পানি সংবেদনতন্ত্র উপস্থিত- Echinodermata- পর্বে।
- ৬ Echinodermata এর সংবেদনতন্ত্রের কাজ করে- পেরিহিমাল তন্ত্র।
- ৬ Echinodermata-র জীবনচক্রে কোন ধরনের লার্ভা বিদ্যমান- মুক্ত স্তরগণীল।
- ৬ Chordata পর্বের প্রাণীদের জীবনে কতটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান- ৪টি (শ্রাব্যরক্ত, নটোকর্ড, গলবিলীয় ফুলকা রক্ত ও পায়ু পট্যাংগ)।
- ৬ ক্যাডেসের রক্তসংরক্ষনতন্ত্র কোন প্রকৃতির বন্ধ প্রকৃতির।
- ৬ Chordata পর্বের উপপর্ব কয়টি- ৩টি (Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata)।
- ৬ ক্যাডেসের অর্ধপিত্ত দেহের- অধীমতলে।
- ৬ Urochordata উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণি কয়টি- ৩টি (Larvacea, Thaliacea, Ascidiacea)।
- ৬ Urochordata উপপর্বের প্রাণীদের কোন অংশে নটোকর্ড থাকে- লেজে।
- ৬ Ascidia-র দেহে কীটরূপ লার্ভা দশা বিদ্যমান- ট্যাডপোল।
- ৬ ম্যাক্রোটম নামক প্রাণি দেখা যায়- Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীতে।
- ৬ Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীদের সুস্থিত বৈশিষ্ট্য আবরণ হলো- ওরফোড।
- ৬ কোন উপপর্বের প্রাণীতে নটোকর্ড মেরুতে পরিণত হয়- Vertebrata
- ৬ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ- পুত্র বা কিডনি।
- ৬ কোন প্রাণীর মাছকলো হ্যাণ্ডিফিশ নামে পরিচিত- Myxini।
- ৬ Myxini প্রাণীর প্রাণীর ফুলকারক্তের সংখ্যা- ৫-১৫ জোড়া।
- ৬ Cephalaspidocephali প্রাণীভুক্ত মাছকলোর সাধারণ নাম- ল্যাম্প্রে।
- ৬ ল্যাম্প্রে ফুলকারক্তের সংখ্যা- ৭ জোড়া।
- ৬ কোন প্রাণীর প্রাণীর দেহ সম্পূর্ণ কোমলাস্থি নির্মিত- Chondrichthyes।
- ৬ *Scoliodon laticaudus* এর আইশ- প্রায়শঃ।
- ৬ হেটেরোসার্কাল লেজ পাওয়া যায় কোন প্রাণীতে- Chondrichthyes।
- ৬ হাঙরের পুচ্ছ পাখনা কোন ধরনের- হেটেরোসার্কাল।
- ৬ জীবিত মাছের কত ভাগ Actinopterygii প্রাণীভুক্ত- ৯৬%।
- ৬ কোন প্রাণীর মাছের অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়- Actinopterygii।
- ৬ Actinopterygii প্রাণীভুক্ত মাছের আইশ কোন ধরনের-সাইক্লোয়েড ও টিলেইড
- ৬ হোমোসার্কাল লেজ পাওয়া যায় কোন প্রাণীতে- Actinopterygii
- ৬ রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ হলো- Actinopterygii
- ৬ ইলিশ কোন প্রাণীভুক্ত প্রাণী- Actinopterygii
- ৬ পিত্তকার পাখনাবিশিষ্ট মাছের প্রাণি হলো- Sarcopterygii
- ৬ বিজলীদের দ্বারা মাছ, কোন প্রাণীর মাছ থেকে হুলচর প্রাণীর অবিস্তার ঘটেছে- Sarcopterygii
- ৬ লার্ভিফিশ কোন প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত- Sarcopterygii
- ৬ পুচ্ছ পাখনা ডাইফিসার্কাল- Sarcopterygii
- ৬ Sarcopterygii প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হলো- গ্যানেয়েড আইশ।
- ৬ প্রথম হুলচর ও চতুষ্পদী মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাণি- Amphibia।
- ৬ কোন প্রাণীর জীবনচক্রে ফুলকা খসন বিদ্যমান- ব্যাঙ।
- ৬ Amphibia প্রাণীভুক্ত প্রাণীর লার্ভা কোনটির সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়- ফুলকা।
- ৬ উভচরের পচাৎপদে আঙ্গুরের সংখ্যা- ৫টি।
- ৬ কুমিরের ত্বক কোন ধরনের আইশ দ্বারা আবৃত-এপিডার্মাল।
- ৬ শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী- সাপ (Naja naja)।
- ৬ অর্ধপিত্ত অসম্পূর্ণ ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট- Reptilia-দের।
- ৬ সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট অর্ধপিত্ত কোন সর্পীসূপে দেখতে পাওয়া যায়- কুমির।
- ৬ সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী- কচ্ছপ।
- ৬ Aves প্রাণীভুক্তদের কোন পদ ডানায় পরিণত হয়- অগ্রপদ।
- ৬ পরিপাকতন্ত্রে খণ্ডিকাকার রূপ এবং পেশিময় গিজার্ড থাকে কোন প্রাণীর প্রাণীদের- Aves
- ৬ বাংলাদেশের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম- *Copsychus saularis*।
- ৬ বিবর্তনিক দিক থেকে সবচেয়ে আধুনিক কোন প্রাণীর প্রাণীরা- Mammalia।
- ৬ স্তন্যপায়ীদের বক্ষ ও উদর গহ্বরকে পৃথক রাখে- ডায়াফ্রাম।
- ৬ মধ্যচ্ছদার উপস্থিতি বা Presence of diaphragm কোন প্রাণীর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য- Mammalia।
- ৬ Mammalia প্রাণীভুক্ত প্রাণীদের করোটিক স্নায়ু- ১২ জোড়া।
- ৬ মানুষ কোন প্রাণীভুক্ত প্রাণী- Mammalia
- ৬ মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম- *Homo sapiens*।
- ৬ বাংলাদেশের জাতীয় পশুর বৈজ্ঞানিক নাম- *Panthera tigris*।
- ৬ Mammalia প্রাণীর উড়তে সক্ষম প্রাণী- বাদুড়।

(11-12, 13-14, 15-16)

18. শিমাকোম নামের কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. *Carcharias maurus* B. *Hirudo medusoides*
C. *Nelusetta maurus* D. *Hydra viridis*
19. পানির স্তরভিত্তিক প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. Porifera B. *Hydra viridis*
C. Mollusca D. *Hydra viridis*
- [S.Why] এককোষীয় প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
20. পানিসত্তা প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
21. Arthropoda প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 13
22. প্রাণীসত্তা প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. Mollusca B. *Nelusetta*
C. Annelida D. *Hydra viridis*
23. কোন প্রাণীসত্তা 'tube within a tube' পদ্ধতি দেখায়? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. *Taenia solium* B. *Metaphysa prothyma*
C. *Loa loa* D. *Aurelia aurita*
24. Ammoeete প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. Hagfish B. *Loa loa*
C. Lamprey D. *Loa loa*
25. কোন প্রাণীসত্তা ইলেক্ট্রিক সিস্টেম দেখায়? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. Porifera B. Annelida
C. Platyhelminthes D. Nematoda
26. *Loa loa* কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. Protozoa B. Platyhelminthes
C. Nematoda D. Annelida
27. প্রাণীসত্তা প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. শিমাকোম B. প্রাণীসত্তা
C. প্রাণীসত্তা D. প্রাণীসত্তা
28. কোন প্রাণীসত্তা মধ্যে Metamorphosis ঘটে? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
- A. নিউক্লিয়া B. প্রাণীসত্তা
C. প্রাণীসত্তা D. প্রাণীসত্তা
- [S.Why] প্রাণীসত্তা প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
29. প্রাণীসত্তা প্রাণীসত্তা কোন প্রাণীসত্তা? (M. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5

35. 'নালিকা পদ' কোন পর্বের প্রাণীর চলনাদ? [জ.বো-২০২১]

- A. Nematoda B. Annelida
C. Mollusca D. Echinodermata

①

36. কোন শ্রেণীতে প্রাকয়েড আইশ রয়েছে? [DU: 19-20; RU: 17-18]

- A. তারামাছ B. হাঙ্গর
C. কইমাছ D. কাতল মাছ

②

37. কোমলাস্থি বিশিষ্ট মাছে কোন ধরনের আইশ থাকে? [DU: 16-17; RU: 18-19, 10-11]

- A. সাইক্লয়েড B. টিনয়েড
C. প্রাকয়েড D. কোনটিই নয়

③

38. কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীটি উড়তে পারে? [DU: 05-06]

- A. *Macropus rufa* B. *Balaenoptera musculus*
C. *Pteropus giganteus* D. *Ornithorhynchus anatinus*

④

39. হেটেরোসার্কাল ধরনের লেজ কোনটির? [JU-D, Set-T, 2021-22]

- A. *Labeo rohita* B. *Scoliodon laticaudus*
C. *Tenualosa ilisha* D. *Protopterus annectens*

[S@why] হেটেরোসার্কাল লেজ:

- খুটি হাড় বা ডগফিশ: *Scoliodon laticaudus*।
- করাত মাছ: *Pristis pectinata*।
- ইলেকট্রিক মাছ: *Torpedo torpedo*।
- হাড়ি হাড়র: *Eusphyra blochii*।
- শংকর মাছ: *Trygon bleekeri*।

40. কব্জিকথিলে কয়জোড়া ফুলকা রক্ত থাকে? [RU-C, Venus-1, Set-I, 2021-22]

- A. 3-4 B. 5-7
C. 8-10 D. 10-12

①

41. কোন শ্রেণিতে Lobe-finned fish পাওয়া যায়? [JU-D, Set-Q, 23-24]

- A. Sarcopterygii B. Actinopterygii
C. Chondrichthyes D. Petromyzontida

②

42. *Copsychus saularis* কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রাণী? [RU: SG-2, 18-19]

- A. অ্যাক্টিভিয়া B. রেপটিলিয়া
C. অ্যান্ডিন D. ম্যামালিয়া

③

43. ভেনাস হার্ট পাওয়া যায় কোন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে? [DU-7Clg-A, 23-24]

- A. অ্যাকটিনোপটেরিজ B. অ্যানাক্টিভিয়া
C. রেপটিলিয়া D. ম্যামালিয়া

[S@why] কইমাছের পৃষ্ঠ ও পুষ্টি CO₂ সমৃদ্ধ রক্ত সংবহন করে। এজন্য একে ভেনাস হার্ট বা শিরা ধর্মপণ্ড বলে। এছাড়াও কইমাছ রশ্মিমুক্ত পান্যাবিশিষ্ট সাইক্লয়েড আইশে আবৃত এবং হোমোসার্কাল পেজবিশিষ্ট, যা অ্যাকটিনোপটেরিজ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

44. সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃদপিণ্ড কোন প্রাণীতে দেখা যায়? [DAT, 2021-22]

- A. কুমীর B. কচ্ছপ
C. টিকটিকি D. সাপ

④

45. আমাদের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম কি? [DAT, 2021-22; AFMC, 2020-21]

- A. *Gracula religiosa* B. *Copsychus saularis*
C. *Passer domesticus* D. *Columba livia*

①

46. নিচের কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে? [DAT, 2021-22]

- A. বাদুড় (Bat) B. ক্যাঙ্গারু (Kangaroo)
C. প্রাটিপাস (Platypus) D. নীল (Seal)

[S@why] প্রাটিপাস স্তন্যপায়ী প্রাণীর Prototheria উপশ্রেণীভুক্ত। এরা ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে অপরিণত নবজাতকের জন্ম হয়।

47. কোন প্রাণীতে 7 জোড়া গলবিদীয় ফুলকারক্ত পাওয়া যায়? [জ.বো. ২০১৯]

- A. *Myxine glutinosa*
B. *Petromyzon marinus*
C. *Scoliodon laticaudus*
D. *Channa punctatus*

②

PRIME TEST

01. কোনটি প্রাণীবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ?

- (A) জিনগত বৈচিত্র্য (B) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য
(C) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (D) সবগুলো

02. নিচের কোন পর্বের প্রাণী অ্যাসিলোমেট নয়?

- (A) Cnidaria (B) Annelida (C) Ctenophora (D) Porifera

03. নিচের কোনটি নিভারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্য নয়?

- (A) অরীয় প্রতিসাম্য (B) মেসোগ্রিয়া থাকে
(C) দেহ ম্যান্টল দ্বারা আবৃত (D) নেম্যাটোসিস্ট থাকে

04. কোন প্রাণীটি ইউসিলোমেট নয়?

- (A) যকৃত কৃমি (B) ইলিশ (C) সমুদ্র তারা (D) কেঁচো

05. এপিডার্মাল আইশ কোন প্রাণীদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়?

- (A) সরীসৃপ (B) অষ্টময় মাছ (C) তরুণাষ্টময় মাছ (D) উভচর

06. সাধারণভাবে কোন পর্বের প্রাণীরা স্পঞ্জ নামে পরিচিত?

- (A) Porifera (B) Cnidaria (C) Nematoda (D) Platyhelminthes

07. কোন পর্বে জীবনের যে কোনো দশায় বা আজীবন গলবিলের দু'পাশে কয়েক জোড়া ফুলকা রক্ত থাকে?

- (A) Porifera (B) Platyhelminthes
(C) Chordata (D) Cnidaria

08. প্রাণীবিন্যাসের সবচেয়ে বড় একক কোনটি?

- (A) Phylum (B) Class (C) Order (D) Family

09. Reptilia শ্রেণির প্রাণির পায়ে কয়টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল থাকে?

- (A) ২টি (B) ৩টি (C) ৪টি (D) ৫টি

10. কোনটি কুনোব্যাঙ-এর বৈজ্ঞানিক নাম?

- (A) *Rana tigrina* (B) *Duttaphrynus melanostictus*
(C) *Zakerana asmati* (D) *Salamandra salamandra*

11. কোন পর্বের প্রাণীদের দেহ প্রাচীর অন্টিরা নামক অনংখ্য ছিদ্রযুক্ত?

- (A) Annelida (B) Porifera (C) Mollusca (D) Arthropoda

12. মুখবিলের কাইটিন নির্মিত একটি রেতি-জিহ্বা বা র্যাডুলা থাকে কোন পর্বে?

- (A) Platyhelminthes (B) Chordata
(C) Porifera (D) Mollusca

13. কোন পর্বের প্রাণীর দেহ মৌখিক ও বিমৌখিক তলে বিন্যাস?

- (A) Porifera (B) Echinodermata (C) Mollusca (D) Annelida

14. শিখা কোষ বিদ্যমান কোন পর্বের প্রাণীতে?

- (A) Annelida (B) Arthropoda (C) Chordata (D) Platyhelminthes

15. নিভারিয়া পর্বের লার্ভা দশার নাম কী?

- (A) প্যারেনকাইমুলা (B) প্র্যানুলা (C) ট্র্যাকোফোর (D) অ্যামোনিট

16. কোন শ্রেণির মাছগুলো ল্যাম্প্রে নামে পরিচিত?

- (A) Petromyzontida (B) Myxini
(C) Chondrichthyes (D) সবগুলো

17. কোনটি দর্শন ও অসম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট?

- (A) Amphibia (B) Aves (C) Reptilia (D) সবগুলো

18. মুখস্থিত গুরাল হৃত রয়েছে নিচের কোনটির?

- (A) Porifera (B) Urochordata
(C) Cephalochordata (D) Vertebrata

19. পৃষ্ঠ পাখনা ডাইফি-সার্কাল নিচের কোন শ্রেণির প্রাণীর?

- (A) Chondrichthyes (B) Actinopterygii
(C) Sarcopterygii (D) Amphibia

20. কোনটির দেহগহ্বর পেলি ও প্যারেনকাইমাসমৃদ্ধ?

- (A) *Spongilla proliferans* (B) *Scypha gelatinosum*
(C) *Taenia solium* (D) *Pila globosa*

Answer Analysis

01.D	02.B	03.C	04.A	05.A	06.A	07.C	08.A	09.D	10.B
11.B	12.D	13.B	14.D	15.B	16.A	17.C	18.C	19.C	20.C

संख्या ३५

ପ୍ରାର୍ଗର ପରିଚିତି

विपिन

সূচকসমূহ	RATINGS		
	***	**	*
চলন, নেভিগেটাসিটি	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	প্রাচীন প্রক্রিয়া	
বহির্ভূত	নর্শন কৌশল, সৈনিক	শৌর্যবাহিনী	
অন্যতম	গঠন	অন্যতম	
বহির্ভূত	গঠন ও বৈশিষ্ট্য, অর্থগত	বাহুগত	প্রাচীন

TOPIC-01

द्वितीयः

- মিয়ানমারে প্রকৃত আবিষ্কারক-অধ্যয়ন ট্রেনিং (১৯৪৪ সালে), নামকরণের
আয়োজন নিম্নোক্ত (১৯৪৮ সালে), পুনরুদ্ধারিত কর্মসূচি আবিষ্কারক-ট্রেনিং
- প্রকৃত কৃষিকার নয় বরং প্রকৃত ট্রেনিংয়ের নামানুসারে শ্রমিকের নামকরণ করা হয়
- মিয়ানমারে মুক্তিযুদ্ধ, মিয়ানমারে, মিয়ানমারে প্রকৃত ট্রেনিং ও পুনরুদ্ধারিত কর্মসূচি প্রকৃত

विष्णु ध्यातुं शक्नुते

হাইড্রার নাম	কলিকতার সংখ্যা	বর্ণ
<i>Hydra viridissima</i> (<i>Chironomydra viridissima</i> <i>Hydra viridis</i>)	৪-৫টি	সবুজ বর্ণ
<i>Hydra vulgaris</i> (বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়)	৬-১০টি	এর বর্ণহীন বা ফস্ফ বা হলুদা হলুদ-বাদামী বর্ণের (উত্তরমিসিক)
<i>Hydra guayanaensis</i>	৬টি	সাদা বা হলুদা সোলাপী বর্ণের
<i>Pelmatohydra oligactis</i> (<i>Hydra fusca</i>)	৬টি	বাদামী বর্ণের (একমিসিক)

হুম্মার এপিগ্রাফিনে নাত বরনের কোদ থাকে

Mnemonic: निद्रा पदमावृत्त गच्छे

নি ↓	জ ↓	প ↓	স ↓	স ↓	হ ↓	ই ↓
নিম্নতম	জননকেন্দ্র	সেই	সংস্কৃতি	সামু	গ্রহি	ইন্দ্রিয়শিক্ষা
		কেন্দ্র	কেন্দ্র	কেন্দ্র	কেন্দ্র	কেন্দ্র

ମହେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତପୁର ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ୧ ବଜ୍ରରେ ଶେଷ ହାବେ

Mnemonic: "कमल नदी"


প ↓ শেখী আবদুল কোষ	স ↓ সংস্কৃতি কোষ	স ↓ সুন্দর কোষ	প ↓ প্রতি কোষ	ই ↓ ইন্টারন্যাশনাল কোষ
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------

दशैकाद निम्न दशैकाद ज्ञानः

- **কুণ্ডল বা কান্ডা চলন:** লতা দৃঢ়, একটা লুপ তৈরি করে। ফ্লোকা চলন বা শুরাশোক চলন নামে পরিচিত।
- **সমরসন্ধি বা ডিম্বাকৃতি বা দ্রুত চলন:** সাধারণ চলন, প্রতিবৃদ্ধ পরিবেশে, ২ বার লুপ তৈরি হয়, 180° বাকির চল।
- **টাইডিং বা অ্যামিব্রের চলন বা পান ঢাকতির সাহায্যে চলন:** এটি কোষ থেকে নিঃসৃত বস চলনভাবে পিছল করলে এ ধরনের চলন হয়।
- **জমা:** পানঢাকতির ক্রাস্টোডার্ম ইতিহাসের থেকে কুবুদন সৃষ্টি করে।
- **সাঁতার:** কর্নিকুলসকে ড্রেটরের মতো আন্দোলিত করে চলাচল করে।
- **ক্রেঞ্চলো বা ক্রামপডি বা Crawling:** কোন বস্তুর আঁকড়ে ধরে চলন সম্পন্ন করে, এ প্রক্রিয়া আরোহন ও অবরোহন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।
- **টীটা বা নবুদী চলন বা Tentacular:** নেত্রের ভর কর্নিকার উপর প্রবেশ চাচল করে।

- ନିମ୍ନର ସାଫୋଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ: ନିମ୍ନର ଦୁଇ କର ସାଫୋଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶନର ନାମମ ଲିଖାଇ କର ।
- ଆରୋହଣ ବା Climbing: ଉଚ୍ଚତ ଉଚ୍ଚତମ ସାମାନ୍ୟତାବଦ ସଫ କର୍ମକାନ୍ଦେ ସଫୁଲ କର ଲିଖାଇ କର ।

➤ **महेश्वर चन्दन धडिया:**



➤ **କୋଫିନିଟି**

- কোম্বের ভিতর আমির ও বেলাল গঠিত বিপ্লবোদ্ভিন্দ নামক বিদ্রোহ তরফে পূর্ণ ব্যাপকতাটি নেমোটেসিলি।
- বিদ্রোহী চরিত্র ১৯৫৫ সালে নিজেদের জড়িত প্রবিশেষে নেমে ২৫ প্রকার কোম্বোডিটি নামক করেন। ইহাচারে নিজেদের ৪ প্রকারে নেমোটেসিলি পাওয়া যায়।

নেমোটোসিস্ট	কাজ
সিগনোটিকা বা সেনিট্যান্ট	শিকারের দেহে সূক্ষ্ম বিন্দু অথবা বিন্দুসমূহ উপস্থাপিত প্রবেশ করিয়ে তাকে অসহ্য করে তোলে।
ডাফ্রেন্ট	শিকার জীবিত থাকে রাখতে সাহায্য করে।
স্ট্রেকটোলিন	এক প্রকার অম্লসো বস অম্ল অথবা চ্যানে এক
থুটিল্যান্ট	শিকার ধ্বংসে সাহায্য করে।
স্টেরিওপ্রিন থুটিল্যান্ট	এক প্রকার অম্লসো বস অম্ল অথবা চ্যানে এক
(কুপের)	শিকার রাখতে সাহায্য করে।

TOPIC-02

चक्रवर्ति

➤ **বৈশিষ্ট্য:**

- সুন্দরীতে প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির ও বাংলাদেশে ২০ প্রজাতির বাসফলি আছে।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে অধিক দেখা যায় *Oryza chinensis* Thunberg.
- অনেক প্রজাতি আছে যারা মূলতঃ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। এদেরকে শরণার্থী বলে।
- বাসফলি এর মনে কয়েকটিইয়া ডিউটিকল লিঙ্গ অবস্থ থাকে। এই কারণেতে ফেরাউই বলে।

बनारसी एव दामिद शर्म:

५ मङ्गलः

- হাইপোথায়মাস গ্রন্থি
- ৬টি স্নায়ু বহন করে
- বড়ব্র কন্ডল গ্লে, গ্লে, আর্ট্রিক, হাইপোফিস)
- ১ প্রোভা পুজাতি করে
- ১ টি সরলানিক বা ওসেলি করে
- ১ প্রোভা আবেদা করে (বেশ, শেভিসেল ও ক্রোমোম (১টি করে বিভক্ত))
- মাইওপিক (মাইওবলেট)

५ रु०

- অর্থ, বণ্য, পশ্যাদি ভাবে বিভক্ত
- পৃথক ক্রুরাইট-টার্ম, অর্ধক্রুরাইট-টার্ম, পশ্যক ক্রুরাইট-টার্ম (উপরে উল্লিখিত থাকে না), অর্ধক্রুরাইট-টার্মকে প্রোমিটার বলে।
- শাসন (নয় প্রোমিটার)
- পা (কল্প, প্রোমিটার, ক্রুরাইট, টার্ম ও টার্ম), পশ্যক নেত্র ৩টি পা থাকার প্রোমিটারে প্রোমিটার বলে।
- ভান (সামান্য ভান-এসিট, এসিট, পশ্যক ভান উল্লিখিত নহে)

উদয়:

- 11টি খতে বিভক্ত থাকে
- টিম্পেনাম (শ্রবণ ধলি)
- শাসবন্ধ (৪ জোড়া- ১ম থেকে ৮ম খন্ড পর্যন্ত)
- পায়ু ও জননঅঙ্গাদি (৯ম ও ১০ম খন্ডকে অবস্থিত), ওভিপজিটর (৮ম ও ৯ম খন্ডতে অবস্থিত)

ঘাসকড়ি-এর মুখোপাসের বিভিন্ন অংশ:

নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ল্যাব্রাম	উপরের ওষ্ঠ গঠন করে, ম্যান্ডিবলের দিকে খাবার ঠেলে দিতে ও স্বাদ নিতে সাহায্য করে। ঘাসকড়ি এর নিচের ঠোঁটকে ল্যাব্রাম বলে।
ম্যান্ডিবল	করাভের মতো দাঁতযুক্ত ২টি উপাসের নাম ম্যান্ডিবল বা চোয়াল
ম্যাক্সিলা	১টি অংশে বিভক্ত- কার্ডো, স্টাইপস, ল্যাসিনিয়া, গ্যালিয়া, ম্যাক্সিলারি পাল্প। স্বাদ গ্রহণ, খাদ্য চূর্ণ করণ
ল্যাবিয়াম	এটি খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করে, সংবেদী অঙ্গ ও উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করে
হাইপোফারিঞ্জ	অপর নাম উপজিহ্বা যা খাদ্যবস্তুকে নড়াচড়া করে লালার সাথে মেশায়

- রক্ত সংবহনতন্ত্র: রক্তের পথ অনুসারে প্রাণীদেহে দু'ধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়: i. মুক্ত বা ল্যাকুনার (ঘাসকড়ি, চিংড়ি, পতঙ্গ, মলাস্কা জাতীয় প্রাণী) ii. বন্ধসংবহন: অ্যানিলিড জাতীয় নন কর্ডেট ও কর্ডেট প্রাণীদেহে। ঘাসকড়ি-এর হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১০০-১১০ বার এবং সমগ্রদেহে রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে ৩০-৬০ মিনিট সময় লাগে।
- ঘাসকড়ি এর রক্তচূর্ণ দেহ গহ্বরকে হিমোসিল বলে।
- ঘাসকড়ি রক্তকে হিমোলিম্ফ বলে।
- ঘাসকড়ি এর হৃদপিণ্ড সাত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট যা ত্রিকোণাকার এলারি পেশী দ্বারা সজ্জিত।

খসনতন্ত্র:

- সাইরক্স বা শ্বাসরক্ত
- ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী
- ট্রাকিল কোষ বা প্রান্তীয় কোষ
- বায়ুথলি

- ঘাসকড়ি এর শ্বাসরক্ত ১০ জোড়া (২ জোড়া বক্ষীয় ৮ জোড়া অক্ষীয়)।

- রূপান্তর: একটি জীবের পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্তি যখন কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনীয় ধাপের মাধ্যমে ঘটে তখন এ ধরনের জীবান্তর পরিবর্তনকে রূপান্তর বলে।

প্রকারভেদ:

- অসম্পূর্ণ রূপান্তর: যে রূপান্তরে একটি পতঙ্গ ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ন দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে (ঘাসকড়ি ও তেলাপোকার রূপান্তর)। অসম্পূর্ণ রূপান্তরের ধাপগুলো হলো- ডিম → নিম্ন → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী।

- সম্পূর্ণ রূপান্তর: যে রূপান্তরে শিশুপ্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোন আঙ্গিক মিল থাকে না তাকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে (মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর)। সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে লার্ভা বলে। সম্পূর্ণ রূপান্তরের চারটি ধাপ: ডিম → লার্ভা → পিউপা → ইমোগো (পূর্ণাঙ্গ)।

- এর বোলস ত্যাগকে নির্মোচন বা মোল্টিং বলে।

খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক:

- ঘাসকড়ির যে মুখোপাস, তা শুধু চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বলে, এদের খাদ্য গ্রহণকে চর্বন এবং মুখোপাসকে চর্বন-উপযোগী বা ম্যান্ডিবুলেট মুখোপাস বলে।
- পরিপাক: প্রাকমৌলিক প্রকোষ্ঠ → লালারস → শর্করার আর্দ্রবিয়োজন → গিজার্ড → সেন্ট → মেসেন্টেরন → সরল ও তরল → পরিশোধিত → হিমোসিল।

TOPIC-03

কুই মাছ

➤ কুই মাছের বৈশিষ্ট্য:

- 14°C এর নিচে বাঁচতে পারে না।
- কুই একটি অহিমর মাছ।
- অকৃতি স্ট্রীমলাইভ (পানির ভেতর গতি বাধা পায় না)।
- কুই মাছ প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: i. মাথা ii. দেহকাণ্ড iii. লেজ

➤ আইশ:

- কুই মাছের আইশ সাইক্লয়েড ধরনের।
- উচ্চ আইশগুলোকে বলে সার্কুলাস।
- বসন্তকাল ও গ্রীষ্মকালে আইশের বৃদ্ধি বেশি হয়।

➤ কুই মাছের বাহ্যিক গঠন:

- গৃষ্ঠ- পাখনা: ১৫-১৬টি পাখনা- রশ্মি থাকে।
- বক্ষ- পাখনা: প্রতিটি পাখনায় ১৬-১৭টি পাখনা রশ্মি থাকে।
- শ্রোণী- পাখনা: প্রতিটি পাখনায় ৯টি পাখনা রশ্মি থাকে।
- পায়ু- পাখনা: ৭ টি পাখনা রশ্মি থাকে।
- পুচ্ছ- পাখনা: ১৯টি পাখনা রশ্মি থাকে।

➤ বায়ুথলি বা পটকা:

- দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।
- প্রবতা রক্ষাকারী অঙ্গ এবং শব্দ উৎপাদনে সহায়তা করে।
- বায়ুথলিতে O_2 , N_2 , CO_2 থাকে। তবে O_2 এর পরিমাণ বেশি থাকে।
- নিউমেটিক নালী থাকে যা ওয়েবেরিয়ান অসিকলের সাথে যুক্ত থাকে।
- ওয়েবেরিয়ান অসিকল বায়ুথলির সাথে অন্তর্কর্ষের সংযোগ ঘটায়।

- রক্ত সংবহনতন্ত্র: অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনী CO_2 এবং বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনী O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।

• ডর্সাল অ্যাওটার শ্বাসনমুহ:

শাখা	রক্ত সরবরাহের স্থান
সাবক্রেভিয়ান ধমনী	বক্ষপাখনা, বক্ষচক্রে
সিলিয়াকো মেসেন্টারিক ধমনী	আন্ত্রিক অঙ্গে
প্যারাটাল ধমনী	দেহপ্রাচীরে
রেনাল ধমনী	বৃক্কে
ইলিয়াক ধমনী	শ্রোণী পাখনায়
কডাল ধমনী	লেজে

• হৃদপিণ্ড:

- ২টি প্রকোষ্ঠ। যথা- ১টি অ্যাট্রিয়াম এবং ১টি ভেন্ট্রিকল।
 - সাইনাস ভেনোসাস নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ থাকে।
 - CO_2 যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, হৃদপিণ্ডকে ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃদপিণ্ড বলে।
- রক্তের গতিপথ: দেহ → সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাম্বাস আটারিওসাস → ফুলকা
 - সংক্ষেপে সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র: দেহের সম্মুখ অংশ → সম্মুখ কার্ডিনাল, হৃদয় → ডাটাস ক্যুডিয়ে (সাইনাস ভেনোসাসে উন্মুক্ত) ← পশ্চাৎ কার্ডিনাল ← দেহের পশ্চাৎ অংশ

➤ খসনতন্ত্র:

- চারজোড়া ফুলকা খসন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
- ফুলকাগুলো ফুলকা আর্চ ও ফুলকা রেকারের সমন্বয়ে গঠিত।
- ফুলকায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে। ফুলকা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: i. ফুলকা রেকার ii. ফুলকা আর্চ iii. ফুলকা সূত্র
- প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ: কানকো উত্তোলিত → ফুলকা প্রকোষ্ঠ বন্ধ → চোখন বন্ধ তৈরি → মৌখিক কপাটিকা খুলে যায় → পানি প্রবেশ।
- নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ: পেশী সংকোচন → মুখছিদ্র বন্ধ → ফুলকা প্রকোষ্ঠের ডিউ উন্মুক্ত → পানি বের হয়ে যায়।

➤ প্রজনন ও প্রজননতন্ত্র:

- পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা শুক্রাণু ও স্ত্রী মাছে একজোড়া লম্বা ডিম্বাশয় (আকারে বড় এবং ডিম্বাণীহীন) পটকার নিচের উদরীয় গহ্বরের পশ্চাতে শায়িত।
- ডিম প্রচুর কুসুম (Yolk) সমৃদ্ধ।
- কুই মাছ ২ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরী হয়।
- অন্তঃপ্রজননের জন্য ১ বছর বয়সেই প্রজননক্ষম হয়।

- [illegible]

11. Hydra-ৰ বহিঃস্থকৈ কোষ নয় কোনটি? [DU-A. 22-23]

A. ক্ষুণ্ণদীয় কোষ B. সংবেদী কোষ
C. পেশি-আবৰণী কোষ D. নিডোসাইট

12. নিম্নৰ কোনটি Hydra-তে নিডোব্লাস্ট বহন কৰে না? [DU.14-15]

A. হাইপোষ্টোম B. কৰ্ৰিকা C. এপিডার্মিস D. পাদ চাকতি

SO WHY হাইড্ৰাৰ পাদ চাকতি ছাড়া তাত দেহৰ সৰ্বত্ৰ নিডোব্লাস্ট কোষ বহন কৰে। এৰ কাজ মূলত খাদ্য গ্ৰহণ। চলন ও আত্মৰক্ষায় অংশ গ্ৰহণ।

13. কোনটি Hydra-ৰ ইণ্টারসিটিয়াল কোষে অনুপস্থিত? [JU-D, Set-L. 23-24]

A. এডোপ্লাজমিক জালিকা B. ৰাইবোজোম
C. নিউক্লিয়াস D. মায়েলিন

14. হাইড্ৰাৰ দেহে নমনীয় ককাল হিসেবে কাজ কৰে কোনটি? [JU-D, Set-J. 2022-23]

A. এপিডার্মিস B. গ্যাস্টোডার্মিস
C. ইণ্টারসিটিয়াল কোষ D. মেসোগ্লিয়া

15. হাইড্ৰাৰ নেমাটোসিস্টেৰ আবৰণ কোন উপাদানে তৈরি? [JU-D, Set-N. 2022-23]

A. Chitin B. Cellulose
C. Glycogen D. Starch

ASPECT

19. বাংলাদেশের যে দেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে:

A. নেফ্রিডিয়া B. শিখাকোষ
C. মালপিজিয়ান নালিকা D. মালপিজিয়ান বডি

20. ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়া কখনো চূপসে যায় না, কারণ- [RU-C, পত্রা-২: 23-24]
 A. ইন্টিমা B. অ্যাড্রিয়াম
 C. ভিক্সিলারী D. টিনিডিয়া **D**
21. ঘাসফড়িং-এর সমগ্র দেহে একবার রক্ত প্রবাহ সম্পন্ন হতে কত মিনিট সময় লাগে? [RU-C, Feldspar-I: 22-23]
 A. 5 - 10 B. 10 - 20
 C. 20 - 25 D. 30 - 50 **D**
22. ওমাটিডিয়ামের কোন অংশ আলো গ্রহণে সাহায্য করে? [RU-C, Feldspar-I: 22-23]
 A. কর্ণিয়া B. ক্রিস্টালাইন কোষ কোষ
 C. কর্ণিয়াজেন কোষ D. রেটিনুলার কোষ **B**
23. ঘাসফড়িং এর রূপান্তর কোন ধরনের? [CU-A. 23-24]
 A. সম্পূর্ণ রূপান্তর B. অসম্পূর্ণ রূপান্তর
 C. মেটাবোলাস D. হেমিমেটাবোলাস **B**
24. ঘাসফড়িং এর রক্ত কণিকার নাম কি? [MAT.2020-21]
 A. Hemocyte B. Thrombocyte
 C. Leukocyte D. Erythrocyte **A**
25. রুই মাছের বর্ণের নাম কি? [DU.16-17; JU:D,15-16]
 A. Cyprinidae B. Cypriniformes
 C. Cypriniforms D. Labeo **B**
26. রুই মাছের পৃষ্ঠ পাখনার কয়টি পাখনা-রশ্মি থাকে? [JU-D, Set-D. 20-21; CU. 18-19]
 A. 15-16 B. 9-10
 C. 11-12 D. 20-21

SO Why রুই মাছের বিভিন্ন পাখনায় পাখনা রশ্মির সংখ্যা:

পাখনা	পাখনা রশ্মির সংখ্যা	পাখনা	পাখনা রশ্মির সংখ্যা
পৃষ্ঠ	19টি	শ্রোণি	9টি
পৃষ্ঠীয়	15-16টি	পায়ু	7টি
বক্ষ	16-17টি		

27. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোন অংশটি নেই? [DU-A. 22-23; JUST: Unit-C, 19-20, 16-17; RU. 17-18]
 A. সাইনাস ভেনোসাস B. অলিন্দ
 C. বাবাস আর্টারিওসাস D. কৌনাস আর্টারিওসাস
- SO Why** রুই মাছের হৃৎপিণ্ডটি দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট: একটি অলিন্দ বা অ্যাড্রিয়াম এবং অন্যটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল। এছাড়া সাইনাস ভেনোসাস নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ রয়েছে। রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কৌনাস আর্টারিওসাস নেই। তার পরিবর্তে বাবাস আর্টারিওসাস নামক একটি গঠন দেখা যায় যা মূলত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্কীত গোড়াদেশীয় অংশ। এটি হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

28. যে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবল CO₂ সমৃদ্ধ রক্ত বাহিত হয় তাকে কী বলে? [RU:SG-2,18-19, JU: D, 18-19]
 A. ভেনাস হার্ট B. ডর্সাল হার্ট
 C. কৌনাস আর্টারিওসাস D. ডর্সাল অ্যাওর্টা **A**
29. রুই মাছের কোথায় CO₂-যুক্ত রক্ত থাকে? [GST-A. 23-24]
 A. হেপাটিক ধমনী B. অন্তর্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনী
 C. বহির্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনী D. ডর্সাল অ্যাওর্টা

S(B) Why রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র:

- অন্তর্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনী CO₂ এবং বহির্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনী O₂ সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।
- রুই মাছের হৃৎপিণ্ড হতে CO₂ সমৃদ্ধ রক্ত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা ও অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনির মাধ্যমে ফুলকায় যায়। সেখানে অক্সিজেন সমৃদ্ধ পানির সংস্পর্শে রক্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ হয়ে বহির্বাহী ফুলকা ধমনির মাধ্যমে ফুলকা ত্যাগ করে।

PRIME TEST

01. Hydra-র পুনরুৎপত্তিতে অংশগ্রহণ করে-

- A. হাইপোস্টোম B. দেহকান্ড
 C. পাদ-চাকতি D. কোনটিই নয়

02. Hydra-র অন্তঃস্থকের গ্রহি কোষ থাকে না-
 A. দেহে B. হাইপোস্টোমে
 C. কর্ণিকায় D. পদতলে
03. কত ঘণ্টার মধ্যে Hydra-র ব্যবহৃত নিডোসাইটটি প্রতিস্থাপিত হয়?
 A. 24 ঘণ্টা B. 36 ঘণ্টা C. 48 ঘণ্টা D. 72 ঘণ্টা
04. নিচের কোন প্রক্রিয়ায় হাইড্রার আরোহণ ও অবরোহণ সম্পন্ন হয়?
 A. ক্রমসংকোচন B. অ্যামিবয়েড চলন
 C. হামাওডি D. দেহের সংকোচন-প্রসারণ
05. Hydra-র প্রধান খাদ্য কোনটি?
 A. বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা B. ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী
 C. ছোট ছোট কুমি D. মাছের ডিম
06. কোন ঋতুতে হাইড্রার মুকুলোদগম বেশি হয়?
 A. গ্রীষ্মকালে B. বর্ষাকালে C. শীতকালে D. শরৎকালে
07. Chlorohydra viridissima নিচের কোনটির সাথে মিথোজীবিতা স্থাপন করে?
 A. লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের সাথে B. তাপসী কাকড়ার সাথে
 C. সী অ্যানিমনের সাথে D. Zoochlorella নামক শৈবালের সাথে
08. স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর ডিমপাড়ার অঙ্গ হলো-
 A. Ovule B. Spiracle C. Anal canal D. Ovipositor
09. ঘাসফড়িং-এর লালারসে কোন খাদ্য পরিপাককারী Enzyme থাকে?
 A. শর্করা B. আমিষ C. স্নেহ D. সবগুলো
10. হৃদযন্ত্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠের পাশে বিদ্যমান ত্রিভুজাকৃতির পেশিকে বলা হয়-
 A. অ্যালারি পেশি B. অ্যাওর্টা C. মধ্য পেশি D. চেম্বার মাসল
11. কোনটিতে টিনিডিয়া থাকে না?
 A. ট্রাকিয়া B. বায়ুথলি
 C. A ও B উভয় D. কোনটিই নয়
12. নিম্নোক্ত কোনটিতে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়?
 A. র‍্যাবডোম B. স্নায়ুতন্ত্র C. ক্রিস্টালাইন কোষ D. কর্ণিয়া
13. শীতের আগমনে কম তাপমাত্রায় জন্মের বৃদ্ধি রহিত হওয়াকে কী বলে?
 A. ইনস্টার B. মোল্টিং C. ডায়াপজ D. নিফ
14. প্রাথমিক গ্রহি কোন হরমোন উৎপন্ন করে?
 A. একডাইসন B. জুভেনাইল
 C. ACTH D. একডাইসিস
15. রাসায়নিকভাবে আইশের গঠন কী রূপ?
 A. চুন ও ইলাস্টিক তন্তু B. চুন ও কোলাজেন তন্তু
 C. চুন ও ডেন্টিন D. কোলাজেন তন্তু
16. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোনটি নেই?
 A. কপাটিকা B. সাইনাস ভেনোসাস
 C. বাবাস আর্টারিওসাস D. কৌনাস আর্টারিওসাস
17. রুই মাছের কোন রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস যুক্ত?
 A. RBC B. WBC
 C. Platelet D. Macrophage
18. রেটি মিরাবিলি কী?
 A. লালা গ্রহি B. বায়ু গ্রহি
 C. গ্যাস গ্রহি D. কোনটিই নয়
19. শুক্রাণু কী দিয়ে দেহ প্রাচীরে ঝুলানো থাকে?
 A. পেরিটোনিয়াম B. মেসোরিকিয়াম
 C. মেসোভেরিয়াম D. মেসেন্টারী
20. ১৫ দিন বয়সে রুইমাছের পোনার দৈর্ঘ্য কত হয়?
 A. ১৫ মি.মি. B. ১৮ মি.মি.
 C. ২৩ মি.মি. D. ৩০ মি.মি.

Answer Analysis

01.B	02.C	03.C	04.C	05.B	06.A	07.D	08.D	09.A	10.A
11.B	12.A	13.C	14.A	15.B	16.D	17.A	18.C	19.B	20.C

অধ্যায় ০৩ **পরিপাক ও শোষণ** **জীববিজ্ঞান ২য় পত্র**

সাজেশনস	RATINGS		
	★★★	★★	★
পরিপাকতন্ত্র	অগ্ন্যাশয়, যকৃত	পাকস্থলী, লিলা গ্রন্থি	দাঁত ও জিহ্বা
বল পরিপাক ও শোষণ	ক্ষুদ্রান্ত্র	পাকস্থলী	মুখগহ্বর
মূলত	-	BMI	বিভিন্ন রোগ

TOPIC-01 **পরিপাকতন্ত্র**

পরিপাকতন্ত্র:

- পৌষ্টিক নালী (৮-১০ মি.): মুখস্থিত → মুখবিবর → গলবিল → অন্ননালী → পাকস্থলী → ক্ষুদ্রান্ত্র (৬-৭ মি.) → বৃহদান্ত্র (১.৫ মি.) → পায়ু।
- পৌষ্টিক গ্রন্থি: লিলাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক, আন্ত্রিক।

- লিলাগ্রন্থি: মানুষের মুখগহ্বরে ২ পাশে ৩ জোড়া লিলাগ্রন্থি পাওয়া যায়।
ক. প্যারোটাইড: কানের নিচে থাকে, এটি সবচেয়ে বড়।
খ. সাবম্যান্ডিবুলার: নিম্ন চোয়ালের কোণিক অঞ্চলের নিচে থাকে, ফ্রেনুলাম নামক বিশেষ তুকে উন্মুক্ত হয়।
গ. সাবলিঙ্গুয়াল: জিহ্বার নিচে অবস্থান করে।
- গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি: পাকস্থলীর প্রাচীর পেশীবহুল এবং গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (gastric gland) সমৃদ্ধ। পাঁচ ধরনের কোষের কাজ:

কোষের নাম	নিঃসরণ ও কাজ
প্যারাইটাল/অক্সিনটিক কোষ	HCl
মিউকাস কোষ	মিউসিন
আর্জেন্টাফিন কোষ	গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর
ট্যাক/জাইমোজেনিক কোষ/পেপটিক কোষ	পেপসিনোজেন
গ্যাস্ট্রিন কোষ বা জি কোষ	গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন

- আন্ত্রিক গ্রন্থি: অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম স্রবণ করে।
ক. ১-২ L/day স্রবণ হয়
খ. pH-6.3-9; আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.010
গ. আন্ত্রিক রসের উপাদান: i. পানি: 98.5% ii. কঠিন পদার্থ: 1.5%।
- অগ্ন্যাশয়:
ক. এটি একটি মিশ্র গ্রন্থি (বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে)।
খ. অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে উইসাং নালী গঠন করে।
গ. চার ধরনের কোষ রয়েছে- (i) আলফা কোষ (α) → প্রকাগপ (ii) বিটা কোষ (β) → ইনসুলিন (iii) গামা কোষ (γ) পিপি কোষ → প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (iv) ডেল্টা কোষ (δ) → সোম্যাটোস্ট্যাটিন

- যকৃত:
ক. অপর নাম: জৈব রসায়নগার বা Organic laboratory বা জীবন সমুদ্রের কর্মমুখর পোতাশ্রয়।
খ. ৪টি খন্ডে বিভক্ত: ডান খন্ডক, বাম খন্ডক, কোয়ার্টেট ও কডেট। ডান খন্ডটি সবচেয়ে বড়।
গ. ওজন: ১.৫ থেকে ২ কেজি বা ১.৪৪-১.৬৬ কেজি।
ঘ. গ্রিসন'স ক্যাপসুল নামে পেরিটোনিয়াম আবরণে আবৃত।
ঙ. যকৃতের নিম্নতলে Gall bladder (পিত্তথলি) থাকে।
চ. যকৃতে প্রায় ৫০০ ধরনের জৈবনিক কার্যবলী সম্পন্ন হয় বলে বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেছেন।

- হ. কাজ: পিত্তরস তৈরি- এটি যকৃতের হেপাটোসাইট কোষ থেকে তৈরি হয়।
- জ. পিত্তরসের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য:
১. পিত্তরস (বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন)
২. পিত্তলবণ (সোডিয়াম টারোকলেট, সোডিয়াম গ্রাইকোকলেট)
- ঝ. যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার রূপরেখা:
১. সঞ্চয়ী ভূমিকা: গ্রাইকোজেন সঞ্চয়; রক্ত সঞ্চয় (যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে); ভিটামিন সঞ্চয় (পানিতে অদ্রবণীয় A, D, E, K; দ্রবণীয় B ও C এছাড়া সায়ানো কোবালামিন এসিড-B₁₂, ফলিক এসিড-B₉); খনিজদ্রব্য সঞ্চয়; পিত্তরস সঞ্চয়; লিপিড ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয়।
২. বিপাকীয় ভূমিকা: শর্করা বিপাক (গ্রাইকোজেনেসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস); প্রোটিন বিপাক; ফ্যাট বিপাক; RBC: হিমোগ্লোবিন; কোলেস্টেরল; পিত্ত উৎপাদন; হরমোন ডাউন; বিষ অপসারণ; তাপ উৎপাদন।

জেনে রাখা ভাল:

- গ্রাইকোজেনেসিস: গ্লুকোজ → গ্রাইকোজেন
- গ্রাইকোজেনোলাইসিস: গ্রাইকোজেন → গ্লুকোজ
- গ্রাইকোলাইসিস: গ্লুকোজ → পাইরুভিক এসিড
- গ্লুকোনিওজেনেসিস: নন-কার্বোহাইড্রেট (অ্যামিনো এসিড, গ্লিসারল) → গ্লুকোজ
- লাইপোজেনেসিস: অতিরিক্ত গ্লুকোজ → ট্রাইগ্লিসারাইড

TOPIC-02 **মুখ গহ্বরে খাদ্যের পরিপাক**

- পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দাঁতের সংকেত: $\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$
- দুধ দাঁতের (শিশুদের দাঁত) সংকেত: $\frac{I_2C_1M_2}{I_2C_1M_2} = \frac{5 \times 2}{5 \times 2} = 10 + 10 = 20$
- ৩য় পেশণ মোলার দাঁতকে আক্কেল দাঁত বলা হয়।

TOPIC-03 **পাকস্থলীতে খাদ্যের পরিপাক**

- একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্য ধারণ ক্ষমতা ১,৫০০ মিলিলিটার। পাকস্থলী দেখতে অনেকটা বাহালা পাঁচের মতো।
- পাকস্থলীর প্রাচীর পাঁচটি স্তরে বিভক্ত: বাইরে থেকে ভিতরে-
i. সেরোসা ii. পেশিস্তর iii. সাবমিউকোসা iv. মাসকিউলারিস মিউকোসা v. মিউকোসা: রুগী ও গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি।
 - মুখ থেকে চর্বি খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলীতে এসে ২ থেকে ৬ ঘণ্টা অবস্থান করে। পাকস্থলীর পেশি স্তর নানা দিকে সঙ্কলিত হয়ে মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পেটে পরিণত করে। এসময় গ্যাস্ট্রিক জুস স্রবিত হয়ে পাকস্থলীর যান্ত্রিক চাপে পেটের সাথে মিশে ঘন স্যুপের মতো তৈরি করে যা কাইম বা মণ্ড নামে পরিচিত।

TOPIC-04 **পরিপাকে এনজাইম ও হরমোনের ভূমিকা**

> প্রয়োজনীয় এনজাইম:

স্থান	খাবারের ধরন	এনজাইমের নাম
মুখ গহ্বর	শর্করা	ট্যালিন, মল্টেজ
পাকস্থলী	আমিষ	পেপসিন, রেনিন, জিলেটিনেস
	স্নেহ	গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ
অগ্ন্যাশয় রস (ক্ষুদ্রান্ত্র)	শর্করা	অ্যামাইলেজ, মল্টেজ
	আমিষ	ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোঅক্সিপেপটাইডেজ, অ্যামিনো পেপটাইডেজ, ট্রাইপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ, কোলাজিনেজ, ইলাস্টেজ
	স্নেহ	লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ

স্বাধীনতা সংগ্রামের তত্ত্ব

[illegible]

- ৬. সিক্রেটিন- অগ্ন্যাশয় রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৭. মানুষের জিহ্বার অঙ্গভাগে কোন ধরনের স্বাদকোরক (Taste bud) থাকে- মিষ্টতা।
- ৮. টায়ালিন ও মলটেন পাওয়া যায়- লালায়।
- ৯. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচক রস হলো- অ্যামাইলেজ।
- ১০. পাকস্থলীর স্রাটীরে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে স্তরগুলো যেভাবে বিন্যস্ত থাকে; সেরোসা → অমূর্দেখ্য পেশিস্তর → বৃদ্ধাকার পেশিস্তর → সাবমিউকোসা → মাসকিউলারিস মিউকোসা → মিউকোসা।
- ১১. যকৃতনালি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন পিত্তনালি তৈরি করে। এই অভিন্ন নালি ডাটার এর অ্যাম্পুলা নামক নালির মাধ্যমে উৎসৃষ্ট হয়- ডিওডেনামে।
- ১২. অগ্ন্যাশয়ের ও যকৃতের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য- লোবিন্ডলের মাঝে সাইনুসয়েড নামক ফাঁকা স্থান আছে।
- ১৩. পাকস্থলিতে পাতলা HCl তৈরি করে- প্যারাইটাল কোষ।
- ১৪. পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে- গ্যাস্ট্রিন।
- ১৫. প্রোটিনের পরিপাক- পাকস্থলীতে শুরু হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়।
- ১৬. ভিলাইয়ের কাজ হচ্ছে- শোষণ অঞ্চল বৃদ্ধি করা।
- ১৭. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে- পেপসিন।
- ১৮. গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়- গ্যাস্ট্রিন হরমোনের প্রভাবে।
- ১৯. স্নেহ জাতীয় পদার্থকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে- লাইপেজ।
- ২০. উৎসেচক বা এনজাইম থাকে না- পিত্তরসে।
- ২১. মানুষে রেনিন হরমোন তৈরি হয়- বৃকে।
- ২২. মুখগহ্বরে আংশিক পরিপাক ঘটে- শর্করা।
- ২৩. ক্ষুদ্রান্ত্রের সর্ববহিঃস্থ কলান্তরকে বলা হয়- সেরোসা।
- ২৪. জিগলেটিনেজ এনজাইম জিগলেটিনকে ভেঙ্গে উৎপন্ন করে- পেপটোন।
- ২৫. গবলেট কোষ- মিউকাস নিঃস্রাবী এককোষী গ্রন্থি।
- ২৬. ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে নিঃসৃত হয়- প্রোলিডেজ।
- ২৭. লালারসের- কিছুটা অম্লীয়।
- ২৮. মানবদেহের কোথায় কোলাজিনেজ এনজাইম পাওয়া যায়- অগ্ন্যাশয় রসে।
- ২৯. ক্ষুদ্রান্ত্রের ফসফেলাইপেজ লিপিডকে সরলীকৃত করে কোন উপাদানটি তৈরি করে- ফ্যাটি এসিড।
- ৩০. গ্যাস্ট্রিক জুস (Gastric Juice)-এ পানির পরিমাণ- ৯৯.৪৫%।
- ৩১. পিত্তথলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে- কোলেসিস্টোকাইনিন।
- ৩২. মিউসিন নিঃসৃত হয়- এপিথেলিয়াল কোষ থেকে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কমনউযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01. নিচের কোনটি আমিষ পরিপাককে সহায়তা করে না? [DU. 23-24]
A. রেনিন B. ট্রিপসিন C. পেপসিন D. লাইপেজ ①
02. ক্ষুদ্রান্ত্র এর অংশ নয় কোনটি? [JU-D, Set-H. 2021-22; DU-7Clg. 19-20]
A. ডিওডেনাম B. সিকাম C. ইলিয়াম D. জেজুনা
[S@Why] • ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ: ডিওডেনাম, জেজুনা, ইলিয়াম।
• বৃহদন্ত্রের অংশ: সিকাম, কোলন, মলাশয়।
03. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন নয় কোনটি? [MBSTU: B, 19-20]
A. B₁₂ B. C C. B D. K
[S@Why] স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C), নিকোটিনিক এসিড (B₁₂) এবং ফলিক এসিড (B₉) সম্বন্ধ করে।
04. কোন এনজাইম স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে? [DU-A. 22-23]
A. লাইপেজ B. মল্টেজ
C. অ্যামাইলেজ D. পেপসিন ①
05. কোন এনজাইম আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে? [DU.10-11; MBSTU.12-13; PSTU. 17-18]
A. Pepsin B. Lipase
C. Lactase D. Trypsin
[S@Why] অগ্নাশয় রসে অবস্থিত ট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিন ও পেপটোন জাতীয় আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

06. নিম্নের পেনসিনোজেনকে সক্রিয় পেনসিনে রূপান্তরিত করে কোন নিম্নের?

[DU-08-09; JnU-08-09]

- A. সিক্রেটিন B. মিউসিন
C. হাইড্রোক্লোরিক এসিড D. অগ্নাশয় রস

SHOW গ্যাস্ট্রিক জুসে পেনসিনোজেন ইমক নিম্নের প্রোটোলাইটিক এনজাইম থাকে। গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে পেনসিন নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। এটি প্রোটিনকেও সক্রিয় বেনিনে পরিণত করে।

07. মানবদেহের অস্থিকবসে প্রোটিন খাদ্য পরিণতের সাহায্যকারী এনজাইমের নাম কি?

[JU-D, 13-14; BSMRSTU, 13-14]

- A. অ্যামিনোপেপটাইডেজ B. পেনসিনোজেন
C. ট্রিপসিনোজেন D. কোলজিনেজ

08. এসিডিক পরিবেশ তৈরি করে কোনটি? [RU-C, মেম-৩: 23-24]

- A. অ্যামাইলেজ B. পেনসিন C. ট্রিপসিন D. লাইপেজ

SHOW পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক এসিড নিম্নের HCl থাকায় এসিডিক বা অম্লীয় পরিবেশ বজায় থাকে। পাকস্থলী বা পাকরসে বিদ্যমান এনজাইম:

পরিণতকারী পদার্থ	এনজাইম
অম্ল	পেনসিন, বেনিন, জিলেটিনেস।
স্নেহ	গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ।

09. টায়ালিন নিসৃত হয় কোথা থেকে? [DU-7C1g, 19-20]

- A. যকৃত B. অগ্নাশয় C. লালমুহি D. গ্যাস্ট্রিক্সাই

SHOW পিত্তরস নিসৃত হয় যকৃত থেকে। অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও প্রোটিনেজ নিসৃত হয় অগ্নাশয় থেকে। গ্যাস্ট্রিক্সাই থেকে নিসৃত হয় লাইপেজ, পেনসিন, বেনিন।

10. অস্ত্রের কোন ছত্র পরবর্তী কোষ (Goblet cell) থাকে? [DAT, 19-20]

- A. সেরোসা B. মাসকিউলারিস মিউকোসা
C. মিউকোসা D. সার্বমিউকোসা

SHOW অস্ত্রের প্রাচীর সেরোসা, পেশি, সার্বমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা ছত্র নিয়ে গঠিত। পেশির বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত। সার্বমিউকোসা রক্তনালি ও স্নায়ুসমৃদ্ধ। মিউকোসাতে গবলেট ও শোষণকম কোষ থাকে।

11. লাইপোলাইটিক এনজাইম কোনটি? [দি.বো. ২০২০]

- A. অ্যামাইলেজ B. কোলজিনেজ C. ইলাস্টেজ D. সেসিথিনেজ

12. Kuffer's cell কোন অঙ্গে থাকে? [DU-A, 21-22; JU, 2021-22]

- A. গ্রন্থি B. মস্তিষ্ক C. যকৃত D. অগ্নাশয়

SHOW যকৃতের কোষগুলো (প্রতি সেলবিউলে 6000 কোষ থাকে) হলো:

- i. হেপাটোসাইট
ii. ম্যাক্রোফেজ (কাপড়ের সেল)।

13. একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন কত মিলিলিটার লালার ক্ষরণ করে? [JU-D, Set-Q, 23-24]

- A. 700-1000 B. 1000-1200 C. 1200-1500 D. 1500-1800

14. পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে-

[RU-C, পত্র-২: 23-24]

- A. গ্রাইকোজেনেসিস B. ইমালসিফিকেশন
C. গ্রাইকোজেনোলাইসিস D. লাইপোজেনেসিস

15. কোন এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে? [MAT, 23-24]

- A. পের্পাসিন B. মস্টেল
C. টায়ালিন D. লাইসোজাইম

SHOW লালার অধিকাংশই পানি (95.5%-99.5%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন 1200 থেকে 1500 মিলিলিটার লালার ক্ষরণ করে। এর pH 6.2-7.4। লালারস থেকে লাইসোজাইম এনজাইম নিসৃত হয় যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। টায়ালিন ও মস্টেল নামক 2টি শর্করা বিশিষ্ট এনজাইমও ক্ষরণ করে।

16. গ্রাইকোজেন কোথায় সঞ্চিত হয়-

[DAT: 22-23]

- A. অগ্নাশয় B. ক্ষুদ্রান্ত্র
C. যকৃত D. পাকস্থলী

SHOW গ্রাইকোজেন সঞ্চিত হয়: ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক গ্যাংলিয়ন থেকে মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃতের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্রাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ার গ্রাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। ইনসুলিন নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ার সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্রাইকোজেন থেকে যকৃত গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক রাখে।

17. কোন ভিটামিন মানবদেহের যকৃতে সঞ্চিত হয় না?

[AFMC, 13-24]

- A. ভিটামিন এ B. ভিটামিন সি
C. ভিটামিন ডি D. ভিটামিন কে

SHOW যকৃতে ভিটামিন সঞ্চিত:

- মেহে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ (A, D, E, K)।
- পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B), ভিটামিন B₁₂ (সায়ানো কোবালামিন) ও B₆ (ফোলিক এসিড) সঞ্চিত করে।
- B₁₂ ও ফোলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরি করে।

18. কোনটি পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরিতে বাধা দেয়? [JU-D, Set-J, 23-24]

- A. কোলিসিস্টোকাইনিন B. সিক্রেটিন
C. প্যানক্রিওজাইমিন D. হাইড্রোক্লোরিক এসিড

19. লিবারকুন গ্রন্থিকে উদ্বীপিত করে কোন হরমোন?

[JU-D, Set-R, 2022-23]

- A. ডিওক্সাইন B. এন্টারোক্রাইনিন
C. কোলিসিস্টোকাইনিন D. এন্টারোকাইনিন

20. কোনটি থেকে সিক্রেটিন নিসৃত হয়?

[JU-D, Set-P, 2022-23]

- A. অস্ত্রের মিউকোসা B. পাকস্থলির প্রাচীর
C. ইলিয়ামের প্রাচীর D. ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর

21. কাইলোমাইক্রন যে খাবার শোষণে ভূমিকা রাখে-

[RU-C, Jupiter-I, Set-I, 2021-22]

- A. শর্করা B. আমিষ
C. চর্বি D. সবগুলো সঠিক

SHOW এপিথেলিয়াম কোষে যে প্রোটিন থাকে তা লিপিড অণুকে আবৃত করে লিপোপ্রোটিন কণা গঠন করে, এর নাম কাইলোমাইক্রন।

22. সবচেয়ে বেশী খাদ্যসার শোষিত হয় -

[MAT, 23-24]

- A. জেজুনা B. পাকস্থলী
C. ডিউডেনাম D. ইলিয়াম

23. সিক্রেটিন নিসৃত হয় কোথায় থেকে?

[AFMC: 2021-22]

- A. Duodenum B. Stomach
C. Ileum D. Liver

SHOW বিভিন্ন হরমোনের উৎস:

উৎস	হরমোনের নাম
Duodenum	Secretin, Enterogastrin, Enterocrinin, Deocrinin
Stomach	Gastrin, Somatostatin
Ileum	Enterokinase, Peptide YY

24. BMI ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

[RU-C, যমুনা-৩: 23-24]

- A. kg/m² B. m²/kg
C. m/kg D. kg/m

SHOW মানুষের স্থূলতা নির্ণয়: পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে দেহের ওজন সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বলে।

$$BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার)}^2} = \text{kg/m}^2$$

25. কোন BMI প্রথম শ্রেণির স্থূলতা নির্দেশ করে?

[GST-A, 23-24]

- A. 35.0-39.9 kg/m² B. 30.0-34.9 kg/m²
C. 25.0-29.9 kg/m² D. 18.5-24.9 kg/m²

26. চিকিৎসাবিদ্যার কোন শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?

[AFMC: 2021-22]

- A. Obesity B. Geriatrics
C. Bariatrics D. Pediatrics

PRIME TEST

০১. কোন এনজাইম আমিয়কে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে?

০১. কোন এনজাইম আমিয়কে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে?
 (A) Pepsin (B) Lipase
 (C) Lactase (D) Trypsin

০২. মানবদেহের জৈব রসায়নাগার কোনটি?

০২. মানবদেহের জৈব রসায়নাগার কোনটি?
 (A) পাকস্থলী (B) কিডনী
 (C) পিত্তথলি (D) লিভার/যকৃত

০৩. মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে কয়টি অংশ থাকে?

০৩. মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে কয়টি অংশ থাকে?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫

০৪. শর্করা পরিপাকে সহায়তা করে কোনটি?

০৪. শর্করা পরিপাকে সহায়তা করে কোনটি?
 (A) লালারস (B) মস্টেজ (C) টায়ালিন (D) সবগুলো

০৫. মানুষের চার ধরনের দাঁতের মধ্যে পেথ দাঁতের সংকেত কোনটি?

০৫. মানুষের চার ধরনের দাঁতের মধ্যে পেথ দাঁতের সংকেত কোনটি?
 (A) I (B) C (C) Pm (D) M

০৬. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে-

০৬. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে-
 (A) লাল (B) পেপসিন (C) লাইপেজ (D) অ্যামাইলেজ

০৭. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোথায় অবস্থিত?

০৭. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোথায় অবস্থিত?
 (A) অগ্ন্যাশয়ে (B) বৃক্কে (C) যকৃতে (D) পিত্তথলিতে

০৮. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এ কয় ধরনের কোষ থাকে?

০৮. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এ কয় ধরনের কোষ থাকে?
 (A) তিন (B) দুই (C) চার (D) পাঁচ

০৯. গ্যাস্ট্রিক জুসে পানির পরিমাণ শতকরা কত?

০৯. গ্যাস্ট্রিক জুসে পানির পরিমাণ শতকরা কত?
 (A) ০.০৯৫ (B) ১০ (C) ৯৯.৯৫ (D) কোনটিই নয়

১০. আদ্রিক রস দৈনিক কতটুকু স্রবিত হয়?

১০. আদ্রিক রস দৈনিক কতটুকু স্রবিত হয়?
 (A) ১-২ লিটার (B) ৫-৬ লিটার (C) ১০০ মি.লি. (D) ৫০০ মি.লি.

১১. নিম্নের কোনটি প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম নয়?

১১. নিম্নের কোনটি প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম নয়?
 (A) লাইপেজ (B) পেপসিন (C) জেলাটিনেজ (D) রেনিন

১২. ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন অংশে লিপিড শোষণ ঘটে না?

১২. ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন অংশে লিপিড শোষণ ঘটে না?
 (A) ডিওডেনাম (B) ইলিয়াম (C) জেজুনা (D) সবগুলো

১৩. সিকামের সাথে যুক্ত বন্ধ ধরনের থলি কোনটি?

১৩. সিকামের সাথে যুক্ত বন্ধ ধরনের থলি কোনটি?
 (A) অ্যাপেনডিক্স (B) মলাশয় (C) কোলন (D) কোনটিই নয়

১৪. কীসের প্রতি সাড়া দিয়ে সিক্রেটিন স্রবিত হয়?

১৪. কীসের প্রতি সাড়া দিয়ে সিক্রেটিন স্রবিত হয়?
 (A) এসিড (B) ক্ষার (C) পানি (D) কোনটিই নয়

১৫. চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থলতার কারণে, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে কী বলে?

১৫. চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থলতার কারণে, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে কী বলে?
 (A) বেরিয়ট্রিকস (B) জেরিয়ট্রিকস
 (C) অনকোলজি (D) পেডিয়াট্রিকস

১৬. স্থলতা প্রতিকারের জন্য সপ্তাহে অন্তত কত মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করতে হবে?

১৬. স্থলতা প্রতিকারের জন্য সপ্তাহে অন্তত কত মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করতে হবে?
 (A) ১০০ - ১২০ মিনিট (B) ১৫০ - ২৫০ মিনিট
 (C) ১০ - ১৫ মিনিট (D) কোনটিই নয়

১৭. যকৃৎের সাইনুসয়েডগুলো কী কোষ দ্বারা আবৃত থাকে?

১৭. যকৃৎের সাইনুসয়েডগুলো কী কোষ দ্বারা আবৃত থাকে?
 (A) রিং সেল (B) কুপফার'স সেল (C) বাথ সেল (D) কোনটিই নয়

১৮. যকৃৎ নিচের কোন ভিটামিন সঞ্চয় করে না?

১৮. যকৃৎ নিচের কোন ভিটামিন সঞ্চয় করে না?
 (A) Vit D (B) Vit B₆ (C) Vit B₁ (D) Vit K

১৯. নিম্নের কোনটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয়?

১৯. নিম্নের কোনটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয়?
 (A) জেজুনা (B) ইলিয়াম
 (C) ডিওডেনাম (D) কোলন

২০. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?

২০. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?
 (A) যকৃত (B) অগ্ন্যাশয়
 (C) পিটুইটারি (D) শুক্রাশয়

Answer Analysis

01.D	02.D	03.B	04.D	05.D	06.B	07.A	08.C	09.C	10.A
11.A	12.C	13.A	14.A	15.A	16.B	17.B	18.C	19.D	20.A

অধ্যায়
০৪

রক্ত ও সংবহন

জীববিজ্ঞান
২য় পত্র

সাজেশন/সু	RATINGS		
	★ ★ ★	★ ★	★
রক্ত	বৈশিষ্ট্য ও রক্তকণিকা	রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া	রক্তের অস্বাভাবিকতা
অর্থপিত্ত	গঠন, দ্রবচক্র ও দ্রবস্পন্দন	বিভিন্ন কণাটিকা	দ্রবরোগ
লসিকা	—	—	বৈশিষ্ট্য

TOPIC-01

রক্ত

➤ রক্তের বৈশিষ্ট্য:

- প্রকৃতি: সামান্য ক্ষারীয়
- pH: ৭.৩৫-৭.৪৫ (গড়: ৭.৪০)
- স্বাদ: নোনতা
- তাপমাত্রা: ৩৬-৩৮°C বা ৩৬-৩৭°C
- আপেক্ষিক গুরুত্ব: ১.০৬৫
- বর্ণ: লাল (হিমোগ্লোবিনের কারণে)
- পরিমাণ: i. পুরুষে: ৫-৬ লিটার (মোট ওজনের ৮% বা ৭-৮%)
ii. স্ত্রীদেহে: ৪.৫-৫.৫ লিটার
- ৪৫% রক্তকণিকা এবং ৫৫% রক্তরস রক্তে বিদ্যমান।
- রক্তরসে ৯০-৯২% পানি।

➤ রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা:

- পলিসাইথেমিয়া: লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাওয়া। কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। এটি মুখ্য ও গৌণ হতে পারে।
- অ্যানিমিয়া: শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।
- থ্যালাসেমিয়া: হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের ত্রুটিজনিত এক ধরনের বংশগত রোগ, যেক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন অ্যানিমিয়া হয়।
- লিউকোসাইথেমিয়া বা লিউকোসাইটোসিস: রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বেড়ে যাওয়া। নিউমোনিয়া, হপিংকাশি ইত্যাদি রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়।
- লিউকেমিয়া: যখন শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যায় (প্রতি মাইক্রোলিটারে ৫০,০০০ - ১,০০০,০০০)। যেমন- ব্লাড ক্যান্সার।

TOPIC-02

বিভিন্ন রক্তকণিকার তুলনামূলক তথ্য

রক্ত কণিকার নাম	সংখ্যা প্রতি ঘন মি.মি রক্তে	কাজ
লোহিত রক্তকণিকা	• জনদেহ : ৮০-৯০ লক্ষ বা ৭০-৯০ লক্ষ (৭-৯ মিলিয়ন) • শিশুর দেহ : ৬০-৭০ লক্ষ (৬-৭ মিলিয়ন) • পূর্ণবয়স্ক পুরুষে : ৫০-৫৪ লক্ষ • পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে : ৪৪-৪৯ লক্ষ	• অধিকাংশ O₂ সামান্য CO₂ বহন করা • অঙ্গ ও ক্ষারের সমতা • রক্তের সামান্য বজায় রাখা
শ্বেত রক্তকণিকা	• ৪-১১ হাজার প্রতি ঘনমিলি রক্তে • আনুপ্রাথমিক সৈনিক বলে	• নিউট্রোফিল (২-৭) টি খন্ড • বেস্টনী • ইওসিনোফিল • ২টি খন্ড বা ২-৩ খন্ড • লাল বর্ণ
		• ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস • অ্যালার্জি, রক্তে প্রবেশ কৃত কৃমির লার্ভা ধ্বংস করে।

21. হৃৎপিণ্ডে যে আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে তাকে কি বলে? [BSMRSTU, 17-18]
 A. পেরিকার্ডিয়াম B. পেরিটোনিয়াম
 C. পেরিক্রিয়াম D. পেরিস্টিয়াম (A)
22. কোন ধর্মী হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে? [DU, 23-24]
 A. পালমোনারি B. করোনারি
 C. সাব-ক্রেডিয়ান D. বুকীয় (B)
23. যে শিরা কৈশিক নালী হতে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে না গিয়ে অন্য অঙ্গে গিয়ে আবার কৈশিক নালীতে রূপান্তরিত হয় তাকে কী বলে? [RU, Sinevas, Set-I, 20-21]
 A. পোর্টাল শিরাতন্ত্র B. পালমোনারী শিরাতন্ত্র
 C. অগ্রমহা শিরা D. পশ্চাৎ মহাশিরা
- SO why** পোর্টাল সংবহন: সিস্টেমিক ও পালমোনারি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলায় পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমে অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে। পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হেপাটিক শিরা → ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা → হৃৎপিণ্ড।
24. অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বহন করে- [DAT, 91-92]
 A. ইলিয়াক শিরা B. মহা শিরা
 C. পালমোনারী শিরা D. করোনারী শিরা (C)
25. মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত (সিস্টোল: ডায়াস্টোল)? [DU, 11-12, 03-04]
 A. 120 mmHg : 80 mmHg B. 110 mmHg : 60 mmHg
 C. 170 mmHg : 95 mmHg D. 140 mmHg : 90 mmHg
- SO why** একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে 110-120 mmHg এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ 70-80 mmHg।
26. স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনকে কি বলা হয়? [JU-D, Set-F, 2022-23]
 A. অ্যারিথমিয়া B. আর্টারিওক্লেরোসিস
 C. অ্যানজাইনা D. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (A)
27. করোনারি হৃদরোগের অপর নাম কি? [RU-C, Feldspar-1: 22-23]
 A. স্টোকপ্রাইটিস B. এমবোলিজম
 C. ইন্ফিমিয়া D. পেরিকার্ডাইটিস (C)
28. কোন জাতীয় ব্যারোসেন্সিটর হৃৎের আয়তন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে? [AFMC, 23-24]
 A. উচ্চচাপ ব্যারোসেন্সিটর B. ক্যারোটিড ব্যারোসেন্সিটর
 C. নিম্নচাপ ব্যারোসেন্সিটর D. অক্সিগেন ব্যারোসেন্সিটর (C)
29. মানবদেহে লসিকার পরিমাণ কত লিটার? [JU-D, Set-J, 2021-22]
 A. 2-4 B. 3-5
 C. 4-8 D. 5-12 (C)
30. কোন রক্তকণিকা দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে? [Ref: আপীল ব্যার]
 A. নিউট্রোফিল B. বেসোফিল
 C. ইওসিনোফিল D. লিম্ফোসাইট (D)

PRIME TEST

01. রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায়-
 A. 0.095 B. 0.065
 C. 1.065 D. 1.195
02. টিস্যুর অধিকাংশ CO₂ রক্তরসে কোনটি রূপে দ্রবীভূত থাকে?
 A. CO B. H₂CO₃
 C. HCO₃ D. COOH
03. শিশুর দেহে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা-
 A. 80 - 90 লক্ষ B. 50 - 60 লক্ষ
 C. 60 - 90 লক্ষ D. 90 - 100 লক্ষ

04. শিশুর কোনটিতে RBC সংখ্যাই কম?
 A. অস্থিহীনা B. যকৃত
 C. প্রাণ D. B ও C উভয়
05. সবচেয়ে বড় শ্বেতকণিকা কোনটি?
 A. নিউট্রোফিল B. ম্যাক্রোফিল
 C. মনোসাইট D. লিম্ফোসাইট
06. কোনটি কলার মুক্ত কোষ ভক্ষণ করে?
 A. নিউট্রোফিল B. লিম্ফোসাইট
 C. মনোসাইট D. ম্যাক্রোফিল
07. অণুচক্রিকার সাইটোপ্লাজমে কোনটি থাকে না?
 A. অ্যাকটিন B. মাইটোকন্ড্রিয়া
 C. Factor II D. বৃদ্ধ কণিকা
08. জন্মটি কিংবা বড় থেকে যে ফলসহ ফলন বর্ধিত জীবের অংশ যে ফল ফলে তাকে বলা হয়-
 A. পলিপ B. সিম
 C. বক্তর D. বড় মড়ক
09. দুধের মত সাদা লসিকাকে বলা-
 A. সিরাম B. ক্রিম
 C. সেরাস D. ফলসেমেন্ট
10. হৃৎপিণ্ড যে দিকের দিকে ঘুরে ঘুরে আবৃত হয়ে থাকে-
 A. পেরিটোনিয়াম B. পেরিকার্ডিয়াম
 C. প্রাণ D. ফল
11. শিশুর কোনটি থেকে সৃষ্ট অ্যাকশন পটেনশিয়ালের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড কত হয়?
 A. SAN B. AVN
 C. পারকর্ডিয়াল তন্ত্র D. বক্তর অংশ
12. 50 বছর বয়সে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের সর্বোচ্চ স্বাভাবিক মান হয়-
 A. 130/85 mmHg B. 145/95 mmHg
 C. 150/100 mmHg D. 160/95 mmHg
13. উচ্চচাপ ব্যারোসেন্সিটরের অপর নাম-
 A. Arterial baroreceptor B. Ventricular baroreceptor
 C. Atrial baroreceptor D. Volume baroreceptor
14. রক্তনালি কত ধরনের হয়?
 A. 1 B. 2
 C. 3 D. 8
15. হার্ট অ্যাটাকের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ কোনটি?
 A. ইনসুলিন B. অ্যানজিন
 C. থাইরক্সিন D. অসলিনেট
16. হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনে ব্লক আছে কিনা, তা দেখার জন্য কোন পদ্ধতি করা হয়?
 A. MRI B. USG
 C. ECG D. করোনারি এন্জিওগ্রাম
17. পেসমেকারের ইলেকট্রোড দুটি হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠের মাঝে বৃত্ত করা হয়?
 A. ডান ও বাম অলিম B. ডান ও বাম মিল
 C. ডান অলিম ও ডান মিল D. বাম অলিম ও বাম মিল
18. মানবদেহে সর্বপ্রথম করোনারী স্টেনটিং এন্জিওপ্লাস্টি পদ্ধতি প্রয়োগ করেন কে?
 A. ডা. অ্যানড্রেস গ্রেনজিগ B. ডা. ইউরিন লিমবার্গ
 C. ডা. জন লেরিস D. ডা. ওয়াল্টন লিলেকি
19. রক্তে কোনটির পরিমাণ বেশি থাকে ভালো?
 A. Chylomicon B. LDL
 C. VLDL D. HDL
20. শিশুর কোনটি রক্তের কাজ নয়?
 A. শর্করা সঞ্চয় B. হোমিওস্ট্যাচিস
 C. অ্যাসিড বার সাম্যরক্ষা D. বায়বীয় পরিবহন

Answer Analysis

01.C	02.C	03.C	04.D	05.C	06.C	07.C	08.B	09.B	10.B
11.A	12.D	13.A	14.C	15.B	16.D	17.C	18.A	19.D	20.A

অধ্যায়
০৫

শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া

জীববিজ্ঞান
২য় পত্র

সাজেশনস্	RATINGS		
	★★★	★★	★
শ্বসনতন্ত্র	স্বরযন্ত্র, অ্যালভিওলাস, ফুসফুস, সারফেকট্যান্ট	ব্রঙ্কাস	ট্র্যাকিয়া, ভলিউম ও ক্যাপাসিটি
শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা	সাইনাসের প্রকারভেদ	সাইনুসাইটিস	ওটিটিস মিডিয়া

TOPIC-01 শ্বসন ও শ্বসনতন্ত্র

শ্বসন দুটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়:

- বহিঃশ্বসন: এটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা ফুসফুসে সংঘটিত হয়। অ্যালভিওলাইয়ে প্রবাহের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটে।
- অন্তঃশ্বসন: জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা দেহকোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়।

শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ:

অঙ্গ	নাম	গঠন ও কাজ
বায়ুপ্রবাহ ও ত্যাগ অঙ্গ	সম্মুখ নাসারন্ধ্র	ন্যাসাল সেন্টামের মাধ্যমে ২টি ছিদ্রের উদ্ভব।
	ভেস্টিবিউল	প্রাচীরের লোমগুলো ছাঁকনির মত কাজ করে, বাতাস পরিষ্কার করে।
	নাসা গহ্বর	- অলফ্যাক্টরি কোষ ব্রাণের কাজ করে। - সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষ ধূলাবালি ও রোগজীবাণু আটকে দেয়।
	পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র (কোয়ানা)	নাসা গহ্বর যে ২টি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র বা কোয়ানা।
	নাসা গলবিল	এর পরে মুখ গলবিল, যা স্বরযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।
বায়ু পরিবহন অঙ্গ	স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংস	- টুকরো টুকরো তরুণাঙ্গ নিয়ে গঠিত। - এদের মধ্যে থাইরয়েড তরুণাঙ্গ (Adam's Apple/ কঠমণি) সবচেয়ে বড়। - স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে ৬টি স্থিতিস্থাপক স্বররজ্জ্ব বা ভোকাল কর্ড থাকে। - স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে এপিগ্লটিস। - এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয়। স্বরযন্ত্রে স্বর উৎপন্ন হয়।
	ট্র্যাকিয়া	১৬-২০টি বা ১৮-২০টি তরুণাঙ্গ (C আকৃতির) নির্মিত অর্ধবলয় দ্বারা গঠিত। - কোমলাঙ্গির বলয়ের কারণে ট্র্যাকিয়া চুপসে যায় না। - বন্ধ গহবরে ট্র্যাকিয়ার শেষপ্রান্ত ২টি শাখায় বিভক্ত, এদের ব্রঙ্কাই বলে। - ব্রঙ্কাসের প্রদাহকে ব্রঙ্কাইটিস বলে আবার একে ইন্ফ্লুয়েন্সিয়া ডিজিসও বলা হয়।
শ্বসন অঙ্গ	ব্রঙ্কাস (ক্রোম নালী)	
	ফুসফুস	- পুরা/প্রিউরাল নামক ঝিল্লুরী পাতলা আবরণ থাকে। - স্তর ২টির মাঝে সেরাস ফ্লুইড/প্রিউরাল ফ্লুইড (ঘর্ষণ জনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে) নামক তরল পদার্থ থাকে। - ডানদিকের ফুসফুসে ৩টি লোব এবং ১০টি সেগমেন্ট, বামদিকের ফুসফুসে ২টি লোব এবং ৮টি সেগমেন্ট থাকে। প্রতিটি সেগমেন্ট অসংখ্য লোবিউল থাকে। - ফুসফুসীয় কলা সেরোটোনিন ও হিস্টামিন সংরক্ষণ ও বিমুক্ত করে। - এটি নরঅ্যাড্রিনালিন ও অ্যাড্রিনালিনকে নিষ্ক্রিয় করে। - ফুসফুসীয় কলা ব্র্যডিকিনি ও প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সংশ্লেষণ ও দেহ হতে অপসারণ করে। - প্রতিটি ফুসফুসের যে স্থান দিয়ে ব্রঙ্কাস, রক্ত নালী ও লসিকা নালী প্রবেশ করে তাকে হাইলাম বলে।

অঙ্গ	নাম	গঠন ও কাজ
অ্যালভিওলাস	অ্যালভিওলাস	- স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত যা ফুসফুসের কার্যকরী একক। - সংখ্যা: নবজাতক শিশুতে ২০ মিলিয়ন, ৮ বছর বয়সে ৩০০ মিলিয়ন, পূর্ণবয়স্ক মানুষে ৪৮০ (২৭৪- ৭৯০) মিলিয়ন। - অ্যালভিওলাইয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শ্বসন গ্যাসের বিনিময় সংঘটিত হয়। - অ্যালভিওলাসের প্রাচীর সারফেকট্যান্ট নামক রাসায়নিক পদার্থ ফ্রণ করে।
	সারফেকট্যান্ট	২৩ সপ্তাহ বয়সে মানবজনে সর্বপ্রথম ফ্রণ হয়। ২৪ সপ্তাহের আগে মানবজনে স্বাধীন অস্থির অধিকারী গণ্য করা হয় না। - অ্যালভিওলাসে O_2 ও CO_2 এর বিনিময়ে সাহায্য করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।


TOPIC-02 গ্যাসীয় আদান-প্রদান

ভলিউম ও ক্যাপাসিটি	পরিমাণ	ভলিউম ও ক্যাপাসিটি	পরিমাণ
টাইডাল ভলিউম (বের করে দেয়ার পরিমাণ)	500 মিলি	সাধারণ মানুষের ভাইটাল ক্যাপাসিটি (ধারণ ক্ষমতা)	4500 মিলি
রেসিডুয়াল ভলিউম (অবশিষ্ট পরিমাণ)	1500 মিলি	দৌড়বিদদের ভাইটাল ক্যাপাসিটি	6000 মিলি

অবশ্যই মনে রাখতে হবে:

- অ্যালভিওলাই/রক্তে O_2 এর চাপ 107/104 মিমি/পারদ
- অ্যালভিওলাই/রক্তে CO_2 এর চাপ 40 মিমি/পারদ
- কৈশিকজালিকায়/কলায় O_2 এর চাপ 40 মিমি/পারদ
- কৈশিকজালিকায়/কলায় CO_2 এর চাপ 46 মিমি/পারদ

রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাসের বিনিময়ে বা গ্যাসীয় পরিবহন:



TOPIC-03 শ্বাসরঞ্জক

শ্বাসরঞ্জক ৪ প্রকার: হিমোসায়ানিন, হিমোইরিথ্রিন, ক্রোরোকুয়েরিন, হিমোগ্লোবিন।

হিমোগ্লোবিন সম্পর্কিত তথ্যাবলি:

- রক্তের লোহিত কণিকায় বিদ্যমান লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ, এ বর্ণের জন্যই রক্ত লাল হয়।
- চারটি একক নিয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন একটি গোলাকার অনু।
- প্রতিটি একক পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন গ্লোবিন এবং লৌহ গঠিত চারটি হিম নিয়ে গঠিত।

- [illegible]

সর্বসুসাইটিস রোগের প্রধান উপসর্গ- মাথাব্যথা।
 ওটিটিস মিডিয়া দেখা যায় মানুষের কোন অঙ্গে- কানে।
 রোগের মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয়- ওটিটিস মিডিয়া।
 মধ্যকর্ণের ইনফেকশনের কারণ- ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ হওয়া।
 কোন বয়সী শিশুদের ওটিটিসমিডিয়া বেশি হতে পারে- ৪ মাস থেকে ৪ বছর।
 পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যকর্ণের প্রদাহে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক হলো- অ্যামোক্সিসিলিন।
 নিক্কি দ্বারা ফুসফুসে নিম্নমাত্রার অক্সিজেন নির্ণীত হলে দেহ এতে সাড়া দিয়ে হাইম
 য়োনিং (yawning) যার ফলে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয়।
 যুগ্মশায়ীদের ফুসফুসের X-ray ফিল্ম দেখতে- কালো।
 যুগ্মশায়ীদের ফুসফুসের X-ray ফিল্ম দেখতে- সাদাটে।
 যুগ্মশায়ীদের ফলে সৃষ্ট রোগ- ব্রঙ্কাইটিস।
 অধিক ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রোগ- ব্রঙ্কাইটিস।
 সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রধান উপাদান-নিকোটিন।
 ফুসফুসের প্রদাহকে বলা হয়- এমফাইসেমা।
 কোন রোগে অ্যালভিওলাস ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে- প্রুরিস।
 কোন কোষ্ঠ বা ঠাণ্ডা লাগা শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণজনিত একটি রোগ যা ২০০ ধরনের
 জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়।
 টুটিনায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা হলো-সিপিআর।
 ক্রিম শ্বাস প্রশ্বাসে বড়দের ক্ষেত্রে মিনিটে ফুঁ দিতে হয়- ১০-১৫ বার।
 ক্রিম শ্বাস প্রশ্বাসে শিশুদের ক্ষেত্রে মিনিটে ফুঁ দিতে হয়-২০-২৫ বার।
 প্যারান্যাসাল সাইনাস না- অক্সিপিটাল সাইনাস।
 Adams Apple থাকে-শ্বরযন্ত্রে।
 কর্ন ভাইসব্রাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে- কার্বোমাইনো হিমোগ্লোবিন তৈরি করে।
 হরতন্ত্রী (স্বর রজ্জুর) অবস্থান- ল্যারিংক্সে।
 এপিগ্লটিস থাকে-ল্যারিংক্সে।
 মানুষের শ্বাসনালির দৈর্ঘ্য-১০-১৫ সেন্টিমিটার।
 ভায়ক্রাম পরোক্ষভাবে সাহায্য করে- বহিঃশ্বসনে।
 দসনে বর্জ্য হিসেবে উৎপন্ন হয়-CO₂।
 ন্যাসাল সেক্টামের সংখ্যা-১টি।
 ফুসফুসের ক্যাপারের জন্য দায়ী-SiO₂।
 ট্রাকিয়া থেকে বাম ফুসফুসে বায়ু পরিবহন করে- ব্রঙ্কাস।
 মানবদেহের ফুসফুস থেকে O₂ রক্তে পরিবাহিত হয়- ব্যাপন প্রক্রিয়ায়।
 মানবদেহের ট্রাকিয়া কয়টি তরুনাঙ্ঘি দ্বারা নির্মিত- ১৬-২০ টি।
 ব্রিঙ্গলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাঙ্ঘিবহীন প্রান্তগুলোকে বলা হয়-অ্যালভিওলার নালি।
 পুরা কয় স্তরবিশিষ্ট-২।
 বাতাসে CO₂-এর ঘনত্ব ০.২৫% বাড়লে শ্বসনের হার হবে-দ্বিগুণ।
 ধূমপান শতকরা কত ভাগ ফুসফুসীয় ক্যাপারের কারণ- ৯০%।
 ফুসফুসে প্রবাহিত শিরা রক্তে O₂ এর পরিমাণ-১৫%।
 ধূমপায়ী শ্বসনতন্ত্রে কোন সমস্যা দেখা দেয়- কমসংখ্যক অ্যালভিওলাই থাকে।
 টিস্পেনোস্টমি ব্যবহৃত হয় কোন রোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে- ওটিটিস মিডিয়া।
 হায়ড্রো ভলিউমে ওটিটিস মিডিয়া-২ প্রকার।
 ক্রোনিক সাইনসাইটিসের চিকিৎসা সাধারণত কত সপ্তাহ ধরে চলে- ৩-৪ সপ্তাহ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01. মানুষের ডান ব্রঙ্কাসটি কতভাগে বিভক্ত? [JU-D, Set-J. 23-24]
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- SCWhy** ব্রঙ্কাস (Bronchus): বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়; এদের নাম ব্রঙ্কাই (bronchi-বহুবচন)। এগুলো ফুসফুসের হাইলাম (hilum) দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ডান ব্রঙ্কাসটি (একবচন) অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খণ্ডে প্রবেশ করে।
02. অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে কোন কোষ থাকে? [JU-D, Set-N. 2022-23]
- A. স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল B. অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ
C. সেক্টাল D. সবগুলো

03. মানুষের শ্বসনতন্ত্রে ভেন্টিলিউলের পরের অংশ কোনটি? [JU: Unit-D; Set-A/B, 19-20, 18-19]
A. হাইলাম B. নাসাগলবিধ C. শ্বরযন্ত্র D. নাসাগলধর
[S@Why] শ্বসনতন্ত্র: সম্মুখ নাসারন্ধ্র → ভেন্টিলিউল → নাসাগলধর → পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র → নাসাগলবিধ → শ্বরযন্ত্র → শ্বাসনাশি বা ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাই → ফুসফুস → ব্রঙ্কিয়াল বা শ্বাস বৃক্ষ।
04. কত সপ্তাহের আগ পর্যন্ত মানব জর্রণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না? [JU:D;Set-D,18-19]
A. 8 B. 12 C. 18 D. 24
05. কত সপ্তাহের মানব জর্রণে সর্বপ্রথম সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়? [JU:D;Set-F,18-19,17-18]
A. 13 B. 18 C. 23 D. 28
06. শ্বসনতন্ত্রের যে অংশটি খাদ্য গ্রাসের সময় ল্যারিংক্স (শ্বরযন্ত্র) কে ঢেকে রেখে খাদ্যদ্রব্য এর ভিতরে প্রবেশে বাধা দেয় তাকে কি বলে? [JU:D,11-12]
A. ডায়াফ্রাম B. ট্রাকিয়া C. স্টার্পাম D. এপিগ্লটিস
07. Adam's Apple কী? [RU: G2, 17-18]
A. খণ্ডিত আপেল B. পাইরয়েড তরুণাবস্থি
C. থাইরয়েড রস D. নিউরোজেন
08. সারফেকট্যান্ট এর কাজ কী? [AFMC. 22-23]
A. পৃষ্ঠটান হ্রাস করে B. পৃষ্ঠটান বৃদ্ধি করে
C. পৃষ্ঠটান কখনো কমায় কখনো বাড়ায় D. পৃষ্ঠটানে কোনো পরিবর্তন করেনা
09. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে অলক্যাট্টরী কোষ থাকে? [সি.সো. ২০২২]
A. ভেন্টিলিউল B. নাসাগলধর
C. পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র D. নাসাগলবিধ
10. রক্তে CO₂ এর শতকরা কতভাগ বাইকার্বোনেট রূপে পরিবাহিত হয়? [JU-D, Set-H. 23-24]
A. 50 B. 55 C. 65 D. 70
[S@Why] রক্তের মাধ্যমে CO₂ পরিবহন:
• ভৌত দ্রবণরূপে (5%): কার্বনিক অ্যানহাইড্রোজ এনজাইমের ক্রিয়ায় (5%) CO₂ রক্তরসের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে।
 $H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড)।
• কার্বামিনো যৌগরূপে (27%): 100 ml রক্তে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিনরূপে 2ml এবং কার্বামিনো প্রোটিনরূপে 1 ml
• বাইকার্বোনেট যৌগরূপে (65%): RBC তে $KHCO_3$ রূপে এবং প্লাজমাতে $NaHCO_3$ রূপে।

11. শ্বাস নেয়ার পর কুসকুনের অ্যালভিওলাইটে O_2 এর গড় চাপ কত থাকে? [JU-D, Set-M. 23-24]
A. 100 mmHg B. 102 mmHg C. 105 mmHg D. 107 mmHg ①
12. নিচের কোন শিফটকে হ্যামবার্গার শিফট বলা হয়? [BSMRSTU: Unit-C, 19-20]
A. Cl^- B. K^+ C. H^+ D. HCO_3^-
SO why লোহিত কণিকা থেকে HCO_3^- আয়নের বের হয়ে আসার ফলে স্বাভাবিক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমায় ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। একে ক্লোরাইড শিফট বা হ্যামবার্গার শিফটও বলে।
13. একটি সিগারেটের শলায় প্রায় কত ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে? [JU-D, Set-J. 23-24]
A. 3000 B. 4000 C. 5000 D. 6000
SO why একটি সিগারেটের শলায় প্রায় 4 হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। সিগারেটে যে রাসায়নিক থাকে তার মধ্যে নিকোটিন, টার, আর্সেনিক, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান।

PRIME TEST

01. নিম্নের কোনটি খাদ্য গলাধঃকরণের সময় বরফের মুখটি বন্ধ করে দেয়?
 (A) আলজিহ্বা (B) এপিগ্লটিস (C) ভোকাল কর্ড (D) কোয়ানা
02. নিম্নের কোনটি বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঙ্গের অংশ নয়?
 (A) শ্বাসনালি (B) নাসিকা (C) নাসাগলবিল (D) বরফদ্ব

• **Prüfung:** 1. Klausur (20.01.2024), 2. Klausur (27.01.2024), 3. Klausur (03.02.2024)

- [illegible]

04. DATE RECEIVED

- **कुमारवर्धनवासी बर्हिवासी (१३%)** - अतिरिक्त परिवारवासी, (अतिरिक्त कुल बाटो)
- **विश्व बर्हिवासी (३%)** - अतिरिक्त बाबावासी, (अतिरिक्त कुल बाटो न राख्)
- **बाबुवासी/कुमार (३३%)** - अतिरिक्त (कुलवासी नभएता) कुलवासी (अतिरिक्त कुल बाटो न राख्)

TOPIC-02

କୋଷର ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀ ୩

01. प्रमाणित नमूना

- জাতির জাতীয় ভাষা বিশ্বাসের জগত থেকে বন্ধ, জাতির সার্বভৌমত্ব
- জাতির ভাষা ইতিহাসের পরিচয় প্রদান করে
- জাতির ইতিহাস জাতির জাতীয় ভাষা জাতির ভাষা থেকে প্রাপ্ত

02. कृष्ण विष्णु

- [illegible]

03. पुस्तक विभागात भरवण्यात आलेली

উপাধান	শতকরা হার	উপাধান	শতকরা হার
নানি	৪৯	ন্যানিসিয়াহ *	০.৪৭
ইউকিয়া	১	ম্যামোনেসিয়াহ	০.৪০
ইউকি একিড	০.১৯	ক্রোইড	০.৬০
ক্রোইডিক *	০.০৭	কলকট	০.২৭
শেইডিয়াহ *	০.৯৯	ল্যানকট *	০.১৪
ম্যামোনেসিয়াহ *	০.১৬	অন্যান্য	১.২৭

TOPIC: 48

पृष्ठ संख्या ७ प्रतिपाद

संख्या १०८३ दिनांक २७/१२/६९

10. 11. 2004

क्रमांक	विवरण	प्रमाण
1	महाराष्ट्र शासन, अर्थ विभाग	महाराष्ट्र शासन, अर्थ विभाग
2	महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग	महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग
3	महाराष्ट्र शासन, उद्योग विभाग	महाराष्ट्र शासन, उद्योग विभाग
4	महाराष्ट्र शासन, कृषि विभाग	महाराष्ट्र शासन, कृषि विभाग
5	महाराष्ट्र शासन, श्रम विभाग	महाराष्ट्र शासन, श्रम विभाग
6	महाराष्ट्र शासन, परिवहन विभाग	महाराष्ट्र शासन, परिवहन विभाग
7	महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक उपकार विभाग	महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक उपकार विभाग
8	महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग	महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग
9	महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग	महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग
10	महाराष्ट्र शासन, स्वास्थ्य विभाग	महाराष्ट्र शासन, स्वास्थ्य विभाग

82. एक विकल्पित संविधान:

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

- [illegible]

অষ্টম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

PRIME TEST

01. বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজকে কি বলে? [JU: Unit-D; Set-A/B; 19-20; RU: 17-18, 08-09]
 A. ক্যাপসুল B. হাইলাম
 C. পেলভিস D. মেডুলা

[SOWhy] বৃক্কের আবরণী বা পর্দার নাম টিউনিকা ফাইব্রোসা বা রেনাল ক্যাপসুল। প্রতিটি বৃক্ক তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, যথা: বাইরের কর্টেক্স, মধ্যখানে অবস্থিত মেডুলা এবং ভেতরে পেলভিস। বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাম বা হাইলাস বলে।

02. বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক কোনটি? [JU: Unit-D; Set-M; 19-20]
 A. ক্রিয়েটিনিন B. ইউরিয়া
 C. অ্যামোনিয়া D. ইউরিক এসিড

[SOWhy] বৃক্কের রোচনে ক্রিয়েটিনিনের ভূমিকা:

- দেহে বিদ্যমান প্রায় 2% ক্রিয়েটিন বিপাক প্রক্রিয়া পেশিতে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- রক্তের ক্রিয়েটিনিন মাত্রাকে বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয়।
- বৃক্কের কাজের জটিলতা দেখা দিলে রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়।
- রক্তে এর স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষের 0.6-1.2 mg/dL এবং মহিলাদের 0.5-1.1 mg/dL।

03. হেনলির লুপ কোথায় দেখা যায়? [DU: 17-18]
 A. চোখে B. হৃৎপিণ্ডে
 C. অগ্ন্যাশয়ে D. বৃক্কে

04. গ্রোমেরুলাস কোথায় অবস্থিত? [RU-C, Corundum-1: 22-23]
 A. যকৃত B. হৃৎপিণ্ড
 C. বৃক্ক D. ফুসফুস

05. হেনলির লুপের অবস্থান বৃক্কের কোথায়? [MAT: 17-18, 13-14; CU: 04-05]
 A. বৃক্কীয় নালীকায়
 B. রেনাল করপাসলে
 C. এফারেন্ট ধমনীকাত্তে
 D. ইফারেন্ট ধমনীকাত্তে

06. কোনটি মূত্র উৎপাদনের একক? [MAT: 89-90; RU: 12-13; CU: 17-18, 03-04; KU: 16-17, 15-16]
 A. নেফ্রন B. নিউরন
 C. মূত্রথলি D. ল্যাপ্সারহেল এর গ্রীপ

07. মানুষের মূত্রে ক্রিয়েটিনিন এর শতকরা হার কত? [JU-D, Set-F/T/H: 2022-23]
 A. 0.01 B. 0.02
 C. 0.05 D. 0.09

[SOWhy] মূত্রের উপাদান ও শতকরা হার:

উপাদান	শতকরা হার	উপাদান	শতকরা হার
পানি	95	পটাশিয়াম	0.15
ইউরিয়া	2	ম্যাগনেসিয়াম	0.01
ক্রিয়েটিনিন	0.07	ক্রোরাইড	0.60
সোডিয়াম	0.35	সালফেট	0.18
অ্যামোনিয়াম	0.04	ক্যালসিয়াম	0.03

08. ইউরিওটেলিক প্রাণীর মূত্রের প্রধান উপাদান কোনটি? [JU: D; Set-H: 18-19]
 A. ইউরিক এসিড B. অ্যামোনিয়া
 C. ইউরিয়া D. ক্রিয়েটিনিন

09. মূত্রের pH হলো- [Ref: আজমল স্যার]
 A. 4.5-8.0 B. 5.5-7.5
 C. 4.6-8.7 D. 3.5-5.5

10. কোন হরমোন অসমোরেগুলেশন নিয়ন্ত্রণ করে? [Ref: হাসান স্যার]
 A. টেস্টোস্টেরন B. প্রোজেস্টেরন
 C. ADH D. LH

01. গ্রাইকোনিওজেনেসিস করে কোনটি?
 A. ফুসফুস B. মস্তিষ্ক C. বৃক্ক D. অত্র
02. নিম্নের কোনটিকে বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয়?
 A. বিলিরুবিন B. বিলিভার্ডিন C. অ্যামোনিয়া D. ইউরোবিলিন
03. ইউরিয়া সৃষ্টি হয় কোথায়?
 A. ফুসফুসে B. বৃক্কে C. যকৃতে D. গ্রীহায়
04. বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে কি পরিমাণ তরল পরিস্রূত হয়?
 A. 124cm³ B. 125cm³ C. 130cm³ D. 128cm³
05. একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ প্রতিদিন প্রায় কতটুকু মূত্র দেহ থেকে অপসারণ করে?
 A. 1000 মিলিলিটার B. 2000 মিলিলিটার
 C. 1500 মিলিলিটার D. 1800 মিলিলিটার
06. মানবদেহে মূত্র নিষ্কাশনের সঠিক পন্থা কোনটি?
 A. পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রথলি → মূত্রনালি → নির্গমন
 B. পেলভিস → মূত্রথলি → ইউরেটার → মূত্রনালি → নির্গমন
 C. পেলভিস → মূত্রথলি → মূত্রনালি → ইউরেটার → নির্গমন
 D. পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রনালি → মূত্রথলি → নির্গমন
07. মূত্রে অজৈব পদার্থের পরিমাণ কত?
 A. 96% B. 4% C. 60% D. 40%
08. বৃক্ক বিকল হলে রক্তে কোন আয়নের পরিমাণ বেড়ে যায়?
 A. ক্যালসিয়াম B. সোডিয়াম C. পটাশিয়াম D. ম্যাগনেসিয়াম
09. পুরুষের প্রতিটি বৃক্কের ওজন-
 A. 150 - 190 গ্রাম B. 130 - 150 গ্রাম
 C. 160 - 180 গ্রাম D. 180 - 195 গ্রাম
10. বোম্বাল ক্যাপসুলে এপিথেলিয়ামের কয়টি আবরণ থাকে?
 A. দুইটি B. একটি C. দুই জোড়া D. তিনটি
11. যে পদার্থের জন্য মূত্রের স্বাদাশো গন্ধ হয়-
 A. নতুন পদার্থের উৎপাদন B. ইউরিনোডের উপস্থিতির জন্য
 C. গ্রোমেরুলাসে অতি পরিস্রাবন D. নালিকার সক্রিয় রেচন
12. হেনলির লুপ কী আকৃতির ফাঁস সৃষ্টি করে?
 A. V আকৃতির B. U আকৃতির C. L আকৃতির D. কোনোটিই নয়
13. মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে কতটুকু রক্ত প্রবাহিত হয়?
 A. 1100 সিসি B. 1200 সিসি C. 100 সিসি D. 125 সিসি
14. মূত্রে কোন ইলেকট্রোলাইট থাকে না?
 A. সিজিয়াম B. অ্যামোনিয়াম C. ম্যাগনেসিয়াম D. পটাশিয়াম
15. অসমোরিসেন্টের কোথায় অবস্থান করে?
 A. থ্যালামাসে B. মেডুলায় C. হাইপোথ্যালামাসে D. পনাসে
16. পূর্ণাঙ্গ পুরুষের দৈনিক ওজনের কতটুকু পানি?
 A. 70% B. 50% C. 60% D. 55%
17. রক্ত থেকে ডায়ালাইসিসে ব্যাপিত হয় কোনটি?
 A. রক্ত কণিকা B. অণুচক্রিকা C. প্রোটিন D. ইউরিয়া
18. নিম্নের কোন আবরণ দ্বারা বৃক্ক আবৃত থাকে?
 A. টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া B. টিউনিকা ফাইব্রোসা
 C. টিউনিকা ইন্টার্না D. টিউনিকা অ্যাডভেনটেসিয়া
19. একটি গ্রোমেরুলাসে কতটি কৈশিকজালিকা থাকে?
 A. 160টি B. 50-60টি C. 125টি D. 95-100টি
20. নিচের কোন হরমোনটি বৃক্ক থেকে উদ্ভূত নয়?
 A. এরিথ্রোপয়েটিন B. প্রোস্টাগ্লান্ডিন
 C. অ্যান্জিওটেনসিন D. প্রোথ হরমোন

Answer Analysis

01.C	02.C	03.C	04.B	05.C	06.A	07.D	08.C	09.A	10.A
11.B	12.B	13.B	14.A	15.C	16.C	17.D	18.B	19.B	20.D

ଚଳନ ଓ ଅଞ୍ଚାଳନା

জীববিজ্ঞান
২য় পত্র

সাজেশনস	RATINGS		
	★★★	★★	★
মুখমন্ডলীয় অস্থি, করোটিকা, বৈশিষ্ট্য	কর্ণাঙ্ঘ্রি	কাপাল, টার্সাল	
তরুণাঙ্ঘ্রির প্রকারভেদ	অস্থি ও তরুণাঙ্ঘ্রির পার্থক্য	—	
অমসৃণ, মসৃণ ও হৃদশৈশির অবস্থান	নিউক্লিয়াসের অবস্থান	কাজ	
উদাহরণ	—	—	

TOPIC-01

কঙ্কালতন্ত্র

মানুষের বুদ্ধিগততার গঠন:

প্রধান ভাগ	অন্তর্ভুক্ত অংশ	বিন্যাস	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
অঙ্গীয় ককাল (৮০টি)	করোট (২৯টি)	ফ্রন্টাল অস্থি	১টি	৮টি
		প্যারাইটাল অস্থি	২টি	
		টেমপোরাল অস্থি	২টি	
		অক্সিপিটাল অস্থি	১টি	
		এথময়েড+স্কেনয়েড অস্থি	১+১টি	
		ম্যাক্সিলা	২টি	১৪টি
		ম্যান্ডিবল	১টি	
		জাইগোম্যাটিক অস্থি	২টি	
		ন্যাসাল অস্থি	২টি	
		ল্যাক্রিমাল অস্থি	২টি	
		ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা	২টি	
		ভোমার	১টি	
		প্যালেটাইন অস্থি	২টি	
	কর্ণাস্থি	ম্যালিয়াস	২টি	৬টি
		ইনকাস	২টি	
		স্টেপিস	২টি	
	হাইঅয়েড		১টি	১টি
	মেরুদণ্ড	সারভাইকাল কশেরুকা	৭টি	২৬টি (৩০টি)
		থোরাসিক কশেরুকা	১২টি	
		লাম্বার কশেরুকা	৫টি	
		স্যাক্রাল কশেরুকা	১টি(৫টি)	
		কক্সিগ্ন	১টি(৪টি)	
	বক্ষপিঞ্জর	স্টার্নাম	১টি	২৫টি
		পর্বকা (প্রতিপাশে ১২টি)	২৪টি	
উপাঙ্গীয় ককাল (১২৬টি)	বক্ষ-অস্থিচক্র	স্ক্যাপুলা	২টি	৪টি
		ক্ল্যাভিকল	২টি	
	বাহু (দুটি)	হিউমেরাস	২টি	৬০টি
		রেডিয়াস	২টি	
		আলনা	২টি	
		কার্পাল	১৬টি	
		মেটাকার্পাল	১০টি	
		ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
	শ্রোণী-অস্থিচক্র	ইলিয়াম	১টি	২টি
		ইচ্চিয়াম	১টি	
		পিউবিস	১টি	

প্রধান ভাগ	অন্তর্ভুক্ত অংশ	বিন্যাস	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
		(প্রতিপাশের অস্থিগুলো (৩-৬) মিলিত হয়ে একটি করে হিপ বোন গঠন করে। সে হিসেবে দু'পাশে দুটি হিপ বোন থাকে)		
	পা (দুটি)	ফিমার	১টি	৬০টি
		টিবিয়া	১টি	
		ফিবুলা	১টি	
		প্যাটেলা	১টি	
		টার্সাল	১৪টি	
		মেটাটার্সাল	১০টি	
		ফ্যাল্যাঞ্জন	২৮টি	
			সর্বমোট	২০৬টি

TOPIC-02

ਅਭਿ ਨਾਮਾਨੰਦ ਭਯਾ

অস্থির বাইরের আবরণকে পেরিস্টিয়াম বলে (অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট, অস্টিওপ্লাস্ট কোষ ছাড়াও হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বিন্যাস)।


➤ ଅହିର ହାତାରନିଆନ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ:

- ল্যামেলি: ন্যাদ্রিলের স্তর (৫-১৫)টি।
- ল্যাকুনা (এর মধ্যে অস্থিকোষ বা অস্টিসেইট অবস্থান করে): ল্যামেলার স্পন্দন করে।
- ক্যানালিকুলি: চুলের ন্যায় ল্যাকুনার চারনিক থেকে বের হয়।
- হ্যাভারসিয়ান নালি বা হ্যাভারসিয়ান ক্যানেল: যে নালির চারপাশে ল্যামেলি থাকে।
- ভক্স্যানস নালি: হ্যাভারসিয়ান নালি যে নালি দ্বারা আড়া-আড়ি লাগে।

➤ বিভিন্ন অস্থির বৈশিষ্ট্য:

বাতন আস্থর বোনাঃ	বৈশিষ্ট্য
অস্থির নাম	
স্ক্যাপুলা	ফ্রোয়েড গহ্বর, কোরাকয়েড প্রসেস, অ্যান্ট্রোমিডাল প্রসেস।
হিউমেরাস	হোট ও বড় টিউবার্কল, সার্জিক্যাল ও অ্যান্ট্রোমিডাল গ্রীব, ক্যাপিচুলাম ও ট্রিকলিয়া, ডেলটয়েড রিজ।
ক্ল্যাবিকল	/ (ইটালিক এফ) এর মতো দেখতে, হেলেনের দেহে Collar bone ও মেয়েদের দেহে Beauty bone নামে পরিচিত।
রেডিয়াস ও আলনা	করনয়েড প্রসেস, ওলোক্রেনন প্রসেস, ট্রিকলিয়ার নড, টিউবারোসিটি, স্টাইলয়েড প্রসেস।
ফিমার	দেহের সবচেয়ে মজবুত ও বৃহত্তম অস্থি, হোট ও বড় ট্রোকাটার।
হাইওয়েড অস্থি	হাইওয়েড বডি সম্বলিত দুই জোড়া কাটা বা কর্ণার নিয়ে গঠিত, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণাধি হিসেবে থাকে পরে অস্থিতে পরিণত হয়। ম্যান্ডিবল ও ল্যারিংক্সের মাঝে অবস্থিত থাকে। বা জিহবার অবস্থান ন্য করে ও কথা বলা, খাদ্য গলাধঃকরণে সহায়তা করে।

অস্থি সন্ধি: দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট বলে।



- গ্লেনয়েড গহ্বর- হিউমেরাসের মস্তক আটকানো থাকে
- অ্যাসিটাবুলাম গহ্বর- ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে

> সন্ধির আঘাত:

- স্থানচ্যুতি: একটি অস্থিসন্ধিতে অবস্থিত দুটি অস্থির মধ্যে একটি সরে গেলে স্থানচ্যুতি ঘটে।
- মচকানো: অস্থিসন্ধিতে আঘাতের ফলে সন্ধিকে অবলম্বনদানকারী লিগামেন্টে সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা টান কিংবা লিগামেন্ট ছিঁড়েও যেতে পারে। এমন অবস্থাকে সাধারণভাবে মচকানো নামে অভিহিত করা হয়।

TOPIC-03

কি নামে ডাকি তোমায়?

- ফ্রন্টাল অস্থি → ললাট বা কপালের অস্থি
- প্যারাইটাল অস্থি → চাঁদির অস্থি
- করোটিকা → খুলির অস্থি
- ক্লাভিকল → Collar Bone or Beauty Bone
- ১ম সারভাইকাল কশেরুকা → অ্যাটলাস
- ২য় সারভাইকাল কশেরুকা → অ্যাক্সিস
- ৭ম সারভাইকাল কশেরুকা → ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স
- আদর্শ পর্দকা → ১ম-৭ম
- নকল পর্দকা → ৮ম, ৯ম, ১০ম।
- ভাসমান পর্দকা → ১১শ ও ১২শ
- সিসাময়েড অস্থি → প্যাটেলা

TOPIC-04

তরুনাস্থি সম্পর্কিত তথ্য

- তরুনাস্থির বাইরের আবরণকে পেরিকড্রিয়াম বলে (কন্ড্রোসাইড, কন্ড্রিওব্লাস্ট কোষ বিদ্যমান)।

> তরুনাস্থি চার প্রকার:

তরুনাস্থি	অবস্থান
স্বচ্ছ বা হায়ালিন	স্তন্যপায়ীর নাক, শ্বাসনালী, স্বরযন্ত্র, পর্দকার প্রান্তভাগ, অস্থি সন্ধিস্থল, সকল মেরুদণ্ডীয় জ্ঞীয় কঙ্কাল, ব্যাঙ ও হাঙরের জ্ঞ বা পরিণত দেহে।
স্থিতিস্থাপক বা গীততন্ত্রময়	বহিঃকর্ণ বা পিনা, আলজিহ্বা, স্বরযন্ত্র, নাসিকার অগ্রভাগ, ইউস্টেশিয়ান নালী।
শ্বেত তন্ত্রময়	বিশেষ কয়েকটি সন্ধিতে, যেমন- দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পিউবিস সিমফাইসিস, অস্থি ও টেনডনের সংযোগস্থল।
চুনময় বা ক্যালসিফাইড	হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে।

TOPIC-05

পেশি সম্পর্কিত তথ্য

> অমসৃণ, মসৃণ ও দ্ব্যপেশীর মধ্যে তুলনা:

তুলনীয় বিষয়	এচ্ছিক পেশী/ কঙ্কালপেশী/রৈখিক/ চিহ্নিত পেশী	ভিসেরাল পেশী/অনৈচ্ছিক পেশী/মসৃণ পেশী	দ্ব্যপেশী/ কার্ডিয়াক পেশী
অবস্থান	অস্থিসংলগ্ন, চোখ, জিহ্বায়, গলবিলে, হাত ও পায়ের অস্থিতে	পৌষ্টিকনালী, রক্তনালী, রেচননালী, শ্বাসনালী, জনননালী, জরায়ু	হৃদপিণ্ডের প্রাচীরের মায়েকার্ডিয়ামে
প্রকৃতি	এচ্ছিক	অনৈচ্ছিক	অনৈচ্ছিক
পেশীতন্ত্র	নলাকার ও শাখা বিহীন	মাকু আকৃতির ও শাখা বিহীন	নলাকার ও শাখাযুক্ত

তুলনীয় বিষয়	এচ্ছিক পেশী/ কঙ্কালপেশী/রৈখিক/ চিহ্নিত পেশী	ভিসেরাল পেশী/অনৈচ্ছিক পেশী/মসৃণ পেশী	দ্ব্যপেশী/ কার্ডিয়াক পেশী
নিউক্লিয়াস	অসংখ্য, পরিধিতে থাকে	একটি কেন্দ্রে থাকে	একটি কেন্দ্রে
আড়াআড়ি দাগ	বিদ্যমান	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত
ইন্টারক্যালারেড ডিস্ক	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	বিদ্যমান
সঙ্কোচন ক্ষমতা	দ্রুত ও শক্তিশালী	মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী	পরিমিত ও ছন্দোময়
সারকোপ্লাজম	স্বল্প পরিমাণ	স্বল্প পরিমাণ	যথেষ্ট পরিমাণ
অবসাদমুখতা	সহজেই অবসাদমুখত হয়	সহজে অবসাদমুখত হয় না	সাধারণত অবসাদমুখত হয়
কাজ	অঙ্গ সঞ্চালন ঘটায়	বিভিন্ন নালীতে বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে	হৃৎস্পন্দন ঘটায়

> হাটুর পেশী:

পেশিগুচ্ছের প্রকৃতি	পেশীর নাম/কাজ
বক্রীকরণ পেশি/ হ্যামস্ট্রিং পেশি	বাইসেপস, সেমিমেম্ব্রানোসাস, সেমিটেন্ডিনোসাস সংকোচনে ফিমার ও টিবিয়া কাছাকাছি আসে।
প্রসারণ পেশি/ কোয়াদ্রিসেপস পেশি	রেকটাস ফিমোরিস, ভ্যাসটাস মিডিয়ালিস, ভ্যাসটাস ল্যাটারালিস, ভ্যাসটাস ইন্টারমিডিয়ালিস সংকোচনে হাঁটু সন্ধির প্রসারণ হয়।

TOPIC-06

লিভার সম্পর্কিত তথ্য

> লিভারের গঠন: লিভার বাহু, পিভট, প্রচেষ্টা, ভার।

> লিভার ৩ প্রকার:

লিভারের প্রকারভেদ	উদাহরণ	সুবিধা
প্রথম শ্রেণী লিভার	• কাঁচি • মাথা ও প্রথম কশেরুকার মধ্যবর্তী সন্ধি	অল্প বল প্রয়োগ করে বেশি ফল পাওয়া যায়
দ্বিতীয় শ্রেণী লিভার	• ঠেলা গাড়ি • পায়ের আঙ্গুলের ডগায় দাড়াতে	সামান্য প্রচেষ্টায় বেশি ওজন উপরে তুলে যাওয়া যায়
তৃতীয় শ্রেণী লিভার	• নখ কাটার যন্ত্র • কনুই সন্ধি	দ্রুত গতির সঞ্চালন সুবিধা।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কঙ্কালতন্ত্র জ্ঞীয় কোন স্তর হতে সৃষ্টি হয়- মেসোডার্ম।
- করোটির ডানার মতো অস্থিটির নাম- ফেনয়েড।
- করোটিকার সংখ্যা-৮টি।
- মুখমণ্ডলীয় অস্থি-১৪টি।
- মুখমণ্ডলীয় অস্থিসমূহের নামগুলো- ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, জাইগোম্যাক্সিটিক, ন্যাসাল্যাক্সিটিক, ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা, ভোমার ও প্যালাটেইন।
- মহাবিবর বা ফোরামেন ম্যাগনাম অবস্থিত- অক্সিপিটাল।
- করোটিকার অস্থি/ জোড় অস্থি-প্যারাইটাল।
- মানুষের মেরুদণ্ডের প্রথম অস্থি (অ্যাটলাস) করোটিকার কোন অস্থির সাথে যুক্ত থাকে অক্সিপিটাল অস্থি।
- পিটুইটারি গ্রন্থিকে ধারণ করে করোটিকার কোন অস্থি- ফেনয়েড অস্থি।
- মানব শ্রবণাঙ্গকে সুরক্ষা করে- টেম্পোরাল অস্থি।
- মানুষের অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের অংশ- করোটিকা।
- মানুষের করোটিকার অস্থির সংখ্যা-২৯ টি।
- মানবদেহে অক্ষীয় কঙ্কাল অস্থির সংখ্যা-৮০ টি।

04. মানুষের রূপান্তরিত কশেরুকার সংখ্যা কত? [GST-A. 23-24]
 A. দুইটি B. চারটি
 C. পাঁচটি D. নয়টি **A**
05. পরিণত বয়সে সর্বমোট কশেরুকার সংখ্যা কত? [BSMRSTU: C, 18-19; RU. 10-11; JUST. 11-12]
 A. 22টি B. 26টি
 C. 29টি D. 33টি **B**
06. বক্ষদেশীয় কশেরুকা কয়টি? [দি. বো. ১৯]
 A. 5 B. 7
 C. 12 D. 14 **C**
07. তরুণাঙ্গি কোন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে? [DU. 17-18, 09-10; JU: D, 14-15; BAU. 00-01, 03-04]
 A. পেরিঅস্টিয়াম B. পেরিকড্রিয়াম
 C. পেরিট্রিক মেমব্রেন D. কিউটিকল **D**
08. অস্থির বাইরের আবরণকে কি বলা হয়? [DU. 17-18, 12-13, 03-04; JU: D, 09-10, 10-11; MBSTU. 12-13]
 A. পেরিটোনিয়াম B. পেরিকার্ডিয়াম
 C. পেরিঅস্টিয়াম D. পেরিস্ট্রোমিয়াম **C**
09. হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে কোন ধরনের তরুণাঙ্গি বিদ্যমান? [JU-D, Set-T. 23-24]
 A. স্বচ্ছ B. স্থিতিস্থাপক
 C. শ্বেত-তন্তুময় D. চুনময় **D**
10. শ্বাসনালিতে কোন ধরনের তরুণাঙ্গি দেখা যায়? [ব.বো. ২০২২, রা.বো. ২০১৭]
 A. হায়ালিন B. পীততন্তুময়
 C. শ্বেততন্তুময় D. ক্যালসিফাইড **A**
11. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক কোন ধরনের কলার বৈশিষ্ট্য- [DU. 09-10; RU. 13-14, 10-11; HSTU.; CU. 17-18, 13-14; JU-D, Set-A. 20-21]
 A. হৃৎপিণ্ডীয় কলা B. স্নায়ুকলা
 C. অস্থির কলা D. আন্ত্রিক কলা
- SAW Why** ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক একমাত্র হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে পাওয়া যায়। এ ডিস্ক হৃৎপিণ্ডের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।
12. পেশীতন্ত্র যে আবরণে আবৃত থাকে তার নাম কি? [JU: D, 13-14]
 A. সারকোলেমা B. মায়োলিন
 C. সারকোপ্লাজম D. মায়োসিন **A**
13. পেশি সংকোচনের জন্য কোন আয়নটি অত্যাবশ্যকীয়? [GST-A. 2021-22]
 A. Na B. Ca
 C. K D. Cl
- SAW Why** ক্যালসিয়াম আয়ন ক্যালডোলিনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যাকটিন ও মায়োসিন প্রোটিনের মধ্যে ক্রস কানেকশন ঘটায়। যার কারণে পেশি সংকুচিত হয়।
14. মানব দেহে মোট অস্থির সংখ্যা কয়টি? [Ref: মাজেদা ম্যাডাম, হাসান স্যার, মেঘনাদ স্যার]
 A. 207টি B. 206টি
 C. 200টি D. 201টি **B**

PRIME TEST

01. কোন জরীয় স্তর থেকে অস্থি ও তরুণাঙ্গি উদ্ভূত হয়?
 A. এন্ডোডার্ম B. মেসোডার্ম
 C. এন্ডোডার্ম D. এপিডার্ম
02. ক্রোটিকী কী অস্থি নিয়ে গঠিত?
 A. মুখমণ্ডল ও ক্রোটিকা B. পর্ভকা ও স্টার্নাম
 C. ফ্রন্টাল ও প্যারাইটাল D. ম্যাক্সিলা ও ম্যান্ডিবল
03. নিচের কোনটি মুখমণ্ডলীয় অস্থি নয়?
 A. ম্যাক্সিলা B. ম্যান্ডিবল
 C. ন্যাসাল D. এথময়েড

04. পিটুইটারি গ্রন্থিকে ধারণ করে ক্রোটিক কোন অস্থি?
 A. ফ্রন্টাল অস্থি B. প্যারাইটাল অস্থি
 C. ফেনয়েড অস্থি D. টেম্পোরাল অস্থি
05. কশেরুকার বৃহত্তম অংশ কোনটি?
 A. সেন্ট্রাম B. পেডিকেল
 C. ল্যামিনা D. স্পাইন
06. নিচের কোনটি রিং আকৃতির?
 A. অ্যাটলাস B. অ্যান্ড্রিস
 C. কল্লিগ্র D. স্যাক্রাম
07. ভাসমান পর্ভকা কোনগুলো?
 A. ১০ম, ১১শ B. ১১শ, ১২শ
 C. ১০ম, ৯ম D. ৭ম, ৮ম
08. বক্ষপিঞ্জর কোন ধরনের খসনে অংশ নেয়?
 A. অন্তঃখসন B. বহিঃখসন
 C. a ও b উভয়ই D. কোনটিই নয়
09. ক্র্যাডিকলের কোন প্রান্ত ক্যাপুলার সাথে যুক্ত থাকে?
 A. স্টার্নাম B. অ্যাক্সেমিয়াল
 C. জিফয়ডাল D. ক্র্যাডিকুলার
10. কজির অস্থি কতটি?
 A. ৮টি B. ৪টি
 C. ১০টি D. ৬টি
11. অ্যাসিটাবুলাম নিচে কোন অস্থির সংযোগস্থলে থাকে না?
 A. ইলিয়াম B. ইশিয়াম
 C. পিউবিস D. হিউমেরাস
12. দু'পাশের পিউবিস যেখানে মিলিত হয় তার নাম কী?
 A. পিউবিক ক্রেন্ট B. পিউবিক টিউবার্কল
 C. পিউবিক সিমফাইসিস D. সবগুলো
13. প্যাটেলা একটি সিসাময়েড অস্থি; কারণ এর উৎপত্তি হয়-
 A. অস্থি থেকে B. পেশি থেকে
 C. টেনডন থেকে D. লিগামেন্ট থেকে
14. ম্যালিওলাস কীসের অংশ?
 A. ফিমার B. টার্সাল
 C. টিবিয়া D. কার্পাল
15. অস্থির আবরণীর নাম কী?
 A. পেরিকড্রিয়াম B. পেরিটোনিয়াম
 C. পেরিঅস্টিয়াম D. পেরিমেট্রিয়াম
16. হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো পরস্পরের সাথে কীসের সাহায্যে যুক্ত থাকে?
 A. ল্যামেলি B. ক্যানালিকুলি
 C. ডকসম্যান নালি D. মজ্জা গহ্বর
17. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক নামে অনুপ্রস্থ রেখা থাকে কোনটিতে?
 A. হৃদপেশি B. মসৃণ
 C. রৈখিক D. চিহ্নিত
18. পেরিস্ট্যালসিসে সাহায্য করে কোন পেশি?
 A. Voluntary muscle B. Cardiac muscle
 C. Visceral muscle D. None
19. ঠেলাগাড়ি কোন শ্রেণির লিভারের উদাহরণ?
 A. প্রথম B. দ্বিতীয়
 C. তৃতীয় D. চতুর্থ
20. RICE এর অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?
 A. Rehabilitation B. Ice
 C. Compression D. Elevation

Answer Analysis

01.B	02.A	03.D	04.C	05.A	06.A	07.B	08.B	09.B
11.D	12.C	13.C	14.C	15.C	16.C	17.A	18.C	19.B

অধ্যায়
০৮

সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ

জীবনিকাজ
১ম পত্র

সম্প্রদায়	RATINGS		
	***	**	*
সুখ	নিউটন	স্বাধীনতা	-
নিউটন বিভিন্ন অংশের কাজ ও কাজ	সেপেরাম, সেপেরাম, ক্যাডাম	হাইপোথ্যালাম, মেডুলা অবলংগাটা	পনস
করোটিক শ্রাব	করোটিক শ্রাবের নাম, প্রকার	কাজ	-
চক্ষু	স্ক্লেরা, রেটিনা, অক্লিন, অক্লিন	বড় কোষ ও কোষ কোষ	কর্নিয়া, ক্রিস্টাল
কান	টিমপানিক পর্দা, ইউট্রিকুলাস, স্যাকুলাস	পিনা, ইউট্রিকুলাস নালী	-
চরম ও গ্রন্থি	গ্রন্থি প্রকারভেদ, পিউইটরি গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল	ডিম্বাশয়, বক্রাশয়	পাইরামিড

TOPIC-01

নিউটন ও করোটিক শ্রাব

মনুষ্যের শরীরের সমন্বয়ের প্রধান সমন্বয়কারী শ্রাবতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী
বৈশিষ্ট্য নিউটন বসে। 100 বিভিন্ন (এক লাফ কোটি) নিউটন এবং 1 বিলিয়ন
(একশত কোটি) নিউট্রোফিল কোষ থাকে।

11. নিউটন প্রকারভেদ:

ভিডি	প্রকারভেদ	ব্যবহৃত পদ্ধতি
অন্য	অপোলার (Apolar)	ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন নেই (সেপেরাম সেমিনারের বিচ্ছিন্নতা এবং সেপেরাম রেটিনার মাধ্যমে নিউট্রোফিল তন্ত্র)।
	ইউনিপোলার (Unipolar)	একটিমাত্র অ্যাক্সন (প্রান্তীয় শ্রাবতন্ত্রে থাকে, প্রধানত সেপেরাম)।
	সেউনিপোলার (Pseudo-unipolar)	ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন একটি মাত্র সেপেরাম উপস্থিত (স্পাইনাল গ্যাংলিয়া ও করোটিক শ্রাব গ্যাংলিয়ায়)।
	বিসম্পোলার (Bipolar)	একটি অ্যাক্সন ও একটি ডেনড্রাইট (রেটিনা, কর্নিয়া, নাকে পাওয়া যায়)।
	মাল্টিপোলার (Multipolar)	একটি ডেনড্রাইট ও একটি অ্যাক্সন (স্থলপাণীসের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডে পাওয়া যায়)।

12. নিউট্রোফিল:

নিউটন যে যেসকল টিস্যুর ভিতরে সঞ্চিত থাকে তাকে নিউট্রোফিল বসে।

■ চরম শ্রাবের নিউট্রোফিল হলো:

- অ্যাড্রিনালিন (পুষ্টি সরবরাহ করে)
- অ্যাড্রিনালিন (হারমোন আনবল গঠন করে)
- হাইড্রোকর্টিসন (এক পিউইটরি ও ক্যাডামাইট্রোফিল প্রক্রিয়ার জীবন তন্ত্র করে)
- এপেনডাইমা (CSF তৈরি, সংরক্ষণ ও শোষণ করে)।

13. করোটিক শ্রাবের কাজ:

শ্রাবের নাম	কাজ
1. অক্লিন	হৃদয় অনুভূত মস্তিষ্কে পৌঁছানো
2. অক্লিন	শরীর অনুভূত মস্তিষ্কে পৌঁছানো
3. অক্লিন	অক্লিনের সংরক্ষণ
4. অক্লিন (প্যাথলজিক শ্রাব)	অক্লিনের সংরক্ষণ
5. অক্লিন	সর্বশেষ অংশ থেকে সংরক্ষণ মস্তিষ্কে প্রেরণ

শ্রাবের নাম	কাজ
6. অক্লিন	অক্লিনের সংরক্ষণ
7. অক্লিন	হৃদয়, হৃদয়, হৃদয়, হৃদয়
8. অক্লিন (অক্লিন)	হৃদয় ও অক্লিন
9. অক্লিন	হৃদয় ও অক্লিন
10. অক্লিন (অক্লিন)	হৃদয় ও অক্লিন
11. অক্লিন	হৃদয় ও অক্লিন
12. অক্লিন	হৃদয় ও অক্লিন

• টপিক: 1, 2 → অক্লিন, 3, 4 → অক্লিন, 5 → অক্লিন

• মস্তিষ্ক শ্রাবের শ্রাব:

চরম (অক্লিন)	শ্রাবের প্রকারভেদ 'অ' অক্লিন শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের	শ্রাবের শ্রাবের 'অ' অক্লিন শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের	শ্রাবের শ্রাবের 'অ' অক্লিন শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের
শ্রাবের কাজ	অক্লিনের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের	অক্লিনের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের	অক্লিনের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের
শ্রাবের নাম	অক্লিনের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের	অক্লিনের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের	অক্লিনের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের শ্রাবের

TOPIC-02

মস্তিষ্ক

11. মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ:

অংশের নাম	শ্রাবের নাম	কাজ ও গঠন
অংশের নাম	শ্রাবের নাম	কাজ: চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি প্রকৃতি মানসিক রোগের নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ প্রকৃতি, বাকশক্তি এবং গ্রন্থির শরীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
		Maemonic: ইচ্ছা ও বুদ্ধি বাকশক্তি চিন্তা নিয়ন্ত্রণ বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
		গঠন:
		• মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ, মোট মস্তিষ্কের 80%
		• বাকশক্তি প্রেরণের ও প্রেরণের প্রেরণের মাধ্যমে গঠিত
অংশের নাম	শ্রাবের নাম	• দুটি সেপেরাম সের্বিক্যাল নামক বড় কর্ণাস ক্যাডাম নামক শ্রাবতন্ত্র দ্বারা বৃত্ত থাকে।
		• সেপেরাম সের্বিক্যাল, সেপেরাম কর্ডেট, সেপেরাম গ্যাংলিয়া ও কর্ণাস স্ট্রুটাম নিয়ন্ত্রণ গঠিত।
		• চীৎকারকে জটিল ও নিউ জটিলকে সংরক্ষণ বা কিসের বসে।
		• সেপেরাম অক্লিন আবার প্রাণ হলো মানুষ

প্রাণীক মস্তিষ্ক	প্রাণীক মস্তিষ্ক	কাজ ও গঠন
	প্যাপানাস	প্যাপানাসইজড হয়ে যায়। - এটি খণ্ড বা লোব বিদ্যমান-ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল, অক্সিপিতাল, লিম্বিক। - চাপুস্পর্ক, যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র, অবশেষের কেন্দ্র ও অজ্ঞাতস্রীণ অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন, মানুষের ব্যতিক্রম ও সামাজিক আচরণ এবং যুমত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক করে। Mnemonic: ঈদের সময় টেনে উঠলে যে খটনা ঘটে - সেব্রেম এর প্রধান প্রবেশ পথ বা সিংহদ্বার বলে।
	হাইপোথ্যালামাস	- জীব জাতিক ঘড়ি বা Biological Clock বলে। - বয়স্ক স্নায়ু কেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অত্যধিক বা গ্রহীর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যানোসেনিন ও অক্সিটেনিন নামে দু'রকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয় এবং তা পচা পচিটাইটির মধ্যে জমা থাকে।
মধ্যমস্তিষ্ক (মোটেলসোফালন)	মোটেলসোফালন	টেকটাম, সেব্রেমাল অ্যাকুইডাক্ট, কর্ণোয়া কোয়ড্রিজেনিমা, সেব্রেমাল পেডাকুল দ্বারা গঠিত। অক্ষ ও পচা মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পচা মস্তিষ্ক (মেডেনসোফালন)	সেরেবেলাম	- এক্সিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। এক্সিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে। চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে। - সেরেবেলামের গড় ওজন 150 গ্রাম।
	পনস (সেতু মস্তিষ্ক)	- সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত (রিলে স্টেশন) করে; মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে। - পনস এর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তুগুলো আড়াআড়িভাবে একে অপরকে অতিক্রম করে-এ কারণে মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	- প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে; স্বর্ষপঙ্ক্তের স্পন্দন, শ্বসন, চর্বণ, শ্বাস্য গলাধকরণ পরিপাক রস ক্ষরণ, ঘাম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ঘটায়। পৌষ্টিকনাগিরি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রাস-প্রশ্বাস, রক্তনাগিরি সংকোচন-প্রসারণ, শালা নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। 4টি (IX-XII) করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে।

02. মস্তিষ্কের পছর সমূহ বা নিম্ন সমূহ:

পছরের নাম	অবস্থান
পাখী বা 1ম ও 2ম পছর	অগ্রমস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি লোব বা সেব্রেমাল হেমিসফিয়ারের কেন্দ্রভাগ
তৃতীয় পছর	অগ্রমস্তিষ্কের থ্যালামাসের মধ্যবর্তী পছর
চতুর্থ পছর	পচা মস্তিষ্ক

Nice To know:

পাখীক ডেট্রিকল দুটি 'ফোরমেন অব মনরো' ইটারডেট্রিকুলার স্রি নামক নলিদ্বারা ওয় ডেট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে ওয় ডেট্রিকল 'সেব্রেমাল অ্যাকুইডাক্ট' বা 'অ্যাকুইডাক্ট অব সিলভিয়াস' দ্বারা ওয় ডেট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।

TOPIC-03

চোখ, কান

01. চোখের বিভিন্ন অংশের কাজ:

চোখের অংশ	প্রধান কাজ
স্ক্লেরা	- অক্ষিপোলকের আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। - চোখে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
কর্ণিয়া (চোখের জানালা)	- প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে - আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে।
কোরয়েড	- অক্ষিপোলকে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিফলন রোধ করে। - অক্ষিপোলকের গুণি প্রদান করে। - সিলিয়ারি বডি থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার নিয়ন্ত্রণ করে।
আইরিশ	পিউপিলের স্রি ছোট-বড় করে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।
সিলিয়ারি বডি	লেগের উপযোগে সহায়তা করে।
রেটিনা	বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
লেগ	- আলোর প্রতিসরণ ঘটায়। - আলোকরশ্মিকে রেটিনার উপর কেন্দ্রীভূত করে।
পিউপিল	এর মাধ্যমে চোখে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে।
কনজাংটিভা	বাইরের ধূলাবালি থেকে কর্ণিয়াকে রক্ষা করে।
অকুবিবিন্দু	রড কোষ ও কোণ কোষ না থাকায় অকুবিবিন্দুতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না।
কোবিয়া	অল্প রড কোষ কিন্তু প্রচুর কোণ কোষ থাকায় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এখানেই সবচেয়ে ভাল হয়।
সেট্রালাস	এখানেই সবচেয়ে ভাল হয়।
অপাটিকস্ স্নায়ু	রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।
রড কোষ	মৃদু আলো শোষণ করে।
কোণকোষ	উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণ করে।
অ্যাকুয়াস হিউমার	- লেগের গুণি যোগায় - বিবর্ষক মাধ্যমরূপে কাজ করে।
ভিট্রিয়াস হিউমার	- রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে। - অক্ষিপোলকের আকৃতি বজায় রাখে।
লিভেটর পালপেব্রি সুপিরিওরিস	উর্ধ্ব অক্ষি পল্লবকে উপরে তুলতে সহায়তা করে।

02. বহিঃকর্ণ:

- পিনা বা কর্ণহুয়:
 - মস্তিষ্কের দু'পাশে তরুনাঙ্ঘি নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত অংশবিশেষ
 - কাজ: শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রেরণ করা।
- বহিঃঅডিটরি মিটাস বা কর্ণকুহুয়:
 - কর্ণহুয়ের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত।
 - এর বাইরের এক-তৃতীয়াংশ তরুনাঙ্ঘি দিয়ে এবং দুই-তৃতীয়াংশ অস্থিতে গঠিত।
 - এটি মোমমাছি ও সুন্ধ্য রোমযুক্ত ত্বকে আবৃত।
 - কাজ: কর্ণপটহ বা টিমপেনিক পর্দার অনুকূল উন্মত্ততা ও অর্দ্রতা বজায় রাখে।

শিক্ষাবিদ্যালয় তত্ত্বি সহায়িকা
শিক্ষণিক পদা বা কর্ণপটহ।
শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

- বিশ্বশান্তির শেষ প্রাচ্যে অবস্থিত, বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ ব্যবধায়ক পর্দা বিশেষ।
- এর বাইরের দিক অবতল, ভেতরের দিক উত্তল।
- এর সাথে মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস অস্থি যুক্ত থাকে।
- কাজ: শব্দতরঙ্গে বেঁধে উঠে এবং শব্দতরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবহন করে।

স্বদেশীয়
ইউনিভার্সিটি বালী:

- ইউটেশিয়াম নালী।
- মধ্যকর্ণ ও গলবিলের সংযোগ নালী।
- কাজ: মধ্য কর্ণের ইউটেশিয়াম নালী কর্নপটহের উভয় পাশের ন্যূনতম চাপ সমান রাখে।

• कथाहिः

- **কৃষি:** শস্য তরঙ্গ বহিস্করণ থেকে অন্তঃস্করণে প্রেরণ করে।
 • 3 প্রকার: i. ম্যানিয়াম (হাতুড়ির মতো) ii. ইনকাস (নেহাই এর মতো)
 iii. স্টেনিস (ত্রিকোণাকার)

विषयः

- মধ্য কর্ণের প্রাচীর পেরিওটিক অস্থিতে গঠিত।
- ফেনেস্ট্রা ওভালিস: উপরের দিকে ডিম্বাকার ছিল।
- ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা: নিচের দিকে গোলা ছিল।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ:

- প্রধান অংশ মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ।
- ইয়া এন্ডোলিথিক নামক তরলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ পেরিলিথিক এ পূর্ণ।
- পেরিলিথিক শব্দ 20 গুণ বৃদ্ধি পায়।
- ভাবসাম্য অঙ্গ (ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস):
 - এটি ইউট্রিকুলাস, স্যাকুলাস, তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি দ্বারা গঠিত।
 - নালীর স্রীত প্রান্তকে অ্যাম্পুলা বলে। যাতে সংবেদী কোষ ও রোম থাকে।
 - স্যাকুলায় সংবেদী রোমকোষ থাকে এবং রোমকোষের রোমগুলো CaCO_3 ক্রিস্টাল (অটোলিথ) সমৃদ্ধ অটোলিথিক মেমব্রেন-এ দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে।
- শ্রবণ অঙ্গ (ককলিয়া)
 - শ্রাবকের খোলকের মতো প্যাচানো ককলিয়া (তিন প্রকোষ্ঠ) তৈরি করে ককলিয়ার অন্তঃপ্রাচীরের স্ক্যালামিডিয়ায় বেসিলার ঝিল্লীর শ্রুতি সংবেদী কোষে গঠিত "Organ of Corti" থাকে।
 - "অর্গ্যান অব কর্টি"-র সংবেদী রোম 25000 ওটোলিথে আবৃত ভেস্টিবুলে ককলিয়ার স্নায়ুর শাখা এবং অন্তঃকর্ণের বিভিন্ন অংশের সংবেদী কোষগুলি যুক্ত হয়ে মস্তিষ্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে (হেলিকোট্রিয়া)।

TOPIC-04	গ্রহি ও হরমোন
----------	---------------

হরমোন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়।

১. হরমোনের বৈশিষ্ট্য:

- হরমোন প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে দূরবর্তী অঙ্গে ক্রিয়া করে।
- হরমোন স্বল্প মাত্রায় বা ঘনত্বে কার্যকরী হয় এবং ক্রিয়ার স্থায়িত্বকাল অনেকদিন বজায় থাকে।
- হরমোন সাধারণত ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে না।
- হরমোন জীবদেহের কোষে রাসায়নিক সংযোগ সাধন করে এবং রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে।

2. বিভিন্ন গ্রহি নিঃসৃত হরমোন ও এদের ভূমিকা:

গ্রন্থের নাম	ভাগ	নিম্নসূত হরমোন	কাজ
পিটুইটারি গ্রন্থি (প্রধান গ্রন্থি বা গ্রন্থ গ্রন্থি বা Principle gland বা Master gland বা	অগ্রভাগ বা Anterior Pituitary বা Adenohyp ophysis	STH বা HGH	• অস্থি ও কোমল টিস্যুর বৃদ্ধি • প্রোটিন সংশ্লেষণ • গ্লাইকোজেন সংরক্ষণ ও চর্বি সংরক্ষকে উদ্দীপ্ত করেন।
		TSH	• থাইরয়েড গ্রন্থিকে হরমোন

[illegible]

গ্রন্থের নাম	ভাগ	নিঃসৃত হরমোন	কাজ
এন্ড্রাল বা সুপ্রাভেনাল গ্রন্থি	কর্টিস	গ্লুকোকর্টিকয়েড (কর্টিসল, কর্টিসোন, কর্টিকোস্টেরন)	• শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ। • ক্রিটাসের ক্রসফুল গঠন।
		মিনারেলোকর্টিকয়েড (আলডোস্টেরন, ডিঅক্সিকর্টিকোস্টেরন)	• খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।
		যৌন কর্টিকয়েড (এন্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন)	• যৌন বা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।
	মেডুলা • ক্ষরিত হরমোন হল ক্যাটেকোলামিন	এড্রেনালিন বা এপিনেফ্রিন (আপকোলীন হরমোন বলে)	• বিপাক নিয়ন্ত্রণ। • হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ। • দেহের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে। • ভয়, আনন্দ, শোক প্রকাশ।
		নর এড্রেনালিন বা নর এপিনেফ্রিন	• হৃৎপেশী উদ্দীপ্ত। • রক্তবাহিকা সংকুচিত। • রক্তচাপ বৃদ্ধি।
পিনিয়াল বডি		মেলাটোনিন	• ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রক্তকোষগুলো পীতবিন্দু এবং অধবিন্দু অঞ্চলে অনুপস্থিত। অন্যত্র সমভাবে বিন্যস্ত থাকে।
- কোষকোষগুলো অধবিন্দু অঞ্চলে অনুপস্থিত, কোটিয়া দেহালাস অঞ্চলে সর্বাধিক এবং অন্যত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকে।
- অধবিন্দু সম্বলিত অঞ্চলকে “অপটিক ডিস্ক” বলে।
- সেল প্রধান প্রতিসরণ বস্তু হিসেবে কাজ করে।
- ভিত্তিয়ার হিউমার সিলিয়ারি বডি এবং রেটিনা স্তর থেকে নিঃসৃত হয়।
- মানুষের পিনার পেশি নিষ্ক্রিয় তাই মানুষ কান নাড়াতে পারেনা।
- প্রাপ্ত বয়স্কদের পাইরক্সিনের ক্ষরণ কমে গেলে মিস্রিতিমা হয়।
- নিউট্রন এক ধরনের স্পেশালাইজড কোষ বিধায়, এর কোনো বিভাজন বা সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বিকাশ ও বর্ধন হয়।
- দু’ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে আইরিশ গঠিত।
- রক্ত কোষগুলো দস্তাকৃত।
- কোষ কোষ কোষকৃত বা মোচাকৃত।
- অটোকনিয়াম: অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস এ অবস্থিত ম্যাকুলা ও অটোলিথিক মেমব্রেনকে অটোকনিয়াম বলে।
- অস্ত্রোপচারে সমর মানুষকে অজ্ঞান করার (অ্যানেসথেসিয়া) জন্য এপি-ডুরাল স্পেসে ইনজেকশনের মাধ্যমে চেতনানাশক প্রদান করা হয়।
- এন্ডোলিথিক CaCO_3 সন্নিহিত অটোলিথ বিদ্যমান থাকে।
- পেরিসিঙ্কে শব্দতরঙ্গের শক্তি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়।
- অ্যান্ড্রেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত এপিনেফ্রিন হরমোন মানুষের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে।
- মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ১২ জোড়া করোটিক শ্রাযু ও সুস্থল্লাকান্ত থেকে উৎপন্ন ৩১ জোড়া সুস্থল্লাশ্রাযু নিয়ে প্রাণীয়া শ্রাযুতন্ত্র গঠিত।
- ADH হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বা বহুমূত্র রোগ হয়।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যুত্রে সাথে গ্লুকোজ নির্গত হলে একে গ্রাইকোশুরিয়া বলে।
- কোনো কারণে ইনসুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেয়ে এক বিশেষ লক্ষণ যুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, একে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে।

- প্রিসিন্যাপটিক ও পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেনের মাঝে প্রায় 20-30 ন্যানোমিটার ফাঁক থাকে, এ ফাঁককে বলে - সিন্যাপটিক ক্রেফট।
- সিন্যাপটিক ক্রেফটে নিউরেট্রান্সমিটার (অ্যাসিটাইল কোলিন) ক্ষরণের জন্য প্রয়োজন হয় আয়ন - Ca^{++} ।
- দুটি নিউরনের সংযোগস্থলকে বলে - সিন্যাপস।
- দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে - হাইপোথ্যালামাস।
- আবেগ, উদ্বেগ প্রভৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে যে কাজ করে - হাইপোথ্যালামাস।
- Biological Clock হিসেবে কাজ করে - হাইপোথ্যালামাস।
- যে চওড়া শ্রাযুগুচ্ছ দুটি সেব্রেল হেমিস্ফিয়ার যুক্ত করে তাকে বলে - কর্পাস কালোসাম।
- ব্রেইন স্টেম গঠিত হয়- মধ্যমস্তিষ্ক, পনস ও মেডুলা অবলংগাটা দ্বারা।
- মস্তিষ্কের চতুর্থ গহ্বর যেখানে অবস্থিত - মেডুলা অবলংগাটা।
- ডায়েনসেফালনের মধ্যস্থ গহ্বরটিকে বলে - তৃতীয় ভেন্ট্রিকল।
- মেনিনজেন্সের সর্ববহিঃস্থ ফিল্মটি হলো - ডুরা মেটার।
- সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস এ বিদ্যমান তরল পদার্থকে বলা হয় - সেরিফ স্পাইনাল ফ্লুয়িড (CSF)।
- যে করোটিক শ্রাযু দ্রাণের সঙ্গে জড়িত - অলফাক্টরি।
- সপ্তম করোটিক শ্রাযু - ফেসিয়াল।
- সংবেদী করোটিক শ্রাযু (৩ জোড়া) - i, ii, viii।
- মিশ্র করোটিক শ্রাযু (৪ জোড়া) - v, vii, ix, x।
- ট্রকলিয়ার শ্রাযুকে বলা হয় - প্যাথেটিক শ্রাযু।
- মেডুলা অবলংগাটা বা সুস্থল্লা কান্ত করোটরি যে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে মেরুদণ্ডে প্রবেশ করে - ফোরামেন ম্যাগনাম।
- মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর - কোরাকয়েড।
- চোখের লেন্সের সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সাথে যুক্ত - সিলিয়ারী বডি।
- চোখের যে অংশ থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার নামক তরল উৎপন্ন হয় - সিলিয়ারী বডি।
- ১০টি উপস্তর নিয়ে গঠিত - রেটিনা স্তরটি।
- মানুষের চোখের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ - নিকটিটেটিং পর্দা।
- একমাত্র আলো-সংবেদী অংশকে বলে - রেটিনা।
- বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণকে পৃথক করে যে পর্দা - টিমপেনিক পর্দা।
- কানের প্রেসার রিলিফ ভাল্ভ বলা হয় - ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা।
- বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের মধ্যে বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে - টিমপেনিক পর্দা।
- অর্গান অব কর্টি থাকে - বেসিলার ফিল্মে।
- মানবদেহের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে যে গ্রন্থি - প্যারাথাইরয়েড।
- সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হরমোন হলো - সিক্রেটিন।
- গ্রন্থিরাজ বলা হয় - পিটুইটারী গ্রন্থি।
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অনাল গ্রন্থি - পিটুইটারী।
- শিশুদের রিকেটস রোগ দেখা দেয় - ভিটামিন ডি এর অভাবে।
- Vit-D এর অভাবে বয়স্কদের যে রোগ হয় - অস্টিওম্যালেসিয়া।
- যে হরমোন আয়নের সমতা রক্ষায় কাজ করে - আলডোস্টেরন।
- আতংকগ্রস্থ বা জরুরী অবস্থায় যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় - অ্যাড্রেনালিন।
- সকল জটিল রোগের জননী - Diabetes mellitus.
- গয়টার/গলগন্ড হয় যেটির অভাবে - আয়োডিন।
- টিটেনি (ঝিচুনি) হয় যেটির অভাবে - প্যারাথরমোনের অভাবে।
- ‘কোরিওনিক গোনাদোট্রোপিন’ হরমোন নিঃসৃত করে থাকে - অমরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01. চোখের নিউরেট্রান্সমিটার হিসেবে কার্যকরী রাসায়নিক নাম- [DU. 08-09]
- A. Glutamate B. Rodopsin
C. Acetylcholin D. Dopamin
- So Why** অপটিক শ্রাযুর সিন্যাপসে অ্যাসিটাইলকোলিন থাকে। রডোপসিন এক প্রকার প্রোটিন। গুটামেট, ডোপামিন এক ধরনের নিউরেট্রান্সমিটার যা চোখের কাজ করে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৃতী সন্থয়িক

১১. কোনটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার নয়? [JU: Unit-D; Set-I, 18-19]

- A. গুটামেট B. অ্যাসিটাইল কোলিন
C. GABA D. গ্লাইসিন

১২. যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাকে বলে - [RU-C, সূত্র-৬: 23-24]

- A. পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন B. প্রিসিন্যাপটিক নিউরন
C. সিন্যাপটিক ক্রেফ্ট D. সিন্যাপটিক নব

১৩. কোন করোটিক স্নায়ু জিহ্বা নাড়াতে সাহায্য করে? [DU: 17-18]

- A. ম্যাক্সিলারি B. ম্যান্ডিবুলার
C. ভেগাস D. হাইপোগ্লোসাল

SO Why হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু মেডুলা অবলংগাটার অক্ষীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে জিহ্বা ও গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু প্রদান করে। জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪. কোনটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু? [JU-D, Set-F, 2022-23]

- A. অলফ্যাক্টরি B. অকুলোমোটর
C. অ্যাবডুসেস D. অ্যাক্সেসরি

SO Why সংবেদী স্নায়ুসমূহের নাম: অলফ্যাক্টরি, অপটিক, অডিটরি, ত্র্যধাণমিক ও ম্যাক্সিলারি শাখা, প্যালাটাইন।

১৫. কোনটি চেইর স্নায়ু নয়? [JU-D, Set-P, 2022-23]

- A. ফ্যাসিয়াল B. অ্যাবডুসেস
C. ট্রিকলিয়ার D. হাইপোগ্লোসাল

SO Why চেইর স্নায়ুসমূহ: অকুলোমোটর, ট্রিকলিয়ার, অ্যাবডুসেস, স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, হাইপোগ্লোসাল।

১৬. নিচের কোনটি মিশ্র করোটিক স্নায়ু নয়? [DAT: 2020-21]

- A. গ্রন্থোকারিনজিয়াল B. ফেসিয়াল
C. ট্রাইজেমিনাল D. হাইপোগ্লোসাল

SO Why মিশ্র করোটিক স্নায়ু:

- i. ট্রাইজেমিনাল ii. ফেসিয়াল
iii. গ্রন্থোকারিনজিয়াল iv. ভেগাস

১৭. মানুষের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকান্ডের আবরণ কোনটি? [DU: 19-20]

- A. মেনিনজেস B. পেরিটোনিয়াম
C. পেরিকার্ডিয়াম D. নিউরোকোর্ডিয়াম

SO Why সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকান্ড একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে। একে মেনিনজেস (Meninges) বলে। মেনিনজেস ৩টি তত্ত্বময় বিস্ত্রি নিয়ে গঠিত যথা: বাইরের ডুরাম্যাটার, মধ্যবর্তী অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ভিতরের প্যায়া ম্যাটার। মেনিনজেসের সংক্রমণকে মেনিনজাইটিস বলে।

- পেরিটোনিয়াম: নিলোমের বাইরের আবরণ।
- পেরিকার্ডিয়াম: হৃদপিণ্ডের বাইরের আবরণ।

১৮. মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে? [DU: 11-12, 99-00; JU: Unit-D; Set-M; 19-20; BU: 15-16, 12-13; RU: 16-17]

- A. Cerebellum B. Cerebrum
C. Pons D. Hypothalamus

SO Why সেরেবেলামের কাজ: ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে। চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

১৯. কোনটি সেরিব্রামকে আবৃত করে রাখে? [RU-C, Topaz-3: 22-23]

- A. মেনিনজেস B. সেরিব্রাল কর্টেক্স
C. নিউরন D. সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার

SO Why সেরেব্রাম: দুটি পাশাপাশি অবস্থিত, বড়, কুন্ডলি পাকানো ও স্বাভাবিকভাবেই ২০ নিয়ে সেরেব্রাম গঠিত। ২০দুটিকে সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার (cerebral hemisphere) বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ (মস্তিষ্কের ওজনের ৮০%-ই হচ্ছে সেরেব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। সেরেব্রামের প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বহিস্তর ও সে.মি.

পুরু ও গ্রে-ম্যাটার (grey matter)-এ গঠিত। এর নাম সেরেব্রাল কর্টেক্স (cerebral cortex)। এর নিচের স্তরটি অর্থাৎ সেরেব্রামের অভ্যন্তরীণ সীমান্ত ম্যাটার (white matter)-এ গঠিত এবং সেরেব্রাল মেডুলা (medulla) নামে পরিচিত।

১১. মানব দেহে "Biological Clock" নিয়ন্ত্রণ করে- [RU-C, Topaz-3: 22-23]

- A. হাইপোথ্যালামাস B. সেরিব্রাম
C. সেরেবেলাম D. থ্যালামাস

১২. কোনটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের অংশ? [DU: 74-75: 19-20]

- A. সেরেব্রাম B. সেরেব্রাল পেডাক্সল
C. সেরেবেলাম D. হাইপোথ্যালামাস

SO Why • অগ্র মস্তিষ্কের অংশ: সেরেব্রাম, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস।

• মধ্যমস্তিষ্কের অংশ: সেরেব্রাল পেডাক্সল, কর্পোরা কোয়ার্ডিয়েমিন, সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট

• পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ: সেরেবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা, পনস।

১৩. মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ কোনটি? [DAT: 22-23]

- A. সেরেবেলাম B. গুরুমস্তিষ্ক
C. থ্যালামাস D. পনস

SO Why সেরেব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক হলো মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ। মস্তিষ্কের ওজনের ৮০% অংশজুড়েই থাকে সেরেব্রাম।

১৪. নিচের কোনটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের (Hindbrain) অংশ নয়? [DAT: 2020-21]

- A. পন B. হাইপোথ্যালামাস
C. মেডুলা অবলংগাটা D. সেরেবেলাম

SO Why পশ্চাৎ মস্তিষ্কের (Hindbrain) এর অংশ সমূহ:

i. সেরেবেলাম ii. পনস iii. মেডুলা অবলংগাটা

১৫. মস্তিষ্কের ওজনের কত ভাগ সেরেব্রাম? [AFMC: 23-24]

- A. ৬০% B. ৭০%
C. ৮০% D. ৯০%

১৬. কোনটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ? [B. মে. ২০২০]

- A. হাইপোথ্যালামাস B. থ্যালামাস
C. হাইপোথ্যালামাস D. সেরেবেলাম

১৭. মৃদু আলোতে/রাতের দর্শনে চোখের কোন কোষ ব্যবহৃত হয়? [JU: D, 13-14, 11-12; RU: 10-11, 04-05; HSTU: A, 18-19]

- A. রড কোষ B. কোণ কোষ
C. আইরিশ কোষ D. পিউপিল কোষ

১৮. অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে নিউরনের অ্যাক্সনগুলো মিলিত হয়ে অপটিক স্নায়ু গঠন করে, তাকে বলে- [RU-C, সূত্র-৬: 23-24]

- A. পীত বিন্দু B. অগটিক বিন্দু
C. ফোবিয়া D. অক্ষ বিন্দু

১৯. কোনটি চোখে প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না? [DAT: 2020-21]

- A. অ্যাকুয়াস হিউমার B. লেন্স
C. রেটিনা D. কর্ণিয়া

২০. অর্গান অব কর্টি কোথায় থাকে? [DU: 16-17, 14-15, 97-98; MAT: 89-90, RU: 13-14, 09-10]

- A. অন্তঃকর্ণ B. এন্ডোলিম্ফ
C. ককলিয়াতে/স্যাঙ্কুলাস D. পেরিলিম্ফ

SO Why অর্গান অব কর্টি থাকে অন্তঃকর্ণের স্যাঙ্কুলাসের ককলিয়াতে।

২১. কোন গ্রন্থি থেকে অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়? [JU-D, Set-J, 2022-23, 18-19]

- A. পিটুইটারি B. ডিফাশয়
C. ফ্যারাখাইরয়েড D. গুক্রাশয়

২২. কোন গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নিঃসৃত হয়? [JU-D, Set-H, 2022-23]

- A. পিটুইটারি B. থাইমাস
C. পিনিয়াল D. থাইরয়েড

06. নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রফিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?
 (A) থ্যালামাস (B) হাইপোথ্যালামাস
 (C) সেরবেলাম (D) পনস
07. স্বাভাবিক স্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে কে?
 (A) পনস (B) মেডুলা
 (C) সেরবেলাম (D) সেরবেলাম
08. মস্তিষ্কের মোট ভেনট্রিকল কতটি?
 (A) ২ টি (B) ৩ টি
 (C) ৪ টি (D) ৫ টি
09. ফেসিয়াল স্নায়ুর কাজ-
 (A) মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি প্রকাশ
 (B) জিহ্বা থেকে স্বাদ বহন
 (C) সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ
 (D) সবগুলো
10. গ্রনোসোফ্যারিজিয়াল স্নায়ুর শাখা নয় কোনটি?
 (A) টিম্প্যানিক (B) লিম্বুয়াল
 (C) মাসকুলার (D) ল্যারিজিয়াল
11. মেলানিনের কাজ কী?
 (A) প্রতিসরণ হ্রাস করা (B) প্রতিফলন বৃদ্ধি করা
 (C) প্রতিফলন হ্রাস করা (D) A ও C উভয়ই
12. কোরয়েডের সামনের অঞ্চল গোল ও মধ্যস্থিত কালো পর্দাকে কী বলে?
 (A) পিউপিল (B) লেন্স
 (C) সিলিয়ারি বডি (D) সবগুলো
13. অক্সিজেনকে উপরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে কোনটি?
 (A) মিডিয়াল রেটিনাস (B) ল্যাটারাল রেটিনাস
 (C) সুপিরিয়র রেটিনাস (D) সুপিরিয়র অবলিক
14. নিচের কোনটি মধ্যকর্ণের অংশ নয়?
 (A) ইউস্টেশিয়ান নালি (B) কর্ণাঙ্ক
 (C) ছিদ্রপথ (D) টিমপেনিক পর্দা
15. কানের প্রধান শ্রবণ সংবেদী অংশ কোনটি?
 (A) অর্ধবৃত্তাকার নালি (B) অ্যাম্পুলা
 (C) ককলিয়া (D) B ও C উভয়ই
16. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ সম্বন্ধে যে বিদ্যা তাকে বলে-
 (A) Endocrinopathy (B) Hormonology
 (C) Endocrinology (D) Exocrinology
17. থাই গ্রন্থি কোনটি?
 (A) পিটুইটারি গ্রন্থি (B) থাইমাস
 (C) থ্যালামাস (D) হাইপোথ্যালামাস
18. ভিটামিন D এর অভাবে কোন রোগ হয়?
 (A) রাতকানা (B) রিকেটস
 (C) স্কার্ভি (D) সবগুলো
19. অক্সিজেনের ইন্টারসিটিয়াল কোষ থেকে ক্ষরণ হয় কোনটি?
 (A) টেস্টোস্টেরন (B) এড্রোজেন
 (C) প্রোজেস্টেরন (D) সবগুলো
20. কোনটির কম নিঃসরণে পিগুরস ঠিকমতো ক্ষরিত হয় না?
 (A) সিক্রিটিন (B) কোলেসিস্টোকাইনিন
 (C) এন্টারোগ্যাসট্রিন (D) গ্যাসট্রিন

(A) সেরেবেল
 (C) হাইপোথ্যালামাস

01.A	02.C	03.C	04.C	05.B	06.B	07.A	08.C	09.D	10.D
11.C	12.A	13.C	14.D	15.C	16.C	17.A	18.B	19.A	20.B

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা

জীববিজ্ঞান
২য় পত্র

পূর্বে	RATINGS		
	★★★	★★	★
পূর্বে	তত্ত্বায়	বিভিন্ন অংশের কাজ	হরমোনের ক্রিয়া
পূর্বে	ডিম্বায় ও জরায়ু	ডিম্বাণু	হরমোনের ক্রিয়া ও রজঃচক্র
পূর্বে	জনন তন্ত্র	—	স্পার্মাটোজেনেসিস ও স্পার্মিওজেনেসিস
পূর্বে	জননীয় স্তর	—	IVF পদ্ধতি
পূর্বে	জননতন্ত্রের রোগ	—	

TOPIC-01

11. ତଦ୍‌ବ୍ୟାପୀ:

১১. তত্ত্বাবধায়ক মোসাব্বির কিয়াম নামক পেরিটোনিয়াল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।

১১. শুক্রাশয়ে মেসোরাকিয়াম নামক ৩টি
শুক্রাশয় ৩টি আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে:

- i. টিউনিকা ডেজাইনালিস
- ii. টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া
- iii. টিউনিকা ভাস্কুলোসা

iii. চিটিকা ভাঙুনো।
প্রতি তক্রাশয় 200-300টি ছোট ছোট অনুদৈর্ঘ্য খন্ডাংশ বা লোবিউলে বিভক্ত।
প্রত্যেক তক্রাশয় 2-3টি সেমিনিফেরাস (প্রতিটি তক্রাশয়ে 1000টি) নালিকা এবং
ইন্টারসিটিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত।
ইন্টারসিটিয়াল কোষ বা লিডিং কোষ ii. সারটলি কোষ।

কোষ সমূহ: i. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বা লিডিগ কোষ ii. সারটলি কোষ।

12. এপিডাইমিস:

১২. এপিডিডাইমিস:
- প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভাসা ইফারেলিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে ৪-৬ মিলিমিটার লম্বা অত্যন্ত প্যাকাচানো এপিডিডাইমিস গঠন করে।
 - শুক্রাশুর ভিতর থেকে তরল ও কঠিন অসার পদার্থ আলাদা করে, শুক্রাশুর লিম্বিক ক্ষমতা বাড়ায় ও এক মাস সঞ্চয় করে এবং পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করে এগুলোকে সতেজ রাখে।

13. সেমিনাল ডেসিকল বা মূত্রথলি:

বীৰ্য বা সিমেন উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ পিচ্ছিল থকথকে পদার্থ (এর ৭০% বীৰ্য বা সিমেন তৈরি করে, সিমেনের প্রধান উপাদান- প্রোস্ট্যাভাভিন, ফ্রুক্টোজ, সাইট্রিক, ইনোসিটল ও প্রোটিন) ক্ষরণ করে। ক্ষরণের ফ্রুক্টোজ সচল শুক্রাণুর শক্তি উৎস হিসেবে কাজ করে ও পুষ্টি প্রধান করে।

04. প্রস্টেট গ্রন্থি:

- এটি শ্রেণিগতভাবে মৃত্তখলির নিচে অবস্থিত নাশপাতি আকৃতির গ্রহি এবং গোড়া ও চূড়ায় বিভক্ত।
- আলকাইলাইন ফসফেটেজ নামক ক্ষারীয় পদার্থ নিঃসরণ করে এবং pH নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ভাদকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে।

05. বাবোইউরেন্থাল বা কাওপার গ্রন্থি:

- * সংগমের সময় এ গ্রহি মিউকাস (পিচ্ছিল পদার্থ) ক্ষরণ করে।

০৬. পুংপ্রজনন তন্ত্রের উপর হরমোনালা ক্রিয়া::

হরমোনের নাম	কাজ
ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)	গুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাকে উদ্দীপ্ত করে গুক্রাণু তৈরি করে
লুটিনাইজিং হরমোন (LH)	গুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিসিয়াল কোষকে উদ্দীপ্ত করে টেস্টোস্টেরনের হরমোন স্রবণ ঘটায়
অ্যাড্রোস্টেরণ	পুরুষের গৌন যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং গুক্রাণুজননে গুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে
টেস্টোস্টেরণ	পুরুষের গৌন যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং গুক্রাণুজননে গুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে

TOPIC-02

স্বী. প্রজননতত্ত্ব

01. ডিম্বাশয়:

- দেখতে বাদাম আকৃতির এবং প্রতিটির ওজন 2 - 3.5 gm
- মেসোভেরিয়াম নামক পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে
- বয়সস্কিকালে ডিম্বাশয়দ্বয়ে প্রায় 3 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ প্রাইমারিয়াল ফলিকুল থাকে
- স্ত্রীলোকের প্রজননকালে 450টি ডিম্বাণু পরিপক্বতা লাভ করে

02. ডিম্বনালী বা ফেলোপিয়ান নালী:

জরায়ুর দুপাশে অবস্থিত দুটি পেশল 12 cm লম্বা নালী। ফিমব্রি, ইনফান্ডিবুলাম, অ্যাম্‌পুলা ও ইসথমাস নিয়ে গঠিত।

03. জরায়ু:

- ওজন 30g, গর্ভাবস্থায় 20 গুণ বৃদ্ধি পায়
 - দেখতে উল্টানো নাশপতির মতো
 - ফাভাস, দেহ বা কার্পাস, সারভিঞ্জ নিয়ে গঠিত
- প্রাচীর: তিনটি স্তরে গঠিত।

i. পেরিমেট্রিয়াম/পেরিটোনিয়াম(বাইরের স্তর)

ii. মায়োমেট্রিয়াম (মধ্য স্তর)

iii. এন্ডোমেট্রিয়াম (অন্তঃ স্তর) → ইমপ্ল্যান্টেশন ঘটে

জরায়ু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রমকে আগলে রক্ষা করে এবং পরিস্ফুটন সম্ভবপর করে তোলে। আমরা সৃষ্টি ক্রমের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন করে। শুক্রাণুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে ও সারভিস্মের নিঃসৃত কারকীয় রস শুক্রাণুর চলনশক্তি বৃদ্ধি করে।

04. বার্থোলিনের গ্রন্থি:

- ♦ বার্থেলিন গ্রন্থি বা ভগাংকুর নামে দুটি বড় গ্রন্থিও লেবিয়া মাইনোরায় উন্মুক্ত হয়েছে।
- ♦ বার্থেলিন গ্রন্থিস্ফূরণ যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তোলে।

05. স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের উপর হরমোনাঁল ক্রিয়া:

হরমোনের নাম	কাজ
ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন FSH)	• ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওভোলেসন ও ইন্সট্রোজেন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে
লুটিনাইজিং হরমোন (LH)	• ডিম্বাশয়ের কর্পোরা লুটিয়াম সৃষ্টি ও প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ ত্বরান্বিত করে
লুটিওট্রফিক হরমোন (LTH)	• স্ত্রীদের স্তন্যগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধ ক্ষরণ ঘটায়
ইন্সট্রোজেন	• স্ত্রীদের গৌন যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং ঋতুচক্র ও স্তন্যগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে • জরায়ুর প্রাচীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে
প্রোজেস্টেরন	বয়ঃসন্ধিতে জরায়ুর প্রাচীরের পরিবর্তন ঘটায় এবং জরায়ুর প্রাচীরকে ভ্রূণ ধারণ উপযোগী করে এবং গর্ভাবস্থায় স্তন্যগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়।
রিলাক্সিন	প্রসবের সময় শ্রোণীদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশীর প্রসারণ ঘটায়।

TOPIC-03

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন

01. ରଞ୍ଜଃଚକ୍ର:

01. রজচক্র:
বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর সমগ্র যৌনজীবনে প্রায় নিয়মিত, গড়ে 28 দিন (24-32 দিন) পরপর জরায়ু থেকে রক্ত, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিক ডিম্বাণুর চক্রীয় নিষ্কাশনকে রজচক্র বলে। প্রথম রজচক্রকে মেনারচি এবং রজচক্র বন্ধহওয়াকে মেনোপজ বলে। রজচক্রকে সন্তান ধারণে অক্ষমতার জন্য জরায়ুর কান্না বলে অভিহিত করা হয়। প্রজনন ঋতুতে যৌনজননে সক্ষম অপ্রাইমেট জাতীয় ত্রীপ্রাণীর জননাঙ্গে সংঘটিত পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের চক্রীয় ধারাকে ঋতুচক্র বলে।

- সময় ব্যবধান: 28 দিন (24-32 দিন)
- হরমোন: গোন্যাডোট্রপিক (FSH, LH, এসেট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন)

রক্তচক্রের ধাপসমূহ:

চক্র	পর্বের নাম	সময়কাল (দিন)
জরায়ু চক্র	রক্তস্রাবীয় পর্যায়	1-4
	বর্ধনশীল পর্যায়	4-14
	ক্ষরণশীল পর্যায়	15-28
ডিডাম্বর চক্র	এই চক্র ফলিকুলার পর্যায় ও যুটিয়াল পর্যায় নিয়ে গঠিত	

02. অমরা বা গ্রাসেন্টা: জরায়ু ও মাড়িটিয়াতে গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাড়িদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে গ্রাসেন্টা বলে। নিষেকের 12 সপ্তাহ পরে গ্রাসেন্টা গঠিত হয়।

অমরার কাজ:

- সংযোজন • স্বচ্ছতা দান • পুষ্টি
- গ্যাসীয় বিনিময় • রেচন
- হরমোন ক্ষরণ:

i) প্রোটিন হরমোন:

- Human Chorionic Gondotrophin (HCG)
- Human Chorionic Corticotrophin (HCC)
- Human Placental Lactogen (HPL)
- Relaxin

ii) স্টেরয়েড হরমোন: • Estrogen • Progesteron

03. জরায়ু আবরণ:

আবরণীর নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	কাজ
অ্যামনিওন	জরায়ু এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মের অংশগ্রহণে গঠিত। যে থলি আকৃতির আবরণ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থেকে জরায়ু ঘিরে রাখে, তাকে অ্যামনিওন বলে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।	জরায়ু চাপ, আঘাত ও গুরুতর হাত থেকে রক্ষা করে।
অ্যাপলানটয়েস	জরায়ু অস্ত্রের পশ্চাৎ অংশ মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মে গঠিত থলির মতো যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়ে কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত হয়, তাকে অ্যাপলানটয়েস বলে।	জরায়ু শ্বসন ও রেচনে সহায়তা করে।
কোরিওন	জরায়ু সর্ববৃহৎ আবরণ যা এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত হয়, তাকে কোরিওন বলে।	অমরা গঠনে সহায়তা করে।
কুসুম থলি	জরায়ু মধ্যস্তরের সঙ্গে যুক্ত এবং এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট থলি আকৃতির তরলে পূর্ণ ঝিল্লিকে কুসুম থলি বলে।	স্টেম কোষের উৎস হিসেবে কাজ করে।

04. 3টি জরায়ু স্তরের পরিণতি:

জরায়ু স্তরের নাম	গঠিত অঙ্গ
এন্ডোডার্ম	• ত্বক ও ত্বকোদ্ভূত অঙ্গাদির (ঘর্ম গ্রন্থি, তেল গ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, চুল, নখ) এপিডার্মিস • টেট, মুখবির, জিহ্বা ও পায়ুছিদ্রের অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ • চোখের রেটিনা, কর্ণিয়া ও লেন্স এবং অন্তঃকর্ণের মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ • পিটুইটারি গ্রন্থি ও পিনিয়াল গ্রন্থির এপিথেলিয়াম আবরণ, বৃক্কের মেডুলা • শ্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গসমূহ, দাঁতের এনামেল

জরায়ু স্তরের নাম	গঠিত অঙ্গ
মেসোডার্ম	• ত্বকের ডার্মিস • বৃক্কের কটেজ, পাকস্থলি ও অস্ত্রের পেশিকলা • রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা
এন্ডোডার্ম	• পরিপাকনালি অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ • শ্বসনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, রেচননালি, মূত্রনালি ও মূত্রপিত্ত এপিথেলিয়াল আবরণ • মধ্যকর্ণ, টনসিল, থাইমাস, থাইরয়েড • প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি • গলবিল, অনুনালি, পাকস্থলি, অস্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়

TOPIC-04

প্রজনন কাহিনী

01. গর্ভনিরোধ:

অস্থায়ী গর্ভনিরোধক পদ্ধতি	
শারীরিক পদ্ধতি	■ নিরাপদ সময় নির্বাচন। ■ শিশু বহিষ্করণ।
রাসায়নিক পদ্ধতি	■ শুক্রনাশক জেলি, ক্রীম, ফেনা বা ফোম বডি জেল প্রভৃতি।
যান্ত্রিক পদ্ধতি	■ কনডম ■ স্পঞ্জ ■ ডায়াফ্রাম
শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি	■ অন্তর্জরায়ু গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা
গর্ভপাত	■ জন্মনিয়ন্ত্রণ বডি: রক্তচক্রের ৫-২৫ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে বডি গ্রহণ করতে হয়। ■ ইনজেকশন ■ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বা বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে ২-৩ মাস বয়সী জরায়ুকে বিচ্যুত করিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়।
স্থায়ী গর্ভনিরোধক পদ্ধতি	
ভ্যাসেকটমি	■ পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ভাস ভিক্সেল বা শুক্রনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয়।
টিউবেকটমি বা লাইগেশন	■ মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ফেগোপিপাস নালির অংশ কেটে বেঁধে দেয়া হয়।

02. যৌনবাহিত রোগ:

বিষয়	রোগের নাম		
	সিফিলিস	গনোরিয়া	এইডস
জীবাণু	ব্যাকটেরিয়া, <i>Treponema Pallidum</i>	ব্যাকটেরিয়া, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ভাইরাস HIV অর্থাৎ Human Immuno deficiency Virus
সুস্থকাল	10-90 দিন	2-5 দিন	6 মাস - 10 বছর
আবিষ্কারক	Fritz Schavdinn এবং Erich Hoffman 1905 সালে	Albert Neinnen 1879 সালে	ফরাসি বিজ্ঞানী Dr. Lue montagnien 1983 সালে

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- নিষেকের ৬-৯ দিনের মধ্যে ইমপ্লান্টেশন ঘটে।
- গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছেলেদের ১৩-১৫ বছর বয়সে এবং মেয়েদের ১১-১৩ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়।
- শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল আরো ৩-৪ বছর পরে শুরু হয়।
- যৌন মিলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষেক সংঘটিত না হলে শুক্রাণু মারা যায়।
- নিষেকের ৬-৯ দিনের মধ্যে জরায়ুর পৃষ্ঠদিকের এন্ডোমেট্রিয়াম প্রস্তুত হয়ে সংস্থাপিত হয়।

মহাশয় প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক

১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
২৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৩৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৪৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৫৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৬৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৭৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৮৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯১. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯২. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৩. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৪. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৫. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৬. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৭. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৮. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
৯৯. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক
১০০. প্রাথমিক ক্রটি সমাধিক

- ১. VDRL পরীক্ষার মাধ্যমে যে রোগটি নির্ণয় করা যায় - সিকলিস
- ২. সিকলিস রোগ হয় - *Treponema pallidum* দ্বারা
- ৩. গনোরিয়া রোগ হয় - *Neisseria gonorrhoeae*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটারে প্রশ্ন

- মানুষের অঙ্কনশক্তি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় কতগুলি ছবির উপস্থাপন করে? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. 1200 B. 1300 C. 1500 D. 1400
SQWEX সেরিমিনোসাস নালিক সার্মিটোসেনিস প্রক্রিয়ায় অঙ্কন উপস্থাপন করে। অঙ্কনশক্তির প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 1500 অঙ্কন উপস্থাপন করে।
- লুটিলাইজিং হরমোনের কাজ কী? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে
B. অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে
C. টেস্টোস্টেরনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে
D. টেস্টোস্টেরনের অবনতি করে
SQWEX লুটিলাইজিং হরমোন অঙ্কনশক্তির ইন্টারমিডিয়েট কোষের উৎপাদন করে টেস্টোস্টেরন হরমোনের অবনতি করে।
- কোনটি অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. সার্মিটোসেনিয়া B. প্রোটিন C. প্রোটিন D. প্রোটিন
SQWEX অঙ্কনশক্তির সেরিমিনোসাস নালিক কোষে সার্মিটোসেনিস প্রক্রিয়ায় অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে।
- লুটিলাইজিং হরমোন যে কাজকে প্রভাবিত করে- (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে
B. অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে
C. অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে
D. অঙ্কনশক্তি বৃদ্ধি করে
SQWEX লুটিলাইজিং হরমোন সার্মিটোসেনিস কোষের উৎপাদন করে টেস্টোস্টেরন হরমোনের অবনতি করে।
- কোনটি মেসোডার্ম থেকে কোন অঙ্গটি গঠিত হয়? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. এপিডার্মিস, কল্ডার্ড
B. কল্ডার্ড, কল্ডার্ড
C. লোডার্ড, কল্ডার্ড
D. এপিডার্মিস, লোডার্ড
- মানবদেহের কোষ কোন অঙ্গীকৃত থেকে গঠিত হয়? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. এপিডার্মিস B. মেসোডার্ম C. এন্ডোডার্ম D. কোল্ডার্ড
- মানবদেহে লিঙ্গ বাত এর উৎপত্তি কত হয় কল্ডার্ড? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. ৫ম স্তম্ভে B. ৬ষ্ঠ স্তম্ভে C. ৭ম স্তম্ভে D. ৮ম স্তম্ভে
- লিঙ্গিক ক্রিয়ায় বিভাজন প্রক্রিয়ায় গ্যামেটের উৎপত্তি কত হয়? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. প্রোটিন B. এপিডার্মিস C. প্রোটিন D. কল্ডার্ড
SQWEX গ্যামেটের উৎপত্তি প্রোটিন, প্রোটিনের উৎপত্তি প্রোটিন ও গ্যামেটের উৎপত্তি প্রোটিন থেকে প্রোটিন হয়।
- কোন অঙ্গের মাধ্যমে কখন প্রথম ফলসম্পন্ন হয়? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. লম্বা স্তম্ভে B. অঙ্গ স্তম্ভে C. ফল স্তম্ভে D. ফল স্তম্ভে
- বৃক্ক ও অণ্ডাশয়ের সৃষ্টি হয় কোনটি থেকে? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. এন্ডোডার্ম B. মেসোডার্ম C. এপিডার্ম D. এপিডার্ম
- কোন ধরনের জীবাণু নিয়ে গনোরিয়া রোগ হয়? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. ব্যাকটেরিয়া B. ভাইরাস C. ফাঙ্গাস D. প্রোটিন
SQWEX *Neisseria gonorrhoeae* প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া গনোরিয়া রোগ সৃষ্টি করে।
- কোনটি যৌনবাহিত রোগ নয়? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. সিকলিস B. গনোরিয়া C. এইডস D. ফল
- সিকলিস রোগের জন্য দায়ী নিম্নের কোনটি? (MCQ-1, Set-1, 20-21)
A. *Neisseria gonorrhoeae* B. *Treponema pallidum* C. *Trichomonas vaginalis* D. *Treponema pallidum*

PRIME TEST

01. গিমেট উৎপন্ন করে কোন্টি?
 (A) এপিডাইডাইমিস (B) ভাস ডিক্রোসেস
 (C) সেমিনাল ভেসিকল (D) টেসিস
02. গোনোডোট্রোফিক রিলিজিং হরমোন কোথা হতে স্রবিত হয়?
 (A) থ্যালামাস (B) হাইপোথ্যালামাস (C) পিউইটারি গ্রন্থি (D) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি
03. জরায়ু দেখতে কী আকৃতি?
 (A) নাশপাতি (B) মটরদানা (C) শিমকী (D) উটিনো নাশপাতি
04. কোন্টি প্রসবের সময় প্রোগেস্টেরি সিগন্যাল ও পেশির প্রসারণ ঘটায়?
 (A) Relaxin (B) Progesterone
 (C) Oestrogen (D) Gonadocorticoids
05. স্ফায়রোফিল ট্রেন্ট বিকশিত হওয়ার কী বসে?
 (A) মোনার্টি (B) থোনার্টি (C) মোনোপজ (D) পিউকার্টি
06. রক্তচাপে সাধারণত জরায়ুর কোন স্তরের পরিবর্তন ঘটে?
 (A) মায়োমেট্রিয়াম (B) এন্ডোমেট্রিয়াম (C) পেরিটোনিয়াম (D) পেরিমিট্রিয়াম
07. ব্রিডিং পর্ব মোট কত দিন স্থায়ী হয়?
 (A) 5-10 দিন (B) 3-6 দিন (C) 4-5 দিন (D) 2-5 দিন
08. নিম্নের কোনটি স্পার্মিটোজেনেসিসের ধাপ নয়?
 (A) সাখ্যাবৃত্তি (B) পরিবর্তন
 (C) অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি (D) স্পার্মিটোজেনেসিস
09. হ্যাডালুরেনিডোজ নামক এনজাইম কোথা থেকে স্রবিত হয়?
 (A) অ্যাক্রোসোম (B) সার্ভিক্স (C) জরায়ু (D) ভিভার
10. আমরা কোন হরমোন্ট অল্প করে না?
 (A) গ্যোডোস্টেরিন (B) রিসার্ভিন (C) ইস্ট্রোজেন (D) কোন্টিই নয়
11. রক্তচাপের কত দিন পরে অনুনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি গ্রহণ করতে হয়?
 (A) 10-15 তম দিন (B) 5-15 তম দিন
 (C) 10-15 তম দিন (D) 12-15 তম দিন
12. প্রথম ট্রোফোটিক বৈশিষ্ট্য নাম কী?
 (A) পুইন প্রটিন (B) কবচ (C) এডওয়ার্ডস (D) ব্যারন
13. ট্রোফোটিক হরমোনের অভাবে ঘন উভেজনা হ্রাস পাওয়ার কী বসে?
 (A) মোনোপজ (B) অ্যাক্রোসোম (C) সায়েনোপজ (D) ট্রোফোপজ
14. প্রসবকালে শিশুর প্রজনন কত হয়?
 (A) ৫ পন্ড (B) ৭ পন্ড (C) ৯ পন্ড (D) 10 পন্ড
15. কত সালে AIDS এর জীবাণু আবিষ্কৃত হয়?
 (A) 1980 সালে (B) 1985 সালে (C) 1987 সালে (D) 1989 সালে
16. শতকরা কতজন নারী জরায়ু অস্ত্রান্তর সমস্যার ভোগে?
 (A) ৫% (B) 10% (C) ৫-10% (D) ৫৫%
17. শিশুর কোনটি অস্ত্রান্তর সম্পর্কে সত্য?
 (A) সারোটিন কোষ ট্রোফোটিক নিয়ন্ত্রণ করে
 (B) প্রতিটি অস্ত্রান্তর ২৫-৩০ সেমিডিমেন্সাল নসিকা থাকে
 (C) অস্ত্রান্তর মোনোজেরিয়াম নামক পেরিটোনিয়াল পর্বা দ্বারা আবৃত থাকে
 (D) ট্রোফোটিক অস্ত্রান্তর সাধারণত দেহতলের উপরে ৫°C কম থাকে
18. প্রসব কেন্দ্র ও প্রসব প্রতিরোধ শিশুর কোন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
 (A) ACTH (B) Estrogen (C) Progesterone (D) Relaxin
19. শিশুর কোনটি গর্ভনিরোধক পদ্ধতির স্থায়ী পদ্ধতি?
 (A) রাসায়নিক পদ্ধতি (B) যান্ত্রিক পদ্ধতি
 (C) শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি (D) হাইপোসেন
20. সিলিডিস প্রোসের জীবাণুর নাম কী?
 (A) Treponema pallidum (B) HIV
 (C) Neisseria gonorrhoeae (D) Clostridium tetani

Answer Analysis

01.C	02.B	03.D	04.A	05.B	06.B	07.C	08.C	09.A	10.C
11.B	12.A	13.B	14.B	15.C	16.C	17.D	18.A	19.D	20.A

অনুশীলন
৯০

মানবদেহের প্রতিরক্ষা

সুপারিশন	RATINGS		
	***	**	*
মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা	বিভিন্ন প্রতিরক্ষা তর	লিফোবল	সহজাত ও অপ্রাপ্ত
অ্যাক্টিভিটি	প্রকারভেদ, কাজ, অবস্থান	অ্যাক্টিভিটির ধরন	-
চিকিৎসা বা অস্ত্রান্তর	অস্ত্রান্তরের প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্য	-	জাতীয় রক্ত-প্রদান

TOPIC-01

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

01. অপ্রাপ্তবয়স্কের বিভিন্ন কোষের উৎপত্তি ও কাজ:

কোষের নাম	উৎপত্তি	কাজ
লিম্ফোসাইট (নিউট্রোফিল)	অস্থিমজ্জা	ফ্যাগোসাইটোসিস: প্রসবের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক অণু
কোস্টিকিল	অস্থিমজ্জা	প্রসব সৃষ্টিতে হিমোগ্লোবিন ও অ্যান্টিবডি অণু
ইউসিনোফিল	অস্থিমজ্জা	করোনারী জীবাণু, ক্যান্সার, অস্ত্রান্তর-বৈশিষ্ট্য প্রতিক্রিয়ায় কাজ করে
ম্যাক্রোফেজ	অস্থিমজ্জা	ম্যাক্রোফেজের অনুপ্রাণ
সিঙ্কোসাইট	জলীয় বৈশিষ্ট্য	বিভিন্ন ইমিউন সিস্টেম পদার্থের হিমোগ্লোবিন ও অ্যান্টিবডি
B-কোষ	-	বিভিন্ন অ্যাক্টিভেটরকে B-কোষ কোষকিটের হিমোগ্লোবিন ও অ্যান্টিবডি-নির্ভর ইমিউন সিস্টেম সৃষ্টি করে; বিভিন্ন অ্যাক্টিভেটরকে প্রসবের কোষের মাধ্যমে সৃষ্টি করে
সাইটোটক্সিক T-কোষ	-	সিঙ্কোসাইট কোষের কোষ ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে; সর্বোচ্চ কোষকে প্রসব করে
হেল্পার T-কোষ	-	সাইটোকিন (cytokines) অণু করে কোষ, সাইটোটক্সিক T-কোষ, NK-কোষ ও ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে
NK-কোষ	-	জীবাণু অস্ত্রান্তর ও অ্যান্টিবডি কোষের সৃষ্টি করে প্রসব করে
প্রাকৃতিক কোষ	গ্রীষ্ম, মিলি, নসিকা গ্রন্থি	অ্যাক্টিভিটি অণু করে
ম্যাক্রোফেজ	সমস্ত টিস্যু ও অণু	ফ্যাগোসাইটোসিস; বিচ্ছিন্ন রাসায়নিক অণুর মাধ্যমে বহিঃকোষীয় প্রসব কার্যক্রম; হেল্পার T-কোষের অ্যাক্টিভেটর উপস্থাপন
মাস্ট কোষ	সমস্ত টিস্যু ও অণু	প্রসবের সঙ্গে জড়িত হিমোগ্লোবিন ও অ্যান্টিবডি রাসায়নিক পদার্থ অণু

02. বিভিন্ন প্রতিরক্ষা তরের অংশ:

প্রতিরক্ষা তর	অংশ
প্রথম প্রতিরক্ষা তরের উপাদান	চুল, নোংরা, মিলিডা, কানের মোম (সেক্সেন), প্রসব, ও লালা, শাকসবজির এসিড ও এনজাইম, প্রসব, প্রসবের এসিড, মলমূত্র ও বমি, হাইড্রোফ্লোরিক এসিড
দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা তরের উপাদান	ফ্যাগোসাইটস, প্রাকৃতিক হারন কোষ, ক্যান্সার-নির্ভর সাইটোটক্সিক T-কোষ, ইন্টারফেরন, অ্যাক্টিভেটর কোষ প্রসব প্রসব, প্রসব, প্রসব অণু
তৃতীয় প্রতিরক্ষা তরের উপাদান	লিম্ফোসাইট, অ্যাক্টিভিটি, সৃষ্টিকোষ

জীববিজ্ঞান ২য় পত্র

জীববিজ্ঞান ২য় পত্র
জীববিজ্ঞান ২য় পত্র
জীববিজ্ঞান ২য় পত্র

আন্টিবডি

আন্টিবডি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
এটি হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

০২. আন্টিবডি প্রকারভেদ:

আন্টিবডির নাম	উদাহরণ
মৃত বা নিষ্ক্রিয় (Inactivated)	• ইনজেকশন • ক্যান্সার • পোলিও (ইনজেকশন) • রেপাটাইটিস A • মলিক
জীবন্ত বা সক্রিয় (Live Attenuated)	• মিজল (চাম) • মলিক • পলিও (ইনজেকশন) • টাইফয়েড • পোলিও (ভ্যাকসিন) • জলাতর • মলিক
বিশেষীকৃত টিকা বা টক্সোয়েড (Toxoid)	• টিটানাস (পটুইকস) • টিটানাস
উপ-একক বা সাবইউনিট (Subunit)	• রেপাটাইটিস B ভ্যাকসিন • হিটমান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন
অনুবন্ধী বা কনজুগেট (Conjugate)	• হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্স টাইপ B (Hib) ভ্যাকসিন • নিউমোকোকাল ভ্যাকসিন
ডিএনএ টিকা	• হিবিসিলি ডিএনএ পদ্ধতিতে ডিএনএ ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়
মিশ্র ভ্যাকসিন	• MMR (মিজল, মলিক, ক্যান্সার)

এক নজরে চক্রবর্ণ্য তথ্যাবলি

- মানবদেহের প্রতিরক্ষা করে চলে।
- অল্প ও দ্রুত যে লাইসোজাইম এনজাইম গুলো তা ব্যাকটেরিয়ার উপর কাজ করে।
- বহিঃকোষে কার্যকর নামক অংশের প্রাচীর থেকে অতি ক্ষয়-ক্ষতি করে মোমের মত পদার্থে পরিণত করে।
- যেখানে ল্যাকটিক এসিড, ব্যাকটেরিয়া গুলো।
- পাকস্থলির শক্তিশালী HCl ও প্রোটিনেজ এনজাইম গুলো এ পলিও গুলো অসহ্য করে।
- সেহে প্রবী ব্যাকটেরিয়া গুলো দুই ধরনের (কোম্পিট ও মনোসাইট) ভূমিকা পালন করে।
- প্রবন দুটি ফ্যাসোসাইট কণিকা হলো নিউট্রফিল ও ম্যাক্রোফেজ।
- ম্যাক্রোফেজ পুরোনো রক্তকণিকা, মৃত টিসু বস্তু ও ক্ষয়-ক্ষতি গুলো গুলো কোষ হিসেবে কাজ করে।
- সহজাত ম্যাক্রোফেজ বা NK-Cell একধরনের নিউক্লিয়ার জাইট কোষ যা টিউমার ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষ গুলো করে।
- NK কোষের আক্রমণে প্রব টিউমার কোষের বিলুপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণি এবং নিউক্লিয়ার জাইট হয়ে যায়।
- প্রাচুর্য কোষ আন্টিবডি ক্ষরণ করে।
- কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অনুজীবের গুলো আক্রান্ত থেকে নিউট্রফিল ও ম্যাক্রোফেজ কে চিনিতে দিয়ে কোষতত্ত্ব সহায়তা করে।
- জ্বর হলো বিবী প্রতিরক্ষা করে শেষ অস্ত্র।
- সৈবিক তাপমাত্রা স্বাভাবিক (৩৭-৩৯°C) ৩৮-৩৯°C) গুলো বেশি হলে গুলো হয়।
- পাইরোজেন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামে বিশেষ পরিবর্তন ঘটায় সেহে তাপমাত্রাকে উচ্চতর মাত্রায় নির্ধারণ করে।
- কম বা মাঝারি ধরনের জ্বর (১০২-১০৪°F) সেহে উপকার করে।
- ত্বকের বাইরের ত্বকের নাম এপিডার্মিস।
- ত্বক স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম নামে একটি হর্নি ত্বক যা মৃত ও মলিক কোষ গুলো।
- মানুষের ত্বক আন্ত-রোগজীবাণুনাশক অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।
- সিমেনে স্পার্মিন এবং দুধে ল্যাক্টোপারভাইরাস নামক এনজাইম গুলো।
- মনোসাইট হলো বৃক্কাকার ও নানবীন সাইটোপ্লাজম বিশিষ্ট খেঁচ রক্তকণিকা।
- সেহে মোট খেঁচ রক্তকণিকা ৪ শতাংশ মনোসাইট।
- ম্যাক্রোফেজ নিউট্রফিলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ফ্যাসোসাইট হিসেবে কাজ করে।
- একেকটি ম্যাক্রোফেজ প্রায় ১০০টির মত ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করে পারে।
- সেহে মোট খেঁচ রক্তকণিকা ৬০-৭০ শতাংশই নিউট্রফিল।

টিকা বা ভ্যাকসিন

টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।
টিকা হলো একটি প্রোটিন যা কোন অজানা বস্তুকে চিনতে সক্ষম করে।

PRIME TEST

- শ্রেণিক প্রতিরক্ষা স্তর কোনটি?
 - প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর
 - দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
 - তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
 - কমপ্লিমেন্ট কম ধরনের প্রোটিন নিয়ে গঠিত?
- কমপ্লিমেন্ট কম ধরনের প্রোটিন নিয়ে গঠিত?
 - দশ
 - পনের
 - বিশ
 - পঁচিশ
- জর সৃষ্টিকারী যৌগসমূহকে এক কথায় কী বলা হয়?
 - পাইরোজেন
 - সাইটোটক্সিন
 - পারফরিন
 - প্রোটোজেন
- পাইরোজেন
 - পাইরোজেন
 - সাইটোটক্সিন
 - পারফরিন
 - প্রোটোজেন
- নিম্নের কোথায় লাইসোজাইম এনজাইম অনুপস্থিত?
 - রক্ত
 - মূত্র
 - ঘাম
 - দালা
- মানুষের সর্ববৃহৎ অঙ্গ কোনটি?
 - যকৃত
 - শ্নায়ু
 - ত্বক
 - ফুসফুস
- প্রতিদিন আমাদের ত্বকের কতগুলো কোষ মারা যায়?
 - ২০-৩০ হাজার
 - ৩০-৪০ হাজার
 - ৪০-৫০ হাজার
 - ৫০-৬০ হাজার
- নিম্নের কোন কোষটি অ্যালার্জি সৃষ্টির জন্য দায়ী?
 - কাপফার কোষ
 - অস্টিওব্লাস্ট
 - মাস্ট কোষ
 - নিউট্রোফিল
- নিম্নের কোনটি ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়ার ধাপ নয়?
 - ভক্ষণ
 - ফ্যাগোসাইটোসোম গঠন
 - এনজাইম নিঃসরণ
 - অনুজীবের সাথে সংযুক্তি
- অ্যান্টিবডি হালকা শৃঙ্খলের আণবিক ওজন কত?
 - ৫০ kD
 - ৭০ kD
 - ৬০ kD
 - ২৩ kD
- কোনো ক্ষতিকর অণুজীব কিংবা ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাবে দেহে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়?
 - অর্জিত প্রতিরক্ষা
 - সহজাত প্রতিরক্ষা
 - সাধারণ প্রতিরক্ষা
 - নির্দেশিত প্রতিরক্ষা
- জন্মের এক মাসের মধ্যে সুপারিশকৃত টিকা কোনটি?
 - BCG
 - DPT-I
 - DPT-II
 - DPT-III
- নিম্নের কোনটি সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান?
 - লিফোসাইট
 - অ্যাসিড
 - ইন্টারফেরন
 - ত্বক
- লালাতে কোন ধরনের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়?
 - IgA
 - IgG
 - IgM
 - IgD
- লাইসোজাইম কোথা থেকে ক্ষরিত হয়?
 - ত্বকীয় গ্রন্থি
 - অ্যাডরেনাল গ্রন্থি
 - অশ্রুগ্রন্থি
 - কোনটিই নয়
- কোনটি সহজাত প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়?
 - ইন্টারফেরন
 - প্রদাহ
 - ভ্যাক্সিন
 - কমপ্লিমেন্ট
- অ্যান্টিবডি গড়ন কোন আকৃতির?
 - V
 - U
 - Y
 - কোনটিই নয়
- সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভ্যাক্সিন কোনটি?
 - এইডস
 - হেপাটাইটিস-A
 - হেপাটাইটিস-B
 - গুটিবসন্ত
- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন কোন ধরনের?
 - নিষ্ক্রিয়
 - টক্সোয়েড
 - সাবইউনিট
 - কনজুগেট
- নিম্নের কোনটি DPT ভ্যাক্সিন এর অন্তর্ভুক্ত নয়?
 - ডিপথেরিয়া
 - পোলিও
 - টিটেনাস
 - পারটুসিস
- নিম্নের কোনটি নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার বৈশিষ্ট্য?
 - প্রভাব ক্ষণস্থায়ী
 - কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় না
 - এ ধরনের অনাক্রম্যতায় নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পরে উপশম ঘটে
 - এটি দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হয়

Answer Analysis

01.C	02.C	03.A	04.A	05.C	06.C	07.C	08.C	09.D	10.A
11.A	12.A	13.A	14.C	15.C	16.C	17.D	18.A	19.B	20.A

অধ্যায়

জীবতত্ত্ব ও বিবর্তন

সাজেশনস	RATINGS		
	★ ★ ★	★ ★	★
বংশগতি	প্রাথমিক অধ্যয়ন এবং অনুপাতসমূহ	অধিকার ও অধিকার	
ইনহেরিট্যান্স	পারিভাসিক প্রভাব, লিঙ্গকৃত ডিসঅর্ডার	ডিম্বাধিকার	নির্দিষ্ট
রক্তের গ্রুপ	রক্তের গ্রুপ	১৫ মাসের	
বিবর্তন		বিবর্তন মতবাদ	

TOPIC-01

প্রাথমিক অধ্যয়ন

- ফ্যাক্টর বা জিন: DNA অণুর বহুত্ব বা জিনের বহুত্বের পরিধি, স্থিতি ও কার্যিক একক এবং বংশ থেকে বংশান্তরে জিনের বৈশিষ্ট্য বহন করে।
- অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ: Homologous Chromosome জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী জিনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন জোড়ের একটির অপরটির অ্যালিল বলে।
- লোকাস: ক্রোমোজোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থানের নাম লোকাস।
- হোমোজাইগাস: কোন জিনে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি সমপ্রকৃতির হলে তাকে হোমোজাইগাস বলে। যেমন- BB, bb
- হেটেরোজাইগাস: কোন জিনে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি অসমপ্রকৃতির হলে তাকে হেটেরোজাইগাস বলে। যেমন- Bb, bB
- জিনোটাইপ: কোন জিনের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন জোড়ের গঠনকে জিনোটাইপ বলে।
- ফিনোটাইপ: জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে।
- ট্রেস্ট ক্রস: কোনো প্রাণি হোমোজাইগাস না হেটেরোজাইগাস তা জানার জন্য বিশেষ প্রাচুর্য লক্ষণ বিশিষ্ট হোমোজাইগাস প্রাণির সাথে যে ক্রস তাই ট্রেস্ট ক্রস।
- ব্যাক ক্রস: F₁ ও Parents (Recessive & Dominant) এর মধ্যে ক্রস।

TOPIC-02

মেডেলিজম

- মেডেল:
 - বংশগতিবিদ্যার জনক।
 - মেডেল অস্ট্রিয়াবাসী একজন ধর্মবাজক ছিলেন, যার জন্ম ১৮২২ সালে এক কৃষক পরিবারে।
 - ৩৪ প্রকার মটরগুটির ৭ জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেন।
- মেডেলের মটরগুটি বেছে নেয়ার কারণ:
 - একবর্ষবীজী
 - ফুলগুলো আকারে বড়
 - ফুল উভলিঙ্গ
 - উর্বর প্রকৃতির সত্ত্ব
 - বহু প্রকরণ
- মেডেলের বিভিন্ন সূত্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী:

সূত্র	সূত্রের ব্যতিক্রম	ফিনোটাইপ	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
প্রথম সূত্র: মনোহাইব্রিড ক্রস বা পৃথকীকরণ সূত্র: ফিনোটাইপ ও সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস ঘটালে গোলাপী ফুল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সূত্র: মনোহাইব্রিড ক্রস ১:২:১	অসম্পূর্ণ প্রকটতা	১:২:১	ইন্টারমিডিয়েট জিনহীন, সম্ভাব্যতঃ লাল ও সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস ঘটালে গোলাপী ফুল পাওয়া যায়।
	সমপ্রকটতা	১:২:১	বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যই সমান প্রকাশ পায়, কালোপালক x সাদা পালক = সাদা ছাপযুক্ত।
	মারশ জিন বা লিথাল জিন	২:১	হোমোজাইগাস অবস্থার জীবের মৃত্যু ঘটায়, মিউট্যান্ট জিন হয়। ক্রোমোমো অবিচ্ছিন্ন করেন, ২৫% মারা যায়। > ৫০% মৃত্যু = সেমিনিফাল (হিমোফিলিয়া)

সূত্র	সূত্রের ব্যতিক্রম	ফিনোটাইপ	চরিত্রপূর্ণ তথ্য
			< ৫০% মৃত্যু = সাবজাইটাল (ডেসোফিলিমা মাছির ছুস্ত জনা)। এছাড়া ক্রীপার মুরগি, পা বিহীন বাছুর, মানুষের ত্র্যাকিফ্যালাজি, হিমোফিলিয়া, জনুগত ইকথিওসিস, খালাসেমিয়া রোগ হয় লিখাল জিনের কারণে।
	পরিপূরক জিন	৯:৭	দুটি প্রকট জিনের জন্য একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।
	এপিস্ট্যাটিক দুই প্রকার		যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে এপিস্ট্যাটিক, যে বাধা পায় তাকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে।
	প্রকট	১৩:৩	একটি প্রকট জিন-নন আলিনিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয়।
	বৈকট প্রকট	৯:৭	আলিন একে অপরকে বাধা দেয় (মুকবধিরতা)।

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স: জিন তত্ত্ববিদ K. Mather (১৯৫৪) সালে পলিজিন নামকরণ করেন।

ইনহেরিট্যান্সের প্রকারভেদ:

নাম	উদাহরণ
পলিজেনিক	উচ্চতা, ওজন, ত্বকের রং, গাভীর দুধ, চোখের বর্ণ, বুদ্ধিমত্তা, আচরণ, ভূমি, গমের দানর রং, ফ্র্যাংগ, কতিপয় কালার, মানসিক রোগ। পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের কিছু বংশগতীয় রোগ দেখা দেয় যেমন- কালার, অটিজম, ডায়াবেটিস টাইপ-২
মনোজেনিক	লিঙ্গ নির্ধারণ, রক্তের গ্রুপ

TOPIC-03

লিঙ্গ নির্ধারণ

লিঙ্গ নির্ধারণের নীতি:

ধরন	স্ত্রী	পুরুষ	যেসব প্রাণীতে ঘটে
XX-XY	XX	XY	<i>Drosophila</i> , বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ, গাভী, তেলাকুতা, ইলোডিয়া, ককিনিয়া ও মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী।
XX-XO	XX	XO	<i>Dioscorea</i> শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ ও ঘাসফড়িং, গাছপোকা, আরশোলা, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা, হেটারোপ্টেরা শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।
ZZ-ZW	ZW	ZZ	পাখি, প্রজাপতি ও কিছু মাছ।
ZZ-ZO	ZO	ZZ	কিছু মথ ও প্রজাপতি।

সেক্সল লিংকড ডিসঅর্ডার: মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতীয় রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের (X ও Y) মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার বা অস্বাভাবিকতা বলে।

- X-জিন নিয়ন্ত্রিত কিছু রোগ: লাল-সবুজ বর্ণাঙ্কতা, হিমোফিলিয়া, ডুশেনি মাসকুলার ডিসট্রফি।
- Y-জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য হলো: কানের লোম।
- মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টিরও বেশি সেক্স লিংকড জিন পাওয়া যায়।

কয়েকটি লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা:

লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা	লক্ষণ
লাল-সবুজ বর্ণাঙ্কতা	লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। আমেরিকার ৮% পুরুষ ও ০.৫% মহিলাতে দেখা যায়।
হিমোফিলিয়া	রক্ততরঙ্গন বিলম্বিত হয়, ফলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত স্রবিত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। পুরুষে দেখা যায়। রাশিয়ান সিজার রাজ বংশে এই রোগ ছিল।
ডুশেনি মাসকুলার ডিসট্রফি	পেশী শক্ত হয়ে যায়, ১০ বছর বয়সেই চলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ২০ বছরের মধ্যে মারা যায়।

লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা	লক্ষণ
রাতকানা	রাত্রে কোন কিছু দেখতে পায় না।
ফ্র্যাংগ-ইল-X সিনড্রম	অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।
টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন	পুরুষ দীর্ঘে দীর্ঘে স্ত্রীতে পরিণত হয়।
হাইপারট্রাইকোসিস	সময় দেহে ঘন লোমের উপস্থিতি।
ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	অস্বাভাবিক মূত্রত্যাগ, শারীরিক অক্ষমতা।
এনথ্রোড্রোডিক	দাঁত, লোম এবং ঘর্মগ্রন্থির অনুপস্থিতি।
এন্টোডার্মাল ডিসপ্লাসিয়া	দৃষ্টিক্ষমতা, নিকটের জিনিস ভালোভাবে দেখতে না পারা
মায়োপিয়া	মাথার চুল আংশিক সাদা হওয়া।
হোয়াইট ফোরলক	চক্ষুগোলকের কাঠিন্য এবং ছানি পড়া।
জুভেনাইল গ্লুকোমা	মাংসপেশির আংশিক অবশ্যতা ও অনিয়ন্ত্রিত কাঠিন্য।
স্পাজটিক প্যারাপেলাজিয়া	মাংসপেশির আংশিক অবশ্যতা ও অনিয়ন্ত্রিত কাঠিন্য।
অপটিক এট্রফি	অপটিক নার্ভের ক্ষয়ক্ষতি

হিমোফিলিয়া: হিমোফিলিয়া হচ্ছে বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একপ্রকার রক্ত তরঙ্গনহীন ক্রটি বা অস্বাভাবিকতা।

প্রকারভেদ:

১. ক্লাসিক/হিমোফিলিয়া A (৮০%):

- VIII নম্বর ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি
- অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি

২. খ্রিস্টমাস/হিমোফিলিয়া B (২০%):

- IX নম্বর ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি
- প্রাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন কমপোনেট বা খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি।

TOPIC-04

রক্তের গ্রুপ

- অ্যান্টিজেনের উপর ভিত্তি করে রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।
- কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার ১৯০১ সালে মনুষ্য রক্তের শ্রেণী বিন্যাস করেন। তাই তাকে বলা হয় ব্লাড গ্রুপের জনক।

ব্লাড গ্রুপ	অ্যান্টিজেন (লোহিত কনিকায় থাকে)	অ্যান্টিবিডি (রক্ত রসে থাকে)	যে গ্রুপকে দিতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে
A (২৩%)	A	b বা β (anti-B)	A, AB	A, O
B (৩২%)	B	a বা α (anti-A)	B, AB	B, O
AB (৮%)	A, B	নেই	AB	A, AB, B, O
O (৩৭%)	নেই	ab বা α ও β (anti-A, anti-B)	A, B, AB, O	O

- ১৯৪০ সালে কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার এবং উইনার রেসাস বানরে (*Macaca mulatta*) Rh ফ্যাক্টর আবিষ্কার করেন।
- রেসাস বানরের নাম অনুসারে এই অ্যান্টিজেনকে Rhesus factor বা সংক্ষেপে Rh factor বলে।
- Fisher এর মতে, Rh ফ্যাক্টর মোট ৬টি অ্যান্টিজেনের সমষ্টি এদের তিন জোড়ায় ভাগ করা যায়। যেমন- C, c; D, d; E, e.
- C, D, E হচ্ছে মেডলীয় প্রকট ও c, d, e হচ্ছে মেডলীয় প্রচ্ছন্ন। Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা: গর্ভধারণজনিত জটিলতা (এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস)।

TOPIC-05

বিবর্তন

ল্যামার্কের 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ/ল্যামার্কিজম' (বায়োলজি শব্দের প্রবর্তক এবং প্রাণীজগতে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী দু'ভাগে বিভক্ত করেন)।

ল্যামার্কের সূত্রসমূহ:

- প্রথম সূত্র- বৃদ্ধি
- দ্বিতীয় সূত্র- পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন
- তৃতীয় সূত্র- ব্যবহার ও অব্যবহার
- চতুর্থ সূত্র- অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ।

• ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' মতবাদ/ডারউইনিজম:

ঘটনা প্রবাহ	সিদ্ধান্ত
বংশবৃদ্ধির উচ্চহার	জীবন সংগ্রাম
খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা	যোগ্যতমের জয়
জীবন সংগ্রাম	
পরিবর্তিত অসীম ক্ষমতা	
যোগ্যতমের উৎপত্তি	নতুন প্রজাতির উৎপত্তি
প্রাকৃতিক নির্বাচন	

- আধুনিক সংশোধিত মতবাদ/নিউ ডারউইনিজম
- ডারউইনের পরিব্যক্তি মতবাদ
- ভাইজম্যানের জার্মপ্লাজম মতবাদ

- পুনরাবৃত্তি মতবাদ- হেকেল

- বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ:

১. অঙ্কসংস্থানিক প্রমাণ:

- ক. তুলনামূলক শারীরস্থান:

- মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ:

প্রকোষ্ঠ	উদাহরণ
দুই প্রকোষ্ঠ	মাছ
তিন প্রকোষ্ঠ	উভচর
আংশিক চার প্রকোষ্ঠ	সরীসৃপ (কুমির ব্যতিক্রম)
সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ	পাখি ও স্তন্যপায়ী

- মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক

- খ. সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ:

- সমসংস্থ অঙ্গ: যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তি এক সেসব অঙ্গকে সমসংস্থ অঙ্গ বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদ, যেমন- পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, ভিমি বা সীল-এর ফ্লিপার (দাঁড়ের মতো হাত), ঘোড়া বা বিড়ালের অগ্রপদ ইত্যাদি সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ।

- টেস্ট ক্রসে কোন জীবের সাথে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয়- মাতৃবংশের বিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন ($Tt \times tt$)।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে বলা হয়- ইন্টারমিডিয়েট জিন।
- বাবা ও মা উভয়ের রক্তগুণ AB হলে সন্তানের রক্তগুণ AB হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু- ৫০%।
- পিতা স্বাভাবিক ও মাতা বর্ণাঙ্ক হলে, ছেলেগুলো হবে- ১০০% বর্ণাঙ্ক।
- হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত মহিলার সম্ভাব্য পিতামাতাকে- বাহক মা ও হিমোফিলিক বাবা।
- পাখি ও সরীসৃপের বিবর্তনসূচক সংযোগকারী প্রাণী- *Archaeopteryx*।
- 'Theory of Natural Selection' মতবাদটি প্রকাশিত হয়- Origin of Species by means of Natural Selection।
- স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (বাহক নয়) স্ত্রী এবং বর্ণাঙ্ক পুরুষের বিয়ে হলে তাঁদের কন্যা সন্তানদের স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনার হার- ১০০%।
- রেসাস বানরের বৈজ্ঞানিক নাম- *Macaca mulatta*।
- মানুষের উদ্ভব হয়েছে- প্রিওসিন যুগে।
- জুরাসিক সময়কাল বলা হয় কত আগের সময়কে?- সাড়ে ১৬ কোটি বছর।
- পুরুষ স্বাভাবিক এবং স্ত্রী বর্ণাঙ্ক হোমোজাইগাস হলে ছেলেটি কী হবে?- বর্ণাঙ্ক।
- যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে বলে- Hypostatic gene।
- জীবের প্রকাশিত লক্ষণকে বলা হয়- ফিনোটাইপ।
- F_1 ও F_2 জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস নাকি হেটেরোজাইগাস তা জানার প্রক্রিয়া- টেস্ট ক্রস।
- এম্পেডোক্লিসকে বিবর্তনের জনক বলা হয়।
- বায়েলজি শব্দের প্রবর্তক ল্যামার্ক, তিনি মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রণীকরণ করেন।
- রাসেল ওয়ালেস প্রাণীর বিস্তারের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে ৬ অঞ্চলে ভাগ করেন।
- ডায়নোসরের উদ্ভব হয় ট্রায়াসিক যুগে, ডায়নোসরের বিলুপ্তি ঘটে ক্রিটেশিয়াস যুগে।
- আলব্রেখট ফন হেলার সর্বপ্রথম Evolution শব্দটি ব্যবহার করেন।
- ডারউইন ১৮৩১ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর এইচ.এম.এস. বিগল নৌজাহাজের

প্রকারভেদ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ট্রোপোট্যাক্সিস	দুই বা ততোধিক সংবেদনশীল অঙ্গে একটি উদ্দীপকের উদ্দীপনা একসঙ্গে গৃহীত হলে ভারসাম্যমূলক ট্যাক্সিস।	মাছের উকুনে এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

TOPIC-02

আচরণ

জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষায় বংশ পরম্পরায় একইভাবে কাজ করে থাকে সেটাই ইনসটিং'স।

01. FAP (Fixed Action Pattern):

বিশ্বখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী লরেঞ্জ প্রদত্ত মানদণ্ড অনুযায়ী একটি FAP কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

- **ইচ্ছাশক্তি:** আচরণ সব সময় একই রকম হবে।
- **স্বাভাবিকতা:** একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে।
- **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত:** বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্যে একই আচরণ প্রকাশিত হবে।
- **ব্যালিস্টিকনেস:** সাড়া একবার দেওয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষেও তা অপরিবর্তিত থাকে।
- **উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা:** একটিমাত্র কাজ করে।

02. রাণী মৌমাছি, পুরুষ ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	রাণী মৌমাছি (উর্বর)	পুরুষ মৌমাছি (ড্রোন মৌমাছি)	কর্মী মৌমাছি (বন্ধ্যা মৌমাছি)
আকার	আকারে বড়	আকারে কিছুটা ছোট তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়	আকারে সবচেয়ে ছোট
প্রজনন	প্রজননে সক্ষম	প্রজননে সক্ষম	প্রজননে অক্ষম
ক্রোমোসোম সংখ্যা	2n	n	2n
মধু ও পরাগ সংগ্রহ	অংশ নেয় না	অংশ নেয় না	অংশ নেয়
কেসেরোমন	নিঃসৃত করে	নিঃসৃত করে না	নিঃসৃত করে না
আয়ুষ্কাল	প্রায় 2-3 বছর	প্রায় 50-60 দিন	প্রায় 50 দিন
প্রতি মৌচাকে সংখ্যা	একটি	কয়েকটি	10-80 হাজার
মৌচাকের কাজ	অংশ নেয় না	অংশ নেয় না	অংশ নেয়
খাদ্য সংগ্রহ	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম	খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম

• **রাজকীয় জেলি:** এটি কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল ও ম্যাভিউলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ এক ধরনের পুষ্টিগত খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয় (পানি ৬০-৭০%, প্রোটিন ১২-১৫%, লিপিড ৩-৬%, চিনি ১০-১৬%, ভিটামিন ২%-৩%, লবণ ও অ্যামিনো এসিড)।

• মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা অধিক বেড়ে গেলে রাণী মৌমাছি কর্মী মৌমাছির চাপে নতুন আবাস গড়ার উদ্দেশ্যে চাকের অর্ধেক কর্মী মৌমাছি নিয়ে ঝাঁক বেড়ে উড়ে যায়। একে সোয়ার্মিং বলে।

• কর্মী মৌমাছির মধ্যে অ্যালট্রাইজম সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, পরিত্যক্ত চাকে নতুন রাণীর পুরুষ অনুগামী সহ উড্ডয়নকে নাপিসিয়াল উড্ডয়ন বলে।

- **মৌমাছির নৃত্য:** মৌমাছির নৃত্যকে মৌমাছির ভাষা বলে। 1947 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী কার্ল ফন ফ্রিস 'মৌমাছির নৃত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। এ জন্য তাঁকে 1973 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। মৌমাছির নৃত্য দু'প্রকারের- i. চক্রাকার নৃত্য (১০০ মিটারের দূরত্বের জন্য) ii. ওয়াগল নৃত্য (ইংরেজি '৪' এর মতো দেখায়, ১৫০ মিটারের অধিক দূরত্বের জন্য)।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- Niko Tinbergen কে ইথোলজির জনক বলা হয়।
- বিখ্যাত আচরণ বিজ্ঞানী লরেঞ্জ (Lorenz) সর্বপ্রথম Releaser শব্দটি প্রয়োগ করেন।
- ম্যাগনেটোট্যাক্সিস হলো চুম্বকক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সাড়া দান।
- জিওট্যাক্সিস হলো জীবের অভিকর্ষজনিত সাড়া দান।
- দৈহিক স্পর্শজনিত ট্যাক্সিস হলো থিগমোট্যাক্সিস।
- তরল পদার্থে প্রাণির স্রোতজনিত ট্যাক্সিস হলো রিওট্যাক্সিস।
- ব্রোফ্লাই ও বাটারফ্লাই এর লার্ভার ক্রাইনোট্যাক্সিস দেখা যায়।
- মেনোট্যাক্সিস হলো সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিপড়ার চলন।
- মাছের উকুনে ট্রোপোট্যাক্সিস দেখা যায়।
- ডারউইন সর্বপ্রথম ইনসটিং'সের বাস্তবমুখী সংজ্ঞা দেন।
- মাকড়সার জাল বোনা, মৌমাছির মৌচাক তৈরি, বাবুই পাখির বাসা তৈরি এবং শিশুর স্তন্যপান হলো সহজাত আচরণের উদাহরণ।
- ক্যাটারপিলার লার্ভা উপরের দিকে এবং এদের পিউপা নিচের দিকে গমন করে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।
- ঘাসফড়িং আলোর প্রতি ধনাত্মক এবং আরশোলা ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।
- কার্প জাতীয় মাছ প্রজননের সময় ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।
- বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ প্রজাতির স্থায়ী পাখি রয়েছে এবং অস্থায়ী বা বিদেশী পাখি রয়েছে প্রায় ৩০০ প্রজাতির।
- হ্যান্স পিটার্স (Hans Peters) সর্বপ্রথম মাকড়সার জাল বোনার ধাপ পর্ববেক্ষণ করেছিলেন।
- একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা মাকড়সার সুতা বেশি শক্তিশালী এবং নাইলনের চেয়ে দ্বিগুণ স্থিতিস্থাপক।
- মাকড়সার সুতা টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে হেঁড়ার আগে সুতা এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।
- মাকড়সার সুতায় ক্লেরোপ্রোটিন নামক প্রোটিন থাকে।
- কুকুরের লালার ক্ষরণের সাপেক্ষে প্রতিবর্ত চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ।
- রাণী মৌমাছি একমাত্র উর্বর মৌমাছি।
- ড্রোন বা পুরুষ মৌমাছি সংখ্যায় কয়েকশ থাকে। সঙ্গমই পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ।
- কর্মী বা বন্ধ্যা মৌমাছি সংখ্যায় ৬০-৮০ হাজার।
- কার্ল ভন ফ্রিস মৌমাছির নৃত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন।
- কর্মী মৌমাছি ৩-৪ দিন বয়সে চাকের মধু-কুইরি পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়।
- বন্ধ্যা মৌমাছি ১৮-২০ দিন বয়সে মধু আহরণে বের হয়।
- স্থানাভাব দেখা দিলে রাণী মৌমাছি চাকের প্রায় অর্ধেক কর্মী মৌমাছিসহ ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় যাকে সোয়ার্মিং বলে।
- রাজকীয় জেলি রাণী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়।
- রাণী মরে গেলে কিংবা প্রজননে অক্ষম হলে কর্মীরা বিকাশরত লার্ভাকে বিশেষভাবে তৈরি রাজকীয় জেলি খাওয়ায়ে কলোনিতে ১৬ দিনের মধ্যে নতুন রাণী সৃষ্টি করে। এ ঘটনাকে সুপার সিডিওর বলে।
- ওয়াগল নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছি বাসা থেকে ১৫০ মিটার অধিক দূরত্বের কোন খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে।
- তিন কাটা স্টিকলব্যাক অঞ্জিলেন চাহিদা নিশ্চিত করতে পানিশ্রোত অব্যাহত রাখে। এ প্রক্রিয়ার নাম ফ্যানিং।
- কিছু পাখি আছে যা অন্যদেশে যাওয়ার আগে দু একদিন বাংলাদেশে অবস্থান করার পর নির্দিষ্ট দেশে উড়াল দেয়। এসব পাখি ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী।

প্রকারভেদ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ট্রোপোট্যাক্সিস	দুই বা ততোধিক সংবেদনশীল অঙ্গে একটি উদ্দীপকের উদ্দীপনা একসঙ্গে গৃহীত হলে ভারসাম্যমূলক ট্যাক্সিস।	মাছের উকুনে এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

TOPIC-02

আচরণ

জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষায় বংশ পরম্পরায় একইভাবে কাজ করে থাকে সেটাই ইনস্টিংস।

01. FAP (Fixed Action Pattern):

বিশ্বখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী লরেন্স প্রদত্ত মানদণ্ড অনুযায়ী একটি FAP কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

- **ইচ্ছাসম্মত:** আচরণ সব সময় একই রকম হবে।
- **স্বাধীনতা:** একটি প্রজাতির সকল সদস্য এ আচরণ প্রদর্শিত হবে।
- **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত:** বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্য একই আচরণ প্রকাশিত হবে।
- **ব্যালিস্টিকনেস:** সাড়া একবার দেওয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষেও তা অপরিবর্তিত থাকে।
- **উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা:** একটিমাত্র কাজ করে।

02. রাণী মৌমাছি, পুরুষ ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	রাণী মৌমাছি (উর্বর)	পুরুষ মৌমাছি (ড্রোন মৌমাছি)	কর্মী মৌমাছি (বক্ষ্য মৌমাছি)
আকার	আকারে বড়	আকারে কিছুটা ছোট তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়	আকারে সবচেয়ে ছোট
প্রজনন	প্রজননে সক্ষম	প্রজননে সক্ষম	প্রজননে অক্ষম
ক্রোমোসোম সংখ্যা	2n	n	2n
মধু ও পরাগ সংগ্রহ	অংশ নেয় না	অংশ নেয় না	অংশ নেয়
কেরোমিন	নিঃসৃত করে	নিঃসৃত করে না	নিঃসৃত করে না
আয়ুষ্কাল	প্রায় 2-3 বছর	প্রায় 50-60 দিন	প্রায় 50 দিন
প্রতি মৌচাকে সংখ্যা	একটি	কয়েকটি	10-80 হাজার
মৌচাকের কাজ	অংশ নেয় না	অংশ নেয় না	অংশ নেয়
খাদ্য সংগ্রহ	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম	খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম

- **রাজকীয় জেলি:** এটি কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল ও ম্যাডিউলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ এক ধরনের পুষ্টিগত খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয় (পানি ৬০-৭০%, প্রোটিন ১২-১৫%, লিপিড ৩-৬%, চিনি ১০-১৬%, ভিটামিন ২%-৩%, লবণ ও অ্যামিনো এসিড)।
- **মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা** অধিক বেড়ে গেলে রাণী মৌমাছি কর্মী মৌমাছির চাপে নতুন আবাস গড়ার উদ্দেশ্যে চাকের অর্ধেক কর্মী মৌমাছি নিয়ে বাক বেড়ে উড়ে যায়। একে সোয়ার্মিং বলে।
- **কর্মী মৌমাছির মধ্যে অ্যালট্রইজম** সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, পরিত্যক্ত চাকে নতুন রাণীর পুরুষ অনুগামী সহ উড্ডয়নকে নাপসিয়াল উড্ডয়ন বলে।

- **মৌমাছির নৃত্য:** মৌমাছির নৃত্যকে মৌমাছির ভাষা বলে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী কার্ল ফ্রিস 'মৌমাছির নৃত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। এ জন্য তাঁকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। মৌমাছির নৃত্য দু'প্রকারের- i. চক্রাকার নৃত্য (১০০ মিটারের কম দূরত্বের জন্য) ii. ওয়াগল নৃত্য (ইংরেজি '৪' এর মতো দেখায়, ১৫০ মিটারের অধিক দূরত্বের জন্য)।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- Niko Tinbergen কে ইথোলজির জনক বলা হয়।
- বিখ্যাত আচরণ বিজ্ঞানী লরেন্স (Lorenz) সর্বপ্রথম Releaser শব্দটি প্রয়োগ করেন।
- ম্যাগনেটোট্যাক্সিস হলো চুম্বকক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সাড়া দান।
- জিওট্যাক্সিস হলো জীবের অভিকর্ষজনিত সাড়া দান।
- দৈহিক স্পর্শজনিত ট্যাক্সিস হলো থিগমোট্যাক্সিস।
- তরল পদার্থে প্রাণির শ্রোতজনিত ট্যাক্সিস হলো রিওট্যাক্সিস।
- ব্রোফাই ও বাটারফ্লাই এর লার্ভার ক্লাইনোট্যাক্সিস দেখা যায়।
- মেনোট্যাক্সিস হলো সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিঁপড়ার চলন।
- মাছের উকুনে ট্রোপোট্যাক্সিস দেখা যায়।
- ডারউইন সর্বপ্রথম ইনস্টিংসের বাস্তবমুখী সংজ্ঞা দেন।
- মাকড়সার জাল বোনা, মৌমাছির মৌচাক তৈরি, বাবুই পাখির বাসা তৈরি এবং শিশুর স্তন্যপান হলো সহজাত আচরণের উদাহরণ।
- ক্যাটারপিলার লার্ভা উপরের দিকে এবং এদের পিউপা নিচের দিকে গমন করে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।
- ঘাসফড়িং আলোর প্রতি ধনাত্মক এবং আরশালা ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।
- কার্প জাতীয় মাছ প্রজননের সময় ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।
- বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ প্রজাতির স্থায়ী পাখি রয়েছে এবং অস্থায়ী বা বিদেশী পাখি রয়েছে প্রায় ৩০০ প্রজাতির।
- হ্যান্স পিটার্স (Hans Peters) সর্বপ্রথম মাকড়সার জাল বোনার ধাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।
- একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা মাকড়সার সুতা বেশি শক্তিশালী এবং নাইলনের চেয়ে দ্বিগুণ স্থিতিস্থাপক।
- মাকড়সার সুতা টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে ছেঁড়ার আগে সুতা এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।
- মাকড়সার সুতায় ক্লোরোপ্রোটিন নামক প্রোটিন থাকে।
- কুকুরের লালার ক্ষরণের সাপেক্ষে প্রতিবর্ত চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ।
- রাণী মৌমাছি একমাত্র উর্বর মৌমাছি।
- ড্রোন বা পুরুষ মৌমাছি সংখ্যায় কয়েকশ থাকে। সঙ্গমই পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ।
- কর্মী বা বক্ষ্য মৌমাছি সংখ্যায় ৬০-৮০ হাজার।
- কার্ল ডন ফ্রিস মৌমাছির নৃত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন।
- কর্মী মৌমাছি ৩-৪ দিন বয়সে চাকের মধু-কুঠুরি পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়।
- বক্ষ্য মৌমাছি ১৮-২০ দিন বয়সে মধু আহরণে বের হয়।
- স্থানাভাব দেখা দিলে রাণী মৌমাছি চাকের প্রায় অর্ধেক কর্মী মৌমাছিসহ বাক বেঁধে উড়ে যায় যাকে সোয়ার্মিং বলে।
- রাজকীয় জেলি রাণী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়।
- রাণী মরে গেলে কিংবা প্রজননে অক্ষম হলে কর্মীরা বিকাশরত লার্ভাকে বিশেষভাবে তৈরি রাজকীয় জেলি খাওয়ায়ে কলোনিতে ১৬ দিনের মধ্যে নতুন রাণী সৃষ্টি করে। এ ঘটনাকে সুপার সিডিওর বলে।
- ওয়াগল নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছি বাসা থেকে ১৫০ মিটার অধিক দূরত্বের কোন খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে।
- তিন কাটা স্টিকলব্যাক অক্সিজেন চাহিদা নিশ্চিত করতে পানিশ্রোত অব্যাহত রাখে। এ প্রক্রিয়ার নাম ফ্যানিং।
- কিছু পাখি আছে যা অন্যদেশে যাওয়ার আগে দু'একদিন বাংলাদেশে অবস্থান করার পর নির্দিষ্ট দেশে উড়াল দেয়। এসব পাখি ট্রানসিগ্রেট পরিযায়ী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বি সহায়িকা

পোহর পোহর পাখির বিরতিহীনভাবে উড়ে ১৪০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আমেরিকার পৌর গ্রাম্য আছে।
বহুবার ঘুরা প্রত্যাহিত হয়ে প্রাণীর চলাচলকে বলে- অ্যানিমোট্যাক্সিস
বিশ্ব (প্রতিবর্তী চক্র) এটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়।
বিকলভাবে ঘুরে জনন সম্পন্ন হয়- বসন্তকালে
একটিবার ব্যাকের রূপান্তরের সময় লাগে- ৪০ দিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১১. জীব বহন বৈশিষ্ট্যিক কোষের প্রতি সাড়া দেয় তাকে কি বলে? [JU-D, Set-H, 2022-23]
A. Aerotaxis B. Phototaxis
C. Galvanotaxis D. Rheotaxis
১২. তরলজনের ঘনত্বের পার্থক্যের সাথে সম্পর্কিত কোনটি? [JU-D, Set-F, 2022-23]
A. Aerotaxis B. Chemotaxis
C. Phonotaxis D. Rheotaxis
১৩. শব্দ প্রতি সাড়া দিয়ে জীবের চলনকে কী বলে? [JU-D, Set-L, 2022-23]
A. Aerotaxis B. Phonotaxis
C. Galvanotaxis D. Geotaxis
১৪. জীবকোষের অভ্যন্তরীণ শক্তির অবস্থা বিবেচনায় সাড়া প্রদানকে কি বলে? [JU-D, Set-R, 2022-23]
A. Phonotaxis B. Thigmotaxis
C. Enetaxis D. Energytaxis
১৫. শীতের পাখি অভিযাত্রা (পরিযান) কোন ধরনের আচরণ? [DU, 17-18]
A. অভ্যাসগত B. সহজাত
C. শিক্ষণ D. অনুকরণ
১৬. ফেরোমন ক্ষরণ করে কোন ধরনের মৌমাছি? [JU-D, Set-F, 20-21]
A. পুরুষ B. রানী
C. কর্মী D. সবকটি
- SCWB** রানী মৌমাছির ম্যাভিবুলার গ্রন্থি থেকে Queen substance নামক এক বিশেষ ধরনের ফেরোমন নিঃসৃত হয়। এ ফেরোমন কর্মীদের জনসংখ্যার পরিপকৃত্য বাধা প্রদান করে।
১৭. কোন মৌমাছি রয়েল জেলি তৈরি করে? [CU-A, Shift-2: 22-23]
A. রানী B. ড্রোন
C. কর্মী D. ড্রোন ও কর্মী মৌমাছি
- SCWB** কর্মী মৌমাছির গঠন ও কাজ: এদের পায়ে পরাগ সংগ্রহের থলি বা পরাগবুড়ি এবং রেণু চিরুনি থাকে। এদের উদরের অক্ষীয়দেশে মোম নিঃসরণের জন্য মোমগ্রন্থি থাকে। দেহের শেষভাগে হলু এবং মস্তকে একটি গোবক নল বা দীর্ঘ প্রোবোসিস বিদ্যমান।
১৮. রয়েল বা রাজকীয় জেলী কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল ও ম্যাভিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ এক ধরনের পুষ্টিগত খাদ্য যা রানী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় ঝাওয়ানো হয়।

PRIME TEST

০১. 'Historia Animalium' কার রচনা?
A. William Harvey B. Aristotle
C. Charles Darwin D. Manning
০২. FAP এর বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
A. হাঁচ সম্পন্ন B. স্বাভাবিকতাবৃত্ত
C. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্তর্গত D. উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা
০৩. মাছের উকুন কোন ট্যাক্সিস দেখা যায়?
A. ক্লাইনোট্যাক্সিস B. ট্রোপোট্যাক্সিস
C. মেনোট্যাক্সিস D. নেমোট্যাক্সিস

০৪. শিম্পাঞ্জি কোন উদ্ভিদপক ব্যবহার করে অন্য প্রাণীদের আকর্ষণ করে?
A. রাসায়নিক উদ্ভিদপক B. শব্দ উদ্ভিদপক
C. দর্শন উদ্ভিদপক D. স্পর্শ উদ্ভিদপক
০৫. গিরগিটি অতিরিক্ত গরমের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য শীতল স্থানে যায় একে কী বলে?
A. শীতনিদ্রা B. গ্রীষ্মনিদ্রা
C. সহজাত আচরণ D. মাইগ্রেশন
০৬. FAP কীভাবে নির্ধারিত?
A. স্থানভেদে B. জিনগতভাবে
C. কোষ অনুযায়ী D. কোনটিই নয়
০৭. নিচের কোনটি থামেট্যাক্সিসের আচরণের উদাহরণ নয়?
A. Paramecium B. Amoeba C. Euglena D. Ascidia
০৮. প্রাণী উদ্ভিদপকের উৎসের দিকে গমন করা কোন ট্যাক্সিসের অন্তর্গত?
A. ধনাত্মক B. নেগেটিভ C. নিউট্রাল D. কোনটিই নয়
০৯. কোনটি মৌমাছির সম্প্রদায় নয়?
A. রানী B. কর্মী C. ড্রোন D. রাজা
১০. সর্বপ্রথম 'Releaser' শব্দ প্রয়োগ করেন কে?
A. লরেঞ্জ B. হার্ভে C. টিনবারগেন D. ম্যানিং
১১. সহজাত আচরণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য নয় কোনটি?
A. সাধারণত জন্মগত B. প্রজাতি নির্দিষ্ট
C. বংশ পরম্পরায় সংঘটিত হয় D. জৈবিক বা অভিযোজনিক উদ্দেশ্যে এ আচরণ প্রকাশ করা হয়
১২. বিহীন আচরণ কোন আচরণের উদাহরণ?
A. অর্জিত B. পরিবেশগত C. স্থানগত D. সহজাত
১৩. প্রতিটি FAP-ই ইনসটিংগে; কে বলেছেন?
A. টিনবারগেন B. ল্যামার্ক
C. হেরিংহাল D. লরেঞ্জ
১৪. স্পর্শের প্রতি সাড়া দেওয়ার প্রতিক্রিয়াকে কী বলে?
A. Rheotaxis B. Thonotaxis
C. Tropotaxis D. Thigmotaxis
১৫. নিচের কোনটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সঠিক বৈশিষ্ট্য নয়?
A. সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ধরনের প্রতিক্রিয়া
B. এটি সহজেই সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয়
C. এটি সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয়
D. এটি খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়
১৬. বাবুই পাখির রাসা তৈরি করা কোন ধরনের আচরণ?
A. শিক্ষণ আচরণ B. অভিজ্ঞতালব্ধ আচরণ
C. সহজাত আচরণ D. পরিবেশীয় আচরণ
১৭. Altruism শব্দটি সর্বপ্রথম প্রণয়ন করেন কোন দার্শনিক?
A. R. A. King B. C.T. Morgan
C. August Comte D. Niko Tinbergen
১৮. কলোনিতে প্রধান ব্যক্তিত্ব কে?
A. রানী B. শ্রমিক
C. লার্ভা D. পুরুষ
১৯. কর্মী মৌমাছির আয়ুষ্কাল কত?
A. ৭ দিন B. ২ মাস
C. ৭ সপ্তাহ D. ২ বছর
২০. বাংলাদেশে কয় প্রজাতির স্থায়ী পাখি রয়েছে?
A. ২০০ B. ৪০০
C. ৫০০ D. ৬০০

Answer Analysis

01.B	02.C	03.B	04.C	05.B	06.B	07.D	08.A	09.D	10.A
11.D	12.D	13.D	14.D	15.B	16.C	17.C	18.A	19.C	20.C