

# উচ্চতর গণিত

গুরুত্ব বুঝে অধ্যয়ন

অধ্যয়নভিত্তিক সূচিপত্র

নিভা সবার প্রয়োজন

| অধ্যায় ক্রমঃ          | অধ্যায়ের নাম                     | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র |                                   |           |
| অধ্যায় - ০১           | ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক           | ৫৭৭       |
| অধ্যায় - ০২           | ভেক্টর                            | ৫৮০       |
| অধ্যায় - ০৩           | সরলরেখা                           | ৫৮৪       |
| অধ্যায় - ০৪           | বৃত্ত                             | ৫৮৯       |
| অধ্যায় - ০৫           | বিন্যাস ও সমাবেশ                  | ৫৯২       |
| অধ্যায় - ০৬           | ত্রিকোণমিতিক অনুপাত               | ৫৯৬       |
| অধ্যায় - ০৭           | সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | ৫৯৮       |
| অধ্যায় - ০৮           | ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র          | ৬০২       |
| অধ্যায় - ০৯           | অন্তরীকরণ                         | ৬০৫       |
| অধ্যায় - ১০           | যোগজীকরণ                          | ৬১০       |


| অধ্যায় ক্রমঃ             | অধ্যায়ের নাম                      | পৃষ্ঠা নং |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র |                                    |           |
| অধ্যায় - ০১              | বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা              | ৬১৬       |
| অধ্যায় - ০২              | যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম               | ৬১৮       |
| অধ্যায় - ০৩              | জটিল সংখ্যা                        | ৬২২       |
| অধ্যায় - ০৪              | বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ             | ৬২৫       |
| অধ্যায় - ০৫              | দ্বিপদী বিস্তৃতি                   | ৬২৯       |
| অধ্যায় - ০৬              | কণিক                               | ৬৩২       |
| অধ্যায় - ০৭              | বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও সমীকরণ | ৬৩৭       |
| অধ্যায় - ০৮              | স্থিতিবিদ্যা                       | ৬৪১       |
| অধ্যায় - ০৯              | সমতলে চলমান বস্তুর গতি             | ৬৪৪       |
| অধ্যায় - ১০              | বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা          | ৬৪৮       |

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা বইটির উচ্চতর গণিত অংশের

বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানতে আসপেক্ট ম্যাথ বইটি দেখ!!!!!!

দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেশসেরা

আসপেক্ট সিরিজ-এর বইগুলো সর্বদাই অতুলনীয়





অধ্যায়  
০৯

# ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

গণিত  
১ম পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস                                             | V.V.I<br>RATE |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ ও মান নির্ণয় সংক্রান্ত     | ★ ★ ★         |
| TOPIC-02 | ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য [Properties of Matrices]    | ★ ★           |
| TOPIC-03 | ম্যাট্রিক্সের মাত্রা, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও সমতা       | ★ ★           |
| TOPIC-04 | ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স [Singular]                   | ★ ★ ★         |
| TOPIC-05 | Adjoint অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স | ★ ★ ★         |
| TOPIC-06 | অনুরাশি বা Minor ও সহগুনক [Co-factor] নির্ণয়       | ★ ★ ★         |
| TOPIC-07 | নির্ণায়কের মান নির্ণয়                             | ★ ★ ★         |
| TOPIC-08 | একটি অজানা চলক থাকলে মান নির্ণয়                    | ★ ★           |
| TOPIC-09 | সবগুলো অজানা চলক থাকলে মান নির্ণয়                  | ★ ★           |

## এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

■ ম্যাট্রিক্স: সংখ্যা বা বীজগণিতীয় রাশির আয়তাকার বা বর্গাকারে সাজানো ব্যবস্থাই হলো ম্যাট্রিক্স। ম্যাট্রিক্সকে সাধারণত  $[ ]$  বা  $( )$  বা  $||$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} \text{ বা } \begin{pmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{pmatrix} \text{ বা, } \left\| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{array} \right\|$$

■ নির্ণায়ক (Determinant):  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$  বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক হচ্ছে  $|A|$

$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$  এবং এর মান  $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$  অর্থাৎ, কতগুলি সংখ্যাক বর্গাকারে সাজিয়ে উভয় পাশে  $| |$  দ্বারা আবদ্ধ করে নির্ণায়ক উৎপন্ন হয়।

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$  একটি তৃতীয় ক্রমের নির্ণায়ক। ইহা একটি নির্দিষ্ট মান।

● A এর মাত্রা  $m \times n$  হলে  $A^T$  এর মাত্রা  $n \times m$

● কোনো ম্যাট্রিক্স A এর বিপরীত ম্যাট্রিক্সের ট্রেস,  $\text{tr}(A^{-1}) = \frac{\text{tr}(A)}{|A|}$

■ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ম্যাট্রিক্সের যোগ, বিয়োগ ও গুণ | 01. দুটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর গুণফল AB নির্ণয় করা যাবে যদি A ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা B ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যার সমান হয়।<br>∴ $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ এবং $B = [b_{ij}]_{n \times r}$ হলে যদি $AB = [ab]_{m \times r}$ হয় তবে AB ম্যাট্রিক্সের মাত্রা $m \times r$ হবে।<br>02. ম্যাট্রিক্সের যোগ ও বিয়োগের নিয়ম : দুটি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা সমান না হলে যোগ বা বিয়োগ করা যায় না। সমান মাত্রার ম্যাট্রিক্সদ্বয় একই অবস্থানের ভুক্তিসমূহ যোগ বা বিয়োগ করে ম্যাট্রিক্সের যোগ বা বিয়োগফল বের করা হয়। যেমন : $A = \begin{bmatrix} a & b \\ e & f \end{bmatrix}$ ,<br>$B = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix}$ হলে, $A \pm B = \begin{bmatrix} a \pm m & b \pm n \\ e \pm p & f \pm q \end{bmatrix}$ হবে।<br>03. ম্যাট্রিক্স গুণনের ক্ষেত্রে যেকোনো একটি সারি বা কলাম এর গুণ বের করে দেখলেই Ans. অপশনে পাওয়া যায়। |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| নির্ণায়কের মান নির্ণয় | কোন নির্ণায়কের যে কোন সারি বা কলামের এর উপাদানসমূহ ও তাদের নিজ নিজ সহগুণকের গুণফলের সমষ্টিই নির্ণায়কের মান।<br>$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের $a_1, a_2, a_3$ এর সহগুনক যথাক্রমে $A_1, A_2, A_3$ হলে নির্ণায়কের মান হবে, $a_1A_1 + a_2A_2 + a_3A_3$<br>$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \times - \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}$ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| অনুরাশি নির্ণয়                             | Step-1: যে রাশি বা সংখ্যার অনুরাশি বের করতে বলবে ঠিক সেই রাশি বরাবর Row এবং Column বাদ দাও।<br>Step-2: বাকি উপাদানগুলো দিয়ে নির্ণায়ক গঠন কর। সেটিই অনুরাশি।<br>Step-3: মান বের করতে বললে সাধারণ নিয়মে নির্ণায়কের মান বের করতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| সহগুনক                                      | Step-1: অনুরাশি বের করার পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথমে অনুরাশি বের কর।<br>Step-2: অনুরাশি সামনে $(-1)^{R+C}$ সূত্র ব্যবহার করে যথাযথ চিহ্ন বসে। সেটিই সহগুনক। যেখানে, R = সারি, C = কলাম<br>অর্থাৎ, অনুরাশিকে উক্ত উপাদানের চিহ্ন দিয়ে গুণ করলে সহগুনক পাওয়া যায়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স | কোন বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়ক $ A $ এর সহগুনক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের (ভুক্তিগুলোর ক্রম অনুসারে) Transpose ম্যাট্রিক্সকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর Adjoint matrix বলা হয়। এটিকে সূচিত করা হয় $\text{Adj}(A)$<br>$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা<br>$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$<br>$A$ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত বা Inverse ম্যাট্রিক্স $A^{-1} = \frac{1}{\text{Det}(A)} \text{Adj}$<br>$(A) = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$<br>[প্রাইমারি কর্ণের উপাদানগুলোর স্থান পরিবর্তন এবং সেকেন্ডারি কর্ণের উপাদানগুলোর চিহ্ন পরিবর্তন করলে যা পাওয়া যায় তাই Adjoint] |

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01.  $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস কোনটি? [JU-A. 19-20]

A. 5 B. 12 C. 8 D. 7

**[S@Why]** ম্যাট্রিক্সের ট্রেস = মুখ্য কর্ণের উপাদান গুলোর যোগফল  
∴ ট্রেস =  $1 + 4 + 3 = 8$

02.  $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$  এবং  $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $AB = ?$  [DU. 14-15; RU. 18-19; JU-A. Set-R. 22-23]

A.  $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$  B.  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  C.  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$  D.  $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

**[S@Why]**  $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$   
 $= \begin{pmatrix} 2.2 + (-2).3 & 2.2 + (-2).3 \\ (-2).2 + 2.3 & (-2).2 + 2.3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-6 & 4-6 \\ -4+6 & -4+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

03. A, B এবং C ম্যাট্রিক্সগুলির আকার যথাক্রমে  $4 \times 5$ ,  $5 \times 4$  এবং  $4 \times 2$  হলে  $(A^T + B)C$  ম্যাট্রিক্সের আকার কত হবে? [JU-A. Set-K. 2023-24, DU-20-21; CU-D. Set-1. 20-21; DU-7Clg. 19-20; BUET. 10-11; IU.16-17; BRU-E. 19-20; MBSTU-C. 19-20; ব.বো. ২০১৯]

A.  $5 \times 4$  B.  $4 \times 2$  C.  $5 \times 2$  D.  $2 \times 5$

**[S@Why]**  $(A^T + B)$  এর মাত্রা  $5 \times 4$ ; C এর মাত্রা  $4 \times 2$   
∴  $(A^T + B)C$  এর মাত্রা  $= (A^T + B)$  এর মাত্রা  $\times$  C এর মাত্রা  
 $= (5 \times 4) \times (4 \times 2) = 5 \times 2$

04. A ম্যাট্রিক্সের ক্রম  $2 \times 3$  এবং B ম্যাট্রিক্সের ক্রম  $3 \times 2$  হলে AB এর ক্রম কোনটি? [JU-A. Set-N. 22-23]

A.  $2 \times 2$  B.  $2 \times 3$  C.  $3 \times 2$  D.  $3 \times 3$

**[S@Why]** AB এর মাত্রা  $= A$  এর মাত্রা  $\times B$  এর মাত্রা  
 $= 2 \times \begin{bmatrix} 3 \times 3 \end{bmatrix} \times 2 = 2 \times 2$



05.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$  এবং  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  হলে  $A + B = ?$  [JU-A, Set-F, 2021-22]

A.  $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 6 & 8 & 6 \\ 11 & 13 & 9 \end{pmatrix}$  B.  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 9 \\ 7 & 12 & 14 \end{pmatrix}$  C.  $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 8 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$  D. অসম্ভব

**SOWHY** A এর মাত্রা  $3 \times 3$  এবং B এর মাত্রা  $3 \times 2$ ।

যেহেতু মাত্রা সমান নয় তাই যোগ করা অসম্ভব।

06.  $\begin{bmatrix} 8 & x \\ y-2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 2+y \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$  হলে  $(x, y)$  কৌণটি? [RU-C, সেপ্টেম্বর-৬, 2023-24]

A. (8, 2) B. (6, 2) C. (6, 8) D. (8, 6)

**SOWHY**  $\begin{bmatrix} 8 & x \\ y-2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 2+y \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$

ম্যাট্রিক্সের সমতা অনুসারে,  $\begin{cases} 8 = 8 \\ x = 2+y \\ y-2 = 4 \\ 6 = 6 \end{cases}$  এবং,  $x = 2 + y$

$y - 2 = 4 \Rightarrow y = 6$

$\therefore (x, y) = (8, 6)$

07. নিচের কোনটি সমবাহু ম্যাট্রিক্স? [RU, Astronomical, Set-1, 20-21]

A.  $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$  B.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$  C.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$  D.  $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

**SOWHY**  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$   $[A^2 = A \text{ হলে সমবাহু}]$

08. যদি  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$  হয়, তবে  $A^T = ?$  [JKNU, 19-20]

A.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$  B.  $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  C.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  D.  $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

**SOWHY**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \therefore A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

09.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$  নির্ণায়কটির '6' এর সহগত্বক কত? [DU, 95-96]

A.  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$  B.  $\begin{vmatrix} 7 & 8 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$  C.  $\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$  D.  $\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -7 & -8 \end{vmatrix}$

**SOWHY** '6' এর সহগত্বক  $= - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$

10.  $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 4 \\ 7 & 2 & 7 \end{bmatrix}$  এ 4 অনুরাশি কৌণটি? [JU-A, 17-18]

A. 10 B. -10 C. 8 D. 5

**SOWHY** 4 এর অনুরাশি  $= \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = (10 - 0) = 10$

11.  $\begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 50 & 70 & 90 \end{bmatrix}$  নির্ণায়কটির মান কত? [DU, 96-97]

A. 0 B. 100 C. -100 D. 140

**SOWHY**  $\begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 50 & 70 & 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & -10 & 30 \\ -10 & -10 & 60 \\ -20 & -20 & 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1' = c_1 - c_2 \\ c_2' = c_2 - c_3 \end{bmatrix} = 0$

[পাশাপাশি দুইটি কলামের উপাদান একই।]

12.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & K \end{bmatrix}$  নির্ণায়কের মান 2 হলে, K এর মান কত? [JU-A, Set-F, 2021-22]

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

**SOWHY**  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & K \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow 1(2K - 12) - 1(K - 3) + 1(4 - 2) = 2$

$\Rightarrow 2K - 12 - K + 3 + 2 = 2$

$\Rightarrow K = 9$

13.  $\begin{bmatrix} x+2 & 2 \\ 8 & x-4 \end{bmatrix}$  একটি বর্গাকারী ম্যাট্রিক্স হলে x এর মান:

A. -6, 6 B. -4, 6 C. 6, 6 D. -4, -6

**SOWHY**  $\begin{bmatrix} x+2 & 2 \\ 8 & x-4 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow (x+2)(x-4) - 16 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 2x - 4x - 8 - 16 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 24 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 6x + 4x - 24 = 0 \Rightarrow (x-6)(x+4) = 0 \therefore x = -4, 6$

14. নিচের কোনটি বর্গাকারী ম্যাট্রিক্স?

A.  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  B.  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

C.  $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  D.  $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

15.  $A = \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$  হলে  $A^{-1} =$  কত?

A.  $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$  B.  $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$  C.  $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$  D.  $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$

**SOWHY**  $|A| = \begin{vmatrix} 8 & -5 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} = 32 - 30 = 2$

$\therefore A^{-1} = \frac{Adj(A)}{|A|} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

16. যদি  $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$  হয়, তবে  $Adj(A)$  কত হয়? [RU-A, Set-A, 2001-02]

22, A, 2018-19; DU, 96-97; RU, 15-16, 12-13, 18-19; IAU, 96-97  
A. 10 B. 1000 C. 100 D. 110

**SOWHY**  $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$  হলে  $Adj(A) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}$

$\therefore |Adj(A)| = (-2 + 12) = 10$

17.  $\begin{bmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{bmatrix}$  ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিস্তারিত না থাকলে m = কত?

A. -1, 6 B. 1, -6 C. 6, -1 D. -1, -6

**SOWHY**  $\begin{vmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow m^2 - 3m - 2m + 6 - 12 = 0$

$\Rightarrow m^2 - 5m - 6 = 0 \Rightarrow (m-6)(m+1) = 0 \therefore m = 6, -1$

18.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ ; a এর মান কত হলে নির্ণায়কটি singular হবে? [CU, 19-20]

A. 1 B. 2 C. 3  
D. 4 E. 5

**SOWHY** নির্ণায়কটি Singular হলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে

$\therefore 1(45 - 48) - 2(36 - 42) + a(32 - 35) = 0$

$\Rightarrow -3 + 12 - 3a = 0 \Rightarrow a = 3$

19.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & a & b \\ x^2 & a^2 & b^2 \end{bmatrix} = 0, x = ?$  [DU, 93, 94; CU, 92-93]

A. -a বা b B. a বা -b C. -a বা -b D. a বা b

**SOWHY**  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & a & b \\ x^2 & a^2 & b^2 \end{bmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x-a & a-b \\ x^2-a^2 & a^2-b^2 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} c_1' = c_1 - c_2 \\ c_2' = c_2 - c_3 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow (x-a)(a-b) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ x+a & a+b \end{bmatrix} = 0$

$\Rightarrow (x-a)(a-b)(a+b-x-a) = 0$

$\Rightarrow (x-a)(a-b)(b-x) = 0 \therefore x = a, b$

**Aspect Special:**

$x = a$  হলে নির্ণায়কের

১ম ও ২য় কলাম দুটি

একই হয় এবং

নির্ণায়কের মান শূন্য হয়।

অনুরূপ ভাবে  $x = b$  হলে

১ম ও ৩য় কলাম দুটি

একই হয় এবং

নির্ণায়কের মান শূন্য

হবে।  $\therefore x = a, b$



20.  $\begin{vmatrix} \alpha & \alpha & x \\ \beta & \beta & \beta \\ \theta & x & \theta \end{vmatrix} = 0$  হলে,  $x$  এর মান কৈনটি? [JU-A, Set-O, 2023-24; DU, 14-15]
- A.  $\alpha, \beta, \theta$  B.  $\alpha, \theta$   
C.  $\beta, \theta$  D.  $\alpha, \beta$

**SQWRY**  $\begin{vmatrix} \alpha & \alpha & x \\ \beta & \beta & \beta \\ \theta & x & \theta \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & \alpha & x \\ 0 & \beta & \beta \\ \theta - x & x & \theta \end{vmatrix} = 0; [c_1 = c_1 - c_2]$   
 $\Rightarrow (\theta - x)(\alpha\beta - \beta x) = 0$   
 $\Rightarrow x = \theta, \alpha$

**Aspect Special:**

যে কৈন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম অভিন্ন হলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

$x = \alpha$  বা  $x = \theta$  হলে নির্ণায়কের দুটি সারি অভিন্ন হবে এবং নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

**PRIME TEST**

01. কৈন ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোর সারিতে পরিবর্তন করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে — বলে।

- Ⓐ সারি ম্যাট্রিক্স Ⓑ কলাম ম্যাট্রিক্স  
Ⓒ বর্গ ম্যাট্রিক্স Ⓓ রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স

02.  $A = \begin{bmatrix} a & 2 & 5 \\ -2 & b & -3 \\ -5 & 3 & c \end{bmatrix}$  একটি বর্গ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে  $a, b, c$  এর মানগুলো—  
 Ⓐ  $-2, -5, 3$  Ⓑ  $0, 0, 0$  Ⓒ  $1, 1, 1$  Ⓓ  $2, 5, 3$

03. নিচের কৈনটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স?

- Ⓐ  $\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$  Ⓑ  $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$   
 Ⓒ  $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 5 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$  Ⓓ  $\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

04.  $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস কৈনটি?

- Ⓐ 5 Ⓑ 12 Ⓒ 8 Ⓓ 7

05. ম্যাট্রিক্স  $M$  এর আকার  $4 \times 3$  এবং  $N$  এর আকার  $3 \times 5$  হলে  $MN$  এর আকার কৈনটি?

- Ⓐ  $4 \times 4$  Ⓑ  $4 \times 5$  Ⓒ  $3 \times 5$  Ⓓ  $3 \times 4$

06. তিনটি ম্যাট্রিক্স  $A, B$  ও  $C$  এর order যথাক্রমে  $2 \times 3, 4 \times 2, 5 \times 4$  হলে,  $CBA$  ম্যাট্রিক্সটির order কত হবে?

- Ⓐ  $5 \times 3$  Ⓑ  $5 \times 4$  Ⓒ  $2 \times 5$  Ⓓ  $4 \times 3$

07. বর্গাকার কৈন ম্যাট্রিক্স  $A$ -এর ক্ষেত্রে যদি  $A^2 = A$  হয়, তবে সেই ম্যাট্রিক্সটি—

- Ⓐ সমঘাতি Ⓑ প্রতিসম Ⓒ পর্যায়বৃত্ত Ⓓ অভেদঘাতি

08. যদি ম্যাট্রিক্স  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$  এবং ম্যাট্রিক্স  $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  হয়, তবে ম্যাট্রিক্স  $B$  কৈনটি?

- Ⓐ  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  Ⓑ  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  Ⓒ  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  Ⓓ  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

09.  $A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} i & -1 \\ -1 & -i \end{bmatrix}$  এবং  $i = \sqrt{-1}$  হলে  $AB$  এর মান হবে—

- Ⓐ  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  Ⓑ  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  Ⓒ  $\begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$  Ⓓ  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

10.  $\begin{pmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{pmatrix}$  ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে যদি  $m$  এর মান—

- Ⓐ 6, -1 Ⓑ -4, 6 Ⓒ -6, 4 Ⓓ 1, -6

11. যদি  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  হয় তবে  $A^{-1}$

- Ⓐ  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  Ⓑ  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$  Ⓒ  $-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  Ⓓ  $-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

12. কৈন ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নেই—

- Ⓐ  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  Ⓑ  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$  Ⓒ  $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$  Ⓓ  $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

13.  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & k \end{vmatrix}$  নির্ণায়কটির মান 2;  $k$  এর মান কত?

- Ⓐ 9 Ⓑ 8 Ⓒ 7 Ⓓ 6

14.  $\begin{vmatrix} 3 & x \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$  নির্ণায়কটির মান  $(-1)$  হলে  $x$  এর মান কত?

- Ⓐ -2 Ⓑ 0z Ⓒ 2 Ⓓ 4

15.  $\begin{vmatrix} a & 1 & b+c \\ b & 1 & c+a \\ c & 1 & a+b \end{vmatrix}$  এর মান কত?

- Ⓐ  $abc$  Ⓑ 0  
Ⓒ  $abc(a+b)(b+c)(c+a)$  Ⓓ  $(a+b)(b+c)(c+a)$

16.  $\begin{vmatrix} p & 2 & q+r \\ q & 2 & r+p \\ r & 2 & p+q \end{vmatrix}$  নির্ণায়কটির মান কত?

- Ⓐ 0 Ⓑ 1 Ⓒ  $pqr$  Ⓓ  $p+q+r$

17.  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$  নির্ণায়কের 6 এর সহগুণক কৈনটি?

- Ⓐ  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$  Ⓑ  $\begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$  Ⓒ  $\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$  Ⓓ  $\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -7 & -8 \end{vmatrix}$

18. কৈন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম সদৃশ হলে, ঐ নির্ণায়কের মান হবে—

- Ⓐ 1 Ⓑ 0 Ⓒ 2 Ⓓ 3

19.  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & y+z \\ 1 & 1 & z+x \\ 1 & 1 & x+y \end{vmatrix}$  নির্ণায়কটি মান কত?

- Ⓐ  $3+x+y+z$  Ⓑ  $3(x+y+z)$  Ⓒ 3 Ⓓ কৈনটিই নয়

20.  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$  হলে, 7 উপাদানটির অনুরাশি কৈনটি?

- Ⓐ -4 Ⓑ 14 Ⓒ -15 Ⓓ 32

**☺ Answer Analysis ☺**

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | D     | ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোর সারিতে পরিবর্তন করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে বিপরীত রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স বলে।                                                                                                                                                                   |
| 02     | B     | যদি $A^T = -A$ হয় তখন তাকে বর্গ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে। যে কৈন ম্যাট্রিক্সের বর্গ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স পেতে হলে মূল্য কর্তৃক বরাবর উপাদানগুলো সব শূন্য হতে হবে। সুতরাং $a=0, b=0$ এবং $c=0$ ।                                                                                                         |
| 03     | A     | সমঘাতি ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে $A^2 = A$ হতে হয়।<br>option (A) এর ক্ষেত্রে<br>$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ |



| ক্রম | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04   | C     | ম্যাট্রিক্সের ট্রেস = প্রাইমারি কর্ণের উপাদানগুলোর যোগফল<br>$\therefore$ ট্রেস = $1 + 4 + 3 = 8$                                                                                                                                                    |
| 05   | B     | $M \rightarrow 4 \times 3$ $3 \times 5 \leftarrow N$<br>MN এর আকার $4 \times 5$                                                                                                                                                                     |
| 06   | A     | $\begin{array}{c} \text{C} \quad \text{B} \quad \text{A} \\ 5 \times 4 \quad 4 \times 2 \quad 2 \times 3 \\ \hline 5 \times 3 \end{array}$                                                                                                          |
| 07   | A     | বর্গাকার ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে $A^2 = A$ হলে A একটি সমখ্যাত ম্যাট্রিক্স।                                                                                                                                                                        |
| 08   | D     | অপশন টেস্ট করলেই হবে। অর্থাৎ যে অপশনের সাথে A ম্যাট্রিক্স গুণ করলে AB ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় সে অপশনটিই সঠিক।                                                                                                                                      |
| 09   | B     | $AB = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i & -1 \\ -1 & -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i-i & -1-i^2 \\ -i^2-1 & i-i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$                             |
| 10   | A     | $\begin{pmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{pmatrix} = 0$<br>$\Rightarrow m^2 - 3m - 2m + 6 = 0$<br>$\Rightarrow m^2 - 5m - 6 = 0$<br>$\Rightarrow (m-6)(m+1) = 0$<br>$\therefore m = 6, -1$                                                           |
| 11   | D     | $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$<br>$\therefore A^{-1} = \frac{1}{\text{Det}(A)} \text{adj}(A)$<br>$= \frac{1}{4-6} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ |
| 12   | B     | Singular matrix does not have any inverse matrix.                                                                                                                                                                                                   |
| 13   | A     | $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & k \end{vmatrix} = 2$<br>$\Rightarrow 1(2k-12) - (-3) + 1(4-2) = 2 \therefore k = 9$                                                                                                              |
| 14   | C     | $\begin{vmatrix} 3 & x \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$<br>Or, $3 - 2x = -1$ Or, $2x = 4$ Or, $x = 2$                                                                                                                                                   |
| 15   | B     | $a = 1, b = 2, c = 3$ হলে $\Delta = 0$                                                                                                                                                                                                              |
| 16   | A     | $p = 1, q = 2, r = 3$<br>$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1(6-8) - 2(6-12) + 5(4-6) = -2 + 12 - 10 = 0$                                                                                                         |
| 17   | C     | 6 এর সহপৃষ্ঠক = $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$                                                                                                                                     |
| 18   | B     | কোন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম সদৃশ হলে ঐ নির্ণায়কের মান শূন্য।                                                                                                                                                                                 |
| 19   | D     | $\begin{vmatrix} 1 & 1 & y+z \\ 3 & 1 & z+x \\ 1 & 1 & x+y \end{vmatrix} = 0$<br>[যেহেতু নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি কলামের উপাদান একই।]                                                                                                             |
| 20   | B     | 7 এর অনুরূপ = $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 4 = 14$                                                                                                                                                                          |

অধ্যায়  
০২

ভেক্টর

পণিত  
১ম পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস্                                                           | V.V.I RATE |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| TOPIC-01 | ভেক্টর রাশির যোগ-বিয়োগ এবং মান নির্ণয় সংক্রান্ত                  | ★          |
| TOPIC-02 | দুটি ভেক্টরের গুণন (ডট গুণন ও ক্রস গুণন) সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ | ★          |
| TOPIC-03 | দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ      | ★          |
| TOPIC-04 | অভিক্ষেপ এবং উপাংশ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ               | ★★         |
| TOPIC-05 | ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                        | ★★         |
| TOPIC-06 | তিনটি ভেক্টর এক সমতলীয় হওয়া সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ            | ★★★        |
| TOPIC-07 | সামান্তরাল একক ভেক্টর ও লম্ব একক ভেক্টর নির্ণয়                    | ★          |

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়ানমূহ:

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| মান নির্ণয়                                                                                                                                                             | $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ হলে A ভেক্টরের মান,<br>$ \vec{A}  = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$<br>এবং<br>$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$<br>ভেক্টর রাশির যোগ-বিয়োগ এবং গুণন নির্ণয় সংক্রান্ত | $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$<br>$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j} + (A_z - B_z)\hat{k}$<br>$\vec{A} \cdot \vec{B} =  \vec{A}   \vec{B}  \cos \theta = AB \cos \theta$<br>$= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$<br>$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{n}  \vec{A}   \vec{B}  \sin \theta = \hat{n} AB \sin \theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$ |
| দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়                                                                                                                                     | $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ $\theta$ হলে, $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$<br>ভেক্টর ও একটি অক্ষের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়                                                                       | • x অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে<br>$\theta_x = \cos^{-1} \left( \frac{\hat{i} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \right)$<br>• y অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে<br>$\theta_y = \cos^{-1} \left( \frac{\hat{j} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \right)$<br>• z অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে<br>$\theta_z = \cos^{-1} \left( \frac{\hat{k} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \right)$                                                                 |
| দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব এবং সামান্তরাল হওয়ার শর্ত সংক্রান্ত                                                                                                            | • দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হলে $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$<br>$\Rightarrow A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = 0$ হবে।<br>• দুটি ভেক্টর সামান্তরাল হলে $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ অর্থাৎ $\frac{A_x}{B_x} = \frac{A_y}{B_y} = \frac{A_z}{B_z}$ হবে।                                                                                                                                                                                                                                             |
| $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত                                                                                                              | • সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু ধরে ক্ষেত্রফল = $ \vec{A} \times \vec{B} $<br>• সামান্তরিকের কর্ণ ধরে ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}  \vec{A} \times \vec{B} $<br>• ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু ধরে ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}  \vec{A} \times \vec{B} $<br>• রম্বসের কর্ণ ধরে ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}  \vec{A} \times \vec{B} $                                                                                                                                                                         |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সমান্তরাল ও লম্ব একক ভেক্টর সংক্রান্ত                   | $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের লম্বিক বরাবর একক ভেক্টর<br>$\hat{n} = \frac{\vec{A} + \vec{B}}{ \vec{A} + \vec{B} }$<br>$\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের যেই সমতলে অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর, $\hat{n} = \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{ \vec{A} \times \vec{B} }$                                                                                                                                  |
| অভিকোণ ও উপাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত                        | $\vec{A}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের অভিকোণ $B \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{A} }$<br>$\vec{A}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের উপাংশ $\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{A} }$<br>$\vec{B}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{A}$ ভেক্টরের অভিকোণ $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{B} }$<br>$\vec{B}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{A}$ ভেক্টরের উপাংশ $\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{B} }$    |
| তিনটি ভেক্টর এক সমতলীয় হওয়া সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ | $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ , $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$<br>এবং $\vec{C} = C_x \hat{i} + C_y \hat{j} + C_z \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয়ের একটি সমতলে থাকার শর্ত: $\begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix} = 0$<br>$\vec{A}(\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C}(\vec{A} \times \vec{B}) = 0$ হয়। |

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী প্রশ্নকল্যাণ

01.  $\vec{a} = t\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$  এবং  $|\vec{a}| = 7$  হলে  $t$  এর মান কত? [JU. 14-15]  
 A. 4 B. -3  
 C. 6 D.  $\frac{3}{4}$
- [SOWHY]**  $|\vec{a}| = \sqrt{t^2 + 2^2 + 3^2} = 7$   
 $\Rightarrow t^2 + 13 = 49 \Rightarrow t^2 = 36 \Rightarrow t = 6$
02.  $\vec{OA} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$  এবং  $\vec{OB} = 7\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$   $\vec{AB}$  কত? [CU. 18-19]  
 A.  $12\hat{i} - 7\hat{j} + 6\hat{k}$  B.  $-2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$   
 C.  $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  D.  $12\hat{i} - 3\hat{j} - 14\hat{k}$
- [SOWHY]**  $\vec{OA} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$   
 $\vec{OB} = 7\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$ ;  $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$
03. ভেক্টর  $\vec{OA} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$  এবং ভেক্টর  $\vec{OB} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  হলে,  $|\vec{AB}|$  এর মান- [JU. 09-10; DU-7Clg. 19-20; CU-F. 12-13]  
 A.  $4\sqrt{19}$  B. 2  
 C.  $2\sqrt{19}$  D.  $4\sqrt{29}$
04.  $\vec{P} = a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$  এবং  $\vec{Q} = 2a\hat{i} - a\hat{j} - 4\hat{k}$  পরস্পর লম্ব হলে,  $a$ -এর মান কত? [DU-A. 22-23; RU. Astrazenecca, Set-1, 20-21; CU-A, Set-3, 20-21; CU. 16-17, 15-16, 11-12; MBSTU. 11-12; BSMRSTU. 11-12; PUST 11-12; NSTU. 19-20]  
 A. 1, 2 B. -1, 2 C. 1, -2 D. -1, -2
- [SOWHY]**  $\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0 \Rightarrow a \cdot 2a + (-2)(-a) + 1(-4) = 0$   
 $\Rightarrow 2a^2 + 2a - 4 = 0 \Rightarrow a^2 + a - 2 = 0$   
 $\Rightarrow a^2 + 2a - a - 2 = 0 \Rightarrow a(a+2) - 1(a+2) = 0$   
 $\Rightarrow (a-1)(a+2) = 0 \Rightarrow a = 1, -2$

05.  $\vec{P} = (2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k})$  এবং  $\vec{Q} = (6\hat{i} - \hat{j} + m\hat{k})$  ভেক্টরদ্বয়ের জন্য  $m$  এর মান কত হলে  $\vec{P}$  এবং  $\vec{Q}$  পরস্পর সমান্তরাল হবে? [RU. 06, 10-11]  
 A.  $m = 3$  B.  $m = -9$  C.  $m = -3$  D.  $m = 9$
- [SOWHY]** দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হলে  $\frac{P_x}{Q_x} = \frac{P_y}{Q_y} = \frac{P_z}{Q_z}$   
 $\therefore \frac{2}{6} = \frac{-1}{-1} = \frac{3}{m} \Rightarrow m = 9$
06. 5 একক এবং 6 একক মানের দুটি ভেক্টর কোন কোন মানের জন্য কোণ নির্দেশিত? [RU. 07-08]  
 A. 30° B. 20° C. 25° D. 35°
- [SOWHY]**  $A \cdot B = AB \cos \theta = 5 \cdot 6 \cdot \cos \theta = 15$
07. মান শূন্য নয় এমন দুটি ভেক্টরের ভিত্তি থাকলে শূন্য ভেক্টর নির্দেশিত? [RU. 11-12]  
 A. নয় B. সমান্তরাল C. লম্ব D. কোনোটিই নয়
- [SOWHY]** ভেক্টরদ্বয়ের পরস্পর লম্ব হলে ভিত্তি থাকলে শূন্য ভেক্টর নির্দেশিত হয়।
08.  $\vec{P} = 6\hat{i}$  এবং  $\vec{Q} = 7\hat{j}$  হলে  $\vec{P}$  ও  $\vec{Q}$  এর মধ্যবর্তী কোণ কত? [RU. A. 3, 4; DU. 19-20]  
 A.  $180^\circ$  B.  $120^\circ$  C.  $90^\circ$  D.  $60^\circ$
- [SOWHY]**  $\vec{P} = 6\hat{i}$  ও  $\vec{Q} = 7\hat{j}$   
 $\cos \theta = \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{|\vec{P}| |\vec{Q}|} = \frac{6\hat{i} \cdot 7\hat{j}}{6 \cdot 7} \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0) \Rightarrow \theta = 90^\circ$
09.  $a\hat{i} - 3a\hat{j} - 4\hat{k}$  এবং  $a\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$  ভেক্টরদ্বয়ের পরস্পর লম্ব হলে  $a$  এর মান- [RU. A. 19-20]  
 A. 1, 1 B. 2, 3 C. 1, 4 D. 2, 4
- [SOWHY]** ভেক্টরদ্বয়ের পরস্পর লম্ব হলে  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$   
 $\Rightarrow a^2 - 4a - 2a + 8 = 0 \Rightarrow a(a-6) - 2(a-4) = 0 \Rightarrow a = 4, 2$
10.  $\vec{A} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ,  $\vec{B} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$  এবং  $\vec{C} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$  হলে,  $\vec{B} \cdot (\vec{C} + \vec{A})$  এর মান কত? [RU. 09-10]  
 A. 5 B. 3 C. 1 D. 0
- [SOWHY]**  $\vec{C} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$   
 $\vec{A} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ;  $\vec{C} + \vec{A} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k}$   
 $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ;  $\vec{B} \cdot (\vec{C} + \vec{A}) = 8 - 4 - 4 = 0$
11.  $2\hat{i} + 2\hat{j}$  ভেক্টরটি  $x$ -অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে করে? [RU. A. 30-31]  
 A.  $30^\circ$  B.  $45^\circ$  C.  $60^\circ$  D.  $135^\circ$
- [SOWHY]**  $x$ -অক্ষের সাথে উপর কোণ,  $= \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = \cos^{-1} \frac{2}{2\sqrt{2}} = 45^\circ$
12. দুটি ভেক্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  এর যেকোনো স্থানের ভিত্তি কখনো কখনো ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ। [RU. 09-10]  
 A. দৃশ্যকোণ B. স্থলকোণ C. সমকোণ D. কোনটিই নয়
- [SOWHY]**  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cos \theta$  বা  $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ab}$   
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  হলে  $\cos \theta = 0 \therefore$  দৃশ্যকোণ।
13.  $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$  ভেক্টরটি  $y$ -অক্ষের সাথে যে কোণ করে করে তার মান হলে- [RU. 16-17; KU. 12-13]  
 A.  $\cos^{-1}(\frac{2}{3})$  B.  $\cos^{-1}(-\frac{1}{3})$  C.  $\cos^{-1}(\frac{-2}{3})$  D.  $\cos^{-1}(\frac{1}{3})$
- [SOWHY]**  $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$  ভেক্টরটি  $y$ -অক্ষের সাথে  $\theta$  কোণ করে করে,  
 $\theta = \cos^{-1} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$  এর সহপা  $= \cos^{-1} \frac{-1}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \cos^{-1}(\frac{-1}{3})$



14. যদি  $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + p\hat{k}$  এবং  $\vec{B} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$  হয় এবং  $(\vec{A} + \vec{B})$  এবং

$(\vec{A} - \vec{B})$  ভেক্টর দুটির পরস্পর লম্ব হলে নিচের কোনটি সত্য? [CU-D, Set-2, 20-21]

- A.  $p = -3$  B.  $p = 2$  C.  $p = 9$  D.  $p = -5$

**[SOWHY]**  $|\vec{A}| = \sqrt{1+4+p^2} = \sqrt{p^2+5}$

$|\vec{B}| = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$

যেহেতু  $(\vec{A} + \vec{B}) \perp (\vec{A} - \vec{B}) \therefore (\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{B}) = 0$

$\Rightarrow |\vec{A}|^2 - |\vec{B}|^2 = 0 \Rightarrow (p^2+5) - 14 = 0 \therefore p = \pm 3$

15.  $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  ভেক্টরের উপর  $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  ভেক্টরের অভিক্ষেপ-  
[RU. 16-17; DU. 09-10; KU. 13-14; CU. 10-11; JUST-A. 15-16]

- A.  $\frac{8}{7}$  B.  $\frac{7}{8}$  C.  $\frac{8}{5}$  D.  $\frac{5}{8}$

**[SOWHY]** অভিক্ষেপ =  $\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{6.2 - 3.2 + 2.1}{\sqrt{6^2 + (-3)^2 + 2^2}} = \frac{8}{7}$

16.  $\vec{B} = 2\hat{i} + 10\hat{j} - 11\hat{k}$  ভেক্টর বরাবর  $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  ভেক্টরের উপাংশের মান?  
[CU. 07-08; MBSTU. 13-14]

- A.  $\frac{13}{15}$  B.  $\frac{12}{15}$  C.  $\frac{13}{14}$  D.  $\frac{12}{14}$

**[SOWHY]**  $\vec{B}$  বরাবর  $\vec{A}$  ভেক্টরের উপাংশ

$= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{4 + 20 - 11}{\sqrt{(2)^2 + (10)^2 + (-11)^2}} = \frac{13}{15}$

17.  $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  ভেক্টর বরাবর  $\vec{b} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$  ভেক্টরের অংশক-  
[IU. 17-18]

- A.  $\frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$  B.  $\frac{1}{6}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$   
C.  $\frac{1}{9}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$  D.  $\frac{1}{12}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$

**[SOWHY]**  $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ;  $\vec{b} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$

$\vec{a}$  ভেক্টর বরাবর  $\vec{b}$  ভেক্টরের অংশক =  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \cdot \hat{a}$

$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{(6-3-2)}{\sqrt{9}} \cdot \frac{2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{9}} = \frac{1}{9}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$

18.  $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  ভেক্টর বরাবর  $\vec{b} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  ভেক্টরের উপাংশ হল- [KU. 14-15]

- A.  $\vec{a}$  B.  $\frac{1}{2}\vec{a}$  C.  $\frac{1}{3}\vec{a}$  D. কোনটিই নয়

**[SOWHY]** উপাংশ =  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \cdot \hat{a} = \frac{10-3-4}{\sqrt{4+1+4}} \cdot \hat{a} = \frac{3}{3} \cdot \hat{a} = \vec{a}$

19. কোন সামান্তরিকের কর্ণদ্বয়  $3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  এবং  $\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$  দ্বারা সৃষ্টিত হলে সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [RU. 16-17]

- A.  $5\sqrt{3}$  B.  $4\sqrt{3}$  C.  $3\sqrt{3}$  D.  $2\sqrt{3}$

**[SOWHY]** যদি,  $\vec{A} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ;  $\vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$

$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(4-6) - \hat{j}(12+2) + \hat{k}(-9-1) = -2\hat{i} - 14\hat{j} - 10\hat{k}$

$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{(-2)^2 + (-14)^2 + (-10)^2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$

$\vec{A}$  ও  $\vec{B}$  ভেক্টর দুটি সামান্তরিকের কর্ণ হলে সামান্তরিক

এর ক্ষেত্রফল =  $\frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}| = \frac{1}{2} \times 10\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

20. তিনটি ভেক্টর  $\vec{A}$ ,  $\vec{B}$  এবং  $\vec{C}$  সমতলীয় হওয়ার শর্ত হল- [KU. 17-18]

A.  $\vec{A}(\vec{B} \times \vec{C}) = 0$  B.  $\vec{A} \cdot \vec{B} \cdot \vec{C} = 0$  C.  $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$  D.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \times \vec{C} = 0$

**[SOWHY]** তিনটি ভেক্টর সমতলীয় হওয়ার শর্ত হচ্ছে যেকোন দুটি ভেক্টর দুটির লম্বের দিক তৃতীয় ভেক্টরের দিকের সমান্তরাল হয়।

21.  $a\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k}$  ভেক্টরটি একক ভেক্টর হলে  $a$  এর মান কত? [KU. 14-15]

- A.  $\pm \frac{6}{5}$  B.  $\pm \frac{6}{\sqrt{23}}$  C.  $\pm \frac{\sqrt{11}}{6}$  D.  $\pm \frac{\sqrt{23}}{6}$

**[SOWHY]**  $a\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k}$  একটি একক ভেক্টর,

$\therefore \sqrt{a^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = 1 \Rightarrow a^2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = 1 \Rightarrow a^2 = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{9}$

$\Rightarrow a^2 = \frac{36-9-4}{36} = \frac{23}{36} \therefore a = \pm \frac{\sqrt{23}}{6}$

### PRIME TEST

01.  $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  ভেক্টরটির  $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j}$  ভেক্টর অভিক্ষেপের অংশক কত?

- A. 3 B. 6  
C.  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  D.  $\sqrt{\frac{7}{2}}$

02. যে ভেক্টরের মডুলাস ও দিক স্থির অথচ অবস্থান স্থির নয় তাকে বলা হয়-

- A. সমান ভেক্টর B. বিপরীত ভেক্টর  
C. শূন্য ভেক্টর D. মুক্ত ভেক্টর

03. ভেক্টর  $\vec{OA} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$  এবং ভেক্টর  $\vec{OB} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  হলে  $|\vec{AB}|$  এর মান-

- A.  $4\sqrt{19}$  B. 2  
C.  $2\sqrt{19}$  D.  $4\sqrt{29}$

04.  $\vec{OA} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$  এবং  $\vec{OB} = 7\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$  হলে  $\vec{AB}$  কত?

- A.  $12\hat{i} - 7\hat{j} + 6\hat{k}$  B.  $-2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$   
C.  $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  D.  $12\hat{i} - 3\hat{j} - 14\hat{k}$

05. ভেক্টর  $\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \sqrt{11}\hat{k}$  এর মান (magnitude) কত?

- A. 10 B. 18  
C. 12 D. 6

06. তিনটি ভেক্টর  $2\hat{i} - 3\hat{j}$ ,  $-9\hat{i} - 5\hat{j}$  এবং  $4\hat{i} + 8\hat{j}$  এর লম্বি ভেক্টরের দিক কোনটি?

- A.  $+x$  বরাবর B.  $-x$  বরাবর  
C.  $-y$  বরাবর D.  $+y$  বরাবর

07.  $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$  এবং  $\vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$  হলে  $\vec{A} \cdot \vec{B} = ?$

- A. 11 B. 12  
C. 13 D. 14

08. ভেক্টর  $\vec{u} = \hat{i} + \hat{j}$  ও  $\vec{v} = \hat{j} + \hat{k}$  এর অন্তর্ভুক্ত কোণ-

- A.  $\cos^{-1}(1/\sqrt{3})$  B.  $\cos^{-1}(1/3)$   
C.  $\cos^{-1}(1/2)$  D.  $\cos^{-1}(1/\sqrt{2})$

09. যদি ভেক্টর  $\vec{A} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + \sqrt{2}\hat{k}$  হয় তাহলে  $x$  অক্ষ এবং ভেক্টরটির মধ্যবর্তী কোণ কত?

- A.  $60^\circ$  B.  $30^\circ$   
C.  $90^\circ$  D.  $0^\circ$

10.  $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$  এবং  $4\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$  ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

- A.  $45^\circ$  B.  $90^\circ$  C.  $180^\circ$  D.  $0^\circ$



11.  $\vec{p}$ -এর মান কত হলে  $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$  এবং  $2\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$  এই দুইটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হবে।  
 (A)  $(-2, 1)$  (B)  $(2, 3)$   
 (C)  $(-3, 5)$  (D)  $(4, 6)$
12.  $\lambda$ -এর কোন মানের জন্য  $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ,  $\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$  এবং  $4\hat{i} - \hat{j} + \lambda\hat{k}$  ভেক্টর তিনটি সমতলীয় হবে?  
 (A) 5 (B) 3 (C)  $\frac{5}{3}$  (D)  $\frac{3}{5}$
13.  $\vec{b} = 6\hat{i} + 7\hat{j} - 6\hat{k}$  ভেক্টর বরাবর  $\vec{a} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$  ভেক্টরের উপাংশ হলো-  
 (A)  $\frac{8}{121}\vec{b}$  (B)  $-\frac{8}{121}\vec{b}$  (C)  $\frac{8}{121}\vec{a}$  (D)  $-\frac{8}{121}\vec{a}$
14.  $\vec{P} = 5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  ভেক্টরের উপর  $\vec{Q} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  ভেক্টরের অভিক্ষেপ-  
 (A)  $\frac{5}{\sqrt{38}}$  (B)  $\frac{3}{\sqrt{38}}$  (C)  $\frac{2}{\sqrt{38}}$  (D)  $\frac{1}{\sqrt{38}}$
15.  $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  বরাবর একক ভেক্টর কোনটি?  
 (A)  $\frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$  (B)  $\frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{3}$  (C)  $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  (D)  $\frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$
16.  $\vec{a} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  ও  $\vec{b} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$  ভেক্টর দুইটি যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু তার ক্ষেত্রফল হবে-  
 (A)  $3\sqrt{3}$  sq units (B)  $6\sqrt{3}$  sq units (C)  $6\sqrt{6}$  sq units (D)  $3\sqrt{6}$  sq units
17.  $\vec{a}$  এর মান কত হবে  $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + a\hat{k}$  ভেক্টরটি একটি একক ভেক্টর হবে-  
 (A)  $\pm \frac{2}{3}$  (B)  $\pm \frac{\sqrt{15}}{6}$  (C)  $\pm \frac{7}{6}$  (D)  $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$
18. অতীকৃত কোণের মান  $\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{13}}{2\sqrt{7}}\right)$  হলে তা নিচের কোন ভেক্টরদ্বয়ের জন্য সত্য?  
 (A)  $(2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k})$  এবং  $(\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k})$  (B)  $(2\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k})$  এবং  $(\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k})$   
 (C)  $(2\hat{i} - 3\hat{j} - 3\hat{k})$  এবং  $(\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k})$  (D)  $(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$  এবং  $(\hat{i} - 4\hat{j} - 3\hat{k})$
19.  $\hat{i} \times \hat{k}$  = কোনটি?  
 (A)  $\hat{j}$  (B)  $\hat{i}$  (C)  $-\hat{k}$  (D)  $-\hat{j}$
20. ABC ত্রিভুজের BC, CA, এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দুগুলো যথাক্রমে D, E এবং F হলে-  
 (A)  $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BC}$  (B)  $\vec{DA} = \vec{DF} + \vec{DE}$   
 (C)  $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$  (D)  $\vec{AD} = \vec{BE} + \vec{CF}$

☺ Answer Analysis ☺


| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | C     | $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j}$<br>$\therefore \vec{A}$ ভেক্টরের $\vec{B}$ ভেক্টরের অভিমুখে অংশক = $\frac{1.1 + 2.1 + 0.1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$ |
| 02     | D     | যে ভেক্টরের মডুলাস ও দিক স্থির অথচ অবস্থান স্থির নয় তাকে মুক্ত ভেক্টর বলে।                                                                                                                                   |
| 03     | C     |                                                                                                                                                                                                               |
| 04     | C     | $\vec{OA} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ ; $\vec{OB} = 7\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$<br>$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$                                                |
| 05     | D     | $ \vec{r}  = \sqrt{(3)^2 + (4)^2 + (\sqrt{11})^2} = \sqrt{36} = 6$                                                                                                                                            |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06     | B     | লব্ধি ভেক্টর = $2\hat{i} - 3\hat{j} - 9\hat{i} - 5\hat{j} + 4\hat{i} + 8\hat{j} = -3\hat{i} (-x$ বরাবর)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07     | D     | $\vec{A} \cdot \vec{B} = 3 + 6 + 5 = 14$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08     | C     | অতীকৃত কোণ $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{uv}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$                                                                                                                                                                                                |
| 09     | A     | $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{3^2 + 5^2 + \sqrt{2^2}}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 60^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10     | D     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11     | A     | ভেক্টর দ্বয় পরস্পর লম্ব। তাই তাদের ডটগুণন = শূন্য<br>$\therefore 2p^2 + 2p - 4 = 0$<br>বা, $p^2 + p - 2 = 0$ বা, $p^2 + 2p - p - 2 = 0$<br>বা, $p(p + 2) - 1(p + 2) = 0$ বা, $(p + 2)(p - 1) = 0 \therefore p = 1, -2$                                                                                                                                                    |
| 12     | D     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13     | B     | $\vec{b} = 6\hat{i} + 7\hat{j} - 6\hat{k}$ ; $\vec{a} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$<br>$\vec{b}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{a}$ ভেক্টরের উপাংশ<br>$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} } \cdot \frac{\vec{b}}{ \vec{b} } = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} ^2} \cdot \vec{b} = \frac{-8}{\sqrt{121}} \cdot \frac{\vec{b}}{\sqrt{121}} = \frac{-8}{121} \cdot \vec{b}$ |
| 14     | B     | $Q \cos \theta = \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{P} = \frac{10 - 3 - 4}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + 2^2}} = \frac{3}{\sqrt{38}}$                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15     | D     | ধরি, $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ; $ \vec{A}  = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$<br>$\therefore \hat{a} = \frac{\vec{A}}{ \vec{A} } = \frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$                                                                                                                                                                       |
| 16     | C     | $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix}$<br>$= \hat{i}(-12 + 6) - \hat{j}(16 - 4) + \hat{k}(-12 + 6) = -6\hat{i} - 12\hat{j} - 6\hat{k}$<br>$\therefore$ ক্ষেত্রফল = $ \vec{a} \times \vec{b}  = \sqrt{36 + 144 + 36} = \sqrt{216}$<br>$= \sqrt{36 \times 6} = 6\sqrt{6}$ sq. units                |
| 17     | D     | প্রদত্ত ভেক্টরের মান = $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + a^2}$<br>শর্তমতে, $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + a^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + a^2 = 1 \therefore a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                                                                                                             |
| 18     | A     | অপসন (A) হতে,<br>$\cos \theta = \frac{(2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}) \cdot (\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k})}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 4^2 + 3^2}} = \frac{2 - 12 - 3}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{26}}$<br>$\therefore \theta = \cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{13}}{2\sqrt{7}}\right)$                                                                              |
| 19     | D     | $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20     | B     | $2\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$<br>$\Rightarrow \vec{AD} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC} = \vec{AF} + \vec{AE}$<br>$\Rightarrow \vec{DA} = \vec{FA} + \vec{EA} = \vec{DE} + \vec{DF}$<br>$\therefore \vec{DA} = \vec{DE} + \vec{DF}$                                                                                                                         |



11. যদি  $A(2, 5)$ ,  $B(5, 6)$  এবং  $D(6, 7)$  বিন্দুসমূহ  $ABCD$  চতুর্ভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু হয়, তবে  $C$  এর স্থানাঙ্ক কোনটি? [BU-C, Quarter-2, 22-23; DU, 17-18; KU, 14-15]

A. (8, 9) B. (9, 8) C. (4, 6) D. (6, 4)



সর্তমতে,  $2 + x = 6 + 5$

$$\Rightarrow x = 9 \therefore (x, y) = (9, 8)$$

12.  $x$ -অক্ষ এবং  $(2, 2)$  বিন্দু হতে  $(5, k)$  বিন্দুটির দূরত্ব সমান হলে  $k$  এর মান কত? [JU-A, Set-F, 2021-22]

A. 4/13 B. 4/7 C. 7/4 D. 13/4

[SOWhy]  $x$ -অক্ষ হতে  $(5, k)$  এর দূরত্ব =  $|k|$

$$(2, 2) \text{ বিন্দু হতে } (5, k) \text{ এর দূরত্ব} = \sqrt{(5-2)^2 + (k-2)^2}$$

$$= \sqrt{9 + k^2 - 4k + 4}$$

$$\text{সর্তমতে, } |k| = \sqrt{9 + k^2 - 4k + 4} \Rightarrow k^2 = 9 + k^2 - 4k + 4 \Rightarrow 13/4 = k$$

13.  $(5, 6)$  বিন্দু হতে 4 একক দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুর কোটি 6 হলে ভূজ কত? [CU-A, Set-1, 20-21]

A. 9 অথবা 1 B. 1 অথবা 2 C. 9 অথবা 2 D. 7 অথবা 1

[SOWhy]  $(5, 6)$  বিন্দু হতে 4 একক দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুর কোটি 6 হলে, ভূজ =  $5 \pm 4 = 9, 1$

14. ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের সমদ্বিখলকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে কি বলা হয়? [KU, 16-17]

A. অধকেন্দ্র B. পরিকেন্দ্র C. ভরকেন্দ্র D. লম্বকেন্দ্র

[SOWhy] ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের সমদ্বিখলকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে পরিকেন্দ্র বলে।

15.  $y = -5x + 9$  রেখার সাথে লম্ব রেখার ঢাল কোনটি? [JU-A, Set-M, 2023-24; DU, 14-15; JU-A, Set-S, 22-23]

A. 5 B. -5 C.  $\frac{1}{5}$  D.  $-\frac{1}{5}$

[SOWhy]  $y = -5x + 9$  রেখার ঢাল  $m = -5$

$$\therefore \text{লম্ব রেখার ঢাল} = -\frac{1}{m} = \frac{1}{5}$$

16.  $(2, 1)$  এবং  $(5, 3)$  বিন্দুগামী সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল কোনটি? [RU-C, বসুনা-৩, 2023-24]

A.  $\frac{2}{3}$  B.  $-\frac{3}{2}$  C.  $\frac{3}{5}$  D.  $\frac{5}{3}$

[SOWhy]  $(2, 1)$  এবং  $(5, 3)$  বিন্দুগামী রেখার ঢাল =  $\frac{3-1}{5-2} = \frac{2}{3}$

$$\therefore \text{সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল} = \frac{2}{3}$$

17.  $5x + 4y - 6 = 0$  এবং  $2x - ky + 6 = 0$  সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হলে,  $k$ -এর মান কোনটি? [JU-A, Set-N, 22-23]

A.  $-\frac{2}{5}$  B.  $-\frac{8}{5}$  C.  $\frac{5}{2}$  D.  $\frac{2}{5}$

[SOWhy] দুইটি রেখা পরস্পর লম্ব হলে  $m_1 m_2 = -1$

$$\Rightarrow \left(-\frac{5}{4}\right) \frac{2}{k} = -1 \Rightarrow k = \frac{5}{2}$$

18.  $k$ -এর মান কত হলে,  $3x - 4y + 1 = 0$  এবং  $6x + ky + 2 = 0$  রেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল হবে? [JU-D, 19-20]

A.  $-\frac{9}{2}$  B. -8 C.  $\frac{9}{2}$  D. 8

[SOWhy] দুইটি রেখা সমান্তরাল হলে  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$  হবে,  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

$$\Rightarrow \frac{3}{6} = \frac{-4}{k} \Rightarrow k = -8$$

19.  $2x + 3y + 4 = 0$  এবং  $x + my + 4 = 0$  দ্বারা নির্দেশিত দুটি সরল রেখা পরস্পর লম্ব হলে  $m$  এর মান- [CU-C, 15-16]

A.  $-\frac{2}{3}$  B.  $-\frac{3}{2}$  C.  $\frac{3}{2}$

D.  $\frac{2}{3}$  E.  $-\frac{1}{3}$

[SOWhy] দুইটি রেখা লম্ব হলে  $m_1 \times m_2 = -1$  হবে

$$\therefore -\frac{2}{3} \times -\frac{1}{m} = -1 \therefore m = -\frac{2}{3}$$

20.  $3x + 7y - 2 = 0$  সরলরেখার উপর লম্ব এবং  $(2, 1)$  বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ- [DU, 11-12, 07-08; JU, 07-08; RU, 18-19; NSTU, 19-20]

A.  $3x + 7y - 13 = 0$  B.  $7x - 3y - 11 = 0$   
C.  $7x + 3y - 17 = 0$  D.  $7x - 3y - 2 = 0$

[SOWhy]  $3x + 7y - 2 = 0$  রেখার ঢাল =  $-\frac{3}{7}$

$$\therefore 3x + 7y - 2 = 0 \text{ রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল} = \frac{7}{3}$$

$$\therefore \text{লম্ব রেখার সমীকরণ: } y - 1 = \frac{7}{3}(x - 2) \Rightarrow 3y - 3 = 7x - 14 \therefore 7x - 3y - 11 = 0$$

21.  $2x - 6y + 4 = 0$  রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ নিচের কোনটি যা  $(1, 1)$  বিন্দুগামী? [JU-A, Set-O, 2021-22; JU, 17-18]

A.  $3x + y - 4 = 0$  B.  $3x - y + 4 = 0$   
C.  $6x + 2y - 4 = 0$  D.  $6x + 6y + 4 = 0$

[SOWhy]  $2x - 6y + 4 = 0$  রেখার লম্বরেখা

$$6x + 2y + K = 0 \text{ যা } (1, 1) \text{ বিন্দুগামী } \therefore 6 + 2 + K = 0 \Rightarrow K = -8$$

$$\therefore \text{সমীকরণ, } 6x + 2y - 8 = 0 \Rightarrow 3x + y - 4 = 0$$

22. মূলবিন্দু হতে কোন সরলরেখার লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক এবং অক্ষের সাথে ঐ লম্বের নতি  $120^\circ$  হলে ঐ সরলরেখার সমীকরণ হবে- [RU, 11-12]

A.  $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$  B.  $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$

C.  $x - \sqrt{3}y + 5 = 0$  D.  $x - \sqrt{3}xy + 8 = 0$

[SOWhy]  $x \cos 120^\circ + y \sin 120^\circ = 4$

$$\Rightarrow x \left(-\frac{1}{2}\right) + y \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4 \Rightarrow -x + \sqrt{3}y = 8 \Rightarrow x - \sqrt{3}y + 8 = 0$$

23. অক্ষের দ্বারা  $4x + 3y = 12$  সরলরেখার ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য কোনটি? [JU-A, Set-H, 22-23; DU, 03-04; JU, 09-10]

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

$$[SOWhy] 4x + 3y = 12 \Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$$

$$\therefore \text{ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ একক}$$

24.  $2y - x - 6 = 0$  রেখাটির দ্বারা  $y$  অক্ষের ছেদাংশ কত? [RU, 09-10]

A. 6 B. 7 C. 3 D. 4

[SOWhy]  $2y - x - 6 = 0 \Rightarrow -x + 2y = 6$

$$\Rightarrow \frac{x}{-6} + \frac{y}{3} = 1 \therefore y \text{ অক্ষের ছেদাংশ} = 3$$

25.  $A(2, 1)$  ও  $B(5, 2)$  বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখলকের সমীকরণ কোনটি? [RU-C, Jupiter-1, Set-1, 2021-22]

A.  $3x + 2y = 12$  B.  $3x + y = 12$   
C.  $6x + 2y = 12$  D.  $3x - y = 12$

[SOWhy] AB এর মধ্যবিন্দু  $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$


$$AB \text{ এর সমীকরণ, } y - 1 = \frac{1-2}{2-5}(x - 2) \Rightarrow y - 1 = \frac{1}{3}(x - 2)$$

$$\Rightarrow x - 3y = -1 \therefore \text{লম্বদ্বিখলকের সমীকরণ } 3x + y = 3 \left(\frac{7}{2}\right) + \frac{3}{2} \Rightarrow 3x + y = 12$$



11. যদি  $A(2, 5)$ ,  $B(5, 6)$  এবং  $D(6, 7)$  বিন্দুদ্বয় ABCD দ্ব্যন্থের তিনটি শীর্ষবিন্দু হয়, তবে C এর স্থানাঙ্ক কোনটি?  
[RU-C, Quartz-2, 22-23; DU, 17-18; KU, 14-15]

A. (8, 9) B. (9, 8) C. (4, 6) D. (6, 4)



শর্তমতে,  $2 + x = 6 + 5$

$$\Rightarrow x = 9 \therefore (x, y) = (9, 8)$$

থাকবে,

$$5 + y = 6 + 7 \Rightarrow y = 8$$

12. x-অক্ষ এবং  $(2, 2)$  বিন্দু হতে  $(5, k)$  বিন্দুটির দূরত্ব সমান হলে k এর মান কত?  
[JU-A, Set-F, 2021-22]

A. 4/13 B. 4/7 C. 7/4 D. 13/4

[SOL] x অক্ষ হতে  $(5, k)$  এর দূরত্ব =  $|k|$

$$(2, 2) \text{ বিন্দু হতে } (5, k) \text{ এর দূরত্ব} = \sqrt{(5-2)^2 + (k-2)^2}$$

$$= \sqrt{9 + k^2 - 4k + 4}$$

$$\text{শর্তমতে, } |k| = \sqrt{9 + k^2 - 4k + 4} \Rightarrow k^2 = 9 + k^2 - 4k + 4 \Rightarrow 13/4 = k$$

13.  $(5, 6)$  বিন্দু হতে 4 একক দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুর কোটি 6 হলে ভূজ কত?  
[CU-A, Set-1, 20-21]

A. 9 অথবা 1 B. 1 অথবা 2 C. 9 অথবা 2 D. 7 অথবা 1

[SOL]  $(5, 6)$  বিন্দু হতে 4 একক দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুর কোটি 6 হলে, ভূজ =  $5 \pm 4 = 9, 1$

14. ত্রিভুজের বাহুরাঙ্কের সমদ্বিখলকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে কি বলা হয়?  
[KU, 16-17]

A. অভ্যাকেন্দ্র B. পরিকেন্দ্র C. ভরকেন্দ্র D. লম্বকেন্দ্র

[SOL] ত্রিভুজের বাহুরাঙ্কের সমদ্বিখলকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে পরিকেন্দ্র বলে।

15.  $y = -5x + 9$  রেখার সাথে লম্ব রেখার ঢাল কোনটি?  
[JU-A, Set-M, 2023-24; DU, 14-15; JU-A, Set-S, 22-23]

A. 5 B. -5 C.  $\frac{1}{5}$  D.  $-\frac{1}{5}$

[SOL]  $y = -5x + 9$  রেখার ঢাল  $m = -5$

$$\therefore \text{লম্ব রেখার ঢাল} = -\frac{1}{m} = \frac{1}{5}$$

16.  $(2, 1)$  এবং  $(5, 3)$  বিন্দুদ্বয়ী সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল কোনটি?  
[RU-C, যশনা-৩, 2023-24]

A.  $\frac{2}{3}$  B.  $-\frac{3}{2}$  C.  $\frac{3}{5}$  D.  $\frac{5}{3}$

[SOL]  $(2, 1)$  এবং  $(5, 3)$  বিন্দুদ্বয়ী রেখার ঢাল =  $\frac{1-3}{2-5}$

$$\therefore \text{সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল} = \frac{2}{3}$$

17.  $5x + 4y - 6 = 0$  এবং  $2x - ky + 6 = 0$  সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হলে, k-এর মান কোনটি?  
[JU-A, Set-N, 22-23]

A.  $-\frac{2}{5}$  B.  $-\frac{8}{5}$  C.  $\frac{5}{2}$  D.  $\frac{2}{5}$

[SOL] দুইটি রেখা পরস্পর লম্ব হলে  $m_1 m_2 = -1$

$$\Rightarrow \left(-\frac{5}{4}\right) \frac{2}{k} = -1 \Rightarrow k = \frac{5}{2}$$

18. k-এর মান কত হলে,  $3x - 4y + 1 = 0$  এবং  $6x + ky + 2 = 0$  রেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল হবে?  
[JU-D, 19-20]

A.  $-\frac{9}{2}$  B. -8 C.  $\frac{9}{2}$  D. 8

[SOL] দুইটি রেখা সমান্তরাল হলে  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$  হবে,  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

$$\Rightarrow \frac{3}{6} = \frac{-4}{k} \Rightarrow k = -8$$

19.  $2x + 3y + 4 = 0$  এবং  $x + my + 4 = 0$  দ্বারা নির্দেশিত দুটি সরল রেখা পরস্পর লম্ব হলে m এর মান-  
[CU-C, 15-16]

A.  $-\frac{2}{3}$  B.  $-\frac{3}{2}$  C.  $\frac{3}{2}$   
D.  $\frac{2}{3}$  E.  $-\frac{1}{3}$

[SOL] দুইটি রেখা লম্ব হলে  $m_1 \times m_2 = -1$  হবে

$$\therefore -\frac{2}{3} \times -\frac{1}{m} = -1 \therefore m = -\frac{2}{3}$$

20.  $3x + 7y - 2 = 0$  সরলরেখার উপর লম্ব এবং  $(2, 1)$  বিন্দুদ্বয়ী সরলরেখার সমীকরণ-  
[DU, 11-12, 07-08; JU, 07-08; RU, 18-19; NSTU, 19-20]

A.  $3x + 7y - 13 = 0$  B.  $7x - 3y - 11 = 0$   
C.  $7x + 3y - 17 = 0$  D.  $7x - 3y - 2 = 0$

[SOL]  $3x + 7y - 2 = 0$  রেখার ঢাল =  $-\frac{3}{7}$

$$\therefore 3x + 7y - 2 = 0 \text{ রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল} = \frac{7}{3}$$

$$\therefore \text{লম্ব রেখার সমীকরণ: } y - 1 = \frac{7}{3}(x - 2) \Rightarrow 3y - 3 = 7x - 14 \therefore 7x - 3y - 11 = 0$$

21.  $2x - 6y + 4 = 0$  রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ নিচের কোনটি যা  $(1, 1)$  বিন্দুদ্বয়ী?  
[JU-A, Set-O, 2021-22; JU, 17-18]

A.  $3x + y - 4 = 0$  B.  $3x - y + 4 = 0$   
C.  $6x + 2y - 4 = 0$  D.  $6x + 6y + 4 = 0$

[SOL]  $2x - 6y + 4 = 0$  রেখার লম্বরেখা

$$6x + 2y + K = 0 \text{ যা } (1, 1) \text{ বিন্দুদ্বয়ী } \therefore 6 + 2 + K = 0 = K = -8$$

$$\therefore \text{সমীকরণ, } 6x + 2y - 8 = 0 \Rightarrow 3x + y - 4 = 0$$

22. মূলবিন্দু হতে কোন সরলরেখার লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক এবং অক্ষের সাথে ঐ লম্বের নতি  $120^\circ$  হলে ঐ সরলরেখার সমীকরণ হবে-  
[IU, 11-12]

A.  $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$  B.  $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$   
C.  $x - \sqrt{3}y + 5 = 0$  D.  $x - \sqrt{3}xy + 8 = 0$

[SOL]  $x \cos 120^\circ + y \sin 120^\circ = 4$

$$\Rightarrow x \left(-\frac{1}{2}\right) + y \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4 \Rightarrow -x + \sqrt{3}y = 8 \Rightarrow x - \sqrt{3}y + 8 = 0$$

23. অক্ষদ্বয় দ্বারা  $4x + 3y = 12$  সরলরেখার ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য কোনটি?  
[JU-A, Set-H, 22-23; DU, 03-04; JU, 09-10]

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

[SOL]  $4x + 3y = 12 \Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

$$\therefore \text{ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ একক}$$

24.  $2y - x - 6 = 0$  রেখাটির দ্বারা y অক্ষের ছেদাংশ কত?  
[RU, 09-10]

A. 6 B. 7 C. 3 D. 4

[SOL]  $2y - x - 6 = 0 \Rightarrow -x + 2y = 6$

$$\Rightarrow \frac{x}{-6} + \frac{y}{3} = 1 \therefore y \text{ অক্ষের ছেদাংশ} = 3$$

25.  $A(2, 1)$  ও  $B(5, 2)$  বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখলকের সমীকরণ কোনটি?  
[RU-C, Jupiter-1, Set-1, 2021-22]

A.  $3x + 2y = 12$  B.  $3x + y = 12$   
C.  $6x + 2y = 12$  D.  $3x - y = 12$

[SOL] AB এর মধ্যবিন্দু  $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$

$$AB \text{ এর সমীকরণ, } y - 1 = \frac{1-2}{2-5}(x - 2) \Rightarrow y - 1 = \frac{1}{3}(x - 2)$$

$$\Rightarrow x - 3y = -1 \therefore \text{লম্বদ্বিখলকের সমীকরণ } 3x + y = 3 \left(\frac{7}{2}\right) + \frac{3}{2} \Rightarrow 3x + y = 12$$



26.  $x - y - 2 = 0$  এবং  $2x - 2y + 4 = 0$  রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব-

[JU-A, Set-K. 2023-24]

- A.  $3\sqrt{2}$  B.  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  C.  $2\sqrt{2}$  D.  $\sqrt{2}$

**So Why** ১ম রেখা,  $x - y - 2 = 0$

২য় রেখাটি,  $2x - 2y + 4 = 0 \Rightarrow x - y + 2 = 0$

$$\therefore \text{রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \left| \frac{2+2}{\sqrt{1^2+1^2}} \right| = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

27. (3, 2) বিন্দু থেকে  $4x - 3y + 7 = 0$  রেখার লম্ব দূরত্ব কত? [CU-C, 15-16]

- A. -1 B. 1 C.  $-\frac{12}{7}$

- D.  $\frac{12}{7}$  E.  $\frac{13}{5}$

**So Why** লম্ব দূরত্ব =  $\frac{|4 \cdot 3 - 3 \cdot 2 + 7|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{13}{5}$

28.  $5x - 5\sqrt{3}y + 2 = 0$  এবং  $3\sqrt{3}x + 3y - 4 = 0$  রেখা দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণ কোনটি? [JU-A, Set-R. 22-23]

- A.  $30^\circ$  B.  $45^\circ$  C.  $60^\circ$  D.  $90^\circ$

**So Why**  $5x - 5\sqrt{3}y + 2 = 0$   $3\sqrt{3}x + 3y - 4 = 0$

$$\therefore m_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore m_2 = -\sqrt{3}$$

$$\therefore \tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sqrt{3})} \right| = \infty \Rightarrow \theta = 90^\circ$$

29.  $x + y = 0$  সরলরেখাটি x-অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? [JKKNU. 19-20]

- A.  $35^\circ$  B.  $45^\circ$  C.  $115^\circ$  D.  $135^\circ$

**So Why**  $x + y = 0$  রেখার ঢাল  $\tan \theta = -1$

$\therefore$  রেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে,

$$\theta = \tan^{-1}(-1) = 135^\circ \text{ কোণ উৎপন্ন করে।}$$

30. (1, 2) বিন্দুগামী এবং x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে  $45^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে এমন সরলরেখার সমীকরণ- [IU-A. 19-20]

- A.  $y = x - 1$  B.  $y = x + 1$  C.  $y = -x + 1$  D.  $y = x$

**So Why**  $y - 2 = \tan 45^\circ (x - 1) \Rightarrow y - 2 = x - 1 \Rightarrow y = x + 1$

31.  $3x + 5y = 2$ ,  $2x + 3y = 0$ ,  $ax + by + 1 = 0$  সমবিন্দুগামী হলে a এবং b এর সম্পর্ক- [DU. 14-15]

- A.  $4a - 6b = 1$  B.  $4a - 6b = 2$  C.  $6a - 4b = 1$  D.  $6a - 4b = 2$

**So Why**  $\begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 2 & 3 & 0 \\ a & b & 1 \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow 3(3 - 0) - 5(2 - 0) - 2(2b - 3a) = 0 \therefore 6a - 4b = 1$$

32.  $x = a$ ,  $y = b$ ,  $y = mx$  রেখা তিনটি যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল কোনটি? [CU-A, Set-1. 20-21]


- A.  $\frac{1}{2}(b - ma)^2$  B.  $\frac{1}{2m}(b - ma)^2$

- C.  $\frac{1}{2m}(ma - b)^2$  D.  $\frac{1}{2m}(b - ma)$

**So Why** ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \left| (b - ma) \left( \frac{b}{m} - a \right) \right|$$

$$= \frac{1}{2|m|} (b - ma)^2$$



## PRIME TEST

01.  $2r \sin^2(\theta/2) = 1$  এর কার্তেসীয় সমীকরণ-

- A.  $y^2 = 1 + 2x$  B.  $y^2 = 4(1 - x)$   
C.  $y^2 = 4(1 + x)$  D.  $x^2 = 4(1 + y)$

02.  $(2, 270^\circ)$  বিন্দুটির কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কত?

- A.  $(-2, 0)$  B.  $(0, -2)$  C.  $(2, -2)$  D.  $(0, 0)$

03.  $(\sqrt{3}, 1)$  বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক কত?

- A.  $(2, \frac{5\pi}{3})$  B.  $(2, \frac{\pi}{6})$  C.  $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{3})$  D.  $(2, -\frac{\pi}{3})$

04. x-অক্ষের উপর অবস্থিত p বিন্দু থেকে (0, 2) ও (6, 4) বিন্দু দুইটি সমদূরবর্তী হলে p বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?

- A. (2, 0) B. (0, 2) C. (4, 0) D. (0, 4)

05. (1, 1) বিন্দুর সাপেক্ষে (3, 4) বিন্দুর প্রতিবিম্ব কোনটি?

- A.  $(-2, -3)$  B.  $(-1, -2)$   
C.  $(-3, -4)$  D.  $(-2, 3)$

06. (1, 4) এবং (9, 12) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা যে বিন্দুতে 3:5 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয়, তার স্থানাঙ্ক-

- A. (7, 4) B. (4, 7) C. (5, 8) D. (8, 5)

07. (1, -1) এবং (2, 4) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরল রেখার লম্ব সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ-

- A.  $x_2 + 3y - 6 = 0$  B.  $x + 5y - 9 = 0$   
C.  $x - 3y - 6 = 0$  D.  $x - 5y - 6 = 0$

08. y-অক্ষের সমান্তরাল এবং  $2x - 7y + 11 = 0$  ও  $x + 3y = 8$  রেখাঘরের ছেদবিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী সরলরেখার সমীকরণ-

- A.  $13x - 23 = 0$  B.  $3x - 7 = 0$   
C.  $7x - 3 = 0$  D.  $23x - 13 = 0$

09.  $y = x + 4$  এবং  $y = x$  রেখাঘরের লম্ব দূরত্ব-

- A. 4 একক B.  $2\sqrt{2}$  একক  
C. 2 একক D.  $4\sqrt{2}$  একক

10.  $\alpha$  সূক্ষ্ম কোণ হলে,  $x \cos \alpha + y \sin \alpha = 4$  এবং  $4x + 3y = 5$  সমান্তরাল রেখাঘরের দূরত্ব-

- A. -1 unit B. 3 units C. 1 unit D. 9 units

11.  $4x - 3y + 2 = 0$  এবং  $8x - 6y - 9 = 0$  সমান্তরাল রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব কোনটি?

- A.  $\frac{15}{10}$  B.  $\frac{11}{9}$   
C.  $\frac{14}{9}$  D.  $\frac{13}{10}$

12. (4, -2) বিন্দু থেকে  $5x + 12y = 3$  রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য-

- A.  $-\frac{7}{13}$  B.  $\frac{8}{9}$   
C.  $-\frac{8}{9}$  D.  $\frac{7}{13}$

13.  $y = b$  এবং  $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$  রেখাঘরের অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্মকোণের মান-

- A.  $30^\circ$  B.  $45^\circ$   
C.  $60^\circ$  D.  $90^\circ$

14.  $x = \alpha$  এবং  $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$  রেখাঘরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণের মান-

- A.  $30^\circ$  B.  $45^\circ$   
C.  $60^\circ$  D.  $75^\circ$

15. একটি সরলরেখা অক্ষদ্বয় হতে সমান অংশ ছেদ করে এবং  $(\alpha, \beta)$  বিন্দু দিয়ে যায়, রেখাটির সমীকরণ নীচের কোনটি?

- A.  $x + y = \alpha + \beta$  B.  $x - y = \alpha + \beta$   
C.  $x - y = \alpha - \beta$  D.  $x + y = \alpha - \beta$



16.  $k$ -এর মান কত হলে,  $2x - y + 7 = 0$  এবং  $3x + ky - 5 = 0$  রেখা দুটি পরস্পর লম্ব হলে?

- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

17.  $m$  এর মান কত হলে,  $y = mx + 1$  রেখাটি  $x$  অক্ষের সাথে  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করবে?

- (A) 1 (B)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$   
(C)  $\frac{1}{5}$  (D)  $\sqrt{3}$

18.  $(-1, 2)$  বিন্দু হতে  $4x - 3y - 5 = 0$  রেখাটির লম্ব দূরত্ব কত?

- (A) 5 একক (B) 3 একক  
(C) 7 একক (D) 4 একক

19. বিন্দুদ্বয়  $(-2, -2)$  এবং  $(a, b)$  বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের একটি সমদ্বিখন্ডক হলে  $(a, b)$  বিন্দু থেকে  $x$ -অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

- (A) 2 (B) 1  
(C)  $1/3$  (D) 3

20.  $2x - 5y + 9 = 0$  ও  $5ax + 8by = 15$  একই সরলরেখা নির্দেশ করলে  $a$  ও  $b$  এর মান কত?

- (A)  $a = -\frac{2}{3}, b = \frac{25}{24}$  (B)  $a = \frac{2}{3}, b = \frac{25}{24}$   
(C)  $a = \frac{3}{2}, b = -\frac{25}{24}$  (D)  $a = -\frac{3}{2}, b = \frac{25}{24}$

### ☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | A     | $2r \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = 1 \Rightarrow r(1 - \cos\theta) = 1$<br>$\Rightarrow r = 1 + r\cos\theta \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 1 + x$<br>$\Rightarrow x^2 + y^2 = 1 + 2x + x^2 \therefore y^2 = 1 + 2x$                                    |
| 02     | B     | $x = r \cos\theta = 2\cos(270^\circ) = 2\cos(90^\circ \times 3 + 0) = 2\sin 0^\circ = 0$<br>$y = r \sin\theta = 2\sin(270^\circ) = 2\sin(90^\circ \times 3 + 0) = -2\cos 0^\circ = -2$<br>$\therefore$ কার্ভের স্থানাঙ্ক $(0, -2)$                            |
| 03     | B     | $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$<br>$\theta = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$<br>$(\sqrt{3}, 1)$ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$                                                         |
| 04     | C     | ধরি, $x$ -অক্ষের $p$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $p(x, 0)$ ;<br>প্রশ্নমতে, $\sqrt{(x-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{(x-6)^2 + (0-4)^2}$<br>$\Rightarrow x^2 + 4 = x^2 - 12x + 36 + 16$<br>$\Rightarrow 12x = 48$<br>$\therefore x = 4 \therefore p$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 0)$ |
| 05     | B     | $1 = \frac{3+x}{2} \quad 1 = \frac{4+y}{2}$<br>$\Rightarrow x = -1 \quad \Rightarrow y = -2$                                                                                                                                                                  |
| 06     | B     | নির্ণেয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক: $\left(\frac{3.9+5.1}{3+5}, \frac{3.12+5.4}{3+5}\right) = \left(\frac{32}{8}, \frac{56}{8}\right) = (4, 7)$                                                                                                                       |
| 07     | B     | $(1, -1)$ এবং $(2, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখার ঢাল $m_1 = 5$<br>$\therefore$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার লম্ব সমদ্বিখন্ডকের ঢাল, $m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{5}$<br>Option $\rightarrow$ B তে $x + 5y - 9 = 0$ রেখার ঢাল $= -\frac{1}{5}$            |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08     | A     | প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু $\left(\frac{23}{13}, \frac{27}{13}\right)$<br>আমরা জানি, $y$ অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ,<br>$x = a$ ; রেখাটি ছেদবিন্দুগামী বলে, $x = \frac{23}{13}$<br>$\therefore$ নির্ণেয় রেখার সমীকরণ, $x = \frac{23}{13}$ বা, $13x - 23 = 0$                                                                                                                                        |
| 09     | B     | $y = x + 4 \Rightarrow x - y + 4 = 0$ এবং $y = x \Rightarrow x - y = 0$<br>$\therefore$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \frac{ 4 - 0 }{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$                                                                                                                                                                                                              |
| 10     | B     | নির্ণেয় দূরত্ব $= \frac{ 0 \cdot \cos \alpha + 0 \cdot \sin \alpha - 4 }{\sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}} = \frac{ 4.0 + 3.0 - 5 }{\sqrt{4^2 + 3^2}}$<br>$= \frac{ -4 }{5} = \frac{4}{5}$                                                                                                                                                                                                            |
| 11     | D     | $4x - 3y + 2 = 0 \dots\dots (i)$<br>$8x - 6y - 9 = 0 \Rightarrow 4x - 3y - \frac{9}{2} = 0 \dots\dots (ii)$<br>(i) ও (ii) নং রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \frac{\left 2 - \left(-\frac{9}{2}\right)\right }{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{\left \frac{13}{2}\right }{5} = \frac{13}{10}$                                                                                                                 |
| 12     | D     | লম্বের দৈর্ঘ্য, $d = \frac{ 5.4 + 12 \cdot (-2) - 3 }{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{7}{13}$ unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13     | C     | $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল $\sqrt{3} \therefore \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$<br>তাই রেখাটি $x$ অক্ষ বা $x$ অক্ষের সমান্তরাল রেখা $y = b$ এর সাথে $60^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে।                                                                                                                                                                                                |
| 14     | A     | $x = \alpha$ রেখাটি $y$ অক্ষের সমান্তরাল যা $x$ অক্ষের সাথে $90^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে<br>আবার, $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল $= \sqrt{3} \therefore \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$<br>অর্থাৎ রেখাটি $x$ অক্ষের সাথে $60^\circ$ কোণ তৈরি করে।<br>$\therefore$ প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ $= 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$                                               |
| 15     | A     | $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 \Rightarrow x + y = a \dots\dots\dots (i)$<br>যা $(\alpha, \beta)$ বিন্দুগামী $\therefore \alpha + \beta = a \therefore x + y = \alpha + \beta$                                                                                                                                                                                                                             |
| 16     | A     | লম্ব হলে, $a_1a_2 + b_1b_2 = 0 \Rightarrow 6 - k = 0 \therefore k = 6$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17     | D     | $y = mx + 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = m \Rightarrow m = \tan 60^\circ \therefore m = \sqrt{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18     | B     | $(-1, 2)$ হতে $4x - 3y - 5 = 0$ এর লম্ব দূরত্ব<br>$= \frac{ 4 \times (-1) - 3 \times 2 - 5 }{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{ -4 - 6 - 5 }{\sqrt{16 + 9}} = \frac{15}{5} = 3$ একক                                                                                                                                                                                                                             |
| 19     | B     | $(x_1, y_1)$ এবং $(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগরেখার সমদ্বিখন্ডন বিন্দুর<br>স্থানাঙ্ক $(x, y)$ হলে $x = \frac{x_1 + 2x_2}{3}$ এবং $y = \frac{y_1 + 2y_2}{3}$<br>$\therefore 0 = \frac{-2 + 2a}{3}$ এবং $0 = \frac{-2 + 2b}{3}$<br>$\Rightarrow a = 1 \quad \Rightarrow b = 1$<br>$\therefore (a, b) \equiv (1, 1)$ বিন্দু থেকে $x$ অক্ষ<br>অর্থাৎ $y = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব $= \frac{ 1 }{\sqrt{1}} = 1$ |
| 20     | A     | $\frac{2}{5a} = \frac{-5}{8b} = \frac{9}{-15} \therefore \frac{2}{5a} = \frac{9}{-15} \Rightarrow \frac{2}{a} = \frac{9}{-3} \Rightarrow a = -\frac{2}{3}$<br>এবং $\frac{-5}{8b} = \frac{9}{-15} \Rightarrow 72b = 75 \Rightarrow b = \frac{75}{72} = \frac{25}{24}$                                                                                                                                       |



অধ্যায়  
০৪

বৃত্ত

গণিত  
১ম পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস                                                                                                                                                                                      | V.V.I<br>RATE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | বৃত্তের সমীকরণের বৈশিষ্ট্য                                                                                                                                                                   | ★★            |
| TOPIC-02 | বৃত্তের কেন্দ্র, ব্যাসার্ধ, ক্ষেত্রফল এবং অক্ষ দ্বারা খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয়                                                                                                           | ★★            |
| TOPIC-03 | বৃত্ত কোন অক্ষকে স্পর্শ করলে অজানা মান নির্ণয় ও উভয় অক্ষকে স্পর্শকারী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                                                                     | ★★★           |
| TOPIC-04 | কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ থেকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ ও $(h, k)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত $x$ বা $y$ অক্ষকে স্পর্শ করলে তার সমীকরণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ | ★★★           |
| TOPIC-05 | নির্দিষ্ট কেন্দ্র এবং অপর কোন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় ও কোন বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং কোন নির্দিষ্ট বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                 | ★★            |
| TOPIC-06 | দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ                                                                                                                                    | ★★★           |
| TOPIC-07 | তিন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ ও ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                                                                     | ★★            |
| TOPIC-08 | একটি সরলরেখা একটি বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                                                                                                                         | ★★            |
| TOPIC-09 | স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয়                                                                                                                                                           | ★★★           |
| TOPIC-10 | স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয়                                                                                                                                                                    | ★★            |
| TOPIC-11 | কোন বৃত্ত অপর একটি বৃত্তকে অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করা সংক্রান্ত                                                                                                                    | ★             |
| TOPIC-12 | বৃত্তের সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়                                                                                                                                                 | ★★            |
| TOPIC-13 | সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত                                                                                                                                            | ★★★           |
| TOPIC-14 | বৃত্তের জ্যা কোন বিন্দুতে সমবিভক্ত হলে, জ্যা এর সমীকরণ ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত                                                                                                           | ★             |
| TOPIC-15 | বৃত্তের জ্যা কর্তৃক কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ                                                                                                                    | ★             |
| TOPIC-16 | বৃত্তের প্রতিবিম্ব নির্ণয় সংক্রান্ত                                                                                                                                                         | ★★            |

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

| $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের জন্য                   |
|----------------------------------------------------------------|
| (i) কেন্দ্র $(-g, -f)$                                         |
| (vi) $x$ -অক্ষকে স্পর্শ করলে, $c = g^2$                        |
| (ix) $y$ -অক্ষ থেকে ছেদিত জ্যা'র দৈর্ঘ্য $= 2\sqrt{f^2 - c}$   |
| (ii) ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$                        |
| (vii) $y$ -অক্ষকে স্পর্শ করলে, $c = f^2$                       |
| (x) $x, y$ উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে, $c = g^2 = f^2$            |
| (iii) কেন্দ্র $y$ -অক্ষের উপর হলে $g = 0$                      |
| (viii) $x$ -অক্ষ থেকে ছেদিত জ্যা'র দৈর্ঘ্য $= 2\sqrt{g^2 - c}$ |
| (x) Area $= \pi r^2$                                           |
| (iv) কেন্দ্র $x$ -অক্ষের উপর হলে $f = 0$                       |

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কেন্দ্র $(h, k)$ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত $x$ বা $y$ অক্ষকে স্পর্শ করলে তার সমীকরণ                                                                                    |
| $x$ অক্ষকে স্পর্শ করলে, i. ব্যাসার্ধ $=$ বৃত্তের কেন্দ্রের $y$ -কোটি $= k$                                                                                      |
| ii. সমীকরণ, $(x-h)^2 + (y-k)^2 = k^2$ ; যেখানে, $k =$ ব্যাসার্ধ                                                                                                 |
| $y$ অক্ষকে স্পর্শ করলে, i. ব্যাসার্ধ $=$ বৃত্তের কেন্দ্রের $x$ -কোটি $= h$                                                                                      |
| ii. সমীকরণ, $(x-h)^2 + (y-k)^2 = h^2$ ; যেখানে, $h =$ ব্যাসার্ধ                                                                                                 |
| একটি সরলরেখা একটি বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত                                                                                                                      |
| i. বৃত্তের ব্যাসার্ধ $=$ কেন্দ্র থেকে রেখার উপর অঙ্কিত সন্কুচ                                                                                                   |
| $\therefore ax + by + c = 0$ সরলরেখা $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত: $\sqrt{g^2 + f^2 - c} = \frac{ -ag - bf + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$ |
| ii. $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শক হলে, $c = \pm a\sqrt{1+m^2}$                                                                          |
| স্পর্শকের দৈর্ঘ্য                                                                                                                                               |
| i. $(x_1, y_1)$ বিন্দু হলে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত অঙ্কিত $\sqrt{x_1^2 + y_1^2 - a^2}$                                                                          |
| ii. $(x_1, y_1)$ বিন্দু হলে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্ত অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, $PT = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$                     |
| iii. মূলবিন্দু $(0, 0)$ হলে কোন বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$                                                                              |
| বৃত্তের সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়                                                                                                                    |
| বিন্দুর অবস্থান $(x_1, y_1)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের বাইরে হলে $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$                                 |
| বৃত্তের (পরিধির) উপর হলে $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$                                                                                                |
| ভিতরে হলে $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$                                                                                                               |
| বৃত্তের জ্যা কর্তৃক কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ $\theta = 2 \sin^{-1} \left( \frac{\text{জ্যা এর দৈর্ঘ্য}}{\text{ব্যাস}} \right)$                                       |
| জ্যা এর দৈর্ঘ্য $l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$                                                                                                                         |

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউসেজবোদী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- $01. kx^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$  সমীকরণটি বৃত্ত নির্দেশ করলে  $k$  এর মান কত? [SUST-17-18]  
A. -2 B. 0 C. 2 D. 4  
[SOWB]  $kx^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$   
 $k = 2$  হলে বৃত্ত নির্দেশ করবে। কারণ  $x^2$  ও  $y^2$  এর সহগ অভিন্ন হলে বৃত্ত হবে।
- $02. x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$  বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কত? [JU-15-16, 11-12, 10-11; CU-17-18, 16-17]  
A.  $(-3, 2), 5$  B.  $(-6, 4), 4$   
C.  $(3, -2), 5$  D.  $(-3, -2), 5$   
[SOWB]  $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$   
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(3)x + 2(-2)y - 12 = 0$   
কেন্দ্র  $(-3, 2)$  ব্যাসার্ধ  $= \sqrt{9 + 4 + 12} = 5$
- $03. x^2 + y^2 = 4$  বৃত্ত দ্বারা সঠিক কেন্দ্রের ক্ষেত্রফল কত? [CU-A, Shift-2, 22-23]  
A.  $\pi$  B.  $2\pi$  C.  $4\pi$  D. কোনটিই নয়  
[SOWB] এনড বৃত্তের ব্যাসার্ধ,  $r = 2$   
 $\therefore$  বৃত্তের ক্ষেত্রফল  $= \pi r^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi$  বর্গ একক
- $04. x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$  বৃত্তটি  $x$  অক্ষকে স্পর্শ করে।  $c$  এর মান কত? [JU-13-14, 09-10; CU-15-16, 09-10; RU-08-09, 07-08; DU-02-03, 00-01; BUTEX-16-17; DU-7Ctg-19-20; নাবা-২০১৯]  
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8  
[SOWB]  $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$   
বৃত্তটি  $x$  অক্ষকে স্পর্শ করে তাই  $c = g^2 = (-2)^2$  [ $\because g = -2$ ]  $= 4$



05.  $r = 2a \cos \theta$  বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?

[RU. 17-18]

- A. (a, 0) B. (-a, 0)  
C. (-a, a) D. (0, 0)

**[SOWHY]**  $r = 2a \cos \theta \Rightarrow r^2 = 2a.r \cos \theta$   
 $\Rightarrow x^2 + y^2 = 2ax \therefore$  কেন্দ্র (a, 0)

06. (1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত x অক্ষকে স্পর্শ করে। উক্ত বৃত্তটি y অক্ষকে কি পরিমাণে ছেদ করে?

[RU. 08-09]

- A.  $3\sqrt{2}$  একক B.  $2\sqrt{3}$  একক C.  $5\sqrt{2}$  একক D.  $2\sqrt{5}$  একক

**[SOWHY]** যেহেতু (1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত x অক্ষকে স্পর্শ করে  
 $\therefore c = g^2 = (-1)^2 = 1$

$\therefore$  বৃত্তটি y অক্ষকে ছেদ করে  $= 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{(-2)^2 - 1} = 2\sqrt{3}$  একক

07.  $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$  বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে। স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক

[JNU. 07-08]

- A. (2, 0) B. (3, 0) C. (6, 6) D. (4, 1)

**[SOWHY]** যেহেতু বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু স্পর্শ বিন্দুর কোটি y = 0  
 $\therefore x^2 + 0 - 4x - 0 + 4 = 0 \Rightarrow$  স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক  $\equiv (2, 0)$

08. নিচের কোন বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে-

[DU. 14-15; NSTU. 19-20]

- A.  $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 4 = 0$  B.  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 5 = 0$   
C.  $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$  D.  $2x^2 + 2y^2 - 2x + 6y + 3 = 0$

**[SOWHY]** বৃত্তের স্পর্শক x অক্ষ হওয়ার শর্ত  $g^2 = c$   
 $\therefore$  নির্ণেয় সমীকরণ,  $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$

09. (-9, 9) ও (5, 5) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ-

[DU. 05-06; DU. 02-03; RU. 06-07; NU. 02-03]

- A.  $x^2 + y^2 + 4x + 14y = 0$  B.  $x^2 + y^2 + 4x - 14y = 0$   
C.  $x^2 + y^2 - 4x + 14y = 0$  D.  $x^2 + y^2 - 4x - 14y = 0$

10.  $3x + y = 14$ ,  $2x + 5y = 18$  রেখাদ্বয়ের ছেদ বিন্দুদ্বারা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু (1, -2) হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

[CU. 11-12]

- A. 5 B. 6 C. 14  
D. 18 E. 4

**[SOWHY]**  $3x + y = 14$  এবং  $2x + 5y = 18$  রেখাদ্বয়ের ছেদ বিন্দু (4, 2)  
 $\therefore$  বৃত্তটির ব্যাসার্ধ  $= \sqrt{(4-1)^2 + (2+2)^2} = 5$

11.  $3x - 4y = k$  রেখাটি  $x^2 + y^2 - 8y = 0$  বৃত্তকে স্পর্শ করলে k এর ধনাত্মক মান কোনটি?

[JU. 13-14]

- A. 4 B. 42 C. 8 D. 35

**[SOWHY]**  $x^2 + y^2 - 8y = 0$  বৃত্তের কেন্দ্র (0, 4) এবং ব্যাসার্ধ = 4

সর্তহে,  $\left| \frac{3 \cdot 0 - 4 \cdot 4 - k}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \right| = 4 \Rightarrow \left| \frac{-(k+16)}{5} \right| = 4 \Rightarrow k+16=20; k=4$

12.  $y = x + c$  রেখাটি  $x^2 + y^2 = 4^2$  বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত হবে-

[RU. 12-13, 10-11]

- A.  $c = \pm\sqrt{2}$  B.  $c = \pm\sqrt{8}$  C.  $c = \pm 4\sqrt{2}$  D.  $c = 0$

**[SOWHY]**  $c = \pm a\sqrt{1+m^2} = \pm 4\sqrt{1+1} = \pm 4\sqrt{2}$

13.  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$  বৃত্তের (0, 2) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ-

[JU-A, Set-K. 2023-24]

- A.  $x = 0$  B.  $x = 2$  C.  $y = 0$  D.  $y = 2$

**[SOWHY]** (0, 2) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ:

$$xx_1 + yy_1 - 2\left(\frac{x+x_1}{2}\right) - 4\left(\frac{y+y_1}{2}\right) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x \cdot 0 + y \cdot 2 - (x+0) - 2(y+2) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2y - x - 2y - 4 + 4 = 0 \therefore x = 0$$

14.  $x^2 + y^2 = a^2$  বৃত্তের উপর (3, 4) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ-

[RU-C. 14-15]

- A.  $3x + 4y = a^2$  B.  $6x + 8y = a$   
C.  $4x + 3y = a^2$  D.  $3x + 4y = a$

**[SOWHY]**  $x^2 + y^2 = a^2$  বৃত্তের (3, 4) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,  
 $3x + 4y = a^2 \Rightarrow 3x + 4y = a^2$

15. (1, -1) বিন্দু থেকে  $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$  বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক? [JU-A, Set-R. 22-23; RU, Moderna, Set-2, 20-21, KU, 15-16, 14-15, RU-C. 14-15, 13-14, 09-10, 08-09, IU, 12-13, 08-09, JKNU, 19-20]

- A.  $\sqrt{2}$  B.  $\sqrt{3}$  C.  $2\sqrt{2}$  D.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

**[SOWHY]**  $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{x}{2} + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0$

$\therefore$  (1, -1) বিন্দু হতে বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

$$= \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}(-1) + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ একক}$$

16. (1, 3) বিন্দু থেকে  $2x^2 + 2y^2 = 9$  বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত?

[CU-A, Set-2, 20-21, CU-C, 11-12]

- A.  $\sqrt{7}$  B.  $\sqrt{\frac{11}{12}}$  C.  $\sqrt{\frac{7}{2}}$  D.  $\sqrt{\frac{10}{11}}$

**[SOWHY]** (1, 3) বিন্দু হতে  $2x^2 + 2y^2 - 9 = 0$


$$\text{বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{1^2 + 3^2 - \frac{9}{2}} = \sqrt{\frac{11}{2}}$$

17. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে তাদের কয়টি সাধারণ স্পর্শক বিদ্যমান?

[RU-H. 16-17]

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

**[SOWHY]**

18. (4, 3) বিন্দুকে কেন্দ্র করে কত ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন করলে  $x^2 + y^2 = 4$  বৃত্তকে স্পর্শ করবে?

[SUST. 11-12, IU. 07-08]

- A. 3 B. 2 C. 5  
D. 1 E. 7

**[SOWHY]**  $x^2 + y^2 = 4$  বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0) এবং ব্যাসার্ধ = 2

ধরি, (4, 3) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r


দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব = ব্যাসার্ধ দ্বয়ের সমষ্টির সমান।  $\therefore \sqrt{(4-0)^2 + (3-0)^2} = r + 2 \Rightarrow 5 = r + 2 \therefore r = 3$

19. (3, 4) বিন্দুটি  $x^2 + y^2 = 81$  বৃত্তের-

[JU. 09-10]

- A. অন্তঃস্থ B. বহিঃস্থ C. উপরিস্থ D. কোনটিই না

**[SOWHY]** (3, 4) বিন্দুটি,  
 $x^2 + y^2 = 81$  বৃত্তের অন্তঃস্থ

20.  $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 11 = 0$  এবং  $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 12 = 0$  বৃত্ত দুটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ নিচের কোনটি? [CU-A, Set-1 2023-24]

- A.  $2x + 1 = 0$  B.  $2x + y = 0$  C.  $x + y = 0$  D.  $x + 2y = 0$

**[SOWHY]** সাধারণ জ্যা,  $S_1 - S_2 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x + 3y + 11 - (x^2 + y^2 + 4x + 3y + 12) = 0$$

$$\Rightarrow -2x - 1 = 0 \Rightarrow 2x + 1 = 0$$

21.  $x^2 + y^2 = 1$  বৃত্তে  $x + y - 1 = 0$  সরলরেখা দ্বারা খণ্ডিত জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? [RU. Sinovac, Set-1. 20-21]

- A.  $x^2 + y^2 - x - y = 0$  B.  $x^2 + y^2 - x - y - 1 = 0$   
C.  $x^2 + y^2 + x + y = 0$  D.  $x^2 + y^2 + x + y + 1 = 0$

**[SOWHY]**  $x^2 + y^2 = 1$  বৃত্ত এবং  $x + y = 1$  সরলরেখার ছেদবিন্দু (0, 1) এবং (1, 0)

$\therefore$  নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ,  $x(x-1) + y(y-1) = 0$

$$\therefore x^2 + y^2 - x - y = 0$$

22.  $x^2 + y^2 = 9$  বৃত্তের একটি জ্যা (2, -3) বিন্দুতে সমাধিবর্তিত হলে, ঐ জ্যা-এর সমীকরণ-

[IU. 17-18]

- A.  $2x - 3y = -1$  B.  $3x - 2y = 1$  C.  $2x - 3y = 13$  D.  $3x - 2y = 13$




23. 2 একক দৈর্ঘ্যের একটি জ্যা কোনো বৃত্তের কেন্দ্রে  $\frac{\pi}{2}$  কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

A.  $\frac{5\pi}{2}$  B.  $2\pi$  C.  $\frac{3\pi}{2}$  D.  $\pi$

**SO WHY** বৃত্তের জ্যা কর্তৃক কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ,

$$\theta = 2\sin^{-1}\left(\frac{\text{জ্যা এর দৈর্ঘ্য}}{\text{ব্যাস}}\right)$$



$$\therefore \frac{\pi}{2} = 2\sin^{-1}\left(\frac{2}{2r}\right) \Rightarrow \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{r} \Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 = \pi (\sqrt{2})^2 = 2\pi \text{ বর্গ একক}$$

24.  $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 36$  বৃত্তের একটি জ্যা কেন্দ্রে  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে। জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?

A. 5 একক B. 6 একক  
C. 8 একক D. 4 একক


**SO WHY** বৃত্তের কেন্দ্র (3, 4) এবং ব্যাসার্ধ = 6

কেন্দ্র  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে

$$\therefore \cos 60^\circ = \frac{OB}{OC}$$


$$\Rightarrow OB = 6\cos 60^\circ = 3$$

$$\therefore OA = 2 \times 3 = 6$$



### PRIME TEST

01. চিত্রের বৃত্তটি x ও y অক্ষকে স্পর্শ করে। y হতে স্পর্শ বিন্দুর দূরত্ব 2 একক হলে কেন্দ্রের স্থানাংক কত?



A. (2, -2) B. (4, 2)  
C. (2, 4) D. ( $\pm 2$ , -2)

02. বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত?

A. 0 B.  $\infty$  C.  $45^\circ$  D. 1

03. একক ব্যাসার্ধের বৃত্তে অন্তর্লিখিত একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্য-

A.  $\frac{3}{2}$  units B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  units C.  $\sqrt{3}$  units D. 1 unit

04.  $3x^2 + 3y^2 + 6x - 12y - 15 = 0$  সমীকরণ দ্বারা বর্ণিত বৃত্তের কেন্দ্র কি?

A. (-3, 6) B. (1, -2) C. (-1, 2) D. (6, -12)

05.  $2x^2 + 2y^2 + 6x + 10y - 1 = 0$  বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, r = ?

A. 1 B. 3 C.  $\sqrt{6}$  D.  $\sqrt{3}$

06.  $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 16 = 0$  সমীকরণ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?

A. 9.43 sq unit B.  $9\pi$  sq unit  
C. 1620 sq unit D.  $4\pi$  sq unit

07.  $x^2 + y^2 - 6x - 4y + c = 0$  বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে, c এর মান-

A. 11 B. 7 C. 5 D. 4

08. (2, 4) কেন্দ্রবিশিষ্ট ও x-অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ

A.  $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$  B.  $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$   
C.  $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 16 = 0$  D.  $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 4 = 0$

09. (4, 5) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত, যা  $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$  বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গমন করে, তার সমীকরণ-

A.  $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 59 = 0$  B.  $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 59 = 0$   
C.  $x^2 + y^2 + 8x + 10y - 59 = 0$  D.  $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 59 = 0$

10. (3, -1) বিন্দুগামী এবং  $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$  বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক বৃত্তের সমীকরণ-

A.  $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 16 = 0$  B.  $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 16 = 0$

C.  $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$  D.  $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 16 = 0$

11. (-4, 3) এবং (12, -1) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ-

A.  $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 51 = 0$  B.  $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 51 = 0$

C.  $x^2 + y^2 + 8x + 2y - 51 = 0$  D.  $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 51 = 0$

12. (4, 3) কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং  $5x - 12y + 3 = 0$  সরল রেখাকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

A.  $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 24 = 0$  B.  $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$

C.  $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 24 = 0$  D.  $x^2 + y^2 - 8x - 6y - 24 = 0$

13. (1, -1) বিন্দু হতে  $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$  বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত?

A. 1 B.  $\frac{1}{2}$

C. 2 D.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

14. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে তাদের কয়টি সাধারণ স্পর্শক বিদ্যমান?

A. 1 B. 2  
C. 3 D. 4

15.  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$  হলে নীচের কোন বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত?

A. (1, 1) B. (-2, 2)  
C. (3, 3) D. (7, -5)

16.  $x^2 + y^2 - 5x - 3y + 16 = 0$  বৃত্তের সাপেক্ষে (1, 2) বিন্দু অবস্থান-

A. ভিতরে B. বাইরে  
C. মধ্যবর্তী D. কোনটিই নয়

17.  $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 = 0$  এবং  $x^2 + y^2 + 8x + y + 10 = 0$  বৃত্ত দুটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ কোনটি?

A.  $2x + y + 4 = 0$  B.  $2x - y - 4 = 0$   
C.  $2x - y + 4 = 0$  D.  $2x + y - 4 = 0$

18.  $3x - 4y = k$  রেখাটি  $x^2 + y^2 - 8y = 0$  বৃত্তকে স্পর্শ করলে k এর ধনাত্মক মান কোনটি?

A. 4 B. 42  
C. 8 D. 35

19. 2 একক বাহু বিশিষ্ট OABC একটি বর্গ; OA ও OC-কে অক্ষ ধরে অঙ্কিত পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ-

A.  $\sqrt{2}$  B.  $2\sqrt{2}$  C. 2 D.  $4\sqrt{2}$

20. k এর কোন মানের জন্য  $(x-y+3)^2 + (kx+2)(y-1) = 0$  সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে?

A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

### ☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | A     | যেহেতু বৃত্তটি x ও y অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু y অক্ষ হতে বিন্দুর দূরত্ব = x হতে স্পর্শ বিন্দুর দূরত্ব = 2 একক।<br>চিত্রমতে, x-অক্ষে স্পর্শ বিন্দু $\equiv (2, 0)$ এবং y-অক্ষে স্পর্শ বিন্দু $\equiv (0, -2)$<br>$\therefore$ কেন্দ্রের স্থানাংক $\equiv (2, -2)$ |
| 02     | A     | বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, $e = 0$                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03     | C     | $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow a = 2R \sin A = 2 \times 1 \times \sin 60^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ units                                                                                                                               |
| 04     | C     | $3x^2 + 3y^2 + 6x - 12y - 15 = 0$<br>$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$<br>$\therefore$ বর্ণিত বৃত্তের কেন্দ্র $\equiv (-1, 2)$                                                                                                                           |







## চক্র বিন্যাস

- $n$  সংখ্যক মানুষ নিয়ে চক্রাকারে বৈঠক করা যাবে  $(n-1)$  উপায়ে  
 আসন সংখ্যা স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকলে  $n!$  উপায়ে  
 মালা, পুঁথি, তজ্জবি, এরূপ জিনিসের বিন্যাস  $\frac{(n-1)!}{2}$  উপায়ে  
 দুটি গ্রুপের ক্ষেত্রে একই গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি না রেখে চক্রাকারে বৈঠক করার ক্ষেত্রে  $(n-1)!$  উপায়ে  
 $n$  সংখ্যক বিভিন্ন ঘটনা/বস্তু থেকে সংখ্যক ঘটনা/বস্তু দ্বারা পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাস যাহা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে

01. ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে = (প্রার্থী) ভোট  
 02. চিঠি পোষ্ট বাক্সে ফেলার ক্ষেত্রে = (পোষ্ট বাক্স) চিঠি  
 03. ফোন করার ক্ষেত্রে =  $(10)^{\text{ডিজিট}}$   
 04. বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে =  $2^n - 1$   
 Magic: (একাধিক নিতে পারে) একাধিক দিতে পারে অথবা, Optional compulsory

## সংখ্যার বিন্যাস

সংখ্যা গঠনের অংক:

01. যত অংকের সংখ্যা ততটা ঘর বানাব।  
 02. যতটা অংক দেওয়া আছে প্রথম ঘরে তত বসাব।  
 03. পুনরাবৃত্তি ছাড়া হলে 1, 1 করে কমাবো।  
 04. পুনরাবৃত্তিসহ হলে কমাবো না।  
 05. কোন বিশেষ শর্ত থাকলে নির্দিষ্ট ঘরে ফিক্সড করে দিব।  
 06. প্রথম ঘরে শূন্য বসার সম্ভাবনা থাকলে বিয়োগ করতে হবে।  
 07. ঘরে বসানো সংখ্যাগুলোর গুণ করব।

## সমাবেশ

- $n$  সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে  $r$  সংখ্যক জিনিস নিয়ে বাছাই বা সমাবেশ,  
 ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}; [n \geq r]$   
 $n$  সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে প্রতিবারে  $r$  সংখ্যক বস্তু নিয়ে গঠিত যে সমস্ত সমাবেশে  
 $p$  সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু সর্বদাই থাকবে, তার সংখ্যা  ${}^{n-p}C_{r-p} [p+r \leq n]$   
 $n$  সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে  $r$  সংখ্যক বস্তু নিয়ে গঠিত যে সমস্ত সমাবেশে  $p$  সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু কখনোই থাকবে না, তার সংখ্যা  ${}^{n-p}C_r [p+r \leq n]$

 $n$  সংখ্যক বিন্দু দ্বারা গঠিত

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| সরলরেখাকে সংখ্যা ${}^nC_2$ | চতুর্ভুজের সংখ্যা ${}^nC_4$ |
| ত্রিভুজের সংখ্যা ${}^nC_3$ | কর্ণের সংখ্যা ${}^nC_2 - n$ |

## কমিটি বা দল গঠন

- $m$  সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে  $p$  আবার  $n$  সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে  $q$  সংখ্যক করে নিয়ে  $(m+n)$  সংখ্যক বস্তু হতে  $(p+q)$  সংখ্যক বস্তু নির্বাচন করা যাবে  ${}^mC_p \times {}^nC_q$  উপায়ে।  
 আবার এর সাথে  $s$  সংখ্যক বস্তু  $t$  সংখ্যক বস্তু নির্বাচন হবে  ${}^mC_p \times {}^nC_q \times {}^sC_t$  উপায়ে।

## সমজাতীয়/ভিন্ন জাতীয় বস্তু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে

সমজাতীয়/ভিন্ন বস্তু বাছাইয়ের অংক করতে গেলে সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সংখ্যা গুলোকে আলাদা করে বাছাই করতে হবে আর আমরা জানি যে একজাতীয়  $n$  সংখ্যক বস্তু হতে প্রতি বারে যতগুলোই বাছাই করা হোক না কেন তার বিন্যাস/সমাবেশ সবসময় 1।

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01. সব অক্ষর নিয়ে RAJSHAHI শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়?  
 [RU. Sinovac, Set-1. 20-21]  
 A. 4032 B. 8062 C. 2016 D. 1008

**SOWhy** নির্ণয় উপায় =  $\frac{8!}{2! \times 2!} = 10080$

02.  ${}^{2n}P_3 = 2 \times {}^nP_4$  হয়, তাহলে  $n$  এর মান নির্ণয় কর?  
 [RU. 18-19; BRU-D, 19-20; RU. 18-19, 14-15; JU. 13-14; CU-C, 16-17]  
 A. 8 B. 6 C. 4 D. 2  
**SOWhy**  ${}^{2n}P_3 = 2 \times {}^nP_4$   
 $\Rightarrow 2n(2n-1)(2n-2) = 2n(n-1)(n-2)(n-3)$   
 $\Rightarrow (2n-1)2(n-1) = (n-1)(n-2)(n-3)$   
 $\Rightarrow 2(2n-1) = n^2 - 2n - 3n + 6 \Rightarrow n^2 - 9n + 8 = 0$   
 $\Rightarrow n^2 - 8n - n + 8 = 0 \Rightarrow n(n-8) - 1(n-8) = 0 \therefore n = 1, 8$
03. যদি  ${}^nP_r = 336$  এবং  ${}^nC_r = 56$  হয় তবে,  $n = ?$  [CU-A, Set-1. 20-21]  
 A. 3 B. 6 C. 8 D. 10  
**SOWhy**  ${}^nP_r = 336$ ,  ${}^nC_r = 56$ ;  $r! = \frac{{}^nP_r}{{}^nC_r} = \frac{336}{56} = 6 = 3!$   
 $\therefore r = 3 \therefore {}^nP_3 = 336 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 336 \therefore n = 8$
04. CLOSE শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে কতগুলি বিন্যাস করা যায়? [JU-H. 14-15]  
 A. 240 B. 48 C. 120 D. 100  
**SOWhy** CLOSE শব্দটিতে মোট অক্ষর = 5টি  
 সাজানো যাবে =  $5! = 120$
05. APPLIED শব্দটির বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়? [RU. 08-09]  
 A. 1260 B. 2520 C. 2540 D. 5040  
**SOWhy** APPLIED শব্দটিতে মোট বর্ণ 7টি যাতে P আছে দুইটি করে।  
 $\therefore$  APPLIED শব্দটির সবগুলি বর্ণ নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হবে =  $\frac{7!}{2!} = 2520$
06. BANGLADESH শব্দটিতে কত ভাবে সাজানো যায় যেন "BANGLA" শব্দটি একত্রে থাকে? [RU. 18-19]  
 A. 43200 B. 8640 C. 5040 D. 120  
**SOWhy** 'BANGLA' শব্দটির বর্ণগুলোকে 1টি ধরে 'BANGLADESH' শব্দটির বিন্যাস =  $(1+4)! = 5! = 120$
07. স্বরবর্ণগুলোকে পৃথক না রেখে 'INSURANCE' শব্দটির অক্ষরগুলোকে একত্রে নিয়ে যত প্রকারে সাজানো যায় তা হলো- [CU-C, 09-10]  
 A. 8460 B. 8640 C. 8630 D. 6840 E. 4860  
**SOWhy** INSURANCE শব্দটিতে- I, U, A, E = 4টি স্বরবর্ণ  
 N, S, R, N, C = 5টি ব্যঞ্জনবর্ণ যেখানে 2টি N  
 স্বরবর্ণ 4টিকে 1টি বর্ণ ধরলে মোট বর্ণ  $(5+1) = 6$ টি  
 $\therefore$  স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে বিন্যাস সংখ্যা =  $\frac{6!}{2!} \times 4! = 8640$
08. PEOPLE শব্দটির অক্ষরগুলি একত্রে নিয়ে কতগুলি শব্দ পাওয়া যাবে যাদের মধ্যে দুইটি P পাশাপাশি থাকবে না? [RU. 09-10]  
 A. 180 B. 160 C. 120 D. 60  
**SOWhy** "PEOPLE" শব্দটিতে মোট বর্ণ 6 যাতে E, P আছে দুইটি করে।  
 যেহেতু, 2টি P একত্রে থাকবে, সেহেতু, বর্ণ 2টিকে একটি মাত্র বর্ণ ধরে মোট বর্ণসংখ্যা 5টি।  
 এই 5টি বর্ণকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় =  $\frac{5!}{2!}$  উপায়ে। 2টি P নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় =  $\frac{2!}{2!} = 1$  ভাবে।  
 $\therefore$  দুইটি P পাশাপাশি রেখে PEOPLE শব্দটির অক্ষরগুলোকে সাজানো সংখ্যা =  $\frac{5!}{2!} \times 1 = \frac{5!}{2!}$   
 $\therefore$  দুইটি P পাশাপাশি না রেখে মোট সাজানো সংখ্যা =  $\frac{6!}{2!2!} - \frac{5!}{2!} = 120$
09. 222334 দ্বারা ছয় অক্ষর কতগুলো বিভিন্ন সংখ্যা তৈরী করা যেতে পারে? [RU-C. 13-14]  
 A. 120 B. 30 C. 720 D. 60  
**SOWhy** সংখ্যার সংখ্যা =  $\frac{6!}{2!3!} = 60$



10. প্রতিবার প্রথমে ও শেষে U রেখে "CALCULUS" শব্দটির অক্ষরগুলোকে নিয়ে কতভাবে সাজানো যায়? [DU. 11-12; JnU 15-16, 11-12; JU. 15-16; RU. 08-09; SUST 04-05]  
A. 90 B. 180 C. 280 D. 360  
**[S@Why]** "CALCULUS" শব্দটিতে মোট অক্ষর 8টি, যাতে C, U, L আছে দুটি অক্ষর করে। প্রথম ও শেষ অক্ষর U হবে বিধায় প্রথম ও শেষ স্থান দুটিতে U এর বিন্যাস = 1; অবশিষ্ট 6টি অক্ষরের বিন্যাস 6!  
কিন্তু ইহাতে 2টি C ও দুইটি L থাকায় বিন্যাস হবে =  $\frac{6!}{2!2!} = 180$   
∴ নির্ণেয় বিন্যাস =  $1 \times 180 = 180$
11. যদি Ride শব্দটির অক্ষরগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয় তবে কতগুলি বিন্যাস স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হবে? [IU-A. 17-18]  
A. 6 B. 11 C. 12 D. 24  
**[S@Why]** RIDE শব্দটিতে মোট অক্ষর = 4টি; স্বরবর্ণ = I, E = 2টি  
∴ স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হবে এরূপ বিন্যাস =  $\frac{4!}{2!} \times 2 = 12$
12. যদি "TIME" শব্দটির অক্ষর গুলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়, তবে কতগুলো বিন্যাস স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হয়? [DU. 98-99]  
A. 6 B. 216 C. 12 D. 60  
**[S@Why]** TIME শব্দটিতে মোট বর্ণ 4টি। স্বরবর্ণ 2টি, ব্যঞ্জনবর্ণ 2টি।  
প্রথম স্থানে স্বরবর্ণকে বসানো উপায় =  ${}^2P_1 = 2$   
অবশিষ্ট 3টি স্থানে অবশিষ্ট 3টি বর্ণ বসানোর উপায় =  ${}^3P_3 = 6$   
স্বরবর্ণকে প্রথমে রেখে বিন্যাস =  $2 \times 6 = 12$   
স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হয়ে TIME শব্দটির পুনর্বিন্যাস = 12 [যেহেতু স্বরবর্ণ দ্বারা শুরু হলে TIME শব্দটি পাওয়া যায় না, সেহেতু পুনর্বিন্যাস বলা হলেও 1 বিয়োগ হবে না]
13. 0, 1, 2, 3, 4, 5 সংখ্যাগুলো দ্বারা ছয় অংক বিশিষ্ট কতটি অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যায়? [RU-H. 16-17; C<sub>3</sub>. 14-15]  
A. 610 টি B. 720 টি C. 560 টি D. 600 টি  
**[S@Why]** নির্ণেয় অর্থপূর্ণ সংখ্যা =  ${}^6P_6 - {}^5P_3 = 600$
14. কোন অংকের পুনরাবৃত্তি না করে 0, 3, 5, 6, 8 অংকগুলো দ্বারা 4000 এর চেয়ে বড় কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? [KU. 13-14]  
A. 168 B. 186 C. 268 D. 286  
**[S@Why]** 4000 এর চেয়ে বড় চার অংকবিশিষ্ট সংখ্যা হল =  ${}^4P_3 \times 3 = 72$   
আবার, পাঁচ অংকবিশিষ্ট সংখ্যা =  ${}^5P_5 - {}^4P_4 = 96$   
∴ মোট সংখ্যা =  $72 + 96 = 168$ টি
15. পূর্ণসংখ্যা 4টি ফুটবল ম্যাচের ফলাফল কেমন হতে পারে? [RU-F. 14-15]  
A.  $2^4$  B.  $3^4$  C.  $2^3$  D.  $4^3$   
**[S@Why]** মোট ফলাফল =  $3^{\text{ম্যাচ}} = 3^4$
16. 5 টি মুদ্রা 4টি দানবক্রে কতভাবে ফেলা যায়? [JKNU. 18-19]  
A.  $4^4$  B.  $4^5$  C.  $5^4$  D.  $5^5$   
**[S@Why]** (দানবক্রে)  $^4P_5 = (4)^5$
17. একটি পদে 3 জন প্রার্থী এবং 5 জন লোকের ভোটে নির্বাচিত হবে। কত প্রকারে ভোট দেয়া যেতে পারে? [KU. 12-13]  
A. 243 B. 245 C. 244 D. 10  
**[S@Why]** (প্রার্থী)  $^3P_5 = 3^5 = 243$
18.  ${}^{2n}C_r = {}^{2n}C_{r+2}$  হলে 'r' এর মান কত? [CU-A, Set-3. 20-21]  
A. n-2 B. n-1 C. n+2 D. n+1  
**[S@Why]**  ${}^{2n}C_r = {}^{2n}C_{r+2}$  ∴  $r + r + 2 = 2n$  ∴  $r = n - 1$
19. যদি  ${}^{n-1}C_1 = 36$ ,  ${}^nC_r = 84$  এবং  ${}^{n+1}C_r = 36$  হয়, তবে r এর মান কত? [CU-D, Set-1. 20-21]  
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4  
**[S@Why]**  ${}^{n-1}C_1 = 36$ ,  ${}^nC_r = 84$ ,  ${}^{n+1}C_r = 126$   
এখন  ${}^{n-1}C_1 = {}^nC_2$ ,  ${}^nC_r = {}^nC_3$ ,  ${}^{n+1}C_r = {}^nC_4$  ∴  $r = 3$
20. যদি  ${}^nC_r = {}^nC_8$  তবে, তবে n এর মান কত? [JnU. 12-13, JU. 09-10]  
A. 12 B. 14 C. 20 D. 18  
**[S@Why]**  ${}^nC_r = {}^nC_8$  ∴  $n = 6 + 8 = 14$
21. 6 জন বালক এবং 5 জন বালিকা থেকে কত উপায়ে 3 জন বালক এবং 2 জন বালিকার একটি দল গঠন করা যাবে? [RU. Astrazeneca, Set-1. 20-21]  
A. 100 B. 150 C. 200 D. 50  
**[S@Why]** নির্ণেয় দল গঠন =  ${}^6C_3 \times {}^5C_2 = 200$
22. এক ব্যক্তির 6 জন বন্ধু আছে। তিনি কত প্রকারে একজন বা একাধিক বন্ধুকে দাওয়াত করতে পারেন- [KU 14-15, RU 13-14, CU 02-03]  
A. 36 B. 63 C. 73 D. 93  
**[S@Why]** একজন বা একাধিক বন্ধুকে দাওয়াত করার সংখ্যা =  $2^6 - 1 = 2^6 - 1 = 63$
23. "EQUATION" শব্দটির বর্ণগুলো থেকে তিনটি করে বর্ণ একত্রে নিয়ে কতটি শব্দ বানানো যায়? [JU. 09-10]  
A. 48 B. 68 C. 84 D. 56  
**[S@Why]** নির্ণেয় বাছাই সংখ্যা =  ${}^8C_3 = 56$
24. একটি স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে 4 জন পুরুষ ও 3 জন মহিলা সদস্য আছেন। শুধু পুরুষ বা শুধু মহিলা নিয়ে 2 সদস্য বিশিষ্ট কতগুলো উপ-কমিটি হবে? [JU. 12-13]  
A. 6 B. 3 C. 9 D. 12  
**[S@Why]** নির্ণেয় উপ-কমিটি সংখ্যা =  ${}^4C_2 + {}^3C_2 = 9$
25. একটি ষড়ভুজ কয়টি কর্ণ আঁকা যায়? [JU. 17-18]  
A. 6 B. 9 C. 4 D. 12  
**[S@Why]** কর্ণের সংখ্যা =  ${}^6C_2 - 6 = 9$
26. অসমভুজাল ও অসমবিন্দু 10টি সরল রেখা দ্বারা কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যাবে? [KU 09-10]  
A. 130 B. 120 C. 124 D. 121  
**[S@Why]** ত্রিভুজ সংখ্যা =  ${}^{10}C_3 = 120$
27. AMERICA শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়? [JU-H. 17-18]  
A. 2250 B. 2520 C. 5520 D. 2200  
**[S@Why]** AMERICA শব্দটিতে মোট অক্ষর, n = 7টি, A = 2টি  
∴ সাজানো যাবে =  $\frac{7!}{2!} = 2520$

## PRIME TEST


01.  ${}^{2n}P_3 = 2 \times {}^nP_4$  হয়, তাহলে n এর মান নির্ণয় কর?  
A 8 B 6 C 4 D 2
02.  ${}^nP_r : {}^nC_r = k : 1$  হলে k এর মান কত?  
A n B r C n! D r!
03. 6 জন বালক 4 আসনের একটি বেঞ্চে কতভাবে বসতে পারে?  
A 6! B 4! C  ${}^6P_4$  D  ${}^6P_4$
04. APPLIED শব্দটির বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়?  
A 1260 B 2520 C 2540 D 5040
05. 'ASSASSINATION' শব্দটির অক্ষরগুলো দিয়ে কতটি বিন্যাস তৈরি করা যায় তার সংখ্যা নিরূপণ কর?  
A 13! B  $\frac{13}{3!}$  C  $\frac{13}{3}$  D  $\frac{13!}{36 \times 16}$
06. DEVASTATION শব্দটির বর্ণগুলো থেকে প্রতিবার 8টি করে বর্ণ যদি এমনভাবে বাছাই করা হয় যে, দুটি বর্ণ এক জাতীয় ও অপর দুটি বর্ণ অন্য এক জাতীয় তাহলে সাজানোর সংখ্যা কত হবে?  
A 1 B 2 C 4 D 6
07. 'ENGINEERING' শব্দের সকল E গুলো একসঙ্গে রেখে সকল অক্ষরগুলোর বিন্যাসের সংখ্যা-  
A 1680 B 15120 C 277200 D 1512
08. 3টি স্বরবর্ণযুক্ত করে 7 অক্ষর বিশিষ্ট একটি শব্দে স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি না রেখে মোট বিন্যাস সংখ্যা হবে-  
A 5040 B 1440 C 3200 D 3600
09. LOVE শব্দটি স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি না রেখে কত ভাবে সাজানো যায়-  
A 24 B 18 C 12 D 6



10. 1, 2, 4, 6, 8, 9 অঙ্কগুলি পুনরাবৃত্তি সহ ব্যবহার করে তিন অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা তৈরী করা যাবে?  
 (A) 120 (B) 216 (C) 2 (D) 60
11. SCHOOL শব্দটি হতে তিনটি অক্ষর নিয়ে পৃথকভাবে সাজানো সংখ্যা-  
 (A) 10 (B) 14 (C) 4 (D) 15
12. THESIS শব্দটির বর্ণগুলো হতে 4 টি নিয়ে মোট সমাবেশ সংখ্যা হল-  
 (A) 14 (B) 12 (C) 15 (D) 11
13. চারজন মহিলা ও ছয়জন পুরুষের মধ্য হতে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি উপকমিটি কত প্রকারে গঠন করা যাবে, যাতে একজন নির্দিষ্ট পুরুষ সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত হবে-  
 (A) 504 (B) 210 (C) 126 (D) 84
14. 9 ব্যক্তির একটি দল দুটি যানবাহনে ভ্রমণ করে, যার একটিতে সাত জনের বেশি এবং অন্যটিতে চার জনের বেশি ধরে না। দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারে?  
 (A) 246 (B) 105 (C) 126 (D) 335
15. বারটি বইয়ের মধ্যে পাঁচটি বই কত প্রকারে বাছাই করা যায়, যাতে নির্দিষ্ট দুইটি বই সর্বদা বাদ থাকে?  
 (A) 120 (B) 225 (C) 252 (D) 128
16. একটি 15 ভূজ ক্ষেত্রের 15টি শীর্ষ বিন্দু দ্বারা গঠিত কর্ণের সংখ্যা কত?  
 (A) 80 (B) 85 (C) 90 (D) 105
17. টেলিফোন ডায়ালে 0 হতে 9 পর্যন্ত লেখা থাকে। যদি সাভারের টেলিফোনগুলো 5 অঙ্ক বিশিষ্ট হয়, তবে সাভারে কত টেলিফোন সংযোগ করা যাবে?  
 (A)  $9 \times 10^5$  (B)  $10^5$  (C)  $10^6$  (D)  $10^7$
18. একটি সভা শেষে সভাপতি ব্যতীত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করলে করমর্দনের সংখ্যা 21টি হয়, কতজন লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন?  
 (A) 5 (B) 8 (C) 6 (D) 7
19. If  ${}^nC_{12} = {}^nC_8$ , then  ${}^{22}C_n = ?$   
 (A) 231 (B) 321 (C) 123 (D) 132
20. LOGARITHMS শব্দটির বর্ণগুলি থেকে তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও দুটি স্বরবর্ণ কত প্রকারে বাছাই করা যায়?  
 (A) 120 (B) 100 (C) 105 (D) 125

☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | A     | ${}^nP_3 = 2 \times {}^nP_4$<br>$\Rightarrow 2n(2n-1)(2n-2)$<br>$= 2n(n-1)(n-2)(n-3)$<br>$\Rightarrow (2n-1)2(n-1)$<br>$= (n-1)(n-2)(n-3)$<br>$\Rightarrow 2(2n-1) = n^2 - 2n - 3n + 6$ |
| 02     | D     | $\frac{{}^nP_r}{{}^nC_r} = k$<br>$\Rightarrow \frac{{}^nC_r \times r!}{{}^nC_r} = k$<br>$\Rightarrow k = r!$                                                                            |
| 03     | D     | ${}^nP_r = {}^6P_4$                                                                                                                                                                     |
| 04     | B     | APPLIED শব্দটিতে মোট বর্ণ 7টি যাতে P আছে দুইটি করে।<br>$\therefore$ APPLIED শব্দটির সবগুলি বর্ণ নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হবে $= \frac{7!}{2!} = 2520$                                       |
| 05     | D     | ASSASSINATION শব্দটিতে মোট অক্ষর = 13<br>A = 3টি, S = 4টি, I = 2টি, N = 2টি<br>$\therefore$ বিন্যাস $= \frac{13!}{3!4!2!2!} = \frac{13!}{36 \times 16}$                                 |
| 06     | D     | এখানে, দুটি T, দুটি A রয়েছে,<br>$\therefore$ মোট সাজানোর সংখ্যা $= \frac{4!}{2! \times 2!} = 6$                                                                                        |

| প্রশ্ন | উত্তর      | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-----|---|---|------|---|---|-------|---|---|------|---|---|
| 07     | B          | 'ENGINEERING' শব্দটিতে মোট বর্ণ 11টি যাতে E ও N আছে তিনটি করে এবং I ও G আছে দুইটি করে। যেহেতু, E 3টি একত্রে থাকবে, সেহেতু, E তিনটিকে একটি মাত্র বর্ণ ধরে মোট বর্ণসংখ্যা 9টি।<br>$\therefore$ E গুলো একসঙ্গে রেখে সকল অক্ষরগুলোর বিন্যাসের সংখ্যা $= \frac{9!}{3!2!2!} = 15120$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 08     | B          | স্বরবর্ণ = 3টি, ব্যঞ্জনবর্ণ = 4<br>ব্যঞ্জনবর্ণ 4টি দ্বারা 4টি স্থান পূর্ণ করা যায় $= 4P_4 = 4! = 24$ উপায়ে<br>ভিতরের 3টি ও বাহিরের 2টি সহ মোট 5টি স্থান পূর্ণ করা যায় $= 5P_3 = 60$ উপায়ে<br>মোট বিন্যাস $= 24 \times 60 = 1440$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 09     | C          | সাজানো সংখ্যা $= 4! - 3! \times 2! = 12$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 10     | B          | এখানে, মোট অঙ্ক 6টি। $\therefore n=6, r=3 \therefore$ নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা $= 6^3 = 216$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 11     | B          | SCHOOL শব্দটিতে মোট 6 টি বর্ণ আছে এবং এর মধ্যে 2টি 'O' সুতরাং প্রতিবারে 3টি করে বর্ণ নিয়ে নিম্নবর্ণিতভাবে বাছাই করা যেতে পারে:<br>(i) 2টি বর্ণ অভিন্ন এবং অপর 1টি ভিন্ন। একত্রে বাছাই সংখ্যা $= 1 \times {}^4C_1 = 4$<br>(ii) 3টি বর্ণই ভিন্ন। একত্রে বাছাই সংখ্যা $= {}^5C_3 = 10$<br>$\therefore$ বর্ণগুলো বাছাইয়ের মোট সংখ্যা $= 4+10=14$<br>N.B: প্রশ্নটির বাংলা অংশে ভুল ছিল। সাজানোর পরিবর্তে বাছাই হবে।                                                                                                                                                       |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 12     | D          | 2টি s ও 2টি ভিন্ন নিয়ে বাছাই $= 1 \times {}^4C_2 = 6$<br>সব ভিন্ন নিয়ে বাছাই $= {}^5C_4 = 5$<br>$\therefore$ নির্ণেয় সমাবেশ $= 5+6=11 \therefore$ মোট বাছাই $= 6+5=11$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 13     | D          | কমিটি গঠনের সম্ভাব্য উপায়গুলো নিম্নরূপ:<br>[একজন নির্দিষ্ট পুরুষ সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত]<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>উপায়</th><th>পুরুষ (6)</th><th>মহিলা (4)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr> <td>(iii)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>(iv)</td><td>1</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> $\therefore$ কমিটি গঠনের উপায় $= {}^5C_3 \times {}^4C_0 + {}^5C_2 \times {}^4C_1 + {}^5C_1 \times {}^4C_2 + {}^5C_0 \times {}^4C_3$<br>$= 10 + 40 + 30 + 4 = 84$ | উপায় | পুরুষ (6)  | মহিলা (4)   | (i) | 4 | 0 | (ii) | 3 | 1 | (iii) | 2 | 2 | (iv) | 1 | 3 |
| উপায়  | পুরুষ (6)  | মহিলা (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (i)    | 4          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (ii)   | 3          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (iii)  | 2          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (iv)   | 1          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 14     | A          | দলটির ভ্রমণের সম্ভাব্য উপায়গুলো নিম্নরূপ:<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>উপায়</th><th>১ম যানবাহন</th><th>২য় যানবাহন</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td><td>7</td><td>2</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>6</td><td>3</td></tr> <tr> <td>(iii)</td><td>5</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> $\therefore$ প্রথম যানবাহনে ভ্রমণের উপায় $= {}^9C_7 + {}^9C_6 + {}^9C_5 = 36 + 84 + 126 = 246$<br>দ্বিতীয় যানবাহনের জন্য লোক বাছাই করলেও ফলাফল একই হবে।                                                                                              | উপায় | ১ম যানবাহন | ২য় যানবাহন | (i) | 7 | 2 | (ii) | 6 | 3 | (iii) | 5 | 4 |      |   |   |
| উপায়  | ১ম যানবাহন | ২য় যানবাহন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (i)    | 7          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (ii)   | 6          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| (iii)  | 5          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 15     | C          | যেহেতু, নির্দিষ্ট দুইটি বই সর্বদা বাদ থাকে।<br>$\therefore$ নির্ণেয় বাছাই সংখ্যা $= {}^{10}C_5 = 252$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 16     | C          | 15 ভূজ ক্ষেত্রের 15টি শীর্ষ বিন্দু দ্বারা গঠিত কর্ণের সংখ্যা $= {}^{15}C_2 - 15 = 90$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 17     | B          | 10টি অঙ্ক 5 অঙ্কের সংখ্যায় বসানো<br>যাবে $= 10^5$ প্রকার<br>$\therefore$ টেলিফোন সংযোগ যাবে $= 10^5$<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 18     | D          | মনে করি, লোকসংখ্যা n, তাহলে ${}^nC_2 = 21$<br>$\Rightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 21 \Rightarrow n^2 - n = 42 \Rightarrow n^2 - n - 42 = 0$<br>$\Rightarrow (n-7)(n+6) = 0 \Rightarrow n = 7, n \neq -6 \therefore n = 7$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 19     | A          | ${}^nC_{12} = {}^nC_8 \therefore n=12+8=20 \therefore {}^{22}C_n = {}^{22}C_{20} = 231$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |
| 20     | A          | ${}^nC_{12} = {}^nC_8 \therefore n=12+8=20 \therefore {}^{22}C_n = {}^{22}C_{20} = 231$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |             |     |   |   |      |   |   |       |   |   |      |   |   |



অধ্যায়  
০৬

## ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

গণিত  
১ম পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস্                                                           | V.V.I RATE |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| TOPIC-01 | বিভিন্ন ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে সম্পর্ক                           | ★          |
| TOPIC-02 | বৃত্তের ব্যাসার্ধ, চাপ ও উৎপন্ন কোণের সম্পর্ক                      | ★★         |
| TOPIC-03 | ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায়কাল বা মৌলিক ব্যবধান নির্ণয় সংক্রান্ত | ★★★        |
| TOPIC-04 | সর্বোচ্চ মান ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় সংক্রান্ত                     | ★★         |
| TOPIC-05 | ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সংক্রান্ত                           | ★          |
| TOPIC-06 | ঘড়ির কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ সংক্রান্ত                               | ★★         |

### এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বৃত্তের ব্যাসার্ধ, চাপ ও উৎপন্ন কোণের সম্পর্ক         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (i)                                                   | $r$ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট যে কোন বৃত্তে যে কোন চাপ $S$ যদি কেন্দ্রে $\theta^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে তবে, উৎপন্ন কোণ = $\frac{\text{চাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}$ or, $\theta^\circ = \frac{S}{r}$<br>$\therefore \theta^\circ$ কোণ উৎপন্ন করলে ক্ষেত্রফল = $\frac{\pi r^2}{360^\circ} \theta^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\pi \theta^\circ}{180} \times r^2 = \frac{1}{2} r^2 \theta^\circ$                                                                                                                          |
| মৌলিক পর্যায়/নিয়মিত ব্যবধান/মৌলিক ব্যবধান           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}$ এর ক্ষেত্রে- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ◆ Power বিজোড় হলে পর্যায়কাল =                       | $\frac{2\pi}{\text{চলকের সহগ}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ◆ Power জোড় হলে পর্যায়কাল =                         | $\frac{\pi}{\text{চলকের সহগ}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\tan, \cot$ এর ক্ষেত্রে-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ◆ Power যাই হোক পর্যায়কাল =                          | $\frac{\pi}{\text{চলকের সহগ}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| সর্বোচ্চ মান ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় সংক্রান্ত        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (a)                                                   | একটি রাশি $a \sin x + b \cos x + c$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান বের করতে হবে।<br>$a \sin x + b \cos x + c = \sqrt{a^2 + b^2} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right) + c$<br>$= \sqrt{a^2 + b^2} (\sin x \cos \theta + \cos x \sin \theta) + c$<br>$= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \theta) + c$<br>এখন, $-1 \leq \sin(x + \theta) \leq 1$<br>$\therefore$ রাশির সর্বোচ্চ মান = $\sqrt{a^2 + b^2} + c$<br>$\therefore$ রাশির সর্বনিম্ন মান = $-\sqrt{a^2 + b^2} + c$ |
| (b)                                                   | ভিন্ন কোণ যুক্ত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ক্ষেত্রে মান সর্বোচ্চ হবে যখন প্রতিটি পদের মান পৃথক পৃথক সর্বোচ্চ হবে এবং মান সর্বনিম্ন হবে যখন প্রতিটি পদের মান পৃথক পৃথক সর্বনিম্ন হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01.  $\sin \theta$  অনুপাতের নিয়মিত ব্যবধান কোনটি?

[JU. 17-18]

- A.  $\frac{\pi}{2}$  B.  $\pi$   
C. 0 D.  $2\pi$

**S@Why**  $\sin \theta$  অনুপাতের নিয়মিত ব্যবধান =  $2\pi$

02. 1 রেডিয়ান সমান কত?

[JU. 09-10]

- A.  $2\pi$  সমকোণ B.  $\frac{2}{\pi}$  সমকোণ C. 2 সমকোণ D.  $\pi$  সমকোণ

**S@Why** 1 রেডিয়ান =  $\frac{2}{\pi}$  সমকোণ

03.  $\frac{7\pi}{20}$  রেডিয়ান = কত ডিগ্রী?

[CU. 15-16]

- A.  $73^\circ$  B.  $85^\circ$  C.  $64^\circ$   
D.  $63^\circ$  E.  $90^\circ$

**S@Why**  $\frac{7 \times 180^\circ}{20} = 63^\circ$

04. 5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের একটি চাপ  $40^\circ$  কোণ উৎপন্ন করলে ঐ চাপের দৈর্ঘ্য কত সে. মি.?

[GST-A, Set-4 2023-24]

- A. 3.641 B. 3.491 C. 3.520 D. 4.20

**S@Why**  $S = r\theta = 5 \times \frac{40 \times \pi}{180} = 3.49$

05. কোট্যানজেন্ট ফাংশনের মৌলিক পর্যায় কত?

[RU. C: 14-15, IU- 18-19]

- A.  $2\pi$  B.  $\pi$  C.  $\frac{\pi}{2}$  D.  $\frac{3\pi}{2}$

**S@Why**  $\cot$  এর মৌলিক পর্যায়কাল =  $\pi$

06.  $\tan \frac{3x}{2}$  এর মৌলিক পর্যায় কোনটি?

[JKKNU. 19-20]

- A.  $\frac{\pi}{3}$  B.  $\frac{2\pi}{3}$  C.  $\pi$  D.  $\frac{3\pi}{2}$

**S@Why**  $\tan \frac{3x}{2}$  এর মৌলিক পর্যায় =  $\frac{\pi}{\text{চলকের সহগ}} = \frac{\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{2\pi}{3}$

07.  $\tan x$  এর পর্যায়কাল-

[JNU. 09-10]

- A.  $2\pi$  B.  $\pi$  C.  $3\pi$  D.  $4\pi$

**S@Why**  $\tan/\cot$  এর পর্যায়কাল =  $\pi$

08.  $5\sin(x + 30^\circ) - 2$  এর সর্বোচ্চ মান-

[JU. 09-10]

- A. 5 B. 3 C. -5 D. 7

**S@Why** রাশিটির মান সর্বোচ্চ হবে যদি  $\sin(x + 30^\circ)$  এর মান সর্বোচ্চ হয়।  $\sin(x + 30^\circ)$  এর সর্বোচ্চ মান = 1

$\therefore 5\sin(x + 30^\circ) - 2 = 5 - 2 = 3$

09.  $\sin \theta$  ও  $\cos \theta$  এর মান সব সময়-

[IU. 17-18; SAU. 05-06]

- A. -1 থেকে 0 B. 0 থেকে 1 C. -1 থেকে 1 D.  $-\infty$  থেকে  $\infty$

**S@Why**  $\sin \theta, \cos \theta$  এর রেঞ্জ  $[-1, 1]$

10. বিকাল 5 টায় ঘড়ির ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে কোণের পরিমাণ-

[JU. 11-12]

- A.  $150^\circ$  B.  $120^\circ$  C.  $180^\circ$  D. কোনটিই নয়

**S@Why** ঘড়ির ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ,

$$\theta = \left| \frac{11}{2} M - 30H \right| = \left| \frac{11}{2} \times 0 - 30 \times 5 \right| = 150^\circ$$

### PRIME TEST

01.  $5\sin(x + 30^\circ) - 2$  এর সর্বোচ্চ মান-

- A. 5 B. 3 C. -5 D. 7

02.  $\tan \theta$  এর রেঞ্জ কোনটি?

- A.  $(-\infty, 0)$  B.  $(0, \infty)$  C.  $[-1, 1]$  D.  $(-\infty, \infty)$

03.  $\sec \theta$  ফাংশনটির বিস্তার কত?

- A.  $[-1, 1]$  B.  $\mathbb{R}$  C.  $\mathbb{R} - (-1, 1)$  D. কোনটিই নয়

04.  $\frac{7\pi}{20}$  রেডিয়ান = কত ডিগ্রী?

- A.  $73^\circ$  B.  $85^\circ$  C.  $64^\circ$  D.  $63^\circ$



15.  $\sin(4x+1)$  এর পর্যায় কত?

- Ⓐ  $4\pi$       Ⓑ  $\pi$       Ⓒ  $2\pi$       Ⓓ  $\frac{\pi}{2}$

16.  $\tan x$  এর পর্যায়কাল-

- Ⓐ  $2\pi$       Ⓑ  $\pi$       Ⓒ  $3\pi$       Ⓓ  $4\pi$

17.  $\tan \frac{3x}{2}$  এর মৌলিক পর্যায় কোনটি?

- Ⓐ  $\frac{\pi}{3}$       Ⓑ  $\frac{2\pi}{3}$       Ⓒ  $\pi$       Ⓓ  $\frac{3\pi}{2}$

18.  $\sec \frac{x}{4}$  এর মৌলিক পর্যায় কত?

- Ⓐ  $\frac{\pi}{2}$       Ⓑ  $2\pi$       Ⓒ  $4\pi$       Ⓓ  $8\pi$

19.  $\sin(1110^\circ)$  এর মান কত?

- Ⓐ  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       Ⓑ  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$       Ⓒ  $-\frac{1}{2}$       Ⓓ  $\frac{1}{2}$

20. ৩০ মিনিট ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?

- Ⓐ  $60^\circ$       Ⓑ  $75^\circ$       Ⓒ  $90^\circ$       Ⓓ  $105^\circ$

21.  $\tan(-1125^\circ) = ?$

- Ⓐ 1      Ⓑ -1      Ⓒ 0      Ⓓ  $\frac{1}{2}$

22. ত্রিকোণমিতিক কাংশনে  $\sin e$  ও  $\theta$  কোণ  $270^\circ$  থেকে বেড়ে  $360^\circ$  হলে,  $\sin \theta$  এর মান -1 থেকে বেড়ে কত হবে?

- Ⓐ 0      Ⓑ 1      Ⓒ -1      Ⓓ -2

23.  $\frac{7\pi}{15}$  রেডিয়ান কোণের বাটবুলক পদ্ধতিতে মান কত?

- Ⓐ  $80^\circ$       Ⓑ  $81^\circ$       Ⓒ  $82^\circ$       Ⓓ  $84^\circ$

24. বিকল 5 টার ঘন্টার ও মিনিটের কাঁটার মাঝে কোণের পরিমাণ-

- Ⓐ  $150^\circ$       Ⓑ  $120^\circ$   
Ⓒ  $180^\circ$       Ⓓ কোনটিই নয়

25.  $\sin \theta$  অনুপাতের নিরূপিত ব্যবধান কোনটি?

- Ⓐ  $\frac{\pi}{2}$       Ⓑ  $\pi$   
Ⓒ 0      Ⓓ  $2\pi$

26. কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান লম্ববিশিষ্ট চাপ কেন্দ্রে যে কোণ ধারণ করে তাকে বলে-

- Ⓐ এক ডিগ্রি      Ⓑ এক সেকেন্ড  
Ⓒ বাটবুলক      Ⓓ এক রেডিয়ান

27.  $21^\circ =$  কত রেডিয়ান?

- Ⓐ  $0.35^\circ$       Ⓑ  $28^\circ 27'$   
Ⓒ  $12^\circ 63'$       Ⓓ  $160^\circ$

28. কোনটি জ্যামিতিক কোণ?

- Ⓐ  $-\frac{\pi}{3}$       Ⓑ  $\frac{4\pi}{3}$   
Ⓒ  $-\frac{4\pi}{3}$       Ⓓ  $3\pi$

29. একটি বৃত্তের দুইটি কোণ  $70^\circ$  ও  $90^\circ$ । ওর কোণটির মান রেডিয়ানে কত?

- Ⓐ  $20^\circ$       Ⓑ  $\frac{\pi}{6}$   
Ⓒ  $\frac{\pi}{9}$       Ⓓ  $\frac{\pi}{12}$

30. একটি বৃত্তের কেন্দ্রে  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 3cm হলে, বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

- Ⓐ  $\frac{2\pi}{3}$       Ⓑ  $\frac{\pi}{2}$       Ⓒ  $\frac{3\pi}{2}$       Ⓓ কোনটিই নয়

## ⊕ Answer Analysis ⊕

| প্রশ্ন উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 B         | কোন বৃত্তের মান সর্বোচ্চ হয়ে যদি $\sin(x+30^\circ)$ এর মান সর্বোচ্চ হয়<br>$\sin(x+30^\circ)$ এর সর্বোচ্চ মান = 1<br>$\therefore 5\sin(x+30^\circ) - 2 = 5 - 2 = 3$                                                                                                                        |
| 02 D         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 03 C         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 04 D         | $\frac{7 \times 180}{20} = 63^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 05 D         | কোন ত্রিকোণমিতিক কাংশনের পর্যায়কাল বের করতে হলে তার মৌলিক পর্যায়কালকে প্রদত্ত ত্রিকোণমিতিক কাংশনের কোণের $x$ -এর সহগ দ্বারা ভাগ করতে হয়। এখানে, $x$ -এর সহগ = 4 এবং $\sin x$ -কাংশনের মৌলিক পর্যায় = $2\pi$<br>$\therefore \sin(4x+1)$ এর পর্যায়কাল = $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ |
| 06 B         | $\tan \cot$ এর পর্যায়কাল = $\pi$                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 07 B         | $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় = $\frac{\pi}{\text{সহগের সহগ}} = \frac{\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{2\pi}{3}$                                                                                                                                                                            |
| 08 D         | $\sec x = \sec(2\pi + x) = \sec(4\pi + x) = \sec(6\pi + x)$<br>তাহলে $\sec x$ এর পর্যায় মৌলিক পর্যায়কাল = $2\pi$<br>$\sec \frac{\pi}{4}$ এর মৌলিক পর্যায়কাল = $4 \times 2\pi = 8\pi$                                                                                                     |
| 09 D         | $\sin(1110^\circ) = \sin(3 \times 360^\circ + 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                      |
| 10 B         | ৩ টি 30 মি. ঘন্টার কাঁটার অবস্থান<br>নির্ণের মধ্যবর্তী কোণ = $\left  \frac{60H - 11M}{2} \right ^\circ$<br>$= \left  \frac{60 \times 5 - 11 \times 30}{2} \right ^\circ = \left  \frac{480 - 330}{2} \right ^\circ = \left  \frac{150}{2} \right ^\circ = 75^\circ$                         |
| 11 B         | $\tan(-1125^\circ) = -\tan(3 \times 360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$                                                                                                                                                                                                            |
| 12 A         | $\sin e$ ও $\theta$ কোণ $270^\circ$ থেকে বেড়ে $360^\circ$ হলে, $\sin \theta$ এর মান -1 থেকে বেড়ে 0 হবে।                                                                                                                                                                                   |
| 13 D         | $\frac{7 \times 180}{15} = 84^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 A         | ঘন্টার ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ<br>$\theta = \left  \frac{11}{2}M - 30H \right  = \left  \frac{11}{2} \times 0 - 30 \times 5 \right  = 150^\circ$                                                                                                                                     |
| 15 D         | $\sin \theta$ অনুপাতের নিরূপিত ব্যবধান = $2\pi$                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 D         | কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোণ ধারণ করে তাকে বলে এক রেডিয়ান।                                                                                                                                                                                                             |
| 17 A         | $21^\circ$ এর সর্বোচ্চ মান 1 এবং সর্বনিম্ন মান 0                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 B         | জ্যামিতিক কোণ কখনো অশূন্যক হয়ে পারে না এবং এর মান $0^\circ$ থেকে $360^\circ$ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।                                                                                                                                                                                            |
| 19 C         | দুইটি কোণটির মান<br>$= 180^\circ - (70^\circ + 90^\circ) =$<br>$20^\circ = 20 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9}$ রেডিয়ান                                                                                                                                                              |
| 20 C         | <br>$A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{2} r^2$<br>$= \frac{\pi}{6} \times (3)^2 = \frac{3\pi}{2}$ বর্গ একক                                                                                               |



| অধ্যায় | সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক<br>অনুপাত | পাঁচ<br>১ম পর্ব |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| ০৭      |                                      |                 |

| TOPICS   | সাজেশনস্                                                                                           | V.V.I<br>RATE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | $\sin^2\theta$ ও $\cos^2\theta$ এর ধরার মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                      | ★★            |
| TOPIC-02 | সহজগতিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সত্রোত্ত                                                         | ★             |
| TOPIC-03 | জানা কোণের ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                                | ★★            |
| TOPIC-04 | অজানা কোণের ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ                               | ★★            |
| TOPIC-05 | কোণ পূর্ণ সংখ্যা (N) এর চলিতক আকারে থাকলে ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ | ★★            |
| TOPIC-06 | ত্রিকোণমিতিক অভ্যেদাবলী                                                                            | ★             |
| TOPIC-07 | ত্রিভুজের sin ও cosine সূত্রের ব্যবহার                                                             | ★★            |
| TOPIC-08 | ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সত্রোত্ত                                                               | ★★            |
| TOPIC-09 | তত্ত্ব সেগ্রে না থাকলে ত্রিভুজের রাশিমালায় মান নির্ণয় সত্রোত্ত                                   | ★             |

### এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

| $\sin/\cos$ এর বৈশিষ্ট্য কোণের সূত্র                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$                                     |
| $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$                                     |
| $2\sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$                                              |
| $2\cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$                                              |
| $2\cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$                                              |
| $2\sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$                                              |
| $\sin C + \sin D = 2\sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$                            |
| $\sin C - \sin D = 2\cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$                            |
| $\cos C + \cos D = 2\cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$                            |
| $\cos C - \cos D = 2\sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$                            |
| $\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$                      |
| $\cos(A+B)\cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$                      |
| $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A \Rightarrow \sin^3 A = \frac{1}{4}(3\sin A - \sin 3A)$ |
| $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A \Rightarrow \cos^3 A = \frac{1}{4}(\cos 3A + 3\cos A)$ |
| $\sin 2A = 2\sin A \cos A$                                                            |
| $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$                                                       |
| $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$ ; $2\sin^2 A = 1 - \cos 2A$                                 |
| $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ ; $2\cos^2 A = 1 + \cos 2A$                                 |
| $\sin 2A = \frac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$                                              |
| $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$                                         |

| $\tan/\cot$ এর বৈশিষ্ট্য কোণের সূত্র                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$                                                                                                   |
| $\cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$                                                                                                   |
| $\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$                                                                                                                          |
| $\cot 3A = \frac{\cot^3 A - 3\cot A}{3\cot^2 A - 1}$                                                                                                              |
| $\tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$                                                                                                              |
| $\tan^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{1 + \cos 2A}$                                                                                                                      |
| ত্রিভুজের সূত্র সমূহ                                                                                                                                              |
| ত্রিভুজের sine এর সূত্র                                                                                                                                           |
| ত্রিভুজের cosine এর সূত্র                                                                                                                                         |
| $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ [R = পরিব্যাসার্ধ]                                                                                  |
| $1. \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$                                                                                                                         |
| $2. \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac}$                                                                                                                         |
| $3. \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$                                                                                                                         |
| ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, $\frac{1}{2} \times$ বাহুর দৈর্ঘ্য $\times$ বাহুর দৈর্ঘ্যের অন্তর্ভুক্ত কোণের sin                                                            |
| ত্রিভুজের অর্ধ পরিমিতি                                                                                                                                            |
| একটি ত্রিভুজের অর্ধ পরিমিতি $= \frac{a+b+c}{2}$                                                                                                                   |
| ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ $R = \frac{abc}{4\Delta}$                                                                                                                  |
| ক্ষেত্রফল $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$                                                                                                                      |
| ত্রিভুজের অন্তর্ব্যাসার্ধ $r = \frac{\Delta}{s}$                                                                                                                  |
| অভিক্ষেপ-সূত্র:                                                                                                                                                   |
| i) $a = b \cos C + c \cos B$                                                                                                                                      |
| ii) $b = c \cos A + a \cos C$                                                                                                                                     |
| iii) $c = a \cos B + b \cos C$                                                                                                                                    |
| $\sin^2\theta$ ও $\cos^2\theta$ এর ধরা থাকলে মান নির্ণয়                                                                                                          |
| ধরার মানটির ক্ষেত্রে $\sin^2\theta$ এবং $\cos^2\theta$ এর জন্য আগে পদ সংখ্যা বের করতে হবে। পদ সংখ্যা $= \frac{\text{শেষ পদ} - 1 \text{ম পদ}}{\text{ব্যবধান}} + 1$ |
| (i) পদ সংখ্যা জোড় হলে Answer $= \frac{n}{2}$                                                                                                                     |
| (ii) পদ সংখ্যা বিজোড় হলে Answer $= \frac{n-1}{2} + (\sin^2\theta / \sin^2 90 / \cos^2\theta / \cos^2 90)$                                                        |
| Note:                                                                                                                                                             |
| (i) পদ সংখ্যা বিজোড় হলে $\sin^2\theta / \sin^2 90 / \cos^2\theta / \cos^2 90$ এই চারটি পদ যেকোনো একটি পদ গ্রহণ থাকবে এবং বোঝা থাকবে তার মান যোগ করতে হবে।        |
| (ii) পদ সংখ্যা বিজোড় হলে এবং $\sin^2\theta / \sin^2 90 / \cos^2\theta / \cos^2 90$ এই চারটি পদের কোনোটি না থাকলে $\frac{1}{2}$ যোগ করতে হবে।                     |
| [অর্থাৎ পদসংখ্যা বিজোড় হলে মধ্যপদ আলাদা করে নিয়ে এর সাথে বাকি অংশের সমষ্টি যোগ করতে হবে]                                                                        |



কম্পিউটার বিজ্ঞানের অসীম সমাধান


৪১.  $\sec\theta = \frac{13}{5}$  হলে  $\tan\theta$  এর মান কত?

[JU: 19-20]

- A.  $\frac{5}{12}$  B.  $\frac{5}{13}$   
C.  $\frac{12}{5}$  D.  $\frac{1}{12}$

**SQ Why**  $\sec\theta = \frac{13}{5}$

$\therefore \tan\theta = \frac{12}{5}$



৪২.  $\tan\theta = \frac{1}{7}$  হলে,  $\cos 2\theta$  এর মান কত?

[JU: 18-19]

- A.  $\frac{24}{25}$  B.  $\frac{23}{25}$  C.  $\frac{21}{25}$  D.  $\frac{19}{25}$

**SQ Why**  $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta} = \frac{1 - \frac{1}{49}}{1 + \frac{1}{49}} = \frac{48}{50} = \frac{24}{25}$

৪৩.  $\tan\theta = \frac{3}{4}$  হলে,  $\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta}$  এর মান কত?

[JU: 15-16]

- A. 7 B.  $\frac{1}{7}$  C.  $-\frac{1}{7}$  D. -7

**SQ Why**  $\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} = \frac{\tan\theta - 1}{\tan\theta + 1} = \frac{\frac{3}{4} - 1}{\frac{3}{4} + 1} = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{7}{4}} = -\frac{1}{7}$

৪৪.  $\sec\theta + \tan\theta = \frac{1}{7}$  হলে  $\sec\theta - \tan\theta$  এর মান কত?

[RU-C, সেকশন-১, ২০২৩-২৪]

- A. 7 B.  $\frac{1}{7}$  C.  $\frac{3}{7}$  D. -7

**SQ Why**  $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$

$\Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1$

$\Rightarrow \frac{1}{7}(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \therefore \sec\theta - \tan\theta = 7$

৪৫.  $\cot A = \frac{12}{5}$  হলে  $\sin A + \cos A$  এর মান কত?

[RU: 18-19, DU: প্রকৃতি, 19-20; JnU: 15-16]


- A.  $\frac{13}{17}$  B.  $-\frac{7}{13}$  C.  $\frac{17}{13}$  D.  $-\frac{13}{17}$

**SQ Why** দেওয়া আছে,  $\cot A = \frac{12}{5}$

$\therefore$  পাশের চিত্র হতে পাই,

$\sin A = \frac{5}{13}$  এবং  $\cos A = \frac{12}{13}$

$\therefore \sin A + \cos A = \frac{5}{13} + \frac{12}{13} = \frac{17}{13}$



৪৬.  $\tan 36^\circ + \tan 9^\circ + \tan 36^\circ \tan 9^\circ = ?$

[JU-H: 19-20; IU: 19-20]

- A. 0 B. -1  
C. 1 D. কোনোটিই নয়

**SQ Why**  $\tan 45^\circ = \tan (36^\circ + 9^\circ)$

$\Rightarrow 1 = \frac{\tan 36^\circ + \tan 9^\circ}{1 - \tan 36^\circ \tan 9^\circ}$

$\Rightarrow \tan 36^\circ + \tan 9^\circ = 1 - \tan 36^\circ \tan 9^\circ$

$\therefore \tan 36^\circ + \tan 9^\circ + \tan 36^\circ \tan 9^\circ = 1$

৪৭.  $\frac{\cos 27^\circ - \cos 63^\circ}{\cos 27^\circ + \cos 63^\circ} = ?$

[JU: H: 14-15; RUET: 10-11]

- A.  $\cot 18^\circ$  B.  $\sin 18^\circ$  C.  $\cos 18^\circ$  D.  $\tan 18^\circ$

**SQ Why**  $\frac{\cos 27^\circ - \cos 63^\circ}{\cos 27^\circ + \cos 63^\circ} = \frac{\cos 27^\circ - \sin 27^\circ}{\cos 27^\circ + \sin 27^\circ}$   
 $= \tan(45^\circ - 27^\circ) = \tan 18^\circ$

৪৮.  $\frac{1 + \tan 25^\circ}{1 - \tan 25^\circ}$  এর মান কত?

[RU: 17-18]

- A.  $\tan 50^\circ$  B.  $\tan 70^\circ$  C.  $\cot 50^\circ$  D.  $\cot 70^\circ$

**SQ Why**  $\frac{1 + \tan 25^\circ}{1 - \tan 25^\circ} = \frac{\tan 45^\circ + \tan 25^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 25^\circ} = \tan(45^\circ + 25^\circ) = \tan 70^\circ$

৪৯.  $\cos 75^\circ$  এর সঠিক মান-

[CU-A, Set-2, 20-21; DU: 07-08; CU 14-15, CU: 08-09; রা.দা. ২০১৯]

- A.  $\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$  B.  $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$  C.  $\frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$  D.  $\frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}$

**SQ Why**  $\cos 75^\circ = \cos (45^\circ + 30^\circ)$   
 $= \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ$   
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}$

১০.  $\cos^2 0^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \dots + \cos^2 90^\circ$  এর মান-

[DU: 08-09]

- A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

**SQ Why** এখানে, পদসংখ্যা  $= \frac{90 - 0}{10} + 1 = 10$  অর্থাৎ ১০ জোড়া পদ।  
 $\therefore$  রাশিটির মান = 5

১১.  $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}$  এর মান কত?

[RU: F: 15-16]

- A.  $\cos \frac{2\pi}{32}$  B.  $\cos \frac{\pi}{32}$  C.  $\cos \frac{\pi}{16}$  D.  $\cos \frac{3\pi}{15}$

**SQ Why**  $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 \cdot 2 \cos^2 \frac{\pi}{4}}}}$   
 $= \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 \cos \frac{\pi}{4}}}} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{16}} = \cos \frac{\pi}{32}$

১২.  $A + B = \frac{\pi}{2}$  হলে  $\cos^2 A - \cos^2 B$  এর মান-

[DU 17-18]

- A.  $\sin (A - B)$  B.  $\sin (B - A)$   
C.  $\cos (B - A)$  D.  $-\cos (A - B)$

**SQ Why**  $\cos^2 A - \cos^2 B = 1 - \sin^2 A - 1 + \sin^2 B$   
 $= \sin^2 B - \sin^2 A = \sin(B + A) \cdot \sin(B - A)$   
 $= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin(B - A) = 1 \cdot \sin(B - A) = \sin(B - A)$

১৩.  $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$  হলে  $(A + B)$  এর মান কোনটি?

[JU-A, Set-H, 22-23; RU 17-18, 16-17, 12-13, 11-12, DU 15-16, 13-14, IU 11-12]

- A.  $\frac{\pi}{2}$  B.  $\pi$  C.  $2\pi$  D.  $\frac{\pi}{4}$

**SQ Why**  $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$   
 $\Rightarrow \sin A - \sin B = \cos B - \cos A$   
 $\Rightarrow 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} = 2 \sin \frac{B+A}{2} \sin \frac{A-B}{2}$   
 $\Rightarrow \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{A+B}{2}$   
 $\Rightarrow \cos^2 \left( \frac{A+B}{2} \right) - \sin^2 \left( \frac{A+B}{2} \right) = 0 \Rightarrow \cos 2 \cdot \frac{A+B}{2} = 0$   
 $\Rightarrow \cos (A+B) = 0 = \cos \frac{\pi}{2} \Rightarrow A + B = \frac{\pi}{2}$



14.  $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$  ও  $A = \frac{\pi}{9}$  হলে  $B = ?$  [JU: H: 14-15]

A.  $\frac{7\pi}{18}$  B.  $\frac{7\pi}{9}$  C.  $\frac{5\pi}{9}$  D.  $\frac{5\pi}{18}$

**[SOWhy]**  $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$  হলে,  $A + B = \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow B = \frac{\pi}{2} - A \Rightarrow B = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{9} = \frac{7\pi}{18}$$

15.  $\sin(2n\pi + \theta)$ -এর মান কত? [CU 13-14]

A.  $\sin \theta$  B.  $\cos \theta$  C.  $-\cos \theta$   
D.  $-\sin \theta$  E.  $\sin 2n\pi$

**[SOWhy]**  $\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta$

16. যদি  $\alpha + \beta + \gamma = \pi$  হয়, তবে  $\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = ?$  [JU-H: 19-20]

A.  $\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma$  B.  $\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma$   
C.  $\tan \alpha - \tan \beta - \tan \gamma$  D. 1

**[SOWhy]**  $\alpha + \beta + \gamma = \pi \Rightarrow \tan(\alpha + \beta) = \tan(\pi - \gamma)$

$$\Rightarrow \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = -\tan \gamma$$

$$\Rightarrow \tan \alpha + \tan \beta = -\tan \gamma + \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$$

$$\Rightarrow \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$$

17. একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 1:2:3 হলে বাহুগুলোর অনুপাত হচ্ছে- [BRU: 15-16; MBSTU: 14-15]

A. 2:3:1 B.  $\sqrt{3}$ :2:1 C. 2: $\sqrt{3}$ :1 D. 1: $\sqrt{3}$ :2

**[SOWhy]** কোণ গুলোর অনুপাত 1:2:3

$$\Rightarrow A:B:C = 30^\circ:60^\circ:90^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{1} = \frac{b}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{c}{1} \Rightarrow a:b:c = 1:\sqrt{3}:2$$

18. একটি ত্রিভুজের বাহুর 5, 12 এবং 13 সে.মি. হলে ত্রিভুজটি হবে- [JU-A, Set-M: 2023-24]

A. স্থলকোণী B. সূক্ষ্মকোণী  
C. সমকোণী D. কোনটিই নয়

**[SOWhy]**  $(বৃহত্তম বাহু)^2 =$  অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি

19. একটি ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 9, 40 এবং 41। এর পরাবৃত্তের ব্যাসার্ধ- [RU-C, সূর্য-৩, 2023-24]

A. 24.5 B. 25.5  
C. 20.5 D. 25.0

**[SOWhy]** পরাবৃত্তের ব্যাসার্ধ =  $\frac{abc}{4\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$

$$\text{দেওয়া আছে, } a = 9$$

$$b = 40$$

$$c = 41$$

$$\therefore r = \frac{9 \times 40 \times 41}{4\sqrt{45 \times 36 \times 5 \times 4}} = 20.5$$

20. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল  $\frac{15\sqrt{3}}{4}$  বর্গ সে.মি. এবং উহার দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3 সে.মি. ও 5 সে.মি.। উক্ত বাহু দুইটির অন্তর্গত কোণ কত? [CU: 08-09]

A.  $30^\circ$  B.  $60^\circ$  C.  $120^\circ$

D.  $135^\circ$  E.  $40^\circ$

**[SOWhy]**  $\frac{15\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$

21. যদি কোন ত্রিভুজে  $A = 60^\circ$  হয়, তবে  $b + c =$  কত? [RU 09-10]

A.  $2a \cos \frac{B-C}{2}$  B.  $2a \cos \frac{B+C}{2}$

C.  $a \cos \frac{B-C}{2}$  D.  $2a \cos B$

**[SOWhy]**  $b + c = 2R \sin B + 2R \sin C$

$$= (2R) \cdot 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = (2R) 2 \sin \left( \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) \cos \frac{B-C}{2}$$

$$= (2R) \cdot 2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2} = \frac{a}{\sin A} \cdot 2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2}$$

$$= \frac{1}{\sin 60^\circ} \cdot 2 \cos 30^\circ \cos \frac{B-C}{2} = \frac{a}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2} = 2a \cos \frac{B-C}{2}$$

## PRIME TEST

01.  $\sin\{(2n+1)\pi + \alpha\} = ?$

A.  $-\sin \alpha$  B.  $\sin \alpha$  C.  $\sin \pi/2$  D.  $\cos \alpha$

02.  $\cos 75^\circ$  এর সঠিক মান-

A.  $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$  B.  $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$  C.  $\frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$  D.  $\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$

03.  $\sin(780^\circ) \cos(390^\circ) - \sin(330^\circ) \cos(-300^\circ)$  এর মান-

A. 0 B. -1 C. 1 D.  $\frac{1}{2}$

04.  $\tan 54^\circ - \tan 36^\circ$  এর মান-

A.  $2 \tan 18^\circ$  B.  $2 \cot 27^\circ$   
C.  $-2 \tan 81^\circ$  D.  $-2 \tan 72^\circ$

05.  $\sin 65^\circ + \cos 65^\circ$  এর মান কত হবে?

A.  $\sqrt{2} \cos 20^\circ$  B.  $\sqrt{2} \cos 60^\circ$   
C.  $\sqrt{2} \sin 20^\circ$  D.  $\sqrt{2}$

06.  $\cos(-4380^\circ) = ?$

A.  $\frac{1}{2}$  B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  C. 0 D.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

07.  $\frac{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}$  এর মান-

A.  $\sqrt{3}$  B.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  C.  $-\frac{1}{\sqrt{3}}$  D.  $-\sqrt{3}$

08. ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ হলে  $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = ?$

A.  $\frac{1}{2}$  B. 1 C. 0 D. -1

09. যদি  $A+B+C=\pi$  হয় তবে  $\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2}$  সমান-

A.  $1 - 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$  B.  $1 + 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$

C.  $1 - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$  D.  $1 + \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$

10.  $f(\theta) = \cos \theta - \sin \theta$  হলে  $\theta$  এর কোন মানের জন্য  $f(\theta) = 0$

A.  $\pi/2$  B.  $\pi/4$  C.  $\pi$  D.  $\pi/6$

11.  $\frac{1 + \cos 2\theta}{\sin 2\theta} = ?$

A.  $\cot \theta$  B.  $\tan \theta$   
C.  $\sec \theta$  D.  $\operatorname{cosec} \theta$



12. यदि  $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$  और  $\cos \theta = 1$  हल कीजिए कि  $\theta$  का मान क्या है?

- (A)  $45^\circ$  (B)  $60^\circ$   
(C)  $30^\circ$  (D)  $90^\circ$

13. यदि  $\tan \theta = \frac{1}{2}$  हो, तो  $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$  का मान क्या है?

- (A)  $\frac{3 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}}$  (B)  $\frac{2\sqrt{5} - 3}{2 + \sqrt{5}}$   
(C)  $\frac{3 + 2\sqrt{5}}{2 - \sqrt{5}}$  (D)  $\frac{3\sqrt{5} - 2}{2 + \sqrt{5}}$

14. ABC त्रिभुज में  $a:b:c = 1:1:1$  हल कीजिए कि  $\angle B = ?$

- (A)  $60^\circ$  (B)  $30^\circ$   
(C)  $90^\circ$  (D)  $120^\circ$

15. दोन त्रिभुजों में 13, 14, 15 हल कीजिए कि ये त्रिभुज क्या हैं?

- (A) 12 (B) 13  
(C) 14 (D) 15

16.  $\frac{1 + \cos 2\theta}{\sin 2\theta}$  का मान क्या है?

- (A)  $\tan \theta$  (B)  $\sec \theta$   
(C)  $\cot \theta$  (D)  $\operatorname{cosec} \theta$

17.  $\frac{\tan^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1}{\tan^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 1} = ?$

- (A)  $\sin 2x$  (B)  $\sin x$   
(C)  $\tan \frac{\pi}{4}$  (D) 1

18. यदि  $\cos \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}$  हो, तो  $x$  का मान क्या है?

- (A)  $2x + \frac{\pi}{3}$  (B)  $x + \frac{\pi}{6}$   
(C)  $x + \frac{\pi}{4}$  (D)  $x$

19.  $\tan 21^\circ + \tan 23^\circ + \tan 21^\circ \tan 23^\circ = ?$

- (A) 1 (B) 1  
(C) -1 (D) दोनों ही सही

20.  $\cos^2 1^\circ + \cos^2 14^\circ + \cos^2 21^\circ + \dots + \cos^2 91^\circ$  का मान

- (A) 6 (B) 3  
(C) 5 (D) 4

### Answer Analysis

| प्रश्न संख्या | व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 A          | हल: $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ और $\cos \theta = 1$ का मान $\theta = 0$ है।<br>Answer: $\theta = 0$<br>$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$<br>$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ (यदि $\alpha = 0$ हो, तो) $= -\sin 0 = 0$                                                                          |
| 13 D          | $\tan \theta = \frac{1}{2}$ हो, तो $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$<br>$= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$<br>$= \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{1 + 2}{1 - 2} = \frac{3}{-1} = -3$ |
| 14 C          | $\sin(731^\circ) \cos(391^\circ) - \sin(331^\circ) \cos(-311^\circ)$<br>$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$                                                                                 |

| प्रश्न संख्या | व्याख्या                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 A          | $\frac{1 + \cos 2\theta}{\sin 2\theta} = \frac{2 \cos^2 \theta}{2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta$                                                             |
| 17 A          | $\frac{\tan^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1}{\tan^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 1} = -\cos 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$<br>$= -(-\sin 2x) = \sin 2x$ |
| 18 A          | $\cos \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}$<br>Option A Test: $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$                                                                     |
| 19 B          | $\tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1$                                                                                                                                                                   |
| 20 C          | हल: $\cos^2 1^\circ + \cos^2 14^\circ + \cos^2 21^\circ + \dots + \cos^2 91^\circ$<br>$= \frac{91 - 1}{11} + 1 = 10$ और 5 का योग 15 है।<br>$\therefore$ सही उत्तर 15 है।                                |



অধ্যায়  
০৬

## ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

পাঠ্য  
১ম পর্ব

| TOPICS   | সাজেশনস্                                      | V.V.I<br>RATE |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | গ্রাফ-এর সাহায্যে ফাংশন ও এক-এক ফাংশন নির্ণয় | ★             |
| TOPIC-02 | ফাংশনের মান নির্ণয়                           | ★             |
| TOPIC-03 | ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয়                 | ★★★           |
| TOPIC-04 | ফাংশনের প্রকৃতি নির্ণয়                       | ★★            |
| TOPIC-05 | বিশদীকৃত ফাংশন নির্ণয়                        | ★★★           |
| TOPIC-06 | সংযোজিত ফাংশন নির্ণয় সম্পর্কিত               | ★★★           |

## এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

| ডোমেনের রেঞ্জ নির্ণয়                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $f(x) = ax + b$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে                                                                  |  |
| <b>Technic:</b> $D_f = R$ এবং $R_f = R$                                                                  |  |
| $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে                                                       |  |
| <b>Technique:</b> $D_f = R = \left\{ \frac{c}{b} \right\}$ এবং $R_f = R - \{0\}$                         |  |
| $f(x) = \frac{ax}{bx+c}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে                                                         |  |
| <b>Technique:</b> $D_f = R = \left\{ \frac{c}{b} \right\}$ এবং $R_f = R - \left\{ \frac{a}{b} \right\}$  |  |
| $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে                                                       |  |
| <b>Technique:</b> $D_f = R = \left\{ \frac{-d}{c} \right\}$ এবং $R_f = R - \left\{ \frac{a}{c} \right\}$ |  |
| $f(x) = \frac{x^n - a^n}{x - a}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে                                                 |  |
| <b>Technique:</b> $D_f = R - \{a\}$ এবং $R_f = R - \{na^{n-1}\}$                                         |  |
| $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন                                                  |  |
| <b>Technique:</b> $x \leq -a$ or $x \geq a \therefore$ রেঞ্জ $R_f = [0, \infty)$                         |  |
| $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন                                                  |  |
| <b>Technique:</b> $D_f = -a \leq x \leq a$ বা $ x  \leq a$ এবং $R_f = [0, a]$                            |  |
| $f(x) = \log(a+bx)$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে $\log$ এর ভেতরের রাশিটি 0 অপেক্ষা বড় হবে                    |  |
| <b>Technique:</b> ডোমেন, $a+bx > 0 \Rightarrow x > \frac{-a}{b}$ এবং রেঞ্জ $R_f = R$                     |  |
| $f(x) = e^x$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে                                                                     |  |
| <b>Technique:</b> $D_f = (-\infty, \infty)$ এবং $R_f = (0, \infty)$                                      |  |
| লব বিখ্যাত ও হর এক খাত বিশিষ্ট $f(x) = \frac{ax^2+b}{cx+d}$ ফাংশনের ক্ষেত্রে                             |  |
| <b>Technique:</b> রেঞ্জ $= R - \{2 \times x \text{ এর যে মানের জন্য হর শূন্য হয়}\}$                     |  |
| বর্গমূল মুক্ত ফাংশনের $f(x) = \sqrt{ax+b}$ ক্ষেত্রে                                                      |  |
| <b>Technique:</b> ডোমেন $= ax+b \geq 0$ ধরে প্রাপ্ত $x$ এর মান, রেঞ্জ $= [0, \infty)$                    |  |

## বিশদীকৃত ফাংশন নির্ণয় সূত্রাবলি

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| যদি $f(x) = ax + c$ হয় তবে $f^{-1}(x) = \frac{x-c}{a}$                  |
| যদি $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ হয় তবে, $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$ |
| $f(x) = ax^n + c$ হলে $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{\frac{x-c}{a}}$              |
| যদি $f(x) = \frac{a}{bx-c}$ হয় তবে, $f^{-1}(x) = \frac{a+cx}{bx}$       |
| $f(x) = ax^2 + c$ হলে $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{x-c}}{\sqrt{a}}$          |

## আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমন্ডেশনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

[IU: 12-13]

01. যদি  $f(x) = \sin x$  হয় তবে  $f$  একটি-

- A. এক-এক ফাংশন B. জোড় ফাংশন  
C. বিজোড় ফাংশন D. কোনটিই নয়

[S(Why)  $f(x) = \sin x$  হয় তবে  $f$  একটি বিজোড় ফাংশন।02.  $f(x) = \ln x$  হলে,  $f\left(\frac{1}{a}\right) =$  কত? [JU: 09-10; KUET: 05-06; PUST: 13-14]

- A.  $f(a)$  B.  $-f(a)$  C. 0 D. 1

[S(Why)  $f(x) = \ln x \therefore f\left(\frac{1}{a}\right) = \ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln(1) - \ln(a) = -\ln(a) = -f(a)$ 03.  $5^{3x+1} = (\sqrt{5})^{x+4}$  হলে  $x$  এর মান কত? [CU-A: 11-12]

- A. 5 B.  $\frac{5}{2}$  C.  $\frac{2}{5}$   
D.  $\frac{3}{4}$  E.  $\frac{5}{4}$

[S(Why)  $(\sqrt{5})^{x+4} \Rightarrow 5^{\frac{x+4}{2}} \Rightarrow 5^{\frac{x}{2}+2} \Rightarrow 3x+1 = \frac{x+4}{2}$   
 $\Rightarrow 6x+2 = x+4 \Rightarrow 5x = 2 \therefore x = \frac{2}{5}$

04.  $y = (x+5)^2 + 4$  ফাংশনটির সর্বনিম্ন মান কত? [JSTU: 18-19]

- A. 10 B. 23 C. 4 D. 0

[S(Why)  $y = (x+5)^2 + 4$  $(x+5)^2$  এর মান সর্বদা ধনাত্মক (বর্গাকারে রয়েছে) $(x+5)^2$  এর মান সর্বনিম্ন হলে  $(x+5)^2 + 2^2$  রাশিটির মান সর্বনিম্ন হবে। $x+5 = 0$  তখন  $R_{\min} = 4$ 05. যদি  $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$  হয়, তবে  $f^{-1}(x)$  এর কোডোমেন কোনটি? [DU-A: 22-23]

- A.  $\mathbb{R}$  B.  $(3, \infty)$  C.  $(-\infty, 3)$  D.  $\mathbb{R} - \{3\}$

[S(Why)  $f(x)$  এর ডোমেন এবং  $f^{-1}(x)$  এর কোডোমেন একই। $f(x) = \frac{2x+1}{x-3} \therefore f(x)$  বাস্তব হতে হলে,  $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$  $\therefore f(x)$  এর ডোমেন  $= \mathbb{R} - \{3\} = f^{-1}(x)$  এর কোডোমেন06.  $y = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$  ফাংশনটির ডোমেন এবং রেঞ্জ- [DU: 15-16; JUST: 19-20]

- A.  $-\infty < x \leq 4; 0 \leq y < \infty$  B.  $-\infty < x < 4; 0 < y < \infty$   
C.  $-\infty < x < 4; 0 \leq y < \infty$  D.  $-\infty < x \leq 4; 0 < y < \infty$

[S(Why) ডোমেনের জন্য,  $4-x > 0$  $\Rightarrow x < 4 \therefore$  ডোমেন,  $-\infty < x < 4$ রেঞ্জ নির্ণয়:  $x = 4$  বসালে  $f(x) = \infty$  এবং  $x = -\infty$  বসালে  $f(x)$  এর মান 0 এর খুব কাছাকাছি হয়।  $\therefore$  রেঞ্জ,  $0 < y < \infty$







09.  $f(x) = \sqrt{9-x^2}$  ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ যথাক্রমে- কত?

- (A)  $\{x \in \mathbb{R} : x > 3\}$  (B)  $\{x \in \mathbb{R} : x \neq -3\}$   
 (C)  $\{x \in \mathbb{R} : x \neq 3\}$  (D)  $\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq 3\}$

10.  $f(x) = \ln \frac{n+x}{n-x}$  ফাংশনটি-

- (A) যুগ্ম (B) অযুগ্ম  
 (C) উভয়ই (D) কোনটিই নয়

11.  $f(x) = \sqrt{x-1}$  হলে  $f^{-1}(2)$  এর মান-

- (A) -1 (B) 3 (C) 1 (D) 5

12.  $f(x) = \frac{5x+3}{4x-5}$  হলে  $f^{-1}(x)$

- (A)  $\frac{5x+3}{4x-5}$  (B)  $\frac{4x-5}{5x+3}$  (C)  $\frac{5x-3}{4x-5}$  (D)  $\frac{5x+3}{4x+5}$

13.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ফাংশনটি  $f(x) = x^2$  দ্বারা সংজ্ঞায়িত।  $f^{-1}(25)$  এর মান কোনটি?

- (A)  $[-5, 5]$  (B)  $(-5, 5)$   
 (C)  $\{-5, 5\}$  (D)  $\emptyset$

14. যদি  $f(x) = x^2 - 2|x|$  এবং  $g(x) = x^2 + 1$  হয়, তাহলে  $g(f(-2))$  এর মান কত?

- (A) 0 (B) 1  
 (C) -1 (D) 5

15.  $f(x) = \sin x$ ,  $g(x) = x^2$  হলে  $f\left(g\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)\right)$  এর মান-

- (A)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
 (C)  $\frac{1}{2}$  (D) 1

16.  $f(x) = \log_e x$  ফাংশনটির রেঞ্জ কোনটি?

- (A)  $(-\infty, 0)$  (B)  $[0, \infty)$   
 (C)  $(0, \infty)$  (D)  $(-\infty, \infty)$

17.  $R = \{n\pi : n \in \mathbb{Z}\}$  এবং রেঞ্জ  $= R - (-1, 1)$  এটি কার ডোমেন?

- (A)  $\tan \theta$  (B)  $\cot \theta$   
 (C)  $\cos \theta$  (D)  $\operatorname{cosec} \theta$

18.  $f(x) = 2x - 1$  এবং  $g(x) = \frac{4}{x-1}$  হলে  $(f \circ g)(2)$  এর মান কোনটি?

- (A) 3 (B) 4 (C) 7 (D) কোনটিই নয়

19.  $f(x) = 2\cos x$  এর রেঞ্জ কত?

- (A)  $-1 \leq f(x) \leq 1$  (B)  $-2 \leq f(x) \leq 2$   
 (C)  $0 \leq f(x) \leq 2$  (D)  $-2 \leq f(x) \leq 0$

20.  $f(x) = \frac{x}{1+x}$  হলে,  $f(2/3) + f(3/2)$  সমান-

- (A)  $\frac{2}{3}$  (B) 3 (C) 2 (D)  $\frac{3}{2}$

### ☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                           |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | D     | $x+2=0 \Rightarrow x=-2$ এবং $y \neq 3$                                                                            |
| 02     | C     | $f(x) = 1 + \sqrt{\sin^2 x + 1} = 1 + \sqrt{1^2 + 1}$ [ $\because \sin x$ এর সর্বোচ্চ মান 1]<br>$= 1 + \sqrt{2}$   |
| 03     | A     | $f(x) = \frac{3-\frac{1}{2x}}{1+\frac{1}{x}} \therefore f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3-1}{1+2} = \frac{2}{3}$ |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04     | B     | $\log(2) = f(g(2)) = f(2^2 + 1) = f(5) = 5^2 - 2.5 = 15$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 05     | D     | $f(x) = \sqrt{2-\sqrt{2-x}}$<br>$\therefore 2-\sqrt{2-x} \geq 0$ এবং $2-x \geq 0$<br>$\Rightarrow 2 \geq \sqrt{2-x} \Rightarrow 2 \geq x$<br>$\Rightarrow 4 \geq 2-x \Rightarrow x \leq 2$<br>$\Rightarrow 2 \geq -x \Rightarrow -2 \leq x$<br>$\therefore$ ডোমেন : $-2 \leq x$ এবং $x \leq 2$<br>$\Rightarrow -2 \leq x \leq 2 \Rightarrow [-2, 2]$ |
| 06     | B     | $f(x) = \sqrt{x+4}$ ফাংশনটিতে ফলাফল হিসেবে কখনোই ঋণাত্মক মান আসবে না, কিন্তু 0 আসবে। তাই, $R_f = [0, \infty)$                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07     | A     | $f(x) =  2x-5 $ ; ফাংশনটি $x$ এর সকল মানের জন্য সংজ্ঞায়িত<br>$\therefore D_f = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$<br>এবং ফাংশনটিতে $x$ এর মান বসিয়ে $f(x)$ এর মান $[0, \infty)$ হবে।<br>$\therefore R_f = [0, \infty)$                                                                                                                                |
| 08     | C     | $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$ এর ডোমেন $(-\infty, \infty)$<br>কারণ $x$ এর কোন মানের জন্য $f(x)$ ফাংশনটির বাধা প্রাপ্ত হয় না।                                                                                                                                                                                                                         |
| 09     | D     | $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ ফাংশনের ডোমেন হবে $9-x^2 \geq 0$ হলে।<br>অর্থাৎ $x \leq \pm 3$ হলে। ফাংশনের ডোমেন $= -3 \leq x \leq 3$                                                                                                                                                                                                                         |
| 10     | B     | $f(x) = \ln \frac{n+x}{n-x}$ , $f(-x) = \ln \left(\frac{n+x}{n-x}\right)^{-1} = -\ln \left(\frac{n+x}{n-x}\right)$<br>$\therefore$ ফাংশনটি অযুগ্ম।                                                                                                                                                                                                   |
| 11     | D     | ধরি, $y = f(x) = \sqrt{x-1}$ বা, $y^2 = x-1$ বা, $x = y^2 + 1$<br>$\therefore f^{-1}(y) = y^2 + 1 \therefore f^{-1}(2) = 2^2 + 1 = 5$                                                                                                                                                                                                                |
| 12     | A     | $\therefore f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ হলে $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$<br>$\therefore f^{-1}(x) = \frac{-(-5)x+3}{4x-5} = \frac{5x+3}{4x-5}$                                                                                                                                                                                                     |
| 13     | C     | $y = x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{y} \therefore f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$<br>$\therefore f^{-1}(25) = \pm\sqrt{25} = \pm 5 = \{-5, 5\}$                                                                                                                                                                                                               |
| 14     | B     | $f(-2) = (-2)^2 - 2 -2  = 0$<br>$g(f(-2)) = g(0) = 0 + 1 = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15     | A     | $f(g(x)) = f(x^2) = \sin x^2$<br>$\therefore f\left(g\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$                                                                                                                                                                                        |
| 16     | B     | $e^x, e^{3x}, e^{-x}$ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রেঞ্জ হবে $[0, \infty)$                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17     | D     | $R = \{n\pi : n \in \mathbb{Z}\}$ এবং রেঞ্জ $= R - (-1, 1)$ $\theta$ এর যেকোন মানের জন্য $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান $(-1, 1)$ হবে না। কারণ $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ হবে।                                                                                                                                                               |
| 18     | C     | $f(x) = 2x - 1$ এবং $g(x) = \frac{4}{x-1}$<br>$\therefore (f \circ g)(2) = f\left(\frac{4}{2-1}\right) = f(4) = 2 \times 4 - 1 = 7$                                                                                                                                                                                                                  |
| 19     | B     | $f(x) = 2\cos x$<br>$\cos x$ এর রেঞ্জ $-1 \leq \cos x \leq 1$<br>$\therefore 2\cos x$ এর রেঞ্জ $-2 \leq 2\cos x \leq 2 \therefore -2 \leq f(x) \leq 2$                                                                                                                                                                                               |
| 20     | A     | $f\left(\frac{2}{3}\right) + f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{2}{3}}{1+\frac{2}{3}} + \frac{1+\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{5}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$                                                                                                          |







•• ASPECT SERIES •• ASPECT SERIES •• ASPECT SERIES •• ASPECT SERIES •• ASPECT SERIES •• ASPECT SERIES •• ASPECT SERIES ••



14.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x - 1} =$  কত?

A.  $5x^2$  B.  $4x^2$   
C.  $3x$  D.  $5x^2$

**SOLVING**  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = 1$

15.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}}{x}$  এর মান.

A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  B.  $\frac{1}{2}$  C.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  D.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

**SOLVING** Using technique:  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

16.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\cos x}$  এর মান.

A.  $e$  B.  $1$  C.  $\frac{1}{e}$  D.  $0$

**SOLVING**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\cos x} = \frac{e^0 - 1}{1} = 0$

17.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$  এর মান কোনটি?

A.  $1$  B.  $0$  C.  $e$  D.  $-\frac{1}{e}$

**SOLVING**  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot x} = e^1 = e$

18.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan^{-1} 2x}{x} \right)$  এর মান কোনটি? [CU-A, Set-G, 22-23; RU-C, February-1, 22-23; DC: 15-16; RU 15-16, CU: 14-15, RU: 19-20]

A.  $1$  B.  $0$  C.  $2$  D.  $\frac{1}{2}$

**SOLVING**  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan^{-1} 2x}{x} \right) = 2 \times \lim_{2x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan^{-1} 2x}{2x} \right) = 2 \times 1 = 2$

19.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 3x}{\cos 3x - \cos x} =$  কত?

A.  $1$  B.  $\frac{1}{2}$  C.  $2$  D.  $0$

**SOLVING**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 3x}{\cos 3x - \cos x} = \frac{9^2 - 7^2}{5^2 - 3^2} = 2$

20.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$  এর মান কোনটি?

A.  $-1$  B.  $1$  C.  $\infty$  D. বিলম্বিত নয়

**SOLVING**  $x > 0$  হলে,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} = 1$

$x < 0$  হলে,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} = -1 \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$  বিলম্বিত নয়।

21.  $\frac{d}{dx} (\cos^2 (\ln x)) = ?$

A.  $-\frac{\sin(2 \ln x)}{2}$  B.  $-\frac{2 \cos (\ln x)}{x}$   
C.  $-\frac{\sin (2 \ln x)}{x}$  D.  $-2x \cos (\ln x) \sin (\ln x)$

**SOLVING**  $\frac{d}{dx} (\cos^2 (\ln x)) = -2 \cos (\ln x) \sin (\ln x) \cdot \frac{1}{x}$   
 $= -\frac{\sin (2 \ln x)}{x}$

22.  $\frac{d}{dx} (\sqrt{\cos 2x}) =$  কত?

A.  $-\frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}$  B.  $\frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}$  C.  $\frac{2 \sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}$  D.  $\frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}$

**SOLVING** যদি,  $y = \sqrt{\cos 2x}$   
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\cos 2x}} \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 = -\frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}$

23.  $\sqrt{\sin x}$  এর অন্তরক মূল্য নির্ণয় কর।

A.  $\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$  B.  $\frac{\sin x}{2\sqrt{\sin x}}$  C.  $\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$  D.  $\frac{\sin x}{2\sqrt{\sin x}}$

**SOLVING** যদি,  $y = \sqrt{\sin x}$   
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$

24.  $y = e^{\sqrt{x}}$  হলে  $\frac{dy}{dx}$  এর মান কোনটি? [CU-A, Set-A, 22-23; A, Set-A, 2021-22; DU: 10-12, RU: 12-13, 16-17, DU: 10-12, 14-15, 18-19]

A.  $e^{\sqrt{x}}$  B.  $2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}$  C.  $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$  D.  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

**SOLVING**  $y = e^{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$

25.  $y = 100^x$  হলে  $\frac{dy}{dx} =$  কত?

A.  $100^x$  B.  $x100^{x-1}$  C.  $2.100^x$  D.  $2.10^x$  E.  $100^{x-1}$

**SOLVING**  $y = 100^x \therefore \frac{d}{dx} = 100^x \log 100 = 100^x \log 10^2 = 2.100^x$

26.  $\frac{d}{dx} (\ln \cos x) = ?$

A.  $-\tan x$  B.  $-\sin x$  C.  $-\cos x$  D.  $-\cos x$

**SOLVING**  $\frac{d}{dx} (\ln \cos x) = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$

27. যদি  $y = e^{2x-1}$  হয়, তবে  $\frac{dy}{dx}$  এর মান কোনটি?

A.  $e^{2x-1}$  B.  $e^{2x-1}(1-x)$  C.  $\frac{e^{2x-1}}{1-x}$  D.  $\frac{1}{1-x}$

**SOLVING**  $y = e^{2x-1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^{2x-1} \cdot \frac{d}{dx} (2x-1) = \frac{e^{2x-1}}{1-x}$

28.  $f(x) = 3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x$ ;  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  হলে,  $f'(x) =$  কত?

A.  $\frac{1}{2} \sin 2x$  B.  $7 \sin 2x$   
C.  $-2 \sin 2x$  D.  $-\sin 2x$

**SOLVING**  $f(x) = 3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x$   
 $= 3 \sin^2 x + 4(1 - \sin^2 x) = 3 \sin^2 x + 4 - 4 \sin^2 x = 4 - \sin^2 x$   
 $f'(x) = 0 - 2 \sin x \cos x = -\sin 2x$

29.  $y = \tan^{-1} \frac{1+x}{1-x}$  হলে,  $\frac{dy}{dx} =$  কত?

A.  $\frac{1}{1-x^2}$  B.  $\frac{1}{1+x^2}$  C.  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  D.  $-\frac{1}{1+x^2}$

**SOLVING**  $y = \tan^{-1} \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \tan^{-1} x \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$



20.  $y = \tan^{-1} \frac{a+bx}{b-ax}$  হলে  $\frac{dy}{dx} = ?$

[CU 14-15, 02-03, RU 13-14, 08-09; BUET, 09-10; JUST, 11-12]

A.  $\frac{1}{1+x^2}$  B.  $\frac{1}{1-x^2}$  C.  $1+x^2$  D.  $1-x^2$  **A**

21.  $y = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$  হলে,  $\frac{dy}{dx} = ?$

[DU: 00-01]

A.  $\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$  B.  $\frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2}$  C.  $\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$  D.  $\frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$

**S@Why** মনে করি,  $y = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{(\sqrt{x}-1) \frac{d}{dx}(\sqrt{x}+1) - (\sqrt{x}+1) \frac{d}{dx}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{x}-1) \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} + 0 \right) - (\sqrt{x}+1) \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} - 0 \right)}{(\sqrt{x}-1)^2} \left[ \because \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{-\frac{1}{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} \therefore \frac{dy}{dx} \left\{ \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right\} = \frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$$

22.  $x^2 + y^2 = 25$  হলে,  $(3, -4)$  বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx}$  কত?

[DU: 01-02; CU: 06-07; JnU, 06-07; NSTU, 07-08; JU, 09-10]

A.  $-\frac{3}{4}$  B.  $\frac{3}{4}$  C.  $-\frac{4}{5}$  D.  $\frac{7}{5}$

**S@Why**  $\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25) \Rightarrow 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$   $\therefore (3, -4)$  বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}$

23.  $x^2 + xy + y^2 = 2$  হলে  $(3, -4)$ , বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx}$  এর মান- [RU 15-16; DU 09-10; PUST, 13-14; SUST, 09-10; JnU, 11-12; JU, 13-14; HSTU, 08-09]

A.  $\frac{2}{5}$  B.  $\frac{5}{2}$  C.  $\frac{3}{8}$  D.  $\frac{8}{3}$

**S@Why**  $\frac{d}{dx}(x^2 + xy + y^2) = \frac{d}{dx}(2) \Rightarrow 2x + x \frac{dy}{dx} + y \cdot 1 + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(2x+y)}{(x+2y)} = -\frac{2x+y}{x+2y} \therefore (3, -4)$  বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = -\frac{2 \times 3 - 4}{3 + 2 \times (-4)} = \frac{2}{5}$

24.  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$  হলে  $\frac{dy}{dx} = ?$

[RU-C, Jupiter-1, Set-1, 2021-22; RU 17-18, 14-15; KU 14-15, JNU 10-11, JU 06-07, KU 09-10; SUST, 04-05; BSMRSTU, 2019-20]

A. 2t B. 2 C. 1 D.  $1+t^2$

**S@Why**  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$  এবং  $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$

$x = \sin^{-1} \left( \frac{2t}{1+t^2} \right) = 2 \tan^{-1} t$   $y = \tan^{-1} \left( \frac{2t}{1-t^2} \right) = 2 \tan^{-1} (t)$

$\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{2}{1+t^2}$  ..... (i)  $\frac{dy}{dt} = \frac{2}{1-t^2}$  ..... (ii)

$\therefore (ii) \div (i) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 1$

25. X-এর সাপেক্ষে  $\ln(e^x + e^{-x})$  অন্তরজ কত?

[JU, 18-19]

A.  $\frac{1}{e^x + e^{-x}}$  B.  $\frac{e^{2x}}{e^x + e^{-x}}$  C.  $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$  D.  $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

**S@Why**  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^x + e^{-x}} \times \frac{d}{dx}(e^x + e^{-x}) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

26. যদি  $y = x^3 - 5x$  হয়, তবে  $\frac{d^3y}{dx^3}$  এর মান কত?

[JU: 09-10]

A. 3x B. 6x C. 6 D. 5

**S@Why**  $y = x^3 - 5x, y_3 = 3! = 6$

27. যদি  $y = a^x$  হয়, তবে  $\frac{d^3y}{dx^3}$  এর মান কত?

[JUST-18-19]

A.  $a^x \ln a$  B.  $(a^x \ln a)^3$  C.  $a^{3x} (\ln a)^3$  D.  $a^x (\ln a)^3$

**S@Why**  $y = a^x \therefore \frac{dy}{dx} = a^x \ln a$

$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 0 + (\ln a)^2 \cdot a^x \Rightarrow \frac{d^3y}{dx^3} = a^x (\ln a)^3$

28. একটি গাড়ি t সেকেন্ড সময়ে  $3t + t^2/8$  সে.মি. দূরত্ব অতিক্রম করে। 2 সেকেন্ড পর এর বেগ কত?

[JU 09-10]

A. 9/8 B. 7/2 C. 7/4 D. 17/8

**S@Why** পরি,  $s = 3t + \frac{t^2}{8} \therefore v = \frac{ds}{dt} = 3 + \frac{t}{4}$

$\therefore$  2 সেকেন্ড পর এর বেগ,  $v = 3 + \frac{2}{4} = \frac{7}{2} \text{ ms}^{-1}$

29.  $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 27x + 15$  এর সর্বোচ্চ মান কত?

[RU-C, Quartz-2, 22-23]

A. 10 B. 20 C. 0 D. 30

**S@Why**  $y = 3x^3 - 9x^2 - 27x + 15$

সর্বোচ্চ মানের জন্য,  $y_1 = 9x^2 - 18x - 27$

$y_2 = 18x - 18$

শর্তমতে,  $9x^2 - 18x - 27 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x + x - 3 = 0$

$\Rightarrow x(x-3) + 1(x-3) = 0 \therefore x = -1, 3$

এখন,  $x = -1$  হলে,  $y_2 = -36 < 0$  অর্থাৎ, তরুমান থাকবে

$\therefore$  সর্বোচ্চ মান  $f(-1) = 3 \times (-1)^3 - 9(-1)^2 - 27(-1) + 15$

$= -3 - 9 + 27 + 15 = 30$

30.  $(4, 3)$  বিন্দুতে  $3x^2 - 4y^2 = 12$  অধিবৃত্তের স্পর্শকের ঢালের মান- [DU, 17-18]

A. -1 B. 1 C.  $\frac{3}{4}$  D.  $\frac{4}{3}$

**S@Why**  $\frac{dy}{dx} = \frac{6x}{8y} = \frac{3x}{4y} \therefore (4, 3)$  বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল  $= \frac{3 \times 4}{4 \times 3} = 1$

31.  $y = x^3 - 2x^2 + 4$  বক্ররেখার  $(2, 4)$  বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক এর সমীকরণ নিচের কোনটি?

[JU-A, Set-F, 2021-22; RU, 18-19, 08-09; চ.বো. ২০১৪, ০৮; ব.বো. ২০০৫; সি.বো. ২০১১]

A.  $4x - y - 4 = 0$  B.  $x + 4y - 18 = 0$

C.  $4x - y + 4 = 0$  D.  $x + 4y + 18 = 0$

**S@Why**  $y = x^3 - 2x^2 + 4$

এখন,  $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4x$

$(2, 4)$  বিন্দুতে,  $\frac{dy}{dx} = 3 \times 4 - 4 \times 2 = 12 - 8 = 4$

$\therefore$  সমীকরণ,  $y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y - 4 = 4x - 8 \Rightarrow 4x - y - 4 = 0$

32. a এর কোন মানের জন্য  $y = ax(1-x)$  বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x-অক্ষের সাথে  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করবে?

[RU-C, Corundum-1, 22-23; DU: 15-16, 05-06; KU 14-15, RU: 08-09; IU: 15-16, 05-06; HSTU, 18-19, 16-17, 14-15, 13-14; JnU, 13-14; BU, 11-12; BSMRSTU, 18-19]

A. 0 B.  $\sqrt{3}$  C.  $-\sqrt{3}$  D. 1

**S@Why**  $y = ax - ax^2$

$\therefore \frac{dy}{dx} = a - 2ax$  এখন, মূলবিন্দু  $(0, 0)$  তে  $\frac{dy}{dx} = a - 2a \cdot 0 = a$

$\therefore$  মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x-অক্ষের সাথে  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে,

$\therefore \frac{dy}{dx} = \tan 60^\circ = \sqrt{3} \therefore a = \sqrt{3}$



PRIME TEST

01.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1}{x}$  এর মান কত?  
 (A)  $a$  (B) 0  
 (C) 2 (D)  $\log_e a$
02.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$  এর মান কত হবে?  
 (A)  $-5a^2$  (B)  $5a^2$   
 (C)  $\frac{a^2}{5}$  (D)  $\sqrt{5}a$
03.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 5}{3x^2 + 5x - 6}$  এর মান-  
 (A)  $\frac{3}{5}$  (B)  $-\frac{5}{6}$   
 (C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $-\frac{2}{3}$
04.  $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  এর মান কত?  
 (A) 2 (B) 3  
 (C)  $\pi$  (D)  $e$
05.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1}$  এর মান হবে-  
 (A)  $\frac{1}{3}$  (B)  $-\frac{1}{3}$   
 (C)  $\frac{1}{6}$  (D) 1
06.  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x + 2}{x - 5} = ?$   
 (A)  $+\infty$  (B)  $-\infty$   
 (C) 7 (D) অস্তিত্ব নেই
07.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}}{x}$  এর মান-  
 (A)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (B)  $\frac{1}{2}$   
 (C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (D)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$
08.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x}}{\cos x}$  এর মান-  
 (A)  $e$  (B) 1  
 (C)  $\frac{1}{e}$  (D) 0
09.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - e^{-x})}{2x}$  এর মান-  
 (A) 0 (B) 1  
 (C)  $\frac{1}{2}$  (D) Does not exist
10.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = ?$   
 (A) 0 (B)  $\infty$   
 (C) 2 (D) অনির্নিত
11.  $\frac{d}{dx} (\cos \sqrt{x})$  এর মান কোনটি?  
 (A)  $-\sin \sqrt{x}$  (B)  $-\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$   
 (C)  $-\frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$  (D)  $\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$
12. If  $x^a + y^a = a^a$  then  $\frac{dy}{dx} = ?$   
 (A)  $\left(\frac{x}{y}\right)^a$  (B)  $\left(-\frac{x}{y}\right)^a$   
 (C)  $\left(\frac{x}{y}\right)^{a-1}$  (D)  $-\left(\frac{x}{y}\right)^{a-1}$

13. যদি  $x^2 + 3xy + 5y^2 = 1$  হয়,  $\frac{dy}{dx}$  সমান-

- (A)  $\frac{2x + 3y}{3x + 10y}$  (B)  $\frac{2x - 3y}{3x + 10y}$   
 (C)  $\frac{2x + 3y}{3x - 10y}$  (D)  $-\frac{2x + 3y}{3x + 10y}$

14.  $xy + x^3y^3 - 5 = 0$  হলে  $\frac{dy}{dx}$  এর মান-

- (A)  $\frac{y}{x}$  (B)  $\frac{2x}{y}$   
 (C)  $\frac{2y}{x}$  (D)  $-\frac{y}{x}$

15.  $y = x^2 \log x$  হলে  $\frac{d^2y}{dx^2}$  এর মান কত?

- (A)  $-\frac{x}{2}$  (B)  $\frac{x}{2}$  (C)  $-\frac{x}{2}$  (D)  $\frac{2}{x}$

16. যদি  $y = e^{\tan^{-1} x}$  হয়, তবে  $\frac{dy}{dx}$  এর মান কোনটি?

- (A)  $e^{\tan^{-1} x}$  (B)  $e^{\tan^{-1} x} (1 + x^2)$   
 (C)  $\frac{e^{\tan^{-1} x}}{1 + x^2}$  (D)  $\frac{1}{1 + x^2}$

17.  $\frac{d}{dx} (\sqrt[3]{x^2})$  এর মান কোনটি?

- (A)  $\frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$  (B)  $\frac{2}{3} x^{-\frac{1}{2}}$  (C)  $\frac{1}{3} x^{-\frac{1}{3}}$  (D)  $\frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}}$

18.  $y = e^{ax} \sin^2 x$  হলে  $\frac{dy}{dx}$  এর মান কত?

- (A)  $e^{ax} \sin x (\cos x + a \sin x)$  (B)  $e^{ax} \sin x (2 \cos x + a \sin x)$   
 (C)  $e^{ax} \sin x (2 \cos x + \sin x)$  (D) কোনটিই নয়

19.  $y = x(3 - x^2)$  এবং  $\frac{dy}{dx} = 0$  হলে  $x$  এর মান কত?

- (A) 1 (B) -1  
 (C)  $\pm 1$  (D) 0

20.  $\frac{d}{dx} (x^2 + 7)(x^2 - 7)$  অন্তরকের মান কত?

- (A)  $7x^2$  (B)  $4x^2$   
 (C)  $4x^3$  (D)  $7x^3$

☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | D     | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1}{x} = \frac{a^0 \log_e a}{1}$ [Hospital's Law প্রয়োগে]<br>$= a^0 \log_e a = \log_e a$                                  |
| 02     | B     | $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = 5a^2$ |
| 03     | C     | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 5}{3x^2 + 5x - 6} = \frac{2}{3}$ [সর্বোচ্চ ঘাতযুক্ত $x$ এর সহগের অনুপাত]                                       |
| 04     | A     | $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = (1+1)^1 = 2$                                                        |



| ক্র.সং. | কথন                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 B    | $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x}{\sqrt{x^2+8}+3} \text{ (H.L.)}$<br>$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{\sqrt{x^2+8}} = \frac{-1}{\sqrt{(-1)^2+8}} = -\frac{1}{3}$            |
| 16 A    | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-5} = \frac{2}{-5} = -\frac{2}{5}$                                                                                                                                                               |
| 17 D    | Using technique: $\frac{1}{\sqrt{3}}$                                                                                                                                                                                                |
| 18 A    | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e^1}{\cos x - 1} = \frac{e^1 - e^1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$                                                                                                                                 |
| 19 B    | [Using L'Hopital Rule]<br>$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - e^{-x})}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x + e^{-x})}{2} = \frac{e^0 + e^0}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$                                                             |
| 20 C    | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}(-1)}{1} = e^0 + e^0 = 2$                                                                                                                  |
| 11 B    | $\frac{d}{dx} (\cos \sqrt{x}) = -\sin \sqrt{x} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$                                                                                                                     |
| 12 D    | $\frac{dy}{dx} = \frac{-mx^{n-1}}{ny^{n-1}} = -\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$<br>[∴ This is an implicit function]                                                                                                                   |
| 13 D    | $\frac{d}{dx} (x^2 + 3xy + 5y^2) = \frac{d}{dx} (0)$<br>$\Rightarrow 2x + 3x \frac{dy}{dx} + 3y \cdot 1 + 10y \frac{dy}{dx} = 0$<br>$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(2x+3y)}{(3x+10y)} = \frac{2x+3y}{3x+10y}$                    |
| 14 D    | $\frac{d}{dx} (xy + x^3y^2 - 5) = \frac{d}{dx} (0)$<br>$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + y \cdot 1 + x^3 \cdot 2y \frac{dy}{dx} + y^2 \cdot 3x^2 = 0$<br>$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(3x^2y^2 + y)}{(3x^3y^2 + x)} = -\frac{y}{x}$ |
| 15 D    | $y_1 = 2x \log x + x, y_2 = 2 \log x + 2 + 1 \therefore y_3 = \frac{2}{x}$                                                                                                                                                           |
| 16 C    | $y = e^{\tan^{-1} x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (e^{\tan^{-1} x}) = e^{\tan^{-1} x} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2}$                                                                             |
| 17 D    | $\frac{d}{dx} (\sqrt[3]{x^2}) = \frac{d}{dx} (x^{\frac{2}{3}}) = \frac{2}{3} x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}}$                                                                                                       |
| 18 B    | $y = e^{a \sin^2 x}$<br>$\therefore \frac{dy}{dx} = e^{a \sin^2 x} \cdot 2 \sin x \cos x + \sin^2 x \cdot e^{a \sin^2 x} \cdot a = e^{a \sin^2 x} (2 \cos x + a \sin x)$                                                             |
| 19 C    | $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (3x - x^3) = 3 - 3x^2$<br>$\therefore \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 3 - 3x^2 = 0$<br>$\Rightarrow 3(1-x^2) = 0 \Rightarrow 1-x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$                                            |
| 20 C    | $\frac{d}{dx} (x^2 + 7)(x^2 - 7) = \frac{d}{dx} (x^4 - 49) = 4x^3$                                                                                                                                                                   |

## অধ্যায়

৯০

## যোগজীকরণ

পণিত  
১ম পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস                                                                              | V.V.I<br>RATE |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | Basic Formula সংক্রান্ত                                                              | ***           |
| TOPIC-02 | প্রতিস্থাপন পদ্ধতি [Method of Substitution]                                          | ***           |
| TOPIC-03 | বিশেষ আকারের যোগজ                                                                    | **            |
| TOPIC-04 | Some Special Formula                                                                 | **            |
| TOPIC-05 | Integration by parts সংক্রান্ত                                                       | ***           |
| TOPIC-06 | Integration Using Partial Fraction                                                   | **            |
| TOPIC-07 | Definite Integrals of Algebraic Function                                             | **            |
| TOPIC-08 | Definite Integrals of Trigonometric Function                                         | **            |
| TOPIC-09 | স্থানাঙ্ক ও অস্থানাঙ্ক ফাংশনের ক্ষেত্রে                                              | *             |
| TOPIC-10 | পরমমান বিশিষ্ট Definite Integration এর মান নির্ণয়                                   | *             |
| TOPIC-11 | Some Special Definite Integrals                                                      | *             |
| TOPIC-12 | একটি বক্ররেখা ও এক/দুই সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের<br>ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত | **            |
| TOPIC-13 | Some Special Applications of Integration                                             | **            |

## এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

## Required Formulas for Integration

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$                                | $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c$                                         |
| $\int \frac{1}{x} dx = \ln x  + c$                                                | $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$                                  |
| $\int uv dx = u \int v dx - \int \left( \frac{d}{dx} (u) \int v dx \right) dx$    | $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left  \frac{x-a}{x+a} \right  + c$ |
| $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$                                                   | $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left( x + \sqrt{x^2 - a^2} \right) + c$  |
| $\int \frac{f(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$                             | $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$                                      |
| $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$               | $\int e^x dx = e^x + c$                                                           |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$                    | $\int \cos x dx = \sin x + c$                                                     |
| $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left  \frac{a+x}{a-x} \right  + c$ | $\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$                                              |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + c$  | $\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + c$                                      |
| $\int \frac{1}{x^n} dx = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$                                 | $\int (u \pm v) dx = \int u dx \pm \int v dx$                                     |
| $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c [a > 0, a \neq 1]$                           | $\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$                                  |
| $\int \sin x dx = -\cos x + c$                                                    | $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x)  + c$                                      |



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্রুটি সত্যাধিকা

Required Formulas for Integration

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\int \operatorname{cosec} x \cot x \, dx = -\operatorname{cosec} x + c$                                                  |
| $\int \tan x \, dx = -\ln(\cos x) + c = \ln(\sec x) + c$                                                                  |
| $\int \sec x \, dx = \ln \left  \tan \left[ \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right] \right  + c = \ln  \sec x + \tan x  + c$  |
| $\int \cot x \, dx = \ln(\sin x) + c = -\ln(\operatorname{cosec} x) + c$                                                  |
| $\int \operatorname{cosec} x \, dx = \ln \left  \tan \frac{x}{2} \right  + c = -\ln(\operatorname{cosec} x + \cot x) + c$ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c = \sqrt{a^2 - x^2} + c$                                     |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + \sqrt{x^2 - a^2} + c$                                         |
| $\int \frac{dx}{a^2 + (mx)^2} = \frac{1}{am} \tan^{-1} \frac{mx}{a} + c$                                                  |
| $\int \frac{dx}{(mx)^2 - a^2} = \frac{1}{2am} \log \frac{mx - a}{mx + a} + c$                                             |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - (mx)^2}} = \frac{1}{m} \sin^{-1} \frac{mx}{a} + c$                                            |
| $\int \frac{dx}{a^2 - (mx)^2} = \frac{1}{2am} \log \frac{a + mx}{a - mx} + c$                                             |

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

> প্রতিস্থাপন পদ্ধতি:

| অঙ্কে পরিষ্কার হলে<br>কিভাবে চিনবে                                                                                                                                     | মুখে মুখে করার Technique                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • অঙ্কের দুটি অংশে<br>সেওয়া থাকবে।                                                                                                                                    | Step-01: সুবিধাজনক অংশকে Z ধর। মনে মনে $\frac{d}{dx}$ কর।                                                                                                                                                                                                                |
| • অংশ দুটির যে কোন<br>একটিকে বা এর কোন<br>অংশ বিশেষকে $\frac{d}{dx}$<br>করলে অন্য অংশটি<br>হবে কিংবাসামান্য<br>পরিবর্তিত রূপে<br>হিসেবে ঐ অঙ্কে গুন<br>অবস্থায় থাকবে। | Step-02: সেখ অংকে Complete result আছে<br>কিনা। Complete result থাকলে তা অঙ্কে হতে বাদ<br>নাও। না থাকলে $\int$ Operator এর ভেতরে-বাইরে চিহ্ন<br>বা সংখ্যা Input Output করে Complete result<br>বানিয়ে নাও (অবশ্যই প্রাপ্যপক্ষে অঙ্কের ডাকের মধ্যেই),<br>তারপর তা বাদ দাও। |
|                                                                                                                                                                        | Step-03: অতঃপর তুমি যেভাবে Integration এর<br>প্রাথমিক সূত্র শিখেছ সেভাবে সূত্র ফেল।                                                                                                                                                                                      |

□ কোনো ফাংশন  $f(x)$  এর হয় এবং তার সাথে  $f'(x)$  গুণিতক আকারের থাকলে  
নিম্নোক্ত সূত্রসমূহ দ্বারা সহজে সমাধান করা যায়।

01.  $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + c$

02.  $\int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) \, dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c$

03.  $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} \, dx = 2\sqrt{f(x)} + c$

04.  $\int e^{f(x)} \cdot f'(x) \, dx = e^{f(x)} + c$

□ নির্দিষ্ট যোগজ এর ধরোপ:

■  $y$  এর একটি ফাংশন থাকলে ক্ষেত্রফল  $= \int_a^b y \, dx$

■  $y$  এর দুটি ফাংশন থাকলে ক্ষেত্রফল  $= \int_a^b (y_1 - y_2) \, dx$  [যদি কখনো  
হবে  $a$  ও  $b$  হলে  $x$  এর Value]

■ বৃত্তের সমীকরণ  $x^2 + y^2 = a^2$  দ্বারা আবদ্ধ: (i) যেটি ক্ষেত্রফল  $= \pi a^2$   
(ii) একটি চতুর্ভুজের আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $= \frac{\pi a^2}{4}$

■ উপবৃত্তের সমীকরণ  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  দ্বারা আবদ্ধ (যেখানে  $a > b$ ) (i) যেটি  
ক্ষেত্রফল  $= \pi ab$  (ii) একটি চতুর্ভুজের আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $= \frac{\pi ab}{4}$

■  $y^2 = 4ax$  পরাবৃত্ত ও  $y = mx$  দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $= \frac{2a^2}{3m^3}$

■ দুটি পরাবৃত্তের  $a$  সমান হলে ক্ষেত্রফল  $= \frac{16}{3} a^2$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কনসিডারেশন স্কলারশিপ

01.  $\int \sqrt{e^x} \, dx = ?$  [CU-A, Shift-2, 22-23, DU, 18-19]

A.  $\frac{2}{3} (e^x)^{\frac{3}{2}} + c$

B.  $\frac{1}{2} \sqrt{e^x} + c$

C.  $2e^{\frac{x}{2}} + c$

D.  $-e^{\frac{x}{2}} + c$

[S@Why]  $\int \sqrt{e^x} \, dx = \int e^{\frac{x}{2}} \, dx = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{1}{2}} + c$

$= 2e^{\frac{x}{2}} + c$

02.  $\int \tan x \, dx = ?$  [IU-D, 19-20]

A.  $\ln |\cos x| + c$  B.  $\ln |\sec x| + c$  C.  $\ln |\sin x| + c$  D.  $\ln \cos x + c$

[S@Why]  $\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + c$

03.  $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$  এর মান কত? [DU-A, 22-23, 17-18, 09-10, 97-98; RU-C, Correlation-  
1, 22-23; JU 17-18, 06-07; IU 17-18, KU 16-17, 19-20, 15-16; CU 04-05]

A.  $\tan^{-1}(e^{-x})$

B.  $\tan(e^{-x})$

C.  $\tan^{-1}(e^x)$

D.  $\tan(e^x)$

[S@Why]  $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{dx}{e^x + \frac{1}{e^x}}$

$= \int \frac{e^x \, dx}{(e^x)^2 + 1} = \int \frac{dz}{z^2 + 1}$  [Let,  $e^x = z \Rightarrow e^x \, dx = dz$ ]

$= \tan^{-1}(z) + c = \tan^{-1}(e^x) + c$

04.  $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x}} = ?$  [JU-18-19.A]

A.  $2\sqrt{2-x}$

B.  $\frac{\sqrt{2-x}}{2}$

C.  $-2\sqrt{2-x}$

D.  $-\frac{1}{2\sqrt{2-x}}$

[S@Why]  $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x}}$

$= - \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = -2\sqrt{z} + c = -2\sqrt{2-x} + c$  [যদি,  $2-x = z$   
 $\Rightarrow -dx = dz$ ]



05.  $\int \frac{\sin x}{3+4 \cos x} dx = \text{কত?}$

[RU: Copax-3, 22-23]

- A.  $-\frac{1}{4} \ln(3+4 \cos x) + c$  B. 0  
C.  $-\frac{3}{4} \ln(3+3 \cos x) + c$  D.  $-\frac{1}{4} \ln \sin x + c$

**[S@Why]**  $\int \frac{\sin x}{3+4 \cos x} dx = -\frac{1}{4} \int \frac{4 \sin x}{3+4 \cos x} dx$   
 $= -\frac{1}{4} \int \frac{d(3+4 \cos x)}{3+4 \cos x} = -\frac{1}{4} \ln(3+4 \cos x) + c$

06.  $\int x^2 e^{-x^3} dx = ?$

[BRU:13-14,E; JUST:14-15,A]

- A.  $\frac{e^{-x^3}}{3}$  B.  $-\frac{e^{-x^3}}{3}$   
C.  $\frac{x e^{-x^3}}{3}$  D.  $-\frac{x e^{-x^3}}{3}$

**[S@Why]**  $\int x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int (-3x^2 e^{-x^3}) dx = -\frac{e^{-x^3}}{3}$

07.  $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx = \text{কত?}$

[RU-C, Corundum-1, 22-23, IU: 18-19; RU: 09-10]

- A.  $x^2 + c$  B.  $x + c$   
C.  $2x + c$  D.  $c$

**[S@Why]**  $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx = \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}} dx$   
 $= \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int (1) dx = x + c$

08.  $\int \frac{x^2-1}{x^2-4} dx$  এর মান কোনটি?

[KU:16-17; সি.বো:০৩, ০৫, ১২; ঢা.বো:১১; কু.বো:০১; ০৬; য.বো:০৬]

- A.  $x + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{x+2}{x-2} \right| + c$  B.  $x + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$   
C.  $x + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$  D.  $x + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x+2}{x-2} \right| + c$   
E.  $x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

**[S@Why]**  $\int \frac{x^2-1}{x^2-4} dx = \int \frac{x^2-4+3}{x^2-4} dx = \int dx + 3 \int \frac{dx}{x^2-4}$   
 $= x + \frac{3}{2.2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c = x + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

09.  $\int e^x (\tan x - \ln \cos x) dx = \text{কত?}$

[RU-Uranus-1, Set-1, 21-22]

- A.  $e^x \sec^2 x + \frac{1}{\cos x} + c$  B.  $e^x \sec^2 x - \tan x + c$   
C.  $e^x \ln |\sec x| + c$  D. কোনটিই নয়

**[S@Why]**  $\int e^x (\tan x - \ln |\cos x|) dx$   
 $= -\int e^x (\ln |\cos x| - \tan x) dx = -e^x \ln |\cos x| + c = e^x \ln |\sec x| + c$

10.  $\int e^x \left\{ f(x) + \frac{d}{dx} (f(x)) \right\} dx$

[JNU: 09-10; KU: 18-19; JU: 13-14; CU: 12-13; HSTU: 09-10; PUST: 09-10]

- A.  $e^x + c$  B.  $e^x f(x) + c$   
C.  $f(x) + c$  D.  $e^x / f(x) + c$

**[S@Why]**  $\int e^x \left\{ f(x) + \frac{d}{dx} (f(x)) \right\} dx = e^x f(x) + c$

11.  $\int (\ln x)^2 dx = \text{কত?}$

[RU-C, Feldspar-1, 12-13]

- A.  $x (\ln x)^2 + 2x \ln x + 2x + c$  B.  $x (\ln x)^2 + 2x \ln x - 2x + c$   
C.  $x (\ln x)^2 - 2x \ln x - 2x + c$  D.  $x (\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c$

**[S@Why]**  $\int (\ln x)^2 dx = (\ln x)^2 \int dx - \int \left[ \frac{d}{dx} (\ln x)^2 \right] dx$

$= x (\ln x)^2 - \int \left[ 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \right] dx = x (\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx$

$= x (\ln x)^2 - 2 \left[ \ln x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int dx \right\} dx \right]$

$= x (\ln x)^2 - 2 \ln x + 2 \int \left( \frac{1}{x} \cdot x \right) dx = x (\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c$

12.  $\int \sin^5 x \cos x dx = f(x) + c$  যেখানে  $c$  একটি প্রদত্ত, তবে  $f(x) = ?$

[DU: 98-99; JU: 09-10; CU: 12-13]

- A.  $\frac{1}{6} \cos^6 x$  B.  $\frac{1}{6} \sin^6 x$  C.  $\cos^5 x \sin x$  D.  $-\frac{1}{6} \cos^6 x$

**[S@Why]**  $\int \sin^5 x \cos x dx = \int (\sin x)^4 \cos x dx$   
 $= \frac{1}{6} \sin^6 x + c \left[ \because \int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c \right]$

$\therefore \int \sin^5 x \cos x dx = f(x) + c$

$\therefore f(x) = \frac{1}{6} \sin^6 x$

13.  $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx = ?$

[DU 14-15]

- A.  $\frac{1}{2} (\ln 2)^2$  B.  $\frac{1}{2} \ln 2$  C.  $\infty$  D. 0

**[S@Why]**  $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx$

$= \int_0^{\ln 2} z dz = \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^{\ln 2}$   
 $= \frac{1}{2} [(\ln 2)^2 - 0] = \frac{1}{2} (\ln 2)^2$

যদি,  $\ln(x+1) = z$   
 $\Rightarrow \frac{1}{x+1} = \frac{dz}{dx} \Rightarrow \frac{dx}{x+1} = dz$

|   |   |      |
|---|---|------|
| x | 0 | 1    |
| z | 0 | ln 2 |

14.  $\int_1^e \log_e x dx = ?$

[DU: 02-03, 97-98; CU: 11-12, JNU: 05-06; BUET: 04-05; RU: 18-19; MBSTU: 11-12; SUST: 13-14; DU: 7Cig. 19-20]

- A. e B. 1 C. -e D. -1

**[S@Why]**  $\int_1^e \log_e x dx$

$= [x \log_e x - x]_1^e = [(e \log_e e - e) - (1 \log_e 1 - 1)] = 1$

15.  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}}$  এর মান কোনটি?

[JU-A, Set-H, 22-23; BU: 13-14]

- A.  $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$  B.  $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$  C.  $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$  D.  $\frac{\pi}{2}$

**[S@Why]**  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[ \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}x}{2} \right]_0^1$

$= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[ \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin^{-1} 0 \right] = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[ \frac{\pi}{3} - 0 \right] = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$



16.  $\int_0^{\ln 3} \frac{e^x}{1+e^x} dx$  এর মান কত? [JUA, Set-Q, 2021-22; SUST-14-15; MRSTU-18-19]

A.  $\ln \frac{2}{3}$  B.  $\ln \frac{4}{3}$  C.  $\ln \frac{1}{3}$  D.  $\ln \frac{3}{2}$  E. 1

**SQW**  $\int_0^{\ln 3} \frac{e^x}{1+e^x} dx = [\ln(1+e^x)]_0^{\ln 3} = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$

17.  $\int e^{2x} \cdot e^{2x} dx$  এর মান কোনটি? [RU-C, স্বচ্ছ-৩, 2023-24]

A.  $2e^{2x} + c$  B.  $e^{2x+1} + c$  C.  $\frac{1}{2}e^{2x} + c$  D.  $\frac{1}{2}e^{2x} + c$

**SQW**  $\int e^{2x} \cdot e^{2x} dx = \int e^{4x} dx = \frac{1}{4} e^{4x} + c$   
 যদি,  $e^{2x} = z$   
 $\therefore 2e^{2x} dx = dz$   
 $\Rightarrow e^{2x} dx = \frac{1}{2} dz$

18.  $\int_0^{\pi} (\sin x + 2 \cos x) dx$  এর মান কত? [RU-Uranus-1, Set-1, 21-22]

A. 1 B. -2 C. 2 D. -1

**SQW**  $\int_0^{\pi} (\sin x + 2 \cos x) dx = [-\cos x + 2 \sin x]_0^{\pi}$   
 $= [-(-1) - 0] - [-2 + 0] = 2$

19.  $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4x+1}}$  এর মান নির্ণয় কর। [RU, Astrazeneca, Set-1, 20-21]

A.  $\frac{3}{2}$  B. 6 C.  $\frac{2}{3}$  D. 9

**SQW**  $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4x+1}} = \frac{2}{4} [\sqrt{4x+1}]_0^2 = \frac{2}{3}$

20.  $\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx = ?$  [RU 15-16, 08-09; PUST, 16-17; IU, 16-17;

JAKNU, 18-19; KU, 10-11; NUST, 13-14; BU, 09-10; JUST, 13-14; রা.বো.11]

A.  $4\pi$  B.  $16\pi$  C.  $8\pi$  D.  $2\pi$

**SQW**  $\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx = \left[ \frac{x\sqrt{4^2-x^2}}{2} + \frac{4^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_0^4 = \frac{4^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$

**Aspect Special:** এরকম Math থাকলে  $\frac{\pi}{4}$  এর সাথে const. অংশ গণন করতে হবে।  $\therefore \frac{\pi}{4} \times \text{const.} = \frac{\pi}{4} \times 16 = 4\pi$

21.  $\int_{\log a}^{\log b} e^x dx$  এর মান কোনটি? [CU, 16-17, G2]

A.  $-b+a$  B.  $b-a$  C.  $a+b$  D.  $-a-b$

**SQW**  $\int_{\log a}^{\log b} e^x dx = [e^x]_{\log a}^{\log b} = e^{\log b} - e^{\log a} = b - a$

22.  $\int_0^4 \sqrt{3x+4} dx$  এর মান হয়- [CU, 13-14]

A. 56 B.  $\frac{112}{3}$  C.  $\frac{124}{9}$  D.  $\frac{112}{9}$

**SQW**  $\int_0^4 \sqrt{3x+4} dx = \left[ \frac{(3x+4)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{3} \right]_0^4$   
 $= \frac{2}{9} [(3x+4)^{\frac{3}{2}}]_0^4 = \frac{2}{9} [(16)^{\frac{3}{2}} - (4)^{\frac{3}{2}}] = \frac{2}{9} (64 - 8) = \frac{2}{9} \times 56 = \frac{112}{9}$

23.  $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{9-2x}} dx = ?$  [IU, 17-18; BUET, 09-10; BRU, 12-13]

A. 1 B. 4  
C. 3 D. 0

**SQW**  $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{9-2x}} dx = -\frac{1}{4} \int_0^2 \frac{-4x}{\sqrt{9-2x}} dx$   
 $= -\frac{1}{4} \cdot 2 [\sqrt{9-2x}]_0^2 = -\frac{1}{2} (1-3) = 1$

24.  $\int_0^1 \frac{x dx}{1-x^2} = ?$  [SUST-10-11]

A.  $1-2\sqrt{6}i$  B.  $-1-\sqrt{6}i$  C.  $1-2\sqrt{6}$  D.  $-1-2\sqrt{6}$

**SQW** Note: সঠিক উত্তর নাই। Ans.  $\ln \left( \frac{1}{2\sqrt{6}i} \right)$

25.  $\int_0^1 \frac{\cos^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$  এর মান- [DU: 09-10, 05-06; JNU: 12-13, 08-09, 05-06; PUST, 11-12; চ.বো. ২০১৯]

A.  $\frac{\pi^2}{8}$  B.  $\frac{\pi}{2}$  C.  $\frac{\pi}{8}$  D.  $\frac{\pi}{4}$

**SQW**  $\int_0^1 \frac{\cos^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\int_0^1 (\cos^{-1} x) \left( \frac{1}{-\sqrt{1-x^2}} \right) dx$   
 $= \left[ \frac{(\cos^{-1} x)^2}{2} \right]_0^1 = -\left[ 0 - \frac{\pi^2}{8} \right] = \frac{\pi^2}{8}$

26.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\cos x}$  এর মান কোনটি?

[JU-A, Set-G, 22-23; CU- 18-19, 14-15; RU, 07-08; JU, 18-19; NU, 13-14]

A. 1 B.  $\frac{1}{2}$  C.  $\frac{1}{3}$  D. 2

**SQW**  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\cos x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec^2 \frac{x}{2} dx$   
 $= \frac{1}{2} \times 2 \left[ \tan \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left[ \tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 \right] = [1 - 0] = 1$

27.  $\int_0^{10} |x-5| dx = ?$  [DU 15-16]

A.  $\frac{25}{2}$  B. 25 C. 50 D. 5

**SQW**  $\int_0^{10} |x-5| dx = \int_{-5}^5 |z| dz$   
 $= -\int_{-5}^0 z dz + \int_0^5 z dz = -\left[ \frac{z^2}{2} \right]_{-5}^0 + \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^5$   
 $= -\frac{1}{2} (0 - (-5)^2) + \frac{1}{2} (5^2 - 0) = \frac{25}{2} + \frac{25}{2} = 25$

যদি,  $x-5 = z$   
 $\Rightarrow dx = dz$

|   |    |    |
|---|----|----|
| x | 0  | 10 |
| z | -5 | 5  |

28.  $y = x^2$  এবং  $y = 2x$  দ্বারা আবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল- [DU: 06-07, SUST: 12-13; PUST, 14-15]

A.  $\frac{4}{3} \text{ unit}^2$  B.  $\frac{3}{4} \text{ unit}^2$   
C.  $4 \text{ unit}^2$  D.  $3 \text{ unit}^2$

**SQW**  $y = x^2$  এবং  $y = 2x$  দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল =  $\frac{8}{3} a^2 m^3$   
 $= \frac{8}{3} \cdot \left( \frac{1}{4} \right)^2 \cdot 2^3 \left[ a = \frac{1}{4}, m = 2 \right] = \frac{4}{3}$



## অধ্যায়

০৬

## বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

পাঠিত  
২য় পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস                                                     | V.V.I<br>RATE |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | সংখ্যার প্রাথমিক আলোচনা                                     | **            |
| TOPIC-02 | মূলদ, অমূলদ সংখ্যা নির্ণয়                                  | ***           |
| TOPIC-03 | মান নির্ণয় ও পরমমানের ধর্ম সংক্রান্ত                       | **            |
| TOPIC-04 | পরমমান আকারে প্রকাশ                                         | *             |
| TOPIC-05 | ( $<$ ) বা ( $\leq$ ) মুক্ত অসমতার সমাধান                   | ***           |
| TOPIC-06 | $>$ বা $\geq$ মুক্ত অসমতার সমাধান                           | ***           |
| TOPIC-07 | লব এবং হর বিশিষ্ট অসমতার সমান যখন হবে চলকমুক্ত পরমমান থাকবে | ***           |
| TOPIC-08 | পরমমানের দুই দিকে অসমতা থাকলে সমাধান                        | **            |
| TOPIC-09 | বিদ্যাত অসমতার সমাধান                                       | **            |
| TOPIC-10 | বাস্তব সংখ্যার সম্পূর্ণতা ধর্ম                              | *             |

## এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $ ax + b  \leq c$<br>আকারের<br>অসমতার<br>সমাধান                                                             | <p>Step-1: অংকের ডাকটিকে প্রথমে <math>-c \leq ax + b \leq c</math> আকারে লিখ</p> <p>Step-2: মডুলাসের ভেতরে যে Constant সংখ্যাটি থাকে তার বিপরীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যা নিয়ে Step-1 এর তিনটি অংশের সাথেই যোগ কর।<br/>অর্থাৎ, <math>-c - b \leq ax + b - b \leq c - b</math><br/>বা <math>-c - b \leq ax \leq c - b</math> আকারে লিখ।</p> <p>Step-3: <math>x</math> কে <math>a</math> মুক্ত কর। অর্থাৎ, <math>\frac{-c-b}{a} \leq x \leq \frac{c-b}{a}</math></p> <p>Step-4: <math>x</math> এর সামনে ঋণাত্মক চিহ্ন থাকলে <math>(-1)</math> দ্বারা গুন করে অসমতার চিহ্নটি উল্টে দাও। আবার ধনাত্মক চিহ্ন থাকলে কিছু করার দরকার নেই।</p> |
| $ ax + b  \geq c$<br>আকারের<br>অসমতার<br>সমাধান                                                             | <p>Step-1: অংকের ডাকটিকে প্রথমে <math>-c \geq ax + b \geq c</math> আকারে লিখ।</p> <p>Step-2: মডুলাসের ভেতরে যে Constant সংখ্যাটি থাকে তার বিপরীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যা নিয়ে Step-1 এর তিনটি অংশের সাথেই যোগ কর।<br/>অর্থাৎ, <math>-c - b \geq ax + b - b \geq c - b</math><br/>বা <math>-c - b \geq ax \geq c - b</math> আকারে লিখ</p> <p>Step-3: <math>x</math> কে <math>a</math> মুক্ত কর। অর্থাৎ, <math>\frac{-c-b}{a} \geq x \geq \frac{c-b}{a}</math></p>                                                                                                                                                                     |
| পরমমান আকারে প্রকাশ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $a \leq bx + c \leq d$ হলে প্রত্যেক অংশে $a, b$ এর বীজগাণিতিক গড় বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $a - \frac{a+d}{2} \leq bx + c - \frac{a+d}{2} \leq d - \frac{a+d}{2}$                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\Rightarrow \frac{a-d}{2} \leq bx + k \leq \frac{d-a}{2} \left[ k = c - \frac{a+d}{2} \text{ ধরে} \right]$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\Rightarrow -\frac{d-a}{2} \leq bx + k \leq \frac{d-a}{2}$                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\therefore  bx + k  \leq \frac{d-a}{2}$ লিখতে হবে।                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01.  $N, Z, Q$  ও  $R$  যথাক্রমে সকল বাস্তবিক সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা, মূলদ সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যার সেট হলে এদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক—

[IU, 16-17, 05-06; BSMRSTU, 19-20]

A.  $N \subset Q \subset Z \subset R$

B.  $N \subset Z \subset Q \subset R$

C.  $Q \subset N \subset Z \subset R$

D.  $R \subset Q \subset Z \subset N$

[S.O. Why]  $N \subset Z \subset Q \subset R$ 

02. ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা  $a < b$  এর জন্য নিচের কোনটি সত্য? [PSTU-A/JA, 17-18]

A.  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

B.  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

C.  $\frac{1}{a} = \frac{1}{b}$

D. কোনটিই নয়

[S.O. Why]  $a < b$  বা,  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$  [Inverse করে দিলে অসমতার চিহ্ন পরিবর্তন হয়]

[RU, 15-16; DU, 04-05]

03. কোনটি অমূলদ সংখ্যা নয়?

A. 0.1010010001.....

B. 0.101101101.....

C.  $\sqrt{11}$

D.  $\pi$

[S.O. Why] 0.101101101..... কে পৌনঃপুনিক প্রকাশ করা যাবে। তাই সংখ্যাটি অমূলদ নয়।

04.  $|\sqrt{10} - 4|$  কে পরম মান চিহ্ন ব্যতীত লিখলে দাঁড়ায়— [JU, 09-10]

A.  $\sqrt{10} - 4$

B.  $4 - \sqrt{10}$

C.  $\sqrt{10} - 4$

D.  $\sqrt{10}$

[S.O. Why]  $\sqrt{10} - 4 = -0.8377$ 

$\therefore |\sqrt{10} - 4|$  কে পরম মান চিহ্ন ব্যতীত লিখলে দাঁড়ায়  $= 4 - \sqrt{10}$

05.  $a, b \in \mathbb{R}$  এর জন্য কোনটি সঠিক নয়? [RU, 15-16]

A.  $|a| + |b| \geq |a + b|$

B.  $|ab| = |a||b|$

C.  $|a - c| + |c - b| > |a - b|$

D.  $|a| - |b| < |a - b|$

[S.O. Why] পরম মানের ধর্ম:

(i)  $|a| + |b| > |a + b|$

(ii)  $|ab| = |a||b|$

(iii)  $|a| - |b| \leq |a - b|$

(iv)  $|a - c| + |c - b| > |a - b|$

06.  $-4 \leq x \leq 2$  কে পরমমান চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক? [JU-H, 19-20]

A.  $|x + 1| \leq 3$

B.  $|x + 1| \leq 1$

C.  $|x + 1| \leq 5$

D.  $|x + 1| \leq 2$

[S.O. Why]  $-4 \leq x \leq 2 \Rightarrow -4 + 1 \leq x + 1 \leq 2 + 1$ 

$\Rightarrow -3 \leq x + 1 \leq 3 \therefore |x + 1| \leq 3$

07.  $-1 < 2x - 3 < 5$  কে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে কোন প্রকারে লেখা যায়? [MBSTU, 17-18; BUET, 10-11; সি.বো. ২০০৫, ১৪; চ.বো. ২০০৬, ১৩; সি.বো. ২০০৯, ১৪; ব.বো. ২০১০, ১৪; ব.বো. ২০১১]

A.  $|2x - 3| < 3$

B.  $|2x - 5| < 3$

C.  $|x - 3| < 3$

D.  $|x| < 3$

[S.O. Why]  $-1 < 2x - 3 < 5$ 

$-1 - 2 < 2x - 3 - 2 < 5 - 2 \Rightarrow -3 < 2x - 5 < 3 \therefore |2x - 5| < 3$

$\Rightarrow -3 < 2x - 5 < 3 \Rightarrow |2x - 5| < 3$

$\Rightarrow -3 < 2x - 5 < 3 \Rightarrow |2x - 5| < 3$

08.  $|2x - 7| < 5$  অসমতাটির বাস্তব সংখ্যার সমাধান কি? [DU, 00-01; CU, 12-13; RU, 06-07; JnU, 00-01]

A.  $x > 1$

B.  $x < 6$

C.  $x > 1$  অথবা  $x < 6$

D.  $x > 1$  এবং  $x < 6$

[S.O. Why]  $|2x - 7| < 5 \Rightarrow -5 < 2x - 7 < 5$ 

$\Rightarrow 2 < 2x < 12 \Rightarrow 1 < x < 6$

 $\therefore$  অসমতাটির সমাধান  $= x > 1$  এবং  $x < 6$ 

09.  $|2x + 3| < 7$  এর সমাধান সেট কোনটি? [JU, 13-14; RU, 08-09; RU-C, 15-16, 14-15]

A.  $-3 < x < 6$

B.  $5 < x < 7$

C.  $-2 < x < 5$

D.  $-5 < x < 2$

[S.O. Why]  $|2x + 3| < 7 \Rightarrow -7 < 2x + 3 < 7$ 

$\Rightarrow -10 < 2x < 4 \Rightarrow -5 < x < 2 \therefore$  অসমতাটির সমাধান  $= -5 < x < 2$



10. নিচের কোন অসমতাটি  $|x-2| < 5$  এর সমতুল্য? [DU, 18-19; MBSTU-A, 19-20]  
 A.  $-5 < x < 5$  B.  $-3 < x < 5$  C.  $-3 < x < 7$  D.  $-5 < x < 7$   
**SOWHY**  $|x-2| < 5 \Rightarrow -5 < x-2 < 5$   
 $\Rightarrow -5+2 < x-2+2 < 5+2 \Rightarrow -3 < x < 7$

11.  $|2x-5| < 3$  এর সমাধান কোনটি? [CU-A, Set-3, 20-21]  
 A.  $-1 < x < 4$  B.  $1 < x < 4$  C.  $1 < x < 3$  D.  $-4 < x < 1$   
**SOWHY**  $|2x-5| < 3 \Rightarrow -3 < 2x-5 < 3 \Rightarrow 1 < x < 4 \Rightarrow x \in (1, 4)$

12. অসমতা  $|5-2x| \geq 4$  এর সমাধান সেট। [DU, 17-18, 03-04; JUST-C, 19-20; BSFMTU, 19-20]  
 A.  $\left[\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right]$  B.  $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{9}{2}, \infty\right)$   
 C.  $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$  D.  $\left[\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right] \cup \left[\frac{27}{2}, \infty\right)$  **D**

13.  $|2x-7| > 5$  অসমতাটির সমাধান কোনটি? [JU, 18-19; DU, 01-02; IU, 16-17]  
 A.  $x < 1$  B.  $x > 6$   
 C.  $x > 6$  অথবা  $x < 1$  D.  $x > 6$  এবং  $x < 1$   
**SOWHY**  $|2x-7| > 5 \Rightarrow -5 > 2x-7 > 5$   
 $\Rightarrow 2 > 2x > 12 \Rightarrow 1 > x > 6 \Rightarrow x < 1$  অথবা  $x > 6$

14.  $\frac{1}{|2x-3|} > 5$  অসমতাটির সমাধান কোনটি? [JU, 18-19; DU, 12-13, 09-10]  
 A.  $\left(\frac{7}{5}, \frac{2}{3}\right)$  B.  $\left(\frac{3}{2}, \frac{8}{5}\right)$   
 C.  $\left(\frac{7}{5}, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, \frac{8}{5}\right)$  D.  $\left(\frac{7}{5}, \frac{8}{5}\right)$

- SOWHY**  $\frac{1}{|2x-3|} > 5 \Rightarrow -5 > \frac{1}{2x-3} > 5 \Rightarrow -\frac{1}{5} < 2x-3 < \frac{1}{5}$   
 $\Rightarrow -\frac{1}{5} + 3 < 2x-3+3 < \frac{1}{5} + 3 \Rightarrow \frac{14}{5} < 2x < \frac{16}{5}$   
 $\Rightarrow \frac{7}{5} < x < \frac{8}{5}$  এবং  $2x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{3}{2} \Rightarrow \left(\frac{7}{5}, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, \frac{8}{5}\right)$

15.  $8x+3 < 3x^2$  হলে  $x$  এর মান? [CU, 18-19]  
 A.  $x > 3$  or  $x < \frac{1}{3}$  B.  $x < 3$  C.  $x > 8$  D.  $-\frac{1}{3} < x < 3$   
**SOWHY**  $8x+3 < 3x^2 \Rightarrow 3x^2-8x-3 > 0$   
 $\Rightarrow \left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3) > 0 \Rightarrow x < -\frac{1}{3}$  or  $x > 3$

16.  $S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$  হলে  $S$  এর লম্বিত উর্ধ্বসীমা কোনটি? [JU, 17-18]  
 A. 1 B. 0 C. -1 D.  $\frac{1}{2}$   
**SOWHY**  $S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$   
 $S$  এর উর্ধ্বসীমা = 1, 2, 3, .....;  $S$  এর লম্বিত উর্ধ্বসীমা = 1

### PRIME TEST

01.  $|\sqrt{10}-4|$  কে পরম মান চিহ্ন ব্যতীত লিখলে দাঁড়ায়-  
 A.  $\sqrt{10}-4$  B.  $4-\sqrt{10}$  C.  $\sqrt{10}-4$  D.  $\sqrt{10}$   
 02.  $a > b$  এবং  $c < 0$  হলে নিচের কোনটি সঠিক?  
 A.  $ac < bc$  B.  $\frac{c}{a} < \frac{c}{b}$  C.  $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$  D.  $ac > bc$   
 03.  $5\sqrt{5}$  এর  $\sqrt{5}\%$  = ?  
 A. 0.05 B. 0.25 C. 0.5 D. 2.5  
 04. কোনটি অমূলদ সংখ্যা নয়?  
 A. 0.1010010001..... B. 0.101101101.....  
 C.  $\sqrt{11}$  D.  $\pi$

05. যদি  $A > B$ ,  $C < B$  এবং  $A < D$  হয়, তবে নিচের কোনটি সত্য?  
 A.  $C < B < D$  B.  $C < B < A$   
 C.  $D < C < A$  D.  $A < C < B$

06.  $a, b \in \mathbb{R}$  এর জন্য কোনটি সঠিক নয়?  
 A.  $|a| + |b| \geq |a+b|$  B.  $|ab| = |a||b|$   
 C.  $|a-b| + |a+b| \geq |a-b|$  D.  $|a-b| < |a-b|$

07.  $|5x+7| = 3$  হলে  $x$  এর মান কত?  
 A.  $\frac{3}{4}, \frac{3}{2}$  B.  $\frac{4}{5}, 2$   
 C.  $\frac{4}{5}, -2$  D.  $\frac{4}{3}, \frac{2}{3}$

08.  $x \leq \frac{1}{2}$  বা  $x \geq \frac{9}{2}$  কে পরম মান আকারে প্রকাশ করলে হবে-  
 A.  $|2x-5| \leq 4$  B.  $|5-2x| \leq 4$   
 C.  $|5-2x| \leq 4$  D.  $|5-2x| \leq \frac{1}{4}$

09.  $-3 < x < 9$  হলে, নিচের কোনটি সত্য?  
 A.  $|x-9| < 12$  B.  $|x+3| < 6$   
 C.  $|x-3| < 6$  D.  $|x+9| < 12$

10.  $4 < x < 10$  অসমতাকে পরম মান চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করলে হবে-  
 A.  $|x-4| < 10$  B.  $|10-x| < 4$   
 C.  $|x-7| > 4$  D.  $|x-7| < 3$

11.  $\left|3-\frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$  অসমতাটির সমাধান সেট-  
 A.  $\frac{2}{7} < x < \frac{2}{5}$  B.  $-\frac{4}{7} < x < -\frac{2}{5}$  C.  $\frac{1}{8} < x < \frac{1}{7}$  D.  $\frac{1}{5} < x < \frac{1}{7}$

12. নিচের কোন অসমতাটি  $|x-2| < 5$  এর সমতুল্য?  
 A.  $-5 < x < 5$  B.  $-3 < x < 5$  C.  $-3 < x < 7$  D.  $-5 < x < 7$

13. বাস্তব সংখ্যার  $|3-2x| \leq 1$  অসমতাটির সমাধান-  
 A.  $1 < x < 2$  B.  $1 \leq x \leq 2$  C.  $x \leq 1$  or  $x \geq 2$  D.  $1 < x \leq 2$

14.  $|3x+2| < 7$  এর সমাধান হচ্ছে-  
 A.  $-4 < x < \frac{5}{4}$  B.  $-2 < x < \frac{3}{2}$  C.  $-3 < x < \frac{5}{3}$  D.  $-4 < x < \frac{7}{4}$

15. বাস্তব সংখ্যার উপসেট  $S = \{x : x^2-3x+2 < 0\}$  এর কূটম সীমার ও ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা হবে-  
 A.  $2 < x < 1$  B.  $1 < x < 2$   
 C.  $-3 < x < 2$  D.  $2 < x < 3$

16. বাস্তব সংখ্যার  $|2x-3| \leq 1$  অসমতাটির সমাধান কোনটি?  
 A.  $1 \leq x \leq 2$  B.  $1 < x < 2$   
 C.  $x \leq 1$  অথবা  $x \geq 2$  D.  $-2, x \leq 2$

17. বাস্তব সংখ্যার উপসেট  $S = \{x : 5x^2-16x+3 < 0\}$  এর কূটম ও ক্ষুদ্রতম সীমা কত?  
 A. 3, 5 B.  $\frac{1}{3}, \frac{5}{3}$   
 C.  $\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$  D.  $\frac{3}{1}, \frac{5}{3}$

18. যদি  $x$  এবং  $y$  উভয়েই ধারাবাহিক Prime number হয় এবং  $x, y \leq 70$  হয়, তাহলে  $x$  এবং  $y$  এর জন্য নিচের কোন পার্থক্যটি সঠিক নয়?  
 A. 2 B. 4  
 C. 5 D. 6

19. মান নির্ণয় কর:  $13+|-1-4|-3-|-8|-1-1-1$   
 A. 6 B. 5  
 C. 4 D. 10

20.  $N, Z, Q$  ও  $R$  কয়ক্রেমে সকল বাস্তবিক সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা, কূট সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যার সেট হলে এদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক-  
 A.  $N \subset Q \subset Z \subset R$  B.  $N \subset Z \subset Q \subset R$   
 C.  $Q \subset N \subset Z \subset R$  D.  $R \subset Q \subset Z \subset N$



शिव  
शिव

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10-trial condition than for the 5-trial condition. Error bars represent the standard error of the mean.



-  CamScanner



10.  $x + y < 1, y < 1, x, y > 0$  শর্তবলী সাপেক্ষে  $2x + y$  এর সর্বোচ্চ মান কত?

- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 5

11.  $5x_1 + 10x_2 \leq 50, x_1 + x_2 \geq 1, x_2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$  শর্তবলী সাপেক্ষে  $2x_1 + 7x_2$  এর সর্বোচ্চ মান-

- (A) 2 (B) 7  
(C) 20 (D) 28

12.  $x + y \geq 6, 2x + y \geq 8, x, y \geq 0$  শর্তসমূহ সাপেক্ষে  $z = 2x + 3y$  রাশিটির সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

- (A) 16 (B) 10  
(C) 12 (D) 14

13.  $x + y \leq 8, x \geq 4, y \leq 4$  শর্তে  $z = x + 2y$  এর সর্বোচ্চ মান-

- (A) 4 (B) 8  
(C) 12 (D) 16

14.  $x + y \geq 6, 2x + y \geq 8, x \geq 0, y \geq 0$  শর্তাধীনে  $z = 3x + 2y$  এর সর্বনিম্ন মান কত?

- (A) 8 (B) 12  
(C) 14 (D) 15

15. Feasible Region/ সম্ভাব্য সমাধান এলাকা কোন চতুর্ভুজে অবস্থান করে?

- (A) ১ম (B) ২য়  
(C) ৩য় (D) যেকোনো চতুর্ভুজে


16.  $x, y \geq 0, x + 2y \leq 10, x + y \leq 6$  শর্তসাপেক্ষে  $z = 2x + 5y$  এর সর্বনিম্ন মান কত?

- (A) 24 (B) 16  
(C) 12 (D) 10

17.  $2x + y \leq 8, 2x + 3y \leq 12, x \geq 0, y \geq 0$  শর্ত সাপেক্ষে  $z = 4x + 3y$  এর সর্বোচ্চ মান কোনটি?

- (A) 12 (B) 16  
(C) 17 (D) 18

18. কোন কারখানায় পুরুষ ও মহিলা কর্মী যথাক্রমে  $x$  ও  $y$ । পুরুষ ও মহিলা কর্মী একত্রে অনধিক 500। আবার দ্বিগুণ মহিলা ও পুরুষ কর্মী একত্রে অনধিক 700। উক্ত শর্তগুলিকে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়-



- (A)  $x = y \geq 500, x + 2y \leq 700$   
(B)  $x + y \geq 500, x + 2y \leq 700$   
(C)  $x + y \leq 500, x + 2y \leq 700$   
(D)  $x + y \geq 500, x + 2y \leq 700$

19. A ও B প্রকার খেলনা তৈরীতে যথাক্রমে 5 ও 3 একক শ্রম এবং 3 ও 4 একক কাঁচামাল লাগে। A প্রকারের প্রতিটি থেকে 10 টাকা ও B প্রকারের প্রতিটি থেকে 12 টাকা লাভ করা সম্ভব হয় এবং কোম্পানিটি 165 একক শ্রম ও 132 একক কাঁচামাল যোগান দিতে পারে, তবে সর্বোচ্চ যে লাভ হবে তা হলো-

- (A) 330 taka (B) 360taka  
(C) 420 taka (D) 448aka

20.  $z = x + y$  সীমাবদ্ধতা:  $12x + 8y \leq 100, x \geq 1, y \leq 8, y \geq 0$  হলে-

- (A)  $x = 1, y = 8$  (B)  $x = 3, y = 8$   
(C)  $x = 8, y = 1$  (D)  $x = 8, y = 3$

### ☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                   |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01     | D     | $0.6x + 0.3y \leq 1200; x + y \leq 3000;$<br>Solving, $x = 1000, y = 2000$ |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02     | C     | $x + 2y \leq 10 \Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{y}{5} = 1; x + y \leq 6 \Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{6} = 1$<br>এবং $x \leq 4 \Rightarrow x = 4$<br>এখন, $x + y = 6$ ও $x = 4$ -এর ছেদবিন্দু (4, 2)<br>এবং $x + 2y = 10$ ও $x + y = 6$ -এর ছেদবিন্দু (2, 4)                                                                                                                |
| 03     | B     | $x_1 + x_2 \leq 1 \Rightarrow \frac{x_1}{1} + \frac{x_2}{1} = 1$<br>$x_2 \leq 1$<br>A(1, 0) বিন্দুতে, মান = 3<br>B(0, 1) বিন্দুতে, মান = 7<br>সর্বোচ্চ মান = 7                                                                                                                                                                                                                    |
| 04     | D     | $\frac{x}{5} + \frac{y}{5} = 1; \frac{x}{8} + \frac{y}{4} = 1$<br>(2, 3), $z = 4 - 3 = 1$<br>(0, 4), $z = 0 - 4 = -4$<br>(0, 5), $z = 0 - 5 = -5$                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05     | B     | সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ লাভ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06     | D     | $x + y = 5 \dots \dots \dots (i)$<br>$x = 2 \dots \dots \dots (ii)$<br>$y = 4 \dots \dots \dots (iii)$<br>(i) ও (ii) থেকে পাই,<br>$y = 5 - 2 = 3 \therefore G \equiv (2, 3)$<br>$G \equiv (2, 3)$ বিন্দুতে, $z = 6 \times 2 + 2 \times 3 = 18$<br>$A \equiv (5, 0)$ বিন্দুতে, $z = 6 \times 5 + 2 \times 0 = 30$<br>$\therefore A(5, 0)$ বিন্দুতে অভিন্ন ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান 30 |
| 07     | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08     | C     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09     | A     | $\frac{x}{7} + \frac{y}{7} = 1 \dots \dots \dots (i)$<br>$\frac{x}{10} + \frac{y}{4} = 1 \dots \dots \dots (ii)$<br>$\therefore$ ছেদ বিন্দু $(x, y) = (5, 2)$<br>A(7, 0) বিন্দুতে $z = 3 \times 7 = 21$<br>এবং B(0, 4) বিন্দুতে $z = 4 \times 4 = 16$<br>$\therefore z_{\max} = 23$ যেখানে, $(x, y) = (5, 2)$                                                                     |



[illegible]







08.  $z = 1 + i$  এর আর্গমেন্ট কোমেন্ট? [JU-A, Set-G, 2023-24; JU-A, Set-B, 22-23; JU, 18-19, 14-15; RU, 18-19; NSTU, 19-20; BSFMSU, 19-20]
- A.  $\frac{\pi}{4}$  B.  $\frac{3\pi}{4}$  C.  $4\pi$  D.  $\frac{\pi}{2}$
- [S.O. Why]  $z = -1 + i$ ;  $0 = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{1}{-1} \right| = \frac{3\pi}{4}$
09.  $z = -1$  জটিল সংখ্যাটির আর্গমেন্ট হবে- [RU-C, 19-20]
- A.  $90^\circ$  B.  $270^\circ$  C.  $120^\circ$  D.  $300^\circ$
- [S.O. Why]  $z = -1$  এর আর্গমেন্ট:
- $$2\pi - \tan^{-1} \left( \frac{0}{-1} \right) = 2\pi - \frac{\pi}{2} = 360^\circ - 90^\circ = 270^\circ$$
10.  $(3 + 4i)$  ও  $(-3 - 4i)$  জটিল সংখ্যাটির মডুলাসের পার্থক্য হবে- [JU, 14-15]
- A. 1 B. 0 C. 6 D. 8
- [S.O. Why]  $3 + 4i$  এর মডুলাস  $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
- এবং  $-3 - 4i$  এর মডুলাস  $= \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$
- $\therefore$  মডুলাসের পার্থক্য  $= 5 - 5 = 0$
11.  $8 + 4\sqrt{5}i$  এর বর্গমূল হবে- [RU-F, 13-14]
- A.  $\pm(3 - 2i)$  B.  $\pm(\sqrt{10} + \sqrt{2}i)$  C.  $\pm(\sqrt{10} - \sqrt{2}i)$  D.  $\pm(3 + 2i)$
- [S.O. Why]  $8 + 4\sqrt{5}i$  অপসারণ (B) হতে,  $2 \times \sqrt{10} \times \sqrt{2}i = 4\sqrt{5}i$
12. যদি  $C^2 = 5 + 12i$  হয় তবে C এর মান কত? [CU-G, 15-16]
- A.  $\pm 4i$  B.  $\pm(1 - 2i)$  C. 7i D.  $2 - 3i$
- E.  $\pm(3 + 2i)$
- [S.O. Why]  $C^2 = 5 + 12i$
- $$\Rightarrow C = \sqrt{5 + 12i} = \sqrt{9 + 12i - 4} = \sqrt{(3 + 2i)^2} = \pm(3 + 2i)$$
13.  $2i$  এর বর্গমূল- [JU, 17-18; RU, 16-17; SUST, 06-07; CU, 06-07; পি.এম. ২০১৯]
- A.  $\pm(1 + i)$  B.  $1 - i$  C.  $-1$  D.  $-1 + i$
- [S.O. Why]  $2i = 1 - 1 + 2i = 1 + i^2 + 2i = (1 + i)^2$
- $\therefore 2i$  এর বর্গমূল  $= \pm(1 + i)$
14.  $\sqrt[3]{-64}$  এর ঘনমূল হবে- [CU-F, 11-12]
- A. -8 B. 4 C.  $i2$  D. -4 E.  $-i2$
- [S.O. Why]  $\sqrt[3]{-64} = \sqrt[3]{(-4)^3} = -4, -4\omega, -4\omega^2$
15.  $\sqrt[4]{-256} = ?$  [RU, 13-14]
- A.  $4i$  B.  $4(1 \pm i)$  C.  $2\sqrt{2}(1 \pm i)$  D. কোনটিই নয়
- [S.O. Why]  $\sqrt[4]{-256} = \sqrt[4]{-16^2} = \pm \sqrt{\frac{16}{2}}(1 \pm i) = \pm 2\sqrt{2}(1 \pm i)$
16. যদি  $\omega$  এককের একটি কাল্পনিক জটিল ঘনমূল হয়, তবে  $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 = ?$  [DU, 11-12, 05-06, 01-02, 97-98; JU-A, Set-G, 22-23; JU, 16-17, 05-06, JU, 08-09, CU, 07-08; DU-7Clg, 19-20;]
- A. -4 B. 4 C. -3 D. 3
- [S.O. Why]  $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2$
- $$= (-\omega - \omega)^2 + (-\omega^2 - \omega^2)^2 = 4\omega^2 + 4\omega^4 = 4\omega^2 + 4\omega = 4(\omega + \omega^2) = -4$$
17. এককের কাল্পনিক ঘনমূলের একটি  $\omega$  হলে,  $\omega^{16} + \omega^{32}$  এর মান কত? [RU, 11-12]
- A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
- [S.O. Why]  $\omega^{16} + \omega^{32} = \omega + \omega^2 = -1$
18. এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল  $\omega$  হলে  $(1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega^4)(1 + \omega^8)$  এর মান- [JU, 07-08]
- A. -1 B.  $\frac{1}{2}$  C.  $\frac{1}{10}$  D. 1
- [S.O. Why]  $(1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega^4)(1 + \omega^8)$
- $$= (1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega)(1 + \omega^2) = (-\omega^2)(-\omega)(-\omega^2)(-\omega) = 1$$

19.  $\sqrt{x + iy} = a + ib$  হলে  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = ?$  [JU, 18-19; KUET, 05-06, 06-07, 08-09, 11-12; BUT, 05-06; BIT, 02-03; পি.এম. ১৯; মাসিক ০৬; পি.এম. ২০১৯; পি.এম. ২০২০; পি.এম. ২০২১; পি.এম. ২০২২; পি.এম. ২০২৩; পি.এম. ২০২৪]
- A.  $x^2 - y^2$  B.  $0.5(x^2 - y^2)$  C.  $4(x^2 - y^2)$  D.  $4(x^2 + y^2)$

[S.O. Why]  $\sqrt{x + iy} = a + ib$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে,  $x + iy = (a + ib)^2 = a^2 + 3a^2ib + 3a^2b^2 + i^2b^2$

$$\Rightarrow x + iy = a^2 - b^2 + i(3a^2b - b^3)$$

উভয়পক্ষের বাস্তব ও কাল্পনিক অংশের সমতা বিধান করে পাই,

$$x = a^2 - b^2 \text{ এবং } y = 3a^2b - b^3$$

অতএব,  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = a^2 - b^2 + 3a^2 - b^2 = 4(a^2 - b^2)$

20.  $z = 1 + 2i$  হলে  $|z|$  হচ্ছে- [CU-C, 14-15]
- A. বাস্তবিক সংখ্যা B. পূর্ণ সংখ্যা C. অকল্পন সংখ্যা D. ভগ্নাংশ E. কোনটিই নয়
- [S.O. Why]  $|z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$  অকল্পন সংখ্যা।
21.  $z = x + iy$  হলে  $|z - 5| + |z + 5| = 16$  নির্দেশ করে- [DU, 14-17]
- A. Circle B. Parabola C. Hyperbola D. Ellipse
- [S.O. Why]  $|z \pm a| + |z \pm b| = c$  উপকৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে অকল্পন,  $|z - 5| + |z + 5| = 16$  উপকৃত্ত নির্দেশ করে।
22.  $z = x + iy$  হলে,  $|z + 8| + |z - 8| = 20$  এর কেন্দ্রের বর্গ কত? [RU-C, Quarter-2, 22-23]
- A.  $60\pi$  B.  $10\pi$  C.  $\pi$  D.  $4\pi$
- [S.O. Why]  $|z + 8| + |z - 8| = 20$
- একটি উপকৃত্তের সমীকরণ বার কার্ভের রূপ:  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$
- $$\Rightarrow \frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1 \therefore \text{কেন্দ্র} = z = 0 \therefore \text{কেন্দ্রের বর্গ} = \pi \times 10 \times 6 = 60\pi$$

## PRIME TEST

01. যদি  $x = \sqrt[3]{1}$  তাহলে নিচের কোন উক্তি সত্য?
- Ⓐ Only one root:  $x = 1$  Ⓑ Two different roots  
Ⓒ Three different roots Ⓓ Solution not possible
02.  $\frac{1+i}{1-i}$  এর পরম মান হলো-
- Ⓐ 0 Ⓑ 1 Ⓒ  $\sqrt{2}$  Ⓓ  $i$
03. যদি  $z_1 = 1 - i$ ,  $z_2 = \sqrt{3} + i$  হয়, তবে  $\frac{z_2}{z_1}$  এর নতি-
- Ⓐ  $\frac{5\pi}{12}$  Ⓑ  $\frac{\pi}{6}$  Ⓒ  $-\frac{\pi}{4}$  Ⓓ  $-\frac{5\pi}{12}$
04.  $\frac{i - i^{-1}}{i + 2i^{-1}}$  এর মান এবং নতি হবে যথাক্রমে-
- Ⓐ 0, 0 Ⓑ  $-2i, \frac{-\pi}{2}$  Ⓒ  $2i, \frac{\pi}{2}$  Ⓓ  $-2, \pi$
05.  $z_1 = 1 + i$  এবং  $z_2 = 1 - i$  হলে,  $z_1 z_2$  এর মান কেমন হবে?
- Ⓐ বাস্তব সংখ্যা Ⓑ জটিল সংখ্যা Ⓒ অবাস্তব সংখ্যা Ⓓ কাল্পনিক সংখ্যা
06.  $\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-1}$  এর মান কত?
- Ⓐ  $-\sqrt{2}$  Ⓑ  $\sqrt{2}$  Ⓒ  $\pm\sqrt{2}$  Ⓓ  $i\sqrt{2}$
06.  $\frac{1+i}{1-i}$  জটিল সংখ্যাটির আর্গমেন্ট হবে-
- Ⓐ  $\frac{\pi}{2}$  Ⓑ 0 Ⓒ  $\pi$  Ⓓ  $\frac{2\pi}{3}$
08.  $z = (-4 + 3i)i$  এর কাল্পনিক অংশ-
- Ⓐ 3 Ⓑ 4 Ⓒ -4 Ⓓ -3



09.  $\frac{2+3i}{2-i} = P + iQ$ , P ও Q বাস্তব সংখ্যা হলে, Q = ?

- (A)  $\frac{4}{5}$  (B)  $\frac{8}{3}$  (C)  $\frac{8}{5}$  (D)  $\frac{7}{5}$

10. যদি  $a = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$  হয়, তবে  $a^6 = ?$

- (A) 1 (B) -1 (C) i (D) -i

11.  $i^{999}$  এর মান কত? [এখানে i কাল্পনিক সংখ্যা]

- (A) i (B) -i (C) 1 (D) -1

12.  $i^2 = 1$  হলে  $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{23} = ?$

- (A) i (B) -i (C) -1 (D) 0

13.  $-8 - 6\sqrt{-1}$  এর বর্গমূল হলো-

- (A)  $\pm(1+i)$  (B)  $\pm(1-i)$  (C)  $\pm(1+4i)$  (D)  $\pm(1-3i)$

14. এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল  $\omega$  হলে  $(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^8)$  এর মান-

- (A) 18 (B) 6 (C) -9 (D) 9

15.  $\omega$  যদি এককের একটি জটিল (কাল্পনিক) ঘনমূল হয়, তবে  $(1-\omega+\omega^2)$   $(1-\omega^2+\omega^4)$  এর মান-

- (A) 4 (B) 6 (C) 3 (D) 2

16.  $\frac{1}{\omega^{2015}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2017}}$  এর মান কোনটি?

- (A)  $-2\omega^2$  (B)  $-2\omega$  (C) 0 (D) 3

17.  $\omega$  যদি এককের একটি জটিল ঘনমূল হয়, তবে  $(1-\omega)^2(1-\omega^2)^2 = ?$

- (A) 1 (B) 3 (C)  $\omega^3$  (D) 9

18.  $\sqrt{2+8\sqrt{5}i} = ?$

- (A)  $\pm(\sqrt{10} + \sqrt{8}i)$  (B)  $\pm(\sqrt{8} + \sqrt{10}i)$   
(C)  $\pm(\sqrt{10} + \sqrt{2}i)$  (D)  $\pm(\sqrt{10} + \sqrt{4}i)$

19.  $3a + i(b-5) = 9 - 5bi$  হলে a ও b এর মান যথাক্রমে কত?

- (A) (3, 5) (B)  $(\frac{5}{6}, 3)$  (C)  $(3, \frac{5}{6})$  (D)  $(2, \frac{5}{6})$

20.  $x = 3 + 2i$  এবং  $y = 3 - 2i$  হলে  $x^2 + xy + y^2 =$  কত?

- (A) 20 (B) 23 (C) 26 (D) 29

### ☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | C     | $x = \sqrt[3]{1} = 1, \omega, \omega^2$ ∴ তিনটি ভিন্ন মূল রয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02     | B     | $\frac{1+i}{1-i}$ এর পরম মান = $\frac{ 1+i }{ 1-i } = \frac{\sqrt{1^2+1^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = 1$<br><b>ASPECT SUPER TRICKS:</b><br>পরস্পর অনুবন্ধী দুটি জটিল সংখ্যার ভাগ ফলের মডুলাস = 1                                                                                                                                        |
| 03     | A     | $\arg z_1 = -\tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = -\frac{\pi}{4}$ এবং $\arg z_2 = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$<br>∴ $\arg\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = \arg z_2 - \arg z_1 = \frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi+3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$ |
| 04     | D     | $\frac{i-i^{-1}}{i+2i^{-1}} = \frac{i^2-1}{i^2+2} = \frac{-1-1}{-1+2} = -2$<br>∴ $\frac{i-i^{-1}}{i+2i^{-1}}$ এর মান -2 এবং নতি, $\tan^{-1}\frac{0}{-2} = \pi$                                                                                                                                                                  |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05     | A     | $z_1 z_2 = (1+i)(1-i) = 1-i^2 = 1+1 \in \mathbb{R}$                                                                                                                                                                                                          |
| 06     | A     | $\sqrt{-2} \times \sqrt{-1} = -\sqrt{2}$                                                                                                                                                                                                                     |
| 07     | A     | $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{1+1} = i$<br>∴ জটিল সংখ্যাটির আর্গুমেন্ট = $\tan^{-1}\left(\frac{1}{0}\right) = \frac{\pi}{2}$                                                                                                 |
| 08     | B     | $z = \frac{-4+3i}{i} \Rightarrow \frac{-4}{i} + 3 = \frac{4i^2}{i} + 3 = 4i + 3$<br>∴ কাল্পনিক অংশ = 4                                                                                                                                                       |
| 09     | C     | $\frac{2+3i}{2-i} = \frac{2+3i}{2-i} \times \frac{2+i}{2+i} = \frac{4+8i+3i^2}{4-i^2} = \frac{1+8i}{5} = \frac{1}{5} + i\frac{8}{5}$<br>∴ $\frac{2+3i}{2-i} = P + iQ = \frac{1}{5} + i\frac{8}{5}$ ∴ $Q = \frac{8}{5}$                                       |
| 10     | D     | $a = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \Rightarrow a^2 = \frac{(1+i)^2}{2} \Rightarrow a^2 = \frac{1+2i+i^2}{2} = i$<br>∴ $a^6 = (a^2)^3 = (i)^3 = -i$                                                                                                                    |
| 11     | B     | $i^{999} = i^{249 \times 4 + 3} = i^{249 \times 4} \cdot i^3 = 1 \cdot i^3 = -i$                                                                                                                                                                             |
| 12     | C     | $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{23}$<br>এখানে ১ম পদ $a = i$ , অনুপাতে, $r = \frac{i^2}{i} = i$<br>∴ $S_{23} = i \frac{1-i^{23}}{1-i} = i \frac{1+i}{1-i} = \frac{i-1}{1-i} = \frac{(1-i)}{1-i} = -1$                                                             |
| 13     | D     | $-8 - 6\sqrt{-1} = -8 - 6i = 1 - 9 - 6i$<br>$= 1^2 + (3i)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 3i = (1-3i)^2$<br>∴ $-8-6\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল = $\pm(1-3i)$                                                                                                                   |
| 14     | D     | $(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^8)$<br>$= (1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega)(1-\omega^2) = (1-\omega)^2(1-\omega^2)^2$<br>$= (1+\omega^2-2\omega)(1+\omega^4-2\omega^2) = (-\omega-2\omega)(-\omega^2-2\omega^2)$<br>$= -3\omega(-3\omega^2) = 9$ |
| 15     | A     | $(1-\omega+\omega^2)(1-\omega^2+\omega^4) = (1-\omega+\omega^2)(1-\omega^2+\omega)$<br>$= (-2\omega)(-2\omega^2) = 4\omega^3 = 4$                                                                                                                            |
| 16     | C     | যেহেতু $\omega^3 = 1$ ∴ $\frac{1}{\omega^{2015}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2017}}$<br>$= \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{\omega} = \frac{1+\omega^2+\omega}{\omega^2} = \frac{0}{\omega^2} = 0$                               |
| 17     | D     | $(1-\omega)^2(1-\omega^2)^2 = (1+\omega^2-2\omega)(1+\omega^4-2\omega^2)$<br>$= (-\omega-2\omega)(-\omega^2-2\omega^2) = (-3\omega)(-3\omega^2) = 9$                                                                                                         |
| 18     | A     | Option, A<br>$= (\pm(\sqrt{10} + \sqrt{8}i))^2 = (\sqrt{10})^2 + 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{8}i + (\sqrt{8}i)^2$<br>$= 10 + 2\sqrt{80}i - 8 = 2 + 8\sqrt{5}i$                                                                                                    |
| 19     | C     | $3a + i(b-5) = 9 - 5bi$<br>∴ $3a = 9 \Rightarrow a = 3$ এবং $b-5 = -5b$<br>$\Rightarrow 6b = 5 \Rightarrow b = \frac{5}{6}$ ∴ $(3, \frac{5}{6})$                                                                                                             |
| 20     | B     | $x^2 + xy + y^2 = (3+2i)^2 + (3+2i)(3-2i) + (3-2i)^2$<br>$= 9 + 12i - 4 + 9 + 6i - 6i + 4 + 9 - 12i - 4 = 23$                                                                                                                                                |



# অধ্যায় ০৪ বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

গণিত  
২য় পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস                                              | V.V.I RATE |
|----------|------------------------------------------------------|------------|
| TOPIC-01 | আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণের বৈশিষ্ট্য                     | ★          |
| TOPIC-02 | দ্বিঘাত সমীকরণে নিচায়কের ব্যবহার                    | ★          |
| TOPIC-03 | মূল ও অজানা মান নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ    | ★          |
| TOPIC-04 | মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয়                              | ★★         |
| TOPIC-05 | সমীকরণের মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত           | ★★         |
| TOPIC-06 | দ্বিঘাত সমীকরণের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান সংক্রান্ত | ★★★        |
| TOPIC-07 | ভাগশেষ উপপাদ্য সংক্রান্ত                             | ★★         |
| TOPIC-08 | আংশিক ভগ্নাংশ সংক্রান্ত                              | ★★         |
| TOPIC-09 | শর্তমূলক গাণিতিক প্রয়োগ                             | ★          |

## এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণের বৈশিষ্ট্য

আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণ:  $ax^2 + bx + c = 0$

- দ্বিঘাত হবার শর্ত  $a \neq 0$
- $b=0$  এবং  $c < 0$  হলে মূলদ্বয় সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় এবং  $a$  ও  $c$  একই চিহ্নের হলে মূলদ্বয় জটিল, বিপরীত চিহ্নের হলে মূলদ্বয় বাস্তব হয়।
- $c=0$  হলে সমীকরণটির একটি মূল শূন্য হয়।
- $b=c=0$  হলে সমীকরণটির দুটি মূলই সমান এবং শূন্য।
- $c=a$  হলে সমীকরণটির একটি মূল অপরটির উল্টা।
- $a$  ও  $c$  ধনাত্মক এবং  $b$  ঋণাত্মক হলে সমীকরণটির দুটি মূলই যোগবোধক হয়।
- $a$  ও  $c$  ঋণাত্মক এবং  $b$  ধনাত্মক হলে সমীকরণটির দুটি মূলই বিয়োগবোধক হয়।
- $a+b+c=0$  হলে একটি মূল 1 এবং অন্যটি  $c/a$  হবে।

ত সমীকরণে নিচায়কের ব্যবহার

দ্বিঘাত সমীকরণ  $ax^2 + bx + c = 0$  এর নিচায়ক/পৃথায়ক/নিরূপক ( $b^2 - 4ac$ ) কে  $D$  দ্বারা সূচিত করা হয়।

দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি  $D$  এর উপর নির্ভর করে।

- $D=0$  হলে মূলদ্বয় বাস্তব, সমান, মূলদ এবং সমান মূলদ্বয়  $= -\frac{b}{2a}$
- $D > 0$  হলে মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হয়।
- $D$  পূর্ণবর্গ হলে মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান হয়।
- $D < 0$  হলে মূলদ্বয় আবাস্তব/জটিল/কাল্পনিক, অসমান ও পরস্পরের অনুবর্তী জটিল সংখ্যা হয়।
- $D=0$  হলে  $ax^2 + bx + c$  দ্বিঘাত রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে।

ও অজানা মান নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ

$ax^2 + bx + c = 0$  দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়  $\alpha, \beta$  হলে  $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$  এবং

$\alpha\beta = \frac{c}{a}$ ; মূলদ্বয়ের অন্তর,  $|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$

$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটি  $\alpha, \beta, \gamma$  হলে,

$$\sum \alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$$

$$\sum \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a} \quad \sum \alpha\beta\gamma = \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয়

■ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুটি  $\alpha, \beta$  হলে সমীকরণটি:

$$(x - \alpha)(x - \beta) = 0 \Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

■ ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটি  $\alpha, \beta, \gamma$  হলে সমীকরণটি:

$$(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) = 0 \Rightarrow x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$$

■ ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটি  $\alpha, \beta, \gamma$  হলে সমীকরণটি:  $(x - \text{একটি মূল})$  (অপর মূলদ্বয় বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ)  $= 0$

দ্বিঘাত সমীকরণের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান সংক্রান্ত

■  $ax^2 + bx + c = 0$  রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান  $= c - \frac{b^2}{4a}$

i.  $a > 0$  ( $x^2$  এর সহগ ধনাত্মক) হলে মান সর্বনিম্ন

ii.  $a < 0$  ( $x^2$  এর সহগ ঋণাত্মক) হলে মান সর্বোচ্চ

■ সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের ক্ষেত্রে,  $x = -\frac{b}{2a}$  হবে

ভাগশেষ উপপাদ্য সংক্রান্ত

■ ভাগশেষ উপপাদ্য (Remainder Theorem): কোন বহুপদী  $f(x)$  কে  $(x - a)$  দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে  $f(a)$  অর্থাৎ  $x$  এর পরিবর্তে  $a$  বসিয়ে যে মান পাওয়া যায় তাই ভাগশেষ।

■ উৎপাদক উপপাদ্য (Factor theorem):  $x$  চলকযুক্ত কোন বহুপদী রাশিতে  $x$  এর স্থানে  $a$  বসালে যদি মান শূন্য হয় তবে  $x - a$  ঐ রাশিটির একটি উৎপাদক হবে।

## শর্তমূলক গাণিতিক প্রয়োগ

■ যা সরাসরি মনে রাখাই ভালো:

i.  $x^2 - px + q$  ও  $x^2 - qx + p$  রাশিদ্বয়ের একটি সাধারণ উৎপাদক থাকার শর্ত,  $p + q + 1 = 0$

ii.  $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$  এবং  $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$  সমীকরণ দুটির দুটি মূলই সাধারণ হওয়ার শর্ত  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

iii.  $x^2 - px + q = 0$  ও  $x^2 - qx + p = 0$  সমীকরণের একটি সাধারণ মূল থাকার শর্ত,  $p + q + 1 = 0$

iv.  $x^2 - bx + c = 0$  ও  $x^2 - cx + b = 0$  এর মূলদ্বয়ের পার্থক্য একটি ধ্রুব রাশি হবার শর্ত,  $b + c + 4 = 0$

v.  $x^2 - px + q = 0$  সমীকরণের মূল দুইটির পার্থক্য 1 হলে,  $p^2 = 1 + 4q$  হবে।

vi.  $ax^2 + bx + b = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত  $m : n$  হলে,

$$\sqrt{\frac{m}{n}} + \sqrt{\frac{n}{m}} + \sqrt{\frac{b}{a}} = 0$$

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01.  $ax^2 + bx + c = 0$  এর একটি মূল শূন্য হলে  $c$  এর মান- [JU. 10-11]

- A. 0 B. -1  
C. 1 D. কোনটিই নয়

**S@Why**  $ax^2 + bx + c = 0$  এর একটি মূল শূন্য হলে,  $c = 0$

02. দ্বিঘাত সমীকরণ  $bx^2 + cx - d = 0$  এর দুটি মূল সমান ও বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হবে যদি- [CU. 09-10]

- A.  $b = 0$  B.  $d = 0$  C.  $c = 1$   
D.  $c = 0$  E.  $b = d$

**S@Why** দ্বিঘাত সমীকরণ এর দুটি মূল সমান ও বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হলে মূলদ্বয়ের যোগফল  $= 0$  হবে।

$$\therefore -\frac{c}{b} = 0$$

$$\Rightarrow c = 0$$



03.  $k$ -এর মান কত হবে  $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$  সমীকরণটির মূল দুইটি সমান হবে? [JU. 16-17, 09-10; CU. 14-15, 12-13, 09-10, 07-08, 03-04, 02-03; KU. 09-10, 05-06, 03-04; RU. 17-18, 12-13, 06-07; BRU. 15-16]  
 A. 5 অথবা 2  
 B. 15 অথবা 12  
 C. 16 অথবা 12  
 D. 6 অথবা 2

**[S.O. Why]**  $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$

বা,  $x^2 + 2x(k - 3) + (k - 1) = 0 \dots\dots\dots (i)$

(i) এর মূলদ্বয় পরস্পর সমান।

$\therefore \{2(k - 3)\}^2 = 4(k - 1)$

বা,  $(k - 3)^2 = (k - 1)$  বা,  $k^2 - 6k + 9 - k + 1 = 0$

বা,  $k^2 - 7k + 10 = 0$  বা,  $k^2 - 2k - 5k + 10 = 0$

বা,  $k(k - 2) - 5(k - 2) = 0$

বা,  $(k - 2)(k - 5) = 0 \therefore k = 2, 5$

04.  $ax^2 + bx + c = 0$  দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুটি সমান হবে যদি- [RU. 18-19]

A.  $b^2 = 4ac$

B.  $b^2 > 4ac$

C.  $b^2 < 4ac$

D.  $b = 0$

**[S.O. Why]** মূলদ্বয় সমান হলে  $b^2 = 4ac$  হয়।

05.  $2x^2 - 5x + 4 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয় হবে- [RU. 18-19, 17-18]

A. বাস্তব ও অসমান

B. বাস্তব ও সমান

C. জটিল ও অসমান

D. জটিল ও সমান

**[S.O. Why]** নিশ্চায়ক,  $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = -7 < 0$

$\therefore$  মূলদ্বয় জটিল ও অসমান

06.  $k$  এর কোন মানের জন্য  $x^2 + kx + 1 = 0$  সমীকরণটির মূল দুটি জটিল হবে? [CU-A, Set-1 2023-24]

A.  $-2 < k \leq 2$

B.  $-2 \leq k \leq 2$

C.  $-2 < k < 2$

D.  $-2 \leq k < 2$

**[S.O. Why]** জটিল হওয়ার শর্ত,  $D < 0 \Rightarrow k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 < 0$

$\Rightarrow k^2 < 4 \therefore |k| < 2 \Rightarrow -2 < k < 2$

07. কোন দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়কের মান ঋণাত্মক উক্ত সমীকরণের মূলদ্বয়- [IU-A. 19-20]

A. জটিল ও সমান

B. মূলদ ও সমান

C. বাস্তব ও অসমান

D. জটিল ও অসমান

**[S.O. Why]** দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়কের মান ঋণাত্মক হলে, মূলদ্বয় জটিল ও অসমান হবে।

08. 'a' এর মান কত হলে,  $(a - 1)x^2 - (a + 2)x + 4 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান- [BU. 12-13; IU. 11-12]

A. 1, 2

B. 2, 10

C. 1, 10

D. None

**[S.O. Why]**  $(a - 1)x^2 - (a + 2)x + 4 = 0$

সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান।  $\{-(a + 2)\}^2 = 4 \cdot 4 \cdot (a - 1)$

বা,  $a^2 + 4a + 4 - 16a + 16 = 0$  বা,  $a^2 - 12a + 20 = 0$  বা,  $a = 2, 10$

09.  $3x^2 - kx + 4 = 0$  সমীকরণ একটি মূল অপরটির 3 গুণ হলে  $k$  এর মান- [DU. 14-15; CoU. 19-20; RU-H. 13-14; JUST-A. 19-20]

A. 8

B. -8

C.  $\sqrt{8}$

D.  $\pm 8$

**[S.O. Why]** মূলদ্বয়  $\alpha$  ও  $3\alpha$

$\therefore \alpha + 3\alpha = \frac{k}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{k}{12}$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল,  $3\alpha^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow \alpha^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{k^2}{12^2} = \frac{4}{9}$

$\Rightarrow k^2 = 64 \Rightarrow k = \pm 8$

10.  $3x^2 - 2x + 1 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি কত? [DU. 98-99; CU. 06-07, IU. 04-05; JUST-C. 19-20; JU. 12-13, 11-12; HSTU. 06-07, 05-06; RU. 18-19, 08-09; MBSTU. 14-15; JUST. 14-15]

A.  $\frac{2}{3}$

B.  $\frac{2}{9}$

C.  $-\frac{2}{3}$

D.  $-\frac{2}{9}$

**[S.O. Why]**  $3x^2 - 2x + 1 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়  $\alpha$  এবং  $\beta$  হলে

$\alpha + \beta = \frac{2}{3}$  এবং  $\alpha\beta = \frac{1}{3}$

$\therefore$  মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি

$= \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9}$

11.  $6x^2 - 5x + 3 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়  $\alpha$  ও  $\beta$  হলে,  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$  এর মান কত? [JU-A, Set-N. 22-23, Set-O. 2021-22]

A.  $-\frac{5}{3}$

B.  $-\frac{5}{12}$

C.  $\frac{5}{12}$

D.  $\frac{5}{3}$

**[S.O. Why]**  $6x^2 - 5x + 3 = 0$ ;  $\alpha$  &  $\beta$

$\therefore \alpha + \beta = \frac{5}{6}$  এবং  $\alpha\beta = \frac{3}{6}$

$\therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{5}{3}$

12.  $2x^2 - 5x + 2 = 0$  সমীকরণের একটি মূল 2 হলে অপর মূলটি কত? [JU-A, Set-Q. 2021-22]

A.  $\frac{1}{2}$

B. 3

C. -2

D. 1

**[S.O. Why]**  $2x^2 - 5x + 2 = 0$  এর মূলদ্বয় 2 এবং  $\alpha$

$\therefore \alpha + 2 = \frac{5}{2} \therefore \alpha = \frac{5}{2} - 2 = \frac{1}{2}$

**Aspect Special:**  $\alpha\beta = \frac{2}{2} \Rightarrow \beta = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

13.  $k$  এর কোন মানের জন্য  $2x^2 - kx + 1 = 0$  সমীকরণের একটি মূল অপর মূলের বর্গের চারগুণের সমান হবে? [CU-A, Shift-2. 22-23; DU-A. 2021-22]

A.  $\frac{1}{2}$

B. 3

C. 1

D. -3

**[S.O. Why]** শর্তমতে,  $\beta = 4\alpha^2$

$\therefore$  ধরি,  $2x^2 - kx + 1 = 0$  এর মূলদ্বয়  $\alpha, 4\alpha^2$

$\therefore \alpha + 4\alpha^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha^3 = \frac{1}{8} \therefore \alpha = \frac{1}{2}$

আবার,  $\alpha + 4\alpha^2 = \frac{k}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{k}{2}$

$\Rightarrow \frac{1}{2} + 1 = \frac{k}{2} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{k}{2} \therefore k = 3$

14.  $3x^3 - 1 = 0$  এর মূলগুলি  $\alpha, \beta, \gamma$  হলে  $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$  এর মান- [DU. 16-17; RU. 18-19; BSFMSTU. 19-20]

A. -1

B. 0

C.  $\frac{1}{3}$

D. 1

**[S.O. Why]**  $3x^3 - 1 = 0$

$\therefore \alpha + \beta + \gamma = 0$ ;

$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 0$  and  $\alpha\beta\gamma = -\frac{-1}{3} = \frac{1}{3}$

$\therefore \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$

$= 0(0 - 0) = 0$

$\therefore \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

**Aspect Special:**  $\Sigma \alpha^3 = (\Sigma \alpha)^3 + 3(\alpha\beta\gamma - \Sigma \alpha \cdot \Sigma \alpha\beta)$

$= 0^3 + 3\left(\frac{1}{3} - 0 \cdot 0\right) = 1$



15.  $3x^2 + 7x - 2 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল ও গুণফলের সমষ্টি কোনটি? [RU-C, সুরমা-৩. 2023-24; JU-A 20-21, 14-15]

- A. 5  
B. -3  
C.  $-\frac{5}{3}$   
D.  $\frac{4}{3}$

**S@Why**  $3x^2 + 7x - 2 = 0$ ;

মূলদ্বয়  $\alpha$  ও  $\beta$   $\therefore \alpha + \beta = -\frac{7}{3}$

এবং  $\alpha\beta = \frac{-2}{3} \therefore \alpha + \beta + \alpha\beta = -\frac{7}{3} - \frac{2}{3} = -3$

16.  $2x^3 + 5x^2 + 5x + 2 = 0$  সমীকরণের মূলগুলি  $\alpha$ ,  $\beta$  ও  $\gamma$  হলে  $\sum \alpha\beta$  এর মান কত? [JU-A, Set-I. 2021-22]

- A.  $\frac{5}{2}$   
B.  $-\frac{5}{2}$   
C. 1  
D. -1

**S@Why**  $\sum \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$

এখন  $2x^3 + 5x^2 + 5x + 2 = 0$  এর জন্য  $\sum \alpha\beta = \frac{5}{2}$

17.  $x^2 - 10x + 34 = 0$  সমীকরণের মূলগুলো হলো- [JU. 14-15]

- A.  $3+i$   
B.  $5 \pm i$   
C.  $5+2i$   
D.  $5 \pm 3i$

**S@Why**  $x^2 - 10x + 34 = 0$

$\Rightarrow x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 136}}{2} = 5 \pm 3i$

18.  $x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$  সমীকরণের একটি মূল  $2i$  হলে, অপর মূলদ্বয় কত? [RU-C, Quartz-2. 22-23]

- A.  $-2i, -1$   
B.  $-2i, 1$   
C.  $2i, 1$   
D.  $-2i, -2$

**S@Why** একটি মূল  $2i$  অপর একটি মূল হবে  $-2i$

$x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$ ; মূলদ্বয় হলো  $2i, (-2i)$  ও  $\gamma$

$\therefore 2i - 2i + \gamma = -\frac{1}{1} \Rightarrow \gamma = -1 \therefore$  অপর মূলদ্বয়  $-2i, -1$

19.  $x^3 - 1 = 0$  সমীকরণের মূলগুলির যোগফল কত? [SUST. 17-18]

- A. 0  
B. -1  
C. 2  
D. -2

**S@Why**  $1 + \omega + \omega^2 = 0$

20. একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল  $1+i$  হলে, অপর মূল কোনটি হবে? [JU-A, Set-R. 22-23; BU. 11-12, 09-10]

- A.  $1+i$   
B.  $-1+i$   
C.  $-1-i$   
D.  $1-i$

**S@Why** একটি মূল  $1+i$  হলে অপর মূলটি হবে  $1-i$ । কারণ জটিল মূলদ্বয় যুগলরূপে থাকে।

21. নিচের কোন সমীকরণটি মূল  $-3$  এবং  $2+3i$ ? [RU-Uranus-1, Set-1. 21-22]

- A.  $x^3 - x^2 - x + 39 = 0$   
B.  $x^3 + x^2 = x + 30 = 0$

- C.  $x^3 + x^2 - x - 39 = 0$   
D.  $x^3 - x^2 + x + 39 = 0$

**S@Why** দেওয়া আছে,

মূলদ্বয়  $-3$  এবং  $2+3i$

$\therefore$  ৩য় মূল হবে  $2-3i$

এখন,  $\alpha + \beta + \gamma = 2+3i+2-3i-3 = 1$

$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -6-9i-6+9i+4+9 = 1$

এবং  $\alpha\beta\gamma = -3(4+9) = -39$

$\therefore$  সমীকরণ  $x^3 - x^2 + x + 39 = 0$

22.  $x^2 - 7x + 2 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয় হতে 2 কম মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি- [DU. 18-19, 11-12, 07-08; IU. 15-16]

- A.  $x^2 - 4x + 6 = 0$   
B.  $x^2 - 3x - 8 = 0$   
C.  $x^2 - 11x + 8 = 0$   
D.  $x^2 - 3x + 8 = 0$

**S@Why**  $x^2 - 7x + 2 = 0$

$\therefore (x+2)^2 - 7(x+2) + 2 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 4x + 4 - 7x - 14 + 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 8 = 0$

23.  $x^2 + qx + r = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়  $\alpha, \beta$  হলে  $\alpha - 2, \beta - 2$  মূলদ্বয় বিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? [CU. 14-15]

- A.  $(x+q)^2 + qx - r + 2 = 0$   
B.  $x^2 + (q+2)x + r - 6 = 0$

- C.  $x^2 + (q+4)x + 2q + r + 4 = 0$   
D.  $rx^2 + (q-2)x + 3 = 0$

E. কোনটিই নয়

**S@Why** নির্ণেয় সমীকরণ,  $(x+2)^2 + q(x+2) + r = 0$

$\Rightarrow x^2 + 4x + 4 + qx + 2q + r = 0$

$\Rightarrow x^2 + (q+4)x + 2q + r + 4 = 0$

24.  $x$  বাড়ব হলে  $5 - 4x - x^2$  রাশিটির সর্বোচ্চ মান কোনটি? [JU-A, Set-K. 2023-24]

- A. 9  
B. -2  
C. 2  
D. -9

**S@Why** সর্বোচ্চ মান  $= c - \frac{b^2}{4a} = 5 + \frac{16}{4} = 9$

25.  $x^{18} + 5x^6 + 2$  রাশিকে  $(x-1)$  দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কোনটি? [RU-C, সেলা-৩. 2023-24]

- A. 2  
B. -8  
C. 3  
D. 8

**S@Why**  $x^{18} + 5x^6 + 2$  রাশিকে  $(x-1)$  দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ

$= (1)^{18} + 5(1)^6 + 2 = 1 + 5 + 2 = 8$

26.  $m$  এর কিরূপ মানের জন্য  $1 + mx + x^2 = 0$  সমীকরণটির মূলদ্বয় জটিল হবে? [RU-C, সুরমা-৩. 2023-24]

- A.  $0 \leq m < 2$   
B.  $-2 \leq m \leq 2$

- C.  $0 \leq m \leq 2$   
D.  $-2 < m < 2$

**S@Why**  $1 + mx + x^2 = 0 \Rightarrow x^2 + mx + 1 = 0$

সমীকরণের মূলদ্বয় জটিল হলে, নিচায়ক  $< 0$

$\therefore m^2 - 4 < 0 \Rightarrow (m+2)(m-2) < 0 \Rightarrow -2 < m < 2$

## PRIME TEST

01.  $ax^2 + bx + c = 0$  এর একটি মূল শূন্য হলে  $c$  এর মান-

- A. 0  
B. -1  
C. 1  
D. কোনটিই নয়

02.  $(k+3)x^2 + (6-2k)x + (k-1) = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয় একটি অপরটির সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হলে,  $k = ?$

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4

03.  $k$  এর মান কত হলে  $(k^2-3)x^2 + 3kx + (3k+1) = 0$  সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর উল্টো হবে?

- A. 4, -1  
B. -4, 1  
C. 4, 2  
D. 1, 4

04.  $2x^2 + 2x - k = 0$  রাশিটির পূর্ণবর্গ হবে যখন  $k$  এর মান-

- A.  $\frac{2}{3}$   
B.  $-\frac{2}{3}$   
C.  $\frac{1}{2}$   
D.  $-\frac{1}{2}$

05.  $(a+1)x^3 - 2x^2 + x + a = 0$  সমীকরণটির দুটি মূল সমান হলে 'a' এর মান কত?

- A. 2  
B. -1  
C. 3  
D. 0

06.  $3x^2 - 5x + k = 0$  সমীকরণে  $k$  এর মান কত হলে মূলদ্বয় সমান হবে?

- A. 0  
B.  $\frac{25}{12}$   
C.  $\frac{5}{3}$   
D. 25

07.  $3x^3 - 1 = 0$  এর মূলগুলি  $\alpha, \beta, \gamma$  হলে  $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$  এর মান-

- A. -1  
B. 0  
C.  $\frac{1}{3}$   
D. 1

08.  $x^2 - 5x + c = 0$  সমীকরণের একটি মূল 4 হলে অপর মূলটি-

- A. -5  
B. -4  
C. 4  
D. 1

09.  $3x^2 - 2x + 1 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি কত?

- A.  $\frac{2}{3}$   
B.  $\frac{2}{9}$   
C.  $-\frac{2}{3}$   
D.  $-\frac{2}{9}$



10. যদি  $x^2 + x + 2 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়  $\alpha$  এবং  $\beta$  হয়, তবে  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = ?$

- Ⓐ  $\frac{2}{3}$       Ⓑ  $-\frac{1}{2}$       Ⓒ  $-\frac{2}{3}$       Ⓓ  $-\frac{2}{9}$

11. কোনো দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল  $\frac{1}{1+i}$  হলে সমীকরণটি হবে-

- Ⓐ  $x^2 - x + 1 = 0$       Ⓑ  $2x^2 - 2x + 1 = 0$   
Ⓒ  $x^2 + x + 1 = 0$       Ⓓ  $2x^2 + 2x + 1 = 0$

12.  $x^3 - 3x^2 + 4x - 10$  কে  $x + 2$  দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ-

- Ⓐ -48      Ⓑ -54      Ⓒ -28      Ⓓ -18

13.  $6x^2 - 5x + 1 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়  $\alpha, \beta$  হলে,  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$  মূল বিশিষ্ট

সমীকরণটি হবে-

- Ⓐ  $x^2 - 5x + 6 = 0$       Ⓑ  $3x^2 - 2x + 5 = 0$   
Ⓒ  $x^2 - 6x + 5 = 0$       Ⓓ  $5x^2 + 2x - 6 = 0$

14.  $5 - 3x - x^2$  এর সর্বোচ্চ মান কত?

- Ⓐ 3      Ⓑ 5      Ⓒ  $\frac{47}{4}$       Ⓓ  $\frac{29}{4}$

15.  $x$  এর মান বাস্তব হলে  $-9x^2 + 6px + q^2$  এর সর্বোচ্চ মান কত?

- Ⓐ  $p^2 + q^2$       Ⓑ  $p^2 - q^2$       Ⓒ  $p^2 - q^2$       Ⓓ  $x^2 - p^2$

16.  $5x^2 - 2x^2 + 3x + 10$  কে  $(x + 2)$  দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে-

- Ⓐ -44      Ⓑ 48      Ⓒ 0      Ⓓ 16

17.  $ax^2 + bx + c = 0$  সমীকরণের নিচায়কের মান পূর্ণসংখ্যা ও ধনাত্মক এবং  $a, b, c$  মূলদ হলে উক্ত সমীকরণের মূলদ্বয়-

- Ⓐ মূলদ ও সমান      Ⓑ মূলদ ও অসমান      Ⓒ জটিল      Ⓓ বাস্তব ও জটিল

18.  $x^3 - 5x^2 + 6 = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয়  $a, b, c$  হলে,  $\frac{1}{abc}$  এর মান কোন্টি?

- Ⓐ -6      Ⓑ  $-\frac{1}{6}$       Ⓒ 0      Ⓓ  $\frac{1}{5}$

19. যদি polynomial ফাংশন  $x^3 - 3x^2 + 4x - 10$  কে  $(x - 1)$  দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে ভাগশেষ হবে-

- Ⓐ -8      Ⓑ 0      Ⓒ 8      Ⓓ 2

20.  $ax^2 + bx + c = 0$  সমীকরণের মূলদ্বয় শূন্য হওয়ার শর্ত কোনটি?

- Ⓐ  $b = 0$       Ⓑ  $c = 0$       Ⓒ  $b = 0 = c$       Ⓓ  $c \neq 0$

### ☺ Answer Analysis ☺

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | A     | $ax^2 + bx + c = 0$ এর একটি মূল শূন্য হলে, $c = 0$                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02     | C     | যেহেতু সমীকরণের মূলদ্বয় একটি অপরটির সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত তাই, $6 - 2k = 0 \Rightarrow k = 3$                                                                                                                                                                                      |
| 03     | A     | $(k^2 - 3)x^2 + 3kx + (3k + 1) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল = $\frac{3k+1}{k^2-3}$<br>[যেহেতু সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর বিপরীত] $\frac{3k+1}{k^2-3} = 1$<br>$\Rightarrow k^2 - 3 = 3k + 1 \Rightarrow k^2 - 3k - 4 = 0$<br>$\Rightarrow (k - 4)(k + 1) = 0$<br>$\therefore k = 4$ or $-1$ |
| 04     | D     | $b^2 - 4ac = 0$<br>$\Rightarrow 4 - 4 \cdot 2(-k) = 0$<br>$\Rightarrow k = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                     |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05     | D     | $(a + 1)x^3 - 2x^2 + x + a = 0$<br>$a = 0$ হলে, $x^3 - 2x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x - 2)^2 = 0$<br>$\therefore x = 0, 1, 1$ অর্থাৎ দুটি মূল সমান                                                                                                                                                                  |
| 06     | B     | $3x^2 - 5x + k = 0$ ..... (i)<br>(i)-এর মূলদ্বয় সমান : $b^2 = 4ca$ বা, $(-5)^2 = 4 \cdot k \cdot 3$ বা, $K = \frac{25}{12}$                                                                                                                                                                                      |
| 07     | D     | $\Sigma \alpha^2 = (\Sigma \alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma = 0^2 - 2 \cdot 0 \cdot 0 = 0$                                                                                                                                                                                                                          |
| 08     | D     | $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল = 5;<br>একটি মূল 4 হলে অপর মূলটি = $5 - 4 = 1$                                                                                                                                                                                                                       |
| 09     | D     | $3x^2 - 2x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha$ এবং $\beta$ হলে<br>$\alpha + \beta = \frac{2}{3}$ এবং $\alpha\beta = \frac{1}{3}$<br>$\therefore$ মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি = $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$<br>$= \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{9}$ |
| 10     | B     | $x^2 + x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha$ এবং $\beta$ হলে,<br>$\alpha + \beta = -1$ এবং $\alpha\beta = 2 \therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}$                                                                                                    |
| 11     | B     | ধরি, $x = \frac{1}{1+i}$ বা, $x + xi = 1$ বা, $x - 1 = -xi$<br>বা, $(x - 1)^2 = (-xi)^2$<br>বা, $x^2 - 2x + 1 = -x^2$ বা, $2x^2 - 2x + 1 = 0$                                                                                                                                                                     |
| 12     | B     | $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 10$<br>$f(x)$ কে $x + 2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ, $f(-2)$<br>$\therefore f(-2) = 3(-2)^3 - 3(-2)^2 + 4(-2) - 10$<br>$= -24 - 12 - 8 - 10 = -54$                                                                                                                                          |
| 13     | A     | $f\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \therefore 6\left(\frac{1}{x}\right)^2 - 5\left(\frac{1}{x}\right) + 1 = 0$<br>$\Rightarrow \frac{6 - 5x + x^2}{x^2} = 0$<br>$\therefore x^2 - 5x + 6 = 0$                                                                                                                         |
| 14     | D     | $\left(c - \frac{b^2}{4a}\right) = 5 - \frac{(-3)^2}{4 \times (-1)} = \frac{29}{4}$                                                                                                                                                                                                                               |
| 15     | A     | $-ax^2 + bx + c$ রাশিটির সর্বোচ্চ মান = $c + \frac{b^2}{4a}$<br>$\therefore -9x^2 + 6px + q^2$ এর সর্বোচ্চ মান = $q^2 + \frac{(6p)^2}{4 \cdot 9} = p^2 + q^2$                                                                                                                                                     |
| 16     | A     | $x = -2$ বসিয়ে, $5(-2)^3 - 2(-2)^2 + 3(-2) + 10$<br>$= -40 - 8 - 6 + 10 = -44$                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17     | B     | $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের নিচায়কের মান পূর্ণসংখ্যা ও ধনাত্মক<br>$\therefore b^2 - 4ac > 0$<br>$b^2 - 4ac > 0$ হলে মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান।                                                                                                                                                                      |
| 18     | B     | $abc = -6 \therefore \frac{1}{abc} = \frac{1}{-6}$                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19     | A     | $(x - 1)$ দ্বারা ভাগ করলে $(x - 1)$ ফাংশনের একটি উৎপাদক হবে<br>অর্থাৎ $x = 1$ দ্বারা ফাংশনটি সিদ্ধ হবে।<br>$\therefore f(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 4 \cdot 1 - 10 = -8$<br>$\therefore$ ভাগশেষ = -8                                                                                                                     |
| 20     | C     | $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের উভয় মূল শূন্য হওয়ার শর্ত $b = c = 0$                                                                                                                                                                                                                                               |



অধ্যায়

০৫

## দ্বিপদী বিস্তৃতি

গণিত  
২য় পত্র

| TOPICS   | সাজেশনস                                                                                                                          | V.V.I<br>RATE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOPIC-01 | দ্বিপদী ও বহুপদীর ধনাত্মক সূচকের বিস্তৃতির পদ সংখ্যা ও প্যাসকেলের ত্রিভুজ সংক্রান্ত                                              | ★★            |
| TOPIC-02 | দ্বিপদী বিস্তৃতির ধ্রুবপদ ও সংখ্যামূলক বৃহত্তম পদ নির্ণয়                                                                        | ★             |
| TOPIC-03 | মধ্যপদ সংক্রান্ত                                                                                                                 | ★★            |
| TOPIC-04 | n ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে x এর ঘাত সম্বলিত পদ, x <sup>r</sup> এর সহগ এবং x বর্জিত পদ নির্ণয়                                    | ★★★           |
| TOPIC-05 | দ্বিপদীর অসীম বিস্তৃতি থেকে n তম পদ, x <sup>r</sup> এর সহগ, সহগের সমষ্টি নির্ণয়, ও বিস্তৃতি বৈধ হওয়া সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ | ★★            |
| TOPIC-06 | আংশিক ভগ্নাংশের মাধ্যমে বিস্তৃতি সংক্রান্ত                                                                                       | ★             |
| TOPIC-07 | অসীম বিস্তৃতির বিবিধ প্রয়োগ                                                                                                     | ★             |

## এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ও প্রক্রিয়াসমূহ:

n ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে x এর ঘাত সম্বলিত পদ, x<sup>r</sup> এর সহগ এবং x বর্জিত পদ নির্ণয়

i.  $(ax^p + bx^q)^n$  এর বিস্তৃতিতে  $(r+1)$  তম পদে x<sup>m</sup> বিদ্যমান থাকলে,  $r = \frac{p(n-m)}{p-q}$

ii. যদি বিস্তৃতিতে x মুক্তপদ নির্ণয় করতে বলে তবে m = 0 ধরে নিতে হবে

মধ্যপদ নির্ণয়:  $(a+x)^n$  -এর বিস্তৃতিতে-

01. n জোড় হলে মধ্যপদ 1টি এবং তা  $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$  তম পদ

02. n বিজোড় হলে মধ্যপদ 2টি এবং মধ্যপদদ্বয়  $\left(\frac{n+1}{2} + 1\right)$  তম এবং  $\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)$  তম পদ

03. মধ্যপদের সহগই বৃহত্তম সহগ

পদ সংখ্যা নির্ণয়:  $(a+b+c)^n$  আকৃতির বিস্তৃতির পদ সংখ্যা =  $n+1$   $C_{n-1}$  [যেখানে r = বিস্তৃতির চলক সংখ্যা]

$(1+ax)^n$  এর বিস্তৃতিতে x<sup>r</sup> এবং x<sup>r+1</sup> এর সহগ পরস্পর সমান হলে

$a = \frac{r+1}{r-1}$  এবং  $(1+ax)^n$  এর বিস্তৃতিতে r ও r+1 তম পদ পরস্পর সমান হলে চলরাশি

$x = \frac{r}{n-(r-1)} = \frac{\text{ছোটতম পদ}}{n-(\text{ছোটতম পদ}-1)}$

$(a+x)^n$  বিস্তৃতিতে r ও r+1 তমপদে অনুপাত,  $\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \times \frac{x}{a}$

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমনউপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

01.  $\left(x - \frac{1}{9x}\right)^7$  এর বিস্তৃতিতে মোট পদের সংখ্যা কয়টি? [CU-A, Set-3, 20-21]

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

**S○Why**  $\left(x - \frac{1}{9x}\right)^7$  এর বিস্তারে মোট পদসংখ্যা = 8।

02.  $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{16}$  এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদটি হবে- [DU, 17-18]

A. 12780 B. 12708 C. 12870 D. 12807

**S○Why** বিস্তৃতির ঘাত জোড় সংখ্যা বলে মধ্যপদ একটি।

∴ মধ্যপদটি =  $\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \left(\frac{16}{2} + 1\right) = 9$  তম পদ।

∴ মধ্যপদের মান =  ${}^{16}C_8 \cdot (x)^{16-8} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^8 = 12870$

03.  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$  এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদটি কত?

[RU, 08-09, 07-08; CU, 11-12, 07-08; BRU, 19-20]

A. 50 B. 60 C. 207 D. 70

**S○Why** বিস্তৃতির ঘাত জোড় সংখ্যা বলে একটি মধ্যপদ আছে।

∴ মধ্যপদটি =  $\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \left(\frac{8}{2} + 1\right) = 5$ -তম পদ।

∴ মধ্যপদটির মান,  $T_{4+1} = {}^8C_4 x^{8-4} \left(\frac{1}{x}\right)^4 = 70$

04.  $\left(\frac{a}{x} - bx\right)^{12}$  এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ কত? [HU-A, 19-20; KU, 18-19]

A.  ${}^{12}C_6 a^6 b^6$  B.  ${}^{12}C_6 a^6 b^6$  C.  ${}^{11}C_6 a^6 b^6$  D.  ${}^6C_3 a^6 b^6$

**S○Why**  $\left(\frac{a}{x} - bx\right)^{12}$  এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ =  ${}^{12}C_6 \left(\frac{a}{x}\right)^{12-6} \cdot (-bx)^6$   
=  ${}^{12}C_6 \left(\frac{a}{x}\right)^6 \cdot (bx)^6 = {}^{12}C_6 a^6 b^6$

05.  $(1+x)^7(1-x)^8$  এর বিস্তৃতিতে x<sup>7</sup> এর সহগ হলো- [DU, 20-21]

A. 15 B. 25 C. 30 D. 35

**S○Why**  $(1+x)^7(1-x)^8 = (1-x)(1-x)^2$   
=  $(1-x)(1-{}^7C_1x+{}^7C_2x^2-{}^7C_3x^3+\dots)$  ∴ x<sup>7</sup> এর সহগ =  ${}^7C_3 = 35$

06.  $|x| < 1$  শর্তে  $\frac{1+2x}{1-x}$  এর বিস্তৃতিতে x<sup>9</sup> এর সহগ- [DU, 14-15]

A. 1 B. 5 C. 2 D. 3

**S○Why**  $\frac{1+2x}{1-x} = (1+2x)(1-x)^{-1}$   
=  $(1+2x)(1+x+x^2+x^3+\dots+x^8+x^9+\dots)$   
∴ x<sup>9</sup> এর সহগ =  $(1+2) = 3$

07.  $|2x| < 1$  এর জন্য x এর ঘাতের উর্ধ্বক্রমে  $\log_e(1+2x)$  এর বিস্তৃতিতে x<sup>4</sup> এর সহগ কত? [DU, 97-98]

A. 4 B.  $\frac{1}{4}$  C. -4 D.  $-\frac{1}{4}$

**S○Why**  $\log(1+2x) = 2x - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} - \frac{(2x)^4}{4} + \dots$   
∴  $\log_e(1+2x)$  এর বিস্তৃতিতে x<sup>4</sup> এর সহগ =  $-\frac{2^4}{4} = -4$

08.  $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^9$  এর বিস্তৃতিতে ধ্রুব পদটি বের কর- [RU, Astrazeneca, Set-1, 20-21]

A. 8-তম B. 9-তম C. 7-তম D. 5-তম

**S○Why**  $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^9$ ; ধ্রুবপদ =  $\left(\frac{9 \times 2}{2+1} + 1\right)$  তম = 7 তম

09.  $\left(x^2 - 2 + \frac{1}{x}\right)^6$  এর সম্প্রসারণে x-বর্জিত পদটির মান কত? [RU, Sinovac, Set-1, 20-21, RU, 17-18, 14-15, 12-13, 09-10; CU, 16-17, 07-08; JU, 15-16, 06-07; NSTU, 19-20]

A. 294 B. 942 C. 702 D. 924

**S○Why**  $\left(x^2 - 2 + \frac{1}{x}\right)^6 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{12}$  ∴ x বর্জিত পদ =  ${}^{12}C_6 = 924$

10.  $\left(3x - \frac{2}{x^2}\right)^{15}$  এর বিস্তৃতিতে কত তম পদ x বর্জিত? [RU, 16-17, 09-10; CU, 13-14, 12-13, 09-10; MBSTU-A, 19-20; JUST, 18-19; JKKNIU, 19-20, 18-19; KU, 15-16; IU, 16-17; ব.বো. ২০০৬; রা.বো. ২০১৬; সি.বো. ২০০৬; দি.বো. ১০]

A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

**S○Why**  $r = \frac{15 \times 1 - 0}{1 - (-2)} = 5$  ∴ x বর্জিত পদ =  $(5+1) = 6$  তম পদ



11.  $(1+x)^{\frac{1}{2}}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এর সহগ কত? [JU-D. 19-20]  
 A.  $\frac{1}{12}$  B.  $\frac{1}{13}$  C.  $\frac{1}{15}$  D.  $\frac{1}{16}$

**[S@Why]**  $(1+x)^{\frac{1}{2}}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এর সহগ  
 $= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - 1 \right) \left( \frac{1}{2} - 2 \right) \cdot \frac{1}{3!} = \frac{1}{2} \times \left( -\frac{1}{2} \right) \times \left( -\frac{3}{2} \right) \times \frac{1}{3 \times 2} = \frac{1}{16}$

12.  $(a+2x)^5$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এর সহগ 320 হলে,  $a$  এর মান কত? [CU-A, Set-2. 20-21, RU. 17-18, 13-14; JU. 16-17, 14-15; IU. 06-07]  
 A.  $\pm 3$  B.  $\pm 2$  C.  $\pm 4$  D.  $\pm 8$   
**[S@Why]**  $(a+2x)^5$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এর সহগ,  ${}^5C_3 a^2 2^3 = 320$   
 $\Rightarrow 80 a^2 = 320 \therefore a = \pm 2$

13.  $\left(x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{15}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^{32}$  এর সহগ কোনটি? [CU-D, Set-2. 20-21]  
 A. 1365 B. 4 C. 635 D. 1653

**[S@Why]**  $\left(x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{15}$  বিস্তৃতিতে  $x^{32}$  এর সহগ  $= {}^{15}C_{\frac{60-32}{7}} = {}^{15}C_4 = 1365$

14.  $(3+kx)^9$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এবং  $x^4$  এর সহগ দুটি সমান হলে,  $k$  এর মান কত? [CU. 17-18]  
 A. 3 B. 2 C. 7 D. 5

**[S@Why]**  $(3+kx)^9$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এর সহগ  $= {}^9C_3 3^6 \cdot k^3$   
 $(3+kx)^9$  এর বিস্তৃতিতে  $x^4$  এর সহগ  $= {}^9C_4 3^5 \cdot k^4$   
 $\therefore {}^9C_3 3^6 \cdot k^3 = {}^9C_4 3^5 \cdot k^4 \Rightarrow k = \frac{3 \times {}^9C_3}{{}^9C_4} = 2$

15.  $(1+x+x^2)^9$  এর বিস্তৃতিতে  $x^5$  এর সহগ কত? [CU-C, 08-09]  
 A. 55 B. 462 C. 378 D. 56 E. 252

**[S@Why]**  $(1+x+x^2)^9 = (1+x)^9 + {}^9C_1(1+x)^8 x^3 + {}^9C_2(1+x)^7 x^6 + x^5$  যুক্ত পদ  $= {}^9C_5 x^5 + {}^9C_1 \cdot {}^8C_2 x^2 \cdot x^3 = 378 x^5$   
 $\therefore x^5$  এর সহগ  $= 378$

16.  $(1+x)^{44}$  এর বিস্তৃতিতে 21 তম পদ ও 22 তম পদ দুইটি সমান হলে,  $x$  এর মান কত? [IU. 17-18; KU. 11-12; CU. 11-12; JU. 05-06; ঢাবো. ১৩, ১০; দি.বো. ১৩; ০৬; ব.বো. ১৩, ১১, ০৮, ০৫; য.বো. ১৩; কু.বো. ১৬, ০৫; চ.বো. ১৪, ১২, ০৮, ০৫; রা.বো. ০৫; সি.বো. ১৪, ০৭]

A.  $\frac{7}{8}$  B.  $\frac{1}{8}$  C.  $\frac{6}{7}$  D.  $\frac{1}{7}$

**[S@Why]**  $(1+x)^{44}$  এর বিস্তৃতিতে  $r$  ও  $(r+1)$  তম পদ পরস্পর সমান হলে,  
 $x = \frac{r}{n - (r-1)} = \frac{21}{44 - (21-1)} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

17.  $\left(x + \frac{1}{x^3}\right)^{20}$  এর বিস্তৃতিতে  $x$  বর্জিত পদের মান কত? [BSFMSTU. 19-20]  
 A. 484.5 B. 6 C. 242.5 D. কোনোটিই নয়

**[S@Why]** ধরি,  $\left(x + \frac{1}{x^3}\right)^{20}$  এর বিস্তৃতিতে  $(r+1)$  তম পদটি  $x$  বর্জিত।

$r = \frac{1 \times 20 - 0}{1 - (-3)} = 5 \therefore x$  বর্জিত পদের মান  $= {}^{20}C_5 = 15504$

18.  $\left(px + \frac{q}{x}\right)^{12}$ ;  $p > 0, q > 0$  এর বিস্তৃতিতে  $x$  বর্জিত পদ কোনটি? [BSMRSTU. 18-19]  
 A.  ${}^{12}C_6 p^6 q^6$  B.  ${}^{12}C_5 p^5 q^5$  C.  ${}^{12}C_5 \sqrt{pq}$  D.  ${}^{12}C_6 p^6 q^5$

**[S@Why]**  $\left(px + \frac{q}{x}\right)^{12}$  এর বিস্তৃতিতে  $(r+1)$  তম  $x$  বর্জিত।

$\therefore r = \frac{12}{1+1} = \frac{12}{2} = 6$  মান  $= {}^{12}C_6 (p)^{12-6} (q)^6 = {}^{12}C_6 p^6 q^6$

19.  $|x| < 1$  শর্তে  $\frac{1+3x}{1-x}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^8$  এর সহগ? [RU. Sinovac, Set-1. 20-21]  
 A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

**[S@Why]**  $|x| < 1$  শর্তাধীনে,  $\frac{1+3x}{1-x} = 1 + 4x(1-x)^{-1}$   
 $= 1 + 4x + 4x^2 + \dots + 4x^8 + \dots$   
 $\therefore x^8$  এর সহগ  $= 4$

20. যদি  $y = x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots$  হয়, তাহলে নিচের কোনটি সত্য? [RU. 15-16]  
 A.  $x = y + y^2 + y^3 + y^4 + \dots$  B.  $x = y - y^2 + y^3 - y^4 + \dots$   
 C.  $x = 1 + y + y^2 + y^3 + \dots$  D.  $x = (1+y)^{-1}$

**[S@Why]**  $y = x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots$   
 $\Rightarrow 1 - y = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots$   
 $\Rightarrow (1-y) = (1+x)^{-1} \Rightarrow (1+x) = (1-y)^{-1}$   
 $\Rightarrow 1+x = 1 + y + y^2 + y^3 + \dots$   
 $\Rightarrow x = y + y^2 + y^3 + \dots$

### PRIME TEST

01.  $x$  এর কোন মানের জন্য  $\left(1 - \frac{x}{8}\right)^{-\frac{1}{2}}$  এর বিস্তৃতি সবসময় সম্ভব যখন-

Ⓐ  $|x| \leq 1$  Ⓑ  $|x| < 1$  Ⓒ  $|x| \leq 8$  Ⓓ  $|x| < 8$

02.  $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^{18}$  এর বিস্তৃতিতে কততম পদটি ধ্রুব?

Ⓐ 11 তম Ⓑ 12 তম Ⓒ 10 তম Ⓓ 13 তম

03.  $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{16}$  এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদটি হবে-

Ⓐ 12780 Ⓑ 12708  
Ⓒ 12870 Ⓓ 12807

04.  $\left(2x + \frac{1}{8x}\right)^8$  এর বিস্তৃতিতে  $x$  বর্জিত পদের মান হলো-

Ⓐ  $\frac{70}{81}$  Ⓑ 520 Ⓒ  $\frac{35}{128}$  Ⓓ  $\frac{7}{512}$

05.  $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$  এর বিস্তৃতিতে  $x$ -মুক্ত পদ-

Ⓐ 204 Ⓑ 240 Ⓒ 402 Ⓓ 420

06.  $\left(2x^3 + \frac{1}{6x}\right)^{12}$  এর বিস্তৃতিতে (expansion)  $x$  বর্জিত পদ কোনটি?

Ⓐ 10 তম Ⓑ 8 তম Ⓒ 7 তম Ⓓ 9 তম

07.  $(a+2x)^5$ -এর বিস্তৃতিতে  $x^3$ -এর সহগ 320 হলে,  $a$ -এর মান কত?

Ⓐ  $\pm 2$  Ⓑ  $\pm 1$  Ⓒ  $\pm 3$  Ⓓ  $\pm 4$

08.  $\left(x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{11}$  বিস্তৃতিতে সপ্তম রাশিটি কত?

Ⓐ  $402x^6$  Ⓑ  $-462x^9$  Ⓒ  $462x^2$  Ⓓ  $-462x^2$

09.  $(1+x)^{20}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^r$  এর সহগ  $x^{r-1}$  এর সহগের ষিগুণ হলে  $r = ?$

Ⓐ 7 Ⓑ 8 Ⓒ 9 Ⓓ 10

10.  $n \in \mathbb{N}$  হলে  $(1+x)^n$  এর বিস্তৃতিতে  $(r+1)$  তম ও  $r$  তম পদের সহগের অনুপাত কত?

Ⓐ  $\frac{n-r-1}{r}$  Ⓑ  $\frac{n-r}{r}$  Ⓒ  $\frac{n-r+1}{r}$  Ⓓ  $\frac{{}^nC_r + 1}{{}^nC_r}$

11.  $\left(2x + \frac{1}{2x}\right)^5$  এর বিস্তৃতিতে  $x$  এর সর্বোচ্চ ঘাতের সহগ কত?

Ⓐ 2 Ⓑ  $2^0$  Ⓒ  $2^5$  Ⓓ  $-2^5$

12.  $(1-2x+3x^2)(1+x)^{11}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^{11}$  এর সহগ ....।

Ⓐ 165 Ⓑ 140 Ⓒ 160 Ⓓ 144

13.  $e^{3x}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^7$  এর সহগ কত?

Ⓐ  $\frac{3^7}{7!} x^7$  Ⓑ  $3^7$  Ⓒ  $\frac{1}{7!}$  Ⓓ  $\frac{3^7}{7!}$



14.  $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - 6^2 + \dots$  এর  $n$  সংখ্যক উপাদানের যোগফল কত?  
( $n$  একটি জোড় সংখ্যা)–

- Ⓐ  $-\frac{n}{2}(n+1)$  Ⓑ  $\frac{n}{2}(n+1)$  Ⓒ  $-n(n+1)$  Ⓓ  $\frac{n(n+1)}{4}$

15.  $\frac{1}{(1-x)(3-x)}$  এর বিস্তৃতিতে  $x^{10}$  এর সহগ হবে–

- Ⓐ  $\frac{1}{2}(1+3^{-11})$  Ⓑ  $\frac{1}{2}(1-3^{-11})$  Ⓒ  $\frac{1}{2}(1-3^{10})$  Ⓓ  $\frac{1}{2}(1+3^{10})$

16.  $(1+x^2)^7$  বিস্তৃতিতে  $x^6$  এর সহগ কত?

- Ⓐ 35 Ⓑ 30 Ⓒ 25 Ⓓ 20

17.  $a$  এর কোন মানের জন্য  $(1+ax)^8$  এর বিস্তৃতিতে  $x$  এবং  $x^2$  এর সহগদ্বয় পরস্পর সমান হবে?

- Ⓐ  $\frac{7}{2}$  Ⓑ  $\frac{2}{7}$  Ⓒ  $\frac{1}{7}$  Ⓓ  $\frac{1}{2}$

18.  $(1+ax)^8$  এর বিস্তৃতিতে  $x^3$  এবং  $x^4$  এর সহগ পরস্পর সমান হলে  $a =$  কত?

- Ⓐ  $\frac{5}{4}$  Ⓑ  $\frac{4}{5}$  Ⓒ  $\frac{16}{5}$  Ⓓ  $\frac{5}{16}$

19.  $(1-x)^8$  এর বিস্তৃতিতে  $x^5$  এর সহগ কোনটি?

- Ⓐ -49 Ⓑ 56 Ⓒ 64 Ⓓ -56

20.  $(2x^2 + \frac{1}{x} - 2\sqrt{2})^{12}$  এর বিস্তৃতিতে ধ্রুবক পদটি কত?

- Ⓐ 1 Ⓑ  ${}^{24}C_{12} 2^{12}$  Ⓒ  ${}^{12}C_6 2^6$  Ⓓ  ${}^{24}C_{12} 2^6$

☺ Answer Analysis ☺


| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | D     | $\left \frac{x}{8}\right  < 1 \Rightarrow  x  < 8$                                                                                                                                                                                                              |
| 02     | D     | ধরি, $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^{18}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটি ধ্রুব পদ।<br>$\therefore r = \frac{18(-2) - 0}{-2 - 1} = \frac{-36}{-3} = 12$<br>$\therefore (12+1)$ তম 13 তম পদটি ধ্রুবক                                                              |
| 03     | C     | বিস্তৃতির ঘাত জোড় সংখ্যা বলে মধ্যপদ একটি।<br>$\therefore$ মধ্যপদটি $= \binom{n}{2+1} = \binom{16}{2+1} = 9$ তম পদ।<br>$\therefore$ মধ্যপদের মান $= {}^{16}C_8 \cdot (x)^{16-8} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^8 = 12870$                                      |
| 04     | C     | ধরি, $\left(2x + \frac{1}{8x}\right)^8$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটি $x$ বর্জিত<br>$r = \frac{1 \times 8 - 0}{1 - (-1)} = 4$<br>$\therefore x$ বর্জিত পদের মান $= {}^8C_4 2^4 \cdot 8^{-4}$<br>$= {}^8C_4 2^4 \cdot 2^{-12} = {}^8C_4 2^{-8} = \frac{35}{128}$ |
| 05     | B     | $r = \frac{12-0}{3} = 4 \therefore {}^6C_4 \times (2)^4 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times 16 = 240$                                                                                                                                                        |
| 06     | A     | $r = \frac{12 \times 3 - 0}{3 - (-1)} = 9$<br>$\therefore x$ বর্জিত পদ $= (9+1) = 10$ তম                                                                                                                                                                        |
| 07     | A     | $x^3$ যুক্ত পদ $= {}^5C_3 \cdot a^{5-3} \cdot (2x)^3 = {}^5C_3 \cdot a^2 \cdot 8x^3$<br>প্রশ্নমতে, ${}^5C_3 \cdot a^2 \cdot 8 = 320 \Rightarrow a^2 = 4 \therefore a = \pm 2$                                                                                   |

| প্রশ্ন | উত্তর | ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08     | C     | $\left(x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{11}$ এর বিস্তৃতিতে সপ্তম পদ<br>$= {}^{11}C_6 (x^4)^{11-6} \left(-\frac{1}{x^3}\right)^6 = 462x^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09     | A     | $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে $x^0$ এর সহগ $x^1$ এর সহগের $K$ গুণ হলে অর্থাৎ<br>$K : 1$ হলে $K + P + 1 \times q = n$ হবে।<br>$2 \times r + 1 \times (r-1) = 20$<br>$\Rightarrow 3r = 21 \Rightarrow r = 7$                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10     | C     | সরাসরি সূত্র।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11     | C     | $\left(2x + \frac{1}{2x}\right)^5 = (2x)^5 + {}^5C_1(2x)^4\left(\frac{1}{2x}\right) + {}^5C_2(2x)^3\left(\frac{1}{2x}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{2x}\right)^5$<br>$\therefore \left(2x + \frac{1}{2x}\right)^5$ এর বিস্তৃতিতে $x$ এর সর্বোচ্চ ঘাতক সহগ $= 2^5$                                                                                                                                                                    |
| 12     | D     | $(1-2x+3x^2)(1+x)^{11}$<br>$= (1-2x+3x^2)(1+{}^{11}C_1x+{}^{11}C_2x^2+\dots+{}^{11}C_9x^9+{}^{11}C_{10}x^{10}+x^{11})$<br>$\therefore x^{11}$ এর সহগ $= 3 \times {}^{11}C_9 - 2 \times {}^{11}C_{10} + 1 = 165 - 22 + 1 = 144$                                                                                                                                                                                                           |
| 13     | D     | $e^{3x} = 1 + \frac{3x}{1!} + \frac{(3x)^2}{2!} + \dots + \frac{(3x)^7}{7!} + \dots$<br>$\therefore e^{3x}$ এর বিস্তৃতিতে $x^7$ এর সহগ $= \frac{3^7}{7!}$                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14     | A     | প্রথম 2টি পদের যোগফল -3; এবার Option $\rightarrow A$ তে $n=2$ বসিয়ে পাই -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15     | B     | $\frac{1}{(1-x)(3-x)} = \frac{1}{3(1-x)\left(1-\frac{x}{3}\right)}$<br>$\therefore x^{10}$ এর সহগ $= \frac{1}{3} \cdot \frac{1^{10+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{10+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3^{11}}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{11}}\right)$                                                                                                                                  |
| 16     | A     | $(1+x^2)^7 = 1 + {}^7C_1x^2 + {}^7C_2(X^2)^2 + {}^7C_3(x^2)^3$<br>$= 1 + {}^7C_1x^2 + {}^7C_2x^4 + {}^7C_3x^6 + \dots$<br>$\therefore$ এর সহগ $= {}^7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3!} = 35$                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17     | B     | যেহেতু, $(1+ax)^8$ এর বিস্তৃতিতে $x$ এবং $x^2$ এর সহগদ্বয় সমান<br>$\therefore a = \frac{\text{বড় পাওয়ার}}{n - \text{ছোট পাওয়ার}} = \frac{2}{8-1} = \frac{2}{7}$                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18     | B     | $(1+ax)^8$ এর বিস্তৃতিতে $x^3$ এর সহগ $= {}^8C_3 1^5 \cdot a^3 = {}^8C_3 \cdot a^3$<br>$(1+ax)^8$ এর বিস্তৃতিতে $x^4$ এর সহগ $= {}^8C_4 1^4 \cdot a^4 = {}^8C_4 \cdot a^4$<br>$\therefore {}^8C_4 a^4 = {}^8C_3 \cdot a^3 \Rightarrow a = \frac{{}^8C_3}{{}^8C_4} = \frac{4}{5}$                                                                                                                                                         |
| 19     | D     | $(1-x)^8$ এর বিস্তৃতিতে $x^5$ এর সহগ $= {}^8C_5 (-1)^5 = -56$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20     | D     | $\left(2x^2 + \frac{1}{x} - 2\sqrt{2}\right)^{12} = \left\{(\sqrt{2}x)^2 - 2\sqrt{2}x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right\}^{12}$<br>$= \left\{\left(\sqrt{2}x - \frac{1}{x}\right)^2\right\}^{12} = \left(\sqrt{2}x - \frac{1}{x}\right)^{24}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটি<br>ধ্রুব পদ অর্থাৎ $x$ বর্জিত।<br>$\therefore r = \frac{24}{1+1} = 12$<br>$\therefore$ ধ্রুবপদটি $= {}^{24}C_{12} (\sqrt{2})^{12} = {}^{24}C_{12} 2^6$ |























**Answer Analysis**

| প্রশ্ন | উত্তর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | D<br>$9x^2 + 16y^2 = 144 \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$<br>উৎকলিতকরে, $c = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{4}{16}$<br>$\therefore \frac{x}{a/c} = \pm \frac{a}{c} \Rightarrow x = \pm \frac{4}{16} \sqrt{16} \Rightarrow x = \pm \frac{4}{16} \sqrt{16} = \pm 16$                                                                                    |
| 02     | C<br>$2x^2 - 4xy + 3y^2 - x + y - 1 = 0$ কে $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাঠে, $a = 2$<br>$b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 16 - 24 = -8 < 0$<br>এখানে $b^2 - 4ac < 0$ এবং $a \neq 0$ $\therefore$ মণ্ডিকগণটি উৎকলিত।                                                                                                              |
| 03     | D<br>$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাঠে,<br>$a = 1; b = 4; c = 4$<br>$\therefore b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$ $\therefore$ মণ্ডিকগণটি পরাবৃত্ত।                                                                                                                                                                                 |
| 04     | A<br>$y^2 + 4x + 2y - 8 = 0 \Rightarrow y^2 + 2y + 1 = 8 - 4x$<br>$\Rightarrow y^2 + 2 \cdot 1 \cdot y + 1 = 8 - 4x + 1 \Rightarrow (y+1)^2 = -4 \left(x - \frac{9}{4}\right)$<br>$\therefore$ মণ্ডিকগণটি $\left(\frac{9}{4}, -1\right)$                                                                                                                              |
| 05     | A<br>$x^2 + 4x + 2y = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 4 = -2y + 4$<br>$\Rightarrow (x+2)^2 = -2(y-2)$ $\therefore$ মণ্ডিকগণটি $(-2, 2)$                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06     | A<br>$3x^2 - 4y + 6x - 5 = 0 \therefore x^2 - \frac{4}{3}y = 2x - \frac{5}{3} = 0$<br>$\Rightarrow x^2 + 2x = \frac{4y+5}{3} \Rightarrow (x^2 + 2x + 1) = \frac{4y+5}{3} + 1$<br>$\Rightarrow (x+1)^2 = \frac{4y+8}{3} \Rightarrow (x+1)^2 = \frac{4}{3}(y+2)$<br>$\therefore$ মণ্ডিকগণ $y+2 = 0$<br>$\Rightarrow y + 2 + \frac{1}{3} = 0$<br>$\therefore 3y + 7 = 0$ |
| 07     | B<br>$3y^2 = 7x \Rightarrow y^2 = 4 \cdot \frac{12}{7}x$<br>$\therefore$ মণ্ডিকগণের মণ্ডিককেন্দ্র, $x + \frac{12}{7} = 0 \Rightarrow 12x + 7 = 0$                                                                                                                                                                                                                     |
| 08     | B<br>$y = mx + c$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের স্পর্শক রেখা হলে:<br>$c = \frac{m}{a} \therefore b = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09     | C<br>$y = x + 3$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের স্পর্শক রেখা হলে $3 = \frac{1}{a}$ হলে<br>$\therefore y^2 = 4 \cdot 3 \cdot x = 12x$<br>$\therefore$ উৎকলিতকরে মণ্ডিককেন্দ্র $(3, 0)$                                                                                                                                                                                  |
| 10     | A<br>$x^2 - 4x + 12y - 40 = 0$<br>$\Rightarrow (x-2)^2 = -12y + 40 + 4 = -12y + 44$<br>$\Rightarrow (x-2)^2 = -12(y-3) = 4 \cdot (-3) \cdot (y-3)$<br>$\therefore$ উৎকলিতকরে মণ্ডিককেন্দ্র $(2, 3)$ $\therefore  a  =  -3  = 12$                                                                                                                                      |
| 11     | A<br>$\therefore c = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$<br>$\therefore$ মণ্ডিককেন্দ্র $(0, 25)$ $\therefore 25x^2 + 16y^2 = 400$ বা, $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$                                                                                                                                                                                       |

|    | ଉତ୍ତର | ସମାଧାନ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | C     | $4x^2 + y^2 = 2 \quad \text{ଓ} \quad x^2 + \frac{y^2}{2} = 1 : a = \sqrt{2}, b = \frac{\sqrt{2}}{2} \therefore b > a$ $\therefore \text{ହେମିଷ୍ଟ} = 2b = 2\sqrt{2}, \text{ଅକ୍ସିଆକ୍ସ} = 2a = \frac{\sqrt{2}}{2}$                                                                                                               |
| 13 | D     | $2x^2 + 3y^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1 \quad (a > b)$ $\therefore \text{ଉଲ୍ଲାସୀୟ ଅକ୍ସିଆକ୍ସ} = 2b^2 = \frac{2 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$                                                                            |
| 14 | D     | $\therefore \text{ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ପର୍କରେ, } x = \pm \frac{e}{a} = \pm \frac{5}{4} = \pm \frac{5}{4} \Rightarrow 4x = \pm 25$ $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$                                                                                                                          |
| 15 | D     | $2x^2 + 3y^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1$ $\therefore \text{ଉଲ୍ଲାସୀୟ ଅକ୍ସିଆକ୍ସ} e = \sqrt{1 - \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}} = \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\therefore (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, 0) = (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$                               |
| 16 | B     | $9x^2 + 5y^2 = 45 \Rightarrow \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ <p>Here, <math>a = \sqrt{5}, b = 3</math> and <math>e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}</math></p> $\therefore \text{ଉଲ୍ଲାସୀୟ ଅକ୍ସିଆକ୍ସ ଦୂରତା} = 2be = 2 \times 3 \times \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{12}{\sqrt{5}}$ |
| 17 | C     | $x^2 - y^2 = 2 \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ $\therefore a\sqrt{2}, b = \sqrt{2}$ $e = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}} = \sqrt{\frac{2+2}{2-2}} = \sqrt{2}$ $\therefore \text{ଫୋକାଲ ଦୂରତା} = 2ae = 2(\sqrt{2})\sqrt{2} = 4$                                                                              |
| 18 | B     | $x^2 + 4y^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1$ $\therefore \text{ଉଲ୍ଲାସୀୟ ଅକ୍ସିଆକ୍ସ} e = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $y = mx + c \text{ ଯେଉଁଠି } y^2 = 4ax \text{ ପରିବର୍ତ୍ତକ କରାଯାଇଛି } c = \frac{m}{2}$                                                     |
| 19 | C     | $\therefore 1 = \frac{3}{a} \Rightarrow a = 3$ $y = mx + c \text{ ଯେଉଁଠି } y^2 = 4ax \text{ ପରିବର୍ତ୍ତକ କରାଯାଇଛି } c = \frac{m}{2}$                                                                                                                                                                                           |
| 20 | D     | $x^2 + y^2 = 12$ $\therefore \text{କ୍ରମିକ ଭାବରେ}$                                                                                                                                                                                                                                                                            |















|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | C | $\tan^{-1} \frac{2}{3} + \cos^{-1} \frac{\sqrt{13}}{2} \Rightarrow \tan^{-1} \frac{2}{3} + \tan^{-1} \frac{2}{3} = \tan^{-1} \frac{4}{3}$<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07 | B | $\cos \tan^{-1} \cot \sin^{-1} x = x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08 | D | $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09 | A | $\sin \cos^{-1} x = \sqrt{1-x^2}$<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | B | $2\cos 2\theta + 2\sqrt{2}\sin \theta = 3$<br>এখানে $\theta$ এর অন্তর্গত কোণের মান বঙ্গোপসাগর থেকে নেওয়া হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | C | $\frac{1}{\tan x} - \tan x = 2$ বা, $1 - \tan^2 x = 2 \tan x$ বা, $\frac{1 - \tan^2 x}{2 \tan x} = 1$<br>বা, $\tan 2x = 1 \Rightarrow \tan \frac{4}{2} = 1 \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ; $n \in \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                                   |
| 12 | C | $\tan \theta + \cot \theta = 2 \Rightarrow \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 2$<br>বা, $\tan^2 \theta + 1 = 2 \tan \theta$ বা, $\frac{1 + \tan^2 \theta}{2 \tan \theta} = 1$<br>বা, $\sin 2\theta = 1 \Rightarrow \sin 90^\circ = 1 \Rightarrow 2\theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = 45^\circ$                                                                                                                           |
| 13 | A | $\theta = 45^\circ$ বা, $\cot \theta - 2\sqrt{2} \sec \theta + 3 = 0$ যা সমাধান করা যায়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | A | Option Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | C | $\tan 2x \cdot \tan x = 1 \Rightarrow \frac{1}{2 \tan x} \cdot \tan x = 1$<br>$\therefore \tan x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan \left( \pm \frac{\pi}{6} \right)$ $x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$<br>$4 \sin^2 \theta + 4 \cos \theta - 5 = 0$ বা, $4 \cos^2 \theta - 4 \cos \theta + 1 = 0$ বা, $(2 \cos \theta - 1)^2 = 0$<br>বা, $\cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ ; $n \in \mathbb{Z}$ |
| 16 | B | $\sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | A | $\cos \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) = 120^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | C | এখানে $\theta$ এর মান $450^\circ < \theta < 540^\circ$ কোণের মান বঙ্গোপসাগর থেকে নেওয়া হয়েছে।<br>$\therefore 120^\circ + 360^\circ = 480^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | B | $\therefore \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta = 1$ বা, $\cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} = 1$<br>$\therefore \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta = 1$                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | B | Option B এর মান $x$ এর অন্তর্গত কোণের মান বঙ্গোপসাগর থেকে নেওয়া হয়েছে।<br>$\therefore n = 0$ বা, $0 < \theta < 360^\circ$ এর মান $\theta = 60^\circ$ Ans.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | A | $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} y$<br>$\Rightarrow x = \sin \left( \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} y \right) = \cos(\sin^{-1} y)$<br>$\Rightarrow x = \cos \cos^{-1} \sqrt{1-y^2} \Rightarrow x = \sqrt{1-y^2} \Rightarrow x^2 = 1-y^2$<br>$\therefore x^2 + y^2 = 1$ |
| 02 | C | $\tan^{-1} 6 + \tan^{-1} \frac{5}{7} = \tan^{-1} \frac{6 \cdot \frac{5}{7} + 1}{\frac{5}{7} - 6} = \tan^{-1} \frac{30+7}{5-42} = \tan^{-1} \frac{37}{-37} = \tan^{-1} (-1) = -\frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$                                                                                            |
| 03 | D | $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} \frac{1}{2} = \tan^{-1} \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \tan^{-1} \frac{3}{1} = \tan^{-1} 3 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$                                                                                                                                               |
| 04 | D | $\tan \frac{\pi}{2} \Rightarrow \infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 05 | C | $\cot \left( \sin^{-1} \frac{1}{2} \right) = \cot(30^\circ) = \sqrt{3}$                                                                                                                                                                                                                                                        |

Answer Analysis

12.  $0 < \theta < 90^\circ$  এর মান কত?   
 (A)  $30^\circ$  (B)  $60^\circ$  (C)  $45^\circ$  (D) কোনোই নয়
13.  $\cot \theta - 2\sqrt{2} \sec \theta + 3 = 0$  এর মান কত?   
 (A)  $45^\circ$  (B)  $\pm 135^\circ$  (C)  $135^\circ$  (D) None of these
14.  $0 \leq \theta \leq 360^\circ$  এর, সমাধান কর:  $4 \cos \theta + 6 = 5(\cos \theta + 1)$    
 (A)  $0^\circ$  (B)  $90^\circ$  (C)  $180^\circ$  (D)  $270^\circ$
15.  $\tan 2x \tan x = 1$  সমাধান কর  $x$  এর কোণ  $0^\circ$  থেকে  $90^\circ$  পর্যন্ত   
 (A)  $7\pi/5$  (B)  $13\pi/15$  (C)  $8\pi/9$  (D)  $6\pi/11$
16.  $4(\sin^2 \theta + \cos \theta) = 5$  সমাধান কর  $\theta$  এর মান  $0^\circ$  থেকে  $90^\circ$  পর্যন্ত   
 (A)  $2n\pi \pm \pi/2$  (B)  $2n\pi \pm \pi/3$  (C)  $2n\pi \pm \pi/4$  (D)  $2n\pi \pm \pi/5$
17.  $\sin \theta = \frac{1}{2}$  এর  $\theta =$  কত?   
 (A)  $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$  (B)  $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (C)  $n\pi - \frac{\pi}{4}$  (D)  $2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$
18.  $\cos \theta = -1/2$ ,  $450^\circ < \theta < 540^\circ$  এর মান  $\theta$    
 (A)  $460^\circ$  (B)  $530^\circ$  (C)  $480^\circ$  (D)  $470^\circ$
19.  $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2$ ,  $0^\circ < \theta < 360^\circ$  এর মান কত?   
 (A)  $45^\circ$  (B)  $60^\circ$  (C)  $90^\circ$  (D)  $120^\circ$
20.  $\sin x = \cos x$  এর,  $x$  এর মান কোণ?   
 (A)  $\frac{\pi}{3}$  (B)  $\frac{4}{5\pi}$  (C)  $\frac{6}{5\pi}$  (D)  $\frac{2}{\pi}$











| প্রশ্ন | উত্তর                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 C   | কোন বিন্দু বা রেখার চার্টের কোন বিন্দু $\times$ বিন্দু হতে                                                                                                               |
| 02 A   | <p>এক ট্রাকের চিত্রমালা দেওয়া হল।</p> <p><math>\therefore</math> বাকি <math>= 2N + 5N = 7N</math></p>                                                                   |
| 03 A   | <p> <math display="block">R = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} + 2 \cdot (\sqrt{3}) (\sqrt{3}) \cos 120^\circ = \sqrt{3} \text{ units}</math> </p> <p>বাঁকানো মান,</p> |

**Answer Analysis**

10. 2 lb-wt. 4 lb-wt এবং 6 lb-wt মালের তিনটি বস একটি বিন্দুতে পরস্পর  
120° কোণে স্থাপন করা হবে। তখন প্রতিটি বসের ওজন যথাক্রমে  
A)  $2\sqrt{3}$  lb-wt B)  $3\sqrt{2}$  lb-wt C)  $2$  lb-wt D)  $5\sqrt{2}$  lb-wt  
একটি লোক একটি বসকে 40 ft দূরত্ব থেকে 20 ft দূরত্ব পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে আসবে।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
11. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
12. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
13. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
14. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
15. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
16. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
17. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
18. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
19. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
20. একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।  
একটি বসের ওজন  $w$  এবং একটি বসের ওজন  $w$ ।

தமிழ் இலக்கியம் - பாவாணர் கருத்துரைப்பு

কর্তব্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি



১১. একটি বিদ্যুৎ ১৫ হেনরির দুটি কয়েল সমান্তরাল পরে করে মোট রোধের ১৬ হিলস্কিটের  
 হেনরি ১৫ হিলস্কিটের দুটি বিদ্যুৎ ১৫ হিলস্কিটের দুটি কয়েল সমান্তরাল পরে করে মোট রোধের ১৬ হিলস্কিটের



29. একটি মানুষ একটি পাথরকে ঠিক 392 ফুট ছুঁতে পারে তবে নিম্নের গতি কোনটি?

- A. 112 ফুট B. 211 ফুট C. 212 ফুট  
D. 110 ফুট E. 121 ফুট

**[S@Why]**  $R_{\max} = \frac{u^2}{g}$

$\therefore u = \sqrt{R_{\max} \times g} = \sqrt{392 \times 32} = 112 \text{ ফুট}$

30. একটি বস্ত্র বিনা বাধায় শুধুমাত্র মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে খাড়া নিচের দিকে নামা অবস্থায় 128 ft দূরত্বে অবস্থিত দুইটি বিন্দু 2 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। উপরের বিন্দু হতে কত উচ্চতায় বস্ত্র নিচের দিকে নামা শুরু করেছিল?

- A. 13 ft B. 19 ft C. 21 ft  
D. 27 ft E. 16 ft

**[S@Why]**  $h = ut + \frac{1}{2}gt^2$

$\Rightarrow 128 = u \times 2 + \frac{1}{2} \times 32 \times 2^2 [g = 32 \text{ ft/s}^2]$

$\Rightarrow 128 = 2u + 64 \Rightarrow u = 32 \text{ ft/s}^{-1}$

উপরের বিন্দুতে বেগ ছিল  $32 \text{ ft/s}^{-1}$

বস্ত্রটি উপরের বিন্দু থেকে  $h'$  উচ্চতায় নামা শুরু করলে,  $u^2 = 2gh'$

$\Rightarrow h' = \frac{u^2}{2g} = \frac{32^2}{2 \times 32} = 16 \text{ ft.}$

31. 0.25 Kg এবং 0.50 Kg ভরের দুইটি বস্ত্র যথাক্রমে  $h_1$  এবং  $h_2$  উচ্চতা হতে মুক্তভাবে পড়ে একই সমান গতিশক্তিতে ভূপৃষ্ঠে পড়ল।  $h_1/h_2$  এর মান নির্ণয় কর। [KUET.13-14]

- A.  $\frac{3}{5}$  B.  $\frac{11}{15}$  C.  $\frac{3}{7}$  D.  $\frac{2}{1}$

**[S@Why]**  $E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \times 2gh = mgh$

$E \propto mh \therefore m_1h_1 = m_2h_2 \Rightarrow \frac{h_1}{h_2} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{0.50}{0.25} = \frac{2}{1}$

32. কোন স্তরের শীর্ষ হতে 19.5 m/sec বেগে খাড়া উপরের দিকে প্রকৃষ্ট কোন কণা 5 sec পরে স্তরের পাদদেশে পতিত হলে স্তরের উচ্চতা- [DU.11-12, 07-08, 05-06; JuU.06-07]

- A. 25 m B. 50 m C. 20 m D. 30 m

**[S@Why]** এক্ষেত্রে,  $u = 19.5 \text{ m/s}$ ,  $t = 5 \text{ s}$ ,  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

$\therefore h = -u + \frac{1}{2}gt^2 = -19.5 \times 5 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 = 25 \text{ m}$

[ $\therefore$  স্তরের শীর্ষ হতে বস্ত্র খাড়া উপরে প্রকৃষ্ট হয়]

### PRIME TEST

01. একটি ক্রিকেট বলকে 40 m/sec বেগে এবং ভূমির সাথে  $60^\circ$  কোণে ব্যাট দ্বারা আঘাত করলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় বলটির বেগ কত?

- A. 0 B. 20 m/sec  
C. 30 m/sec D. 40 m/sec

02. একটি গাড়ী স্থিরাবস্থা থেকে সমত্বরণে চলা শুরু করে 5 sec এ 80 m/s গতিপ্রাপ্ত হল। গাড়ীটির ত্বরণ-

- A.  $15 \text{ m/s}^2$  B.  $20 \text{ m/s}^2$   
C.  $16 \text{ m/s}^2$  D.  $30 \text{ m/s}^2$

03.  $s = 6 + 4t - t^2$  হলে 2 সে. পর এর ত্বরণ কত হবে?

- A.  $4 \text{ m/s}^2$  B.  $-4 \text{ m/s}^2$  C.  $2 \text{ m/s}^2$  D.  $-2 \text{ m/s}^2$

04. কোন গাড়ী ঘণ্টায় 45 মাইল বেগে চলে; 2 মিনিট 20 সেকেন্ডে ইহা কত মাইল যাবে?

- A.  $1\frac{1}{5}$  B.  $1\frac{2}{5}$  C.  $1\frac{3}{4}$  D.  $1\frac{3}{5}$

05. একটি বুলেট কোন দেয়ালের ভিতর 5 cm চুকবার পর এক তৃতীয়াংশ বেগ হারায়। বুলেটটি দেয়ালের মধ্যে আর কতটুকু চুকবে?

- A. 5 cm B. 4 cm C.  $\frac{10}{3} \text{ cm}$  D. 3 cm

06. যদি  $u$  বেগে অনুভূমিকের সাথে  $\alpha$  কোণে প্রকৃষ্ট বস্ত্র T সময়ে তার গতিপথের সর্বোচ্চ উচ্চত H এ পৌঁছায়, তবে  $\frac{H}{T^2}$  হবে।

- A.  $\frac{2}{g}$  B.  $\frac{g}{2}$  C.  $g$  D.  $\frac{1}{g}$

07. 32 ft/sec আদিবেগে এবং ভূমির সাথে  $30^\circ$  কোণে একটি বস্ত্র নিম্নের দিকে হলে। ইহার আনুভূমিক পাল্লা-

- A. 16 ft B.  $32\sqrt{3}$  C. 32 ft D.  $16\sqrt{3} \text{ ft}$

08. বায়ুশূন্য স্থানে প্রকৃষ্ট বস্ত্রকণার গতিপথ একটি-

- A. বৃত্ত B. অধিবৃত্ত C. পরাবৃত্ত D. সরলরেখা

09. একটি বস্ত্র 39.2 মি./সে. বেগে ভূমির সাথে  $30^\circ$  কোণে নিম্নের দিকে কত সময় পড়ে বস্ত্রটি নিম্নের দিকের সাথে লম্বভাবে চলবে?

- A. 10 সে. B. 8 সে. C. 6 সে. D. 4 সে.

10. আনুভূমিক তলের পাল্লা সর্বোচ্চ পাল্লার অর্ধেক হলে প্রকৃষ্ট কোন কত?

- A.  $15^\circ$  B.  $30^\circ$  C.  $45^\circ$  D.  $60^\circ$

11.  $\frac{u}{\sqrt{3}}$  বেগে  $30^\circ$  কোণে প্রকৃষ্ট কণার সর্বোচ্চ উচ্চতার বেগ কত একক/সে.?

- A.  $\frac{2u}{\sqrt{3}}$  B.  $\frac{u}{\sqrt{3}}$  C.  $\frac{u}{2}$  D.  $\frac{u}{2\sqrt{2}}$

12. ভূমি হতে 19.6 m/sec বেগে খাড়া উপরের দিকে কোন বস্ত্র নিক্ষেপ হলে কতক্ষণ পর ভূমিতে পতিত হবে?

- A. 3 sec B. 4 sec C. 5 sec D. 6 sec

13. 64 ft/sec বেগে খাড়া উপরের দিকে উৎক্ষেপিত একটি বস্ত্রের সর্বোচ্চ উচ্চতা কত?

- A. 32 ft B. 48 ft C. 64 ft D. 80 ft

14. কোন স্তরের শীর্ষ হতে 19.5 m/sec বেগে খাড়া উপরের দিকে প্রকৃষ্ট কোন কণা 5 sec পরে স্তরের পাদদেশে পতিত হলে স্তরের উচ্চতা-

- A. 25 m B. 50 m C. 20 m D. 30 m

15. একটি শূন্য কূপের মধ্যে এককণা পাথরের টুকরা ছেড়ে দেয়ার পর তা 19.6 মি./সে. বেগে কূপের তলদেশে পতিত হয়। কূপের গভীরতা কত মিটার?

- A. 9.8 B. 32.0 C. 16.5 D. 19.6

16. একটি বাঘ 20 মিটার দূরে একটি হরিণকে দেখতে পেয়ে হির অবস্থান হতে  $3 \text{ m/sec}^2$  ত্বরণে হরিণটির পিছনে দৌড়াল। হরিণটি  $13 \text{ m/sec}$  সমবেগে দৌড়াতে থাকলে কতক্ষণ পরে বাঘটি হরিণকে ধরতে পারবে?

- A. 2 sec B. 12 sec C. 10 sec D. 20 sec

17. 49 মিটার উঁচু দালানের ছাদ হতে এককণা পথর ছেড়ে দিলে ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগবে?

- A.  $\sqrt{5} \text{ sec}$  B. 10 sec  
C.  $\sqrt{10} \text{ sec}$  D. 15 sec

18. একটি বুলেট একটি লক্ষ্য বস্তুতে 3 cm ভেদ করে এর অর্ধেক বেগ হারায়। বুলেটটি আরও কতটা ভেদ করবে?

- A. 1 cm B. 1.5 cm C. 2 cm D. 3 cm

19. কত ডিগ্রী কোণে নিক্ষেপিত বস্ত্রের পাল্লা সর্বোচ্চ?

- A.  $30^\circ$  B.  $45^\circ$  C.  $25^\circ$  D.  $90^\circ$

20. একটি বস্ত্রকণা 35 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি বরাবর 10 সেকেন্ডে একটি ব্যাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যায়। বস্ত্রকণার গড়বেগ কত?

- A. 5 সে.মি./সে. B. 7 সে.মি./সে.  
C. 9 সে.মি./সে. D. 11 সে.মি./সে.



13. একটি নিটোল মুদ্রা ও একটি নিটোল ছকা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো। একই সলে মুদ্রাটির মাথা ও ছকাটির জোড় সংখ্যা সম্ভাবনা: [DU. 11-12]

A.  $\frac{1}{2}$  B.  $\frac{1}{3}$  C.  $\frac{1}{4}$  D.  $\frac{1}{5}$

**[SOWhy]** একটি নিটোল মুদ্রা ও একটি নিটোল ছকা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে মোট ফলাফল = 2

মুদ্রাটির মাথা ও ছকাটির জোড় সংখ্যা আছে ৩টি: {2H, 4H, 6H}

$$\therefore \text{সম্ভাবনা} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

14. একটি ছকা নিক্ষেপে 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা উঠার সম্ভাবনা কত? [JU-D. 19-20]

A.  $\frac{1}{2}$  B.  $\frac{1}{3}$  C.  $\frac{1}{6}$  D.  $\frac{2}{3}$  **(A)**

15. একটি ছকাকে নিক্ষেপ করা হলো। 3 বা 4 পাওয়ার সম্ভাবনা- [DU-7Clg. 18-19]

A. 1.6 B. 1/3 C. 5/6 D. 1

**[SOWhy]**  $P(3 \cup 4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

16. একটি তাসের প্যাকেট. হতে দৈবভাবে একটি তাস নিলে তা হরতনের টেকা হবার সম্ভাবনা কত? [JU. 09-10]

A.  $\frac{1}{13}$  B.  $\frac{4}{13}$  C.  $\frac{1}{4}$  D.  $\frac{1}{52}$  **(D)**

17. একটি বাস্তব 3 টি লাল, 5টি কালো এবং 7টি সাদা বল আছে। এলোমেলোভাবে একসাথে দুটি বল তুলে নেয়া হলো। বল দুটির একটি লাল ও অপরটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত? [JU-H. 19-20]

A. 8/105 B. 3/105 C. 3/7 D. 1/7

**[SOWhy]** লাল = 3টি, কালো = 5টি, সাদা = 7টি

মোট = 3 + 5 + 7 = 15টি

দুইটি উঠালে একটি লাল এবং অপরটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা =  $\frac{{}^3C_1 \times {}^5C_1}{{}^{15}C_2} = \frac{1}{7}$

18. একটি বাস্তব 7টি লাল ও 6 টি কালো বল আছে। এটি হতে দৈবভাবে 6টি বল উঠানো হলে, 4টি কালো ও 2টি লাল বল পাওয়ার সম্ভাবনা- [RU. 08-09]

A. 0.3875 B. 0.1836 C. 0.2567 D. কোনটি নয়

**[SOWhy]** 4টি কালো ও 2টি লাল বল পাওয়ার সম্ভাবনা

$$= \frac{{}^6C_4 \times {}^7C_2}{{}^{13}C_6} = \frac{105}{572} = 0.183566$$

19. একটি বুদ্ধিতে সম আকারের 6টি কালো, 5টি সাদা ও 4টি লাল মার্বেল আছে। বুদ্ধি হতে দৈবক্রমে একটি মার্বেল নেয়া হলে মার্বেলটি কালো বা লাল হওয়ার সম্ভাবনা - [CU. 15-16]

A.  $\frac{1}{3}$  B.  $\frac{2}{3}$  C. 1

D.  $\frac{2}{5}$  E.  $\frac{3}{5}$

**[SOWhy]** কাল ও লাল মার্বেল = 6 + 4 = 10;

মোট মার্বেল = 6 + 4 + 5 = 15  $\therefore$  নির্ণেয় সম্ভাব্যতা =  $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

20. একটি বাস্তব 10টি নীল ও 15টি লাল মার্বেল আছে। একটি বালক যেমন খুশি টেনে প্রতিবারে একটি করে পর পর দুইটি মার্বেল উঠালে দুটি একই রংয়ের মার্বেল হবার সম্ভাবনা- [DU. 05-06; JnU. 06-07]

A.  $\frac{1}{2}$  B.  $\frac{4}{5}$  C.  $\frac{3}{20}$  D.  $\frac{7}{20}$

**[SOWhy]** 2টি একই রংয়ের মার্বেল পাবার অর্থ: 2টি নীল অথবা 2টি লাল।

$$\therefore P(2\text{টি একই রংয়ের মার্বেল}) = P(2\text{টি নীল অথবা } 2\text{টি লাল মার্বেল})$$

$$= P(2\text{টি নীল মার্বেল}) + P(2\text{টি লাল মার্বেল})$$

$$= P(1\text{মটি নীল ও } 2\text{য়টি নীল}) + P(1\text{মটি লাল ও } 2\text{য়টি লাল})$$

$$\text{পরপর উত্তোলনে মার্বেল দুটি একই রংয়ের হওয়ার সম্ভাবনা}$$

$$= \frac{10}{25} \times \frac{9}{24} + \frac{15}{25} \times \frac{14}{24} = \frac{300}{600} = \frac{1}{2}$$

21. একটি বাস্তব 4টি সাদা ও 6টি কালো বল আছে। বাস্তব হতে দৈবচয়নভাবে দুইটি বল একসাথে তুলে নিলে, বল দুইটি ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা কত? [JU. 15-16]

A.  $\frac{3}{15}$  B.  $\frac{1}{3}$

C.  $\frac{7}{15}$  D.  $\frac{8}{15}$

**[SOWhy]** ভিন্ন রং হওয়ার সম্ভাবনা =  $\frac{{}^4C_1 \times {}^6C_1}{{}^{10}C_2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$

22. কোন বাস্তব 6টি লাল ও 4টি সাদা বল আছে। পুনঃস্থাপন না করে 2টি বল নেয়া হলে বল দুইটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা হবে- [JUST-A. 14-15]

A.  $\frac{2}{15}$  B.  $\frac{7}{15}$  C.  $\frac{8}{15}$

D.  $\frac{1}{15}$  E.  $\frac{4}{15}$

**[SOWhy]** লাল বল = 6

$$\text{সাদা বল} = 4$$

$$\text{মোট বল} = 10$$

$$\therefore \text{বল দুইটি সাদা হবার সম্ভাবনা} = \frac{{}^4C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{2}{15}$$

### PRIME TEST

01. 4, 2, 5, 7 সংখ্যাসমূহের জ্যামিতিক গড় কত?

(A) 9 (B) 12 (C) 8 (D)  $\sqrt[4]{280}$

02. তোমার 15 জন বন্ধুর বয়সের গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 10 ও 2 হলে বয়সের বিভেদাঙ্ক কত?

(A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20%

03. প্রথম 10টি সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান-

(A) 2.87 (B) 3.50 (C) 4.27 (D) 4.89

04. Geometric mean, arithmetic mean থেকে সবসময়-

(A) ছোট হবে (B) বড় হবে  
(C) সমান হবে (D) ছোট বড় দুই রকমের হতে পারে

05. প্রথম 7টি স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান হবে-

(A) 2 (B) 2.5 (C) 1.9 (D) 3

06. 2, 5, 4, 9, 7, 13 সংখ্যাগুলির মধ্যমা হবে-

(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 6

07. 1 থেকে 21 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যেকোনো একটিকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নিলে সেই সংখ্যাটি 3 বা 7 এর গুণিতক হবার সম্ভাবনা কত?

(A)  $\frac{8}{21}$  (B)  $\frac{3}{7}$  (C)  $\frac{10}{21}$  (D)  $\frac{11}{21}$

08. 10 জন ব্যক্তির একটি গ্রুপে 4 জন হলো পুরুষ। দৈবচয়ন ভিত্তিতে 2 জনকে বাছাই করলে উভয়ই পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(A)  $\frac{1}{15}$  (B)  $\frac{1}{5}$  (C)  $\frac{2}{15}$  (D)  $\frac{4}{15}$

09. 40 হতে 50 সংখ্যাগুলি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা নেয়া হল। সংখ্যাটি মৌলিক না হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?

(A)  $\frac{8}{11}$  (B)  $\frac{5}{11}$  (C)  $\frac{3}{11}$  (D)  $\frac{1}{11}$

10. 0, 1, 2 দ্বারা গঠিত তিন অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যাকে 10 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা হবে-

(A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{3}$  (C)  $\frac{2}{9}$  (D)  $\frac{1}{6}$

11. একটি ছকাকে নিক্ষেপ করা হলো। 3 বা 4 পাওয়ার সম্ভাবনা-

(A) 1.6 (B) 1/3  
(C) 5/6 (D) 1