

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

হাইড্রা (Hydra) :

Hydra নিডেরিয়া (Cnidaria) পর্বের একটি ক্ষুদ্র-জলজ প্রাণী যা সাধারণত 'হাদুপানির পলিপ' নামে পরিচিত। প্রাণিজগতের Cnidaria ও Ctenophora (টিনোফোরা) পর্ব দুটির অন্তর্গত প্রাণীরা দ্বিস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) নামে পরিচিত।

Hydra আবিষ্কারে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান :

বিজ্ঞানীর নাম	সাল	অবদান
লিউয়েন হুক	১৭০২	হাইড্রা আবিষ্কার করেন।
অব্রাহাম ট্রেন্ডেল	১৭৪৪	হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা ব্যাখ্যা করেন।
কারোলাস লিনিয়াস	১৭৫৮	হাইড্রার নামকরণ করেন।

হাইড্রার প্রধান প্রধান খাদ্যের একটি তালিকা :

যেসব প্রাণীর দেহে গুটিখিণ্ডন বিদ্যমান হাইড্রা সেসব প্রাণীকে শিকার করে।

হাইড্রার খাদ্য			
সাইরুপস	মাছের ডিম	ছোট অ্যানিলিড	রটিফার
ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী	ডাফনিয়া	ছোট ছোট কুমি	ক্ষুদ্র পতঙ্গ
কাঁটপতঙ্গের লার্ভা	ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী		

হাইড্রার চলন (Locomotion) :

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ প্রচেষ্টায় স্থানান্তরিত হয় তাকে চলন বলে।

হাইড্রার বিভিন্ন প্রকার চলন (Locomotion of Hydra) :

• সমারসলিং/ডিগবাজি চলন	• ভাসা
• Looping/হামাণ্ডি চলন	• হাঁটা বা নতমুখী চলন
• গ্রাইডিং চলন বা অ্যামিবিয়ড	(Walking or Tentacular)
• Crawling/হেঁচড়ান	• ক্রম সংকোচন

ঘাসফড়িং (Grasshopper) :

Arthropoda পর্বের insecta শ্রেণির Orthoptera বর্গের Caelifera উপবর্গের প্রাণীদের ঘাসফড়িং (Grasshopper) বলে। ঘাসফড়িং একপ্রকার পতঙ্গ (insect) পেস্ট। এরা শাকসবজি, ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের পেস্ট হিসেবে থাকে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি ঘাসফড়িং প্রজাতির নাম :

<i>Acrida exaltata</i>	<i>Schistocerca gregaria</i>
<i>Phlaeoba infumata</i>	<i>Romalea microptera</i>
<i>Chondracris rosea</i>	<i>Oxya velox</i>
<i>Aulacobothrus luteipes</i>	<i>Locusta danica</i>
<i>Schistocerca americana</i>	<i>Locusta migratoria</i>
<i>Oedaleus abruptus</i>	<i>Poeciloceris pictus</i>

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের কাজ নিচে দেওয়া হলো :

নাম	কাজ
১. ল্যাব্রাম	খাবার ধরে রাখা, ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দেওয়া, স্বাদ গ্রহণ।
২. ম্যান্ডিবল	খাদ্য কঠন করা।
৩. ম্যাক্সিলা	খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, ধরে রাখা, মুখের ভেতর প্রবেশ করানো, খাদ্য চূর্ণকরণ।
৪. ল্যাবিয়াম	খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করা ও চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করানো।
৫. হাইপোফ্যারিংজ	খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মিশাতে সাহায্য করা।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর (Metamorphosis of Grasshopper) :

ঘাসফড়িং একলিঙ্গিক প্রাণী, এদের যৌন দ্বিরূপতা (sexual dimorphism) সুস্পষ্ট অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং শনাক্ত করা যায়। ঘাসফড়িং এর পুংজননতন্ত্র ও স্ত্রীজননতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে অবস্থান করে।

ঘাসফড়িং-এর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ :

ঘাসফড়িং-এর পুরুষ প্রজননতন্ত্র	ঘাসফড়িং-এর স্ত্রী প্রজননতন্ত্র
১. শুক্রাশয়	১. ডিম্বাশয় ২. ডিম্বনালি
২. শুক্রনালি/ভাস ডিফারেন্স	৩. যোনি
৩. ফেপা নালি	৪. আনুবাদিক গ্রন্থি
৪. সেমিনাল ভেসিকল	৫. স্ত্রীজননরক্ত
৫. লিঙ্গ	৬. স্পার্মাথিকা/সেমিনাল রিসেস্টেন্টল

রুই মাছ (Labeo rohita) :

অস্থিবিশিষ্ট মাথা, আইশবিন, ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য সম্পন্নকারী ও পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাচলকারী শীতল রক্তবিশিষ্ট Vertebrata উপপর্বভুক্ত প্রাণীকে মাছ বলা হয়। কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে আমাদের দেশে রুই মাছ (Labeo rohita) সুপরিচিত অস্থিযুক্ত মাছ।

দেশি কার্পের উদাহরণ :

১. রুই (Labeo rohita)	২. কাতলা (Catla catla)
৩. মুগেল (Cirrhinus mrigala)	৪. কালবাউশ (Labeo calbasu)
৫. বাটা (Labeo bata)	

রুই মাছের পাখনা :

রুই মাছের পায়ুর পিছনের অংশটি হলো লেজ। লেজের শেষ প্রান্তে রয়েছে হোমোসার্কাল ধরনের পুচ্ছ পাখনা। এ পাখনার সাহায্যেই রুইমাছ পানির মধ্যে চলাফেরা করে বলে পুচ্ছ পাখনাকে চলন অঙ্গ বলে।

পাখনাসমূহ (Fins) : মাছের চলনসঙ্গে পাখনা বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভেতরে অবস্থিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত সূক্ষ্ম শলাকার অঙ্গকঙ্কালকে পাখনা-রশ্মি (fin rays) বলে। রুই মাছে মোট পাঁচ ধরনের পাখনা দেখা যায়।

- পৃষ্ঠ পাখনায় (১টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৫-১৬টি
- শ্রোণি পাখনায় (২টি) পাখনারশ্মি থাকে → ৯টি
- পুচ্ছ পাখনায় (১টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৯টি
- বক্ষ পাখনায় (২টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৭-১৮টি (মজেনা)/১৬-১৭টি (অজল)
- পায়ু পাখনায় (১টি করে থাকে) পাখনারশ্মি থাকে → ৭টি/৬-৭টি (মজেনা)

রুই মাছের ধমনিতন্ত্র (Arterial system of Labeo) :

হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন যে বাহিকা দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত পরিবহণ করে তাদের ধমনি (artery) বলে। ধমনির সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে ধমনিতন্ত্র বলে।

ডর্সাল অ্যাওর্টা মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত। যাত্রাপথে এটি যেসব প্রধান নালিকা সৃষ্টি করে তারা হলো :

ধমনির নাম	যেখানে রক্ত সরবরাহ করে
১. সাবক্ল্যাভিয়ান	বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।
২. সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক	পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ইত্যাদি অঙ্গীয় অঙ্গাদিতে।
৩. প্যারাইটাল	দেহ প্রাচীরে।
৪. রেনাল	বৃক্কে।
৫. ইলিয়াক	শ্রোণি পাখনায়।
৬. কডাল	পুচ্ছে।

[Ref: অজল]

পট্টাচার্য্যের আবিষ্কার- অত্রাহাম ট্রেমলে

ইট্রের নামকরণ করেন- ক্যারোলাস লিনিয়াস

ইট্রের সর্বপ্রথম পুনরুৎপত্তি বর্ণনা করেন- অত্রাহাম ট্রেমলে

এর একটি হিসেবে আখ্যা দেন- ব্রায়েন

এই প্রজাতি দুটি পর্ব ছিট্রারী- নিডারিয়া এবং টিনোফোরা

এই প্রজাতি পলিপ বলা হয়- Hydra-কে

ইট্রার পলিপ কোষ বিদ্যমান- ৭ ধরনের

ইট্রার বহুতম কোষ- পেশি আবরণী কোষ

ইট্রার পলিপ কোষ বলা হয়- ইন্টারসিটিয়াল কোষ

কোন মতো যেকোনো কোষে পরিণত হয়- ইন্টারসিটিয়াল কোষ

ইট্রার মুক প্রান্ত থেকে বের হয়- মুখ সংবেদী রোম

ইট্রার মুক প্রান্ত-এর অন্য নাম- নিডা (cindi)

ইট্রার পলিপ বড় কাঁটা থাকে- ৩টি

ইট্রার প্রাণীর নিমিত- কাইটিন দ্বারা

ইট্রার পলিপ পাতাওয়া যায়- ৪ ধরনের

ইট্রার পলিপ পলিপ শনাক্ত করেছেন- ২৩ প্রকারের

ইট্রার পলিপ প্রাণী- হাইড্রা

ইট্রার পলিপ গঠিত হয়- দেহপ্রাচীর ও কেন্দ্রীয় সিলেন্টেরন দ্বারা

ইট্রার পলিপ ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস মাঝে বিদ্যমান- মেসোগ্রিয়া বা মেসোসোলা

ইট্রার পলিপ কোষগুলো এপিডার্মিসের কোষের- দ্বিগুণ লম্বা

ইট্রার পলিপ পদার্থ- মেসোগ্রিয়া

ইট্রার পলিপ ও এপিডার্মিসের ভিত্তি কিলি হিসেবে কাজ করে- মেসোগ্রিয়া

ইট্রার পলিপের পুরুত্ব- $0.1 \mu\text{m}/10^{-7}\text{m}$

ইট্রার পলিপের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বর- সিলেন্টেরন

ইট্রার পলিপ বাদ- ক্ষুদ্র ক্রান্তীয় সন্ধিপদী প্রাণী

ইট্রার পলিপ নোমোটিসিস- গুটিনাট, সিনোটিল

ইট্রার পলিপ অবশ্য করে- হিপনোটিক্স দ্বারা

ইট্রার পলিপ প্রাণী শিকার করে তাদের কলারসে বিদ্যমান- গুটিনাট

ইট্রার পলিপ ও সাধারণ চলন প্রক্রিয়া- সমারসলিং বা ডিগবাজি

ইট্রার পলিপ চলন- গ্লাইডিং/অ্যামিবয়েড চলন

ইট্রার পলিপ ও অবরোধ সম্পন্ন হয়- গ্লাইডিং বা অ্যামিবয়েড

ইট্রার পলিপের পলিপ ব্যবহার করে উল্টোভাবে ধীরে ধীরে চল- নতমুখী চলন

ইট্রার পলিপের প্রধানত যৌন জনন সম্পন্ন করে- শরৎকালে/শীতকালে

ইট্রার পলিপ হলেও ঘটে না- স্থানিষেক

ইট্রার পলিপ সাধারণত- মোচাকৃতি বা ত্রিকোণাকার

ইট্রার পলিপ কোষ কাজ করে- গুটিনাট মাটুকোষ-এর মতো

ইট্রার পলিপ হাইড্রার যে অংশে অবস্থান করে- গ্যাস্ট্রোডার্মিস

ইট্রার পলিপ স্ট সালোকসংশ্লেষণের কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়- CO_2

ইট্রার পলিপের কাজে উদ্ভূত হয়- নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য

ইট্রার পলিপ Life long paying guest বলা হয়- শৈবালকে

ইট্রার পলিপ-এর দেহ- বেলনাকার

ইট্রার পলিপ-এর বহিঃকক্ষাল থেকে নিঃসৃত হয়- Hypodermis

ইট্রার পলিপ তার দেহ বহুতম ও উপাদানকে সহজেই নাড়াচাড়া করে- সূচারের সাহায্যে

ইট্রার পলিপের পৃষ্ঠদেশীয় পর্দাকে বলে- টার্গাম বা টার্গাইট

ইট্রার পলিপ-এর মস্তক- ৬ খণ্ডবিশিষ্ট

ইট্রার পলিপ-এর বক্ষ- ৩ অংশে বিভক্ত

ইট্রার পলিপ-এর উদর- ১১টি খণ্ডকে বিভক্ত

ইট্রার পলিপ মস্তক দেখতে- নাশপাতি আকৃতির

ইট্রার পলিপ-এর বক্ষাঞ্চল বিভক্ত- ৩টি অংশে

ইট্রার পলিপ পর্দার নাম- প্রোনোটাম

- মধ্যবক্ষীয় ডান্না কক্ষদো উড়তে পারে না এবং পেছনের ডান্না দুটোকে ছেঁতে পারে।
- তাই এগুলোকে বলে- এলিট্রা বা টেগমিনা
- ঘাসফড়িংয়ের বক্ষীয় বহিঃকক্ষালের টার্মিসসমূহের সাধারণ নাম- মোটাম
- ঘাসফড়িং-এর পৌরিক তর বিভক্ত- ২ ভাগে
- স্টেরোমিডিয়াম অঙ্গআবরণ-এর নাম- কাইটিন
- মেসোস্টেরনের অঙ্গআবরণ-এর নাম- পেরিট্রিক পর্দা
- গিজার্ড ও মেসোস্টেরনের সংযুক্ত তুল্যকে বলে- কার্ডিয়া
- ঘাসফড়িং-এর বক্ত সংবহনতর- মুক্ত ধরনের
- ঘাসফড়িং-এর বক্ত সংবহনতর বিভক্ত- ৩টি অংশে
- ঘাসফড়িং-এর বক্ত গঠিত হয়- প্রাক্সমা ও হিমোসাইট
- ঘাসফড়িং-এর প্রাক্সমাত পানি থাকে- ৭০%
- ঘাসফড়িং-এর দেহের উভয় পাশে মোট শ্বাসরক্ত থাকে- ১০ জোড়া বা ২০টি
- ঘাসফড়িং-এ শ্বাসরক্ত পরিবেশিত থাকে- কাইটিন দ্বারা
- ঘাসফড়িং-এর বক্তগুলো গোলা বা বক হয়- কপাটিকা দ্বারা
- ঘাসফড়িং-এর দেহে বায়ু প্রবেশ করে- শ্বাসরক্ত দিয়ে
- ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গ- ম্যালপিজিয়ান নালিকা
- ঘাসফড়িং-এর রেচন অঙ্গ- মেফিডিয়াল ধরনের
- মোলিট বা খোলাস ত্যাগের সময় পরিত্যক্ত হয়- কিউটিকল
- ঘাসফড়িং-এর পুষ্টি সংখ্যা- প্রায় ২০০০
- ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়াম হিসেবে কাজ করে- দর্শন একক
- ঘাসফড়িং-এর দর্শনাস্ত হিসেবে উপস্থিতি থাকে- ওসেলি ও পুষ্টি
- দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবন্ধ গঠিত হয়- পুষ্টি দ্বারা
- ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর প্রধানত- ২ ধরনের
- মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর- সম্পূর্ণ রূপান্তর
- শিশু অবস্থায় প্রাণীকে বলে- Nymph
- ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর- অসম্পূর্ণ ধরনের
- রুই মাছ অতি পরিচিত- অস্থিময় মাছ হিসেবে
- কার্প জাতীয় মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- গলবিলীয় দাঁত থাকে
- কার্প জাতীয় মাছ- ৭০০-৮০০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়
- রুই মাছের দেহ- স্ট্রিমলাইনড
- পূর্ণাঙ্গ রুই মাছ লম্বা হয়- এক মিটার
- কানকোর নিচের কিনারায় একটি করে যুক্ত থাকে- ব্রাকিওস্টেগাল পর্দা
- রুই মাছের সংবেদী অঙ্গ- নিউরোমাস্ট বা পার্শ্বরেখা অঙ্গ
- রুই মাছের পাখনা আছে- ৫টি
- রুই মাছের রক্ত থাকে না- অণুচক্রিকা
- রুই মাছের রূপিণ্ডের অবস্থান- পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর
- রুই মাছের রূপিণ্ডের আবরণ- পেরিকার্ডিয়াম
- রুই মাছের রূপিণ্ডের উপ-প্রকোষ্ঠ- সাইনাস ভেনোসাস
- রুই মাছের প্রধান শ্বসন অঙ্গ- ৪ জোড়া/৮টি ফুলকা
- মাছের চোষণ পাম্পের মতো কাজ করে- গলবিল
- গলবিলের পার্শ্বপ্রাচীরে ফুলকা ছিদ্র থাকে- ৫ জোড়া
- গলবিলের প্রতিপার্শ্বে ফুলকা ছিদ্র আঠ থাকে- ৫টি
- রুই মাছের বায়ুথলিকে বলা হয়- ফাইসোসটোমাস
- বায়ুথলি দেখতে- চকচকে সাদা থলের মতো
- বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাসের অধিকাংশই- O_2
- রুই মাছ প্রজননের জন্য তৈরি হয়- জুন-জুলাই মাসে
- একলিঙ্গ প্রাণী- রুই মাছ
- রুই মাছের যৌন হস্তিকে উত্তেজিত করে- O_2
- রুই মাছের প্রজননকালীন আচরণকে- Spawning বলে
- রুই মাছের স্পিনিং ঘটে না- পুকুর, বিল, বন্ধ জলাশয়

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নিম্নের কোনটি স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ে অনুপস্থিত? [NU-Science : 13-14]
 (A) অ্যানাল স্টাইল (B) গোনাপোফাইসিস (C) জননছিদ্র (D) টারগাম (Ans A)
02. Hydra-এর কোন অংশে নেমাটোসিস্ট (Nematocyst) থাকে? [NU-Science : 13-14]
 (A) বহিঃত্বক (B) অন্তঃত্বক (C) মেসোগিয়া (D) গ্যাস্ট্রোডার্মিস (Ans A)
03. ঘাসফড়িংয়ের মিলেসিস কি দিয়ে পূর্ণ থাকে? [NU-Science : 11-12]
 (A) দেহরস (B) রক্ত (C) স্নেহদ্রব্য (D) কলারস (Ans B)
04. ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামের কিউটিকলের বাইরের স্চছ আবরণীকে কি বলে? [NU-Science : 10-11]
 (A) কর্নিয়াজেন স্তর (B) কর্নিয়া (C) রঞ্জক আবরণী (D) র্যাবডোম (Ans B)
05. ঘাসফড়িং-এর মস্তকটি দেহের সাথে কিভাবে অবস্থিত? [NU-Science : 07-08]
 (A) সরলকোণে (B) পুরক কোণে (C) সমকোণে (D) বৃত্তাকার কোণে (Ans C)
06. ঘাসফড়িং-এর পৃষ্ঠদেশীয় ক্রেরাইটকে কী বলে? [NU-Science : 06-07]
 (A) স্টার্নাম (B) টারগা (C) প্রিউরন (D) সুচার (Ans B)
07. কোন প্রাণীর নেমাটোসিস্ট আছে? [NU-Science : 03-04]
 (A) অ্যামিবা (B) হাইড্রা (C) কেঁচো (D) তেলাপোকা (Ans B)
08. অ্যালারিপেশি (alary muscle) কোন প্রাণীতে থাকে? [NU-Science : 01-02]
 (A) হাইড্রা (B) ঘাসফড়িং (C) কেঁচো (D) মানুষ (Ans B)

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর বৈশিষ্ট্য কোনটি? [GST-A : 23-24]
 (A) অ্যানাল সারকি থাকে (B) অপেক্ষাকৃত ছোট (C) ওভিপজিটর থাকে (D) সুপ্রাঅ্যানাল গ্রেট থাকে (Ans C)
02. উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় হাইড্রার উওসাইট মায়োসিস বিভাজনে কয়টি ডিম্বাণু তৈরি করে? [GST-A : 23-24]
 (A) একটি (B) দুইটি (C) তিনটি (D) চারটি (Ans A)
03. রুই মাছের কোথায় CO₂-যুক্ত রক্ত থাকে? [GST-A : 23-24]
 (A) হেপাটিক ধমনি (B) অন্তর্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনি (C) বহির্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনি (D) উর্সাল অ্যাওর্টা (Ans B)
04. ঘাসফড়িং-এর শবণথলি কী দিয়ে আবৃত থাকে? [GST-A : 22-23]
 (A) টারগাম (B) স্টার্নাম (C) প্রিউরন (D) টিমপেনাম (Ans D)
05. রুই মাছের পটকা ও অন্নালি সংযুক্ত হয় কোনটির মাধ্যমে? [GST-A : 22-23]
 (A) ফুলকা র্যাকার (B) ফুলকা সূত্র (C) নিউম্যাটিক নালি (D) ডেমিব্রান্স (Ans C)
06. হাইড্রার হিপনোটিক্সিন কী দিয়ে তৈরি? [GST-A : 22-23]
 (A) প্রোটিন ও কপার (B) প্রোটিন ও ফেনল (C) ট্রিপসিন ও ফেনল (D) অ্যামিনো ট্রিপসিন ও কপার (Ans B)
07. কংগোবেট গ্রন্থি কার আছে? [GST-A : 21-22]
 (A) ব্যাঙ (B) হাইড্রা (C) অক্টোপাস (D) তেলাপোকা (Ans D)
08. মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাবেলায় একটি ঘাসফড়িং তার পুঞ্জাক্ষীতে কোন ধরনের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে? [GST-A : 21-22]
 (A) মোজাইক (B) সুপারপজিশন (C) সরল (D) জটিল (Ans B)
09. কোনটি মিথোজীবীর ক্ষেত্রে সত্য? [GST-A : 20-21]
 (A) একজন উপকৃত (B) উভয়েই উপকৃত (C) উভয়েই অপকৃত (D) একজন অপকৃত (Ans B)
10. ঘাসফড়িং-এর মস্তকের পৃষ্ঠদেশে ত্রিকোণাকার অংশটির নাম কী? [CoU-A : 19-20]
 (A) ভার্টিব্র (B) ফ্রন্স (C) জেনা (D) ক্রাইপিয়াস (Ans A)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. কোন প্রাণীর স্বাভাবিক মৃত্যু নেই?
 (A) শামুক (B) হাইড্রা (C) জোঁক (D) স্টার ফিশ (Ans B)
02. ঘাসফড়িং-এর দৈহিক বৃদ্ধির জন্য বারবার খোলস বদলানোর প্রক্রিয়ার নাম—
 (A) একডাইসিস (B) ইনস্টার (C) সোলিং (D) মেটামরফোসিস (Ans A)
03. বাংলাদেশের কোন নদীতে রুইমাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হয়?
 (A) বুড়িগঙ্গা (B) সুরমা (C) হালদা (D) যমুনা (Ans C)

04. মাছ পানির নিচে শ্বাস নিতে তার শরীরের কোন অংশ ব্যবহার করে?

- (A) মাছের ফুলকা (B) মাছের পাখনা
 (C) মাছের ফুসফুস (D) মাছের হৃৎপিণ্ড (Ans A)

05. কোন অবস্থায় হাইড্রা সিস্ট তৈরি করে?

- (A) প্রতিকূল পরিবেশে (B) অযৌন প্রজননের সময়
 (C) যৌন প্রজননের সময় (D) জগ পরিস্ফুটন কালে (Ans D)

06. কোন প্রাণীতে মিথোজীবিতা (symbiosis) পরিলক্ষিত হয়—

- (A) ব্যাঙ (B) ঘাস ফড়িং (C) হাইড্রা (D) কেঁচো (Ans C)

07. প্রজনন ঋতুতে মাছের ডিম পাড়াকে বলা হয়?

- (A) অ্যাটারেশিয়া (B) ডিমারসল (C) স্পিনিং (D) ফিসারলিং (Ans C)

08. হিপনোটিক্সিনে কোন ধরনের পদার্থ থাকে?

- (A) অম্ল ও ফেনল (B) শর্করা
 (C) ভিটামিন বি এবং এ (D) চর্বি (Ans A)

09. হাইড্রার দ্রুত চলন পদ্ধতিকে কী বলা হয়?

- (A) লুপিং (B) সমারসলিং (C) অ্যামিবয়েড (D) ফ্লোটিং (Ans B)

10. ঘাসফড়িং-এর মুখোপাসের অংশ নয় কোনটি?

- (A) Labrum (B) Clypeus (C) Lacinia (D) Cardo (Ans B)

11. হাইড্রার ক্ষেত্রে পরিবেশ থেকে উদ্ভীপনা গ্রহণ করে কোন কোষ?

- (A) ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (B) স্নায়ু কোষ
 (C) সংবেদী কোষ (D) গ্রন্থি কোষ (Ans C)

12. মিথোজীবিতার উদাহরণ কোনটি?

- (A) সবুজ হাইড্রা ও জুওকোরেলো (B) হাইড্রা ও ছত্রাক
 (C) মশা ও মানুষ (D) সবগুলো (Ans A)

13. আর্থ্রোপোডার দেহ গহ্বরকে কী বলা হয়?

- (A) সিলোম (B) হিমোসিল (C) গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার (D) অন্নালি (Ans B)

14. রুই মাছে লার্ভা দশায় কতক্ষণ পর ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়?

- (A) ৬ ঘণ্টা (B) ৯ ঘণ্টা (C) ২৪ ঘণ্টা (D) ৪৮ ঘণ্টা (Ans C)

15. Hydra-র গ্যাস্ট্রোডার্মিসে কোন কোষটি দেখা যায় না?

- (A) Sensory Cell (B) Interstitial Cell
 (C) Germ Cell (D) Gland Cell (Ans C)

16. ঘাসফড়িং-এর ম্যালপিজিয়ান নালিকা কোথায় বিস্তৃত থাকে?

- (A) হিমোসিলে (B) ট্রাকিয়াতে (C) ইউটেরাসে (D) নিডোসিলে (Ans A)

17. ঘাসফড়িং-এর ল্যাব্রাম মানুষের কোন অংশের সমতুল্য?

- (A) মুখ (B) জিহ্বা (C) উপরের ঠোঁট (D) নিচের ঠোঁট (Ans C)

18. রুই মাছের অন্তর্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনি বাহিত রক্তে সমৃদ্ধ থাকে—

- (A) অক্সিজেন (B) কার্বন ডাইঅক্সাইড
 (C) কার্বন মনোক্সাইড (D) লিম্ফোটিক ফ্লুইডে (Ans B)

19. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের নাম কী?

- (A) ধমনি হৃৎপিণ্ড (B) ফুলকা হৃৎপিণ্ড (C) শিরা হৃৎপিণ্ড (D) হিমোসিল (Ans C)

20. কোন ঋতুতে Hydra-এর যৌন প্রজনন ঘটে?

- (A) শীত (B) বসন্ত (C) গ্রীষ্ম (D) বর্ষা (Ans A)

21. হিমোসিলের হিমোলিম্ফের আন্দোলনের দ্বারা ম্যালপিজিয়ান নালিকা ঘাসফড়িং এর কোন কাজটি করে থাকে?

- (A) রক্ত সংবহন (B) শ্বাসন (C) রেচন (D) বিপাক (Ans C)

22. উজ্জ্বল আলোয় পুঞ্জাক্ষি কী ধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে?

- (A) বাইনোকুলার প্রতিবিম্ব (B) সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব
 (C) অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (D) মনোকুলার প্রতিবিম্ব (Ans C)

23. রুই মাছের শবণ অঙ্গের অংশ কোনটি?

- (A) কানকো (B) বারবেল (C) বায়ুথলি বা পটকা (D) ফুলকা ছিদ্র (Ans C)

24. রুই মাছে কত জোড়া ফুলকা আছে?

- (A) ৩ (B) ৪ (C) ৫ (D) ৬ (Ans B)

25. কোনটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী?

- (A) কেঁচো (B) হাইড্রা (C) মাছ (D) ব্যাঙ (Ans B)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

6. *musculus* 1 day

- | ক্রমিক | বিজ্ঞানসম্মত (2018) | মানুষের শ্রেণি |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 18.5-24.9 kg/m ² | সর্বাধিক ওজন কম |
| 2 | 25.0-29.9 kg/m ² | সামান্যিক ওজন |
| 3 | 30.0-34.9 kg/m ² | অতিরিক্ত ওজন |
| 4 | 35.0-39.9 kg/m ² | বৃহত্তর 1ম স্তর |
| 5 | 40.0-44.9 kg/m ² | বৃহত্তর 2য় স্তর |
| 6 | 45.0-49.9 kg/m ² | বৃহত্তর 3য় স্তর |

Part 2

At a glance

- মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের সময়- ৫-৩০ সেকেন্ড
- পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাকের সময়- ২-৬ ঘণ্টা
- বৃহদন্ত্রে খাদ্য পরিপাকের সময়- ১.৫-২ ঘণ্টা
- খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হতে সময় লাগে- ২৪-৭২ ঘণ্টা
- শর্করা জাতীয় খাবার পরিপাক হতে সময় লাগে- ২ ঘণ্টা
- সমগ্র পৌষ্টিক নালির দৈর্ঘ্য- ৮-১০ মিটার বা ২৯ ফুট
- প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দাঁতের সংখ্যা- ৩২ টি
- ১৮-২৪ বছরের মধ্যে মানুষের সর্বমোট দাঁত পরিলক্ষিত হয়- ৩২ টি
- মানুষের দাঁত দু'বার ওঠাকে বলে- ডাইফায়াডন্ট
- মানুষের ৪ প্রকার দাঁত থাকাকে বলে- হেটারোডন্ট
- ছায়ী দাঁত প্রতিস্থাপিত হয়- ৮-১০ বছরের মধ্যে
- লাল মিশ্রিত পিণ্ডাকৃতির খাদ্যকে বলে- খাদ্যমণ্ড বা বোলাস
- লালারস দ্বারা পরিপাক হয় না- আমিষ ও স্নেহজাতীয়
- টায়ালিন এনজাইমের অপর নাম- Salivary- α -Amylase
- টায়ালিন কার্যকরী হয়- সিদ্ধ খেতসার-এর ওপর
- মানুষের খাদ্য পরিপাক শুরু হয়- পাকস্থলিতে
- টায়ালিন-এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়- পাকস্থলিতে
- সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর পাকস্থলির ধারণক্ষমতা- ৩০ মি.লি.
- প্রাপ্তবয়স্কের পাকস্থলির ধারণক্ষমতা- ১.৫-২ লিটার
- পাকস্থলির অবস্থান- ডায়াফ্রামের নিচে উদরের ওপর
- ক্ষুদ্রান্ত্র ৩টি অংশে বিভক্ত- ডিওডেনাম, জেজুনা, ইলিয়াম
- ডিওডেনাম দেখতে- U আকৃতির
- ক্ষুদ্রান্ত্রের মোট দৈর্ঘ্যের তিন পঞ্চমাংশ- ইলিয়াম
- সাব মিউকোসাতে থাকে- যোজক কলা, রক্তনালি ও শ্নায়ু
- ভিলাই নামক অভিক্ষেপ থাকে- মিউকোসাতে
- কোনো পাচক রস না থাকায় খাদ্য পরিপাক হয় না- বৃহদন্ত্রে
- উপকারী জীবাণুর ভান্ডার বলা হয়- অ্যাপেনডিক্সকে
- মলাশয়/রেকটাম এর দৈর্ঘ্য- ১২ বা ১৩ সেন্টিমিটার
- মানবদেহের পৌষ্টিকগ্রন্থি- ৫ ধরনের
- পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত- গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
- অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থিত- আক্ট্রিক গ্রন্থি
- মানুষের মুখগহ্বরের দু'পাশে বিদ্যমান- ৩ জোড়া লালগ্রন্থি
- একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক লালার ক্ষরণ করে- ১২০০-১৫০০ মি.লি.
- লালার কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইম থাকে- টায়ালিন ও মল্টেজ
- লালার নিঃসরণ কমে যাওয়ায় বলে- ডিসজিউসিয়া
- ভয় ও অসুখের ফলে লালার ক্ষরণ কমে যাওয়ায় বলে- জেরোস্টোমিয়া (Xerostomia)
- প্যারোটাইড গ্রন্থিতে ভাইরাসের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলে- মাস্পস
- মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি- যকৃৎ
- যকৃৎ গঠিত- ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে
- ডান খণ্ডটি বাম খণ্ডের চেয়ে- ৬ গুণ বড়
- যকৃৎ ডান লোব এবং বাম লোবে বিভক্ত হয়- ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট দ্বারা
- অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি যাঁ- মরিচ আকৃতির
- অগ্ন্যাশয়ের তিনটি অংশ হলো- মস্তক, দেহ ও লেজ
- রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে- গ্লুকাগন
- রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়- ইনসুলিন
- পিত্তথলি যুক্ত থাকে- যকৃৎের ডান খণ্ডের নিচে

- পিত্তথলি হচ্ছে- নাশপাতি আকৃতির
- পিত্তথলির ক্ষরণকে বলা হয়- পিত্তরস
- পিত্তথলি থাকে না- ঘোড়া, কুকুর, ইঁদুর এবং হরিণ-এ
- গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো থেকে প্রতিদিন গ্যাস্ট্রিকজুস ক্ষরিত হয়- ২ লিটার (প্রায়)
- গ্যাস্ট্রিক রসের pH- 0.9-1.5
- গ্যাস্ট্রিক রসে অজৈব পদার্থ- ০.১৫%
- দুগ্ধ প্রোটিন কেসিনকে প্যারাকেসিন এ পরিণত করে- গ্যাস্ট্রিক রসের রেনিন এনজাইম
- পাকস্থলির প্রাচীরে মিউকোসা স্তরে গ্যাস্ট্রিক পিট থাকে- ৩.৫ মিলিয়ন
- গ্যাস্ট্রিন হরমোন ক্ষরণ করে- G-cell
- আক্ট্রিক গ্রন্থিসমূহ হচ্ছে- শোষণক্ষম কোষ
- আক্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে বলে- আক্ট্রিকরস বা সাক্রাস ইন্টেরিকাস
- প্রতিদিন আক্ট্রিক গ্রন্থি থেকে ক্ষরণের পরিমাণ- ১-২ লিটার
- খাদ্য ও পানি দ্রুত প্রবাহিত হতে সাহায্য করে- অ্যাসিটাইলকোলিন
- পাকস্থলি ও অন্ত্রের পেশি শিথিল করে- অ্যাক্সেট্রোপিক হরমোন
- গ্যাস্ট্রিন হরমোনের উৎস- পাকস্থলির G-কোষ
- সিক্রেটিন হরমোনের উৎস- ডিওডেনামের S-কোষ
- কোলেসিস্টোকাইনিন-এর উৎস- ডিওডেনামের I-কোষ
- পাকস্থলির প্রাচীরে খাদ্যসার শোষণ খুব কম ঘটে- ভিলাই না থাকায়
- প্রধানত পানি শোষণ ঘটে- ক্ষুদ্রান্ত্রে
- ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম প্রধানত যুক্ত থাকে- ক্ষরণ কাজের সাথে
- জেজুনা ও ইলিয়াম সম্পৃক্ত থাকে- শোষণ কাজের সাথে
- দেহের মোট ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায়- Body Mass Index (BMI)
- BMI-এর একক হলো- কিলোগ্রাম/বর্গমিটার (Kg/m^2)
- নারীদের স্থূলতা দেখা দিতে পারে- পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম-এর ফলে
- দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ করে- লেপটিন

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. নিম্নের কোনটি অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত পাচক রস নয়? [NU-Science : 13-14]
 A পেপসিনোজেন B ট্রিপসিনোজেন C অ্যামাইলেজ D লাইপেজ **Ans A**
০২. মানুষের রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ কোন রোগের জন্য হয়? [NU-Science : 12-13]
 A Diabetes B Cancer C Asthma D Liver cirrhosis **Ans A**
০৩. মানবদেহের কোন অঙ্গ গ্রাইকোজেন জমা করতে পারে? [NU-Science : 10-11]
 A পিত্তথলি B অগ্ন্যাশয় C যকৃৎ D হাড় **Ans C**
০৪. কোনটি শোষণতল বৃদ্ধি করে? [NU-Science : 09-10]
 A সেরোসা B সিলিয়া C ইনটেসটিনাল ভিলাই D গ্যাস্ট্রিক গ্রান্ড **Ans C**
০৫. খাদ্য পরিপাকের জন্য প্রয়োজন? [NU-Science : 05-06]
 A এনজাইম B হরমোন C পানি D অক্সিজেন **Ans A**
০৬. মানবদেহে সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি? [NU-Science : 05-06]
 A যকৃৎ B অগ্ন্যাশয় C থাইরয়েড গ্রন্থি D প্যারোটাইড গ্রন্থি **Ans A**
০৭. মানবদেহে যে অঙ্গ থেকে ইনসুলিন নির্গত হয় তা হলো- [NU-Science : 04-05]
 A কিডনি B প্যানক্রিয়াস C লিভার D বৃহদন্ত্র **Ans B**
০৮. স্তন্যপায়ী প্রাণীতে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী উৎসেচকের নাম- [NU-Science : 01-02]
 A অ্যামাইলেজ B লাইপেজ C ম্যালটেজ D ল্যাকটেজ **Ans B**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

04. মানব শরীরের সবচেয়ে বড় গ্রন্থির নাম কী?
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয় (C) পাইরোসেড (D) পিটুইটারি (Ans) A

05. ইনসুলিন নিঃসরণকারী গ্রন্থির নাম হলো—
 (A) যকৃৎ (B) যুসুস
 (C) গ্রীহা (D) অডিটোরি অর ল্যাংগারহ্যান্স (Ans) D

06. অক্সিক ল্যাকটোজ এনজাইম ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ কী উপর করে?
 (A) গ্লুকোজ (B) অ্যানিমো অ্যানিড
 (C) অ্যানোনিয়া (D) যুসুস (Ans) D

07. ১.৬ মিটার উচ্চতা ও ৭৪ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির BMI কত?
 (A) ৯ (B) ১৯ (C) ২৯ (D) ৩৯ (Ans) C

08. প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত প্রতি ১৪.৬ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে কত গ্রাম চর্বি জমা হয়?
 (A) 1g (B) 2g (C) 3g (D) 4g (Ans) B

09. দুধের অমিনকে কী বলা হয়?
 (A) ফুস্টোজ (B) ভাইটেলিন (C) ল্যাক্টোজ (D) কেসিন (Ans) D

10. কোন এনজাইম প্রোটিন বিয়োজ করে?
 (A) টায়ালিন (B) অ্যানাইসেজ (C) এস্টারেজ (D) কেসিন (Ans) D

11. যকৃতের ওজন মানব দেহের কত ভাগ?
 (A) 1-3% (B) 3-5% (C) ৪-৬% (D) ৪% (Ans) B

12. পিত্তরসের জন্য কোনটি সত্য?
 (A) এনজাইম থাকে না (B) হরমোন থাকে
 (C) এটি ট্রিপসিন এর অংশ (D) অমিন পরিপাক করে (Ans) A

13. অগ্ন্যাশয় রসে কোন হরমোনটি অনুপস্থিত?
 (A) কাইমোট্রিপসিন (B) পাইপেজ
 (C) অ্যানাইসেজ (D) নিউক্লিওটাইডেজ (Ans) D

14. লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে কী কী থাকে?
 (A) পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন (B) টায়ালিন ও মল্টেজ
 (C) পেপসিন ও রেনিন (D) রেনিন ও মল্টেজ (Ans) B

15. মানুষের পরিপাক নালিতে নিঃসৃত সিক্রেটিন হলো—
 (A) হরমোন (B) এনজাইম (C) অ্যানিড (D) পিটুইটারি (Ans) A

16. কোন প্রাণীতে পিত্তাশয় অনুপস্থিত?
 (A) গরু (B) গোড়া (C) বাঘ (D) ভেড়া (Ans) B

17. নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থি?
 (A) লালগ্রন্থি (B) অ্যান্ড্রিনাল গ্রন্থি
 (C) অগ্ন্যাশয় (D) পিটুইটারি (Ans) C

18. Bile salt (পিত্ত লবণ) কোনটি?
 (A) সোডিয়াম প্রাইকোকোসলেট (B) সোডিয়াম টারটারেট
 (C) মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (D) মনোসোডিয়াম টারটারেট (Ans) A

19. কোনটিকে গ্রন্থি বললে ভুল হবে?

20. নিচের কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয়?
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয় (C) হৃৎপিণ্ড (D) ফুফুস (Ans: A)

21. নিচের কোনটি পিত্ত লবণ?
 (A) সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (B) সোডিয়াম কার্বনেট
 (C) সোডিয়াম সালাফেট (D) সোডিয়াম বাইকার্বনেট (Ans: A)

22. মানুষের কানের নিচে অবস্থিত লালাগ্রন্থি কোনটি?
 (A) প্যালাটিন টনসিল (B) সার্বপল্লবগ্রন্থি
 (C) প্যারোটাইড গ্রন্থি (D) সাবম্যাক্সিলার গ্রন্থি (Ans: C)

Part 2

At a glance

■ মুখগণ্ঠের খাদ্য পরিপাকের সময়- ৫-৩০ সেকেন্ড

■ পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাকের সময়- ২-৬ ঘণ্টা

■ বৃহদন্ত্রে খাদ্য পরিপাকের সময়- ১.৫-২ ঘণ্টা

■ খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হতে সময় লাগে- ২৫

■ শর্করা জাতীয় খাবার পরিপাক হতে সময়

■ সমগ্র পৌষ্টিক নালির দৈর্ঘ্য- ৮-১০

■ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দাঁতের

■ ১৮-২৪ বছরের মধ্যে

■ মানুষের দাঁত

■ মানুষের

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

■ হৃদয়

শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সংকলন

৩. অ্যাওটিক কপাটিকা :

অবস্থান : বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওটার সংযোগস্থলে।

কাজ : বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওটার রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

৪. থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা :

অবস্থান : করোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।

কাজ : করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

৫. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা :

অবস্থান : ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।

কাজ : ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

হাইপারটেনশনজনিত জটিলতা :

হৃৎপিণ্ডের জটিলতা	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা
• অ্যানজাইনা পেকটোরিস। • হার্ট ফেইলিউর ইনফার্কশন। • আনস্ট্যাবল অ্যানজাইনা। • হার্ট অ্যাটাক এবং মায়োকার্ডিয়াল।	• স্ট্রোক। • হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি। • সাব অ্যারাকনয়েড হিমোরেজ।

মানবদেহের শিরাতন্ত্র :

মানবদেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট-বড় সকল শিরার সমন্বয়ে গঠিত জটিল তন্ত্রকে শিরাতন্ত্র বলে। মানুষের শিরাতন্ত্রকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) পালমোনারি শিরাতন্ত্র, (খ) সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (গ) হেপাটিক পোর্টাল শিরাতন্ত্র।

৬. ধমনি ও শিরার উৎপত্তিস্থল/সমাগ্ধস্থল :

- পালমোনারি ধমনির উৎপত্তিস্থল → হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয়
- পালমোনারি শিরার উৎপত্তিস্থল → ফুসফুস
- ধমনির সমাগ্ধস্থল → কৈশিক জালিকা
- শিরার সমাগ্ধস্থল → হৃৎপিণ্ড
- ধমনির উৎপত্তিস্থল → হৃৎপিণ্ড
- শিরার উৎপত্তিস্থল → কৈশিক নালি
- ফুসফুসীয় শিরার সমাগ্ধস্থল → বাম অলিন্দ
- মানুষের অ্যাওটার উৎপত্তিস্থল → বাম নিলয়

৭. পেসমেকার (Pacemaker) :

মানুষের হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে অবস্থিত SAN বা সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node) প্রাকৃতিক পেসমেকার হিসেবে কাজ করে যাকে প্রাথমিক পেসমেকার (Primary Pacemaker) বলে।

৮. পেসমেকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য :

- হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম প্রাচীরের ওপর দিকে অবস্থিত এবং কার্ডিয়াক পেশিগুচ্চে গঠিত।
- পেসমেকার দু'ধরনের :
i. প্রাকৃতিক পেসমেকার (সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড)
ii. যান্ত্রিক পেসমেকার (একটি লিথিয়াম ব্যাটারী, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর এবং সেন্সরযুক্ত কতগুলো তার)
• সেন্সরগুলোকে ইলেকট্রোড বলে। পেসমেকারের তারকে লিড (Lead) বলে।
• পেসমেকার স্থাপন করতে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগে।
- ৯. পেসমেকারের সুবিধা : এটি বিপদজনক হার্টবিট Long QT Syndrome (LQTS) নিয়ন্ত্রণ করে।

রক্তকণিকা (Blood corpuscles) :

রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলে। এগুলো হেমাটোপোয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। রক্তকণিকা তিন ধরনের। যথা : (ক) এরিত্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা (খ) লিম্ফোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা (গ) থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা।

১০. মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে) : পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ।

আয়ুষ্কাল : ১২০ দিন (৪ মাস)।

উৎসস্থল : অণুবাহ্য যকৃৎ, প্রীহা ও থাইমাস এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জার হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক কোষ থেকে।

কাজ : ১. O_2 ও CO_2 বহন করে। ২. অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।

৩. রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা রক্ষা করে। ৪. বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদন করে।

৫. রক্ত ফ্রিপিংয়ের জন্য দায়ী।

১১. মানবদেহে শ্বেত রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে)	উৎসস্থল	আয়ুষ্কাল
নিউট্রোফিল	৩-৫ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা।	২-৫ দিন
ইওসিনোফিল	১৫০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা।	৮-১২ দিন
বেসোফিল	২৫-২০০	লাল অস্থিমজ্জা।	১২-১৫ দিন
লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	প্রীহা, যকৃৎ, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	১০০-১২০ দিন
মনোসাইট	৩০০-৮০০	যকৃৎ, প্রীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	২-৫ দিন

১২. শ্বেত রক্তকণিকার কাজ :

১. লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট উভয়ই প্রাজমা প্রোটিন থেকে ট্রিফেন নামক কলাকোষের পুষ্টিকারক পদার্থ ক্ষরণ করে।

২. ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নিঃসরণ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

১৩. মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ :

১. বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা দ্বিপত্রী কপাটিকা :

অবস্থান : বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।

কাজ : বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্রী কপাটিকা :

অবস্থান : ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।

কাজ : ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. লোহিত কণিকার আয়ু কত দিন? [NU-Science : 14-15]
 A 120 B 60 C 30 D 15 **Ans A**
02. নিউক্লিয়াস থাকে না কোনটিতে? [NU-Science : 11-12]
 A WBC B কন্যাপায়ীর RBC C মায়ুকোষ D পেশিকোষ **Ans B**
03. রক্ত কি ধরনের কলা? [NU-Science : 05-06]
 A তরল যোজক কলা B আবরণী কলা
 C পেশি কলা D মায়া কলা **Ans A**

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় কোন পরীক্ষার মাধ্যমে? [GST-A : 23-24]
 A ট্রোপোনিন-১ B ইসিজি C ইটিটি D এমআরআই **Ans D**
02. কোনটি রক্তনাশির সংকোচন ঘটাবে রক্তপাত হ্রাস করে? [GST-A : 23-24]
 A হিস্টামিন B সেরোটেনিন C প্রোথ্রোম্বাস্টিন D হেপারিন **Ans B**
03. ব্যারোরিসেন্টর কী? [GST-A : 23-24]
 A জাঙ্কট-গ্লোমেরুলার কোষ B স্নায়ুক্রিয় স্নায়ু প্রান্ত
 C প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু D সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত **Ans D**
04. কোন কোষ হতে হিস্টামিন ক্ষরণ হয়? [GST-A : 23-24]
 A মনোসাইট B নিউট্রোফিল
 C লিম্ফোসাইট D বেসোফিল **Ans D**
05. রক্তকণিকা রঞ্জিতকরণে ব্যবহৃত হয় — [GST-A : 22-23]
 A Crystal violet B Methylene blue
 C Safranin D Leishman **Ans D**
06. কোন ধরনের রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করে? [GST-A : 20-21]
 A নিউট্রোফিল B বেসোফিল
 C ইয়োসিনোফিল D লিম্ফোসাইট **Ans D**
07. রক্তের (প্রাথমিক) পানির পরিমাণ শতকরা কত? [KU-A : 19-20]
 A 50-60 B 65-70 C 75-80 D 90-92 **Ans D**
08. ওপেন হার্ট সার্জারি কত প্রকারে করা যায়? [CoU-A : 19-20]
 A ৩ প্রকারে B ৪ প্রকারে C ৫ প্রকারে D ৬ প্রকারে **Ans A**
09. রক্তের pH 6.90 এর অবস্থাকে বলে— [IU-D : 19-20]
 A অ্যাকালোসিস B অ্যাসিডোসিস
 C হাইড্রোসিস D অ্যালকালিমিয়া **Ans B**
10. হৃদচক্রের অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল স্থায়ী হয়— [IU-D : 19-20]
 A 0.05 sec B 0.01 sec C 0.1 sec D 0.7 sec **Ans C**
11. মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণকাল— [IU-D : 19-20]
 A 5-7 মিনিট B 12-14 মিনিট
 C 4-5 মিনিট D 25-27 মিনিট **Ans C**
12. কোনটি রক্ত আমিশ নয়? [SUST-A : 19-20]
 A ফাইব্রিনোজেন B প্রোথ্রমিন C অ্যালবুমিন
 D প্রোবিউলিন E অ্যাথ্রুটিন **Ans F**
13. নিম্নের কোন অঙ্গে লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়? [HSTU-A : 19-20]
 A ফুসফুস B যকৃৎ C পাকস্থলি D বৃক্ক **Ans B**
14. লোহিত কণিকার আয়ু কত দিন? [HSTU-A : 19-20]
 A ৫০ দিন B ৭০ দিন C ৯০ দিন D ১২০ দিন **Ans D**

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. রক্ত জমাট বাঁধতে কোনটি সহায়তা করে?
 A K^+ B Mg^{2+} C Ca^{2+} D Na^+ **Ans C**
02. মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কোনটি?
 A লিম্ফোসাইট B নিউট্রোফিল
 C ইওসিনোফিল D বেসোফিল **Ans A**

03. নিচের কোনটি বিলিরুবিন তৈরি করে?
 A লোহিত রক্ত কণিকা B অণুচক্রিকা
 C শ্বেত রক্ত কণিকা D প্রাজমা **Ans A**
04. রক্ত জমাট বাঁধার জন্য কোনটির প্রয়োজন হয় না?
 A প্রাটিনেট B প্রোথ্রমিন C ফিব্রিনোজেন D হরমোন **Ans D**
05. কৃত্রিম পেসমেকারের ব্যাটারি কিসের তৈরি?
 A ক্যাডমিয়াম B লিথিয়াম C অ্যালুমিনিয়াম D ইউরেনিয়াম **Ans B**
06. করোনারি ধমনি কোথায় রক্ত সরবরাহ করে?
 A মাথায় B হৃৎপিণ্ডে C জননাস্থে D যকৃতে **Ans B**
07. নিচের কোনটি তৈরির প্রক্রিয়াকে এরিথ্রোপোয়েসিস বলে?
 A লোহিত রক্ত কণিকা B প্রাজমা
 C শ্বেত রক্ত কণিকা D অণুচক্রিকা **Ans A**
08. কোন অঙ্গের শিরায় সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন থাকে?
 A মস্তিষ্ক B হৃৎপিণ্ড C বৃক্ক D ফুসফুস **Ans D**
09. কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে কোনটি?
 A পোর্টাল ধমনি B পালমোনারি
 C হেপাটিক ধমনি D রেনাল ধমনি **Ans B**
10. অনুচক্রিকার কাজ নয়—
 A হিমোস্ট্যাটিক প্রাপ্ত তৈরি B এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন
 C হেপারিন উৎপন্ন করা D সেরোটেনিন উৎপন্ন করা **Ans C**
11. কোনটি এনজিওপ্রাস্টিন প্রকারভেদ নয়?
 A করোনারি স্টেনটিং B অ্যাথেরেকটমি
 C বেলুন এনজিওপ্রাস্টিন D করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং **Ans D**
12. কন্যাপায়ীর নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ কোনটি?
 A নিউরন B লোহিত রক্তকণিকা
 C পেশি কোষ D শ্বেত রক্তকণিকা **Ans B**
13. নিচের কোনটি মানবদেহের Natural pacemaker নামে পরিচিত?
 A Sino-Atrial Node B Atrio-Ventricular Node
 C Purkinje Fibre D Bundle of HIS **Ans A**
14. মানুষের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকার অনুপাত কত?
 A ৮০০ : ১ B ৫০০ : ১ C ১ : ৫০০ D ১ : ৬০০ **Ans D**
15. রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
 A ডান অলিন্দ → ডান নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ
 B বাম অলিন্দ → বাম নিলয় → ফুসফুস → সারাদেহ
 C ডান নিলয় → সারাদেহ → ডান অলিন্দ → ফুসফুস
 D বাম নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ → সারাদেহ **Ans A**
16. প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তে সাধারণত কত গ্রাম লৌহ থাকে?
 A ২ B ৩ C ৪ D ৫ **Ans A**
17. বসা অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্পন্দন চাপ কত?
 A 15-25 mm Hg B 30-40 mm Hg
 C 50-60 mm Hg D 65-75 mm Hg **Ans B**
18. হৃৎচক্রের গড় সময়কাল কত সেকেন্ড?
 A 0.7 B 0.1 C 0.8 D 0.3 **Ans C**
19. হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দের সাথে নিচের কোনটি যুক্ত থাকে?
 A সিস্টেমিক মহাধমনি B পালমোনারি ধমনি
 C পালমোনারি শিরা D উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা **Ans D**
20. প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকা পানিতে ডুবেলে কী হয়?
 A স্বাভাবিক থাকে B সংকুচিত হয়
 C স্ফীত হয়ে ফেটে যায় D সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় **Ans C**
21. মানবদেহের সকল শিরা হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে?
 A বাম অলিন্দ B বাম নিলয়
 C ডান নিলয় D ডান অলিন্দ **Ans D**

মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া

Part 1

উন্নতত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System of Human) :

জীবের যে তন্ত্র দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিময় প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাকে শ্বসনতন্ত্র বলে। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের O_2 দেহে প্রবেশ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা : বায়ুগ্রহণ ও বায়ুত্যাগ অঞ্চল, বায়ু পরিবহণ অঞ্চল ও শ্বসন অঞ্চল।

৬. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ :

উর্ধ্ব শ্বসননালি (বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল) :

১. নাসিকা (nostril), ২. নাসা গলকিল (nasopharynx), ৩. স্বরযন্ত্র (larynx)।

নিম্ন শ্বসননালি (বায়ু পরিবহণ অঞ্চল) :

৪. শ্বাসনালি (trachea)

৫. ব্রঙ্কি (bronchi)

৬. প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল (terminal bronchioles)

ফুসফুস (শ্বসন অঞ্চল) :

৭. শ্বসন ব্রঙ্কিওল (respiratory bronchioles)

৮. অট্রিয়াম (atrium)

৯. অ্যালভিওলাস (alveolus)

১০. অ্যালভিওলার নালি (alveolar duct)

১১. অ্যালভিওলার থলি (alveolar sac)

১২. বায়ু বিভাগ ও বায়ুর পরিমাণ নিচে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

বায়ু বিভাগ	বায়ুর পরিমাণ
১. টাইডাল ভলিউম (tidal volume) বা বায়ু মাত্র	500 মিলিলিটার।
২. রেসিডুয়াল ভলিউম (residual volume) বা অবশিষ্ট ঘনমান বায়ু	1500 মিলিলিটার।
৩. ভাইটাল ক্যাপাসিটি (vital capacity) বা বায়ু ধারণক্ষমতা	4500 মিলিলিটার।
৪. দৌড়বিদদের বায়ু ধারণক্ষমতা	6000 মিলিলিটার।
৫. শ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু	2-3.3 লিটার।
৬. শ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু	1 লিটার।

১৩. শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেট (Respiration Quotient or RQ) :

শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেট বলে।

৬. বিভিন্ন বয়সের মানুষের শ্বসন হার :

বয়স (বছর)	প্রতি মিনিটে শ্বসন হার
১ম বছর	১৪ - ৬০ বার।
২ - ৪ বছর	২৫ - ৩৫ বার।
৫ - ১৪ বছর	১০ - ২৫ বার।
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১০ - ১৮ বার।
প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী	১০ - ১৮ বার।

১৪. শ্বাসনালির সংক্রমণ (Respiratory tract infection) :

ফুসফুস, শ্বাসনালি, গলা বা সাইনাসের যেকোনো ধরনের সংক্রমণকে শ্বাসনালির সংক্রমণ (Respiratory tract infection- RTI) বলে।

৬. শ্বাসনালির সংক্রমণের প্রকারভেদ :

(১) উর্ধ্ব শ্বাসনালির সংক্রমণ :

- সাধারণ ঠান্ডা - টনসিলাইটিস (টনসিলের সংক্রমণ)

- সাইনুসাইটিস (সাইনাসের সংক্রমণ)

- ল্যারিনজাইটিস (ল্যারিংক্স বা স্বরযন্ত্রের সংক্রমণ)

- ওটাইটিস মিডিয়া (মধ্যকর্ণের সংক্রমণ)

(২) নিম্ন শ্বাসনালির সংক্রমণ : - ফ্লু (শ্বাসনালির সংক্রমণ)

- ব্রঙ্কাইটিস (শ্বাসনালির সংক্রমণ) - নিউমোনিয়া (ফুসফুসের সংক্রমণ)

- যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ)

১৫. সাইনাসের নাম, অবস্থান ও প্রদাহ :

সাইনাস গহ্বরগুলো তরলে পূর্ণ হলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে সাইনুসাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে মানবদেহে চার ধরনের সাইনাস রয়েছে। নিচে এদের নাম, অবস্থান ও প্রদাহের ধরন উল্লেখ করা হলো :

১. ম্যাক্সিলারি সাইনাস :

অবস্থান : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালে)।

প্রদাহের ধরন : ম্যাক্সিলারি সাইনাস সংক্রমিত হলে ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে বা গালে চাপ প্রয়োগে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়া মাথা ব্যথা ও দাঁত ব্যথা হয়।

২. ফ্রন্টাল সাইনাস :

অবস্থান : ফ্রন্টাল সাইনাস চোখের ওপরে অবস্থিত।

প্রদাহের ধরন : এক্ষেত্রে ফ্রন্টাল সাইনাস গহ্বর সংক্রমিত হয়। ফলে চোখের ওপরে চাপ প্রয়োগে ব্যথা ও মাথা ব্যথাও হয়ে থাকে।

৩. এথময়ডাল সাইনাস :

অবস্থান : দু'চোখের মাঝখানে।

প্রদাহের ধরন : দু'চোখের মাঝখানে ও পিছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এর সাথে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।

৪. স্ফেনয়ডাল সাইনাস :

অবস্থান : চোখের পেছনে।

প্রদাহের ধরন : দুই চোখের পিছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়াও মাথার চূড়ায় ব্যথা বা চাপ অনুভূত হয়।

১৬. সাইনুসাইটিস (Sinusitis) :

কোনো কারণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যালার্জিজেনিত প্রভৃতি) মুখমণ্ডলে বিদ্যমান সাইনাসগুলোর কিল্লিতে ঘা বা প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস বলে। সাইনুসাইটিস হলো কোনো গহ্বরের প্রদাহ। একে রাইনোসাইনুসাইটিস (rhinosinusitis) ও বলা হয়।

৬. সাইনুসাইটিসের কারণ :

(i) জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ : ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি।

(ii) নাকের অ্যালার্জি : ধূমপান করলে বা ধূমপায়ীর আশেপাশে থাকলে।

(iv) নাকের ভেতর পলিপ (মাংসপিণ্ড) সৃষ্টি হলে।

(v) নাকের হাড় বাঁকা থাকলে।

৬ সাইনুসাইটিসের প্রকারভেদ : ছায়িত্বভেদে সাইনুসাইটিস দুই প্রকার। যথা :

১। অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস :

ছায়িত্বকাল : প্রায় ৪-৮ সপ্তাহ

জীবাণুর নাম : *Streptococcus sp.*, *Haemophilus influenzae*

২। ক্রনিক সাইনুসাইটিস :

ছায়িত্বকাল : ৮ সপ্তাহ বা তার বেশি

জীবাণুর নাম : *Staphylococcus aureus*

৬ সাইনুসাইটিসের লক্ষণ : • তীব্র মাথা ব্যথা • কাশি • জ্বর জ্বর ভাব

• নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়।

৬ সাইনুসাইটিস প্রতিকারের উপায়সমূহ :

১. লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক, কান, গলারোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

২. চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ, যেমন : প্রদাহনাশক অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক অ্যানালজেসিক, নাকের ড্রপ, সর্দির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন, জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল সেবন করতে হবে।

৩. প্রশ্বাসের সময় বাষ্প গ্রহণ (Stream inhalation) করতে হবে।

Part 2

At a glance

- নাকের সামনে অবস্থিত ছিদ্রদ্বয়কে বলা হয়- সম্মুখ নাসারন্ধ্র
- নাসারন্ধ্রদ্বয় পৃথককৃত থাকে- ন্যাসাল সেপ্টাম/নাসিকাপাত দিয়ে
- বায়ু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে- সম্মুখ নাসারন্ধ্র দিয়ে
- নাসাগহ্বর প্রাচীরে থাকে- মিউকাস নিষ্কাশী এবং অলফ্যাক্টরি কোষ
- অলফ্যাক্টরি কোষ থেকে ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণ করে- নাসাগহ্বর
- তরুণাঙ্ঘুর সবচেয়ে বড় অঙ্গ- থাইরয়েড
- স্থিতিস্থাপক তরুণাঙ্ঘুর দ্বারা নির্মিত- এপিগ্লটিস
- খাদ্যকণাকে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়- এপিগ্লটিস
- অ্যালভিওলাস হলো গ্যাসীয় থলি যা- ফুসফুসের গঠন ও কার্যের একক
- নবজাতক শিশুর ফুসফুসে অ্যালভিওলাস থাকে- ২০ মিলিয়ন
- পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে অ্যালভিওলাস থাকে- ৭০০ মিলিয়ন। [Ref: আলীম]
- পূর্ণবয়স্ক সুস্থ দেহে অ্যালভিওলাস থাকে- ৪৮০ মিলিয়ন/২৭৪-৭৯০ মিলিয়ন
- অ্যালভিওলাসের প্রাচীরের পুরুত্ব- ৪ মাইক্রোমিটার বা ০.০০৪ মি.মি.
- মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ- ফুসফুস
- ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে শ্বসনিক গ্যাসের বিনিময় ঘটে- ব্যাপন প্রক্রিয়ার
- ফুসফুসে সংশ্লেষ ঘটে- প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট
- ফুসফুস দেহ হতে নিষ্কাশন করে- CO_2
- ফুসফুসীয় কলা বিমুক্ত করে- সেরোটোনিন ও হিস্টামিন
- যে প্রক্রিয়ায় শ্বসন অঙ্গে শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটে তাকে- বহিঃশ্বসন বলে
- বহিঃশ্বসন একটি- ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া
- অন্তঃশ্বসন একটি- জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
- ফুসফুসে সংঘটিত হয়- বহিঃশ্বসন
- Dorsal Respiratory Group of Neurons- প্রশ্বাস ঘটায়
- Ventral Respiratory Group of Neurons- নিঃশ্বাস ঘটায়
- Pneumatic centre- শ্বসনের হার ও ধরন নির্ধারণ করে

• Apneustic centre- নিঃশ্বাস কেন্দ্রকে দমিয়ে রাখে

• শ্বসনের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে- মেডুলা

• ইন্টারকোস্টাল পেশির সংখ্যা- ১১টি

• প্রতি 100ml রক্তে ভৌত দ্রবণ হিসেবে পরিবাহিত হয়- 0.2ml O_2

• রাসায়নিক যৌগরূপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়- প্রায় 98% O_2

• 100 ml রক্তে O_2 বাহিত হয়- 19ml

• একটি হিমোগ্লোবিন অণু যুক্ত হতে পারে- 4টি O_2 অণুর সাথে

• CO_2 ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়- 5%

• শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে বলে- শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেট

• ১ম বছর বয়সে প্রতি মিনিটে শ্বসন হার- ১৪-৬০ বার

• ২-৪ বছর বয়সে প্রতি মিনিটে শ্বসনের হার- ২৫-৩৫ বার

• ৫-১৪ বছর বয়সে প্রতি মিনিটে শ্বসনের হার- ১০-২৫ বার

• হিমোগ্লোবিনে হিম ও গ্লোবিনের অনুপাত- 1 : 25

• হিমের লৌহ (Fe) থাকে- 33.33%

• পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র লৌহ থাকে- 4-5 গ্রাম

• হিমোগ্লোবিন একটি- ক্রোমোপ্রোটিন

• অক্সিজেন পরিবহনে ভূমিকা পালন করে- হিমোগ্লোবিন

• মুখমণ্ডলের অস্থির ভিতর কতকগুলো বায়ুপূর্ণ গহ্বর আছে যেগুলো নাসিকা গহ্বরে উন্মুক্ত হয়- এগুলোকে সাইনাস বা প্যারান্যাসাল সাইনাস বলে

• ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালে) অবস্থিত- ম্যাক্সিলারি সাইনাস

• চোখের ওপরে অবস্থিত (কপালের সামনে)- ফ্রন্টাল সাইনাস

• দুচোখের মাঝখানে (নাকের ওপরে) অবস্থিত- এথময়ডাল সাইনাস

• এথময়েড সাইনাসের পেছনে (কপালের পাশে) অবস্থিত- স্ফেনয়ডাল সাইনাস

• মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলে- ওটাইটিস মিডিয়া

• অ্যাডিনয়েড ফুলে গেলে সৃষ্টি হয়- ওটাইটিস মিডিয়া

• শিশুদের ক্ষেত্রে ওটাইটিস মিডিয়া- ৩ প্রকার

• বহিঃকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহ- ওটাইটিস এক্সটার্না

• মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহ- ওটাইটিস মিডিয়া

• X-ray চিত্রে স্বাভাবিক ও সবল দেখায়- ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর

• ধূমপায়ীর ক্ষেত্রে, ফুসফুস X-ray চিত্রে দেখা যায়- এমফাইসেমা

• ফুসফুসের X-ray চিত্রের কালো দাগ ও সাদা দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদন দেখা যায়- অধূমপায়ীর ফুসফুস

• একটি সিগারেটের শলায় রাসায়নিক পদার্থ থাকে- 8০০০ ধরনের

• শ্বাসনালিতে ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি করে- কার্বন মনোঅক্সাইড

• রক্তের O_2 পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস করে- CO

• যক্ষ্মা রোগ হলে শিশুদের দিতে হয়- বি.সি.জি. টিকা

• শ্বাসনালির গাত্র সংকুচিত হওয়ার ফলে দেখা দেয়- অ্যাজমা

• শ্বাসনালির ভেতরে আবৃত ঝিল্লির প্রদাহের কারণে হয়- ব্রঙ্কাইটিস

• সংকটময় মুহূর্তে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া অত্যাৱশ্যক হয়ে পড়ে আর এজন্য প্রয়োজন পড়ে- CPR বা কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন

• যে ব্যক্তি CPR দেবেন তাকে বলা হয়- উদ্ধারকর্মী বা রেসকিওর

• ফুসফুস ও রক্ত সংবহনে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে বজায় রাখা হয়- শ্বাসকেন্দ্র ও হৃৎপিণ্ড

• কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ধরন হলো- ৫ প্রকার

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মানুষের মস্তিষ্কের কোন অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে? [NU-Science : 12-13]
- (A) Hippocampus (B) Cerebrum
(C) Medulla oblongata (D) Cerebellum

Ans C

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মধ্যকর্ণের সংক্রমণের জন্য দায়ী কে? [GST-A : 23-24]
- (A) *Streptococcus pneumoniae* (B) *Vibrio mimicus*
(C) *Staphylococcus aureus* (D) SARS-CoV-2
02. রক্তের মাধ্যমে বেশিরভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড কোন প্রক্রিয়ায় পরিবহন হয়? [GST-A : 23-24]
- (A) প্রাঞ্জমার সাথে (B) হিমোগ্লোবিনের সাথে
(C) বাইকার্বোনেট যৌগরূপে (D) অধঃক্ষেপরূপে
03. Adam's apple কোথায় থাকে? [GST-A : 22-23]
- (A) অ্যালভিওলাসে (B) ফুসফুসে
(C) স্বরযন্ত্রে (D) ট্রাকিয়ায়
04. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন প্রাঞ্জমায় ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়? [KU-A : 19-20]
- (A) 0.1 (B) 0.2
(C) 2.0 (D) 1.0
05. মধ্যকর্ণের Otitis media রোগ কোন জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হয়? [KU-A : 19-20]
- (A) Bacteria (B) Fungus
(C) Protozoa (D) Virus
06. নিম্নের কোন তরল পদার্থটি ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে? [CoU-A : 19-20]
- (A) সেরাস ফ্লুইড (B) সাইনোভিয়াল ফ্লুইড
(C) সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (D) ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড
07. নিম্নের কোনটি মিনিটে নবজাতক শিশুর শ্বসনের হার? [CoU-A : 19-20]
- (A) ৫০ বার (B) ৪০ বার
(C) ৩০ বার (D) ১৮ বার
08. চান ফুসফুসে কয়টি লোবিউল থাকে? [IU-D : 19-20]
- (A) 3 (B) ৪
(C) 10 (D) 2
09. সারফেকট্যান্ট পাওয়া যায়- [IU-D : 19-20]
- (A) স্বরযন্ত্র (B) শ্বাসনালিতে
(C) অ্যালভিওলাসে (D) ব্রঙ্কায়ে
10. কোন সাইনাসের কারণে মানুষের গাল, দাঁত ও মাথায় ব্যথা হয়? [JUST-FBSTA : 19-20]
- (A) Frontal (B) Maxillary
(C) Ethmoid (D) Sphenoid

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. শ্বসনতন্ত্রের কোন ছানে গ্যাসের বিনিময় হয়?
- (A) অ্যালভিওলাস (B) ব্রঙ্কায়ে
(C) ব্রঙ্কিওল (D) ট্রাকিয়া
02. Adam's Apple কোথায় অবস্থিত?
- (A) নাসা গহ্বর (B) ভেস্টিবিউল
(C) নাসাগলবিল (D) স্বরযন্ত্র
03. ফুসফুসের ক্যাপারের জন্য দায়ী কোনটি?
- (A) CO (B) R_n (Radon)
(C) MnO₂ (D) H₂S
04. কানের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে কী বলে?
- (A) Otitis Media (B) Sinusitis
(C) Emphysema (D) Bronchitis
05. রক্ত ও বায়ুর মধ্যে O₂ এবং CO₂ এর বিনিময় ঘটে মানবদেহের-
- (A) ট্রাকিয়াতে (B) ব্রঙ্কিওলে
(C) ব্রঙ্কায়ে (D) অ্যালভিওলাসে
06. সারফেকট্যান্ট কোন প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়?
- (A) ট্রাকিয়া (B) ব্রঙ্কায়ে
(C) ব্রঙ্কিওল (D) অ্যালভিওলাস
07. অক্সি হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?
- (A) রক্তে অক্সিজেন বহন করা
(B) রক্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বহন করা
(C) রক্তে অক্সিজেন বহনে বাধা দেওয়া
(D) রক্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বহনে বাধা দেওয়া
08. মানুষের ফুসফুসে প্রায় 70 - 90 বর্গমিটার আয়তনের তলজুড়ে কত সংখ্যক অ্যালভিওলাই থাকে?
- (A) 70 কোটি (B) 5 কোটি
(C) 70 লাখ (D) 5 হাজার
09. ফুসফুস শরীরের যে গহ্বরে অবস্থান করে তার নাম-
- (A) পেরিটোনিয়াল গহ্বর (B) পেরিনিউরাল গহ্বর
(C) প্রিউরাল গহ্বর (D) পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর
10. অ্যালভিওলাসের মধ্যে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ কত মিলিমিটার পারদ চাপের সমান?
- (A) 40 (B) 60 (C) 80 (D) 100
11. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ফুসফুসে কতগুলো অ্যালভিওল থাকে?
- (A) 174 - 590 মিলিয়ন (B) 374 - 690 মিলিয়ন
(C) 274 - 790 মিলিয়ন (D) 474 - 890 মিলিয়ন
12. অ্যালভিওলি নিচের কোনটির অংশ?
- (A) যকৃৎ (B) ট্রাকিয়া
(C) ব্রঙ্কাই (D) ফুসফুস
13. শাখা প্রশাখাবিহীন শ্বাসনালিকে বলে-
- (A) ট্রাকিওল (B) ট্রাকিয়া
(C) স্পাইরাকুল (D) অস্টিয়া
14. মানুষের স্বরযন্ত্রে সবচেয়ে বড়ো তরুণাঙ্ক কোনটি?
- (A) ক্রিকয়েড (B) এপিগ্লটিস
(C) অ্যারিটনয়েড (D) অ্যাডাম'স অ্যাপল
15. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন প্রাঞ্জমায় ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়?
- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 2.0 (D) 1.0

মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

৬১ রেচনতন্ত্র (Excretory system) :

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় দেহ হতে অম্লিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) বলে। মানুষের প্রধান রেচন বর্জ্যের নাম হলো মূত্র (urine)। যে তন্ত্র দ্বারা রেচনকার্য সম্পন্ন হয় তাকে রেচনতন্ত্র (excretory system) বলে। বৃক্ক মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলেও ডাক, ফুসফুস, যকৃৎ ও পরিপাকনালি দ্বারা কিছু রেচন বর্জ্য দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৬২ মানুষের রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ :

নাম	কাজ
১. বৃক্ক (Kidney)	মূত্র উৎপাদন করা বৃক্কের প্রধান কাজ।
২. রেচননালি/ইউরেটার	বৃক্ক থেকে উৎপন্ন মূত্র মূত্রথলিতে পরিবহণ করে।
৩. মূত্রথলি/মূত্রাশয়	মূত্র সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূত্র নিষ্কাশন করে।
৪. মূত্রনালি/ইউরেথ্রা	এটি মূত্রাশয় থেকে মূত্রকে দেহের বাইরে নিষ্কাশন করে।

৬৩ বৃক্ক (Kidney) :

মানুষের উদর গহ্বরের পশ্চাৎ প্রাচীর সংলগ্ন মেরুদণ্ডের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক বিদ্যমান। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে যে অপ্রতিসাম্যতার সৃষ্টি হয় তাতে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্ক থেকে কিছুটা উপরে অবস্থান করে। বৃক্কের উর্ধ্ব অংশ ১১ তম ও ১২ তম পর্বকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

৬৪ বৃক্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য :

- আকার ও আকৃতি : নিরেট, চাপা, অনেকটা শিম বীজের মতো, লালচে রংয়ের।
- দৈর্ঘ্য : ১১ - ১২ সেমি. • প্রস্থ : ৫ - ৬ সেমি. • চুলতা : ৩ সেমি.
- ওজন : পুরুষে → ১৫০ - ১৭০ গ্রাম, স্ত্রীদেহে → ১৩০ - ১৫০ গ্রাম।
- বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল এবং ভেতরের দিক অবতল।
- অবতল অংশের খাঁজের নাম হাইলাস/হাইলাম।
- বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে টিপির মতো আচ্ছাদনকারী অংশ → অ্যাদরেনাল গ্রন্থি।
- বৃক্কের আবরণ → রেনাল ক্যাপসুল বা টিউনিকা ফাইব্রোসা।
- বাইরের দিকের অংশ → রেনাল কটেজ।
- ভেতরের দিকের অংশ → রেনাল মেডুলা।
- নেফ্রন বৃক্কের গঠনগত ও কার্যকরী একক।
- মেডুলা অংশের ত্রিভুজাকৃতির (৪-১৪ টি) গঠন → রেনাল পিরামিড।
- রেনাল পিরামিডের ফাঁকে বিস্তৃত কটেজ → রেনাল কলাম।
- রেনাল পিরামিডের শীর্ষ → রেনাল প্যাপিলা।
- ক্যালিক্স মাইনরের সমষ্টি → ক্যালিক্স মেজর।

৬৫ বৃক্কের ভূমিকা/কাজ :

১. রক্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য অপসারণে ভূমিকা রাখে।
২. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। হরমোন এবং এনজাইম নিঃসরণে ভূমিকা রাখে।
৩. দেহে প্রবর্তিত প্রতিবিষ ও ভেজাজ পদার্থসমূহ দেহ থেকে অপসারণে ভূমিকা রাখে।
৪. রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্রোমাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।
৬. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
৭. যথাযথ আয়নিক কম্পোজিশন বজায় রাখে।

৬৬ নেফ্রন (Nephron) :

বৃক্কের গঠনগত ও কার্যকরী একককে নেফ্রন বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১০ লাখ থেকে ১২ লাখ নেফ্রন রয়েছে।

৬৭ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ :

১. রেনাল করপাসল
২. হেনলির লুপ
৩. সংগ্রাহী নালিকা
৪. প্রক্সিমাল প্যাসানো নালিকা
৫. ডিস্টাল প্যাসানো নালিকা

৬৮ মানবদেহে নেফ্রনের গুরুত্ব :

১. নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রক্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় সকল উপাদান হৃৎকম্পিত মাধ্যমে পৃথক করে বোম্যাস ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রেরণ করে।
২. বৃক্কীয় নালিকার পরিশুদ্ধ তরলের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো, যথা : গ্লুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি প্রভৃতি পুনরায় শোষিত হয়ে রক্তনালিতে প্রেরণ করে।
৩. বৃক্কীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে তাই নয়, এটি কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ যথা : নানা প্রকারের সালফারযুক্ত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক প্রকারের জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি রক্ত থেকে নালিকার গহ্বরে রক্ষণ করে।
৪. বৃক্কীয় নালিকার এপিথেলীয় কোষে কয়েক প্রকার যৌগ, যথা : অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে নালিকার গহ্বরে মুক্ত হয়।
৫. দেহস্থিত pH এর সঠিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করাও নেফ্রনের কাজ।

৬৯ মূত্র (Urine) :

নেফ্রনের রেনাল টিউবুলসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অপ্রদূষিত তরল রেচন বর্জ্য মূত্ররূপে জমা হয় তাকে মূত্র (Urine) বলে।

৭০ মূত্রের বৈশিষ্ট্য :

১. পরিমাণ	প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্কে প্রতিদিন ০.৫-২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয় যা ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ ঘটায়।
২. বর্ণ	স্বাভাবিক মূত্র হালকা হলুদ বা খড় বর্ণের। মূত্রে ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি খড় বা হালকা হলুদ বর্ণের হয়।
৩. গন্ধ	এটি ঝাঁঝালো বা অ্যারোমেটিক গন্ধবিশিষ্ট। মূত্রে ইউরিনোড (C_6H_8O) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে এরূপ গন্ধ হয়।
৪. রাসায়নিক ধর্ম	মূত্র সামান্য অম্লীয়, এর pH মান ৫.০-৬.৫
৫. আপেক্ষিক গুরুত্ব	মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮-১.০৩০

৭১ মূত্রের প্রধান উপাদানগুলোর নাম ও শতকরা পরিমাণ :

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩-৫%) কঠিন পদার্থ। নিচে হ্রক আকারে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো দেখানো হলো :

জৈব উপাদান শতকরা হার			
ইউরিয়া	২	কিটোন বডি	০.০২
ইউরিক অ্যাসিড	০.০৫	ক্রিয়েটিন	০.০১
হিপপিউরিক অ্যাসিড	০.০৫	সোডিয়াম	০.৩৫
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭		
অজৈব উপাদান শতকরা হার			
পটাশিয়াম	০.১৫	সালফেট	০.১৬
অ্যামোনিয়াম	০.০৪	ফসফেট	০.২৭
ম্যাগনেশিয়াম	০.০১	ক্যালসিয়াম	০.০৩
ক্রোমাইড	০.৬০		

[Ref : আভাস]

Part 2

At a glance

- যে তন্ত্র দ্বারা রেচনকার্য সম্পন্ন হয় তাকে বলে- রেচনতন্ত্র
- মানুষ হলো- ইউরিওটেলিক প্রাণী
- মানুষ এর প্রধান রেচন পদার্থ- ইউরিয়া
- রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়- ৮০ ভাগ
- বৃক্কের সংখ্যা - ২টি (বাম ও ডান বৃক্ক)

■ বৃদ্ধি বন্ধ হলে রক্তে বেড়ে যায়— ইডারিয়া ও ক্রিয়োটানিন

(A) নেফ্রন (B) নিউরন (C) নেফ্রিডিয়া (D) ফ্লোম কোষ **Ans (A)**

৩) রেনাল পেলভিস

© রেনাল গিয়ানত
PUBLICATIONS •

Ans C

IONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন অস্থি গুলেক্রেনন প্রসেস বহন করে? [NU-Science : 14-15]

- A Tibia B Ulna
C Humerus D Pubis

Ans B

02. কোন অস্থিতে গুলেক্রেনন প্রসেস থাকে? [NU-Science : 10-11]

- A স্ক্যাপুলা B ইন্ডিয়াম
C হিউমেরাস D আলনা

Ans D

03. মানবদেহে cervical vertebrae মোট— [NU-Science : 05-06]

- A 7টি B 8টি
C 3টি D 11টি

Ans A

04. মানুষের স্যাক্রাম (Sacrum) অস্থি কয়টি কশেরুকার সমন্বয়ে গঠিত? [NU-Science : 01-02]

- A 3টি B 5টি
C 9টি D 8টি

Ans B

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মানুষের রূপান্তরিত কশেরুকার সংখ্যা কত? [GST-A : 23-24]

- A দুইটি B চারটি
C পাঁচটি D নয়টি

Ans A

02. হ্যামস্ট্রিং পেশি কোনটি? [GST-A : 23-24]

- A রেক্টাস ফিমোরিস B বাইসেপস ফিমোরিস
C ভাস্টাস মিডিয়ালিস D ভাস্টাস ল্যাটারালিস

Ans B

03. মানবদেহে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় তরুণাঙ্গ? [GST-A : 22-23]

- A ফাইব্রোকার্টিলেজ B শ্বেত-তন্তুময় কার্টিলেজ
C ক্যালসিফাইড কার্টিলেজ D হায়ালিন কার্টিলেজ

Ans A

04. পেশি সংকোচনের জন্য কোন আয়নটি অত্যাবশ্যকীয়? [GST-A : 21-22]

- A Na B Ca
C K D Cl

Ans B

05. শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাঙ্গ থাকে? [KU-A : 19-20]

- A হায়ালিন B পীত তন্তুময়
C শ্বেত তন্তুময় D চুনময়

Ans A

06. নিম্নের কোনটি মানুষের করোটির অস্থি সংখ্যা? [CoU-A : 19-20]

- A ৮টি B ১৪টি
C ৬টি D ২৯টি

Ans D

07. মানবদেহের কোন অংশে কোস্টাল আর্চ থাকে? [PUST-A : 19-20]

- A স্ক্যাপুলা B হিউমেরাস
C পর্ভকা D স্টার্নাম

Ans C

08. মুখমণ্ডলীয় অস্থির মোট সংখ্যা কত? [JUST-FBSTA : 19-20]

- A ১৪টি B ১৬টি
C ১২টি D ১৫টি

Ans A

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে—

- A টেনডন B লিগামেন্ট
C সাইনোভিয়াম D ফাইবার

Ans A

02. মানব শিশুর জন্মের সময় কতোটি অস্থি থাকে?

- A ৩০০টি B ২০০টি
C ২০৬টি D ৩০৬টি

Ans A

03. অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকা কয় প্রকার?

- A 3 B 4
C 5 D 6

Ans C

04. শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাঙ্গ থাকে?

- A হায়ালিন B পীত তন্তুময়
C শ্বেত তন্তুময় D চুনময়

Ans A

05. মুখমণ্ডলীয় অস্থি নয়—

- A এথময়েড B ম্যান্ডিবল C ভোমার D প্যাশেটাইন

Ans A

06. হাতের কজি কোন অস্থি দ্বারা গঠিত?

- A কার্পাল B মেটাকার্পাল
C ফ্যালাঞ্জেস D হিউমেরাস

Ans A

07. গ্রেনয়েড গহ্বরে মাথা আটকানো থাকে—

- A হিউমেরাসের B রেডিও-আলনার
C ফিমারের D মেনুব্রিয়ামের

Ans A

08. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর কী ধরনের পেশি দিয়ে গঠিত?

- A অনৈচ্ছিক পেশি B ঐচ্ছিক পেশি
C ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশি D আবরণী কলা

Ans A

09. বাইসেপস কোন ধরনের পেশি?

- A Flexor B Extensor
C Abductor D Adductor

Ans A

10. মানবদেহের দীর্ঘতম অস্থি কোনটি?

- A মেরুদণ্ড B স্যাক্রাল কশেরুকা
C হিউমেরাস D ফিমার

Ans D

11. স্টার্নাম মানুষের কোথায় থাকে?

- A মেরুদণ্ডে B বক্ষপিণ্ডের C অগ্রিচক্রে D মাথায়

Ans B

12. কোন অস্থিটি করোটিকার অংশ নয়?

- A অক্সিপিটাল অস্থি B স্কেনয়েড অস্থি
C প্যাশেটাইন অস্থি D এথময়েড অস্থি

Ans C

13. মানবদেহে পায়ের সবচাইতে বড় অস্থি কোনটি?

- A টিবিয়া B ফিবুলা C টার্সাল D ফিমার

Ans D

14. মানবদেহের মেরুদণ্ড কয়টি কশেরুকা দিয়ে গঠিত?

- A ৩১ B ৩২ C ৩৩ D ৩৪

Ans C

15. মানবদেহে অস্থির মোট সংখ্যা কত?

- A 303 B 250 C 206 D 500

Ans C

16. কোনটি সিসাময়েড অস্থি?

- A স্ক্যাপুলা B ইলিয়াম
C প্যাটেলা D A ও B উভয়

Ans C

17. কোন ধরনের যোজক কলা অস্থিবদ্ধনী তৈরিতে সাহায্য করে?

- A অ্যারিওলার ডিস্ক B হোয়াইট ফাইব্রাস ডিস্ক
C ইয়েলো ফাইব্রাস ডিস্ক D অ্যাডিপোস ডিস্ক

Ans C

18. হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে কোন ধরনের তরুণাঙ্গ দেখা যায়?

- A হায়ালিন B স্থিতিস্থাপক
C শ্বেততন্তুময় D ক্যালসিফাইড

Ans D

19. দেহের প্রায় শতকরা কতভাগ ক্যালসিয়াম অস্থিতে জমা থাকে?

- A 67% B 77% C 87% D 97%

Ans D

20. কঙ্কালতন্ত্রের কাজ নয় কোনটি?

- A দেহকাঠামো গঠন B রক্ষণাবেক্ষণ
C চলাচল D বর্জ্য নিষ্কাশন

Ans D

21. Beauty bone বলা হয় কোন অস্থিকে?

- A শ্রোণিচক্রে B হিউমেরাস C ক্ল্যাভিকল D স্ক্যাপুলা

Ans C

22. মানুষের মেরুদণ্ডের অ্যাটলাস ও অ্যাক্সিসের মধ্যবর্তী সচল সন্ধিকে বলে—

- A Pivot B Hige
C Synchrondrosis D Symphysis

Ans A

23. গ্রেনয়েড গহ্বর থাকে—

- A পঞ্চাংগদে B অগ্রপদে
C শ্রোণিচক্রে D আদর্শ কশেরুকা

Ans B

মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১ নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters) :

কেনব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক কেনব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা গ্রন্থিতে পরিবহণে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে। যেমন : ইপিনেফ্রাইন, ডোপামিন, সেরোটোনিন, অ্যাসেটাইলকোলিন, অ্যাডিনোসিন। এ পদার্থ প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের ডেসিকলে জমা থাকে এবং প্রয়োজনে সিন্যাপটিক ক্রাফটে মুক্ত হয়।

২ নিউরোট্রান্সমিটারের প্রকারভেদ :

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার	ডোপামিন, GABA, গ্লাইসিন, গ্লুটামেট প্রভৃতি।
প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার	অ্যাড্রেনালিন, অ্যাসিটাইল কোলিন, নর অ্যাড্রেনালিন, হিস্টামিন প্রভৃতি।

৩ করোটিক স্নায়ু (Cranial nerve) :

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট যেসব প্রান্তীয় স্নায়ুসমূহ করোটিক বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া। এদের সম্মুখ অংশ থেকে পূর্ণরোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা সূচিত করা হয়।

৪ মানুষের করোটিক স্নায়ুর নাম :

i. অলক্যাক্টরি (সংবেদী)	vii. ফ্যাসিয়াল
ii. অপটিক (সংবেদী)	viii. অডিটরি (সংবেদী)
iii. অকুলোমোটর (চেষ্টায়)	ix. ট্রোগোফ্যারিজিয়াল (মিশ্র)
iv. ট্রেকলিয়ার (চেষ্টায়)	x. ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)
v. ট্রাইজিমিনাল	xi. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (চেষ্টায়)
vi. আবডুসেস (চেষ্টায়)	xii. হাইপোগ্লোসাল (চেষ্টায়)

৫ স্পিনাল স্নায়ু (Spinal nerve) :

কেনব স্নায়ু স্নায়ুকাণ্ড থেকে সৃষ্ট, মিশ্র প্রকৃতির এবং স্নায়ুকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের স্নায়ু বা স্পাইনাল নার্ভ (Spinal nerve) বলে। স্নায়ু স্নায়ু ৩১ জোড়া।

৬ করোটিক স্নায়ু ও স্নায়ু স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য :

করোটিক স্নায়ু (Cranial nerve)	স্নায়ু স্নায়ু (Spinal nerve)
১. মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয়।	১. স্নায়ুকাণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়।
২. সংখ্যা ১২ জোড়া।	২. সংখ্যা ৩১ জোড়া।
৩. প্রতিটি স্নায়ুর ১টি স্নায়ুমূল থাকে।	৩. প্রতিটি স্নায়ুর এক জোড়া স্নায়ুমূল থাকে।

৭ চোখ (Eye) :

চোখ মানুষের আলোকসংবেদী অঙ্গ বা দর্শনেন্দ্রিয়। মাথার সম্মুখদিকে দুপাশে দুটি চোখ বিদ্যমান। করোটিক অপটিক ক্যাপসুলে (optic capsule) প্রতিটি চোখ বসানো থাকে। মানুষের প্রতিটি চোখে চক্ষু পল্লব, চক্ষুপেশি, চক্ষুগ্রন্থি এবং চক্ষু গোলক থাকে।

৮ চোখের বিভিন্ন অংশ :

বস্তু কোষ	কোরয়েড	নেত্রপল্লব
কোন কোষ	ফোবিয়া সেন্ট্রালিস	অ্যাকুয়াস হিউমার
প্রেটিনা	কর্নিয়া	ভিট্রিয়াস হিউমার
পিউপিল	অন্ধবিপদ	স্কেরা
লেস	সিলিয়ারি বডি	আইরিশ

অংশগ্রহণ

কনজাংক্টিভা

৯ মানবদেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের সংখ্যা :

গ্রন্থিসমূহের নাম	সংখ্যা
আইলেটস অব ল্যাসারহাস	অনেক
শুক্ৰাশয় (পুরুষে)	২টি
ডিম্বাশয় (স্ত্রীলোকে)	২টি
অমরা (প্রাসেন্টা)	১টি
পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)	১টি
থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)	১টি
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)	৪টি
থাইমাস গ্রন্থি	২টি
অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রায়েনাল গ্রন্থি	১টি

১০ অক্ষিপেশি (Eye muscles) :

প্রতিটি অক্ষিগোলক ৬টি করে অক্ষিপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থান করে। এদের মধ্যে ৪ টি রেক্টাস (rectus) পেশি এবং ২টি অবলিক (oblique) পেশি। প্রতিটি চোখে ৬ টি পেশি থাকে।

১১ চোখের পেশিগুলোর নাম ও কাজ :

পেশির নাম	অক্ষিগোলককে ঘুরতে সাহায্য করে
১. মিডিয়াল রেক্টাস	ভেতরের দিকে।
২. ল্যাটারাল রেক্টাস	বাইরের দিকে।
৩. সুপিরিয়র রেক্টাস	ওপরের দিকে।
৪. ইনফিরিয়র রেক্টাস	নিচের দিকে।
৫. ইনফিরিয়র অবলিক	সুপিরিয়র অবলিক তৈরির বিপরীতে কাজ করে।
৬. সুপিরিয়র অবলিক	অপটিক স্নায়ু ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অক্ষ বরাবর।

১২ হরমোন (Hormone) :

যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ (প্রোটিনধর্মী বা ফেনলিক বা স্টেরয়েড হতে পারে) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয় এবং সাধারণত উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকে হরমোন (hormone) বলে।

১৩ হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণজনিত রোগের নাম :

১। ডোয়ারফিজম	৮। ক্রোটিনিজম
২। অ্যাক্রোমিক্রিয়া	৯। মিক্সিডিমা
৩। জাইগ্যানটিজম	১০। গয়টার বা হ্রেন্স বর্ণিত রোগ
৪। অ্যাক্রোমেগালি বা মারিজ ব্যাধি	১১। টিটেনি
৫। সাইমন্ড ব্যাধি	১২। ডায়াবিটিস মেলিটাস
৬। অ্যাডিসন বর্ণিত ব্যাধি	১৩। ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস
৭। কুশিং বর্ণিত ব্যাধি	

১৪ মানবদেহে অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হরমোনের আরো কিছু নেতিবাচক ক্রিয়া :

রোগের নাম	বর্ণনা
২। টারনার সিনড্রোম	নারীদেহে ক্রোমোসোম সংক্রান্ত ব্যাধি যখন দুটি X-ক্রোমোসোমের একটি বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
৩। প্রাডের উইলি সিনড্রোম	মানবদেহে ক্রোমোসোম 15-তে ক্রোমোসোমীয় পদার্থের অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট ব্যাধি।
৪। কার্পাল টানেল সিনড্রোম	হাতের তালুতে সরবরাহকারী মিডিয়ান স্নায়ু কজির গোড়ায় চাপা পড়লে আঙুল ও হাতে, এমনকি কনুই পর্যন্ত অসাড় ও কাঁটা কাঁটা ভাব।
৫। হাইপো-গ্লাইসিমিয়া	রক্তে অম্লভাবিক কম মাত্রায় গ্লুকোজের উপস্থিতি।

At a glance

- চোখের পর্দাখ দিকে যে বিন্দু দিয়ে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে জেরার সে অংশকে বলে- **ল্যাম্বা ফাইব্রোসা**
- অক্ষিপোলকের আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে- **জেরা**
- চোখের জানালা বলা হয়- **কর্নিয়া**
- রক্ত সরবরাহ নেই- **কর্নিয়াতে**
- কর্নিয়ার স্তর- **৫টি**
- প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়- **৫টি ধাপে**
- চোখের প্রতিসরণ মাধ্যম হলো- **কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স এবং ভিট্রিয়াস হিউমার**
- রেটিনায় ফোকাসের জন্য উপযোগ্য হয়- **৬ মি. দূরত্বে বস্তু রাখলে**
- যে দৃষ্টিতে কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না, তাকে- **হাইপারমেট্রোপিয়া বলে**
- হাইপারমেট্রোপিয়া রোগ সেরে যায়- **উক্স লেন্সের চশমা ব্যবহারে**
- যদি দূরের বস্তু দেখতে সমস্যা হয় তবে থাকে বলে- **মায়োপিয়া (Myopia)**
- হাতুড়ির মতো দেখতে- **ম্যালিয়াস**
- নেহাই-এর মতো দেখতে- **ইনকাস**
- ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো দেখতে- **স্টেপিস**
- শ্রবণ অনুভূতি জাগানো হলো- **ককলিয়ার কাজ**
- হরমোন শব্দটি এসেছে গ্রিক- **Hormo (উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত করা) থেকে**
- হরমোন সুপরিচিত- **দেহের রাসায়নিক দূত হিসেবে**
- হরমোন বাহিত হয়- **রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে**
- পিটুইটারি গ্রন্থি হতে ফরিত হরমোন- **গ্রোথ হরমোন**
- থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ফরিত হয়- **থাইরক্সিন হরমোন**
- সোম্যাটোট্রোপিন হরমোন গঠিত হয়- **১৯১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে**
- মানুষের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ওজন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে- **গ্রোথ হরমোন**
- মূত্র উৎপাদন হ্রাস করে- **ইপিনেফ্রিন**
- বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে- **মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোন**
- Na^+ , K^+ আয়নের সমতা রক্ষা করে- **অ্যালডোস্টেরন**
- Ca^{2+} পরিশোধণ বৃদ্ধি করে- **প্যারাথরমোন ও ক্যালসিটোনিন**
- প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ফরিত হয়- **প্যারাথরমোন**
- মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে- **অ্যাড্রেনালিন**
- মানুষের ঘুম, জাগ্রত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে- **মেলাটোনিন**
- মানুষের স্বাভাবিক উগ্রতা সৃষ্টি হয়- **টেস্টোস্টেরন-এর জন্য**
- শিশুদের থাইরক্সিন কমে গেলে দেখা দেয়- **ক্রিটিনিজম**
- আমরা একটি- **অস্থায়ী গ্রন্থি**
- গলার স্বর ব্যাণ্ডের মতো কর্কশ হয়- **Myxedema রোগে**

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ কোনটি? [NU-Science : 11-12]
 (A) ইনসুলিন নিঃসরণ (B) শুক্রাণু উৎপাদন
 (C) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাক (D) অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্ষরণ (Ans D)
02. ক্যালসিয়াম বিপাকে সহায়তাকারী গ্রন্থি কোনটি- [NU-Science : 10-11]
 (A) প্যারাথাইরয়েড (B) অ্যাড্রিনাল
 (C) প্যানক্রিয়াস (D) পিটুইটারি (Ans A)
03. মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে? [NU-Science : 09-10]
 (A) সেরিব্রাম (B) হাইপোথ্যালামাস (C) পনস (D) সেরেবেলাম (Ans D)
04. মানুষের ১০ম ক্রোটিক মায়ুর নাম- [NU-Science : 09-10]
 (A) অডিটরি (B) ভেগাস (C) অপটিক (D) অলফ্যাক্টরি (Ans B)
05. মানুষের অক্ষিগোলকের ব্যাস কত? [NU-Science : 07-08]
 (A) ২৪ মিলিমিটার (B) ২৪ মাইক্রোমিটার
 (C) ২৫ মিলিমিটার (D) ২৩ মিলিমিটার (Ans C)
06. মানব মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ হলো- [NU-Science : 06-07]
 (A) সেরিব্রাম (B) সেরিবেলাম (C) মেডুলা (D) মধ্য মস্তিষ্ক (Ans A)
07. চোখে আলোক সংবেদী কোষসমূহ কোথায় অবস্থান করে? [NU-Science : 02-03]
 (A) কর্নিয়ায় (B) স্কেরায় (C) কলয়েডে (D) রেটিনায় (Ans D)

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় পর্বের উপযোগী বিভিন্ন
বিষয়বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিপণ্ড প্রশ্নোত্তর

01. মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশের নাম কী? [GST-A: 20-21]
 (A) সেরেব্রাম (B) সেরেবেলাম
 (C) হোমো অলংগাটা (D) মধ্য মস্তিষ্ক **Ans A**
02. নিচের কোন করোটিক দ্রাব্য কার্যকারিতায় মুখের অভিকর্ষিত প্রকাশিত হয়? [CoU-A: 19-20]
 (A) প্যালাটাইন (B) হায়োম্যাডিকুলার (C) ম্যাডিকুলার (D) ম্যাডিকুলারি **Ans B**
03. অ্যাক্সিটের অংশ নয়- [BU-D: 19-20]
 (A) সেরেব্রাম (B) সেরেব্রাম
 (C) থ্যালামাস (D) হাইপোথ্যালামাস **Ans A**
04. চোখের রেটিনার ভিতরে সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশ- [BU-D: 19-20]
 (A) ভক্স বিন্দু (B) আলোক বিন্দু (C) গীত বিন্দু (D) সাদা বিন্দু **Ans C**
05. মানুষের পচাং মস্তিষ্কের অংশ নয়- [BU-D: 19-20]
 (A) হোমো অলংগাটা (B) পনাস
 (C) সেরেব্রাম (D) থ্যালামাস **Ans D**
06. অ্যা পিটুইটারি গ্রহি নিম্নতম হরমোন নয়- [BU-A: 19-20]
 (A) ADH (B) FSH (C) LH (D) TSH **Ans A**
07. মানব চক্ষুতে কয়টি রেকটাস পেশি থাকে? [BU-A: 19-20]
 (A) ৮ (B) ৪ (C) ৩ (D) ৬ **Ans B**
08. ADH হরমোনটি কোথা হতে নিঃসরণ হয়? [HSTU-A: 19-20]
 (A) সুপ্রায়েনাল গ্রহি (B) প্যাট্রিমাল গ্রহি
 (C) পিটুইটারি গ্রহি (D) হাইপোথ্যালামাস গ্রহি **Ans C**
09. মানবদেহে মটর নিউরন কোষের দৈর্ঘ্য কত? [RSTU-C: 19-20]
 (A) 1.35 meter (B) 1.37 meter
 (C) 1.33 meter (D) 1.39 meter **Ans B**
10. নিচের কোনটি সংবেদী দ্রাব্য? [CoU-A: 18-19]
 (A) অকুলোমেটর (B) অপটিক (C) আবডুসেস (D) সবগুলো **Ans B**
11. নিচের কোনটি মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ? [CoU-A: 18-19]
 (A) চক্ষু (B) কান (C) নাক (D) জিহ্বা **Ans B**
12. সেরেব্রাম নিচের কোনটির অংশ? [CoU-A: 18-19]
 (A) অ্যাক্সিট (B) মধ্যমস্তিষ্ক (C) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (D) সুম্যাকাক **Ans C**

Part 5

সমগ্র MCQ

01. কোনটিকে মাস্টার গ্রান্ড বলা হয়?
 (A) Pituitary gland (B) Thyroid gland
 (C) Parotid gland (D) Lymph gland **Ans A**
02. মানুষের মস্তিষ্কে কতোটি ভেন্ট্রিকল দেখা যায়?
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 **Ans C**
03. ইনকাস কীসের অংশ?
 (A) পিনা (B) বহিঃকর্ণ (C) মধ্যকর্ণ (D) অন্তঃকর্ণ **Ans C**
04. অক্সিজেন গ্রহি নয় কোনটি?
 (A) যকৃৎ (B) পিটুইটারি গ্রহি (C) হাইরয়েড গ্রহি (D) পিনিয়াল গ্রহি **Ans A**
05. চোখের আলোক সংবেদী অংশ কোনটি?
 (A) আইরিশ (B) লেন্স (C) কর্ণিয়া (D) রেটিনা **Ans D**
06. শুক্রাণু থেকে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?
 (A) ইস্ট্রোজেন (B) টেস্টোস্টেরন
 (C) প্রোল্যাকটিন (D) অক্সিটোসিন **Ans B**
07. মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড় কোনটি?
 (A) হিউমেরাস (B) ম্যালিয়াস (C) ইনকাস (D) স্টেপিস **Ans D**
08. নিচের কোন গ্রহিকে প্রভু গ্রহি বলা হয়?
 (A) পিনিয়াল (B) হাইরয়েড
 (C) প্যাথ্যাথাইরয়েড (D) পিটুইটারি **Ans D**

09. অন্যপারী প্রাণীতে কত জোড়া করোটিক দ্রাব্য থাকে?

- (A) ৪ (B) 10 (C) 12 (D) 14 **Ans C**

10. অটোপিক হরমোন-

- (A) মর্পেস সত্যক (B) প্রাণে সত্যক
 (C) নিরসরণে সত্যক (D) ভারসাম্য নির্দেশক **Ans D**

11. কোন করোটিক দ্রাব্য দ্রাব্য নিচের সত্যক করে?

- (A) অপটিক (B) অকুলোমেটর
 (C) অভিকর্ষিত (D) অলফাক্টরি **Ans D**

12. চোখের আলোক সংবেদী অংশ কোনটি?

- (A) অ্যাকুয়াস হিউমর (B) লেন্স (C) কর্ণিয়া (D) রেটিনা **Ans D**

13. সম্পূর্ণ সংবেদী দ্রাব্য নয় কোনটি?

- (A) ট্রাইক্লোরিনাল (B) অভিকর্ষিত (C) অলফাক্টরি (D) অপটিক **Ans A**

14. ভারসাম্য অঙ্গ কোনটি?

- (A) ইউট্রিকুলাস (B) স্যাকুলাস
 (C) অর্গান অব কটি (D) ককলিয়া **Ans A**

15. মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের সব ইঞ্জিন পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে?

- (A) থ্যালামাস (B) সেরেব্রাম
 (C) হাইপোথ্যালামাস (D) সেরেবেলাম **Ans B**

16. কর্ণিয়া ও লেন্সের মধ্যকারী একোড় যে তরল পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থাকে-

- (A) অ্যাকুয়াস হিউমর (B) ডিট্রিয়াস হিউমর
 (C) পেরিলিম্ব (D) এডোপিক **Ans A**

17. হাইরয়েড গ্রহি থেকে নিঃসৃত হরমোন নয় কোনটি?

- (A) ট্রাইঅ্যাক্সোডোফাইরোনিন (B) হাইমোসিন
 (C) হাইরগিন (D) ক্যালসিটোনিন **Ans B**

18. মধ্যকর্ণের হাড়গুলো যে পর্যায়ক্রমে অবস্থিত তা হলো-

- (A) ইনকাস, মেলিয়াস, স্টেপিস (B) মেলিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস
 (C) ইনকাস, স্টেপিস, মেলিয়াস (D) মেলিয়াস, স্টেপিস, ইনকাস **Ans B**

19. করোটিক দ্রাব্যের মধ্যে কোনটি মিলা?

- (A) অপটিক (B) ট্রিকলিয়াস
 (C) ভেগাস (D) অকুলোমেটর **Ans C**

20. অক্সিজেন গ্রহি নয় কোনটি?

- (A) যকৃৎ (B) পিটুইটারি গ্রহি
 (C) হাইরয়েড গ্রহি (D) পিনিয়াল গ্রহি **Ans A**

21. মানুষের বয়সসন্ধিকালের পর থেকে কোন গ্রহিটার অবক্ষয় ঘটতে থাকে?

- (A) পিটুইটারি (B) পিনিয়াল (C) হাইমাস (D) হাইরয়েড **Ans C**

22. পূর্ববয়স্কদের সেরিওস্পাইনাল ফ্লুইডের আয়তন কত?

- (A) 10-130 ml (B) 140-150 ml
 (C) 280-330 ml (D) 340-400 ml **Ans B**

23. ভায়োসেনসকালনের মধ্যস্থ গলকটির নাম কী?

- (A) প্রথম ভেন্ট্রিকল (B) দ্বিতীয় ভেন্ট্রিকল
 (C) তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (D) চতুর্থ ভেন্ট্রিকল **Ans C**

24. সন্ধ্য পিটুইটারি গ্রহি হতে নিঃসৃত হরমোন নয় কোনটি?

- (A) গ্যাটিনাইজিং (B) প্রোল্যাকটিন
 (C) অক্সিটোসিন হরমোন (D) ফলিকল উদ্দীপক হরমোন **Ans C**

25. লিফোসাইটের পরিপক্বতা নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?

- (A) লিফয়েড (B) অ্যাডেনয়েড (C) হাইমাস (D) অস্থিমজ্জা **Ans D**

26. অঙ্গ ক্ষরণকারী গ্রহির নাম হলো-

- (A) সিবেরিয়াস গ্রহি (B) প্যাট্রিমাল গ্রহি
 (C) হার্ডেরিয়ান গ্রহি (D) মিবোমিয়ার গ্রহি **Ans B**

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা

Part 1

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

♂ जनन प्रणाली (Male Reproductive System) :

যে ক্রান্তির মাধ্যমে ক্রান্তীয়রেখা থেকে উত্তরায়ন, দক্ষিণায়ন, পরিবর্তন এবং অক্ষান বক্রতা উদ্ভূত, তাকে ক্রান্তীয়রেখার মাঝে ক্রান্তীয় উত্তরায়নের মাঝে সঞ্চিত অক্ষের দুই অক্ষান্তর এবং ক্রান্তীয় দক্ষিণায়ন ও অক্ষান্তর মাঝে সঞ্চিত অক্ষের অক্ষান্তর (axial-twist) ক্রান্তীয় বলে। ক্রান্তীয় দুই (primary) অক্ষান্তর নাম ক্রান্তীয় (axiality)।

५. सुख-सन्तोष-वैराग्य-मार्ग-द्वारा-प्राप्त-हो-य-सक-त-है-

- (i) কাজের (ii) কর্মসম্পাদন (iii) কর্ম নিয়ন্ত্রণ
(iv) কর্মসম্পাদন (v) কর্মসম্পাদন

- 11/20/2019 11:20 AM

[illegible]

६. सुभाष चक्रवर्तय्य नाम अस्ति महान् ।

- सिनेमा सिटिंग
- डायनोमेट्रिक
- फोटोग्राफिक सिस्टम
- कलिकल सिद्धान्त दत्तमान
- कुति-प्रतिक दत्तमान
- आवाज सिग्नल

♂ नर प्रणाली (Male Reproductive System) :

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

প্রশ্ন	উত্তর
কৃষ্ণ উল্লসিত	বিজয়শর
	বিজয়লালি
শৌণ্ডিক বা জাম্ববন্তিক উল্লসিত	জম্বব
	জোনি
	ভালতা (লবিয়া মেছরা, লবিয়া মাইনরা)
বহিঃউল্লসিত	কুইউউউউউ
	ক্রেস্টিকেল প্রাই, ব্যাট্টেল প্রাই

५. श्री अन्नामल्ल स्वामिन्

মেনইয়াল সমস্যা	এডহেডেইজিস	পুলেরাইটিস
জরায়ব ক্যানসার	এক্সট্রিক গ্রেভনাইট	গর্ভাবস্থান সিন্ড্র

১. বঙ্গদেশে বঙ্গদেশের ভূমিকা :

পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
GH	GH	ADH	সোজা স্টেরন
FSH	FSH	টাইফয়েড স্টেরন	ইন্ট্রা স্টেরন
অ্যাড্রেনালিন	ADH	-	LH

১০. **অমরা বা প্রাচেন্টী (Placenta) :**

ଅନୁ ଓ ଆବୃତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ବିନିମୟର ମିଶ୍ରଣର ଉପସ୍ଥାପନା ଏ ସାଧୁକଣ୍ଠା ମିଶ୍ରଣ ଓ ବିଶେଷ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି କରୁ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । (Bhattacharya, 1978) ।

५. अमरावती नगरपालिका विभिन्न खानेपानी योजना

কঠিন → তরল	তরল → বাষ্প
O_2 , যুক্তকর, আর্দ্রতা, আর্দ্রতা আর্দ্রতা ও যুক্তকর, তরল, তরল আর্দ্রতা, আর্দ্রতা, তরল পানির পানির, পানির, পানির	CO_2 , ইজিরা, পানির ইজিরা, পানির, পানির ইজিরা, পানির, পানির

५. अथवा अथवा

- [illegible]

3. प्रसूत चरण की अवस्था (State of germ layers):

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন জাতির পরিকল্পনায় লোকসমূহকে একত্রিত করে, সেসেভার্স ও জায়েভার্স নামক যে সকল কেসমসের সুবিধা হয় তাদের প্রাচীন জর (Dyotans) করে। এই সকল জর মধ্যে জায়ে 'বিভিন্ন কল', 'জর' বা 'জর' বিভিন্ন জর বিভিন্ন জর। জায়ে 'গঠন' ও 'সিদ্ধান্তের' ব্যবহার উপায়ের উপায়। 'বিভিন্ন' প্রাচীন জায়ে পরিকল্পনা উপায়ের ব্যবহার।

অধীক্ষক	পূর্বের প্রদানসময় যে সকল গতি ও স্থান
একোভার্ম	১. যুদ্ধের পৌরসভা, জল এবং বৃষ্টির জল, কাল, নদ, জল, জল এবং জল। ২. জল ও জলস্রাব। ৩. জল, জলস্রাব এবং জল। ৪. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৫. জলস্রাব এবং জলস্রাব।
মোসোভার্ম	১. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ২. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৩. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৪. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৫. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৬. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৭. জলস্রাব এবং জলস্রাব।
একোভার্ম	১. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ২. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৩. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৪. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৫. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৬. জলস্রাব এবং জলস্রাব। ৭. জলস্রাব এবং জলস্রাব।

▲ अविवेक (In vitro Fertilization-IVF) :

প্রকৃতিগত পদ্ধতি বান দিয়ে কৃত্রিম পরিবেশে অরুদ্র বীজের অঙ্কন করে
 তরঙ্গ ১ টি বান কোষকে একত্রে রেখে নিম্নের ঘটনাবলী ইন্ডিউস
 ক্যাটালিইজেশন (in vitro fertilization) বা IVF বান।

৬. আই.ডি.এক (IVF) সাক্ষাৎ কিয়ত দূর।

বাংলাদেশে প্রথম টেস্ট টিউব স্ক্রীনিং করা হয় ২০০১ সালে। Dr. Robert G. Edward টিকিকা শায়ে মোকোলা পুরস্কার পান ২০১০ সালে। সুবিধার প্রথম টেস্টটিউব শিখ : Louise Joy Brown

निम्न वस्तु : १०५- साज्जद २१ कुपारी

लेखक: लेडी और पीटर हॉगन

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

→ IVF at 25% in vitro Fertilization

→ 1947-48 : एक नामिनी मक यह सर्व समाप्त हो गया है ।

— श्री कृष्णजी की लाल माला —

→ ৬. শব্দভিত্তিক বা শব্দকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা টেনিসভিত্তিক ঘরে কিছু ব্যক্তি থাকবে।
শায়েই কোনও ব্যক্তি

Part 2

At a glance

- পুষ্টিজননকালকে ভাগ করা যায়- দুই ভাগে
- মুখ্য জননায় হলো- শুক্রাণু/টেক্সিস
- শুক্রাণুর আকৃতি হলো- ডিম্বাকৃতির
- শুক্রাণুর আকৃতি হলো- উল্টানো নাশপাতি
- শুক্রাণুর ক্ষরণ ঘটায়- ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন
- টেক্সিসটেরন ক্ষরণ ঘটায়- ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন
- শুক্রাণুর ইনট্রাসিটিনিয়াল কোষসমূহকে উদ্দীপ্ত করে- লুটিনাইজিং হরমোন
- বৌন যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়- লুটিওট্রপিক হরমোন
- প্রস্টেট গ্রন্থি গ্যালাগন্যানসি - প্রস্টেট ক্যান্সার
- শুক্রাণুর আকৃতি- বাদাম বা কাঠবাদাম এর মতো
- শুক্রাণুর জরায়ুর প্রাচীরে আটকানো থাকে- গুভারিয়ান লিগামেন্ট দ্বারা
- শুক্রাণুর জরায়ুর প্রাচীরে আটকানো থাকে- গুভারিয়ান লিগামেন্ট দ্বারা
- মোট প্রজননকালে ডিম্বাণু ক্ষরিত হয়- ৪০০টি
- গ্রানুলোসা কোষ হতে নিঃসৃত হয়- ইস্ট্রোজেন হরমোন
- ডিম্বাণু উৎপাদন ও ইস্ট্রোজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে- গোন্যাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন
- গ্রানুলোসা কোষের ফলিকুল কর্পাস লুটিয়ামে পরিণত হয়- লুটিনাইজিং হরমোনের প্রভাবে
- বৌনের জননায় বিকাশ ও দুগ্ধ ক্ষরণে সহায়তা করে- লুটিওট্রপিক হরমোন
- জন্মের বৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে- গোন্যাডোট্রফিক হরমোন
- রাসায়নিকালীন মেয়েদের দেহে প্রথম পরিবর্তনকে বলে- খেলারচি
- অ্যান্ড্রালি (বপল) ও পিউবিক লোম গজাতে শুরু করে, একে বলে- পিউবারচি
- রাসায়নিকালীন পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে- James M. Tanner
- প্রথম রক্তচক্রের সূত্রপাতকে বলে- মেনারচি (menarche)
- প্রজননের পর্যায় ও দশাকে বলে- রজঃচক্র
- মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার সূচনা ঘটায়- রজঃচক্র
- প্রসিদ্ধে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে- গ্যামিটোজেনেসিস
- স্পার্মাটোগোনিয়া উৎপন্ন হয়- সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়ে
- প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) উৎপন্ন হয়- বৃদ্ধি পর্যায়ে
- চারটি হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটাইড তৈরি হয়- পূর্ণতা পর্যায়ে
- শুক্রাণু প্রতি সেকেন্ডে পথ অতিক্রম করে- ১-৪ মি. মি.
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ- শুক্রাণু
- শুক্রাণুর গ্রীবাতে সেন্ট্রিওল থাকে- ২টি
- শুক্রাণুর চলনে শক্তি জোগায়- মাইটোকন্ড্রিয়া
- পরিপক্ব প্রাইমারি ফলিকুলকে বলে- গ্রাফিয়ান ফলিকুল
- উর্গট রূপান্তরিত হয়ে গঠন করে- ডিম্বাণু
- জন্মপায়ীদের ক্ষেত্রে ভাইটেলিন আবরণীকে বলা হয়- জোনা পেলুসিডা
- মানুষের নিষেক সংঘটিত হয়- ডিম্বাণু বা ফেলোপিয়ান নালিতে
- হ্যাণ্ডলরিনোজ এনজাইম ক্ষরিত করে- করোনা রেডিয়াটা
- অণুনিষেক ঘটে- সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের
- ইমপ্লান্টেশন ঘটে- নিষেকের পর ৬-৯/৭-৮ দিনের মধ্যে
- জাইগোটের বিভাজনকে বলে- ক্রিভেজ
- মকলাতে কোষ থাকে- ১২-১৬টি
- মকলা বিভাজিত হয়ে গঠন করে- ব্লাস্টুলা
- ব্লাস্টোসিস্টে প্রতিটি কোষকে বলে- ব্লাস্টোসিস্ট
- ব্লাস্টোসিস্টের ভিতরে বলা হয়- ট্রফোব্লাস্ট
- জগীয় ও মাতৃকলায় গঠিত চাকতি আকৃতির গঠনকে বলা হয়- অমরা
- অমরা একটি- ফিটো ম্যাটারনাল অঙ্গ
- অমরা গঠিত হয়- নিষেকের ১২ সপ্তাহ পর
- প্রাস্টার ওজন প্রায়- ৬০০ গ্রাম
- শিশুর মাথায় চুল গজায়- ৫ম মাসে
- জরায়ুতে জন্ম সংঘাপিত হওয়ার পর থেকে ৮ম সপ্তাহ পর্যন্ত বলে- জন্ম
- ৮ম সপ্তাহে থেকে ভ্রূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুটিকে বলে- ফিটাস
- মাতৃগর্ভে শিশু প্রায়- ৯ মাস (৩৬-৪০ সপ্তাহ) থাকে
- মিসকারেজ হলো- গর্ভাবস্থায় জন্মের মৃত্যু ও জন্মের নির্গমন

- জেস্টেশন পিরিয়ড- ২৮০ দিন
- সাধারণত শিশুর ভ্রূমিষ্টকাল- ২৮০ দিন
- জরায়ু ফিটাসে অবস্থান করে- ৩৮ সপ্তাহ
- সবচেয়ে নিরাপদ গর্ভনিরোধক- কনডম ও ডায়াফ্রাম
- স্ত্রীলোকের কনডমকে বলা হয়- ফেম সিল্ড
- কপার I একপ্রকার- অয়নমুক্ত তামার তৈরি গর্ভনিরোধক
- গর্ভনিরোধক স্থায়ী পদ্ধতি- বন্ধ্যাকরণ
- In vitro কণাটির অর্থ- কাচের ভিতর
- বিশ্বের প্রথম টেস্টিউব বেবি- লুইস ব্রাউন
- ডিম্বাণু বাড়তে ইনজেকশন দিতে হয়- FSH
- পৃথিবীতে অনুরূপ দম্পতি- ১৫%
- বন্ধ্যা দম্পতির সংখ্যা- ১-২%
- সিমেনের মধ্যে শুক্রাণুর অনুপাতিকে বলে- অ্যাজুস্পার্মিয়া
- প্রতি cm³ বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ২০ মিলিয়নের কম হলে- অলিগোস্পার্মিয়া
- সন্তান জন্মগত পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করে- Cytomegalovirus-এর আক্রমণে
- দেহে উচ্চমাত্রার অ্যাক্রোজেনের উপস্থিতির লক্ষণ- পলিসিস্টিক গুভারি সিন্ড্রোম
- ডিম্বপাতের সমস্যা হয়- FSH কারণে
- ডাউন সিন্ড্রোম বলা হয়- ট্রাইসোমি-২১-কে
- সিফিলিস রোগের প্যাথোজেন হলো- *Treponema pallidum*
- সিফিলিস রোগের Incubation period- ১০-৯০ দিন
- সিফিলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়- চারটি পর্যায়ে
- গনোরিয়া রোগের প্যাথোজেন- *Neisseria gonorrhoeae*
- গনোরিয়া ইনকিউবেশন পিরিয়ড- ২-৫ দিন
- মূত্রথলি এবং মূত্রথলিতে প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়- গনোরিয়াতে
- বিশেষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বলে- AIDS
- AIDS এর প্যাথোজেন হলো- Human Immunodeficiency Virus
- AIDS এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড- ৬ মাস - ১০ বছর
- ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যৌনবাহিত রোগ- ক্র্যামাইডিয়া, গনোরিয়া ও সিফিলিস
- ভাইরাস দ্বারা যৌনবাহিত রোগ- হেপাটাইটিস, হার্পিস, এইডস
- পরজীবী দ্বারা যৌনবাহিত রোগ- পিউবিক উকুন, ক্যাবিস

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

- নিম্নের কোনটি জগীয় আবরণী নয়? [NU-Science : 13-14]
 (A) Allantois (B) Chorion (C) Limnion (D) Amnion **Ans C**
- নিম্নের কোন হরমোনটি রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে? [NU-Science : 13-14]
 (A) Progesterone (B) Cortisone
 (C) Thyroxine (D) Adrenaline **Ans A**
- ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমকে কি বলে? [NU-Science : 12-13]
 (A) সাইটোপ্লাজম (B) নিউক্লিয়াস
 (C) জোনা পেলুসিডা (D) উৎপ্লাজম **Ans D**
- পৌষ্টিক নালির ভিতরের আবরণ তৈরি করে কোনটি? [NU-Science : 11-12]
 (A) এন্ডোডার্ম (B) এন্ডোডার্ম (C) মেসোডার্ম (D) কোনোটাই নয় **Ans B**
- অ্যাক্রোসোম কোথায় পাওয়া যায়? [NU-Science : 11-12]
 (A) ডিম্বাণুতে (B) শুক্রাণুতে (C) ডিম্বাশয়ে (D) শুক্রাশয়ে **Ans B**
- নবজাতক বলা হয়- [NU-Science : 07-08]
 (A) জন্মের প্রথম দুই সপ্তাহ (B) জন্মের পর প্রথম তিন সপ্তাহ
 (C) জন্মের পর প্রথম চার সপ্তাহ (D) জন্মের পর প্রথম পাঁচ সপ্তাহ **Ans C**
- পাখির ডিম্বাণু কোন প্রকৃতির? [NU-Science : 03-04]
 (A) অ্যালিসিথাল (B) মাইক্রোসিসিথাল
 (C) ম্যাক্রোসিসিথাল (D) কোনোটিই নয় **Ans C**
- জন্মের আর্কেন্টেরন যে ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উল্লুত হয় তার নাম কী? [NU-Science : 03-04]
 (A) নেফ্রিডিওপোর (B) ব্লাস্টোপোর
 (C) প্রোসিসপোর (D) অ্যাটরিওপোর **Ans B**

Part 4**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর**

01. মহিলা হরমোন- [IU-D : 19-20]

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) প্রোজেস্টেরন (C) লুটিনাইজিং (D) সবগুলো **Ans D**

02. প্রথম টেস্ট টিউব বেবীর জন্ম হয় কত সালে? [IU-D : 19-20]

- (A) 1980 (B) 1987 (C) 1978 (D) 1979 **Ans C**

03. জন বিকাশের যে পর্যায়ে রক্তনালির উৎপত্তি হয়- [NSTU-A : 19-20]

- (A) ৪র্থ সপ্তাহ (B) ৫ম সপ্তাহ (C) ৩য় সপ্তাহ (D) ৬ষ্ঠ সপ্তাহ **Ans A**

04. উগোগনিয়ামের প্রকৃতি কী ধরনের? [PUST-A : 19-20]

- (A) ট্রিপ্লয়েড (B) হ্যাপ্লয়েড (C) ডিপ্লয়েড (D) পলিপ্লয়েড **Ans C**

Part 5**সম্ভাব্য MCQ**

01. মরুতার ভেতর তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হওয়ার দশকে বলে-

- (A) ক্রিভেজ (B) ব্লাস্টুলা (C) আর্কেন্টেরন (D) Differentiation **Ans B**

02. নারীর বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোন হরমোনের ভূমিকা নেই?

- (A) গ্রোথ হরমোন (B) অ্যাক্সোজেন (C) ইস্ট্রোজেন (D) ভ্যাসোপ্রেসিন **Ans B**

03. জাইগোট থেকে জন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয়-

- (A) স্পার্মাটোজেনেসিস (B) উওজেনেসিস (C) এমব্রায়োজেনেসিস (D) কানোটাই নয় **Ans C**

04. গ্যাস্ট্রুলার ভেতরের গহ্বরকে বলা হয়-

- (A) ব্লাস্টোসিল (B) সিলোম (C) আর্কেন্টেরন (D) কানোটাই নয় **Ans C**

05. নিষেকের ফলে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড কোষকে বলা হয়-

- (A) জার্মপোর (B) জাইগোট (C) সিনগ্যামি (D) কানোটাই নয় **Ans B**

06. কোন যৌনরোগের কারণে পুরুষে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি ঘটে?

- (A) গনোরিয়া (B) সিফিলিস (C) মাস্পস (D) এইডস **Ans A**

07. পুরুষের বীৰ্য ত্যাগের অক্ষমতার কারণ নয় কোনটি?

- (A) স্কেরোসিস (B) ডায়াবেটিস (C) যক্ষ্মা (D) স্পাইনাল ইনজুরি **Ans C**

08. তিনটি জনীয় স্তর গঠিত হয় কোন ধাপে?

- (A) নিষেক (B) ক্রিভেজ (C) গ্যাস্ট্রুলেশন (D) অর্গানোজেনেসিস **Ans C**

09. মাতৃদেহ ও জগের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে কোনটি?

- (A) অ্যামনিওন (B) কর্পাস লুটিয়াম (C) জার্মলেয়ার (D) অমরা **Ans D**

10. কোনটি পুরুষের জন্ম নিরোধক পদ্ধতি?

- (A) ডায়াপ্যাম (B) টিউবেকটমি (C) ইমপ্লান্ট (D) ভ্যাসেকটমি **Ans D**

11. পুংজননতন্ত্রের অংশ কোনটি?

- (A) ইপিডিডাইমিস (B) ফেলোপিয়ান টিউব (C) ডিম্বাশয় (D) জরায়ু **Ans A**

12. কোন রোগের কারণে মানুষের শ্বেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T₄ লিফোসাইট ধ্বংস হয়?

- (A) এইডস (B) গনোরিয়া (C) সিফিলিস (D) ট্রাইসোমি **Ans A**

13. Test tube baby করা হয় কখন?

- (A) ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে গেলে (B) স্বামীর কার্যকর শুক্রাণু না থাকলে (C) নারীতে অপরিণত ডিম্বপাত হলে (D) ডিম্বনালি পর্যন্ত শুক্রাণু যেতে অসমর্থ হলে **Ans D**

14. জরায়ুর সংকোচন ঘটায় কোন হরমোন?

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) রিলাক্সিন (C) প্রোজেস্টেরন (D) প্রোট্রোজেন **Ans A**

15. ইমপ্লান্টেশন কোথায় হয়?

- (A) অমরায় (B) ডিম্বনালিতে (C) জরায়ুতে (D) ডিম্বাশয়ে **Ans C**

16. নিচের কোনটি বহিঃজননীয় আবরণী?

- (A) করোনা রেডিয়েটা (B) জোনা পেলুসিডা (C) ভাইটেলাইনমেমব্রেন (D) অ্যালানটয়েস **Ans D**

17. জন বিকাশের সঠিক স্থান কোনটি?

- (A) ডিম্বাশয় (B) অমরা (C) ডিম্বনালি (D) জরায়ু **Ans D**

18. আর্কেন্টেরন কোথায় দেখা যায়?

- (A) ব্লাস্টুলায় (B) জাইগোটে (C) মরুলায় (D) গ্যাস্ট্রুলায় **Ans D**

19. কোনটি মেসোডার্ম স্তর হতে উৎপন্ন হয়?

- (A) পাকস্থলী ও রক্তনালি (B) হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক (C) জনন অঙ্গ ও যোজক কলা (D) চুল ও ফুসফুস **Ans C**

20. ১০ টি প্রাইমারি উওসাইট ও ১০টি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে কতটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণু তৈরি হবে?

- (A) ১০ ও ১০ (B) ১০ ও ২০ (C) ১০ ও ৪০ (D) ৪০ ও ৪০ **Ans C**

21. রজঃচক্রের কততম দিনে ওভুলেশন বা ডিম্বপাত ঘটে?

- (A) ১২ (B) ১৪ (C) ২৮ (D) ৩৭ **Ans B**

22. মানুষের নিষেক সংঘটিত হয় কোন অঙ্গে?

- (A) ফেলোপিয়ান নালি (B) ডিম্বাশয় (C) যোনি (D) জরায়ু **Ans A**

23. রজঃচক্রের ৭-১৪ তম দিনে কোন হরমোন ক্ষরিত হয়?

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) FSH (C) LH (D) GTH **Ans A**

24. জাইগোটের বিভাজনকে কি বলে?

- (A) ব্লাস্টুলেশন (B) গ্যাস্ট্রুলেশন (C) ক্রিভেজ (D) মরুলেশন **Ans C**

25. প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয় কোথা থেকে?

- (A) সিলোম (B) জনস্তর (C) খণ্ডক (D) নটোকর্ড **Ans B**

26. Azoospermia কি?

- (A) সিমেনে অপরিপক্ব শুক্রাণুর উপস্থিতি (B) সিমেনে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি (C) সিমেনে কমসংখ্যক শুক্রাণুর উপস্থিতি (D) সিমেনে স্বাভাবিক সংখ্যার শুক্রাণুর উপস্থিতি **Ans B**

27. ব্রীলিসের কোন অংশে জন বর্ধিত হয়?

- (A) ডিম্বাণু (B) ডিম্বনল (C) গর্ভাশয় (D) যৌন নিলয় **Ans C**

28. কোনটি মেসোডার্ম থেকে তৈরি হয়?

- (A) কঙ্কালতন্ত্র (B) শ্বসনতন্ত্র (C) মুখ গহ্বর (D) ত্বকীয় গ্রন্থি **Ans A**

29. সিফিলিসের পরবর্তী লক্ষণ কোনটি?

- (A) পায়ু অঙ্গুলে ঘা সৃষ্টি (B) লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায় (C) চোখের আইরিশে প্রদাহ (D) মুখের চারপাশে ঘা হওয়া **Ans A**

30. কোনটি পুংজননতন্ত্রের অংশ?

- (A) ফেলোপিয়ান নালি (B) ইনফান্ডিবুলাম (C) সারভিক্স (D) ক্রেমটাম **Ans D**

মানব দেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Human defence system) :

বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তত্ত্ব দেহকে রোগাক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি (immune system) বা মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (human defence system) বলে।

২. ইমিউন প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন কোষের ভূমিকা :

কোষের নাম	কাজ
লিম্ফোসাইট (লিম্ফোসাইট)	ফ্যাগোসাইটোসিস: প্রদাহকে ঘিরে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ক্ষরণ।
বোসোফিল	প্রদাহ সৃষ্টিতে হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্ষরণ।
ইউনিফিল	বহুকোষী জীবাণু ধ্বংস: দ্রুত অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় সাড়াদান।
ম্যাক্রোফেজ	ম্যাক্রোফেজের অনুকরণ।
নিউট্রোফিল	নির্দিষ্ট ইমিউন সাড়ার শনাক্তকারী কোষ (recognition cells) হিসেবে কাজ করে।
প্লাজমা কোষ	অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।
ম্যাক্রোফেজ	ফ্যাগোসাইটোসিস: বিষাক্ত রাসায়নিক ক্ষরণের মাধ্যমে বহিকোষীয় ধ্বংস কার্যক্রম; হেল্পার T-কোষের কাছে অ্যান্টিজেন উপস্থাপন: প্রদাহের সময় সাইটোকাইন ক্ষরণ করে।
মসি কোষ	প্রদাহের সঙ্গে জড়িত হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ।
B-কোষ	অ্যান্টিজেন নির্ভর ইমিউন সাড়ার সূত্রপাত ঘটায়। নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে হেল্পার T-কোষের সামনে তুলে ধরে।
সাইটোটক্সিক T-কোষ	টার্গেট কোষের কোষঝিল্লিতে যুক্ত হয়ে সরাসরি কোষকে ধ্বংস করে।
হেল্পার T-কোষ	সাইটোকাইন ক্ষরণ করে B-কোষ, সাইটোটক্সিক T-কোষ, NK কোষ ও ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে।
NK কোষ	ভাইরাস আক্রান্ত ও ক্যান্সার কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধ্বংস করে।

[Ref: আজমল + আশরাফ]

৩. অ্যান্টিবডি (Antibody) :

অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে যে প্রোটিনধর্মী বস্তু সংশ্লেষিত হয়ে উক্ত অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণিদেহে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে তাকে অ্যান্টিবডি (Antibody) বা ইমিউনোগ্লোবুলিন (Immunoglobulin) বলে।

৪. অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ :

অ্যান্টিবডির নাম (শতকরা পরিমাণ)	অবস্থান
IgG (৭৫-৮০)	দেহের সকল তরল পদার্থ যেমন: রক্ত, লসিকা, অত্র ও চিস্মা তরল।
IgA (১০-১৫)	অশ্রু, লালা, পরিপাক রস, রক্ত, লসিকা, নাক, কান, চোখ, শ্বাসনালি, পরিপাক নালি ইত্যাদি।
IgM (৫-১০)	রক্ত, লসিকা, B কোষের উপরিতল।
IgE (০.১)	মাস্টকোষ, বোসোফিল, ফুসফুস, ত্বক, মিউকাস আবরণী।
IgD (০.২)	রক্ত, লসিকা, লিম্ফোসাইট B কোষের উপরিতল।

৫. অ্যান্টিজেন (Antigen) :

যে কোন বিজাতীয় জীবাণু বা অবিষম দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন (Immunogen) বলে। হাঙ্গেরিয়ান অণুজীববিজ্ঞানী Ladislaus Deutsch (1903) সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন।

৬. অ্যান্টিজেনের সাধারণ ধর্ম :

রাসায়নিক গুরুত্ব : অ্যান্টিজেন প্রধানত প্রোটিন। কিন্তু অ্যান্টিজেন-পলিস্যাকারাইড ও লাইপোপ্রোটিন জাতীয় হয়।

বহিরাগত ধর্ম : বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া অ্যান্টিজেন সাধারণত বহিরাগত হয়।

আণবিক ভর : বিশেষ অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর ১০,০০০ ডাল্টনের বেশি।

সর্বাপেক্ষা ভালো অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর মোটামুটি ১,০০,০০০ ডাল্টন হওয়া প্রয়োজন। ইনসুলিনের আণবিক ভর ৫০০০ D।

প্রজাতি নির্দিষ্টতা : একই প্রজাতির অন্তর্গত সব প্রাণীর কলাতে প্রজাতি নির্দিষ্টতা অ্যান্টিজেন থাকে।

৭. বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিজেন :

১) এন্টোজেনাস : প্রাণিদেহের বাইরে উৎপন্ন হয়। যেমন : পরাগরেণু, দুগ্ধক পদার্থ, ভেজ পদার্থ, জীবাণু ইত্যাদি।

২) এন্ডোজেনাস : প্রাণিদেহের ভেতরে উৎপন্ন হয়। যেমন : লোহিত কণিকার ফরসম্যান অ্যান্টিজেন, স্তন্যপায়ীর স্বত্বপেও কার্ডিওলিপি।

৮. টিকা বা ভ্যাকসিন (Vaccine) :

কোনো রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে অথবা নিষ্ক্রিয় জীবাণুসত্তা দেহে প্রবেশ করিয়ে যে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তাকে ভ্যাকসিন (Vaccine) বা টিকা বলে। টিকায় বিদ্যমান অণুজীবগুলো (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃত হতে পারে।

৯. একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য :

- সারাজীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে।
- সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়।
- রোগের সংক্রমণ রোধ করে।
- খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়।
- মায়ের অনাক্রম্যতাকে সন্তানে পরিবাহিত করে।
- সুস্থিত, সজ্ঞা এবং নিরাপদ।

১০. সংযুক্ত টিকা বা যৌথ টিকা (Combined Vaccine) :

একাধিক রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যদি একটি মাত্র টিকা প্রদান করা হয়, তবে সেই প্রকার টিকাকে সংযুক্ত বা যৌথ টিকা বলে। যেমন : DPT। এই প্রকার টিকা প্রদানে ডিপথেরিয়া (Diphtheria), হুপিংকাশি বা পারটুসিস (Pertussis), টিটেনাস (Tetanus) এই তিনটি রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা যায়।

১১. সংযুক্ত টিকা বা যৌথ টিকার উদাহরণ :

- DT → ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের প্রতিষেধক।
- MMR → মাম্পস, মিজলস ও রুবেলা রোগের প্রতিষেধক।
- DP → ডিপথেরিয়া ও হুপিংকাশির টিকা প্রতিষেধক।

১২. EPI ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার রোগ :

EPI = Expanded Programme on Immunization; EPI ভুক্ত রোগের সংখ্যা = ৮টি। নিম্নে এগুলো দেওয়া হলো :

D	ডিপথেরিয়া	T	টিউবারকুলোসিস/বক্সা/BCG. (Bacillus Calmette Gurin)
P	পারটুসিস (হুপিংকাশি) DPT টিকা	I	ইনফ্লুয়েঞ্জা
T	টিটেনাস	H	হেপাটাইটিস বি.
M	মিসেলস (হাম) : মিসেলস টিকা		শেষ দুটো রোগ বর্তমানে যুক্ত হয়েছে।
P	পোলিও : OPV (Oral Polio Vaccine) [মুখে খাওয়ানো হয়]		

Part 2

At a glance

- Immunity শব্দটি ল্যাটিন যে শব্দ থেকে এসেছে- Immunis
- Father of Immunology বলা হয়- Edward Jenner-কে
- Founder of Microbiology বলা হয়- লুইপাস্তার-কে
- উটবিস্তের টিকা আবিষ্কার করেন- এডওয়ার্ড জেনার
- মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রধানত- ২ ধরনের
- স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না- মেমোরি B কোষ
- অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে- B লিম্ফোসাইট
- জ্বর ও শিশু মায়ের দেহ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে- মেমোরি কোষ
- প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরটি পরিচিত- নন-স্পেসিফিক নামে
- ত্বক কার্যকর প্রতিরক্ষক হিসেবে কাজ করে- ৪ ভাবে
- মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ- ত্বক
- একজন পরিণত মানুষের দেহে ত্বক থাকে- ৮ পাউন্ড
- ত্বকে গ্রন্থি থাকে- ঘেদ গ্রন্থি ও ঘামগ্রন্থি নামে
- ত্বক অগ্নীয় হবার কারণ- হায়ালুরনিক অ্যাসিড
- Self disinfecting organ হলো- ত্বক
- অতিবেগুনি রশ্মিকে ধ্বংস করে- মেলানিন
- Streptococcus এর সংক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে- ক্যাথিলেসিডিন
- দুধে জীবাণুনাশক পদার্থ থাকে- ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ
- অশ্রু, নাসিকা বিপ্লি ও লালায় থাকে- লাইসোজাইম
- যোনিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া- Lactobacillus
- দুটি প্রধান ফ্যাগোসাইট কণিকা হচ্ছে- নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ
- ধাঙড় কোষ হিসেবে কাজ করে- ম্যাক্রোফেজ
- প্রাণী প্রোটিনের অন্তর্গত- প্রায় ১০% কমপ্রিমেণ্ট
- ইন্টারফেরনের আণবিক ওজন- ২০-৩০ হাজার ডাল্টন
- দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ স্তর হচ্ছে- জ্বর
- দেহের তাপমাত্রাকে উচ্চতম মাত্রায় নির্ধারণ করে- পাইরোজেন
- তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরটি দু ধরনের কোষ- T কোষ, B কোষ নিয়ে গঠিত
- কিলার-T কোষ বিনষ্ট করে- ক্যানসার কোষকে
- দেহে প্রবর্তিত অ্যান্টিজেনদের ধ্বংস করে- Memory T-cells
- প্রতি সেকেন্ডে ২০০০টি অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে- প্রাণী কোষ (Plasma cells)
- বহুদিন বাঁচে এবং অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে- Memory B cells
- Antibody শব্দটি ব্যবহার করেন- Paul Ehrlich
- প্রত্যেক অ্যান্টিবডি হচ্ছে- ইমিউনোগ্লোবুলিন (সংক্ষেপে Ig)
- B-লিম্ফোসাইট কয়েক উপধরনের বিভক্ত যার একটি হচ্ছে- প্রাণী B কোষ
- প্রাণী B কোষ থেকে উৎপন্ন হয়- অ্যান্টিবডি
- অ্যান্টিবডির আণবিক ওজন- ১,৫০,০০০ - ৯,০০,০০০ ডাল্টন
- ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের আণবিক ওজন হচ্ছে যথাক্রমে- 50-70 Kd ও 23Kd
- প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে ডাইসালফাইড বন্ড রয়েছে- ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল
- সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন- Ladilas Deatch
- অ্যান্টিজেন প্রধানত- প্রোটিন
- কার্যকরী অ্যান্টিজেনের ভর সাধারণত- 10,000 ডাল্টন এর বেশি
- ইনসুলিনের আণবিক ভর- 5000D
- অ্যান্টিজেন প্রধানত- ২ ধরনের
- রসভিত্তিক অনাক্রম্যতায় ভূমিকা রাখে- B লিম্ফোসাইট
- দেহের প্রধান সৈনিক হিসেবে কাজ করে- অ্যান্টিবডি
- কোষের MHC মার্কার পাওয়া যায়- প্রাণীমাইগ্রিনে
- সর্বপ্রথম টিকা আবিষ্কার করেন- Dr. Edward Jenner (1796)
- ভ্যাকসিন শব্দটি যে ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে- ভ্যাকসিনাস
- মিশ্র ভ্যাকসিন হলো- MMR (Measles, Mumps and Rubella) ভ্যাকসিন
- উৎপাদনের ধরন অনুযায়ী ভ্যাকসিন বা টিকা- ৫ ধরনের
- পোলিও সৃষ্টি হয়- Enterovirus নামক একটি RNA ভাইরাস

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন
বিষয়বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

- মানবদেহে natural killer cells থেকে কোনটি নিঃসৃত হয়? [GST-A : 22-23]
 (A) HCl (B) Pyrogen
 (C) Perforin (D) Monokines **Ans C**
- ভাইরাসের আক্রমণে দেহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় কোনটি? [GST-A : 20-21]
 (A) ইন্টারফেরন (B) হিস্টোন
 (C) অ্যান্টিজেন (D) লাইসোসোম **Ans A**
- ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে কোনটি? [GST-A : 20-21]
 (A) অণুচক্রিকা (B) কমপ্রিমেণ্ট সিস্টেম
 (C) ভ্যাকসিন (D) ইন্টারফেরন **Ans B**
- পাইরোজেন- [IU-D : 19-20]
 (A) ডাইপেপটাইড (B) কার্বোহাইড্রেট (C) পলিপেপটাইড (D) লিপিড **Ans C**
- ব্যাকটেরিয়া নাশক- [IU-D : 19-20]
 (A) অশ্রু (B) লাইসোজাইম (C) স্পার্মিন (D) সবগুলোই **Ans D**
- মানুষের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়- [IU-D : 19-20]
 (A) লোম (B) লালা (C) ইন্টারফেরন (D) সিরুমেন **Ans C**
- লাইসোজাইম পাওয়া যায় নিচের কোন দুইটিতে? [NSTU-A : 19-20]
 (A) অশ্রু ও লালা (B) মূত্র ও লালা
 (C) রক্ত ও লালা (D) সেরাম ও প্রাণীম **Ans A**
- অ্যালার্জিকজনিত প্রতিক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অ্যান্টিবডি কোনটি? [NSTU-A : 19-20]
 (A) IgG (B) IgE (C) IgD (D) IgA **Ans B**
- Live attenuated vaccine হিসেবে কাজ করে না কোনটি? [PUST-A : 19-20]
 (A) রোটাবাইরাস (B) ইয়োলো ফিভার (C) টিটেনাস (D) মাম্পস **Ans C**
- গর্ভস্থায় অমরা অতিক্রম করে অঙ্গের দেহে প্রবেশ করে কোন অ্যান্টিবডি? [PUST-A : 19-20]
 (A) IgD (B) IgM (C) IgG (D) IgA **Ans C**

Part 4

সম্ভাব্য MCQ

- নিম্নের কোনটি অ্যালার্জিক বিক্রিয়ার সাথে জড়িত?
 (A) IgG (B) IgM (C) IgD (D) IgE **Ans D**
- শরীরের কোন স্থানে লাল, গরম ও ফুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনটি দায়ী?
 (A) IgG (B) IgA (C) IgM (D) IgE **Ans D**
- মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কোন কোষটি?
 (A) T-লিম্ফোসাইট (B) মনোসাইট (C) প্রাণীম ফোল (D) নিউট্রোফিল **Ans C**
- নিচের কোন এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে প্রধান ভূমিকা পালন করে?
 (A) এন্টারোকাইনেজ (B) লাইসোজাইম
 (C) টায়ালিন (D) কাইমোট্রিপসিন **Ans B**
- মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অংশ কোনটি?
 (A) ফ্যাগোসাইট (B) প্রদাহ (C) সেরুমেন (D) ইন্টারফেরন **Ans C**
- Phagocytosis এর সাথে জড়িত নয় কোনটি?
 (A) কুফকার কোষ (B) হিস্টিওব্লাস্ট (C) NK কোষ (D) মনোসাইট **Ans B**
- BCG টিকা কোন রোগের জন্য দেয়া হয়?
 (A) পোলিও (B) হেপাটাইটিস বি (C) কলেরা (D) যক্ষ্মা **Ans D**
- কোন গ্রন্থি হতে অশ্রু নিঃসৃত হয়?
 (A) ল্যাক্রিমাল (B) হার্ডেরিয়ান (C) থ্যালামাস (D) মেমোরিয়ান **Ans A**
- নিচের কোন কোষটিকে Treg বলা হয়?
 (A) B-lymphocyte (B) Regulatory T-Cell
 (C) Cytotoxic T-Cell (D) Helper T-Cell **Ans B**
- নিচের কোনটি Giant cell তৈরি করে?
 (A) নিউট্রোফিল (B) ম্যাক্রোফেজ
 (C) হেলপার T-কোষ (D) NK-কোষ **Ans B**
- কোনটি মিশ্র ভ্যাকসিন?
 (A) MMR (B) BCG (C) OPV (D) IPV **Ans A**
- কোন অ্যান্টিবডির নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে মানব শরীরে?
 (A) Ig A (B) Ig B (C) Ig D (D) Ig E **Ans D**

জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন

Part 1

স্বকৃতপূর্ণ তথ্যাবলি

১. মেডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র:

৬ মেডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণের সূত্র:

মনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ক্যাবির বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। একে জননকোষ বিতরণের সূত্র (Law of Purity of Gametes) বা মনোহাইব্রিড ক্রসের (Law of Monohybrid Cross) সূত্রও বলা হয়।

৬ মেডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র:

দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ন করলে প্রথম অপত্য বংশে (F₁ জন) শুধু একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী সময় গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে মিলিত হয়। একে ডাইহাইব্রিড ক্রসের (Law of di hybrid cross) সূত্রও বলা হয়।

৬ মেডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ:

১৯০০ সালে মেডেলের সূত্র পুনরাবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পর হতেই বিভিন্ন ক্রমবিকৃত পরীক্ষায় মেডেলীয় অনুপাতের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. মেডেলের সূত্রের আপাত ব্যতিক্রম ২. মেডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম।

১. লিথাল জিন বা ঘাতক জিন বা মারণ জিন (Lethal Gene):

কোনো জীবের কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিথাল জিন বলে। এটি জীবের জিন বা DNA এর কোনো অংশের মিউটেশনের কারণে ঘটে থাকে।

৬ লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য:

- এক প্রকার মিউট্যান্ট জিন যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।
- প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- জাইগোট বা জুগ অবস্থায় জীব মারা যায়।

৬ লিথাল জিনের উদাহরণ:

- ক্রীপার মুরগি
- মানুষে জন্মগত ইকথিওসিস
- পাবিধীন বাচ্চুর
- মানুষে ব্র্যাকিফ্যালাজি
- মানুষে থ্যালাসেমিয়া
- হিমোফিলিয়া
- মানুষে ইনফ্যান্টাইল আম্যারটিক ইডিওসিস

১. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance):

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত অনেকগুলো নন-অ্যালিলিক জিন সম্মিলিতভাবে যদি কোনো জীবের একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন তাদের পলিজিন বা মাল্টিপল জিন (polygene or multiple gene) বলে। এই পলিজিনের বংশানুক্রমিক সম্ভারণকে বহুজিনীয় বংশগতি বা পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বা পরিমাণগত উত্তরাধিকার বলে। পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ফিনোটাইপের ক্রমাগত ভিন্নতা প্রদান করে। জিনতত্ত্ববিদ K. Mather (1954) পলিজিন নামকরণ করেন।

৬ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্সের বৈশিষ্ট্য:

১. দুই বা ততোধিক জিন দ্বারা ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়।
২. গণনার চেয়ে পরিমাপ দ্বারা এদের মাত্রা নির্ণয় করা হয়।
৩. জীবের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়।

৬ পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট রোগ:

- অটিজম
- ক্যান্সার
- ডায়াবেটিস টাইপ ২

১. সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder):

সাধারণত 'X' ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিংকড জিন (Sex-linked gene) বলে। সেক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের দেহে যে বিভিন্ন ধরনের বংশগতীয় অস্বাভাবিকতা ও রোগ সৃষ্টি হয় তাদের একত্রে লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা বা সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (sex-linked disorder) বলে।

৬ মানুষের কয়েকটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা):

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ১. লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা | ১০. হিমোফিলিয়া |
| ২. ভুশিনি মাসকুলার ডিসট্রফি | ১১. রাতকানা |
| ৩. ফ্রাঙ্গাইল X সিনড্রোম | ১২. হিমোফিলিয়া |
| ৪. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস | ১৩. মাসকুলার ডিসট্রফি |
| ৫. স্প্যাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া | ১৪. টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন |
| ৬. এক্সোডার্মাল ডিসপ্লাসিয়া | ১৫. বর্ণান্ধতা |
| ৭. অপটিক আট্রফি | ১৬. জুভেনাইল গ্লুকোমা |
| ৮. হোয়াইট ফোরলক | ১৭. মায়োপিয়া |
| ৯. হাইপারট্রাইকোসিস | |

১. ABO রক্ত গ্রুপ (ABO-Blood group):

লেখিত রক্তকণিকার প্রাজমায়েমের কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে ABO রক্ত গ্রুপ বা সংক্ষেপে রক্তগ্রুপ (blood group) বলা হয়।

৬ ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

A	• RBC-র অ্যান্টিজেন: অ্যান্টিজেন-A • প্রাজমার অ্যান্টিবডি: অ্যান্টিবডি- b • যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে: A, AB • যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে: A, O
B	• RBC-র অ্যান্টিজেন: অ্যান্টিজেন-B • প্রাজমার অ্যান্টিবডি: অ্যান্টিবডি- a • যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে: B, AB • যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে: B, O
AB	• RBC-র অ্যান্টিজেন: অ্যান্টিজেন- A ও B • প্রাজমার অ্যান্টিবডি: নেই • যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে: AB • যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে: A, AB, B, O
O	• RBC-র অ্যান্টিজেন: নেই • প্রাজমার অ্যান্টিবডি: অ্যান্টিবডি- a ও b • যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে: A, B, AB, O • যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে: O

১. বিবর্তন (Evolution):

কোনো জীবের সরল অবস্থা থেকে জটিলতার দিকে পর্যায়ক্রমিক অতি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলে। বিবর্তনের ফলে অধিকতর জটিল জীবের সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৬ বিবর্তন সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদসমূহ:

প্রবক্তা	মতবাদ
ল্যামার্ক	অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম মতবাদ/ল্যামার্কিজম।
চার্লস রবার্ট ডারউইন	প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ/ ডারউইনজম।
অগাস্ট ভাইজম্যান	জার্মপ্রাজম মতবাদ।
হগো দ্যা ভিস	পরিব্যক্তি মতবাদ।

Part 2

At a glance

- ক্রোমোসোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থানের নাম- লোকাস
- জিনদ্বয় একত্রে থাকার অবস্থাকে বলে- অ্যালিলোমর্থ
- জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের প্রতীকী পঠনকে বলে- জিনোটাইপ
- জীবের প্রকাশিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে বলে- ফিনোটাইপ
- যেসব ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাদের- সেক্স ক্রোমোসোম বলে
- ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে একজোড়া- Sex chromosome
- মেডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম হচ্ছে- অসম্পূর্ণ প্রকটতা, সমপ্রকটতা ও লিঙ্গাল জিন
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিন- ইন্টারমিডিয়েট জিন
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ- সন্ধামালতি (*Mirabilis galapa*)
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার আবিষ্কারক- কার্ল করেল
- সমপ্রকটতার উদাহরণ- আশাশুনিয়ান ঘোরণ/ঘুরণ
- লিঙ্গাল জিন এর আবিষ্কারক- ফরাসি জিনতত্ত্ববিদ লুসিয়েন ক্যামেনো
- মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত- ৯ : ৩ : ৩ : ১
- দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাহলে এ অবস্থাকে বলা হয়- সমপ্রকটতা
- পরিপূরক জিন এর ফিনোটাইটিক অনুপাত- ৯ : ৭
- যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে বলে- এপিষ্ট্যাটিক জিন
- যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিন- হাইপোস্ট্যাটিক জিন
- প্রকট এপিষ্ট্যাটিক জিনের আবিষ্কারক- বেটসন এবং পান্টে
- পলিজিনের প্রভাব ক্রমবিক্রম বিধায় একসূত্র চরিত্রকে বলা হয়- মাত্রিক চরিত্র
- পলিজিনের ফিনোটাইটিক অনুপাত হলো- ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১
- পলিজিনের নামকরণ করেন- K. mather
- নিম্নো বাবা এবং ককেশিয়ান মাতার সন্তান হবে- মিউল্যাটো
- নারী সদস্যের যেসব গ্যামেট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু থাকে- X ক্রোমোসোম
- নারীর ক্রোমোসোমকে বলা হয়- হোমোগ্যামেটিক সেক্স
- নারীর গ্যামেটকে বলা হয়- হোমোগ্যামেট
- পুরুষ সদস্যের গ্যামেট সৃষ্টি হয়- দু'ধরনের
- পুরুষের ক্রোমোসোমকে বলা হয়- হেটারোগ্যামেটিক সেক্স
- পুরুষের গ্যামেটকে বলা হয়- হেটারোগ্যামেট
- মানুষের এ পর্যন্ত সেক্স-লিংকড জিন পাওয়া গেছে- ৬০টি
- মানুষের Y জিন (হোলান্থ্রিক জিন) নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য হলো- কানের লোম
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার বাহিত হয়- X ক্রোমোসোম দ্বারা
- সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার রোগের জিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই- প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির
- সেক্স লিংকড জিন মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়- হোমোজাইগাস অবস্থায়
- Generation skip দেখা যায়- সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার-এর ক্ষেত্রে
- লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না- লাল সবুজ বর্ণাক ব্যক্তি
- হিমোফিলিয়া হলো- বংশগতভাবে সম্ভারণশীল রুটি
- হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে- প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিনের কারণে
- হিমোফিলিয়ার আবিষ্কারক- John Conrad Otto
- হিমোফিলিক জিনের বাহক ছিলেন- মহারানি ভিক্টোরিয়ার ২ কন্যা
- হিমোফিলিয়া A কে বলা হয়- রাজকীয় হিমোফিলিয়া
- মানবদেহে অ্যান্টিজেন রয়েছে- ৪০০ ধরনের প্রায়
- 'A' ব্লাড গ্রুপের মানুষ রক্ত গ্রহণ করতে পারে- 'A' এবং 'O' হতে
- অ্যান্টিজেনের ওপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তগ্রুপ- ২১টি
- মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন- কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার
- Rh ফ্যাক্টরের আবিষ্কারক- কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার ও উইনার

- Rh ফ্যাক্টরের নামকরণ করা হয়- রেসাস বানরের নাম অনুসারে
- Rh অ্যান্টিজেন থাকে- Rh পজিটিভ-এ
- Rh অ্যান্টিজেন অনুপস্থিত- Rh নেগেটিভ-এ
- ইংরেজ দার্শনিক Herbert spencer সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন- Evolution
- বিবর্তনের জনক- এম্পিডোক্লিস
- বিভিন্ন জাত, জারাইটি বা উপজাতির সৃষ্টি হয়- মাইক্রো বিবর্তন-এর ফলে
- উপজাতি থেকে প্রজাতির সৃষ্টি হয়- ম্যাক্রো বিবর্তন-এর ফলে
- অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম মতবাদ বা ল্যামার্কিজম-এর প্রবর্তক- ল্যামার্ক
- প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম-এর প্রবর্তক- ডারউইন
- জার্মপ্লাজম/জার্মপ্লাজম-সোম্যাটোপ্লাজম মতবাদ-এর প্রবর্তক- ভাইজম্যান
- পুনরাবৃত্তি মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত পুনরাবৃত্তি করে- জাতিগত
- প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ প্রকাশিত হয়- ১৮৫৯ সালে
- ডারউইন বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ভাগ করেছে- ৬টি ধাপে

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

- যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাকে বলে- [NU-Science : 14-15]
 (A) ইপিষ্ট্যাটিক জিন (B) হাইপোস্ট্যাটিক জিন
 (C) প্রচ্ছন্ন জিন (D) কোনোটিই নয় **Ans(B)**
- 'The theory of Natural Selection'- কে প্রবর্তন করেন? [NU-Science : 12-13]
 (A) Charles Robert Darwin (B) Carolus Linnaeus
 (C) Antony Van Leeuwenhoek (D) Aristotle **Ans(A)**
- অপের বা শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনের নাম কি? [NU-Science : 12-13]
 (A) Epistasis (B) Lethal gene
 (C) Complementary gene (D) Sex-Linked gene **Ans(B)**
- কোনটি সমগোত্রীয় নয়? [NU-Science : 11-12]
 (A) হাঙ্গর (B) ইলিশ
 (C) তিমি (D) রুই **Ans(C)**
- কখন মেডেলের সূত্র প্রথম পুনরাবিষ্কার করা হয়? [NU-Science : 09-10]
 (A) ১৮৬৬ খ্রিঃ (B) ১৯২১ খ্রিঃ
 (C) ১৯০০ খ্রিঃ (D) ১৯০১ খ্রিঃ **Ans(C)**
- জীবের মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনকে বলা হয়- [NU-Science : 09-10]
 (A) ডমিনেন্ট জিন (B) বাইভিৎ জিন
 (C) লিথাল জিন (D) কমপ্লিমেন্টারি জিন **Ans(C)**
- যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে বলে- [NU-Science : 08-09]
 (A) Lethal gene (B) Complementary gene
 (C) Hypostatic gene (D) Epistatic gene **Ans(C)**
- কোনটি মানুষের সেক্স-লিংকড জিন নয়? [NU-Science : 07-08]
 (A) ডায়াবেটিস (B) রাতকানা
 (C) হিমোফিলিয়া (D) বর্ণান্ধতা **Ans(A)**
- সার্বজনীন দাতা কোন গ্রুপের রক্ত? [NU-Science : 05-06]
 (A) A গ্রুপের (B) B গ্রুপের
 (C) AB গ্রুপের (D) O গ্রুপের **Ans(D)**
- অভিব্যক্তির মূল উপাদান হিসেবে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির কথা সর্বপ্রথম কোন বিজ্ঞানী উল্লেখ করেন? [NU-Science : 03-04]
 (A) দ্য ফ্রিজ (B) জুলিয়ান হার্ডলে
 (C) আর্নস্ট হেকেল (D) আলফ্রেড ওয়ালেস **Ans(C)**
- কোন রক্তগ্রুপের ব্যক্তিকে সার্বজনীন দাতা (universal donor) বলা হয়? [NU-Science : 01-02]
 (A) A-রক্ত গ্রুপ (B) AB-রক্ত গ্রুপ
 (C) B-রক্ত গ্রুপ (D) O-রক্ত গ্রুপ **Ans(D)**

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

Part 4

01. হিমোশাইটিক ডিজিজ অব নিউবর্ন-এর জন্য কোনটি দায়ী? [GST-A : 23-24]
 A) ফ্রটিং ফ্যাক্টর B) লিখাল জিন
 C) পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স D) রেসাস ফ্যাক্টর (Ans D)
02. মেডেল তাঁর মটরটটি গবেষণায় কত জোড়া বাহ্যিক বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য
 ফুটিয়ে তুলেছিলেন? [GST-A : 22-23]
 A) 2 B) 3 C) 6 D) 7 (Ans D)
03. AB গ্রুপের ব্যক্তির কোন কোন গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে? [GST-A : 21-22]
 A) AB⁺, AB⁻ B) B⁺, AB⁺
 C) O⁺, AB⁺, AB⁻ D) A⁺, B⁺, O⁺ (Ans A)
04. পরিপূরক জিন-এর ফিনোটাইপিক অনুপাত- [GST-A : 21-22]
 A) 9 : 3 : 3 : 1 B) 1 : 2 : 1
 C) 13 : 3 D) 9 : 7 (Ans D)
05. মাসকুলার ডিস্ট্রফি রোগের লক্ষণ- [GST-A : 21-22]
 A) সারা শরীরে ঘন লোম হওয়া B) বর্ণান্ধতা
 C) পেশির দুর্বলতা ও সময়ের অভাব D) অ্যান্টিবডি তৈরি না হওয়া (Ans C)
06. *Lathyrus odoratus* প্রজাতির দুইটি সাদাফুল বিশিষ্ট আলাদা Strain সংকরায়ন
 করা হল F₂ জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত কত হবে? [KU-A : 19-20]
 A) 7 : 8 B) 7 : 9 C) 9 : 7 D) 13 : 3 (Ans C)
07. কে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ প্রদান করেন? [CoU-A : 19-20]
 A) ল্যামার্ক B) ডারউইন C) মেডেল D) ভাইজম্যান (Ans B)
08. কোন জিনোটাইপ হতে বেশি ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হবে? [IU-D : 19-20]
 A) aa Rr B) Aa Rr C) Aa RR D) Aa rr (Ans B)
09. মেডেলের ১ম সূত্রকে বলে- [IU-D : 19-20]
 A) ক্রমোসোম তত্ত্ব B) পৃথকীকরণের সূত্র
 C) প্যানজেনেসিস তত্ত্ব D) স্বাধীন সংঘর্ষণের সূত্র (Ans B)
10. যে জিন নন-অ্যালিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে বলে- [NSTU-A : 19-20]
 A) প্রাণঘাতী জিন B) পরিপূরক জিন
 C) এপিস্ট্যাটিক জিন D) হাইপোস্ট্যাটিক জিন (Ans C)
11. দৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাটিক-এর ফিনোটাইপিক অনুপাত হলো- [PUST-A : 19-20]
 A) 9 : 7 B) 13 : 3
 C) 9 : 3 : 3 : 1 D) 1 : 2 : 1 (Ans A)
12. "Genetics" শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন? [JUST-FBSTA : 19-20]
 A) জোহান মেডেল B) উইলিয়াম বেটসন
 C) দ্য ব্রিস D) ক্রেসল (Ans B)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. কোনো F₁ জীবকে তার প্যারেন্টের সাথে ক্রস করানোর নাম-
 A) টেস্ট ক্রস B) ব্যাক ক্রস
 C) মনোহাইব্রিড ক্রস D) ডাইহাইব্রিড ক্রস (Ans B)
02. দৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাটিক-এর অনুপাত হলো-
 A) ১৩ : ৩ B) ৯ : ৭
 C) ১ : ২ : ১ D) ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ (Ans B)

03. রঙিন জিন থাকা সত্ত্বেও হোয়াইট লেগহর্ন মুরগীর পালক সাদা হয় কেন?
 A) সমপ্রকটতা B) পরিপূরক জিন
 C) প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাটিক D) প্রকট এপিস্ট্যাটিক (Ans D)

04. ঘাসফড়িং-এর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি কোনটি?
 A) XX-XY B) XX-XO C) ZZX-ZO D) ZZ-ZW (Ans B)

05. প্রচ্ছন্ন লিখাল জিন কোন অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়?
 A) হোমোজাইগাস B) হেটেরোজাইগাস
 C) হেমিজাইগাস D) মনোজাইগাস (Ans A)

06. দৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাটিক-এর উদাহরণ কোনটি?
 A) মুক-বধিরতা B) থ্যালাসেমিয়া
 C) রাতকানা D) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Ans A)

07. জীবন্ত জীবাশ্ম কোনটি?
 A) *Archaeopteryx* B) *Platypus*
 C) *Eohippus* D) *Equus* (Ans B)

08. সমপ্রকটতার ক্রিয়ায় F₂ জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত কত?
 A) 1 : 2 : 1 B) 2 : 1 C) 4 : 1 D) 3 : 1 (Ans A)

09. জীবের মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনকে বলা হয়-
 A) Dominant gene B) Binding gene
 C) Lethal gene D) Complementary gene (Ans C)

10. 'Theory of natural selection' মতবাদটি কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয়?
 A) Origin of organic evolution B) Origin of species
 C) Philosophic zoologique D) Origin of life (Ans B)

11. লিঙ্গ-জড়িত বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
 A) রাতকানা B) অন্ধত্ব C) বর্ণান্ধতা D) ক্ষীণদৃষ্টি (Ans B)

12. নিম্নের কোন রোগের জন্য লিখাল জিন দায়ী?
 A) থ্যালাসেমিয়া B) ডায়াবেটিস C) ক্যানসার D) অটিজম (Ans A)

13. নিচের কোন অনুপাতটি মেডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম নয়-
 A) 2 : 1 B) 13 : 3 C) 9 : 7 D) 3 : 1 (Ans D)

14. কোনটি সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্য নয়?
 A) Muscular dystrophy B) Haemophilus
 C) Color-Blindness D) Skin color (Ans D)

15. কোন ব্লাড গ্রুপে কোন অ্যান্টিজেন নাই?
 A) O B) A C) B D) AB (Ans A)

16. প্রকট এপিস্ট্যাটিকের ফিনোটাইপিক অনুপাত কত?
 A) ৯ : ৭ B) ১৩ : ৩ C) ৯ : ৩ D) ১ : ২ : ১ (Ans B)

17. বর্ণান্ধ কন্যা কখন জন্মায়?
 A) স্বাভাবিক মাতা, বর্ণান্ধ পিতা B) বাহক মাতা, বর্ণান্ধ পিতা
 C) বর্ণান্ধ মাতা, স্বাভাবিক পিতা D) বাহক মাতা, স্বাভাবিক পিতা (Ans B)

18. একটি হোমোজাইগাস প্রকট লাল ফুলের গাছের সঙ্গে একটি প্রচ্ছন্ন সাদা ফুলের
 গাছের ক্রস করলে F₁ জনুতে প্রাপ্ত ফলাফল কী?
 A) সমস্ত লাল ফুলের গাছ B) ৫০% লাল ও ৫০% সাদা ফুলের গাছ
 C) সমস্ত সাদা ফুলের গাছ D) সব গোলাপি ফুলের গাছ (Ans D)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

৮৯ প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান :

বিজ্ঞানীর নাম	অবদান
আরিসটটল	প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত প্রথম তথ্য উপস্থাপন করেন।
উইলিয়াম হার্ভে	পাখির প্রজননকালীন আচরণ ও অপত্য লালনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।
অগাস্ট কোথ	সর্বপ্রথম Altruism শব্দটি প্রয়োগ করেন।
কার্ল ভন ফ্রিস	মৌমাছির নৃত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন।

৯০ সহজাত আচরণ (Innate Behaviour) :

অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় (reflex action) সৃষ্টি সতল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্তিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট (Species specific), শিখণবিহীন ও অংশত আচরণই হলো সহজাত আচরণ।

৯১ সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য : ১। সহজাত আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট।

২। সহজাত আচরণ উদ্ভাবিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত।

৩। জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না।

৪। সহজাত আচরণ বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তিত থাকে।

৫। অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে সহজাত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে।

৯২ চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস :

উদ্দেশ্যের প্রভাবে কোনো বাহ্যিক লক্ষ্য সংক্রান্ত বা গতিপথ সংক্রান্ত (directional) জীবদেহের সামগ্রিক চলনই হলো ট্যাক্সিস।

৯৩ ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য : • এটি সম্পূর্ণ আনুমানিক প্রতিক্রিয়া।

• এটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না।

• প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিখণহীন।

• খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।

• দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ দৃঢ় জড়িত থাকে।

• দিকমুখি চলন সরাসরি উদ্দেশ্য শক্তির সমানুপাতিক।

৯৪ ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ :

৯৫ দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে :

ট্যাক্সিসের নাম	ধরন
ধনাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্দেশ্যের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।
ঋণাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্দেশ্যের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

৯৬ দিকমুখিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস :

১. ক্লাইনোট্যাক্সিস	৩. নেমোট্যাক্সিস	৫. ট্রোপোট্যাক্সিস
২. মেনোট্যাক্সিস	৪. টেলোট্যাক্সিস	

৯৭ উদ্দেশ্যের উৎসের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস :

১. ফটোট্যাক্সিস	৫. থার্মোট্যাক্সিস	৯. হাইড্রোট্যাক্সিস
২. অ্যানিমোট্যাক্সিস	৬. কেমোট্যাক্সিস	১০. স্যাপেক্স ট্যাক্সিস
৩. রিওট্যাক্সিস	৭. থিগমোট্যাক্সিস	১১. গ্যালভানোট্যাক্সিস
৪. জিওট্যাক্সিস	৮. ফোনোট্যাক্সিস	

৯৮ শিখন বা শিখন আচরণ (Learning or Learning behaviour) :

প্রাণীর যে আচরণ শিখন, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাহলে শিখন বা শিখন আচরণ বা শিক্ষণীয় আচরণ (Learning behaviour) ক্যা হয়।

৯৯ শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য :

১. শিখন আচরণ জটিল প্রকৃতির, যাহা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২. এ আচরণ স্বভাবজাত নয়, এমনকি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়।

৩. এই আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অভিযোজনীয়।

৪. এ আচরণ প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।


৫. এটি উদ্দেশ্য ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে।

৬. সাধারণত উচ্চ শ্রেণির প্রাণীতে এই আচরণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রদর্শিত হয় না।

১০০ বাংলাদেশ (তিন প্রজাতির), ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি :

বাংলাদেশে প্রাপ্ত তিন প্রজাতির মৌমাছি :		
(i) <i>Apis indica</i>	(ii) <i>Apis dorsata</i>	(iii) <i>Apis florea</i>
ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি :		
(i) <i>Apis mellifera</i>	(ii) <i>Apis adamsoni</i>	

১০১ মৌমাছির জাত : একটি মৌমাছিকে তিন জাতের বা কাস্টের (caste) সদস্য মৌমাছি দেখা যায়। যেমন : একটি রানি (Queen), কয়েকশত পুরুষ (drone) এবং কয়েক হাজার কর্মী বা শ্রমিক (worker)। শ্রমবণ্টনের ভিত্তিতে এদের দৈনিক গঠনের পার্থক্য দেখা যায়।



১০২ মৌমাছির বিভিন্ন জাতের কাজ :

মৌমাছির নাম	কাজ
রানি মৌমাছি	- ডিম পাড়া। - কলোনির প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা। - ফেরোমোনের অগ্রিকেননিক অ্যাসিডের (Oxydecanoic acid) সাহায্যে মৌমাছির বিভিন্ন সদস্যদের সংযুক্ত রাখা। - এরা অধিকার বাড়া উৎপাদন করে কলোনির আকৃতি সৃষ্টি করে।
পুরুষ মৌমাছি	- সঙ্গম উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করা। - প্রজাতির বংশ রক্ষা করা। - কলোনির তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে।
কর্মী মৌমাছি	- মৌমাছির পাহারা দেওয়া ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করা। - মৌমাছির তাপমাত্রা ও অর্ধতা বজায় রাখা। - রানির পরিচর্যা করা। - ক্রডের বিভিন্ন সদস্যদের যত্ন নেওয়া, খাদ্য প্রদান করা, মোম উৎপাদন ও ঢাক গঠন করা। - খাদ্যের অনুসন্ধান। - নেকটার, পানি, রেণু ইত্যাদির সাহায্যে মধু সৃষ্টি করা। - পরিষ্কার অনুযায়ী অন্য কর্মী মৌমাছিকে হত্যা করা। - প্রোপোলিস উৎপাদন করা।

১. রাজকীয় জেলি (Royal jelly) :

কমী মৌমাছির গলবিল থেকে নিষ্কৃত পরাগ, পাচিত মধু ও লালারসের মিশ্রণকে রাজকীয় বা রয়াল জেলি বলে। এটি পুষ্টিকর খাদ্য এবং আশ্রিত ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ উপাদান (ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত।

২. রাজকীয় জেলির রাসায়নিক উপাদান :

উপাদান	পরিমাণ (%)	উপাদান	পরিমাণ (%)
পানি	৬৬.০৫	লিপিড	৫.৪৬
প্রোটিন	১২.৩৪	অজৈব বস্তু	০.৯২
চিনি	১২.৪৩	ভিটামিন ও অন্যান্য বস্তু	২.৮০

Part 2

At a glance

- ইথোলজির জনক- নিকোলাস টিনবারগেন
- উৎপত্তি ও কাজের ভিত্তিতে সাংকেতিক উদ্দীপনা প্রধানত- তিন প্রকার
- মানুষের উদ্দীপনা- ৫ প্রকার
- সর্বপ্রথম Releaser শব্দ প্রয়োগ করেন- বিজ্ঞানী লরেন্স
- হেরিংগাল (গাংচিল) এর খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া- রিলিজিং বা নির্গমন উদ্দীপনা
- বিজ্ঞানী লরেন্স এর মতে আচরণ প্রধানত- ২ প্রকার
- মকরমূর সাপ রাস্তার কোণায় উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী শিকার করে- দর্শন উদ্দীপক এর মাধ্যমে
- প্রজাতি নির্দিষ্ট থাকে- সহজাত আচরণে
- মাকড়সার জাল বোনা হলো- সহজাত আচরণ
- বাবুই পাখির বাসা তৈরি হলো- সহজাত আচরণ
- শিশুর স্তন্যপান হলো- সহজাত আচরণ
- সহজাত আচরণ প্রধানত- তিন প্রকার
- পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রজনন স্থান নির্ণয়ে দেখা যায়- বিব্রহ আচরণ
- পতঙ্গ ও পাখিদের যৌন মিলনের সময় দেখা যায়- যুগলবন্দি ও মৈথুন আচরণ
- দিকমুখি চলন সরাসরি উদ্দীপনা শক্তির- সমানুপাতিক
- দেহেরদিক মুখিতার ভিত্তিতে ট্যাক্সিস প্রধানত- দু'রকম
- প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায়- ধনাত্মক ট্যাক্সিসে
- প্রাণী উদ্দীপকের থেকে দূরে সরে যায়- ঋণাত্মক ট্যাক্সিসে
- জীব অক্সিজেন ঘনত্বের তারতম্যের কারণে সাড়া দেয়- কেমোট্যাক্সিসে
- ধনাত্মক কেমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে- *Paramecium*
- জীব কোষের সর্বোচ্চ বিপাকীয় কাজের প্রতি সাড়া দেয়- এনার্জি ট্যাক্সিস
- জীবের অভিকর্ষজনিত সাড়া দান- জিওট্যাক্সিস
- চোখের উপযোজন হলো- প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স
- হাই তোলা হলো- প্রতিবর্তী ক্রিয়া
- প্রতিবর্তী ক্রিয়া হলো- সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ধরনের
- সংবেদী উদ্দীপনা সৃষ্টি করে- প্রতিবর্ত ক্রিয়া
- প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে ভাগ করা যায়- দুটি ভাগে
- বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না- অর্জিত বা কনডিশনড রিফ্লেক্স
- হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলি, অস্ত্র, ফুসফুস, মূত্রাশয় ইত্যাদি- ভিসেরাল প্রতিবর্তী
- সেব আচরণ অর্জিত এবং অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তিত হতে পারে তাদের ক্ষয়- শিখন আচরণ
- শিখন আচরণকে ভাগ করা যায়- ৬ ভাগে
- শিখন আচরণ- হাঁসের ছানার মাকে অনুসরণ
- প্যাভলভ শিখন পরীক্ষা করেন- সাপেঙ্ক
- সুধার্ত প্রাণী অন্যকে খাবার খেতে দেখলে তার লালার ক্ষরণ হয়, এটি- সাপেঙ্ক প্রতিবর্ত ক্রিয়া

- অনুকরণকে এক অভিনব আচরণ বলে অভিহিত করেন- লরেন্স
- Pavlov ছিলেন একজন- শারীরবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী
- সাপেঙ্ক প্রতিবর্ত সম্বন্ধে যিনি যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন- Pavlov
- অনপেঙ্ক প্রতিবর্ত ক্রিয়া হলো- সহজাত বা জন্মগত আচরণ
- বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়- সাপেঙ্ক প্রতিবর্ত ক্রিয়া
- আচরণে সব সময় একই রকম হবে- Stereotype
- একটি প্রজাতির সকল সদস্যের আচরণ প্রদর্শিত হবে- সার্বজনীনতা
- টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা- সহজাত আবেগের এক চমৎকার উদাহরণ
- আংশিক অভিপ্ৰাণ ঘটে- লক্ষ্মীগাচা ও নীলকণ্ঠ পাখির
- মাকড়সার জাল বোনা হলো- একটি সহজাত প্রক্রিয়া
- কীটপতঙ্গ আটকে যায় মাকড়সার জালে- এগ্জিগেট ও ফ্রেজেলিফর্ম এর কারণে
- ডিমকে আটকে রাখতে সাহায্য করে- টিউবিকুলিফর্ম
- মাকড়সার জালের অংশ হলো- কাঠামো, অরীয় স্পোক ও আঠাল প্যাচ
- Anadromous মাছ হলো- *Tenualosa, Petromyzon, Salmon*
- Catadromous মাছ হলো- স্বাদু পানির Eel
- প্রিকেসিয়াল পাখি হলো- হাঁস, মুরগির বাচ্চা ইত্যাদি
- ক্রুডখলি গঠন করে- সাগর ঘোড়া ও পাইপ ফিস
- সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা বা পরার্থিতা হলো- অ্যালট্রুইজম
- Altruism শব্দটি ব্যবহার করেন- August comte
- কমী মৌমাছির মধ্যে বেশি দেখা যায়- Altruism
- বাংলাদেশে মৌমাছি পাওয়া যায়- তিন প্রজাতির
- ৩-৪ দিন বয়সে চাকের মধু-কুঠুরি পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়- কমী মৌমাছি
- কমী মৌমাছি মধু আহরণে বের হয়- ১৮-২০ দিন বয়সে
- উদরের শেষ প্রান্তে হল থাকে- কমী মাছির
- রানি মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়- রাজকীয় জেলি
- ১৬ দিনের মধ্যে নতুন রানি সৃষ্টির ঘটনাকে বলে- সুপার সিডিওর
- খাদ্যের উৎস কোন দিকে তার কোন নির্দেশনা থাকে না- চক্রাকার নৃত্যে
- ইংরেজি '৪' এর মতো দেখায়- ওয়াগল নৃত্য
- খাদ্যের উৎসের দিক সম্পর্কেও নির্দেশনা থাকে- Waggle dance
- গাছের ডালে কিংবা ঘরের কার্নিশে বাসা তৈরি করে- *Apis florea*
- Honey comb গঠন করে- মৌমাছি

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মৌমাছি পালনকে বলা হয়- [NU-Science : 08-09]

- (A) Lac Culture (B) Aquaculture
(C) Sericulture (D) Apiculture

(Ans D)

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞানকে কী বলে? [GST-A : 20-21]

- (A) ইকোলজি (B) ইথোলজি
(C) ইথনোজুলজি (D) এনিমেল বিহেভিওর

(Ans B)

02. প্রজনন ঋতুতে কার্প মাছের হালদা নদীতে আগমন কোন ধরনের আচরণ?

[KU-A : 19-20]

- (A) কেমোট্যাক্সিস (B) হাইড্রোট্যাক্সিস
(C) জিওট্যাক্সিস (D) রিওট্যাক্সিস

(Ans D)

প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রতিসাম্য :

প্রাণিদেহকে কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সদৃশ সমান অংশে বিভাজন করার নিয়মকে প্রতিসাম্য বলে।

ক) বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্যতা :

প্রতিসাম্যতার ধরন	উদাহরণ
১. গোলায়	<i>Volvax</i> , <i>Radiolaria</i> , <i>Heliozoa</i>
২. অরীয়	হাইড্রা, জেলিফিশ (<i>Aurelia</i>), সাঁ আনিমন্ (<i>Merulam</i>)
৩. দ্বিঅরীয়	<i>Ctenophora</i> জাতীয় প্রাণীর দেহ
৪. দ্বিপাক্ষীয়	প্রজাপতি, ব্যাঙ, মানুষ
৫. অপ্রতিসাম্য	স্পঞ্জ, শামুক

Porifera (পরিফেরা বা ছিদ্রাল প্রাণী) :

বিজ্ঞানী Robert Grant (1836) সর্বপ্রথম Porifera পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রাণীগুলো সাধারণত স্পঞ্জ নামে পরিচিত।

৬ Porifera পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
সাইকন	<i>Scypha gelatinosum</i>
মিঠা পানির স্পঞ্জ	<i>Spongilla lacustris</i>
ক্লাথিরিনা	<i>Clathyrina sp.</i>

৬ Porifera পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- অস্টিগা ও অসকুলাম • নালিতন্ত্র • কোয়ানোসাইট কোষ • স্পঞ্জোসিল

Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
হাইড্রা	<i>Hydra vulgaris</i>
জেলিফিশ	<i>Aurelia aurita</i>
সমুদ্র পাখা	<i>Gorgonia ventalina</i>

৬ Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- দ্বিষ্টরী • মেসোগ্রিয়া • পলিপ ও মেডুসা • সিলেন্টরন • নিডোসাইট কোষ ও নেমাটোসিস্ট

Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
যকৃৎ কৃমি	<i>Fasciola hepatica</i>
ফিটা কৃমি	<i>Taenia solium</i>
প্রানেরিয়া	<i>Dugesia tigrina</i>

৬ Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ত্রিষ্টরী • অসম্পূর্ণ পৌষ্টিকতন্ত্র • শিখাকোষ • চ্যাপ্টাদেহ • হুক বা চোষক

Nematoda পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম ও উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
গোলকৃমি	<i>Ascaris lumbricoides</i>
চোষ কৃমি	<i>Loa loa</i>
ফাইলেরিয়া কৃমি	<i>Wuchereria bancrofti</i>

৬ Nematoda পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- দ্বিপাক্ষীয় প্রতিসম • নলাকারদেহ • পরিপাকনালি সম্পূর্ণ • বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠ

Mollusca (মলাস্ক বা কয়েজ প্রাণী) :

বিজ্ঞানী Jonston (1650) Mollusca পর্বের নামকরণ করেন। পর্বটির প্রাণীগুলো molluscas বা mollusks বা মলস্ক দেহ বা কয়েজ প্রাণী নামে পরিচিত। Mollusca পর্বভুক্ত প্রাণীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব।

৬ Mollusca পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
আপেল শামুক	<i>Pila globosa</i>
কিনুক	<i>Lamellidens marginalis</i>
অক্টোপাস (Devil fish)	<i>Octopus vulgaris</i>

ছলবাসী শামুক → *Achatina fulica* (ফসলের পেড়)

৬ Mollusca পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- মাংসল দেহ • ম্যান্টল • ক্যাটুলা • ত্রিষ্টরী • নেফ্রিডিয়া • তিসেরাল মাস • খোলস

Annelida পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
লাং ওয়ার্ম	<i>Arenicola sp.</i>
কেঁচো	<i>Metaphire posthuma</i>
জোঁক	<i>Hirudinaria granulosa</i>

৬ Annelida পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ট্র্যাকোফোর • প্যারাপেডিয়া • নেফ্রিডিয়া • সেপ্টেমেন্ট

Arthropoda পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
মাকড়সা	<i>Lycosa lenta</i>
প্রজাপতি	<i>Pieris brassicae</i>
রেশমপোকা	<i>Bombyx mori</i>

৬ Arthropoda পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- সন্ধিস্থত উপাঙ্গ • পৃষ্ঠাঙ্কি • অ্যান্টেনা • মুখোপাঙ্গ • রূপান্তর • হিমোসিল

Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম ও উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
সাগর আঁচিন	<i>Echinus esculentus</i>
পালক স্টার	<i>Antedon bifida</i>
সমুদ্র তারা	<i>Asterias rubens</i>

৬ Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পঞ্চঅরীয় প্রতিসম • বিমৌখিক তল • পানি সংবহনতন্ত্র • নালিকাপদ • মুক্ত সঁতারুলার্জ

কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত উপপর্বের বিশেষ নাম :

উপপর্বের নাম	বিশেষ নাম
Cephalaspidomorphi	ল্যাম্প্রে (Lamprey)
Actinopterygii	রশ্মিময়-পাখনাবিশিষ্ট মাছ
Sarcopterygii	পিভাকার-পাখনাবিশিষ্ট মাছ
Urochordata	সাগর ফোয়ারা (Sea squirt)
Vertebrata	Craniata
Myxini	হ্যাগফিশ (Hagfish)

- Annelida কে ডটেন অফ- Nephridia
- Annelida কে থাকে ন- পোহিত বন্ধকমিকা
- Annelida পর্বের প্রাণীদের কলা হয়- Ringed worm বা অঙ্গুবিমল
- নেমের প্রাণী থাকে বলে- নেমিডিয়া
- কীটকটকে লার্ভা থাকে- Trochophore larva
- Arthropoda-র প্রজনন- মাসপিজিয়ান নালিকা
- প্রাণিকুলেত বৃহত্তম পর্ব- Arthropoda (প্রায় ৮০%)
- অঙ্গায়ন বা Tagmatization দেখা যায়- Arthropoda-র প্রাণিকুলে
- সবুজ গ্রহী পাওয়া যায়- Arthropoda-র
- সিলের নালি পাওয়া যায়- Arthropoda-র
- একাইনোডার্মিটি পর্বটির নামকরণ করেন- Jacob Klein
- পেভিসিলারি নামক বহিঃকঙ্কাল থাকে- Echinodermata-র
- Water vascular system বিনয়ান- Echinodermata-র
- Haemal & Perihemal সঙ্কলন হয় থাকে- Echinodermata-র
- Echinodermata পর্বত্ব প্রাণীর বহিঃকঙ্কালের নাম- পেভিসিলারি
- Pharyngeal gill slits থাকে- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- Nerve cord পাওয়া যায়- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- স্থিতিস্থাপক ও নিরৈকি নটোকর্ড থাকে- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- গলবিলের নিচু এডোমাইটল থাকে- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- রক্ত সংবলনস্থ রক্ত প্রকারের হয়- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- সাগর কেমারা নামে পরিচিত- Urochordata
- প্রাণীর দেহ কীটকার বা নলাকার হয়- Ascidiacea
- প্রাণীর দেহ লেবু বা গোল আকৃতির হয়- Thaliacea
- প্রাণীর দেহ বাঁকা ব্যাঙটি আকৃতির- Larvacea
- Urochordata উপপর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড থাকে- লেজ
- গলবিলে অস্থায়ী ফুলকা রক্ত উপস্থিত- Cephalochordata প্রাণীদের
- দেহের দুপাশে ">" আকারে মায়েটোম পেশি থাকে- Cephalochordata
- পূর্বাঙ্গ সেফালোকর্ডেটের পেশিবদ্ধ বা সোমাইটকে বলে- মায়েটোম
- Cephalaspidomorphi শ্রেণিত্ব মহাশল্যের সাধারণ নাম- ল্যাম্প্রে
- Vertebrata উপপর্বের আরেক নাম- Craniata
- মস্তিষ্ক অবস্থান করে- Cranium-এর অভ্যন্তরে
- স্কুলকাঠকে ঘিরে রাখে- অস্থির অথবা তরুণস্থির অবস্থান
- গলবিলের উভয় পাশে ফুলকা থাকে- ৫-১৫ জোড়া
- চলন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়- পাখনা বা পদ
- প্রাকয়েত (Placoid) অস্থি-এ আবৃত- Chondrichthyes
- Chondrichthyes-এ পুচ্ছ পাখনার ধরন- হেটেরোসার্কাল
- কোন শ্রেণির প্রাণীর দেহ সম্পূর্ণ কোলাহি নির্মিত- Chondrichthyes
- Scoliodon laticaudus-এর অস্থি- প্রাকয়েত
- হাড়ের পুচ্ছ পাখনার ধরন- হেটেরোসার্কাল
- সাইক্লয়েড বা তিনয়েড অস্থি-এ আবৃত- Actinopterygii-র অঙ্গুত্ব হয়
- Actinopterygii-র অঙ্গকঙ্কাল- সম্পূর্ণ অস্থির
- Swim bladder থাকে- Actinopterygii-দের
- জীবিত মাছের মধ্যে Actinopterygii-র শ্রেণিত্ব- ১৬%
- Sarcopterygii শ্রেণিত্ব মাছ হলো- অস্থির অঙ্গকঙ্কালবৃত্ত
- Sarcopterygii মাছ বর্তমানে জীবিত আছে- ৮ প্রকারের
- Sarcopterygii মাছ যে প্রকারের অস্থি-এ আবৃত থাকে- গ্যানয়েড ও ক্যামো
- Sarcopterygii-র পুচ্ছ পাখনা হলো- ডাইফিসার্কাল ধরনের
- Sarcopterygii-এর হৃৎপিণ্ড- ২ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
- চতুষ্পদী (tetrapod) নামে পরিচিত- Amphibia
- জীবনচক্রে ট্যাডপোল লার্ভা দশা থাকে- Amphibia-দের
- Amphibia-দের স্বপ্নে সাহায্য করে- ফুস
- Amphibia-র আত্মা থাকে- অঙ্গপদ চারটি ও পশ্চাপদে পাঁচটি
- Amphibia-দের হৃৎপিণ্ড- তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
- Amphibia-র লার্ভা দশায় স্বপ্নে ঘটে- ফুলকার সাহায্যে
- Amphibia পরিণত অবস্থায় স্বপ্নকার্য চলায়- মুসকুল দিয়ে
- Reptilia-র দেহ আবৃত- অস্থি বা শক্ত শ্রেট দিয়ে

- Reptilia-র পায়ে আঙুল থাকে- ৫টি
 Reptilia-র একমাত্র নসন অঙ্গ- ফুসফুস
 Reptilia-র চর্খপত- চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (অসম্পূর্ণভাবে)
 Reptilia-র চর্খপত (চর্খপত) যুগ বলা হয়- Mesozoic Era-কে
 সরীসৃপদের (চর্খপত) যুগ বলা হয়- Mesozoic Era-কে
 ক্যারাপেসে আবৃত থাকে- Reptilia (Crocodyle) প্রাণীদের দেহ
 Aves-এর দেহ আবৃত থাকে- পালকে
 Aves-এর অগ্নাদ রূপান্তরিত হয়- ডানায়
 Aves অস্থিগুলো- Pneumatic
 Aves-এর চর্খপত- ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পাটের কোন অংশ খাদ্য শোষণ করে? [NU-Science : 14-15]
 (A) Crop (B) caecum (C) Crop (D) Rectum (Ans: C)
 02. নিচের কোনটি Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য নয়? [NU-Science : 12-13]
 (A) গতিত দেহাংশ (B) অঙ্গকঙ্কাল-এর উপস্থিতি (C) জোড়া পা-সমূহ (D) দ্বি-পাক্ষীয় প্রতিসাম্য (Ans: B)
 03. পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য অঞ্চলকে কি বলে? [NU-Science : 12-13]
 (A) Greep Spot (B) Hot Spot (C) Safe Spot (D) White Spot (Ans: B)
 04. শিখা কোষ কোন তন্তুর অন্তর্ভুক্ত? [NU-Science : 11-12]
 (A) জনন তন্ত্র (B) রেচন তন্ত্র (C) পরিপাক তন্ত্র (D) কঙ্কাল তন্ত্র (Ans: B)
 05. আরশোলার রক্ত কণিকালোকে বলে- [NU-Science : 09-10]
 (A) হিমোসাইট (B) মাইট্রোকট্রিয়া (C) লিউকোসাইট (D) ফ্যাগোসাইট (Ans: A)
 06. আরশোলার সঞ্চিত খাদ্য হলো- [NU-Science : 08-09]
 (A) গ্লুকোজ (B) গ্লাইকোজেন (C) কার্বোহাইড্রেট (D) প্রোটিন (Ans: B)
 07. কোনটি আরশোলার বেচন অঙ্গ? [NU-Science : 06-07]
 (A) মেট্রিডিয়াম (B) ম্যালপিজিয়ান নালিকা (C) বৃক্ক (D) মেসেন্টেরন (Ans: B)
 08. কোন প্রাণিতে প্রজাতির সংখ্যা সর্বাধিক? [NU-Science : 04-05]
 (A) ইনসেক্টা (B) ক্রাস্টেসিয়ানা (C) হাইড্রোজোয়া (D) ম্যাললিয়া (Ans: A)

Part 4 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. "Holothuria tubulosa" কোন পর্বের প্রাণী? [GST-A : 23-24]
 (A) নেমাটোড (B) একাইনোডার্মিটা (C) অ্যানিলিডা (D) মোলাস্কা (Ans: B)
 02. কোন পর্বের প্রাণীদের দেহে পানি সংবহনতন্ত্র থাকে? [GST-A : 22-23]
 (A) Echinodermata (B) Annelida (C) Arthropoda (D) Mollusca (Ans: A)
 03. পোষ প্রাণিনির্যাসের কততম স্তর? [Col-A : 19-20]
 (A) ১ম স্তর (B) ২য় স্তর (C) ৩য় স্তর (D) ৪র্থ স্তর (Ans: C)
 04. সরীসৃপ সংক্রান্ত জ্ঞানকে কী বলা হয়? [BU-A : 19-20]
 (A) হারপেটোলজি (B) অরনিথলজি (C) ম্যামালজি (D) ম্যালাকলজি (Ans: A)
 05. স্যালামান্ডার কোন বর্ণের প্রাণী? [BU-A : 19-20]
 (A) Anura (B) Crocodilia (C) Gymnophiona (D) Caudata (Ans: D)
 06. ডিম পাড়ে এমন জলপায়ী প্রাণী- [BU-A : 19-20]
 (A) ইঁদুর (B) বনকই (C) হংসচমু (D) কাঁঠবিড়াল (Ans: C)
 07. অগ্নাদে চারটি এক পটভূমিতে পাঁচটি আঙ্গুল আছে এমন প্রাণী কোনটি? [SUST-A : 19-20]
 (A) Amphibia (B) Reptilia (C) Aves (D) Mammalia (Ans: A)
 08. স্তন্যপায়ী বিদ্যমান কোনটিতে? [PUST-A : 19-20]
 (A) Mollusca (B) Annelida (C) Arthropoda (D) Chordata (Ans: B)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. ব্যাঙা কোন পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য?
 (A) মোলাস্কা (B) নেমাটোড (C) আর্থ্রোপোডা (D) নিডারিয়া (Ans: A)
 02. চার প্রকোষ্ঠ চর্খপতবিশিষ্ট সরীসৃপ-
 (A) খড়িয়াল (B) টিকটিকি (C) সামুদ্রিক কাছিম (D) কুমির (Ans: D)
 03. "রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ" নামে পরিচিত কোন প্রাণী?
 (A) Myxini (B) Chondrichthyes (C) Actinopterygii (D) Sarcopterygii (Ans: C)
 04. সম্পূর্ণ চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট চর্খপত কোন প্রাণীতে দেখা যায়?
 (A) টিকটিকি (B) কুমির (C) কজুপ (D) সাপ (Ans: B)
 05. তরুণাঙ্কিয়ারী হাঙর মাছে কোন ধরনের আঁশ থাকে?
 (A) গ্যানয়েড (B) রথয়েড (C) টিনয়েড (D) প্র্যাকয়েড (Ans: D)
 06. কোনটি আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী?
 (A) জেলি ফিশ (B) স্টার ফিশ (C) সিলডার ফিশ (D) গোল্ড ফিশ (Ans: C)
 07. গ্রীষ্ম নিদ্রায় যায় কোন প্রাণী?
 (A) শকুন (B) সাপ (C) গিরগিটি (D) চিংড়ি মাছ (Ans: C)
 08. নিম্নের কোনটিতে হোমোসার্কাল (Homocercal) লেজ বিদ্যমান?
 (A) কুই মাছ (B) ব্যাঙ (C) মাছ (D) মশা (Ans: A)
 09. গোখরা সাপের বৈজ্ঞানিক নাম?
 (A) Naja naja (B) Cairina moschata (C) Columba livia (D) Cavia porcellus (Ans: A)
 10. উভচর প্রাণীর চর্খপতে কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে?
 (A) দুই (B) তিন (C) চার (D) পাঁচ (Ans: B)
 11. কোন অঙ্গ অ্যাক্সিবিয়া প্রাণীর প্রাণীর শ্বসনে সাহায্য করে?
 (A) ফুসফুস (B) ফুলকা (C) ডেজা বুক (D) মুখ (Ans: A)
 12. অ্যানিলিডার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
 (A) কিউটিকলে আবৃত ও প্রকৃত খওয়ান আছে (B) রক্তে অ্যামিবেসাইট থাকে (C) শক্ত, অরীয় প্রতিসম (D) শিখা কোষ থাকে (Ans: A)
 13. আর্থ্রোপোডা কোনটি?
 (A) Pila globosa (B) Pinctada vulgaris (C) Hirudinaria medicinalis (D) Musca domestica (Ans: D)
 14. রেশম মথ যে বর্ণের অন্তর্ভুক্ত?
 (A) Lepidoptera (B) Coleoptera (C) Hymenoptera (D) Redemira (Ans: A)
 15. ম্যান্টল নামক পাতলা আবরণে কোন পর্বের প্রাণীর দেহ আবৃত থাকে?
 (A) আর্থ্রোপোডা (B) মলাস্কা (C) একাইনোডার্মিটা (D) সিলেন্টেরন (Ans: B)
 16. প্রাণীর নামকরণে আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি?
 (A) FAO (B) ICZN (C) ILO (D) ICBN (Ans: B)
 17. কর্ডাটে থাইরয়েড গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয় যে অঙ্গ-
 (A) সিলেন্টেরন (B) এন্ডোস্টাইল (C) কোয়ানোসাইট (D) ব্যাঙা (Ans: B)
 18. নিচের কোনটি ইউসিলোমেট?
 (A) মলাস্কা (B) হাইড্রা (C) নেমাটোডা (D) যকৃৎ কুমি (Ans: A)
 19. প্রাণিজগতের কোন পর্বের প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ 'নেফ্রিডিয়া' নামে পরিচিত?
 (A) Mollusca (B) Annelida (C) Platyhelminthes (D) Porifera (Ans: B)
 20. সিলোমাইন পর্ব কোনটি?
 (A) Nematoda (B) Chordata (C) Annelida (D) Platyhelminths (Ans: D)
 21. সর্বাধিক সংখ্যক প্রজাতি বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী পর্ব হলো-
 (A) কর্ডাটা (B) আর্থ্রোপোডা (C) মলাস্কা (D) অ্যোডোজোয়া (Ans: B)
 22. নিডেরিয়ানদের দংশন অঙ্গ কয়টি?
 (A) নেমাটোসিস্ট (B) সিলেন্টেরন (C) ট্রোকোফোর (D) ওম্যাটিডিয়াম (Ans: A)
 23. শুক্রাকার প্রাণী কারা?
 (A) Actinopterygii (B) Ascidiacea (C) Cephalochordata (D) Chondrichthyes (Ans: C)