

রসায়ন

অধ্যয়নভিত্তিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ
শুরুত্ব বুঝে অধ্যয়ন, নিত্য সবার প্রয়োজন

রসায়ন প্রথম পত্র		DU-7 College						
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
01	ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার	-	1	-	1	-	-	-
02	শুণ্ণগত রসায়ন	3	3	3	5	2	1	2
03	মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন	3	4	7	3	3	11	2
04	রাসায়নিক পরিবর্তন	5	2	-	2	6	5	5
05	কর্মমুখী রসায়ন	-	-	-	-	-	-	-
প্রথম পত্র থেকে ছোট প্রশ্ন		11	10	10	11	11	17	09

রসায়ন দ্বিতীয় পত্র		DU-7 College						
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
01	পরিবেশ রসায়ন	7	5	3	2	2	-	1
02	জৈব রসায়ন	7	9	9	9	10	8	8
03	পরিমাণগত রসায়ন	-	-	2	2	2	-	4
04	তড়িৎ রসায়ন	-	1	1	1	-	-	1
05	অর্থনৈতিক রসায়ন	-	-	-	-	-	-	2
দ্বিতীয় পত্র থেকে ছোট প্রশ্ন		14	15	15	14	14	8	16
প্রথম ও দ্বিতীয় থেকে ছোট প্রশ্ন		25	25	25	25	25	25	25

টপিকের মাথে প্রশ্ন বিশ্লেষণ
+
প্যারালাল তথ্য = ১৬% কমান

আসপেক্ট সিরিজ
পাঠ্যবইকে সহজ করার প্রয়াস

অধ্যায় ০১
প্রথম পত্র

ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার

SAFE USE OF LABORATORY



কি, কেন পড়বে?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়বে?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	ল্যাবরেটরির বিধি, সঠিক পোশাক ও নিরাপত্তা সামগ্রী	★★
02	ল্যাবরেটরির সামগ্রী নিরাপদে ব্যবহার ও পরিষ্কারকরণ	★★★
03	বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ব্যালেন্সের নির্ভুল ব্যবহার	★★
04	সেমিমাইক্রো, মাইক্রো ও ম্যাক্রো অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতি	★★★
05	নিরাপদে ল্যাব সামগ্রীতে তাপ দেওয়ার কৌশল	★★★
06	রিয়েজেন্ট বোতল ও রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণ	★★
07	পরিবেশের উপর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব ও গুরুত্ব	★★
08	নিরাপত্তা সামগ্রী/ব্যবহার/পরিষ্কার ও দূষণ বা চিকিৎসা	★★★



টপিক আনোচনা

□ ল্যাবরেটরির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি:

জরুরী উপাদান	ব্যবহারের কারণ/অন্যান্য তথ্য
পিপেট	যে কোন তরল পদার্থ সূক্ষ্মভাবে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।
বুরেট	সাধারণত টাইট্রেশনে খুব সঠিক ভাবে তরল পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।
ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক	প্রমাণ দ্রবণ তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়। একে Standard flask বলা হয়। 250 mL আয়তনের বেশী ব্যবহৃত হয়।
কনিক্যাল ফ্লাস্ক	বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিতকরণ এবং তাপ প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত আয়তন মাত্রিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।
Succer	দ্রবণ টেনে নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
Water Bath	কোন পদার্থকে 100° C সে. তাপমাত্রার নিচে উত্তপ্ত করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
নিরাপদ গ্লাস	UV রেডিয়েশন/ক্ষতিকর/ক্ষয়কারী পদার্থ গাঢ় HCl এবং NaOH ও KOH থেকে রক্ষার জন্য।
মাছ	গবেষণায় ক্ষতিকর গ্যাস যেমন NO ₂ , NH ₃ , SO ₂ , CO ₂ , CO থেকে দূরে থাকতে মাছে চারকোল/জিয়োস্লাইট ব্যবহৃত হয়।
গ্লাভস (Disposable/Synthetic)	PVC গ্লাভস → মৃদু ক্ষয়কারী ও বিরক্তিকর পদার্থ; ল্যাটেক্স গ্লাভস → জ্বালা সৃষ্টিকারক, অস্থিরকর ও সংক্রামক পদার্থ; নিওপ্রিন গ্লাভস → দ্রাবক, তেলজাতীয় পদার্থ; জিটেস গ্লাভস → ছোটখাটো জলন্ত বস্তু থেকে রক্ষার জন্য। [নাইট্রাইল গ্লাভস স্বাস্থ্যসম্মত]

□ পরিমাপন সিলিন্ডার ও ব্যালেন্স:

নাম	ব্যবহার
পরিমাপন সিলিন্ডার (20ml, 25ml, 50ml)	তরল পদার্থ পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। পরিমাপের সূক্ষতা কম।
পল বুঙ্গি ব্যালেন্স	পল বুঙ্গি ব্যালেন্সের সাহায্যে 0.0001g পর্যন্ত ওজন মাপা যায় (চার দশমিক)।
ডিজিটাল ব্যালেন্স (2 ডিজিট ও 4 ডিজিট)	চার ডিজিটের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন 0.0001g পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়।

□ অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতি:

পদ্ধতির নাম	নমুনার পরিমাণ	তথ্যাবলী
ম্যাক্রো অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতি	0.1-0.5g (20-25mL)	অধিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়।
সেমি মাইক্রো অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতি	0.05-0.1g (1-4mL)	সর্বাধিক জনপ্রিয় ও ব্যবহৃত পদ্ধতি।
মাইক্রো অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতি	<0.1g	সূক্ষ্ম গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। পরিবেশের ক্ষতি করে না। অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

□ বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদানের বিকল্প উপাদান:

বিষাক্ত উপাদান	বিকল্প উপাদান
ক্লোরোফর্ম (CHCl ₃)	হেক্সেন (C ₆ H ₁₄)
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl ₄)	হেক্সেন (C ₆ H ₁₄)
বেনজিন (C ₆ H ₆)	টলুইন (C ₆ H ₅ -CH ₃)
পটাসিয়াম (K)	ক্যালসিয়াম (Ca)

□ রাসায়নিক দ্রব্যের ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নির্দেশক সতর্কীকরণ চিহ্ন:

পদার্থ	ইংরেজি নাম	চিহ্ন
ক্ষতিকারক	Harmful (Xn)	
উত্তেজক	Irritant (Xi)	
বিষক্রিয়াশীল	Toxic (T)	
দাহ্যপদার্থ	Flammable (F)	
পরিবেশ দূষণকারী	Environmentally Toxic (N)	
তেজস্ক্রিয়তা	Radioactive (R)	
বিস্ফোরক	Explosive (E)	
ফার্স্ট এইড বক্স	First Aid Box	
দূরে থাকুন/সাবধান	Keep Out	

স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন

রাসায়নিক পদার্থ বা উপাদানের জন্য	কি করতে হবে বা যা করণীয়
পেটের ভিতর ফার প্রবেশ করলে	ভিনেগার বা লেবুর রস ও 3% CH ₃ COOH দ্রবণ
পেটের ভিতর এসিড প্রবেশ করলে	5% সাবান দ্রবণ ও 2% NaHCO ₃ দ্রবণ
চোখে ফার বা এসিড লাগলে	ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ক্ষত স্থানে 4% NaHCO ₃ দ্রবণ + বোরিক এসিডের (H ₃ BO ₃) সম্পৃক্ত দ্রবণ
ত্বকে ফার লাগলে	ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ক্ষত স্থানে 5% CH ₃ COOH দ্রবণ
ত্বকে এসিড লাগলে	ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ক্ষত স্থানে 5% NaHCO ₃ দ্রবণ

গাণিতিক সমস্যা: পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স সংক্রান্ত math এর ক্ষেত্রে- [উল্লেখ্য, সর্বোচ্চ দাগ সংখ্যা মানে কিন্তু মোট দাগ সংখ্যা নয় বরং বীমের ওপর সর্বোচ্চ যে সংখ্যা দেখা যায়, তাই সর্বোচ্চ দাগ সংখ্যা]

- রাইডারের ফ্রবক = $\frac{\text{রাইডারের নিজস্ব ভর}}{\text{সর্বোচ্চ দাগ সংখ্যা}}$ [যখন 0 (শূন্য) মাঝখানে থাকবে]
- রাইডারের ফ্রবক = $\frac{2 \times \text{রাইডারের নিজস্ব ভর}}{\text{সর্বোচ্চ দাগ সংখ্যা}}$ [যখন 0 (শূন্য) বাম প্রান্তে বা ডান প্রান্তে থাকবে]
- মোট ভর = ভর $\pm$ (রাইডারের ফ্রবক $\times$ শূন্য হতে রাইডারের দূরত্ব)
- রাইডারের শূন্য দাগের ডানে থাকলে '+' এবং রাইডারের শূন্য দাগের বামে থাকলে '-' করতে হবে।

MEQ 01 নিজের বীমের মাঝে 0 দাগ এবং দুদিকে 50 টি করে দাগ আছে। রাইডারের সর্বোচ্চ 50 নম্বর দাগে রেখে বাম পাঠায় 10mg ভর যোগ করলে নিজের ভারসাম্য অর্জিত হয়। (a) রাইডারের নিজস্ব ভর কত? (b) রাইডারের ফ্রবক কত?

Solve যেহেতু বীমের মাঝখানে 0 দাগ আছে এবং রাইডার বীমের সর্বোচ্চ সারিয়ে বাম পাঠায় 10mg ভর যোগ করার পর নিজের ভারসাম্য অর্জিত হয়, সেহেতু রাইডারের নিজস্ব ভর 10mg

$$\therefore \text{রাইডার ফ্রবক} = \frac{10\text{mg}}{50} = 0.0002\text{g}$$

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

- H₂S প্রসারের সাথে মিশে → মাখা ব্যাখা
- মাছের জন্য ক্ষতিকর → পারদ
- মর্করি স্ট প্রধান স্বাস্থ্যঝুঁকি → স্নায়ুতন্ত্রে সমস্যা
- জেন কমে বাওয়া কোন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব → পটাসিয়াম আয়োডাইড
- কোন্টির প্রভাবে ত্বক ফেটে যেতে পারে → ইথাইল অ্যাসিটেট
- কুশাস্ত্র খোয়া সৃষ্টি করে → ইথাইল অ্যাসিটেট
- মাসনিজের আধিক্যের কারণে হয় → পাতায় বাদামি বর্ণের দাগ করে
- টব্রদের মোটাবলিজম বিনষ্ট করে → জিঙ্ক ক্লোরাইড
- অবশিষ্ট গ্যাসের নাম → CO₂, NO₂, SO₂, HCl
- Pb²⁺, Hg²⁺, Cd²⁺ প্রাণীদেহে প্রবেশ করলে → এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।
- ল্যাবরেটরিতে অপোলার জৈব পদার্থ পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয় বেনজিন।
- বর্তমান বিশ্বে বর্জ্য পরিত্যাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রিসাইকেলিং।
- ফুলসেন দ্বীপ শিখার দীপ্তিমান শিখাকে বিজারণ শিখা বলে।
- HCN গ্যাসটি মানুষের মৃত্যু ঘটতে সক্ষম।
- গুদেহভাজন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ K₂Cr₂O₇
- GHS এর পূর্ণনাম Global Harmonized System.
- কিউথেরাপিতে ব্যবহার করা হয় IR রশ্মি।
- অনুষ্কল শিখায় ৩টি জোন আছে।
- মাইক্রো অ্যানালাইসিস ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রোফোরিক ও এলসরে ডিফ্রাকশন।

- কাঁচ পরিষ্কারক হিসাবে অ্যামোনিয়া ও জৈব দ্রাবক বেশি উপযোগী।
- রাইডারের ফ্রবকের মান এর ওজন ও ব্যালেন্সের বীমের দাগাঙ্কন এর উপর নির্ভর করে।
- নীল কাঁচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় CaO
- লিভার ও কিডনির ক্ষতি করে CCl₄, CHCl₃ ও CH₂Cl₂
- ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য প্রচুর ভারীধাতু বহন করে ও রিসাইকেলিং করতে হবে।
- বর্তমানে ওয়াশ বোতল হিসাবে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ইথানল বুনসেন দ্বীপ শিখায় সরাসরি তাপ দেয়া যায় না।
- সেমি-মাইক্রো এনালাইসিসে ফিল্টার পেপারের বদলে ব্যবহৃত হয় → 3mL সেক্সিফিউজ টিউব।
- ল্যাবে H₂S এর পরিবর্তে থায়ো অ্যাসিটামাইড ব্যবহৃত হয়।
- সেমি-মাইক্রো অ্যানালাইসিসে দুই রকমের টেস্টটিউব ব্যবহৃত হয়।
- মাইক্রো অ্যানালাইসিস নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পান - ফ্রিটজ রিগেল। ফ্রিটজ নাগরিক ছিলেন → স্লোভেনিয়ার।
- ক্রোমাটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়- মাইক্রো অ্যানালাইসিস।
- অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ নিয়ে কাজ করা হয় মাইক্রো অ্যানালাইসিসে।
- সর্বনিম্ন পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদিত হয় মাইক্রো অ্যানালাইসিস পদ্ধতিতে।

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

- আয়তনমিতিক টাইট্রেশনে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণ কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিতে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [DU-7CIG: 2020-21]
 - বিকার
 - বুরেট
 - পিপেট
 - মাপন সিলিভার

Explanation আয়তনমিতিক (Volumetric) টাইট্রেশনে পাত্র হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণ সূক্ষ্মভাবে কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিতে ব্যবহৃত হয় পিপেট। বুরেটে নিতে ব্যবহৃত হয় মাপন সিলিভার।
- নিচের কোনটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরিতে ব্যবহার করা উচিত নয়? [DU-7CIG: 2020-21]
 - Ethanol
 - Isopropyl alcohol
 - Methanol
 - Glycerol

Explanation মিথানল একটি বিষাক্ত পদার্থ। এটি শরীরে প্রবেশ করলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরিতে মিথানল ব্যবহৃত হয় না।

IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

- 10.50 mL তরল পরিমাপ করতে নিচের কোনটির ব্যবহার যথার্থ?
 - পিপেট
 - মাপন সিলিভার
 - বুরেট
 - আয়তনিক ফ্লাস্ক

Explanation বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার:

যন্ত্রের নাম	সাধারণ আয়তন পরিমাপ
পিপেট	নির্দিষ্ট আয়তন সঠিকভাবে মাপতে ব্যবহৃত হয়।
মাপন সিলিভার	(5, 10, 50, 100, 200, 250) ml
বুরেট	যেকোন আয়তন (সাধারণত ১০-৫০মিলি) সূক্ষ্মভাবে মাপতে বুরেট ব্যবহার করা হয়।
আয়তনিক ফ্লাস্ক	যেকোন আয়তনের দ্রবণ বানাতে ব্যবহৃত হয়।
- কোন পদার্থ কাঁচের পাত্রকে ক্ষয় করে?
 - Aqua-regia
 - HCl
 - HF
 - H₃PO₄

Explanation HF কাঁচ পাত্রকে ক্ষয় করে কারণ F⁻ আয়ন কাঁচ পাত্রের উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে।
বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ: SiO₂ + 4HF → SiF₄ + 2H₂O, তাই কাঁচ পাত্র ক্ষয় হয়।
- কাঁচপাত্রের কোন সেটিং সঠিকভাবে আয়তন মাপার জন্য উপযুক্ত?
 - Pipette and beaker
 - Burette and reagent bottle
 - Pipette and burette
 - Graduated pipette and conical flask

Ans C

04. ব্যুরেটের অভ্যন্তরে মিজ বা তৈলাক্ত পদার্থ দূর করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
 A. $K_2Cr_2O_7$ ও গাঢ় H_2SO_4 B. গাঢ় $K_2Cr_2O_7$ ও হালকা H_2SO_4
 C. $K_2Cr_2O_7$ ও H_2SO_4 D. গাঢ় $K_2Cr_2O_7$ ও গাঢ় H_2SO_4
- ⓐ Explanation/ ব্যুরেট পরিষ্কার করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল ক্রোমিক এসিড ($K_2Cr_2O_7$ ও গাঢ় H_2SO_4 এর মিশ্রণ) দ্বারা ধৌতকরণ। ক্রোমিক এসিড দ্বারা ধৌত করার পর ব্যুরেটটিকে আবার পানিতে ধুয়ে নিতে হয়।

05. সেমি-মাইক্রো বিশ্লেষণে H_2S এর পরিবর্তে নিচের কোনটি ব্যবহার করা যাবে?
 A. CH_3SCH_3 B. CH_3CSCH_3 C. CH_3CSNH_2 D. PbS
- ⓐ Explanation/ H_2S এর পরিবর্তে থায়ো এসিট্যামাইড (CH_3CSNH_2) ব্যবহার করা হয়।

- সেমি-মাইক্রো অ্যানালাইসিসে ফিল্টার পেপারের বদলে ব্যবহৃত হয় → 3mL সেন্ট্রিফিউজ টিউব।
- সেমি-মাইক্রো অ্যানালাইসিসে দুই রকমের টেস্টটিউব ব্যবহৃত হয়।

PRIME TEST

01. ল্যাব অ্যাক্সোনে সিনথেটিক কাপড় কেন ব্যবহৃত হয় না?
 A. দ্রুত নষ্ট হয় B. রাসায়নিক প্রতিরোধী নয়
 C. দাহ্য পদার্থ বলে D. আরামপ্রদ নয় বলে
02. নিচের কোন গ্রাভসে প্রোটিন থাকে?
 A. নিওপ্রিন গ্রাভস B. পিভিসি গ্রাভস
 C. ল্যাটেক্স গ্রাভস D. নাইট্রাইল গ্রাভস
03. $Ca(OH)_2$ দ্রবণ চোখে পড়লে নিচের কোন দ্রবণ দিয়ে ধুতে হয়?
 A. HCl দ্রবণ B. H_3BO_3 দ্রবণ
 C. $NaOH$ দ্রবণ D. $NaCl$ দ্রবণ
04. পোড়াফলের জ্বালা নিবারণে ব্যবহৃত 'বার্ণল' হলো-
 A. পিকরিক এসিড B. ক্রোরোফর্ম
 C. ডাইক্রোরোইথেন D. ডাইইথাইল ইথার
05. ল্যাবরেটরিতে অব্যবহৃত $LiAlH_4$ কে কোনটির দ্রবণ দ্বারা পরিশোধন করা হয়?
 A. $NaHCO_3$ B. $MgSO_4$
 C. Na_2CO_3 D. $Ca(OH)_2$
06. একটা 4 ডিজিট ব্যালেন্স দ্বারা সর্বনিম্ন কত গ্রাম ওজন পরিমাপ করা যায়?
 A. 0.1 gm B. 0.01 gm
 C. 0.001 gm D. 0.0001 gm
07. বুনসেন বার্নারে জারণ শিখার তাপমাত্রা কোনটি?
 A. $1500^\circ C$ B. $1600^\circ C$
 C. $1700^\circ C$ D. $1800^\circ C$
08. কোনটি বিস্ফোরকের উপাদান?
 A. CNG B. SO_2
 C. LPG D. MnO_2
09. শরীরের কোথাও এসিড পড়লে কোনটি ব্যবহার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়?
 A. $NaHCO_3$ দ্রবণ B. $NaOH$ দ্রবণ
 C. KOH দ্রবণ D. $Al(OH)_3$ দ্রবণ
10. পায়ের চামড়ার উপর ক্ষার পড়লে নিম্নের কোনটি ব্যবহার করতে হবে?
 A. বোরিক এসিড B. সোডা অ্যাশ
 C. বেকিং সোডা D. কস্টিক পটাশ

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	০৩ ০৮ ০৯

ANS ANALYSIS

10. A	09. A	08. D	07. B	06. D
05. B	04. A	03. B	02. C	01. C

অধ্যায় ০২
প্রথম পত্র

গুণগত রসায়ন

QUALITATIVE CHEMISTRY

কি, কেন পড়ব? SURVEY TABLE কতটুকু পড়ব?

টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	কোয়ান্টাম সংখ্যা	★ ★ ★
02	ইলেকট্রন বিন্যাস ও কয়েকটি নীতি	★ ★ ★
03	বর্ণালীমিতি	★ ★ ★
04	দ্রাব্যতা, দ্রাব্যতার গুণফল (দ্রাব্যতা গুণাক) ও দ্রাব্যতা নীতি	★ ★ ★
05	বিভিন্ন আয়ন শনাক্তকরণ	★ ★



টপিক তালোচনা

- ছকের মাধ্যমে পরমাণুর বিভিন্ন কণিকার বর্ণনা দেয়া হল:

নাম	চার্জ	ভর	ব্যাসার্ধ
পরমাণু	নিরপেক্ষ (0)	$10^{-27} - 10^{-25} \text{ kg}$	10^{-8} cm
নিউক্লিয়াস	ধনাত্মক (+ve)	পরমাণুর সমস্ত ভর	$10^{-12} - 10^{-13} \text{ cm}$
ইলেকট্রন (e^-)	$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$9.1085 \times 10^{-28} \text{ gm}$	$1.4 \times 10^{-13} \text{ cm}$
প্রোটন (P^+)	$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$1.672 \times 10^{-24} \text{ gm}$	$1.4 \times 10^{-13} \text{ cm}$
নিউট্রন (N^0)	নিরপেক্ষ (0)	$1.6744 \times 10^{-24} \text{ gm}$	$1.4 \times 10^{-13} \text{ cm}$

রসায়নে আপেক্ষিক চার্জের বা ভরের কোন একক নেই

- রাদারফোর্ড মডেল- মূলভিত্তি: নিউটনের মহাকর্ষ ও ঘূর্ণনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত
- বোর মডেলের মূলভিত্তি: প্রাণকের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

- ISO সম্পর্কিত তথ্য:

বিষয়	আইসোটোপ	আইসোবার	আইসোটোন	আইসোইলেকট্রনিক/সমরূপতা
ভর সংখ্যা	বিভিন্ন	একই	বিভিন্ন	ইলেকট্রন সংখ্যা সমান
পারমাণবিক সংখ্যা	একই	বিভিন্ন	বিভিন্ন	
নিউট্রন সংখ্যা	বিভিন্ন	বিভিন্ন	একই	
পরমাণু	একইমৌলের পরমাণু	ভিন্ন মৌলের পরমাণু	ভিন্ন মৌলের পরমাণু	
মনে রাখার ট্রিক্স	শেষ বর্ণ 'প'	শেষ বর্ণ 'বার'	শেষ বর্ণ 'ন'	

- চিকিৎসা বিজ্ঞানে আইসোটোপের ব্যবহার:

আইসোটোপের সংকেত	আইসোটোপের ব্যবহার
$^{131}_{53}\text{I}$	টিউমার এর অবস্থান ও আয়তন এবং থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি জনিত চিকিৎসা
$^{60}_{27}\text{Co}$	ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা
$^{32}_{15}\text{P}$	রক্তস্রাবতা রোগের চিকিৎসা
U- 238	পাথরের বয়স নির্ণয়
Tc-99	মস্তিষ্কের টিউমারের স্থান নির্ধারণ
Ra-226	ক্যান্সারের স্থান নির্ধারণ
C-14 dating	জীবাশ্মের বয়স তথা পৃথিবীর আনুমানিক বয়স নির্ণয় করা যায়

- পলির বর্জন নীতিঃ দুই ইলেকট্রন বিশিষ্ট কোন পরমানুর চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনই সমান হতে পারে না।

মূল কথা: একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটো এবং সর্বনিম্ন শূন্য ইলেকট্রন থাকতে পারে।
• ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক সব সময় বিপরীত মুখী হবে।

- আউফবাউ নীতি: পরমাণুতে বিদ্যমান ইলেকট্রনগুলো নিম্ন থেকে পর্যায় ক্রমে উচ্চ শক্তিস্তরে প্রবেশ করে-
 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s$
 • $(n + \ell)$ এর নিয়ম-আউফবাউ নীতি অনুসারে, ইলেকট্রনসমূহ আগে নিম্ন শক্তিস্তরে প্রবেশ করবে।
 • $(n + \ell)$ এর মান কম মানে শক্তি কম আর বেশি মানে শক্তি বেশি। কমটাতে আগে e^- প্রবেশ করবে।
 • $5s > 4d$; $5s: n + \ell = 5 + 0 = 5$; $4d: 4 + 2 = 6$

□ কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রাথমিক তথ্যাবলী:

কোয়ান্টাম সংখ্যা	প্রতীক	কি নির্দেশ করে
প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা	n	শক্তি স্তরের আকার
সহকারী বা অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম সংখ্যা	l	উপশক্তিস্তরের আকৃতি
ম্যাগনেটিক বা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা	m	অরবিটাল সংখ্যা এবং বিন্যাস
স্পিন বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা	s বা m_s	ইলেকট্রন ঘূর্ণনের প্রকৃতি ও দিক

□ কোয়ান্টাম ও ইলেকট্রন সংখ্যার সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য:

নাম	সূত্র
অরবিটাল নির্ণয়	n^2
কক্ষপথে ইলেকট্রন নির্ণয়	$2n^2$
উপশক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা	$2(2l + 1)$
উপশক্তি স্তরে অরবিটাল সংখ্যা	$(2l + 1)$

□ ভিউব চুম্বকীয় বর্ণালী:

মহাজাগতিক	গামা	রঞ্জনক	অতি বেগুনী	দৃশ্য	অবহেলিত করেছে	মাইক্রো	রেডিও টেলিভিশন
মহাজাগতিক	গামা	রঞ্জন	অতি বেগুনী	দৃশ্যমান	অবহেলিত	মাইক্রো	রেডিও
রশ্মি (CR)	রশ্মি (γ)	রশ্মি (X-ray)	রশ্মি (UV)	রশ্মি (Visible)	Infra-red (IR)	ওয়েভস (Micro waves)	রশ্মি (Radio waves)
10^{-14} (nm)	10^{-4}	10^{-2}	2	380	700	10^6	10^8

□ পারমাণবিক বর্ণালী (H-বর্ণালী):

H-বর্ণালীসিরিজ	টেকনিক	যে শক্তি স্তরে আসলে সৃষ্টি হয়	প্রধান বর্ণালী অঞ্চল
লাইম্যান	লাইলির	১ম	অতি-বেগুনী
বামার	বাবা	২য়	দৃশ্য মান (Visible)
প্যাচেন	পেল	৩য়	নেয়ার ইনফ্রা-রেড (নিকটঅবহেলিত)
ব্র্যাকট	বাক্ট	৪র্থ	ইনফ্রা-রেড (অবহেলিত)
ফুন্ট	ফুল	৫ম	ফার ইনফ্রা-রেড (অতিঅবহেলিত)
হামফ্রিশ	হাই	৬ষ্ঠ	ফার ইনফ্রা-রেড (অতিঅবহেলিত)

□ শিখা পরীক্ষা (FLAME TEST)- শিখা পরীক্ষায় প্লাটিনাম বা নাইক্রোম তার এবং গাড় HCl এসিড ব্যবহার করা হয়।

মৌলের বর্ণ: খালি চোখে বা শিখা পরীক্ষায়-

ধাতু/ধাতব আয়ন	বর্ণ
Li/Li ⁺	উজ্জ্বল লাল (Crimson)
Na/Na ⁺	সোনালী হলুদ (Golden Yellow)
K/K ⁺	বেগুনী (Pale Violet)

ধাতু/ধাতব আয়ন	বর্ণ
Rb/Rb ⁺	লালচে বেগুনী
Cs/Cs ⁺	নীল (Blue)
Ba/Ba ²⁺	কাঁচা আপেলের মত
Ca/Ca ²⁺	ইটের ন্যায় লাল (Brick Red)
Sr/Sr ²⁺	টকটকে লাল (Crimson Red)
Ra/Ra ²⁺	লাল (Red)
Cu/Cu ²⁺	সবুজাভ নীল (Bluish Green)

শিখা পরীক্ষায় বর্ণ দেয় না Be²⁺, Mg²⁺, Al³⁺, Fe²⁺, Fe³⁺

□ এক নজরে সমীকরণসমূহ:

(i) ডি-ব্রগলী সমীকরণ: $\lambda = \frac{h}{mv}$ বা $mv = h/\lambda$;

$P = \frac{h}{\lambda}$ (কণা ও তরঙ্গ ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক)

(ii) বোর সমীকরণ: $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

(iii) প্লাঙ্কের সমীকরণ: $E = h\nu$

(iv) আইনস্টাইনের সমীকরণ: $E = mc^2$

(v) বামার সিরিজের লাইনের সাধারণ সমীকরণ: $\frac{1}{\lambda} = \bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

(vi) বোর-বারী এর সমীকরণ: $(n + l)$

(vii) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি:

$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$; $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$; $\Delta x \cdot \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}$

(viii) শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ:

$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - U) \psi = 0$

□ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ সংখ্যা, কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয়:

এখান থেকে যে সমস্যাগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে-

- হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে আগত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথবা তরঙ্গ সংখ্যা কত হবে?
- হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর যে কোন সিরিজের n তম লাইনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গ সংখ্যা কত?
- হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর যে কোন সিরিজের সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গ সংখ্যা কত?

Tricks: ক্যালকুলেটর বিহীন অংক করতে R_H এর মান না বসিয়ে সরাসরি R_H রেখে দিতে বলা হবে।

□ সরাসরি শক্তিস্তর দেওয়া থাকলে, $n_1 =$ ছোট মান, $n_2 =$ বড় মান

উদাহরণ-01: হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর ৪র্থ শক্তিস্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তিস্তরে আগত আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং তরঙ্গ সংখ্যা নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, $n_1 =$ ছোট মান

$= 2, n_2 =$ বড় মান $= 4$

[যেহেতু calculator নাই তাই মানগুলো এভাবেই দেওয়া থাকবে]

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \therefore \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right), \frac{1}{\lambda}$

$= R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right), \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{4-1}{16} \right), \frac{1}{\lambda} = \left(\frac{3R_H}{16} \right)$

$\therefore \frac{1}{\lambda} = \bar{\nu} = \left(\frac{3R_H}{16} \right)$ (এটা তরঙ্গ সংখ্যা)

এখন আমরা খুব সহজে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উল্টাই দিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারি

$\therefore$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $= \frac{16}{3R_H}$

□ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা শক্তির ক্ষেত্রে-

শর্টকাট: সর্বনিম্ন শক্তি বা সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে,

$$n_1 = \text{সিরিজ নং এবং } n_2 = n_1 + 1;$$

সর্বোচ্চ শক্তি বা সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে, $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{R_H}{(\text{সিরিজ নং})^2}$

উদাহরণ-01: হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর বামার সিরিজের সর্বনিম্ন শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও তরঙ্গ সংখ্যা কত?

সমাধান: এখানে $n_1 = 2$ (যেহেতু বামার সিরিজের কথা বলা হয়েছে)

$$n_2 = 2 + 1 = 3$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$= R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = R_H \left(\frac{9-4}{36} \right)$$

$$\therefore \text{তরঙ্গ সংখ্যা} = \frac{1}{\lambda} = \bar{\nu} = \frac{5 R_H}{36}$$

এখন আমরা তরঙ্গ সংখ্যা উল্টাই দিলেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো

$$\therefore \lambda = \frac{36}{5 R_H}$$

□ দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফল (S) সম্পর্কিত সমস্যা:

$$\text{দ্রাব্যতা, } S = \frac{m}{M - m} \times 100$$

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

- NH_4^+ আয়নের উপস্থিতি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়- $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$, NaOH/KOH ।
- α , β এবং γ কণাগুলোর চার্জ, যথাক্রমে- +2, -1 and 0।
- উপস্তর সম্ভব নয়- 2d, 1p, 3f।
- MRI যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে ভূমিকা রয়েছে- Hydrogen।
- নাইট্রেট অ্যানায়নে ইলেকট্রন রয়েছে- 32টি।
- অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম বিশোধনে যে প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর- Fractional distillation।
- $^{234}_{90}\text{Th}$ থেকে $^{234}_{91}\text{Pa}$ তৈরি হয়- β -emission প্রক্রিয়ায়।
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়- Microwave আলোক রশ্মির।
- বাস্তব গ্যাস আদর্শ সমীকরণ অনুসরণ করে- High temperature and low pressure।
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম- λ ray।
- $^{14}_6\text{C}$ ও $^{16}_8\text{O}$ পরস্পরের- Isotone।
- হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালীর দৃশ্যমান অঞ্চলের রশ্মি দেখা যায়- বামার সিরিজে।
- $^{31}_{15}\text{P}_4$ এর 15টি অণুর মধ্যে নিউট্রন আছে- 960টি।
- 'f' অরবিটাল সর্বমোট ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে- 14টি।
- ইলেকট্রনের ভর- $9.1 \times 10^{-28} \text{ gm}$ ।
- অরবিটালের আকৃতি নির্দেশ করে- l।
- একটি মৌলের আইসোটোপসমূহের মধ্যে ভিন্ন থাকে- নিউট্রন সংখ্যা।
- মৌলের পরিচিতি কোন মৌলিক কণার সংখ্যার উপর নির্ভর করে- প্রোটন।
- ক্যান্সার নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়- Co-60।
- জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত রশ্মি- UV-ray।
- AgCl পানিতে- অদ্রবণীয়।
- ^4_2He থেকে কী সরালে আলফা কণা তৈরী হয়- ইলেকট্রন।
- পটাসিয়াম বুনসেন দ্বীপ শিখায় বর্ণ ধারণ করে- বেগুনী।
- কখন অধঃক্ষেপ পড়ে- আয়নিক গুণফল > দ্রাব্যতা গুণফল।
- শিখা পরীক্ষায় খালি চোখে ইটের মত লাল শিখা দেখা যায়- Ca^{2+} ।
- HPLC তে সচল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়- মিথানল ও পানি।
- দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি- 380 nm - 780 nm।

- সিলভারের পারমাণবিক সংখ্যা - 47।
- কম্পোজিট কণিকার সংখ্যা- 2টি।
- ভারী পানি বলা হয়- D_2O ।
- হাইড্রোজেনের আইসোটোপ সংখ্যা- 3টি (প্রোট্রিয়াম, ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম)।
- Cr পরমাণুতে অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে- 6।
- বোরের স্বীকার্য অনুযায়ী অনুমোদিত ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ- $mvr = \frac{nh}{2\pi}$ ।
- গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফিতে বাহক গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়- O_2 ।
- Fe^{2+} লবণে $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ যোগ করলে- গাঢ় নীল বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়।
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ইলেকট্রন বিন্যাসটি- সালফার
- ^{42}Mo এর সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস- $[\text{Kr}]4d^5 5s^1$
- $n = 4$ এবং $l = 3$ উপক্ষেপে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন সংখ্যা হবে- 18
- নিউট্রন কণা- ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান।
- মৌলের নিউক্লিয়ন সংখ্যা- প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা
- একটি আয়নে 5 টি প্রোটন, 6 টি নিউট্রন, 3^+ চার্জ আছে, ইহার এটমিক সংখ্যা- 5।
- হাইড্রোজেনের আইসোটোপ নয়- ^4_1H
- যে সব পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ও ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের বলে- আইসোটোন
- আইসোবার এর- ভর সংখ্যা সমান
- পরমাণুতে ইলেকট্রনের অবস্থান বর্ণনা করা যায় কোনটি দ্বারা-কোয়ান্টাম সংখ্যা।
- 3d অরবিটালের জন্য m এর মান কোন সেটটি- $\pm 2, \pm 1, 0$
- অরবিটালে ইলেকট্রনের ঘনত্ব সর্বাধিক-1s
- অরবিটাল প্রকাশ করে- ψ^2
- d উপ-শক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে- 10টি
- Fe^{++} এবং Cr^{++} এর ইলেকট্রন সংখ্যা- 28 ও 28
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2$ ইলেকট্রন বিন্যাসটি- Fe
- $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$ ইলেকট্রন বিন্যাস বিশিষ্ট মৌলের অবস্থান হল- VIII
- d ব্লক মৌলসমূহের কোনটিতে 4s অরবিটালে 1টি ইলেকট্রন রয়েছে- Cu(29)
- পলির বর্জন নীতি অনুসারে s ও p উপশক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা- 2, 6
- জীবাণুনাশক কাজে 240 nm - 280 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হয়।
- ইলেকট্রন $n = 3$ থেকে $n = 2$, ধাপে স্থানান্তর হলে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নির্গত বর্ণালী সিরিজটি হবে- বামার সিরিজ
- AX_3 এর দ্রাব্যতা গুণফল 1.7×10^{-12} হলে, এটির দ্রাব্যতা- $5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$
- অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণের সাথে সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে- Ca^{2+}
- Fe^{2+} লবণে $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ যোগ করলে অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়- গাঢ় নীল
- HPLC তে সচল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়- মিথানল ও পানি
- কলাম ক্রোমোটোগ্রাফিতে কোনটি সচল দশা হিসেবে কাজ করে- $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- এটম বোমা তৈরী হয় কিসের ভিত্তিতে- নিউক্লিয় ফিশান বিক্রিয়া
- কোনটি থেকে ইলেকট্রন সরালে আলফা কণা তৈরী হয়- ^4_2He
- অক্সিজেনের অন্যতম আইসোটোপ ^{17}O এ নিউট্রন সংখ্যা কয়টি- 9।
- সালফাইড ($^{32}_{16}\text{S}^{2-}$) আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা- 18।
- নাইট্রোজেনের আইসোটোপ $^{15}_7\text{N}$ -এ নিউট্রন সংখ্যা- 8।
- $^{206}_{82}\text{Pb}$ এর নিউট্রন সংখ্যা- 128।
- H^+ আয়নে নিউট্রন আছে- 0টি।
- তরঙ্গ সংখ্যার সমীকরণ- $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$
- রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা দ্বারা পরমাণুর আবিস্কৃত হয়েছে- নিউক্লিয়াস।
- বোরের স্বীকার্য অনুযায়ী অনুমোদিত ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ- $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

সেটিকলসেজ

• ^{18}O আইসোটোপটির ভরসংখ্যা হচ্ছে-18

• তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ- C - 14

• নিম্নের কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলির কোন সেটটি অনুমোদিত নয়- $n=2, l=2, m=-1$

• কোন পরমাণুর ৩য় শক্তিস্তরে ইলেকট্রন থাকতে পারে-১৮টি

• $2p$ অরবিটালের n, l এবং m এর মান যথাক্রমে-2, 1, (-1, 0, 1)

• পরমাণুর ৪র্থ শক্তিস্তরে অনুমোদিত ইলেকট্রনের মোট অরবিটাল সংখ্যা-১৬

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. ^{32}S এর 10টি অণুর মধ্যে কয়টি নিউট্রন আছে? [DU-7Clg: 2023-24]

- A. 1280
B. 160
C. 320
D. 960

Explanation: ^{32}S এ নিউট্রন সংখ্যা = $16 \times 8 = 128$ টি।

• ^{32}S এর 10টি অণুর মধ্যে নিউট্রন সংখ্যা = $128 \times 10 = 1280$ টি।

02. হ্রদের নিম্ন অনুযায়ী ^{26}Fe এর ইলেকট্রন বিন্যাসে d-অরবিটালে কতটি বিজোড় ইলেকট্রন বিদ্যমান? [DU-7Clg: 2023-24]

- A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Explanation: $\text{Fe} (26) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

$3d_{xy}^1 3d_{yz}^1 3d_{zx}^1 4s^2$

03. 4f অরবিটালে $(n+l)$ এর মান কত? [DU-7Clg: 2023-24]

- A. 4
B. 7
C. 6
D. 11

Explanation: 4f অরবিটালের জন্য $(n+l) = 4+3 = 7$

04. নিচের কোন আয়নটি O^{2-} এর সম-ইলেকট্রন বিশিষ্ট? [DU-7Clg: 2022-23]

- A. K^+
B. Mg^{2+}
C. Cl^-
D. S^{2-}

Explanation: O^{2-} এ ইলেকট্রন সংখ্যা ১০টি

K^+ " " " ১৮টি

Mg^{2+} " " " ১০টি

Cl^- " " " ১৮টি

S^{2-} " " " ১৮টি

05. শিখা পরীক্ষায় ইটের মত লাল বর্ণ প্রদর্শন করলে লবণটিতে উপস্থিত- [DU-7Clg: 2022-23]

- A. ক্যালসিয়াম
B. পটাসিয়াম
C. কপার
D. সোডিয়াম

Explanation: শিখা পরীক্ষায় প্লাটিনাম বা নাইক্রোম তার এবং গাঢ় HCl এসিড ব্যবহার করা হয়।

ধাতু/ধাতব আয়ন	বর্ণ	ব্র-গ্রাস/কোবাল্ট কাচে বর্ণ
Li/Li^+	উজ্জ্বল লাল	-----
Na/Na^+	সোনালী হলুদ	বর্ণহীন শিখা
K/K^+	বেগুনী	গোলাপী লাল শিখা
Rb/Rb^+	লালচে বেগুনী	
Cs/Cs^+	নীল	
Ba/Ba^{2+}	কাঁচা আপেলের মত	নীলাভ সবুজ
Ca/Ca^{2+}	ইটের ন্যায় লাল	হালকা সবুজ
Sr/Sr^{2+}	টকটকে লাল	
Ra/Ra^{2+}	লাল	
Cu/Cu^{2+}	সবুজাভ নীল	...

06. শিখা পরীক্ষায় বর্ণ দেয় না $\rightarrow \text{Be}^{2+}, \text{Mg}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$ [DU-7Clg: 2022-23]

- A. $^{14}\text{N}, ^{19}\text{F}$
B. $^{14}\text{C}, ^{14}\text{N}$
C. $^{16}\text{O}, ^{17}\text{O}$
D. $^{23}\text{Na}, ^{24}\text{Mg}$

Explanation: ভরসংখ্যা সমান হলে তা আইসোবার। $^{14}\text{C}, ^{14}\text{N}$ এদের ভরসংখ্যা সমান তাই এরা পরস্পরের আইসোবার।

07. নেসলার দ্রবণ কোনটি? [DU-7Clg: 2022-23]

- A. KHgI_4
B. K_2HgI_4
C. $\text{KHgI}_4 + \text{NaOH}$
D. $\text{K}_2\text{HgI}_4 + \text{KOH}$

Explanation: নেসলার দ্রবণ হচ্ছে $\text{KOH} + \text{K}_2[\text{HgI}_4]$ মিশ্রণ। এর সাহায্যে NH_4^+ ক্যাটায়ন শনাক্ত করা যায়।

একনজরে NH_4^+ মূলক শনাক্তকরণ:

লবণে ক্ষারীয় মূলকের সিক্ত পরীক্ষা				
আয়ন	পরীক্ষার ধরণ	বিকারক	উৎপন্ন দ্রবণ/অধঃক্ষেপ	পর্যবেক্ষণ
NH_4^+	উপস্থিতি শনাক্তকরণ	K_2HgI_4	$\text{NH}_4[\text{Hg}_2\text{I}_3]$	বাদামী অধঃক্ষেপ

08. নিচের কোন তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি? [DU-7Clg: 2022-23]

- A. অতিবেগুনী রশ্মি
B. অবলোহিত রশ্মি
C. এক্স-রশ্মি
D. রেডিও তরঙ্গ

Explanation: বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য মনে রাখার কৌশল (ছোট থেকে বড়):

মহাজাগতের	গামা	রঞ্জনকে	অতি বেগুনী
মহাজাগতিক রশ্মি (CR)	গামা রশ্মি (γ)	রঞ্জন রশ্মি (X-ray)	অতি বেগুনী রশ্মি (UV)
দৃশ্য	অবলোহিত করে	মাইক্রো	রেডিও টেলিভিশন
দৃশ্যমান রশ্মি (Visible)	অবলোহিত রশ্মি (Infra-red (IR))	মাইক্রো ওয়েভস (Micro waves)	রেডিও টেলিভিশন রশ্মি (Radio waves)

• বাম পাশে অবস্থিত মহাজাগতিক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ায় কম্পন ও শক্তি সবচেয়ে বেশি।

• ডান পাশে অবস্থিত রেডিও ও টেলিভিশনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়ায় কম্পন ও শক্তি সবচেয়ে কম।

09. নিচের কোন মৌল যুগলের সর্ববহিস্ত্র শক্তিস্তরে একই সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে? [DU-7Clg: 2021-22]

- A. H and Li
B. He and C
C. C and Mg
D. O and N

Explanation: $\text{H} (1) = 1s^1$; $\text{Li} (3) = 1s^2 2s^1$

সর্ববহিস্ত্র স্তরের ইলেকট্রন সমান।

10. ^{15}N এবং ^{16}O পরস্পর- [DU-7Clg: 2021-22]

- A. Isobar
B. Isotope
C. Isotone
D. Isomer

Explanation: ^{15}N এর নিউট্রন সংখ্যা: $n = A - Z = 15 - 7 = 8$

^{16}O এর নিউট্রন সংখ্যা: $n = A - Z = 16 - 8 = 8$

এরা পরস্পরের আইসোটোন।

11. $2p$ অরবিটালের n, l এবং m এর মান যথাক্রমে- [DU-7Clg: 2021-22]

- A. 2, 1, 0
B. 2, 1, (-1, 0, 1)
C. 2, 2, (-2, -1, 0, 1, 2)
D. 1, 1, 0

Explanation: $l = 0$ হলে, s অরবিটাল, $l = 1$ হলে, p অরবিটাল, $l = 2$ হলে, d অরবিটাল। $2p$ এর ক্ষেত্রে $n = 2, l = 1, m = \pm 1, 0, -1$ ।

12. নিচের কোনটি α -কণা? [DU-7Clg: 2021-22]

- A. $^1_1\text{H}^+$
B. $^4_2\text{He}^{2+}$
C. $^4_2\text{He}^{2-}$
D. $^1_1\text{H}^+$

Explanation: α কণা দ্বি-ধনাত্মক হিলিয়াম (He^{2+}) নিউক্লিয়াস।

13. নিম্নের বিকিরণগুলোর মধ্যে কোনটির শক্তি সবচেয়ে বেশি? [DU-7Clg: 2020-21]

- A. Infrared
B. Visible
C. Ultraviolet
D. Microwave

Explanation: UV রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য তুলনামূলক কম। তাই এর শক্তি সবচেয়ে বেশি।

14. $^{30}_{14}\text{Si}$ ও $^{31}_{15}\text{P}$ পরস্পরের-

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. আইসোটোন B. আইসোবার
C. আইসোমার D. আইসোটোপ

(A) Explanation আইসোটোন বলতে বুঝায় একই নিউট্রন সংখ্যা যুক্ত দুটি ভিন্ন পরমাণু। এখানে $^{30}_{14}\text{Si}$ এবং $^{31}_{15}\text{P}$ এর নিউট্রন সংখ্যা একই। তাই এরা পরস্পরের আইসোটোন।

15. গামা রশ্মির ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. ধনাত্মক আধানযুক্ত পাত দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়
B. ঋণাত্মক আধানযুক্ত পাত দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়
C. বাহ্যিক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না
D. এটি ইলেকট্রন

(C) Explanation গামা রশ্মি মূলত তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণ। এটি ভরহীন আধানবিহীন এবং বাহ্যিক কোন ক্ষেত্র (চৌম্বক, তড়িৎ, রাসায়নিক) দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

16. হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালীর কোন সিরিজটি দৃশ্যমান আলোক অঞ্চলে দেখা যায়?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. প্যাচেন B. বামার C. লাইমেন D. ব্র্যাকেট

(B) Explanation পারমাণবিক বর্ণালী (H-বর্ণালী):

H-বর্ণালীসিরিজ	টেকনিক	ইলেকট্রন যে শক্তি স্তরে ফিরে আসলে সৃষ্টি হয়	প্রধান বর্ণালী অঞ্চল
লাইম্যান	লাইলি	১ম	অতি-বেগুনী
বামার	বলল	২য়	দৃশ্যমান
প্যাচেন	প্রেম	৩য়	নেয়ার ইনফ্রা-রেড (নিকট অবলোহিত)
ব্র্যাকেট	বোকাঝীর	৪র্থ	ইনফ্রা-রেড (অবলোহিত)
ফুড	ফসলে	৫ম	ফার ইনফ্রা-রেড (অতিঅবলোহিত)
হামফ্রিশ	হয়	৬ষ্ঠ	ফার ইনফ্রা-রেড (অতিঅবলোহিত)

17. 4f অরবিটালের একটি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে নিচের কোন কোয়ান্টাম সংখ্যার সেটটি সঠিক?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. $n=4, l=3, m=+4, s=+1/2$
B. $n=4, l=2, m=-2, s=+1/2$
C. $n=4, l=3, m=+1, s=+1/2$
D. $n=4, l=-3, m=-4, s=-1/2$

(C) Explanation 4f অরবিটালে, $n=4$, f অরবিটালের ক্ষেত্রে $l=3$, যেহেতু সেক্ষেত্রে m এর মান $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ । তাহলে $m = \pm 1$ সঠিক হবে এবং $S = \pm \frac{1}{2}$ বিধায় $\pm \frac{1}{2}$ মানটি গ্রহণযোগ্য।

18. পানিতে দ্রবীভূত একটি লবণের দ্রবণে $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ দ্রবণ যোগ করলে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে যা জলীয় লব্ধ HCl এ অদ্রবণীয়। দ্রবীভূত লবণের আনায়ন কোনটি?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. CO_3^{2-} B. SO_4^{2-} C. Br^- D. PO_4^{3-}

(B) Explanation SO_4^{2-} বা আয়ন সাধারণত $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (বেরিয়াম নাইট্রেট) এর সাথে বিক্রিয়ার সাদা অধঃক্ষেপ দেয়। যা লব্ধ HCl এ অদ্রবণীয়। অর্থাৎ $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NO}_3^-$

19. নিচের কোন লবণটির জলীয় দ্রবণে বর্ণহীন?

[DU-7Clg: 2019-20]

- A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ B. FeSO_4
C. NiSO_4 D. ZnCl_2

(D) Explanation জলীয় দ্রবণে বিভিন্ন যৌগের বর্ণ:

যৌগ	উৎপন্ন বর্ণ	যৌগ	উৎপন্ন বর্ণ
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$	সবুজ	NiSO_4	বর্ণহীন
FeSO_4	সবুজ	ZnCl_2	সাদা

20. শিখা পরীক্ষায় নীলাভ-সবুজ বর্ণ দেখায় কোন মৌল?

[DU-7Clg: 2019-20]

- A. Ca B. Na
C. Mg D. Cu

(D) Explanation শিখা পরীক্ষা (FLAME TEST):

ধাতু/ধাতব আয়ন	বর্ণ	ব্লু-গ্রাস/কোবাল্ট কাচে বর্ণ
Ba/Ba^{2+}	কাঁচা আপেলের মত	নীলাভ সবুজ (Bluish Green)
Ca/Ca^{2+}	ইটের ন্যায় লাল (Brick Red)	হালকা সবুজ (Light Green)
Sr/Sr^{2+}	টকটকে লাল (Crimson Red)	
Ra/Ra^{2+}	লাল (Red)	
Cu/Cu^{2+}	সবুজাভ নীল (Bluish Green)	...

21. $^{40}_{18}\text{Ar}$ এবং $^{40}_{19}\text{K}$ পরমাণু দুইটিতে কোনটির সংখ্যা সমান? [DU-7Clg: 2018-19]

- A. ইলেকট্রন B. নিউট্রন
C. নিউক্লিয়ন D. প্রোটন

(C) Explanation মৌলের নিউক্লিয়ন সংখ্যা:


মৌল	প্রোটন (P)	ইলেকট্রন (e)	নিউট্রন (n)	নিউক্লিয়ন (P+n)
$^{40}_{18}\text{Ar}$	18	18	22	40
$^{40}_{19}\text{K}$	19	19	21	40

22. কোন লবণের জলীয় দ্রবণ লব্ধ H_2SO_4 এবং AgNO_3 এর জলীয় দ্রবণ, উভয়ের সাথে সাদা অধঃক্ষেপ দেয়? [DU-7Clg: 2017-18]

- A. BaCl_2 B. MgCl_2
C. MgSO_4 D. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$

(A) Explanation $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{HCl}$

সাদা অধঃক্ষেপ



সাদা অধঃক্ষেপ

23. নিচের কোন আয়নটির জলীয় দ্রবণ বর্ণহীন?

[DU-7Clg: 2017-18]

- A. Zn^{2+} B. Ni^{2+}
C. Cu^{2+} D. Fe^{2+}

Ans A



IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION


01. নিম্নের কোনটিকে সাধারণত তরল-তরল ক্রোমাটোগ্রাফি বলে?

- A. কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি B. কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি
C. গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি D. পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি

Ans B

02. নিম্নের কোন পরীক্ষাটি সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যবহার করা যায়?

- A. সার্বজনীন নির্দেশক দিয়ে পরীক্ষা B. সোডিয়াম কার্বনেট গুড়া যোগে
C. ম্যাগনেসিয়াম ফিতা যোগে D. বেরিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ যোগে

(D) Explanation $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$
(সাদা অধঃক্ষেপ)

03. MRI যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে কোন মৌলটির ভূমিকা রয়েছে?

- A. Neon B. Oxygen
C. Hydrogen D. Silicon

(C) Explanation পরমাণুর চৌম্বক ধর্ম কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা NMR পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। H পরমাণু NMR সক্রিয় পরমাণু কারণ এর নিউক্লিয়াসে একটি অযুগল প্রোটন আছে ফলে এর একমুখী স্পিনিংকে প্রশমিত করার মত আর একটি প্রোটন নেই। তাই H পরমাণু চুম্বক হিসেবে কাজ করে এজন্য NMR বা MRI পদ্ধতিতে H_2 পরমাণু ব্যবহার করা হয়।

04. উত্তেজিত অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণুর কোয়ান্টাম সংখ্যা $n = 4, l = 1$ বিশিষ্ট অরবিটালটি কি?
 A. s orbital
 B. p orbital
 C. $d_{x^2-y^2}$ orbital
 D. $d_{x^2-y^2}$ orbital

Explanation $n = 4, l = 1$ হলে p orbital হবে কারণ $p = 1$


05. কোন পরমাণু বা আয়নে ইলেকট্রন ও নিউট্রনের সংখ্যা সমান?

- A. ${}^9_4\text{Be}$
 B. ${}^{19}_9\text{F}$
 C. ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$
 D. ${}^{18}_8\text{O}^{2-}$

Ans D

06. কোন প্রক্রিয়ায় ${}^{234}_{90}\text{Th}$ থেকে ${}^{234}_{91}\text{Pa}$ তৈরি হয়?

- A. α -emission
 B. β -emission
 C. γ -emission
 D. neutron-emission



${}^0_{-1}\text{e}$ হলো β -Particle। বিক্রিয়াটিতে β -কণা বিকিরিত হয়।

07. নিচের কোন আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়?

- A. Gamma ray
 B. Microwave
 C. Visible ray
 D. X-ray

Explanation Cosmic γ -ray $<$ X-ray $<$ UV $<$ visible $<$ IR $<$ Microwave

08. Co এবং Co^{2+} এর জন্য নিচের কোন যোজ্যতা ইলেকট্রন বিন্যাসটি সঠিক?

- A. $4d^7 5s^2$ and $4d^7 5s^0$
 B. $3d^5 4s^1$ and $3d^5 4s^0$
 C. $3d^7 3s^2$ and $3d^7 3s^0$
 D. $3d^7 4s^2$ and $3d^7 4s^0$

Explanation $\text{Co}(27) = [\text{Ar}] 3d^7 4s^2$, $\text{Co}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^7 4s^0$

09. নিচের কোন বিন্যাসটি পাউলির বর্জন নীতি ও হুন্ড নীতি সমর্থন করে?

- A. $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$
 B. $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$
 C. $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$
 D. $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$


Explanation পাউলির বর্জন নীতিঃ দুই ইলেকট্রন বিশিষ্ট কোন পরমাণুর চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনই সমান হতে পারে না।

মূল কথাঃ একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটো এবং সর্বনিম্ন শূন্য ইলেকট্রন থাকতে পারে।

• ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক সব সময় বিপরীত মুখী হবে।

10. 26 আণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট একটি মৌলের M-শেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা-

- A. 12
 B. 18
 C. 14
 D. 16



26 আণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের M-শেলে অর্থাৎ তৃতীয় শক্তিস্তরে মোট 14টি ইলেকট্রন থাকে। যেমন- 2(K), 8(L), 14(M), N(2)

11. উপরোক্ত পেন্ডোলিয়াম বিশোধনে যে প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর-

- A. Distillation
 B. Steam distillation
 C. Sublimation
 D. Fractional distillation

Ans D

12. শিখা পরীক্ষায় কোন মৌলটি সোনালী হলুদ শিখা প্রদর্শন করে?

- A. Copper
 B. Chromium
 C. Sodium
 D. Calcium

Explanation $\text{Na} \rightarrow$ সোনালী হলুদ, $\text{K} \rightarrow$ বেগুনী, $\text{Ca} \rightarrow$ ইটের ন্যায় লাল, $\text{Cs} \rightarrow$ নীল

13. দ্রবণের দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয়ে কোন ধরণের দ্রবণ উপযোগী?

- A. Super saturated
 B. Unsaturated
 C. Saturated
 D. All of them

Explanation দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয়ের জন্য সবসময় সম্পৃক্ত (Saturated) দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

14. রিডবার্গ ধ্রুবক, R_H দ্বারা প্রকাশ করা হলে, হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালিতে বামার সিরিজের জন্য সর্বনিম্ন কত তরঙ্গ সংখ্যার রশ্মি বিকিরিত হয়?

- A. $3/4R_H$
 B. $5/36R_H$
 C. $8/9R_H$
 D. $9/144R_H$

Explanation হাইড্রোজেন পরমাণু বর্ণালিতে বামার সিরিজের জন্য সর্বনিম্ন তরঙ্গ সংখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নশক্তিস্তর, $n_1 = 2$ এবং উচ্চ শক্তিস্তর, $n_2 = 3$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right] = \frac{5}{36} R_H$$

PRIME TEST

01. মৌলের পরিচিতি নিচের কোন মৌলিক কণিকার সংখ্যার উপর নির্ভরশীল?

- A. ইলেকট্রন
 B. পজিট্রন
 C. প্রোটন
 D. নিউট্রন

02. ${}^{14}_6\text{C}$ ও ${}^{16}_8\text{O}$ পরস্পরের-

- A. Isomer
 B. Isotone
 C. Isobar
 D. Isotope

03. আইসোটোপের উদাহরণ-

- A. ${}^{13}_7\text{N}$, ${}^{13}_6\text{C}$
 B. ${}^{40}_{18}\text{Ar}$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}$
 C. ${}^{40}_{20}\text{Ca}$, ${}^{40}_{19}\text{K}$
 D. ${}^{31}_{15}\text{P}$, ${}^{32}_{16}\text{S}$

04. নিচের কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর কোন সেটটি নিষিদ্ধ?

- A. $n = 1; l = 0; m = 0; s = \pm 1/2$
 B. $n = 3; l = 2; m = -2; s = \pm 1/2$
 C. $n = 2; l = 2; m = +2; s = \pm 1/2$
 D. $n = 4; l = 2; m = 0; s = \pm 1/2$

05. 'f' অরবিটাল সর্বমোট কয়টি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে-

- A. 10
 B. 8
 C. 18
 D. 14

06. নিম্নোক্ত d ব্লক মৌলসমূহের কোনটিতে 4s অরবিটালে 1 টি ইলেকট্রন রয়েছে?

- A. Mn(25)
 B. Fe(26)
 C. Ni(28)
 D. Cu(29)


07. শিখা পরীক্ষায় খালি চোখে ইটের মত লাল শিখা দেখা যায়-

- A. Na^+
 B. K^+
 C. Sr^{2+}
 D. Ca^{2+}

08. একটি হ্যালাইড লবণকে ঘন H_2SO_4 এ উত্তপ্ত করা হল। যেখানি ধোঁয়ার উৎপত্তি কোন আয়নের উপস্থিতি নির্দেশক?

- A. I^-
 B. Br^-
 C. Cl^-
 D. F^-

09. নিচের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় X-কে কি বলা যায়?



- A. Proton
 B. β -particle
 C. γ -ray
 D. Neutron

10. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি বস্তুর 60 g সম্পৃক্ত দ্রবণ শুকিয়ে ফেলার পর 10 g তালনি পাওয়া যায়। উক্ত তাপমাত্রায় দ্রবীভূত বস্তুটির দ্রাব্যতা কত?

- A. 25
 B. 15
 C. 20
 D. 22

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	১১. (A) (B) (C) (D)

ANS ANALYSIS

10. C	09. A	08. A	07. D	06. D
05. D	04. C	03. D	02. B	01. C

অধ্যায় ০৩ **মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন**
PERIODIC PROPERTIES OF ELEMENTS & CHEMICAL BOND
প্রথম পত্র

কি, কেন পড়ব? **SURVEY TABLE** কতটুকু পড়ব?

টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	বিভিন্ন ব্লকের মৌল ও তাদের ধর্মাবলী	★ ★
02	মৌলের পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম	★ ★ ★
03	বিভিন্ন যৌগের বন্ধন প্রকৃতি ও পোলারায়ন	★ ★
04	ফাযানের নীতি ও ডাইপোল মোমেন্ট	★ ★ ★
05	সিগমা-পাই বন্ধন ও সংকরায়ন	★ ★ ★
06	বিভিন্ন মৌলের অক্সাইডসমূহ	★ ★

টপিক জানোচনা


□ প্রাথমিক কথা: সর্বশেষ আবিস্কৃত ও IUPAC সংস্থা কর্তৃক পর্যায় সারণীতে মোট অনুমোদিত মৌলের সংখ্যা 118টি। প্রথম মৌল হাইড্রোজেন (H-1) এবং শেষ মৌল ওগানেসান (Og-118)। ধাতু ৯৪টি, অধাতু ১৮টি, অপধাতু ৬টি (B, Si, As, Sb, Te, Ge)।

□ বর্ণযুক্ত আয়ন সৃষ্টি: এক নজরে অবস্থান্তর ধাতুসমূহের আয়নের বর্ণ:

ধাতব আয়ন	বর্ণ
Sc ³⁺	বর্ণহীন
Ti ³⁺	রক্তবর্ণ (লালচে বেগুনী)
V ³⁺	সবুজ
V ⁴⁺	নীল
Cr ³⁺	হালকা সবুজ (বেগুনী)
Mn ³⁺	বেগুনী (গোলাপী)
Mn ²⁺	হালকা গোলাপী/বর্ণহীন
Fe ²⁺	হালকা সবুজ/সবুজ
Fe ³⁺	হলুদ/হালকা বাদামী
Co ²⁺	গোলাপী
Ni ²⁺	সবুজ
Cu ²⁺	নীল
Zn ²⁺	বর্ণহীন

□ চৌম্বকীয় ধর্ম: অবস্থান্তর ধাতুসমূহ সাধারণত প্যারাম্যাগনেটিক হয়। 3d ব্লক মৌল গুলোর মধ্যে (Fe, Co, Ni) ফেরোম্যাগনেটিক, (Sc, Zn) ডায়াম্যাগনেটিক এবং (Ti, V, Cr, Mn, Cu) প্যারাম্যাগনেটিক।

□ আয়নীকরণ শক্তি, ইলেকট্রন আসক্তি, তড়িৎ ঋণাত্মকতার মূল সূত্র:



অর্থাৎ এক কথায় মনে রাখবে, বাম থেকে ডানে গেলে আইত বাড়ে এবং উপর থেকে নিচের গেলে আইত কমে।

ব্যতিক্রম: Be > B, Mg > Al, N > O, P > S

□ পরমাণুর আকার / ব্যাসার্ধ:

পরমাণুর আকার	নিয়ম
মৌলের ক্ষেত্রে	বাম থেকে ডানে গেলে পরমাণুর আকার কমে এবং উপর থেকে নিচে গেলে বাড়ে। পর্যায়ক্রম - Na > Mg > Al > Si > P > S, গ্রুপক্রম - Li < Na < K < Rb < Cs
আয়নের ক্ষেত্রে	সম ইলেকট্রনিক পদার্থের ক্ষেত্রে যার প্রোটন সংখ্যা বেশি তার আকার ছোট। যেমন: Na ⁺ , Mg ²⁺ , Al ³⁺ এতে ইলেকট্রন সংখ্যা 10 কিন্তু Al এর প্রোটন সংখ্যা সর্বাধিক বলে এর আকার সবচেয়ে ছোট।

□ এক নজরে কতিপয় মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা:

মৌলের নাম	তড়িৎ ঋণাত্মকতা	মৌলের নাম	তড়িৎ ঋণাত্মকতা
F	4.0	H	2.1
Cl	3.0	At	2.2
Br	2.8	N	3.0
I	2.5	C	2.5

ভুলেও কত ভুলবেনা: তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য যত বেশী হবে (1.7 এর বেশী) আয়নিক বৈশিষ্ট্য তত বেশী হবে।

□ ফাযানের নীতি:

ছন্দে ছন্দে ফাযানের নীতি	বাক্যে বাক্যে ফাযানের নীতি
ক্যাটা মিয়া ছোট হলে অ্যানা মিয়া বড়, অ্যানা ও ক্যাটার বাড়লে চার্জ d ও f- কে ধরো।	A. ক্যাটায়নের আকার যত ক্ষুদ্র হবে। B. অ্যানায়ন যত বৃহদাকার হবে। C. ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চার্জ যত বেশী হবে। D. d ও f অরবিটালে ইলেকট্রন থাকলে পোলারায়নের মাত্রা তত বেশী হবে এবং বন্ধনের সমযোজী বৈশিষ্ট্য তত অধিক হবে।

□ সংকরণ, বন্ধন কোণ এবং আকৃতি:

সূত্র, $x = \frac{1}{2}$ [যোজ্যতা শেলে ইলেকট্রন সংখ্যা + একযোজী পরমাণুর সংখ্যা - ক্যাটায়নের চার্জ + অ্যানায়নের চার্জ]

$x = \frac{1}{2}[V + M - C + A]$, x = হাইব্রিড অরবিটালের সংখ্যা

□ অণু ও আয়নের আকৃতি ও বন্ধন কোণ:

যৌগ	সূত্রানুসারে	সংকরণ	বন্ধন কোণ
PCl ₅	$x = \frac{1}{2} (5+5-0+0)=5$	sp ³ d	sp ³ = 109° 28' sp ² = 120° sp = 180° ব্যতিক্রম NH ₃ = 107° H ₂ O = 104.5°
XeF ₂	$x = \frac{1}{2} (8+2-0+0)=5$	sp ³ d	
XeF ₄	$x = \frac{1}{2} (8+4-0+0)=6$	sp ³ d ²	
XeF ₆	$x = \frac{1}{2} (8+6-0+0)=7$	sp ³ d ³	
SF ₄	$x = \frac{1}{2} (6+4-0+0)=5$	sp ³ d	
SF ₆	$x = \frac{1}{2} (6+6-0+0)=6$	sp ³ d ²	
NH ₂ ⁻	$x = \frac{1}{2} (5+2-0+1)=4$	sp ³	
NH ₄ ⁺	$x = \frac{1}{2} (5+4-1+0)=4$	sp ³	

□ জটিল যৌগের সংকরায়ণ, সন্নিবেশ সংখ্যা ও আকৃতি:

সংকেত	সন্নিবেশ সংখ্যা	সংকরায়ণ	আকৃতি
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$	4	sp^2d	সমতলীয় বর্গাকার
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Br}_2$	6	sp^3d^2	অষ্টতলকীয়
$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$	6	sp^3d^2	অষ্টতলকীয়
$\text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]$	4	sp^2d	সমতলীয় বর্গাকার
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$	6	sp^3d^2	অষ্টতলকীয়
$\text{Ni}(\text{CO})_4$	4	sp^3	চতুস্তলকীয়
$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$	2	sp	সরলরৈখিক

□ অম্লীয় অক্সাইড (Acidic Oxide): CO_2 , SO_2 , SO_3 , NO_2 , N_2O_5 , P_2O_5 , B_2O_3 , SiO_2 , Cl_2O_7 ইত্যাদি।

□ ক্ষারীয় অক্সাইড (Basic Oxide): Na_2O , K_2O , V_2O_3 , CuO , FeO , CaO , MgO ইত্যাদি।

□ পার-অক্সাইড (Peroxide):

a) ক্ষারীয় পার অক্সাইড: Na_2O_2 , BaO_2 , CaO_2 ইত্যাদি

b) অম্লীয় পার অক্সাইড: CrO_4 , S_2O_7 , Cl_2O_7 , SnO_3 , ClO_2

c) প্রশম পার অক্সাইড: H_2O_2

□ H-বন্ধন: HF, H_2O , NH_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, CH_3COOH , ফেনল ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$), অর্থো নাইট্রোফেনল ($\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$), অর্থ-হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{CHO}$, স্যালিসাইলিক এসিড।

□ উভধর্মী অক্সাইড (Amphoteric Oxide): কালু (Cr_2O_3) মায়া (MnO_2) জানে (ZnO) তুমি (TeO_2) গেলে (Ga_2O_3) সোনা (SnO_2) পাব (PbO_2) আমি (Al_2O_3 , As_2O_3)।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

- $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ এর কার্বন পরমাণুসমূহের সংকরায়ন কী ধরনের- sp^2 ।
- সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাইড্রোজেন বন্ধন রয়েছে- HF যৌগে।
- গ্রাফাইটে কোন ধরনের সংকরণ বিদ্যমান- sp^2 ।
- সোডিয়াম ধাতু সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়- কেরোসিন ও হেক্সেন।
- হাইড্রেনিয়াম আয়নে কোন কোন বন্ধন বিদ্যমান- সমযোজী ও সন্নিবেশ বন্ধন।
- Al_2Cl_6 অণুটিতে সমযোজী ও সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা যথাক্রমে- 6, 2।
- বায়ুর অনুপস্থিতিতে উচ্চমাত্রায় (600°C) কাঠকে দহন করলে পাওয়া যায়- কাঠকয়লা।
- ধাতুসমূহের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়- Aluminium।
- কোন যৌগটির স্কুটনাঙ্ক সবচেয়ে কম- ইথারের (C_2H_5) $_2\text{O}$ ।
- ফিটিকিরির সংকেত- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ।
- দৈত্যাকার অণু- SO_2 ।
- কোন যৌগটি পানিতে দ্রবণীয়- AgF।
- SF_6 যৌগের সংকরায়ন- sp^3d^2 ।
- পানি কোন ধরনের অক্সাইড- প্রশমধর্মী।
- কোন মৌলের আয়নিকরণ বিভব সর্বাধিক- F।
- S-ব্লকের মৌলের সংখ্যা কতটি- 14টি।
- সর্বশেষ আবিষ্কৃত মৌলসমূহ হলো- নিহোনিয়াম, মস্কোভিয়াম, টেনেসিন, ওগানেসান।
- f-ব্লক মৌলের সংখ্যা কতটি- 27টি।
- অন্তঃঅবস্থান্তর মৌল- $\left(\text{Ce}\right)_{58}$
- ছুরি দিয়ে কাটা যায়- Na ধাতুকে।
- আদর্শ বা প্রতিনিধি মৌল- s ও p ব্লক।
- অপধাতুর সংখ্যা- 6টি।
- ফটোগ্রাফিক ফ্লাশ বাব্ব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়- ক্রিপটন জেনন মিশ্রণ।
- নিকটোজেন শব্দের অর্থ- শ্বাসরোধকারী গ্যাস।

- ফেরোম্যাগনেটিক মৌলসমূহ- Fe, Co, Ni
- $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ এর আকৃতি- সমতলীয় বর্গাকার।
- সিগমা বন্ধন ও পাই বন্ধন মূলত- সমযোজী বন্ধন।
- H_2O এর বন্ধন কোণ- 104.5° ।
- NH_3 এর বন্ধন কোণ- 107° ।
- H_2O অণুর অক্সিজেনের কোন অরবিটাল সংকরণটি ঘটে- sp^3
- মিথেন অণুতে বিদ্যমান কার্বন পরমাণুতে sp^3 হাইব্রিডাইজেশনে উৎপন্ন প্রতিটি হাইব্রিড অরবিটাল এ কয়টি ইলেকট্রন থাকে- 1টি
- sp^3 সংকরায়িত যৌগ নয়- BF_3
- NH_4^+ আয়নের সংকরায়ণ- sp^3
- কোন অণুটির বন্ধন কোণ সবচেয়ে বড়- BCl_3
- কোন যৌগে sp সংকরণ বিদ্যমান- CO_2
- কোন যৌগটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর ফলে সবচেয়ে বড় আণবিক গুচ্ছ তৈরি করে- H_2O
- হাইড্রোজেন বন্ধন করতে পারে- H_2O
- H_2 পরমানুর ব্যাস- 0.1 nm
- পানি কোন ধরনের অক্সাইড- প্রশমধর্মী
- সর্বাধিক অম্লধর্মী অক্সাইড- Cl_2O_7
- উভধর্মী অক্সাইড- BeO
- সাব-অক্সাইড- Pb_2O
- কোন যুগল আয়নিক বন্ধন গঠন করবে- F এবং Na
- কোনটির একটি আয়নিক ও একটি সমযোজী বন্ধন আছে- KCN
- নিচের কোন যৌগটিতে আয়নিক বন্ধন আছে- CaO
- সমযোজী বন্ধনের দ্বারা উৎপন্ন যৌগ- NH_3
- কোন মৌলটির সাথে পানির বিক্রিয়া তীব্রতম- K
- টাংস্টেন-এর প্রতীক হল- W
- Ti ধাতু- অবস্থান্তর মৌল
- কোন আয়নটি সবুজ- V^{3+}
- কোন আয়নটি বর্ণহীন যৌগ গঠন করবে- Cu^+
- অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপাদনে প্রভাবক ব্যবহার করা হয়- Fe
- অধিক ক্ষারীয়- Na_2CO_3
- পর্যায় সারণিতে p-ব্লক মৌল আছে- 36টি
- কোনটি ডায়াম্যাগনেটিক- Zn
- কোন ধাতব আয়নটি বর্ণহীন যৌগ গঠন করে- Sc^{3+}
- একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 21, পর্যায় সারণিতে এর অবস্থান কোথায়- চতুর্থ পর্যায় তৃতীয় গ্রুপ
- কোন আয়নটি বর্ণহীন যৌগ গঠন করবে- Cu^+
- অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপাদনে কোন প্রভাবক সহায়ক ব্যবহার করা হয়- Mo
- রঙিন যৌগ গঠন করে- Ni^{2+}
- কোন মৌলটির ইলেকট্রন আসক্তি সর্বাধিক- Cl
- নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহের ইলেকট্রন আসক্তি- শূন্য
- বেশী ইলেকট্রো পজেটিভ- Cs
- মৌলগুলির ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ক্রম- $\text{N} > \text{C} > \text{P} > \text{Si}$
- কোন আয়নের আকার সবচেয়ে ছোট- Na^+
- ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম- $_{12}\text{Mg}^{2+}$
- Sr, Tc, Zr এবং Rb পরমাণুর ব্যাসার্ধের ক্রম হলো- $\text{Rb} > \text{Sr} > \text{Zr} > \text{Tc}$
- Na, F, Cl ও Br আয়নগুলোর ব্যাসার্ধের ক্রম- $\text{Br} > \text{Cl} > \text{F} > \text{Na}^+$
- CH_4 এর মধ্যে কোন বন্ধন বিদ্যমান- সমযোজী
- NH_4^+ এ কোন ধরনের বন্ধনী বিদ্যমান- সন্নিবেশ
- পোলার দ্রাবক নয়- বেনজিন
- NH_4Cl এ কী ধরনের বন্ধন আছে- আয়নিক, সমযোজী ও সন্নিবেশ বন্ধন

- ধাতুসমূহের সাধারণ ধর্ম হলো- নমনীয়তা এবং তড়িৎ ও তাপ পরিবাহিতা
- যৌগগুলির কোনটিতে একটি আয়নিক ও একটি সমযোজী বন্ধন আছে- KCN
- কোন যৌগে আয়নিক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী- NaI
- কোনটি পানিতে অদ্রবণীয়- CaCO_3
- কোন সালফেট লবণ পানিতে অদ্রবণীয়- BaSO_4
- কোন যৌগের মধ্যে সবচেয়ে কম পোলারায়ন ঘটে- SnF_2
- কোন যৌগটি সহজে পানি দ্বারা আক্রান্ত হয় না- CCl_4
- ধনাত্মক আয়নের পোলারায়ন ক্ষেত্রের কোনটি সঠিক নয়- $\text{Ba}^{2+} > \text{Be}^{2+}$
- CCl_4 -এর ডাইপোল মোমেন্ট- শূন্য
- MgCl_2 তড়িৎযোজী হলেও BeCl_2 একটি সমযোজী যৌগ। কারন- Mg^{2+} আয়নের চেয়ে Be^{2+} আয়ন অনেক ছোট
- গ্রাফাইটের গঠনে প্রতিটি কার্বন পরমাণুর সংকরণ হচ্ছে- sp^2
- অণুগুলোর মধ্যে কোন অণুটির বন্ধন কোণের মান সবচেয়ে ছোট- H_2S
- POCl_3 গঠনকালে কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংকরণ ঘটে- sp^3
- $\text{CH}_3\text{-CH=CH-C}\equiv\text{CH}_3$ যৌগটির বাম দিক থেকে চতুর্থ কার্বনে কি ধরনের সংকরণ বিদ্যমান- sp
- $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ জটিল আয়নে Fe^{2+} -এ কি ধরনের সংকরণ বিদ্যমান- $d^2\text{sp}^3$
- কার্বনের sp^2 সংকরণ কোন পদার্থে আছে- গ্রাফাইট
- হীরকের প্রতিটি কার্বন পরমাণুর- sp^3 সংকরণ হয়
- sp^2 সংকরণ কোন ক্ষেত্রে ঘটে-
- BeCl_2 অণু-সরলরৈখিক
- পারমাণবিক অরবিটালের sp^3 সংকরণে বিন্যাস পাওয়া যায়- চতুস্তলকীয়
- O এর বন্ধন ক্রম- এক
- CH_4 অণুর আকৃতি- চতুস্তলকীয়
- N_2 অণুতে কী ধরনের সংকরণ বিদ্যমান- sp
- টেট্রাহেড্রাল অণুর বন্ধনীর কৌণিক দূরত্ব- $109^\circ 28'$
- কোন অণুর আকৃতি ত্রিকোণীয় দ্বি-পিরামিডীয়- PCl_5
- কোন যৌগে সর্বাধিক নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল বিদ্যমান- H_2O
- হাইড্রোজেন বন্ধন হয় কোনটিতে- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- পানির অণুর হাইড্রোজেন পরমাণু বহিঃস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে কয়টি শক্তিস্তরে বিন্যস্ত হয়- ২টি।
- হাইপোক্সিসফরাস এসিডের রাসায়নিক সংকেত হলো- H_3PO_2
- জারণ অবস্থা স্থির - F
- কোনটি সুপার অক্সাইড- KO_2
- কোনটি 'পাইরো' এসিড- $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$
- উভধর্মী অক্সাইড- SnO_2
- হাইপো ক্লোরাইট আয়ন- ClO^-
- $\text{Cu}(\text{OH})_2, \text{Fe}(\text{OH})_3$ এবং $\text{Zn}(\text{OH})_2$ এর অধঃক্ষেপ সমূহের বর্ণের সঠিক ক্রম- সাদা, নীল, বাদামী
- ড্রাই আইস হলো- কঠিন CO_2
- সিগমা বন্ধন গঠনে অরবিটালদ্বয় থাকে- সরলরেখায়
- হীরক, গ্রাফাইট ও ইথেন অণুর গঠনে C এর সংকরিত অবস্থা হল- $\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^3$
- বরফের মধ্যে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান- হাইড্রোজেন বন্ধন



PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. নিচের কোন মৌলটির দ্বিতীয় আয়নীকরণ বিভব সবচেয়ে বেশি?

- A. N B. Cl C. Ar D. K [DU-7Clg. 2023-24]

Explanation পর্যায়সারণিতে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে আয়নিকরণ শক্তি বাড়ে। তাই, N, Cl, Ar, K এর মাঝে আয়নিকরণ শক্তি বেশি।

02. কোনটি সুপার অক্সাইড?

- A. Pb_3O_4 B. MnO_2 C. KO_2 D. Na_2O_2 [DU-7Clg. 2023-24]

Explanation সুপার অক্সাইডের উদাহরণ- $\text{KO}_2, \text{RbO}_2$ প্রভৃতি।

• সাধারণ অক্সাইড $\rightarrow \text{O}^{2-} \rightarrow$ জারণ সংখ্যা -2

• পার অক্সাইড $\rightarrow \text{O}^- \rightarrow$ জারণ সংখ্যা -1

• সুপার অক্সাইড $\rightarrow \text{O}_2^- \rightarrow$ জারণ সংখ্যা $-\frac{1}{2}$

অক্সাইড	প্রকার	অক্সাইড	প্রকার
MnO_2	পরি অক্সাইড	KO_2	সুপার অক্সাইড
Pb_3O_4	যুগ্ম বা মিশ্র অক্সাইড	Na_2O_2	পার অক্সাইড

03. কোন যৌগটিতে সর্বোচ্চ পোলারায়ন ঘটে?

[DU-7Clg. 2023-24]

- A. BeCl_2 B. LiCl C. MgCl_2 D. NaCl

Explanation চার্জ যত বেশি পোলারায়ন তত বেশি। এই হিসেবে Li^+ বা Na^+ এর চেয়ে Be^{2+} বা Mg^{2+} এর পোলারায়ন বেশি। আবার, ক্যাটায়নের আকার যত ছোট পোলারায়ন তত বেশি। এই হিসেবে Be^{2+} তথা BeCl_2 এর বেশি পোলারায়ন ঘটে।

• LiCl : এর পোলারায়ন MgCl_2 অপেক্ষা কম।

• MgCl_2 : এর পোলারায়ন LiCl, NaCl অপেক্ষা বেশি।

• NaCl : এর পোলারায়ন MgCl_2 ও LiCl অপেক্ষা কম।

04. নিচের কোন আয়নটির আকার সবচেয়ে ছোট?

[DU-7Clg. 2022-23]

- A. Na^+ B. Be^{2+} C. Na^{2+} D. Ca^{2+}

Explanation ক্যাটায়নের আকার মূল পরমাণুর আকারের চেয়ে ছোট হয় এবং একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর আকার বাড়ে।

• কোন ধাতুর একাধিক ক্যাটায়নের বেলায় অধিক চার্জযুক্ত ক্যাটায়নের আকার সবচেয়ে ছোট হয়। আয়নগুলোর আকারের ক্রম: $\text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Na}^{2+} > \text{Be}^{2+}$

05. ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের জ্যামিতিক গঠন কোনটি?


[DU-7Clg. 2021-22]

- A. Trigonal bipyramidal B. Tetrahedral
C. Pentagonal D. Hexagonal

Explanation PCl_5 এর সংকরায়ন

হলো sp^3d এবং আকৃতি ট্রাইগোনাল

বাইপিরামিডাল।



06. ক্লোরাইট আয়নের রাসায়নিক সংকেত কোনটি?

[DU-7Clg. 2021-22]

- A. Cl^- B. ClO^- C. ClO_2^- D. ClO_3^-

Explanation ক্লোরাইট আয়নের সংকেত $\rightarrow \text{ClO}_2^-$

• ক্লোরাইট আয়নের সংকেত $\rightarrow \text{ClO}_2^-$

• ক্লোরিন মনোক্লোরাইড $\rightarrow \text{ClO}^-$

• ক্লোরেট $\rightarrow \text{ClO}_3^-$

07. XeF_4 -এ জেনন (Xe) পরমাণুর হাইব্রিডাইজেশন কী হবে?

[DU-7Clg. 2021-22]

- A. sp^2 B. sp C. sp^3d D. sp^3d^2

Explanation অজৈব যৌগের ক্ষেত্রে সংকরিত অরবিটালের প্রকৃতি নির্ণয়:

সূত্র: $x = \frac{1}{2}$ [যোজ্যতা শেলে ইলেকট্রন সংখ্যা + একযোজী পরমাণুর সংখ্যা -

ক্যাটায়নের চার্জ + অ্যানায়নের চার্জ] $x = \frac{1}{2} [V + M - C + A]$

যেখানে, x = হাইব্রিড অরবিটালের সংখ্যা

সূত্রানুসারে, XeF_4 -এ, $x = \frac{1}{2} (8 + 4 + 0 + 0) = 6 \therefore \text{sp}^3d^2$ সংকরণ

08. তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে বেশি কোনটির?

[DU-7Clg. 2021-22]

- A. C B. Cl C. O D. Br

Explanation তড়িৎ ঋণাত্মকতার ক্রম: $\text{O}(3.5) > \text{Cl}(3) > \text{Br}(2.8) > \text{C}(2.5)$

09. $\text{CH}_3\text{-CH=CH-C}\equiv\text{CH}$ যৌগ σ (সিগমা) বন্ধনের সংখ্যা কতটি?


[DU-7Clg. 2020-21]

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Explanation σ বন্ধন সংখ্যা = মোট পরমাণু সংখ্যা - 1 = 11 - 1 = 10 (অ্যালিফেটিক যৌগের ক্ষেত্রে)।

19. নিম্ন কোন অক্সাইডটি সর্বাধিক অম্লীয়? [DU-7Clg: 2020-21]
 A. CO B. SiO₂ C. P₂O₅ D. CO₂ **Ans: C**
20. নিম্ন কোনটি অবস্থার মৌল নয়? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. Bi B. Ni C. Mn D. Cr
Explanation: বেসার d-ব্লক মৌল অন্তত এমন একটি আয়ন গঠন করে, যাদের ইলেক্ট্রন বিন্যাসে d-অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ (d¹ - d⁹) থাকে, তাদের অবস্থার মৌল বলে।
 কিন্তু Bi(3+) → [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³
 Bi এর d অরবিটাল পূর্ণ অর্থাৎ এটি অবস্থার মৌল নয়।
21. নিম্ন কোন যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন ঘটে না? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. NH₃ B. HF C. CH₄ D. CH₃OH
Explanation: CH₄ যৌগে H-বন্ধন ঘটানো সম্ভব না, কারণ পোলার যৌগসমূহে H-বন্ধন ঘটে। কিন্তু CH₄ পূর্ণ সমযোজী যৌগ।
22. কোনগুলো অম্লধাতু? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. Na, K, Rb B. Mg, Al, Sb C. Si, Ge, As D. Ba, Fe, Ni
Explanation: অম্লধাতুগুলো মৌল 6টি
 B, Si, Ge, Sb, As, Te
23. নিম্ন কোন মৌলটি পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে না? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. Mn B. Fe C. Zn D. Co
Explanation: অবস্থার মৌল ওগুলো পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে।
 যেমন - Fe, Co, Ni, Mn। Zn একটি d ব্লক মৌল কিন্তু অবস্থার মৌল নয়।
24. নিম্ন কোনটির আকার সবচেয়ে ছোট? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. Na⁺ B. Na C. Mg²⁺ D. Mg
Explanation: আকারের সঠিক ক্রম: Mg²⁺ < Na⁺ < Mg < Na
25. কোন অণুর আকৃতি সমতলীয়? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. C₂H₂ B. CH₄ C. NH₃ D. PCl₃
Explanation: যৌগের সংকরণ ও আকৃতি:
- | যৌগ | সংকরণ | আকৃতি |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| CH ₄ | sp ³ | চতুস্তলকীয় |
| NH ₃ | sp ³ | ত্রিকোণীয় পিরামিড |
| PCl ₃ | sp ³ | পিরামিড |
| C ₂ H ₂ | sp | সমতলীয় |
26. NH₃ অণুতে H-N-H বন্ধন কোণের মান কত? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. 105° B. 109° C. 107° D. 120°
Explanation: NH₃ অণুতে H-N-H এর বন্ধন কোণ 107°
27. এক মোল H₂ গ্যাসে কয়টি ইলেক্ট্রন আছে? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. 6.02 × 10²³ B. 6.02 × 10²⁶ C. 2.02 × 10²² D. 12.04 × 10²³
Explanation: 1 mol H₂ এ 2 mol H পরমাণু আছে।
 তাই X = nN_A = 2 × 6.02 × 10²³
28. কোনটির ইলেক্ট্রন বিন্যাস Al³⁺ আয়নের অনুরূপ? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. O B. F⁻ C. Cl⁻ D. Mg²⁺
Explanation: (13) Al³⁺ ⇒ 1s² 2s² 2p⁶
 O ⇒ 1s² 2s² 2p⁴
 F ⇒ 1s² 2s² 2p⁶
 Mg ⇒ 1s² 2s² 2p⁶ 3s²
29. ইলেক্ট্রন আসক্তির সঠিক ক্রম কোনটি? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. F > Cl > Br > I B. Cl > F > Br > I
 C. I > Br > Cl > F D. Cl > Br > F > I
Explanation: হ্যালাজেনের ইলেক্ট্রন আসক্তির সঠিক ক্রম:
 Cl > F > Br > I
30. কোনটিতে আয়নিক ও সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. NaCl B. H₂S C. KCN D. CH₃Cl
Explanation: KCN যৌগে K⁺ ও CN⁻ আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়। এবং CN-এ কার্বন ও নাইট্রোজেন সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়।

22. কোন মৌলের 1ম আয়নিকরণ শক্তি সর্বোচ্চ? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. নাইট্রোজেন B. অক্সিজেন C. সোডিয়াম D. ক্যালসিয়াম
Explanation: নাইট্রোজেনের আয়নিকরণ শক্তি অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি।
23. কোন ধাতুর পরমাণুর s অরবিটালে একটি বিজোড় ইলেক্ট্রন আছে? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. Cr B. Co C. Fe D. Mg
Explanation: Cr = [Ar] 3d⁵ 4s¹ Co = [Ar] 3d⁷ 4s²
 Fe = [Ar] 3d⁶ 4s² Mg = [Ne] 3s²
24. কোন মৌলটির 1ম আয়নিকরণ শক্তি সবচেয়ে কম? [DU-7Clg: 2017-18]
 A. Mg B. Al C. Na D. Si
Explanation: পর্যায় সারণির বাম থেকে ডান দিকে গেলে মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
25. [Fe(H₂O)₆]³⁺ আয়নে Fe³⁺ ও H₂O এর মধ্যে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান? [DU-7Clg: 2017-18]
 A. আয়নিক বন্ধন B. সমযোজী বন্ধন
 C. সন্নিবেশ বন্ধন D. হাইড্রোজেন বন্ধন
Explanation: Fe³⁺ ও H₂O এর মধ্যে সন্নিবেশ বন্ধন বিদ্যমান



26. কোন যৌগের গঠন সরলরেখিক? [DU-7Clg: 2017-18]
 A. CO₂ B. H₂O C. NH₃ D. SO₂
Explanation: CO₂ এর গঠন সরলরেখিক O = C = O

IQA // IMPORTANT QUESTION FOR BCU ADMISSION

01. কার্বন মৌল হীরা ও গ্রাফাইট-এ ভিন্নরূপ। এদের ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সত্য নয়?
 A. উভয়েই কার্বন মৌল দ্বারা গঠিত
 B. হীরা ও গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুর সংকরায়ন হলো কথাক্রমে sp³ ও sp²
 C. উভয়ের দহন তাপ একই
 D. উভয়ের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ভিন্ন
Explanation: কার্বনের রূপ হীরা ও গ্রাফাইট এর পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

হীরা	গ্রাফাইট
সংকরায়ন sp ³	sp ² সংকরায়ন
বিদ্যুৎ অপরিবাহী	বিদ্যুৎ পরিবাহী
গলনাংক 3600°C	গলনাংক 3720°C
আপেক্ষিক গুরুত্ব 3.5	আপেক্ষিক গুরুত্ব 2.1
বর্ণহীন	কালো বর্ণের
ক্ষটিক → অটতলাকার	ক্ষটিক → ঘড়ীতলাকার

02. কোনটি অম্লীয় জলীয় দ্রবণ তৈরি করে?
 A. Na₂O B. ZnO C. Al₂O₃ D. CO₂
Explanation: খাতব অক্সাইড এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় এবং অখাতব অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ অম্লীয়
 (i) Na₂O + H₂O → 2NaOH (ii) ZnO + H₂O → Zn(OH)₂
 (iii) Al₂O₃ + 3H₂O → 2Al(OH)₃ (iv) CO₂ + H₂O → H₂CO₃
03. প্রথম ট্রানজিশন ধাতু সিরিজের একটি ধাতু হতে প্রাপ্ত একটি M³⁺ আয়নে পাঁচটি ইলেক্ট্রন 3d সাবশেলে অবস্থিত। M³⁺ আয়নটি কী হতে পারে?
 A. Cr³⁺ B. Mn³⁺ C. Fe³⁺ D. Sc³⁺
Explanation: মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাস:

মৌল	ইলেক্ট্রন বিন্যাস
Cr ³⁺ (24)	[Ar] 3d ³
Mn ³⁺ (25)	[Ar] 3d ⁴
Fe ³⁺ (26)	[Ar] 3d ⁵
Sc ³⁺ (21)	[Ar]

D. $\text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Ne}$

01 A

রাসায়নিক পরিবর্তন

CHEMICAL CHANGES

কি, কৈন পড়বে? SURVEY TABLE কতটুকু পড়বে?

ক্রমিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	জীন কেমিস্ট্রি ও প্রভাবক সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★
02	সামগ্রিক ও লা-শাতেলীয়ার নীতি	★★★
03	K_p ও K_c সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★
04	অ্যাসিডের বিয়োজন ও শক্তিমাাত্রা	★★
05	pH ও বাফার দ্রবণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★

টপিক আলোচনা

জীন কেমিস্ট্রি:

- পরিবেশ দূষণ রোধে 1991 সালে যুক্তরাষ্ট্রে মি. পল অ্যানাস্তাস এবং ওয়ার্নার জীন কেমিস্ট্রির প্রস্তাব করেন।
- জীন কেমিস্ট্রির প্রতিপাদ্য বিষয় হল ক্ষতিকর ও বিতর্কিত রাসায়নিক দ্রব্যের বিকল্প ব্যবহার।
- জীন কেমিস্ট্রির নীতি 12টি। 1991 সালে পাউল টি. অ্যানাস্তাস (Paul T. Anastas) এবং জন সি. ওয়ার্নার (John C. Warner) সবুজ রসায়নের 12টি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। নীতিমালাসমূহকে 'ঝুঁকি হ্রাসকরণ' ও পরিবেশগত দূষণ সীমিতকরণ' নামক দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

বিক্রিয়ার হারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক সমূহ: খুব সহজভাবে একবাক্যে মনে রাখবে-

তাপের ↓ তাপমাত্রা	চাপের ↓ চাপ	ঘন ↓ ঘনমাত্রা	পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ↓ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল	অনেক ↓ অনুঘটক	আলোকিত ↓ আলোক
-------------------------	-------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

টেকনিক: সব বাড়ালে বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ে।

ব্যতিক্রম:

- প্রভাবক
- ধনাত্মক প্রভাবক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে
- ঋণাত্মক প্রভাবক বিক্রিয়ার গতি হ্রাস করে।

এক নজরে অনুঘটকের নানা তথ্য:

শ্রেণীবিভাগ	উদাহরণ
ধনাত্মক অনুঘটক	Pt (NH ₃), V ₂ O ₅ (MnO ₂), Cu, Fe, Al ₂ O ₃
ঋণাত্মক অনুঘটক	H ₃ PO ₄ (H ₂ O ₂), ROH (CHCl ₃ + O ₂), CO, Urea
স্বয়ংক্রিয় অনুঘটক	Mn ⁺⁺
আবিষ্ট প্রভাবক	Na ₂ SO ₃
প্রভাবক বিষ	As ₂ O ₃
প্রভাবক উদ্ভীপক	Fe (Al ₂ O ₃ +K ₂ O) Fe(K ₂ O+Cr ₂ O ₃)

এক নজরে শিল্পক্ষেত্রে অনুঘটকের ব্যবহার:

শিল্প	অনুঘটক
NH ₃ উৎপাদন	Fe (প্রভাবক), সহায়ক Mo/Al ₂ O ₃
H ₂ SO ₄ উৎপাদন	Pt বা V ₂ O ₅
ডালডা উৎপাদন	Ni
মিথানল উৎপাদন	ZnO + Cr ₂ O ₃

রাসায়নিক সাম্যাবস্থার প্রধান চারটি শর্ত:

প্রভাব ভূমিকাহীনতায় উভয়ের সাম্যতা অসম্পূর্ণ হলো-

প্রভাব ভূমিকাহীনতায় ↓ প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা	উভয়ের ↓ উভয়দিক থেকে সুগম্যতা	সাম্যতা ↓ সাম্যের স্থায়িত্ব	অসম্পূর্ণ হলো ↓ বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা
--	---	---------------------------------------	---

ভ্যান্টহফের সমীকরণ: $\log K_p = \frac{-\Delta H}{2.303RT} + C$ দ্বারা সাম্যাংকের উপর তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়।

সাম্যাংক বা সামগ্রিক: বিক্রিয়া একবার সাম্যাবস্থায় উপনীত হলে বিক্রিয়ক বা উৎপাদের ঘনমাত্রা পরিবর্তন করলে সাম্যাংক [K] এর কোন পরিবর্তন হয় না। কেবলমাত্র তাপমাত্রা (Temperature) বাড়ালে বা কমালে সাম্যাংক [K] পরিবর্তিত হয়।

প্রকারভেদ: সাম্যাংক বা সামগ্রিক [K] দুই প্রকার। যথা-

i. মোলার ঘনমাত্রার সামগ্রিক (K_c) ii. আংশিক চাপে সামগ্রিক (K_p)।

পানির আয়নিক গুণফল (K_w): বিজ্ঞানী কোলরাস ও হেড উইলার (১৮৯৪) দেখান যে, বিশুদ্ধ পানি অতি দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য। পানির আয়নিক গুণফলকে K_w দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 25°C তাপমাত্রা, $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$

$$\text{অর্থাৎ } K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14} \text{ M}^2$$

 K_w এর উপর তাপমাত্রার প্রভাব: তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানির বিয়োজন মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে H^+ ও OH^- আয়নের মোলার ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অতএব তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানির আয়নিক গুণফল, K_w বৃদ্ধি পায়।


তাপমাত্রা	$K_w (\text{mol/L})^2$	তাপমাত্রা	$K_w (\text{mol/L})^2$
0°C	0.0114×10^{-14}	30°C	1.468×10^{-14}
10°C	0.292×10^{-14}	40°C	2.119×10^{-14}
25°C	1.008×10^{-14}	100°C	7.500×10^{-14}

pH এর গুরুত্ব:



ক্ষেত্র	pH ব্যবহার বা গুরুত্ব		
	মাটির pH	প্রভাব	করণীয়
কৃষি ক্ষেত্র	pH < 3 বা অধিক অম্লীয়	গাছপালা মরে যায় বা উৎপাদন হয় না	pH বাড়তে CaO, ডলোমাইট (CaCO ₃ , MgCO ₃), (NH ₄) ₂ CO ₃ [Ca+Mg (যৌগ)] সার
	pH > 9.5 বা অধিক ক্ষারীয়	অণুজীব মুক্ত হয় বা উর্বরতা নষ্ট হয়	pH কমাতে নাইট্রেট সার (KNO ₃ , NH ₄ NO ₃), ফসফেট সার TSP [Ca(H ₂ PO ₄) ₂], ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট [Ca(H ₂ PO ₄) ₂ ·H ₂ O]; 2(CaSO ₄ ·2H ₂ O), ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট- (DAP) [(NH ₄) ₂ HPO ₄]
	pH 7-8	ফসল ভাল হয়	pH 7-8 রাখা জরুরি।
মানুষের রক্ত	রক্তের pH 7.4 (সীমা 6.8-7.8) মাত্র 0.5 পরিবর্তিত হলে জীবন বিপন্ন হয়। জেনে রাখা ভালো pH 6.8 এর কম হলে বিষয়টিকে এসিডোসিস এবং pH 7.8 এর বেশি হলে অ্যালকালিসিস বলে। মাতৃ দুগ্ধ: 6.6- 6.9, প্রসাব: 4.8-7.5 চোখের পানি: 4.8-7.5, শ্যাম্পু: 5.0-5.5 EDTA: 10. সাবান 7.0 এর অধিক।		

অম্লের শক্তিমাাত্রা সম্পর্কিত তথ্যাবলী:


- অম্ল বিয়োজন ধ্রুবক (K_a): K_a এর মান যত বড় হয় এসিডটি তত তীব্র হয়।
- হাইড্রোসিডের অম্লধর্মের তীব্রতা- এদের অনুষ্ঠিত ঋণাত্মক আয়নের আকার যত বড় হয়, অম্লের তীব্রতা তত বেশী হয়। যেমন- HI > HBr > HCl > HF
- অক্সোএসিড সমূহের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারন সংখ্যা যত বেশী ঐ এসিডের তীব্রতা তত বেশী হয়।



- অক্সো এসিড সমূহের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারন সংখ্যা সমান হলে তখন যেটির কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার ছোট হবে অর্থাৎ চার্জ ঘনত্বের ক্রম বৃদ্ধি অনুসারে এসিডের তীব্রতা বেশী হবে।




- অজৈব এসিড জৈব এসিডের তুলনায় শক্তিশালী।



- বাফার দ্রবণ: যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারকের দ্রবণ যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে তাকে বাফার দ্রবণ বলে।

বাফার দ্রবণ 2 প্রকার: অম্লীয় বাফার দ্রবণ- [দুর্বল এসিড + অনুবন্ধী ক্ষারক (সবল ক্ষারের লবণ)]।



- ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ: [দুর্বল ক্ষারক + অনুবন্ধী এসিড (সবল এসিডের লবণ)]



- বাফার দ্রবণ প্রস্তুতিতে হেন্ডারসন হ্যাসেলবাখ সমীকরণ:

• অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে: $pH = pK_a + \log \frac{[লবণ]}{[অম্ল]}$

• ক্ষারীয় বাফারের ক্ষেত্রে: $pOH = pK_b + \log \frac{[লবণ]}{[ক্ষারক]}$

বা $pH = 14 - pK_b - \log \frac{[লবণ]}{[ক্ষার]}$

- তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার উদাহরণ:

হাই	কাল	সাথীর	মিতা	নাই
$H_2 + O_2$	$C + O_2$	$SO_2 + O_2$	$CH_4 + O_2$	$N + H_2$
$\rightarrow H_2O$	$\rightarrow CO_2$	$\rightarrow SO_3$	$\rightarrow CO_2 + H_2O$	$\rightarrow NH_3$

- ঘনমাত্রা থেকে pH বা pOH নির্ণয়-

উদাহরণ-01: 0.01M $Ba(OH)_2$ দ্রবণের pOH কত?

সমাধান: $S = 0.01 \times 2 = 0.02$ [যেহেতু $OH^- = 2$ টি]

$\therefore pOH = -\log(0.02) = 1.69$

- Power থেকে pOH নির্ণয়-

উদাহরণ-01: 10^{-3} M H_2SO_4 এর pH কত?

সমাধান: $[H^+] = 2 \times 10^{-3} \Rightarrow pH \Rightarrow 2.698 \approx 2.7$

জেনে রাখা ভালো: pH নির্ণয়ের কমন সূত্র,

$pH = -\log[H^+] = -\log[\alpha C] = -\log \sqrt{Ka \cdot C}$

- CALCULATOR ছাড়া pH নির্ণয়ের আরেকটি চমক

Calculator ছাড়া pH নির্ণয় নির্ণয় করতে হলে নিচের মানগুলো মনে রাখা জরুরী।

$\log 1 = 0$	$\log 2 = 0.3$	$\log 3 = 0.5$	$\log 4 = 0.6$
$\log 5 = 0.7$	$\log 6 = 0.8$	$\log 7 = 0.9$	$\log 10 = 1$

➤ দেখ সবই সহজ log 2 বাদে বাকী সবগুলোর log ভিত্তিক মান বের করতে হলে ঐ সংখ্যার আগে দশমিক বসিয়ে তার সাথে (0.2) যোগ করে দাও।

TRICKS: pH = দশমিকের পর যত অংক $-\log$ of শেষ অংক

উদাহরণ: 01 0.001M $HClO_4$ এর pH কত?

সমাধান: $pH = 3 - \log 1 = 3 - 0 = 3$

- pH বা pOH থেকে ঘনমাত্রা নির্ণয়-

মূল সূত্র: pH বা pOH দেওয়া থাকলে সরাসরি,

i) $[H^+] = 10^{-pH}$; ii) $[OH^-] = 10^{-pOH}$

এবার উদাহরণ লক্ষ্য কর-

উদাহরণ-01: পাকস্থলীর পাঁচক রসে pH এর মান 1.4 হলে ঐ রসে H^+ আয়নের ঘনমাত্রা কত?

সমাধান: $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-1.4} = 0.0398M$

- হ্যান্ডারসন-হেসেলবাখ সমীকরণ সম্পর্কিত সমস্যা:

Acid/Base ক্ষেত্রে- $pH = pK_a + \log \frac{V_b S_b}{V_a S_a - V_b S_b}$ [সূত্রটি লবণ উল্লেখ না

থাকলে সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে।]

উদাহরণ: 10 ml 0.1 M ইথানোয়িক এসিড ($pK_a = 4.76$) দ্রবণে 4 ml 0.1 M NaOH দ্রবণ যোগ করলে উৎপন্ন দ্রবণের pH মান কত হবে?

সমাধান: $pH = pK_a + \log \frac{V_b S_b}{V_a S_a - V_b S_b}$

$= 4.76 + \log \frac{4 \times 0.1}{10 \times 0.1 - 4 \times 0.1} = 4.58$

- কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্র:

• হেসের তাপ সমষ্টিকরণ সূত্র: $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$

• সূত্র: $Q = ms\Delta\theta$

• তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে- বিক্রিয়ার এনথালপি $\Delta H =$ (উৎপাদের এনথালপি - বিক্রিয়কের এনথালপি)

• তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে- বিক্রিয়ার এনথালপি $\Delta H =$ (বিক্রিয়কের এনথালপি - উৎপাদের এনথালপি)

• দহন তাপে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র: দহন তাপে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ = $\frac{\text{উৎপন্ন তাপ}}{\text{দহন তাপ}} \times \text{আণবিক ভর}$

• প্রতি গ্রাম বস্তু থেকে উৎপন্ন তাপ = $\frac{\text{দহন তাপ}}{\text{আণবিক ভর}}$

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

- বিশুদ্ধ পানিতে OH^- এবং H^+ এর মোলার ঘনমাত্রার অনুপাত- 1।
- প্রথম ক্রমের বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান কোনটির উপর নির্ভরশীল নয়- বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা।
- তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়াতে- বিক্রিয়া হার কমে।
- মাটির pH বাড়তে ব্যবহৃত যৌগ- ডলোমাইট।
- $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ বিক্রিয়ায় k_p এর মান- $k_p = k_c (RT)^{-2}$ ।
- বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা (মোল/লিটার)- 55.5।
- 0.1 M CH_3COOH দ্রবণের pH- 2.872।
- 0.1M HCl এর pH মান- 1.0।
- রক্তের বাফার কী ধরনের বাফার- উৎকৃষ্ট বাফার।
- 25°C তাপমাত্রায় K_w এর মান- 1×10^{-14} ।
- গ্রীন কেমিস্ট্রির নীতি কতটি- 12টি।
- বিক্রিয়ার হারের একক- $\text{mol L}^{-1} \text{S}^{-1}$ ।
- স্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 উৎপাদনে কোন দুটি প্রভাবক ব্যবহার করা হয়- Pt বা V_2O_5 ।
- এনজাইম একধরনের- টারসিয়ারি প্রোটিন নামক জটিল জৈব পদার্থ।
- H_3PO_3 এর ক্ষারকত্ব কত- 2।
- মানুষের রক্তের pH 7.45 এর বেশি হলে তাকে বলে- অ্যালকালিসিস।
- মানুষের রক্তের pH 7.0 এর নিচে হলে তাকে বলে- এসিডোসিস।
- যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষার যোগ করার পরেও pH পরিবর্তিত হয় না তাকে কী বলে- বাফার দ্রবণ বলে।
- অক্সি এসিডসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এসিড- $HClO_4$ ।
- k_p ও k_c এর মান সমান হবে যখন বিক্রিয়াটির Δn এর মান- 0।
- বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কীসের উপর নির্ভর করে না- ঘনমাত্রা।
- হেবার পদ্ধতিতে NH_3 উৎপাদনে প্রভাবক হিসেবে থাকে- Fe, K_2O , Al_2O_3 ।
- রাসায়নিক সাম্যাবস্থার শর্তসমূহ সাম্যের স্থায়িত্ব, উভয়দিক থেকে সুগম্যতা, বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা, প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা।
- বিক্রিয়ার উভয়দিকে মোল সংখ্যা সমান হলে চাপ- পরিবর্তিত হয় না।

- k_c ও k_p এর মান- শূন্য বা অসীম হতে পারে না।
- $pH = 7$ হলে তা হবে- নিরপেক্ষ দ্রবণ।
- তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপের গড় মান- 57.34 kJ
- অক্সি এসিডসমূহের মধ্যে ২য় সর্বোচ্চ শক্তিশালী এসিড- H_2SO_4
- কোনটি দিয়ে ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ তৈরী করা যায়- NH_4Cl ও NH_4OH
- কোনটির pH পরিসর- $6.6 - 6.9$
- মাতৃদুগ্ধের pH পরিসর- $6.6 - 6.9$
- বিতক পানিতে কিছু অম্ল যোগ করলে- দ্রবণে H^+ এর ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- কোন লবণটির জলীয় দ্রবণ ক্ষারকীয়- NaCN
- পিত্তরসের pH গড়ে- 7.8
- এনজাইম কোন শ্রেণীর যৌগ- প্রোটিন।
- সক্রিয় শক্তি বেশি হলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার- কম হবে।
- $\text{CO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH(g)}$ বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে 127°C তাপমাত্রায় বেগ দ্রবকের মান 27°C তাপমাত্রায় বেগ দ্রবকের মানের 10 গুণ হলে বিক্রিয়াটির সক্রিয় শক্তির মান- 22.98 kJ/mol
- ইউরিয়া থেকে মেলামাইন তৈরিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে- TiO_2
- গ্রীন কেমিস্ট্রি সম্পর্কে সঠিক ধারণা- পরিবেশ দূষণ কম হবে এমন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করা।
- এনজাইম হল- প্রোটিন।
- সমস্ত প্রভাবন- $2\text{SO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \xrightarrow{\text{NO(g)}} 2\text{SO}_3\text{(g)}$
- বিক্রিয়ার কো-হোসের জন্য যে তথ্যটি সঠিক- সক্রিয় শক্তি বৃদ্ধি।
- পটাশিয়াম ক্রোমেট থেকে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুতির সময় ধনাত্মক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে- MnO_2
- বিক্রিয়াটির K_p উহার K_c এর মান অপেক্ষা বড়- $2\text{SO}_3 \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$
- কোন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদকের মোল সংখ্যা যখন সমান হয়, তখন- $K_p = K_c$
- $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ সাম্য বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থায় চাপ প্রয়োগ করলে- বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হবে।
- $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে- চাপ বাড়ালে উৎপাদন বাড়ে।
- দ্বি-ক্ষারীয় এসিড- H_2SO_4
- তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এসিড- H-COOH
- সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষার- CsOH
- সংযুক্তি এসিড বাফার নয়- $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$
- $0.005 \text{ M H}_2\text{SO}_4$ দ্রবণের pH কত- 2
- $0.02 \text{ M H}_2\text{SO}_4$ এসিডের pH এর মান- 2।
- 0.002 M সালফিউরিক এসিড দ্রবণের pH - 2.40।
- $5.0 \times 10^{-2} \text{ M NaOH}$ দ্রবণের pH এর মান- 12.7।
- কোন বাফার দ্রবণে সমঘনমাত্রার X^- ও HX আছে। HX এর $K_a = 10^{-6}$ হলে বাফার দ্রবণটির pOH মান- 8
- জলীয় 0.02 M Ba(OH)_2 দ্রবণের pH মান- 12.6
- কোন বাফার দ্রবণে ইথানয়িক এসিড ($K_a = 1.76 \times 10^{-5}$) ও সোডিয়াম ইথানয়েটের ঘনমাত্রা যথাক্রমে 0.10 ও 0.15 mol L^{-1} হলে দ্রবণটির pH - 4.93
- কোন দ্রবণের OH^- আয়নের ঘনমাত্রা 4×10^{-5} মোল/লিটার। ঐ দ্রবণের pH - 9.60
- 4.25 mol H_2 ও 4.75 mol I_2 মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে 6.70 mol HI উৎপন্ন হলে, K_c এর মান- 35.61
- 90°C তাপমাত্রায় PCl_5 এর 35% বিয়োজিত হয়। সাম্যাবস্থায় মোট চাপ 1.5 atm হলে K_p এর মান- 0.2094 atm
- দুর্বল জৈব ক্ষারক- Phenolphthalein
- মানুষ কোন ধরনের খাবার গ্রহণ করলে বা ঔষধ রূপে রক্তে যোগ করলে তা সাম্যাবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করে- $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$
- 25°C তাপমাত্রায় তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপ- $-57.34 \text{ kJ mol}^{-1}$
- এনট্রপি সবচেয়ে কম থাকে - কঠিন অবস্থায়।

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $2\text{A} \rightarrow \text{B} + 4\text{C}$ বিক্রিয়াটির হারের সমীকরণ কোনটি? [DU-7Clg. 2023-24]
 A. $\frac{d[\text{A}]}{dt} = 4 \frac{d[\text{C}]}{dt}$ B. $-\frac{d[\text{A}]}{dt} = 4 \frac{d[\text{C}]}{dt}$
 C. $-\frac{1}{2} \frac{d[\text{A}]}{dt} = \frac{1}{4} \frac{d[\text{C}]}{dt}$ D. $-\frac{1}{2} \frac{d[\text{A}]}{dt} = 4 \frac{d[\text{C}]}{dt}$
Explanation $2\text{A} \rightarrow +4\text{C}$ বিক্রিয়ার হারের সমীকরণ
 $-\frac{1}{2} \frac{d[\text{A}]}{dt} = + \frac{d[\text{B}]}{dt} = \frac{1}{4} \frac{d[\text{C}]}{dt}$
02. $2\text{A(g)} \rightleftharpoons \text{B(g)}$ বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থার জন্য কোন উক্তিটি সঠিক? [DU-7Clg. 2023-24]
 A. $K_p > K_c$ B. $K_p < K_c$ C. $K_p = K_c$ D. $K_p/K_c = 2$
Explanation $2\text{A(g)} \rightleftharpoons \text{B(g)}$
 এখানে, $\Delta n = 1 - 2 = -1$
 • $\Delta n = 0$ হলে, $K_p = K_c$ • $\Delta n = (+)$ ve হলে, $K_p > K_c$
 • $\Delta n = (-)$ ve হলে, $K_c > K_p$
03. কোন শর্তে বাফার ক্ষমতা সর্বাধিক? [DU-7Clg. 2023-24]
 A. $pH = pK_a$ B. $pH > pK_a$ C. $pH < pK_a$ D. $pH \geq pK_a$
Explanation বাফার ক্ষমতা: প্রতি লিটার বাফার দ্রবণের মধ্যে যত গ্রাম অণু বা যত মোল তীব্র এসিড অথবা তীব্র ক্ষার যোগ করার ফলে বাফার দ্রবণের pH এর মান এক একক পরিবর্তিত হয় তাকে উক্ত দ্রবণের বাফার ক্ষমতা বলে।
 • গাণিতিকভাবে প্রকাশ: 1 লিটার আয়তনের অম্লীয় বাফার দ্রবণের মধ্যে কোনো 1টি তীব্র এসিডের dA গ্রাম অণু যোগ করলে যদি দ্রবণের pH মান dpH পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহলে বাফার ক্ষমতা,

$$\beta = \frac{1 \text{ লিটার দ্রবণে যোগকৃত এসিড বা ক্ষারের গ্রাম-অণুর সংখ্যা}}{pH \text{ এর পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{dA}{dpH} \text{ [ক্ষারীয় বাফারের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সূত্র প্রযোজ্য]}$$
 • সর্বোচ্চ বাফার ক্ষমতার শর্ত: অনুবন্ধী ক্ষার ও দুর্বল অম্ল অথবা অনুবন্ধী অম্ল ও দুর্বল ক্ষার এর ঘনমাত্রা সমান বা এদের অনুপাত 1 হতে হবে। অর্থাৎ $pH = pK_a$ ও $pOH = pK_b$ হতে হবে।
04. FeCl_3 এর জলীয় দ্রবণের pH কত? [DU-7Clg. 2023-24]
 A. < 7 B. > 7 C. 7 D. 0
Explanation $\text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe(OH)} + \text{HCl}$
 FeCl_3 এর জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী। তাই এর $pH < 7$
05. নিচের কোনটি বাফার দ্রবণ? [DU-7Clg. 2022-23]
 A. $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ B. $\text{NaOH} + \text{NaCl}$
 C. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaCl}$ D. $\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH}$
Explanation বাফার দ্রবণ: যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারকের দ্রবণ যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে তাকে বাফার দ্রবণ বলে।
 □ বাফার দ্রবণ 2 প্রকার:
 • অম্লীয় বাফার দ্রবণ- [দুর্বল এসিড + অনুবন্ধী ক্ষারক (সবল ক্ষারের লবণ)]
 উদাহরণ: (i) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$, (ii) $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{HPO}_4^{2-}$
 • ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ: [দুর্বল ক্ষারক + অনুবন্ধী এসিড (সবল এসিডের লবণ)]
 উদাহরণ: (i) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCO}_3^-$ (ii) $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4^+$
06. নিচের কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী এসিড? [DU-7Clg. 2022-23]
 A. HClO_4 B. HCl C. HClO_2 D. HClO_3
Explanation কেন্দ্রীয় পরমাণুর চার্জ সংখ্যা যত বেশি হবে সে এসিড তত বেশি শক্তিশালী। $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_2 > \text{HCl}$
07. 0.001 M KOH দ্রবণের pH কত? [DU-7Clg. 2022-23]
 A. 7 B. 11 C. 14 D. 0.01
Explanation $P^{OH} = -\log(0.001) = 3$
 $\therefore P^H = 14 - P^{OH} = 14 - 3 = 11$


08. 90°C তাপমাত্রায় বিতক্ত পানিতে $[H_3O^+] = 10^{-6} M$ । এ তাপমাত্রায় K_w এর মান হবে-
 A. 10^{-14} B. 10^{-12} C. 10^{-13} D. 10^{-10}
(B) Explanation আমরা জানি, $K_w = [H_3O^+][OH^-]$
 $\therefore K_w = 10^{-6} \times 10^{-6} = 10^{-12} \therefore [H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-6}$

09. নিচের কোনটির বন্ধন শক্তির মান সবচেয়ে বেশী? [DU-7Clg: 2020-21]
 A. C-I B. C-Br C. C-Cl D. C-F

(D) Explanation এখানে, C-Cl, C-I, C-Br, C-F এর মধ্যে বন্ধনশক্তি C-F এর বেশী। কারণ F এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা (4.0) অন্যান্য হ্যালোজেনসমূহের Cl(3.0), Br(2.8) I(2.5) চেয়ে বেশী। এজন্য সমযোজী বন্ধনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে প্রবণতা বেশী। এজন্য এই বন্ধন (C-F) ভাঙতে বেশী শক্তি প্রয়োজন হবে অন্যান্য বন্ধনের তুলনায়।

10. রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি প্রভাবক কিসের পরিবর্তন ঘটায়? [DU-7Clg: 2020-21]
 A. এন্ট্রপি B. এনথালপি C. দ্রবণ তাপ D. সক্রিয় শক্তি

(D) Explanation রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবকের কাজ সাধারণত বিক্রিয়ার সক্রিয় শক্তির হ্রাস করে বিক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও ত্বরান্বিত করা।



11. 0.01 M NaOH দ্রবণের pH কত? [DU-7Clg: 2020-21]
 A. 1 B. 2 C. 12 D. 13

(C) Explanation NaOH একটি মনোপ্রোটিক ক্ষার এক্ষেত্রে, NaOH এর $pOH = -\log [0.01 \times 1] = -\log [10^{-2}] = 2$
 $\therefore pOH + pH = 14$
 $\therefore pH = 14 - 2 = 12$

12. কোনটি $A \rightarrow B$ বিক্রিয়ার হার নির্দেশ করে? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. $-\frac{dB}{dt}$ B. $-\frac{dA}{dt}$ C. $-\frac{dt}{dA}$ D. $-\frac{dt}{dB}$

(B) Explanation বিক্রিয়ার হার, $r = -\frac{d[A]}{dt} = +\frac{d[B]}{dt}$

13. $2KCl \xrightarrow{MnO_2} 2KCl + 3O_2$ বিক্রিয়ায় MnO_2 কোন ধরনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে? [DU-7Clg: 2019-20]

- A. ধনাত্মক প্রভাবক B. ঋণাত্মক প্রভাবক
 C. অটো প্রভাবক D. আবিষ্ট প্রভাবক

(A) Explanation ধনাত্মক অনুঘটক Pt (NH_3), V_2O_5 (MnO_2), Cu, Fe, Al_2O_3

14. স্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 এর শিল্পোৎপাদনে কোনটি প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. Fe চূর্ণ B. Mo C. Fe_2O_3 D. V_2O_5

(D) Explanation স্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 এর শিল্পোৎপাদনে Pt বা, V_2O_5 প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

15. 0.01 M ঘনমাত্রার জলীয় HCl দ্রবণের pH কত হবে? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

(C) Explanation আমরা জানি, $pH = -\log [H^+] = -\log [0.01] = 2$

16. তাপহারী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপ প্রয়োগে কোনটি ঘটে? [DU-7Clg: 2019-20]
 A. সামনের দিকে অগ্রসর হয় B. পিছনের দিকে অগ্রসর হয়
 C. স্থির থাকে D. সাম্যাবস্থা বিলুপ্ত হয়

(A) Explanation তাপহারী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপ প্রয়োগ করলে:

- i. বিক্রিয়ক থেকে নতুন উৎপাদ অণু সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়।
 ii. বিক্রিয়াটি সম্মুখমুখী হওয়ায় বিক্রিয়কের পরিমাণ হ্রাস পায়।

17. CH_3COOH ও CH_3COONa এর মিশ্রণের জলীয় দ্রবণে কয়েক কোটি লব্ধি অ্যাসিড যোগ করলে নিম্নের কোনটি ঘটবে? [DU-7Clg: 2018-19]

- A. CH_3COONa এর ঘনমাত্রা কমবে B. pH বাড়বে
 C. pH কমবে D. pH অপরিবর্তিত থাকবে

(D) Explanation CH_3COOH ও CH_3COONa এর মিশ্রণ একটি বাফার দ্রবণ। বাফার দ্রবণে সামান্য এসিড যোগ করলে pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে।

18. কোন বিক্রিয়ার সাম্য ধ্রুবক, K_C এর একক (ঘনমাত্রা) $^{-1}$? [DU-7Clg: 2018-19]


- A. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ B. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
 C. $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ D. $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3H_2$

(C) Explanation (A) অপশনে $\Delta n = 0$ কোন একক নেই
 (B) অপশনে $\Delta n = -2$ একক (ঘনমাত্রা) $^{-2}$
 (C) অপশনে $\Delta n = -1$ একক (ঘনমাত্রা) $^{-1}$
 (D) অপশনে $\Delta n = 2$ একক (ঘনমাত্রা) 2

19. এক মোল অকটেন বাতাসে সম্পূর্ণ দহন করলে কত মোল পানি উৎপন্ন হয়? [DU-7Clg: 2018-19]

- A. 6 B. 18 C. 9 D. 8

(C) Explanation একমোল অকটেন (C_8H_{18}) বাতাসে সম্পূর্ণ দহন করলে 9 mol পানি ও 8 mol CO_2 উৎপন্ন হয়।



20. 0.005 M H_2SO_4 দ্রবণের pH কত? [DU-7Clg: 2018-19]
 A. 1 B. 4 C. 2 D. 5

(C) Explanation H_2SO_4 এ $[H^+]$ আয়নের ঘনমাত্রা = $0.005 \times 2 = 0.01M$
 $pH = -\log (0.01) = 2$

21. একটি দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ হলে দ্রবণের p^{OH} এর মান কত? [DU-7Clg: 2017-18]



- A. 9.0 B. 10.0 C. 11.0 D. 6.0

(B) Explanation হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা, $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$
 $p^{OH} = -\log [OH^-] = -\log [1.0 \times 10^{-4}] = 4 \therefore pH = 14 - 4 = 10$

22. কোন পরিবর্তনটি তাপ- উৎপাদী? [DU-7Clg: 2017-18]

- A. $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ B. $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$
 C. $C_2H_5OH(l) \rightarrow C_2H_5OH(g)$ D. $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$

(D) Explanation তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার উদাহরণ:



23. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ বিক্রিয়াটির K_p এর একক কোনটি? [DU-7Clg: 2017-18]

- A. atm B. atm^2 C. atm^{-1} D. atm^{-2}

(D) Explanation $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ এর $\Delta n = 2 - 4 = -2$
 $\therefore K_p$ এর একক হবে $(\text{atm})^{-2} = \text{atm}^{-2}$

24. কোন দ্রবণটি বাফার দ্রবণ নয়? [DU-7Clg: 2017-18]

- A. $CH_3COOH + CH_3COONa$ B. $NH_4OH + NH_4Cl$
 C. $HCOOH + HCOONa$ D. $NaCl + NH_4Cl$

(D) Explanation যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ সবল এসিড বা ক্ষার দ্রবণ যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান বিশেষ পরিবর্তন হয় না, প্রায় স্থির থাকে। তাকে বাফার দ্রবণ বলে। বাফার দ্রবণের নিজস্ব pH স্থির রাখার ক্ষমতা থাকে, বাফার অর্ধ প্রতিরোধ বা resist করা। বাফার দ্রবণ হতে হলে দুর্বল এসিড বা ক্ষার এবং ঐ এসিড বা ক্ষারের লবণ হতে হবে।

IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. কোন এসিডের তীব্রতা সবচেয়ে বেশী?

- A. CH_3CH_2COOH B. $ClCH_2CH_2COOH$
 C. $Cl_2CHCOOH$ D. CH_3COOH

(C) Explanation জেব এসিডে Cl এর সংখ্যা বাড়লে তীব্রতা বাড়বে-
 $CH_3COOH < CH_2ClCOOH < CHCl_2COOH < CCl_3COOH$

♦ ASPECT SERIES ♦ NETWORK ♦ ASPECT SERIES ♦ NETWORK ♦ ASPECT SERIES ♦ NETWORK ♦ ASPECT SERIES ♦ NETWORK ♦ ASPECT SERIES ♦ NETWORK ♦ ASPECT SERIES ♦ NETWORK ♦

এক নজরে মূল আলোচনা:

পারিভাষিক শব্দ	সংজ্ঞা বা তাৎপর্য
সাসপেনশন	কণার আকার 10^{-5} cm এর চেয়ে বড়।
কলয়েড	কণার আকার (10^{-3} cm - 10^{-7} cm)।
দ্রবণ	10^{-7} cm অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
ক্রিস্টালয়েড	দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ বা প্রাণিজ বিদ্যুতি বা পার্চমেন্ট কাগজ অতিক্রম করে।
সল	তরল কলয়েডকে বলা হয়-সল।
জেল	কঠিন ফেজ এর মধ্যে যদি তরল বস্তু কণা বন্টিত হয়ে কলয়েড গঠন করে তাকে জেল বলে।
ইমালশন	একটি তরল ফেজ এর মধ্যে কোন তরল বস্তুকণা বন্টিত হলে যে কলয়েড পাওয়া যায় তাই ইমালশন।
কোয়াগুলেশন	ইমালশন নষ্ট হয়ে জমাট বাধাকে কোয়াগুলেশন বলে।

কলয়েডের শ্রেণিবিভাগ:

কলয়েড শ্রেণী	বিস্তারিত বস্তুকণা	বিস্তারণ মাধ্যম	উদাহরণ
এরোসল	কঠিন	গ্যাস	ধোয়া, বায়ুতে ভাসমান ধুলো
	তরল	গ্যাস	কুয়াশা, মেঘ
জেল	তরল	কঠিন	জেলি, পনির, দই ও জুতোর কালি
ফোম	গ্যাস	তরল	পাকানো ক্রিম, সাবানের ফেনা
ইমালশন	তরল	তরল	দুধ, শ্যাম্পু, ক্রিম
	তরল	কঠিন	বাটার
সল	কঠিন	তরল	পেইন্ট, মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া

দুধের গুণিত্ত্ব ও সংযুক্তি (শতকরা):

প্রাণী	পানি	চর্বি (Fat)	প্রোটিন	ল্যাকটোজ	খাদ্য ক্যালরি (K.cal/100g)
মানুষ	87.1	4.5	0.9	7.1	72
গাভী	87.8	3.5	3.1	4.6	66
ছাগল	87.0	4.2	3.3	4.8	70
ভেড়া	82.0	7.2	4.6	4.8	102
মহিষ	82.7	7.4	3.6	5.5	110
উট	87.6	5.3	3.0	3.3	76

ট্যালেন্ট ও পারফিউমারী:

- হেয়ার অয়েল: মিন্ট অয়েল, নারকেল, তেল, কেনোলা অয়েল, রং, 1-বিউটাইল অ্যালকোহল।
- ট্যালকম পাউডার:
 - (i) মূল উপাদান হচ্ছে টেলক। টেলকের রাসায়নিক নাম হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট $[3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O]$ বা, $H_2Mg_3(SiO_3)_4$ বা, $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$ (92 ভাগ)
 - (ii) জিকে স্টিয়ারেট (অ্যান্টিসেপটিক)
 - (iii) ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (পাউডার ফাঁপানোর জন্য)
 - (iv) মেনথল (সুগন্ধ বস্তু)
- অ্যানিশিং ক্রিম: মিথাইল প্যারাবেন, সুগন্ধি, গ্লিসারিন, কস্টিক পটাশ + স্টিয়ারিক এসিড, পানি, অ্যানিশিং ক্রিম
- কোল্ড ক্রিম: Cold Cream, মিন্ট অয়েল, রোজ ওয়াটার, বাদাম তেল, হোয়াইট বি-ওয়াশ, বোরাক্স, গ্লিসারিন
- আফটার সেভ: Antiseptic (ডিন্যাচারড অ্যালকোহল-40), Fragrance (সুগন্ধি), Moisturizer (গ্লিসারিন)।
- মেহেন্দী: হেনা পাউডার, লেমন জুস, সাইট্রিক এসিড, প্রাকৃতিক রং, এসেনশিয়াল অয়েল, ময়েচারাইজার
- গোলাপজল: এটি হাইড্রোসল (ফিনাইল ইথানল) যার মনোমুদ্রকর সুগন্ধি রয়েছে, জিরানিওল, সিট্রোনিলোল, নিরল

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

- দুধ থেকে ছানা তৈরির প্রক্রিয়া হলো- কোয়াগুলেশন।
- দুধের প্রোটিন - ক্যাসিন।
- প্রোটিন অণুর মধ্যে অ্যামাইনো এসিডের অণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে- Peptide bond।
- গ্যাসকে ক্ষয় করে- HF।
- চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয়- $Cr_2(SO_4)_3$ ।
- উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে ইউরিয়া সার যে অবস্থায় শোষণ করে- NO_3^- Salt।
- বড় পুকুরিয়া খনিতে কী ধরনের কয়লা পাওয়া যায়- বিটুমিনাস।
- ইরিথ্রিটল হলো- A-non caloric sweetener।
- কোন মৌলটির উপস্থিতি কয়লার মান নষ্ট করে- সালফার।
- ক্যাওলিনাইটের রাসায়নিক সংকেত- $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ ।
- ইউরিয়া সার তৈরিতে প্রাকৃতিক গ্যাস যেভাবে ব্যবহৃত হয়- NH_3 ।
- 30-40% ফরমালডিহাইড এর জলীয় দ্রবণকে কী বলে- ফরমালিন।
- যে শর্করা ফেহলিং দ্রবণ ও টলেন বিকারক কে বিজারিত করতে পারে না- সুক্রোজ।
- ঢালাই লৌহে কার্বনের পরিমাণ- 2.9 - 4.5%।
- সোডা অ্যাশ শিল্পক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়- Solvay process।
- লোহাকে মরিচার হাত থেকে রক্ষার জন্য যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়- Zn।
- ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের সংকেত- $Mg_3(PO_4)_2$ ।
- ইস্পাতে যে যে উপাদান আছে- (Fe + C)।
- মরিচার রাসায়নিক সংকেত কোনটি- $Fe_2O_4 \cdot xH_2O$ ।
- চর্বি থেকে সাবান তৈরি করার জন্য যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়- আর্দ্র বিশ্লেষণ।
- ২০১৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন- জাক দুবোচে, জোয়াসিম ফ্রাংক, রিচার্ড হেভারসন
- দুধের মিষ্টি স্বাদের কারণ হলো- ল্যাক্টোজ
- লিপস্টিকে থাকে- টেট্রাব্রোমোফ্লোরোসিন/সোডিয়াম স্টিয়ারেট
- টুথপেস্টে pH-৮
- ভিনেগারের জন্য কোন উদ্ভিতি সঠিক নয়- 6-10% ফরমিক এসিড এর জলীয় দ্রবণ
- টয়লেট ক্লিনার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়-বেকিং সোডা/ফেনল




IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

- খাদ্য সংরক্ষণে নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
 - ক্যালসিয়াম কার্বোনেট
 - ক্যালসিয়াম প্রোপানয়েট
 - সোডিয়াম বেনজোয়েট
 - সোডিয়াম নাইট্রেট
- মেহেন্দীর রংয়ের জন্য দায়ী-
 - গ্যাসোলিন
 - অলিক এসিড
 - লোশন (Lotion)
 - ল্যাসোন (Lawsone)
- কোনটি ন্যাচারাল ফুড প্রিজারভেটিভ নয়?
 - সল্ট
 - অ্যালকোহল
 - ভিনেগার
 - ফরমালিন
- ইরিথ্রিটল হলো-
 - An enzyme
 - A non-caloric sweetener
 - An amino acid
 - An anti-oxidant

Ans D

① Explanation



It is about 60-80% as sweet as sucrose. এটিকে tetra-hydroxy বিউটেনও বলে।

05. ভিনেগারের জন্য নিচের কোন উদ্ভিতি সঠিক নয়?

- A. ব্যাকটেরিয়া রোধক তরল পদার্থ
B. 6-10% ফরমিক এসিড এর জলীয় দ্রবণ
C. ছোট বীজযুক্ত কাচা ফল সংরক্ষণ করা হয় ভিনেগার দ্বারা
D. উপরের সবগুলোই ভুল

Ans B

PRIME TEST

01. ভিনেগার কী?

- A. ইথানয়িক অ্যাসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণ
B. প্রপানয়িক অ্যাসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণ
C. বিউটানয়িক অ্যাসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণ
D. ফরমালডিহাইডের 30-40% জলীয় দ্রবণ

02. কোনটি খাদ্যদ্রব্য ও বীজ সংরক্ষণের সময় ঋণাত্মক প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

- A. সোডিয়াম বেনজয়েট B. অ্যানিসোল
C. ফসফরিক এসিড D. কোনটিই নয়

03. খাদ্যদ্রব্য পচনে অন্যতম সহায়ক কোনটি?

- A. SO_2 B. N_2O
C. NO_2 D. O_2

04. কলয়ডাল দ্রবণের চারিদিকে আলো ছড়ানোর (light scattering) ধর্মকে বলা হয়-

- A. ফারাডে ইফেক্ট B. টিনডাল ইফেক্ট
C. ব্রাউনিয়াম ইফেক্ট D. B ও C উভয়েই

05. অম্লের ইমেজিং কাজে ব্যবহৃত $BaSO_4$ মিশ্রণ নিম্নের কোন শ্রেণিভুক্ত?

- A. কোয়াগুলেন্ট B. অধঃক্ষেপ
C. সাসপেনশন D. কলয়েড

06. দুধে নিচের কোন আয়নসমূহের সেটটি অধিক পরিমাণে থাকে?

- A. K^+ , Ca^{2+} , Cl^- B. Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+}
C. K^+ , Cu^{2+} , C^{3-} D. Na^+ , K^+ , Cl^-

07. খাদ্য সংরক্ষণে সাইট্রিক এসিডের pH কত?

- A. 10.14 B. 7
C. 3.14 D. 4.23

08. টয়লেট ক্রিনারে কোন উপকরণটি মিজ অপসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

- A. সোডিয়াম লরাইল সালফেট
B. ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট
C. কস্টিক সোডা
D. ফেনল

09. ভ্যানিলাইন ক্রিম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়-

- A. অলৈয়িক এসিড B. ম্যালিক এসিড
C. পামেটিক এসিড D. স্টিয়ারিক এসিড

10. Canning বা টিনজাত খাদ্যদ্রব্যের জীবাণু ধ্বংসের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা কত?

- A. $600^\circ C$ B. $1000^\circ C$
C. $1210^\circ C$ D. $3000^\circ C$

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	

ANS ANALYSIS

10. A	09. D	08. C	07. C	06. A
05. C	04. B	03. D	02. C	01. A

অধ্যায় ০১

পরিবেশ রসায়ন

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY

দ্বিতীয় পত্র



কি, কেন দড়ত?

SURVEY TABLE

কতটুকু দড়ত?

টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বা]
01	বিভিন্ন গ্যাসসূত্র ও তাদের গ্রাফ নির্ণয়	★★
02	বাস্তব গ্যাস ও বাস্তব গ্যাসের সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক	★★★
03	ব্যাপন ও অনুব্যাপন (নিঃসরণ)	★★★
04	অ্যাসিড বৃষ্টি ও নাইট্রোজেন ফিক্সেশন	★★
05	অম্ল ও ক্ষার	★★★
06	পানির খরতা ও বিতঙ্ক পানির বিভিন্ন মানদণ্ড	★★



টপিক আনোচনা

□ পরিবেশের উপাদান সম্পর্কিত তথ্য:

উপাদান	বিকল্প নাম	অন্যান্য তথ্য
বায়ুমণ্ডল	বায়ু/বাতাস/বাপ্প মণ্ডল	সমস্ত গ্যাসীয় অঞ্চল
বারিমণ্ডল	পানি মণ্ডল	সমস্ত জলরাশি
শিলামণ্ডল	মৃত্তিকা মণ্ডল	শিলা দ্বারা গঠিত বহিরাবরণ
জীবমণ্ডল	প্রাণ মণ্ডল	উদ্ভিদ ও জীবজগত

□ বায়ুমণ্ডলের উপাদান:

বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদানসমূহ	
গ্যাসসমূহ	শতকরা আয়তন (%)
নাইট্রোজেন (N_2)	78.09
অক্সিজেন (O_2)	20.946
জলীয় বাষ্প (H_2O)	1 ~ 4
আর্গন	0.934
কার্বন ডাই-অক্সাইড	0.033
নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে বাতাসে আর্গনের (0.93%) পরিমাণ সবচেয়ে বেশি	

□ STP (Standard Temperature and Pressure):

চাপ (P)	তাপমাত্রা (T)	আয়তন (V)
1 atm = 76 cm = 760 mm = 1.01325×10^5 Pa	$0^\circ C$ বা 273 K	22.4 dm ³ বা L

□ SATP (Standard Ambient Temperature and Pressure):

চাপ (P)	তাপমাত্রা (T)	আয়তন (V)
100KPa	$25^\circ C$ বা 298 K	24.789 dm ³ বা L

□ সংকট ধ্রুবকের বিভিন্ন মান:

H_2		O_2	
ক্রান্তি তাপমাত্রা	ক্রান্তি চাপ	ক্রান্তি তাপমাত্রা	ক্রান্তি চাপ
$-240^\circ C$	12.8	$-118.8^\circ C$	49.7

□ বিভিন্ন এককে R এর মান:

এককের নাম	এককের মান	একক
লিটার-বায়ুচাপ	0.0821	L. atm. $K^{-1}mol^{-1}$
এস. আই	8.314	$JK^{-1}mol^{-1}$
সি.জি.এস	8.314×10^7	erg. $K^{-1}mol^{-1}$
ক্যালরি	1.987	Cal $K^{-1}mol^{-1}$

