


গণিত

অধ্যয়নভিত্তিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ
গুরুত্ব বুঝে অধ্যয়ন, নিত্য সবার প্রয়োজন

গণিত প্রথম পত্র		DU-7 College						
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
01	ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক	2	1	3	2	1	-	1
02	ভেক্টর	-	-	-	1	1	1	1
03	সরল রেখা, স্থানাঙ্ক	2	4	2	1	1	2	2
04	বৃত্ত	5	3	3	2	2	1	2
05	বিন্যাস ও সমাবেশ	-	-	-	1	1	1	1
06	ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	-	-	-	1	1	-	1
07	সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	2	2	-	1	-	2	2
08	ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র	-	-	1	2	2	1	1
09	অন্তরীকরণ (লিমিটসহ)	4	2	4	2	3	2	1
10	যোগজীকরণ	3	4	5	3	2	2	3
প্রথম পত্র থেকে মোট প্রশ্ন		18	16	18	16	14	12	15

গণিত দ্বিতীয় পত্র		DU-7 College						
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
01	বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা	-	-	-	-	2	1	1
02	যোগাশ্রয়ী প্রোচ্যাম	-	-	-	-	-	-	-
03	জটিল সংখ্যা	1	2	-	1	2	1	1
04	বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ	-	1	1	1	2	1	1
05	দ্বিপদী বিস্তৃতি	1	-	-	-	-	2	-
06	কণিক	2	3	3	2	1	2	1
07	বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও সমীকরণ	1	1	2	2	1	2	3
08	স্থিতিবিদ্যা	1	1	1	1	1	1	1
09	সমতলে বস্তু কণার গতি (গতিবিদ্যা)	1	1	-	1	-	2	1
10	বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা	-	-	-	1	2	1	1
দ্বিতীয় পত্র থেকে মোট প্রশ্ন		07	09	07	09	11	13	10
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র থেকে মোট প্রশ্ন		25	25	25	25	25	25	25

টপিকের সাথে প্রশ্ন বিশ্লেষণ
+
প্যারালাল তথ্য = ৯৬% কমান



କି ପଢ଼ୁଛ ? କେନ ପଢ଼ୁଛ ?

SURVEY TABLE

কণ্টক পড়ত ? কিভাবে পড়ত ?



ক্রমিক সং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ ও মান নির্ণয় সংক্রান্ত	★
02	ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য [Properties of Matrices]	★★★
03	ম্যাট্রিক্সের মাত্রা, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও সমতা	★★
04	ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স	★★
05	অনুবর্তী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স	★★★
06	অনুমানি ও সহগুণক নির্ণয়	★★★
07	নির্ণায়কের মান নির্ণয়	★★
08	একটি অজানা চলক থাকলে মান নির্ণয়	★★★
09	সবগুলো অজানা চলক থাকলে মান নির্ণয়	★★




ઉપરિક આલોચના

ম্যাট্রিক্স সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্য

ନାହିଁରୁର ପ୍ରକାରଭେଦ:

বর্গ ম্যাট্রিক্স	আয়ত ম্যাট্রিক্স	কর্ণ ম্যাট্রিক্স	স্কেলার ম্যাট্রিক্স	অভেদ/একক ম্যাট্রিক্স
$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
সারি ও কলাম সংখ্যা সমান	সারি ও কলাম সংখ্যা ভিন্ন	প্রধান কর্ণের উপাদান ব্যতীত সকল উপাদান '0' হবে	কর্ণ ম্যাট্রিক্সের অশূন্য উপাদানগুলো সমান	কর্ণ ম্যাট্রিক্সের উপাদান গুলো 1 হলে

■ **মূখ্য বা প্রধান কর্ণ:** ম্যাট্রিক্সের প্রথম সারি ও প্রথম কলামে যে উপাদান থাকে তাকে নিয়ে যে কর্ণ গঠিত হয় তাই মূখ্য কর্ণ এবং অপর কর্ণটি গৌণ কর্ণ। যেমন-



Note: মূল্য বর্ধনের উপাদান গুলোর যোগফলকে ট্রেস $(a + y + r)$ বলে।

■ **গাছের মাত্রা/ক্রম = সারি x কলাম**

Ex: (i) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ 2টি সারি, 3টি কলাম $\therefore$ মাত্রা হলো 2×3

(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ मात्रा = 3×3

(iii) $[1 \ 2 \ 3]$ মাত্রা $= 1 \times 3$

⇒ ম্যাট্রিক্সের কোন মান নেই। তবে বর্গ ম্যাট্রিক্সকে নির্ণায়ক আকারে প্রকাশ করে সেই নির্ণায়কের মান নির্ণয় করা যায়। যেমন-

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান $|A| = \text{Det}(A) = ad - bc$

১) শ্যাট্রিক্সের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও সমতা

দুটি মাটির কবের মাত্রা সমান না হলে যোগ বা বিয়োগ করা যায় না।

দুটি ম্যাট্রিক্স সমান হলে তাদের অনুরূপ উপাদানগুলো সমান হবে।

দুটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর গুণফল AB নির্ণয় করা যাবে যদি A ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা B ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যার সমান হয়।

$\therefore A = [a_{ij}]$ এবং $B = [b_{ij}]$ হলে যদি $AB = [ab_{ij}]_{m \times r}$ হয় তবে AB ম্যাট্রিক্সের মাত্রা $m \times r$ হবে।

যাতির গুণের ফলে কোনো একটি সারি বা কলাম এর গুণ বের করে দেখলেই Ans. অপশনে পাওয়া যায়।

SPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ SPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ SPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ SPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦

⊙ অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স

- **Adjoint ম্যাট্রিক্স:** কোন বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়ক |A| এর সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের (ভুক্তিগুলোর ক্রম অনুসারে) Transpose ম্যাট্রিক্সকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর Adjoint matrix বলা হয়। এটিকে সূচিত করা হয় Adj (A)

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ ম্যাট্রিক্স এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা adjoint of A/Adj (A)}$$

= প্রাইমারি কর্ণের উপাদানগুলোর স্থান পরিবর্তন এবং সেকেন্ডারি কর্ণের উপাদানগুলোর চিহ্ন পরিবর্তন করলে যা পাওয়া যায় তাই Adjoint

$$\therefore \text{Adjoint of } A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$A \text{ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত বা Inverse ম্যাট্রিক্স} = \frac{1}{\text{Det (A)}} \text{Adj (A)} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Note: সকল ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকে না। Inverse ম্যাট্রিক্স থাকার শর্ত দুটি:

- (i) ম্যাট্রিক্সটি অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে। (ii) ম্যাট্রিক্সটির নির্ণায়কের মান শূন্য হওয়া যাবে না।

⊙ নির্ণায়কের মান নির্ণয়

- **নির্ণায়কের মান:** কোন নির্ণায়কের যে কোন সারি বা কলামের এর উপাদানসমূহ ও তাদের নিজ নিজ সহরাশির গুণফলের সমষ্টিই নির্ণায়কের মান।

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ নির্ণায়কের } a_1, a_2, a_3 \text{ এর সহগুণক যথাক্রমে } A_1, A_2, A_3 \text{ হলে নির্ণায়কের মান হবে}$$

$$= a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \times - \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

⊙ অনুরাশি ও সহগুণক নির্ণয় সংক্রান্ত

01. অনুরাশি:

FORMULA Step-01: যে রাশি বা সংখ্যার অনুরাশি বের করতে বলবে ঠিক সেই রাশি বরাবর Row এবং Column বাদ দাও।

Step-02: বাকি উপাদান গুলো দিয়ে নির্ণায়ক গঠন কর। সেটিই অনুরাশি।

Step-03: মান বের করতে বললে সাধারণ নিয়মে নির্ণায়কের মান বের করতে হবে।

02. সহগুণক: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ এর b_3 এর সহগুণক কত?

Finix Technique:

Step-1: অনুরাশি বের করার পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথমে অনুরাশি বের কর।

Step-2: অনুরাশি সামনে $(-1)^{R+C}$ সূত্র ব্যবহার করে যথাযথ চিহ্ন বসে। সেটিই সহগুণক।

Shortcut Solⁿ $(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$

Shortcut Tricks. $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

সহগুণক নির্ণয় এর বক্স এর ভিতর চিহ্নিত উপাদান গুলোর সামনে (+) এবং বাকি উপাদান গুলোর সামনে (-) বসবে।

Magic!!!

সহগুণক = $(-1)^{\text{সারি} + \text{কলাম}} \times \text{অনুরাশি}$
সহগুণক = চিহ্ন $\times$ অনুরাশি

গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 যে ম্যাট্রিক্সের সারি ও কলামের সংখ্যা সমান তাকে বলা হয়-

Solve সারি = কলাম $\rightarrow$ বর্গ ম্যাট্রিক্স।

MEx 02 A, B এবং C ম্যাট্রিক্সগুলোর মাত্রা যথাক্রমে 4×5 , 5×4 এবং 4×2 হলে $(A^T + B)C$ ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা কত?

Solve $A = 4 \times 5 \therefore A^T = 5 \times 4$;
 $B = 5 \times 4 \therefore (A^T + B) = 5 \times 4$

$$(A^T + B)C = 5 \times [4 \ 4] \times 2 = 5 \times 2$$

MEx 03 A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং I একই ক্রমের একক ম্যাট্রিক্স হলে AI এর মান কত?

Solve একটি ম্যাট্রিক্সকে তার অভেদক ম্যাট্রিক্স দ্বারা গুণ করলে ঐ ম্যাট্রিক্সই পাওয়া যায়। অর্থাৎ $AI = A$

MEx 04 $A = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = [1 \ 2 \ 3]$ হলে AB ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কোনটি?

Solve A হলো (3×1) ম্যাট্রিক্স আর B হলো (1×3) ম্যাট্রিক্স
 $\therefore AB = (3 \times 1) \cdot (1 \times 3) = (3 \times 3)$

MEx 05 Matrix $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ এর নাম-

Solve যে Matrix এর কলাম এবং সারি inter-change করলে Matrix অপরিবর্তিত থাকে। তাকে প্রতিসম Matrix বলে।

MEx 06 যদি $A = \begin{bmatrix} a & -b \\ c & d \end{bmatrix}$ হয়, তবে A^{-1} = কত?

Solve $A^{-1} = \frac{1}{ad + bc} \begin{bmatrix} d & b \\ -c & a \end{bmatrix}$

MEx 07 A একটি 3×3 বর্গম্যাট্রিক্স এবং $|A| = 8$ হলে $|2A|$ এর মান কোনটি?

Solve Finix shortcut:

$$\text{Here, } |A| = 8, |2A| = 2^3 |A| = 8 \times 8 = 64$$

MEx 08 A একটি অব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে A^{-1} এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স কোনটি?

Solve A^{-1} এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স $(A^{-1})^{-1} = A$

জেনে রাখা ভাল: ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স inverse ম্যাট্রিক্স নেই/বিপরীত যোগ্য নয়।

MEx 09 $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix}$ হলে x ও y এর মান-

Solve $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4x \\ -2x+3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix}$
 $\Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$ এবং $-2x + 3y = 3$

$\Rightarrow -6 + 3y = 3 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3 \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

MEx 10 এককের একটি জটিল ঘনমূল ω হলে, $\begin{vmatrix} \omega & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ \omega^3 & 1 & \omega \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের

মান কত?

Solve $\begin{vmatrix} \omega & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ \omega^3 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \omega & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\omega+\omega^2 & \omega & \omega^2 \\ 1+\omega+\omega^2 & \omega^2 & 1 \\ 1+\omega+\omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$
 $[c_1' = c_1 + c_2 + c_3]$

$= \omega(1+\omega+\omega^2) \begin{vmatrix} 0 & \omega & \omega^2 \\ 0 & \omega^2 & 1 \\ 0 & 1 & \omega \end{vmatrix} = \omega(1+\omega+\omega^2) \times 0 = 0$

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. a এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} 4a & -1 \\ -8 & -8 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে? [DU-7Clg: 2023-24]

- A. $\frac{1}{-5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. -8 D. $-\frac{1}{4}$

Explanation $\begin{bmatrix} 4a & -1 \\ -8 & -8 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী বলে, $\begin{vmatrix} 4a & -1 \\ -8 & -8 \end{vmatrix} = 0$
 $\Rightarrow -32a - 8 = 0 \therefore a = \frac{-8}{-32} = -\frac{1}{4}$

02. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস কোনটি? [DU-7Clg: 2023-24]

- A. $-\frac{5}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

Explanation ধরি, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \therefore A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$\therefore \text{Trace} = -2 - \frac{1}{2} = \frac{-4-1}{2} = -\frac{5}{2}$

03. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ হলে $|4A^{-1}| = ?$ [DU-7Clg: 2022-23]

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

Solve $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \therefore |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 2(-2) = 4$

এখন, $|4A^{-1}| = \left| \frac{4}{A} \right| = \frac{4^2}{|A|} = \frac{4^2}{4} = 4$

04. c এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & c \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স প্রতিসম? [DU-7Clg: 2021-22]

- A. 4 B. 0
C. -1 D. -4

Solve $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & c \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & c & 0 \end{bmatrix}$

ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে যদি এবং কেবল যদি $c = 4$ হয়।

05. $Y = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির $(2,3)$ তম ভুক্তির সহগ কত?

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. -19 B. 19 C. -95 D. 95

Solve $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 \\ 7 & 6 & 8 \end{vmatrix}$ এর $(2,3)$ তম ভুক্তির সহগ।

$= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = -(12+7) = -19$

06. $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ হলে $A^{-1} = ?$

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ B. $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$
C. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$ D. $\frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

Solve $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

$\therefore A^{-1} = \frac{1}{\text{Det}(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{-4+6} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

07. β এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} \beta+5 & 2 \\ 3 & \beta \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. $1, 6$ B. $1, -6$ C. $0, 0$ D. $1, 1$

Solve ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে তার নির্ণায়ক শূন্য।

$\therefore \begin{vmatrix} \beta+5 & 2 \\ 3 & \beta \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \beta^2 + 5\beta - 6 = 0$

$\Rightarrow \beta^2 + 6\beta - \beta - 6 = 0 \Rightarrow \beta(\beta+6) - 1(\beta+6) = 0$

$\Rightarrow (\beta+6)(\beta-1) = 0 \therefore \beta = 1, -6$

08. A, B, C ম্যাট্রিক্সগুলোর আকার যথাক্রমে $4 \times 5, 5 \times 4, 4 \times 2$ হলে $(A^T + B)C$ এর আকার হবে- [DU-7Clg: 2019-20]

- A. 5×4 B. 4×2 C. 5×2 D. 2×5

Solve A এর আকার 4×5

$\therefore A^T$ এর আকার $5 \times 4 \therefore (A^T + B)C$ এর আকার 5×2

09. $\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ -5 & x+4 \end{vmatrix} = 0$ হলে, x এর মান কত? [DU-7Clg: 2017-18]

- A. $-1, -3$ B. $1, 3$ C. $-1, 3$ D. $1, -3$

Solve $(x-2)(x+4) + 5 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 2x + 4x - 8 + 5 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 3x - x - 3 = 0 \Rightarrow x(x+3) - 1(x+3) = 0$

$x = 1, -3$

IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. k এর কোন মানের জন্য $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & k^2 \\ 1 & k^2 & k^4 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান শূন্য হবে না?

- A. $k = 1$ B. $k = -1$ C. $k = 3$ D. $k = 0$

Solve $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & k^2 \\ 1 & k^2 & k^4 \end{vmatrix} = 0$ বা, $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & k-1 & k^2-k \\ 1 & k^2-1 & k^4-k^2 \end{vmatrix} = 0$


বা, $(k-1)(k^2-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & 1 & k^2 \end{vmatrix} = 0$

বা, $(k-1)(k^2-1)(k^2-k) = 0$ বা, $k = 1, -1, 0$

$\therefore k = 3$ এর জন্য নির্ণায়কটির মান শূন্য হবে না।

প্রথম পত্র

অধ্যায় ০২

ভেক্টর
(VECTORS)

কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?

ক্রমিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	ভেক্টর রাশির যোগ-বিয়োগ এবং মান নির্ণয় সংক্রান্ত	★ ★ ★
02	দুটি ভেক্টরের গুণন (ডট গুণন ও ক্রস গুণন) সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★ ★
03	দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★ ★ ★
04	অভিক্ষেপ এবং উপাংশ নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★ ★
05	ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★
06	তিনটি ভেক্টর এক সমতলীয় হওয়া সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★
07	সমান্তরাল একক ভেক্টর ও লম্ব একক ভেক্টর নির্ণয়	★ ★ ★



টপিক আনোচনা

চরিত্রসূত্র সমূহের Topic	সূত্র সমূহ
দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} \right); \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z; A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}; B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$
একটি ভেক্টর ও একটি অক্ষের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়	$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ ভেক্টরটি: (i) x অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে $\theta_x = \cos^{-1} \left(\frac{\hat{i} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \right)$ (ii) y অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে $\theta_y = \cos^{-1} \left(\frac{\hat{j} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \right)$ (iii) z অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে $\theta_z = \cos^{-1} \left(\frac{\hat{k} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \right)$
দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব এবং সমান্তরাল হওয়ার শর্ত সংক্রান্ত	1. দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হলে $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = 0$ হবে। 2. দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হলে $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ or, $\frac{A_x}{B_x} = \frac{A_y}{B_y} = \frac{A_z}{B_z}$ হবে।
ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত	$\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়- (i) সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু ধরে ক্ষেত্রফল $= \vec{A} \times \vec{B} $ (ii) সামান্তরিকের কর্ণ ধরে ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \vec{A} \times \vec{B} $ (iii) ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু ধরে ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \vec{A} \times \vec{B} $ (iv) রম্বসের কর্ণ ধরে ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \vec{A} \times \vec{B} $
সমান্তরাল ও লম্ব একক ভেক্টর নির্ণয় সংক্রান্ত	(i) $\vec{A}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর, $\vec{a} = \pm \frac{\vec{A}}{ \vec{A} }$ (ii) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের লম্বি বরাবর একক ভেক্টর $\vec{n} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{ \vec{A} \times \vec{B} }$ (iii) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের যেই সমতলে অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর, $\vec{n} = \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{ \vec{A} \times \vec{B} }$
অভিক্ষেপ ও উপাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত	(i) $\vec{A}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ $B \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{A} }$ (iii) $\vec{A}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের উপাংশ $\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{A} } \hat{a}$ (ii) $\vec{B}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{A}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{B} }$ (iv) $\vec{B}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{A}$ ভেক্টরের উপাংশ $\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{B} } \hat{b}$ [যার বরাবর, যার তুলনায়, যার দিকে বলবে সে নিচে থাকবে।]
তিনটি ভেক্টর এক সমতলীয় হওয়া সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	i) $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}, \vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$ এবং $\vec{C} = C_x \hat{i} + C_y \hat{j} + C_z \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় একই সমতলে থাকার শর্ত: $\begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix} = 0$ ii) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = 0$ হয়।

গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 $\vec{A} = -3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$ ভেক্টরের মান কত?

Solve $A = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 6^2} = 7$

MEx 02 $\vec{a}$ ভেক্টর বরাবর একক ভেক্টর কোনটি?

Solve একক ভেক্টর = $\frac{\text{ভেক্টর}}{\text{এই ভেক্টরের মান}}$

MEx 03 $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরটি y অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার পরিমাণ কোনটি?

Solve $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}}$, $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore \theta = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$

MEx 04 $\vec{P} + \vec{Q} = \vec{P} - \vec{Q}$ হলে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

Solve $(\vec{P} + \vec{Q})^2 = (\vec{P} - \vec{Q})^2$

$\Rightarrow P^2 + Q^2 + 2\vec{P} \cdot \vec{Q} = P^2 + Q^2 - 2\vec{P} \cdot \vec{Q}$

$\Rightarrow 4\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0 = \vec{P} \cdot \vec{Q} = 0$

$\therefore \vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ $\pi/2$

MEx 05 $\vec{P} = 6\hat{i}$ এবং $\vec{Q} = 7\hat{i}$ হলে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

Solve $\theta = \cos^{-1} \left| \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{P \cdot Q} \right|$

$\therefore \theta = \cos^{-1} \left(\frac{42}{42} \right) = \theta = \cos^{-1}(1) = 0^\circ$

MEx 06 ভেক্টরদ্বয় $\vec{V}_1 = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ ও $\vec{V}_2 = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 6\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হলে λ এর মান কত?

Solve $\vec{V}_1$ ও $\vec{V}_2$ লম্ব বলে, $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0$

$\Rightarrow (4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}) \cdot (3\hat{i} + 5\hat{j} - 6\hat{k}) = 0$

$\Rightarrow 12\lambda - 15\lambda - 30 = 0$

$\therefore \lambda = -10$

MEx 07 $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $2\hat{j} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $3\hat{j} + 4\hat{j} + a\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একতলীয় হলে a এর মান কত?

Solve শর্তমতে, $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & a \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow 1(3a - 16) - 2(2a - 12) + 3(8 - 9) = 0$

$\Rightarrow 3a - 16 - 4a + 24 - 3 = 0$

$\Rightarrow -a + 5 = 0$

$\therefore a = 5$

MEx 08 $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ কর্ণ বিশিষ্ট সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত?

Solve $\Delta = \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(-3-4) - \hat{j}(-2-3) + \hat{k}(8-9)$

$= -7\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$

$\therefore \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}| = \frac{5\sqrt{3}}{2}$

MEx 09 $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ কত?

Solve $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|}$

$\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ

$A \cos \theta = \frac{12 - 6 + 2}{7} = \frac{8}{7}$

P/Q // PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর এবং x -অক্ষের মধ্যবর্তী কোণ নিচের কোনটি?

[DU-7Clg. 2020-21]

A. $\cos^{-1}(2/3)$

B. $\cos^{-1}(1/3)$

C. $\cos^{-1}(-2/3)$

D. $\cos^{-1}(-1/3)$

Explanation মধ্যবর্তী কোণ $= \cos^{-1} \frac{(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) \cdot \hat{i}}{|2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}| |\hat{i}|}$

$= \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} \sqrt{1^2}}$

$= \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$

02. $\vec{OA} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{OB} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে, $|\vec{AB}|$ = কত?

[DU-7Clg. 2019-20]

A. $2\sqrt{19}$

B. $\sqrt{19}$

C. $2\sqrt{17}$

D. $\sqrt{17}$

Explanation $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = 2\hat{i} - 6\hat{j} + 6\hat{k}$

$\therefore |\vec{AB}| = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$

03. $\vec{u} = 3\hat{i} + a\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $\vec{v} = 6\hat{i} - 8\hat{j} - 10\hat{k}$ পরস্পর সমান্তরাল হলে a এর মান-

[DU-7Clg. 2018-19]

A. -4

B. -3

C. 2

D. 4

Explanation $\frac{3}{6} = \frac{a}{-8} \Rightarrow a = -4$

04. $3\hat{i} + 2\hat{j} + a\hat{k}$ এবং $4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, a এর মান কত?

[DU-7Clg. 2017-18]

A. 6

B. -6

C. $\sqrt{6}$

D. $-\sqrt{6}$

Explanation $3 \cdot 4 + 2(-3) + a = 0$

$\Rightarrow 6 + a = 0 \Rightarrow a = -6$

IQA // IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. $\vec{u} = 3\hat{i} + a\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $\vec{v} = 6\hat{i} - 8\hat{j} - 10\hat{k}$ পরস্পর সমান্তরাল হলে a এর মান-

A. -4

B. -3

C. 2

D. 4

Explanation $\frac{3}{6} = \frac{a}{-8} \therefore a = -4$

02. $\vec{b} = 6\hat{i} + 7\hat{j} - 6\hat{k}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{a} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের উপাংশ হলো-

- A. $\frac{8}{121} \vec{b}$ B. $\frac{-8}{121} \vec{b}$
C. $\frac{8}{121} \vec{a}$ D. $\frac{-8}{121} \vec{a}$

Explanation $\vec{b} = 6\hat{i} + 7\hat{j} - 6\hat{k}$;
 $\vec{a} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$

$\vec{b}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{a}$ ভেক্টরের উপাংশ

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b}$$

$$= \frac{-8}{\sqrt{121}} \cdot \frac{\vec{b}}{\sqrt{121}} = \frac{-8}{121} \cdot \vec{b}$$

03. ভেক্টর $\vec{u} = \hat{i} + \hat{j}$ ও $\vec{v} = \hat{j} + \hat{k}$ এর অন্তর্ভুক্ত কোণ-

- A. $\cos^{-1}(1/\sqrt{3})$ B. $\cos^{-1}(1/3)$
C. $\cos^{-1}(1/2)$ D. $\cos^{-1}(1/\sqrt{2})$

Explanation অন্তর্ভুক্ত কোণ

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$$

04. $\vec{a} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ও $\vec{b} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টর দুইটি যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু তার ক্ষেত্রফল হবে-

- A. $3\sqrt{3}$ sq units B. $6\sqrt{3}$ sq units
C. $6\sqrt{6}$ sq units D. $3\sqrt{6}$ sq units

Explanation $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

$$= \hat{i}(-12+6) - \hat{j}(16-4) + \hat{k}(-12+6) = -6\hat{i} - 12\hat{j} - 6\hat{k}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{36+144+36} = \sqrt{216}$$

$$= \sqrt{36 \times 6} = 6\sqrt{6} \text{ sq. units}$$

05. $\vec{P} = 5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{Q} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ-

- A. $\frac{5}{\sqrt{38}}$ B. $\frac{3}{\sqrt{38}}$
C. $\frac{2}{\sqrt{38}}$ D. $\frac{1}{\sqrt{38}}$

Explanation $Q \cos \theta = \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{P}$

$$= \frac{10 - 3 - 4}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + 2^2}}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{38}}$$

06. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে নিম্নের কোনটি সত্য?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
B. $\vec{a} \wedge \vec{b} = 0$
C. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$
D. $(\vec{a} + \vec{b}) \wedge (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

Explanation $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 2 - 6 = -5$ (অর্থাৎ A সত্য নয়)

$$\text{এখন, } (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = (4\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) \cdot (-2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})$$

$$= -8 + 3 + 5 = 0$$

অর্থাৎ C সত্য হয়।

PRIME TEST

01. $\vec{OA} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ এবং $\vec{OB} = 7\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$ $\vec{AB}$ কত?

- A. $12\hat{i} - 7\hat{j} + 6\hat{k}$
B. $-2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$
C. $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$
D. $12\hat{i} - 3\hat{j} - 14\hat{k}$

02. $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j}$, $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{C} = -2\hat{i} + \hat{k}$ হলে $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = ?$

- A. $-2\hat{i} - 5\hat{j} - 4\hat{k}$
B. $-2\hat{i} - 4\hat{j} - 5\hat{k}$
C. $2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$
D. $\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$

03. $\vec{p} = 24\hat{i} + 7\hat{j}$ এবং $\vec{q} = 20\hat{i} + 15\hat{j}$ হলে $(\vec{p} + \vec{q})$ এবং $(\vec{p} - \vec{q})$ এর অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় কর।

- A. 90° B. 0°
C. 120° D. 60°

04. $4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\lambda\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ এর মান-

- A. 3 B. -1
C. 5 D. 2

05. $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরটি y-অক্ষের সঙ্গে যে কোণ তৈরী করে তার মান হলো-

- A. $\cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$
B. $\cos^{-1} \left(-\frac{1}{3} \right)$
C. $\cos^{-1} \left(\frac{-2}{3} \right)$
D. $\cos^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$

06. k এর মান কত হলে $\vec{a} = 2\hat{i} + k\hat{j}$ এবং $\vec{b} = 3\hat{i} + 5\hat{j}$ ভেক্টর দুটো পরস্পর সমান্তরাল হবে?

- A. $\frac{6}{5}$ B. $\frac{5}{6}$
C. $\frac{-8}{3}$ D. $\frac{10}{3}$



ক্রমিক সং.	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে]
০১	স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত	★★
০২	বিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক সংক্রান্ত	★★
০৩	সম্মারণের সমীকরণ নির্ণয়	★★
০৪	অক্ষকে ছেদ করে এরূপ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
০৫	লম্ব সমীকরণের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
০৬	ছেদবিন্দু, ছেদবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ ও লম্বের পাদবিন্দু নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
০৭	দুইটি রেখা একই হওয়ার, লম্ব হওয়ার এবং সমান্তরাল হওয়ার শর্ত সংক্রান্ত	★★
০৮	দুটি রেখার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★



টপিক আলোচনা

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সমূহের Topic	সূত্র সমূহ
কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের পারস্পরিক রূপান্তর	$\left. \begin{aligned} (i) x &= r \cos \theta \\ (ii) y &= r \sin \theta \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{পোলার হতে কার্তেসীয়}$ $\left. \begin{aligned} (iii) r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ (iv) \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{কার্তেসীয় হতে পোলার}$
$P(x, y)$ বিন্দুটির চারটি চতুর্ভাগে অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আর্গুমেন্টের মান (θ) নির্ণয়ের সাধারণ নিয়ম	$(i) P(x, y) \text{ এর ক্ষেত্রে: } \theta = \tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right $ $(ii) P(-x, y) \text{ এর ক্ষেত্রে: } \theta = \pi - \tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right = -\pi - \tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right $ $(iii) P(-x, -y) \text{ এর ক্ষেত্রে: } \theta = \pi + \tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right = -\pi + \tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right $ $(vi) P(x, -y) \text{ এর ক্ষেত্রে: } \theta = 2\pi - \tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right \text{ or } -\tan^{-1} \left \frac{y}{x} \right $
দূরত্ব সূত্র	
কার্তেসীয় স্থানাঙ্কে	$P(x_1, y_1)$ ও $Q(x_2, y_2)$ দুটি বিন্দু হলে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব, $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ একক
পোলার স্থানাঙ্কে	$P(r_1, \theta_1)$ ও $Q(r_2, \theta_2)$ দুটি বিন্দু হলে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব, $PQ = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}$ একক
লম্ব দূরত্ব	বিন্দু $P(x_1, y_1)$ থেকে রেখা $ax+by+c=0$ এর লম্ব দূরত্ব $D = \left \frac{ax_1+by_1+c}{\sqrt{a^2+b^2}} \right $
দুইটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব	একটি রেখা $ax+by+c_1=0$ থেকে অপর একটি রেখা $ax+by+c_2=0$ এর মধ্যবর্তী দূরত্ব, $D = \left \frac{c_1-c_2}{\sqrt{a^2+b^2}} \right $
লম্ব আকৃতির সরলরেখার আদর্শ সমীকরণ	$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ যেখানে, p = মূলবিন্দু হতে সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্ব দূরত্ব $\alpha = x$ অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্ন কোণ।
বিভক্তিকরণ সূত্র	
অন্তর্বিভক্তি করণ	$A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1:m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে, $x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}$ এবং $y = \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}$
বহির্বিভক্তি করণ	$A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1:m_2$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত করলে, $x = \frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 - m_2}$ এবং $y = \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 - m_2}$
মধ্যবিন্দু নির্ণয়	$A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার মধ্যবিন্দু : $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2} \right)$

অক্ষদ্বয়কে বিভক্ত করলে	(x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে $* x$ অক্ষ: $-\frac{y_1}{y_2}$ অনুপাতে $* y$ অক্ষ: $-\frac{x_1}{x_2}$ অনুপাতে বিভক্ত করে।
ভরকেন্দ্র সংক্রান্ত	$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ শীর্ষ বিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (x, y) হলে, $x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল	ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ দেওয়া থাকলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta ABC = \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2} \{ (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3) \}$ বর্গ একক
বর্গ/সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল	একটি বর্গ বা সামান্তরিককে দুইটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করা যায়। সুতরাং বর্গ বা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $= 2 \times \Delta ABC$
সমরেখ/সমবিন্দু/একই সমতলে/ একই সরলরেখা অবস্থিত হলে	■ $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, a_2 x + b_2 y + c_2 = 0,$ $a_3 x + b_3 y + c_3 = 0$ রেখাত্রয় সমবিন্দু হলে, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$ ■ তিনটি $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ বিন্দু সমরেখ হওয়ার শর্ত হচ্ছে বিন্দুত্রয়ের ঢাল সমান হবে $\therefore \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y_2 - y_3}{x_2 - x_3}$
সরলরেখার সমীকরণ	
আদর্শ সমীকরণ	$ax + by + c = 0$
ঢাল (m) এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ	$y - y_1 = m(x - x_1)$
ঢাল এবং y ছেদক আকৃতি রেখার সমীকরণ	$y = mx + c$ $\downarrow$ $\tan \theta$
(x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ	$\frac{y - y_1}{y_1 - y_2} = \frac{x - x_1}{x_1 - x_2}$
ছেদক আকারের সমীকরণ	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
সমান্তরাল এবং লম্ব সরলরেখার সমীকরণ	$ax + by + c = 0$ রেখার (i) সমান্তরাল রেখার সমীকরণ $ax + by + k = 0$ (ii) লম্ব রেখার সমীকরণ $bx - ay + k = 0$
রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান নির্ণয়	
দুইটি রেখার $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ ও $a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, $\tan \theta = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \pm \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_1 a_2 + b_1 b_2}$ Note: সরলরেখার ঢাল $\tan \theta$ ঋণকোণ হলে (-)ve এবং সূক্ষ্মকোণ হলে (+)ve	
বিন্দুর সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব	
01. সাপেক্ষ বিন্দুটি প্রদত্ত বিন্দু ও প্রতিবিম্ব বিন্দুর মধ্যবিন্দু হয়। যেমন- (x_1, y_1) বিন্দুর সাপেক্ষে (x_2, y_2) বিন্দুর প্রতিবিম্ব (x, y) হলে, $\frac{x + x_2}{2} = x_1$ এবং $\frac{y + y_2}{2} = y_1$	
02. অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব (i) x অক্ষের সাপেক্ষে $(x, -y)$ (ii) y অক্ষের সাপেক্ষে $(-x, y)$	
পরস্পর সমান্তরাল এবং লম্ব সরলরেখা দ্বয়ের ঢাল	
দুইটি সরলরেখা $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ এবং $a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$ পরস্পর সমান্তরাল হলে তাদের ঢালদ্বয় সমান হবে অর্থাৎ $m_1 = m_2$ অথবা রেখাদ্বয়ের সমান্তরাল হলে $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ এবং পরস্পর লম্ব হলে ঢালদ্বয়ের গুনফল $= -1$ অর্থাৎ $m_1 \times m_2 = -1$ অথবা $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$	

♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦ ASPECT SERIES ♦♦ NETWORK ♦♦

গণিত

০৬. $2x+3y-4=0$ এবং $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$ একই সরলরেখা নির্দেশ করলে p এর মান-

- A. $\frac{1}{\sqrt{13}}$ B. $\frac{2}{\sqrt{13}}$ C. $\frac{3}{\sqrt{13}}$ D. $\frac{4}{\sqrt{13}}$

$\textcircled{D}$ Explanation: $2x+3y-4=0$ এবং $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$ একই সরলরেখা
 নির্দেশ করলে, $\frac{2}{\cos\alpha} = \frac{3}{\sin\alpha} = \frac{4}{p}$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{2p}{4} = \frac{p}{2} \text{ এবং } \sin \alpha = \frac{3p}{4},$$

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = \frac{p^2}{4} + \frac{9p^2}{16} = p^2 \left(\frac{4+9}{16} \right) \Rightarrow 1 = p^2 \left(\frac{13}{16} \right)$$

$$\Rightarrow p^2 = \frac{16}{13} \quad \therefore p = \frac{4}{\sqrt{13}}$$

07. P(6, 8), Q(4, 0) এবং R(0, 0) শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-
 A. 32 Sq. units B. 16 Sq. units
 C. 12 Sq. units D. 24 Sq. units

(B) Explanation নির্ণেয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$= \frac{1}{7} \{ 6(0-0) + 4(0-8) + 0(8-0) \}$$

$$= \frac{1}{2} (0 - 32 + 0) = \frac{1}{2} |-32| = 16 \text{ sq. units.}$$

PRIME TEST

৩১. $r = 2a \cos \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?

- A. $(2, 0)$ B. $(-2, 0)$
C. $(-2, 2)$ D. $(0, 0)$

12. (1, 5) এবং (3, 2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে x অক্ষরেখা কোন অনুপাতে বিভক্ত করে?

- A. 5:2 অনুপাতে বহির্বিভক্ত
B. 5:2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত
C. 2:5 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত
D. 2:5 অনুপাতে বহির্বিভক্ত

13. $P(6, 8)$, $Q(4, 0)$ এবং $R(0, 0)$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-

- A. 32 Sq. units
B. 16 Sq. units
C. 12 Sq. units
D. 24 Sq. units

৭. $P(2, 5)$, $Q(5, 9)$ এবং $S(6, 8)$ বিন্দুত্রয় PQRS রম্বসের শীর্ষবিন্দু হলে R এর স্থানাঙ্ক-

- A. $(12, 9)$
- B. $\left(\frac{7}{2}, 7\right)$

- C. $\left(4, \frac{13}{2}\right)$ D. $(9, 12)$

15. সরলরেখার সমীকরণ কোনটি যা y অক্ষকে -8 বিন্দুতে ছেদ করে এবং x -অক্ষের সাথে 45° হেলানো অবস্থায় আছে?

- A. $x + y + 8 = 0$ B. $3x + 8y = 1$
C. $x - y = 8$ D. $y = 8$

৬. $2x-3y+6=0$ রেখার উপর লম্ব এবং $(1, -1)$ বিন্দুগামী সরল রেখার
সীকরন-

- A. $3x + 2y = 1$
C. $3x + 2y = 5$

৭৭. $3x - 4y - 12 = 0$ রেখার ঢাল কত হবে?

- A. $\frac{3}{4}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $-\frac{4}{3}$

০৪. (3, -6) বিন্দুগামী এবং y -অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি?

- A. $x = -6$
B. $y = -6$
C. $x = 3$
D. $y = 3$

09. $4x - 3y + 2 = 0$ এবং $8x - 6y - 9 = 0$ সমান্তরাল রেখাযুগ্মের মধ্যবর্তী দূরত্ব কোনটি?

- A. $\frac{15}{10}$ B. $\frac{11}{9}$
C. $\frac{14}{9}$ D. $\frac{13}{10}$

10. $px + qy + 12 = 0$ এবং $px + qy + 20 = 0$ রেখাভয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ?
- A. $\pi/3$ B. $\pi/2$
C. π D. কোনটিই নহে

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	ಇಲ್ಲಿ

ANS ANALYSIS

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	A	$r = 2a \cos \theta$ $\Rightarrow r^2 = 2a.r \cos \theta$ $\Rightarrow x^2 + y^2 = 2ax \quad \therefore \text{কেন্দ্র } (a, 0)$
02	A	$m = -\frac{y_1}{y_2} = -\frac{5}{2}$ $\therefore 5:2$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে।
03	B	নির্ণেয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, $= \frac{1}{2} \{6(0-0) + 4(0-8) + 0(8-0)\}$ $= \frac{1}{2} \cdot (0-32+0) = \frac{1}{2} \cdot -32 = 16 \text{ sq. units.}$
04	D	R বিন্দুর স্থানাংক = $\{(5+6-2), (9+8-5)\} = (9, 12)$
05	C	রেখাটির সমীকরণ, $y = mx + c$ $\Rightarrow y = (\tan 45^\circ)x - 8$ $\therefore y = x - 8 \Rightarrow x - y = 8$
06	A	$2x - 3y + 6 = 0$ রেখার ঢাল $= -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3}$ $\therefore 2x - 3y + 6 = 0$ রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল $= -\frac{3}{2}$ $\therefore$ লম্ব রেখার সমীকরণ $y + 1 = -\frac{3}{2}(x-1)$ $\Rightarrow 2y + 2 = -3x + 3$ $\therefore 3x + 2y = 1$
07	A	$3x - 4y - 12 = 0$ রেখার ঢাল $= -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$
08	C	y অক্ষের সমান্তরাল হলে $x = a$ হয়। $\therefore (3, -6)$ বিন্দুগামী $\therefore x = 3$
09	C	$4x - 3y + 2 = 0 \dots\dots (i)$ $8x - 6y - 9 = 0$ $\Rightarrow 4x - 3y - \frac{9}{2} = 0 \dots\dots (ii)$ $(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \frac{\left 2 - \left(-\frac{9}{2}\right) \right }{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{\left \frac{13}{2} \right }{5} = \frac{13}{10}$
10	D	As straight lines are parallel $\therefore$ অন্তর্ভুক্ত কোণ $= 0^\circ$

- i. (x_0, y_0) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত $\sqrt{x_0^2 + y_0^2 - a^2}$
- ii. (x_0, y_0) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, $PT = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + 2gx_0 + 2fy_0 + c}$
- iii. মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে কোন বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{\text{কেন্দ্রের দূরত্ব}}$

বিন্দুর অবস্থান	বৃত্তের সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়	
	(x_0, y_0) বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের	(x_0, y_0) বিন্দুটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের
বাইরে হলে	$x_0^2 + y_0^2 + 2gx_0 + 2fy_0 + c > 0$	$x_0^2 + y_0^2 - a^2 > 0$
বৃত্তের (পরিধির) উপর হলে	$x_0^2 + y_0^2 + 2gx_0 + 2fy_0 + c = 0$	$x_0^2 + y_0^2 - a^2 = 0$
ভিতরে হলে	$x_0^2 + y_0^2 + 2gx_0 + 2fy_0 + c < 0$	$x_0^2 + y_0^2 - a^2 < 0$
ছা এল দৈর্ঘ্য		$l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$
হলে জা কর্তৃক কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ		$\theta = 2 \sin^{-1} \left(\frac{\text{জা এর দৈর্ঘ্য}}{\text{ব্যাস}} \right)$

শুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমাধান

ME1 $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 41 = 0$ সমীকরণ দ্বারা সূচিত বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?

Solve $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 41 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-2)x + 2(-4)y + (-41) = 0$

$\therefore (-2, -4) = (2, 4)$

Magic x^2 ও y^2 এর সহগকে দুই করে। x ও y এর সহগকে -2 দ্বারা ভাগ করে বৃত্তের কেন্দ্র পাওয়া যায়।

ME2 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0$ বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করলে c এর মান কত?

Solve $x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0$ বৃত্তটিতে $f = -2$ কোনো বৃত্ত y অক্ষকে স্পর্শ করলে $f^2 = c$ $\therefore c = f^2 = (-2)^2 = 4$

ME3 $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$ বৃত্তটি দ্বারা x অক্ষের ব্যতিরণ কত?

Solve $g = 1; f = \frac{3}{2}; c = \frac{1}{2}$

ব্যতিরণ = $2\sqrt{g^2 - c}$

$= 2\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

ME4 যদি $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শক হয় তবে $c = ?$

Solve $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত,

$c = \pm a\sqrt{1 + m^2}$

ME5 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 2 = 0$ বৃত্তের উপর $(3, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ-

Solve $x(3) + y(-1) - 2 \cdot \frac{x+3}{2} + 6 \cdot \frac{y-1}{2} + 2 = 0$

$\Rightarrow 3x - y - x - 3 + 3y - 3 + 2 = 0$

$\Rightarrow 2x + 2y - 4 = 0$

$\therefore x + y - 2 = 0$

ME6 $x^2 + y^2 - 6x + 16y = 0$ বৃত্তের $(1, 1)$ বিন্দুগামী ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত?

Solve $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ হলে,

ব্যাস = $\sqrt{g^2 + f^2 - c}$

বৃত্তের কেন্দ্র বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য = $2 \times \sqrt{(-3)^2 + (8)^2 - 0} = 2\sqrt{73}$

ME7 $(1, -1)$ বিন্দু হতে $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$ বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত?

Solve $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0$

$\therefore$ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{1^2 + (-1)^2 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}(-1) + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

ME8 $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$ বৃত্ত সাপেক্ষে মূলবিন্দুর অবস্থান কোনটি?

Solve $0^2 + 0^2 - 0 + 9 + 0$

$\therefore 9 > 0 \therefore$ বৃত্তের বাইরে

ME9 $r = a \sin \theta$ নির্দেশ কোনটি নির্দেশ করে?

Solve $r = a \sin \theta \Rightarrow r^2 = ar \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = ay$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - ay = 0$ বাহ্য একটি বৃত্ত নির্দেশ করে।

ME10 $x^2 + y^2 = 9$ এবং $x^2 + y^2 + 2ax + 2y + 1 = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পর স্পর্শ করলে a এর মান কত?

Solve $C_1 C_2 = r_1 + r_2; \sqrt{a^2 + 1} = 3 + a$

$\Rightarrow 6a + 9 = 1 \Rightarrow a = -\frac{4}{3}$

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $r = a \sin \theta$ সমীকরণটি নির্দেশ করে- [DU-7Clg. 2023-24]

- A. বৃত্ত B. পরাবৃত্ত C. উপবৃত্ত D. অধিবৃত্ত

Explanation $r = a \sin \theta \Rightarrow r^2 = ar \sin \theta \therefore x^2 + y^2 = ay \rightarrow$ বৃত্ত

02. $(2, -3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত x -অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তটির ব্যাস কত? [DU-7Clg. 2023-24]

- A. -3 B. 2 C. 4 D. 6

Explanation x অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ $r = |\text{কেন্দ্রের কোটি}|$
 $= |-3| = 3$
 $\therefore$ ব্যাস = $2r = 6$ একক

03. $2(x^2 + y^2) - 3x + 4y = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কোনটি? [DU-7Clg. 2023-24]

- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{4}{5}$
 C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

Explanation $x^2 + y^2 - \frac{3}{2}x + 2y = 0 \therefore$ কেন্দ্র = $(\frac{3}{4}, -1)$

$\therefore r = \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = \sqrt{\frac{9+16}{16}} = \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}$

04. $x^2 + y^2 - 9x = 0$ বৃত্তটির পোলার সমীকরণ- [DU-7Clg. 2023-24]

- A. $r = 9 \cos \theta$ B. $r = 3 \cos \theta$
 C. $r + 9 \cos \theta = 0$ D. $r + 3 \cos \theta = 0$

Explanation $x^2 + y^2 = 9x$

$\Rightarrow r^2 = 9r \cos \theta$

$\Rightarrow r = 9 \cos \theta$

প্রথম পত্র

অধ্যায়

০৫

বিন্যাস ও সমাবেশ

(PERMUTATIONS & COMBINATIONS)



কি পড়ব? কেন পড়ব?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়ব? কিভাবে পড়ব?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব]
01	(i) কিছু বর্ণ/বস্তু কখনো পাশাপাশি বা একত্রে না রেখে বিন্যাস (ii) কতগুলো বস্তু যা কখনোই থাকবে না (iii) কতগুলো বস্তু যা অবশ্যই থাকবে	★★★
02	(i) কতগুলো বিশেষ বস্তু কিছু থাকবে কিছু থাকবে না (ii) কতগুলো বিশেষ বস্তু অবস্থান পরিবর্তন করবে না (iii) কতগুলো বিশেষ বস্তু আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন করবে না (iv) কতগুলো বিশেষ বস্তু ক্রম পরিবর্তন করবে না	★★★
03	সমজাতীয়/ ভিন্ন জাতীয় বস্তু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে	★★★
04	বিন্যাস ও সমাবেশের মিশ্রিত সমস্যা সংক্রান্ত	★★



টপিক তালিকা

বিন্যাস

সাধারণ সূত্রাবলি

(i) ${}^nP_r = {}^nC_r \times r!$

(ii) ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

(iii) ${}^nC_n = 1$

(iv) ${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}$

 n সংখ্যক ভিন্ন জিনিস হতে n সংখ্যক নিয়ে

${}^nP_n = n!$

 n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস

${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}; [n \geq r]$

 n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে সবগুলি নিয়ে বিন্যাস

${}^nP_n = n!$

 n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে p একজাতীয়, q সংখ্যক অন্য এক জাতীয়, r সংখ্যক আর এক জাতীয় হলে সবগুলো নিয়ে বিন্যাস

$\frac{n!}{p! q! r!}$

বৃহত্তম মান নির্ণয়

 nP_r এর মান বৃহত্তম হবে যদি $r = n$ বা $r = n - 1$ হয় এবং ${}^nP_r = {}^nP_s$ হবে যখন হয় $r = s$ অথবা, $n = r + s$

কিছু বর্ণ বা বস্তু একত্রে রেখে বিন্যাস

i) r সংখ্যক নির্দিষ্ট জিনিস একত্রে রেখে n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস একসাথে নিয়ে বিন্যাস $= (n - r + 1)! \times r!$

ii) একত্রে না রেখে বিন্যাস = সবগুলো নিয়ে বিন্যাস - একত্রে রেখে বিন্যাস

চক্র বিন্যাস

 n সংখ্যক মানুষ নিয়ে চক্রাকারে বৈঠক করা যাবে

$(n - 1)!$ উপায়ে

আসন সংখ্যা স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকলে

$n!$ উপায়ে

মালা, পুথি, তজবি, এরূপ জিনিসের বিন্যাস

$\frac{(n - 1)!}{2}$ উপায়ে

দুটি গ্রুপের ক্ষেত্রে একই গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি না রেখে চক্রাকারে বৈঠক করার ক্ষেত্রে

$(n - 1)!$ উপায়ে

 n সংখ্যক বিভিন্ন ঘটনা/বস্তু থেকে সংখ্যক ঘটনা/বস্তু দ্বারা পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাস যাহা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে

01. ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে = (প্রার্থী) ভোটের

03. চিঠি পোষ্ট বাক্সে ফেলার ক্ষেত্রে = (পোষ্ট বাক্স) চিঠি

02. ফোন করার ক্ষেত্রে = (10) ডিজিট

04. বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে = $2^n - 1$

Magic: (একাধিক নিতে পারে) একাধিক দিতে পারে অথবা, Optional compulsory

FORMULA সংখ্যা গঠনের অংক :

01. যত অংকের সংখ্যা ততটা ঘর বানাব।
03. পুনরাবৃত্তি ছাড়া হলে 1, 1 করে কমাতে।
05. কোন বিশেষ শর্ত থাকলে নির্দিষ্ট ঘরে ফিক্সড করে দিব।
07. ঘরে বসানো সংখ্যাগুলোর গুণ করব।
02. যতটা অংক দেওয়া আছে প্রথম ঘরে তত বসাব।
04. পুনরাবৃত্তিসহ হলে কমাতে না।
06. প্রথম ঘরে শূন্য বসার সম্ভাবনা থাকলে বিয়োগ করতে হবে।

সমাবেশ

সমাবেশের ধর্ম

- ${}^nC_0 = 1$
- ${}^nC_n = 1$
- ${}^nC_x = {}^nC_y$ হলে, Either $x = y$ or $x + y = n$
- ${}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n = 2^n$
- ${}^nP_r = r! \times {}^nC_r$
- ${}^nC_1 = n$
- ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ [nC_r ও ${}^nC_{n-r}$ কে পরস্পরের সম্পূরক সমাবেশ বলে।]
- ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ [$n > r > 1$]
- ${}^nC_1 + {}^nC_2 + {}^nC_3 + \dots + {}^nC_n = 2^n - 1$

n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বাছাই বা সমাবেশ

$${}^nC_r = \frac{n!}{r! (n-r)!}; [n \geq r]$$

n সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে প্রতিবারে r সংখ্যক বস্তু নিয়ে গঠিত যে সমস্ত সমাবেশে p সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু সর্বদাই থাকবে, তার সংখ্যা

$${}^{n-p}C_{r-p} [p+r \leq n]$$

n সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে r সংখ্যক বস্তু নিয়ে গঠিত যে সমস্ত সমাবেশে p সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু কখনোই থাকবে না, তার সংখ্যা

$${}^{n-p}C_r [p+r \leq n]$$

 n সংখ্যক বিন্দু দ্বারা গঠিত

সরলরেখাকে সংখ্যা

nC_2

ত্রিভুজের সংখ্যা

nC_3

চতুর্ভুজের সংখ্যা

nC_4

কর্ণের সংখ্যা

$${}^nC_2 - n$$

কমিটি বা দল গঠন

m সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে p আকার n সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু হতে q সংখ্যক করে নিয়ে $(m+n)$ সংখ্যক বস্তু হতে $(p+q)$ সংখ্যক বস্তু নির্বাচন করা যাবে ${}^mC_p \times {}^nC_q$ উপায়ে। আবার এর সাথে s সংখ্যক বস্তু t সংখ্যক বস্তু নির্বাচন হবে ${}^mC_p \times {}^nC_q \times {}^sC_t$ উপায়ে।

সমজাতীয়/ভিন্ন জাতীয় বস্তু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে

সমজাতীয়/ভিন্ন বস্তু বাছাইয়ের অংক করতে গেলে সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সংখ্যা তুলোকে আলাদা করে বাছাই করতে হবে আর আমরা জানি যে একজাতীয় n সংখ্যক বস্তু হতে প্রতি বারে যতগুলোই বাছাই করা হোক না কেন তার বিন্যাস/সমাবেশ সবসময় 1।

উকত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

ME101 nP_r এর মান nC_r এর মানের কতগুণ?

Solve ${}^nP_r = r! \times {}^nC_r = r!$

ME102 0! এর মান কত হবে?

Solve 1

ME103 যদি ${}^nC_5 = {}^nC_7$ হয় তবে ${}^nC_{11}$ এর মান কত?

Solve সর্বদা এক্ষেত্রে ডান ও বাম পাশে n এর যে মান দেওয়া থাকে তা যোগ করলে এর মান পাওয়া যায়।

$$n=5+7=12; {}^{12}C_{11}=12; {}^{12}C_{n-1}=n$$

ME104 5 টি মুদ্রা 4 টি দানবক্সে কতভাবে ফেলা যায়?

Solve (দানবক্স) ${}^4P_5 = (4)^5$

ME105 3 জন ছাত্রী ও 4 জন ছাত্রকে একটি সারিতে কত প্রকারে বিন্যাস করা যায় যাতে 3 জন ছাত্রী সর্বদাই একত্রে থাকে?

Solve এখানে, 3 জন ছাত্রীকে একত্রে একটি গ্রুপ মান করে মোট বিন্যাস সংখ্যা = 5!

আবার, 3 জন ছাত্রীর নিজেদের মধ্যে বিন্যাস সংখ্যা = 3!

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = 5! \times 3! = 720$$

ME106 টেলিফোন ডায়ালে 0 হলে 9 পর্যন্ত লেখা থাকে। যদি কলকাতার শহরের টেলিফোনডায়ালে 5 অংকবিশিষ্ট হয়, তবে এই শহরে কত টেলিফোন সংযোগ দেয়া যাবে?

Solve সূত্র = 10^{Digit}

$$\text{সংযোগ} = 10^5 = 100000$$

ME107 0, 1, 2, 3 দ্বারা চার অঙ্কের কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যেতে পারে?

Solve এখানে অঙ্ক আছে 8টি

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} = 18$$

0 ব্যতীত বাকিগুলো

ME108 'EQUATION' শব্দটির সবগুলো অক্ষর ব্যবহার করে কতগুলো শব্দ গঠন করা যেতে পারে যাতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে থাকে?

Solve n সংখ্যক জিনিসের মধ্যে P সংখ্যক ভিন্ন জিনিসকে একত্রে রেখে,

$$\text{বিন্যাস} = (n-p+1)! \times p!$$

$$\therefore \text{নির্ণয়ের বিন্যাস} = (8-5+1)! \times 5!$$

$$= 2880$$

৩৩. ৩ জন বালক এবং ৫ জন বালিকাকে একটি সারিতে কত প্রকারে বিন্যাস করা হবে, যাতে ৩ জন বালক সর্বসাই একত্রে থাকবে?
- A. 720 B. 2430
C. 4320 D. 144
৩৪. BANGLADESH শব্দটিতে কত ভাবে সাজানো যায় যেন "BANGLA" শব্দটি একত্রে থাকে?
- A. 43200 B. 8640
C. 5040 D. 120
৩৫. "TIME" শব্দটির অক্ষরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়, তবে কতগুলো প্রকারে বরবর্ণ দ্বারা শুরু হয়?
- A. 5 B. 216
C. 12 D. 60
৩৬. ৫ জন কার্মেসী বিভাগের ছাত্রকে একত্রে বা বসিয়ে ৫ জন রসায়নের ছাত্র ও ৫ জন কার্মেসী বিভাগের ছাত্র কত রকমে একটি টেবিলের পাশে আসন নিতে পারে?
- A. 7200 B. 2840
C. 2430 D. 2440
৩৭. ৯ জন অক্ষরকে যে কোন সংখ্যক বার ব্যবহার করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 জনগণের নাম তিন অক্ষরের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে?
- A. 720 B. 84
C. 144 D. 504
৩৮. SCHOOL শব্দটি যত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর নিয়ে পৃথকভাবে সাজানো সংখ্যা-
- A. 10 B. 14
C. 4 D. 15
৩৯. ৩ জন বালক এবং ৫ জন বালিকাকে একটি সারিতে কত প্রকারে বিন্যাস করা হবে, যাতে ৩ জন বালক সর্বসাই একত্রে থাকবে।
- A. 720 B. 2430
C. 4320 D. 144
৪০. BANGLADESH শব্দটিতে কত ভাবে সাজানো যায় যেন "BANGLA" শব্দটি একত্রে থাকে?
- A. 43200 B. 8640
C. 5040 D. 120
৪১. "TIME" শব্দটির অক্ষরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়, তবে কতগুলো প্রকারে বরবর্ণ দ্বারা শুরু হয়?
- A. 5 B. 216
C. 12 D. 60
৪২. ৫ জন কার্মেসী বিভাগের ছাত্রকে একত্রে বা বসিয়ে ৫ জন রসায়নের ছাত্র ও ৫ জন কার্মেসী বিভাগের ছাত্র কত রকমে একটি টেবিলের পাশে আসন নিতে পারে?
- A. 7200 B. 2840
C. 2430 D. 2440
৪৩. ৯ জন অক্ষরকে যে কোন সংখ্যক বার ব্যবহার করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 জনগণের নাম তিন অক্ষরের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে?
- A. 720 B. 84
C. 144 D. 504
৪৪. SCHOOL শব্দটি যত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর নিয়ে পৃথকভাবে সাজানো সংখ্যা-
- A. 10 B. 14
C. 4 D. 15
৪৫. ৩ জন বালক এবং ৫ জন বালিকাকে একটি সারিতে কত প্রকারে বিন্যাস করা হবে, যাতে ৩ জন বালক সর্বসাই একত্রে থাকবে।
- A. 720 B. 2430
C. 4320 D. 144
৪৬. BANGLADESH শব্দটিতে কত ভাবে সাজানো যায় যেন "BANGLA" শব্দটি একত্রে থাকে?
- A. 43200 B. 8640
C. 5040 D. 120
৪৭. "TIME" শব্দটির অক্ষরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়, তবে কতগুলো প্রকারে বরবর্ণ দ্বারা শুরু হয়?
- A. 5 B. 216
C. 12 D. 60
৪৮. ৫ জন কার্মেসী বিভাগের ছাত্রকে একত্রে বা বসিয়ে ৫ জন রসায়নের ছাত্র ও ৫ জন কার্মেসী বিভাগের ছাত্র কত রকমে একটি টেবিলের পাশে আসন নিতে পারে?
- A. 7200 B. 2840
C. 2430 D. 2440
৪৯. ৯ জন অক্ষরকে যে কোন সংখ্যক বার ব্যবহার করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 জনগণের নাম তিন অক্ষরের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে?
- A. 720 B. 84
C. 144 D. 504
৫০. SCHOOL শব্দটি যত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর নিয়ে পৃথকভাবে সাজানো সংখ্যা-
- A. 10 B. 14
C. 4 D. 15

প্রশ্ন উত্তর	ব্যাখ্যা												
03 A	যেহেতু, 3 জন বালক সর্বসাই একত্রে থাকবে, সেহেতু, 3জন বালককে একজন ধরে মোট লোকসংখ্যা 5 জন। এই 5 জনকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় = 5! উপায়ে। আবার, 3 জন বালক নিজেদের মধ্যে সাজে 3! ভাবে। ∴ সর্বমোট বিন্যাস সংখ্যা = 5!×3!=720												
04 D	'BANGLA' শব্দটির বর্ণগুলোকে 1টি ধরে 'BANGLADESH' শব্দটির বিন্যাস = (1 + 4)! = 5! = 120												
05 C	TIME শব্দটিতে মোট বর্ণ 4টি। বরবর্ণ 2টি, ব্যঞ্জনবর্ণ 2টি। প্রথম স্থানে বরবর্ণকে বসানো উপায় = ${}^2P_1 = 2$ অবশিষ্ট 3টি স্থানে অবশিষ্ট 3টি বর্ণ বসানোর উপায় = ${}^3P_3 = 6$; বরবর্ণকে প্রথমে রেখে বিন্যাস = $2 \times 6 = 12$ বরবর্ণ দ্বারা শুরু হয়ে TIME শব্দটির পুনর্বিন্যাস = 12 [যেহেতু বরবর্ণ দ্বারা শুরু হলে TIME শব্দটি পাওয়া যায় না, সেহেতু পুনর্বিন্যাস বলা হলেও 1 বিয়োগ হবে না]												
06 A	5 জন রসায়নের ছাত্রকে টেবিলের পাশে বসিয়ে তাদের মাঝে কার্মেসী বিভাগের ছাত্রকে বসালে দুইজন কার্মেসী বিভাগের ছাত্র একত্রে থাকবে না। একজনকে নির্দিষ্ট ধরে 5 জন রসায়নের ছাত্রকে টেবিলের পাশে 4! উপায়ে বসানো যায়। ∴ তাদের মাঝে কার্মেসী বিভাগের ছাত্রকে বসানো যায় 5! উপায়ে। ∴ মোট বিন্যাস সংখ্যা = 4! × 5! = 2880												
07 A	মোট ভিন্ন ভিন্ন সাজানো সংখ্যা = $9^3 = 729$												
08 B	SCHOOL শব্দটিতে মোট 6 টি বর্ণ আছে এবং এর মধ্যে 2টি 'O' সুতরাং প্রতিবারে 3টি করে বর্ণ নিয়ে নিম্নবর্ণিতভাবে বাছাই করা যেতে পারে: (i) 2টি বর্ণ অভিন্ন এবং অপর 1টি ভিন্ন। এক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা = $1 \times {}^4C_1 = 4$ (ii) 3টি বর্ণই ভিন্ন। এক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা = ${}^5C_3 = 10$ ∴ বর্ণগুলো বাছাইয়ের মোট সংখ্যা = 4+10=14												
09 B	কমিটি গঠনের সম্ভাব্য উপায়গুলো নিম্নরূপ: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>উপায়</th><th>ইংরেজ (7)-</th><th>মার্কিন (4)</th></tr> <tr> <td>(i)</td><td>4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>(iii)</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table> ∴ কমিটি গঠনের উপায় $= {}^7C_4 \times {}^4C_2 + {}^7C_3 \times {}^4C_3 + {}^7C_2 \times {}^4C_4$ $= 210 + 140 + 21 = 371$	উপায়	ইংরেজ (7)-	মার্কিন (4)	(i)	4	2	(ii)	3	3	(iii)	2	4
উপায়	ইংরেজ (7)-	মার্কিন (4)											
(i)	4	2											
(ii)	3	3											
(iii)	2	4											
10 B	এখানে, মোট অক্ষ 6টি। n = 6, r = 3 নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা = $6^3 = 216$												

04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
07. (A) (B) (C) (D)	১১. (A) (B) (C) (D)

সর্বোচ্চ মান ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় সমস্যা

(a) একটি রাশি $a \sin x + b \cos x + c$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান বের করতে হবে।

$$\begin{aligned} a \sin x + b \cos x + c &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right) + c \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\sin x \cos \theta + \cos x \sin \theta) + c \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \theta) + c \end{aligned}$$

এখন, $-1 \leq \sin(x + \theta) \leq 1$

$$\therefore \text{রাশির সর্বোচ্চ মান} = \sqrt{a^2 + b^2} + c$$

$$\therefore \text{রাশির সর্বনিম্ন মান} = -\sqrt{a^2 + b^2} + c$$

(b) ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ক্ষেত্রে মান সর্বোচ্চ হবে যখন প্রতিটি পদের মান পৃথক পৃথক ভাবে সর্বোচ্চ হবে এবং মান সর্বনিম্ন হবে যখন প্রতিটি পদের মান পৃথক পৃথক সর্বনিম্ন হবে।

(c) $\sin \theta$ ও $\cos \theta$ যুক্ত ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত মানগুলো বিবেচনা করতে হবে:

(i) $\sin \theta$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 ও -1

(ii) $\cos \theta$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 ও -1

(iii) $\sin^2 \theta$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 ও 0

(iv) $\cos^2 \theta$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 ও 0

(v) $|\sin \theta|$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 1 ও 0

গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 $50^\circ 37' 30''$ কত রেডিয়ানের সমান?

$$\text{Solve } 50^\circ 37' 30'' = \frac{\pi}{180} \left[50 + \frac{37}{60} + \frac{30}{60 \times 60} \right] = \frac{9\pi}{32}$$

MEx 02 $\tan x$ একটি পর্যায় ফাংশন। $\tan x$ এর পর্যায় কত?

$$\text{Solve } \tan x \text{ এর পর্যায়} = \frac{\pi}{\text{চলকের সহগ}}$$

MEx 03 $\sin \theta$ এবং $\cos \theta$ এর মান সবসময়ই-

$$\text{Solve } \sin \theta \text{ এবং } \cos \theta \text{ এর মান সর্বদাই } (-1 \text{ থেকে } +1 \text{ পর্যন্ত হয়})$$

MEx 04 যদি $\sec \theta = -2$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, তবে θ এর মান কত?

$$\text{Solve } \sec \theta = -2 \text{ বা, } \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \cos \theta = \cos 120^\circ$$

$$\therefore \theta = 120^\circ$$

MEx 05 $y = \cot x$ ফাংশনটি কোন বিন্দুতে বিচ্ছিন্ন?

$$\text{Solve } \text{যেহেতু } x \text{ এর মান } 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ \text{ ইত্যাদি হলে } \cot x \text{ এর মান অসংপারিত হয়, সেহেতু এসব বিন্দুতে } \cot x \text{ ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন।}$$

MEx 06 যদি $\tan \theta = \sqrt{2x^2}$ হয় তবে $\cos 2\theta$ এর মান-

$$\begin{aligned} \text{Solve } \tan \theta &= \sqrt{2x^2} \\ \cos 2\theta &= \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} \\ &= \frac{1 - (\sqrt{2x^2})^2}{1 + (\sqrt{2x^2})^2} = \frac{1 - 2x^4}{1 + 2x^4} \end{aligned}$$

MEx 07 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ এবং $\tan \theta = \frac{3}{4}$ হলে $\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta}$ এর মান কোনটি?

$$\begin{aligned} \text{Solve } \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} &= \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + 1} \\ &= \frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1} = \frac{\frac{3}{4} - 1}{\frac{3}{4} + 1} = -\frac{1}{7} \end{aligned}$$

MEx 08 একটি বহুভুজের একটি কোণের পরিমাণ 170° বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কত?

$$\text{Solve } \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n} = 170^\circ$$

$$\Rightarrow 180^\circ n - 360^\circ = 170^\circ n \therefore n = 36$$

জেনে রাখা ভালো:

$$> \text{বহুভুজের অভ্যন্তর কোণের মান} = \frac{n-2}{n} \times 180^\circ \quad [n = \text{বাহুর সংখ্যা}]$$

$$> \text{কোন বহুভুজের বাহুর একটি কোণের মান } 30^\circ \text{ হলে বাহুর সংখ্যা } n = \frac{360}{30}$$

P/Q PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $y = \sin x$ ফাংশনটির পর্যায়কাল কত?

[DU-7C]g, 2019-20]

- A. π B. 2π
C. 3π D. 4π

[B] Explanation/ $\sin x, \cos x, \sec x, \csc x$ এদের Power বিজোড় হলে

$$\text{পর্যায়কাল} = \frac{2\pi}{\text{চলকের সহগ}} \therefore y = \sin x \text{ এর পর্যায়কাল} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$$


IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. যদি $\cos \theta = \frac{12}{13}$ হয়, তাহলে $\tan \theta$ এর মান-

- A. $\pm \frac{5}{12}$ B. $\frac{25}{144}$ C. $\frac{13}{12}$ D. $\pm \frac{13}{12}$

[A] Explanation/ দেওয়া আছে, $\cos \theta = \frac{12}{13}$

পার্থের ত্রিভুজ হতে পাই,



$$\tan \theta = \pm \frac{5}{12} \quad [0 \text{ সূক্ষ বা তুল উভয়ই হতে পারে।}]$$

02. $f(x) = 1 + \sqrt{\sin^2 x + 1}$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত হবে?

- A. $1 + \sqrt{1.5}$ B. 2 C. $1 + \sqrt{2}$ D. $3\sqrt{3}$

● Explanation/ যেহেতু $\sin x$ এর সর্বোচ্চ মান 1

সুতরাং $\sin^2 x$ এর সর্বোচ্চ মানও 1 হবে।

$$\therefore 1 + \sqrt{\sin^2 x + 1} \text{ এর সর্বোচ্চ মান} = 1 + \sqrt{1+1} = 1 + \sqrt{2}$$

PRIME TEST

01. $\cot \theta$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি?

- A. R
B. $R - \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$
C. $R - \{(2n+1)\pi/2, n \in \mathbb{Z}\}$
D. $R - \{2n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$

02. একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ যথাক্রমে $72^\circ 53' 51''$ এবং $37^\circ 6' 9''$ তৃতীয় কোণটির মান রেডিয়ানে কত হবে?

- A. $\frac{4\pi}{9}$ রেডিয়ান
B. $\frac{7\pi}{18}$ রেডিয়ান
C. $\frac{6\pi}{12}$ রেডিয়ান
D. $\frac{5\pi}{18}$ রেডিয়ান

03. $f(x) = 1 + \sqrt{\sin^2 x + 1}$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত হবে?

- A. $1 + \sqrt{1.5}$ B. 2
C. $1 + \sqrt{2}$ D. $3\sqrt{3}$

04. কোট্যানজেন্ট ফাংশনের মৌলিক পর্যায় কত?

- A. 2π B. π
C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

05. $0 \leq x \leq 360^\circ$ এবং $4\sin x - 1 = -5$ হলে, $x = ?$

- A. 0 B. 90
C. 180 D. 270

06. $\tan \theta = c$ হলে $\sin \theta$ হবে-

- A. $\frac{-1}{\sqrt{1+c^2}}$
B. $\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}$
C. $\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}$
D. $\frac{\sqrt{1+c^2}}{c}$

07. $\cot A = \frac{12}{5}$ হলে $\sin A + \cos A$ এর মান কত?

- A. $\frac{13}{17}$ B. $-\frac{7}{13}$
C. $\frac{17}{13}$ D. $-\frac{13}{17}$

08. $20^\circ =$ কত রেডিয়ান?

- A. 0.35° B. $28^\circ 27'$
C. $12^\circ 63'$ D. 160°

09. কোন লেখচিত্রটি মূলবিন্দু দিয়ে যায় না?

- A. $y = \sin x$
B. $y = \sin(x + 45^\circ)$
C. $y = \tan x$
D. সব কয়টিই


10. যদি $\cos x = \frac{4}{5}$ এবং $0 < x < \frac{\pi}{2}$ হয়, তবে $\tan x = ?$

- A. $\frac{7}{24}$ B. $\frac{7}{25}$
C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{24}{25}$

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	সেউল

ANS ANALYSIS

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	B	General discussion of Trigonometric Ratios.
02	B	তৃতীয় কোণটির মান $= 180^\circ - (72^\circ 53' 51'' + 37^\circ 6' 9'')$ $= 70^\circ = 70 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{18}$ রেডিয়ান
03	C	যেহেতু $\sin x$ এর সর্বোচ্চ মান 1 সুতরাং $\sin^2 x$ এর সর্বোচ্চ মানও 1 হবে। $\therefore 1 + \sqrt{\sin^2 x + 1}$ এর সর্বোচ্চ মান $= 1 + \sqrt{1+1} = 1 + \sqrt{2}$
04	B	$\cot$ এর মৌলিক পর্যায়কাল $= \pi$
05	D	$\sin 270^\circ = -1$
06	C	দেওয়া আছে, $\tan \theta = c$; পার্শ্বের ত্রিভুজ হতে পাই, $\sin \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{1+c^2}}$ [0 সূক্ষ্ম বা স্থূল উভয়ই হতে পারে।]
07	C	দেওয়া আছে, $\cot A = \frac{12}{5}$ $\therefore$ পাশের চিত্র হতে পাই, $\sin A = \frac{5}{13}$ এবং $\cos A = \frac{12}{13}$ $\therefore \sin A + \cos A = \frac{5}{13} + \frac{12}{13} = \frac{17}{13}$
08	A	$\cos^2 x$ এর বৃহত্তম মান 1 এবং ক্ষুদ্রতম মান 0
09	B	General discussion of Trigonometric Ratios
10	C	$\cos x = \frac{4}{5}$ $\Rightarrow x = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$ $\therefore \tan x = \tan\left(\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right) = \frac{3}{4}$



প্রথম পত্র

অধ্যায় ০৭

সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত
(TRIGONOMETRIC RATIOS OF ASSOCIATED ANGLES)



কি পড়বে? কেন পড়বে?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়বে? কিসে পড়বে?



ক্রমিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	সহসংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সংক্রান্ত	★★
02	জানা কোণের ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★★
03	অজানা কোণের ত্রিকোণমিতিক রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★★★
04	ত্রিভুজের sin ও cosine সূত্রের ব্যবহার	★★★
05	ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত	★★



টপিক চানোচনা

sin/cos এর যৌগিক কোণের সূত্র		
$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$	$\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$	$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$	$\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$	$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$	$\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$	$\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A ; 2 \sin^2 A = 1 - \cos 2A$
$2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$	$\sin(A+B) \sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$	$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 ; 2 \cos^2 A = 1 + \cos 2A$
$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$	$\cos(A+B) \cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$	$\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$
$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$	$\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A \Rightarrow \sin^3 A = \frac{1}{4} (3 \sin A - \sin 3A)$	$\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$
$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$	$\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A \Rightarrow \cos^3 A = \frac{1}{4} (\cos 3A + 3 \cos A)$	
tan/cot এর যৌগিক কোণের সূত্র		
$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$	$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$	$\tan 3A = \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}$
$\cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$	$\cot 3A = \frac{\cot^3 A - 3 \cot A}{3 \cot^2 A - 1}$	$\tan^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{1 + \cos 2A}$
নিম্নোক্ত মানগুলো MCQ এর জন্য মুখস্থ রাখতে হবে		
$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$	$\sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$	$\cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$
$\tan(-15^\circ) = \sqrt{3} - 2$	$\cos 15^\circ = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$	$\cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$
$\tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$	$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\sin 36^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$
ত্রিভুজের সূত্র সমূহ		
ত্রিভুজের sine এর সূত্র	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ [R = পরিব্যাসার্ধ]	
ত্রিভুজের cosine এর সূত্র	1. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$	2. $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac}$ 3. $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল	$\frac{1}{2} \times \text{বাহুদ্বয়ের গুণফল} \times \text{বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের sin}$	

ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা

একটি ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা	$\frac{a+b+c}{2}$
ক্ষেত্রফল	$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
ত্রিভুজের অন্তঃব্যাসার্ধ	$r = \frac{\Delta}{s}$
ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ	$R = \frac{abc}{4\Delta}$
অভিক্ষেপ- সূত্র	$a = b \cos C + c \cos B$ $b = c \cos A + a \cos C$ $c = a \cos B + b \cos C$

$\sin^2 \theta$ ও $\cos^2 \theta$ এর ধারা থাকলে মান নির্ণয়

ধারার সমষ্টির ক্ষেত্রে $\sin^2 \theta$ এবং $\cos^2 \theta$ এর জন্য আগে পদ সংখ্যা বের করতে হবে।

$$\text{পদ সংখ্যা} = \frac{\text{শেষ পদ} - \text{প্রথম পদ}}{\text{ব্যবধান}} + 1$$

(i) পদ সংখ্যা জোড় হলে Answer = $\frac{n}{2}$

(ii) পদ সংখ্যা বিজোড় হলে Answer = $\frac{n-1}{2} + (\sin^2 \theta / \sin^2 90^\circ / \cos^2 \theta / \cos^2 90^\circ)$

Note:

(i) পদ সংখ্যা বিজোড় হলে $\sin^2 \theta / \sin^2 90^\circ / \cos^2 \theta / \cos^2 90^\circ$ এই চারটি পদের যে কোনো একটি পদ গ্রহণ থাকবে এবং যেটি থাকবে তার মান যোগ করতে হবে।

(ii) পদ সংখ্যা বিজোড় হলে এবং $\sin^2 \theta / \sin^2 90^\circ / \cos^2 \theta / \cos^2 90^\circ$ এই চারটি পদের কোনোটি না থাকলে $\frac{1}{2}$ যোগ করতে হবে।

[অর্থাৎ পদসংখ্যা বিজোড় হলে মধ্যপদ আলাদা করে নিয়ে এর সাথে বাকি অংশের সমষ্টি যোগ করতে হবে]

প্রকৃতপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 $\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ এর মান হবে-

Solve $\sin \theta \sin (60^\circ - \theta) \sin (60^\circ + \theta) = \frac{1}{4} \sin 3\theta$

MEx 02 $\sin^2 2^\circ + \sin^2 7^\circ + \sin^2 12^\circ + \dots + \sin^2 147^\circ$ এর পদসংখ্যা কত?

Solve $\sin^2 2^\circ + \sin^2 7^\circ + \sin^2 12^\circ + \dots + \sin^2 147^\circ$

ধরি, পদ সংখ্যা, $n = \frac{\text{শেষ পদ} - \text{প্রথম পদ}}{\text{ব্যবধান}} + 1 = \frac{147 - 2}{5} + 1 = 30 \therefore n = 30$

MEx 03 $\frac{1 - \cos 2\theta}{\sin 2\theta}$ এর মান-

Solve $\frac{2\sin^2 \theta}{2\sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$

MEx 04 যদি $A + B + C = \pi$ হয় তবে $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2\cos A \cos B \cos C =$ কত হবে?

Solve $A = 60^\circ, B = 60^\circ, C = 60^\circ$ বসিয়ে

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2\cos A \cos B \cos C = 1$$

MEx 05 $4 \cos x + 3 \sin x$ এর বৃহত্তম মান কত?

Solve সর্বোচ্চ মান = $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

MEx 06 $\frac{\cos 15^\circ + \sin 15^\circ}{\cos 15^\circ - \sin 15^\circ}$

Solve $\frac{\cos A + \sin A}{\cos A - \sin A} = \tan(45^\circ + A) = \cot(45^\circ - A)$

$$\therefore \frac{\cos 15^\circ + \sin 15^\circ}{\cos 15^\circ - \sin 15^\circ} = \tan(45^\circ + 15^\circ) = \sqrt{3}$$

MEx 07 একটি স্থলকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলি পরিমাপ 3 সেমি, 5 সেমি, এবং 7 সেমি, হলে স্থলকোণটির পরিমাপ কত?

Solve $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right) = 120^\circ$

MEx 08 ΔABC সমকোণী হলে $\sin(A + B + C) = ?$

Solve For any triangle, $A + B + C = \pi$

So, $\sin(A + B + C) = \sin \pi = 0$

MEx 09 $\sin x \sin(x + 30^\circ) + \cos x \sin(x + 120^\circ)$ এর মান কত?

Solve $x = 30^\circ$ ধরে, $\sin x \sin(x + 30^\circ) + \cos x \sin(x + 120^\circ)$

$$= \sin 30^\circ \sin 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \frac{1}{4} \sin(3 \times 10^\circ) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

MEx 10 $\cos A + \cos C = \sin B$ হলে $\sin(B + C)$ এর মান কত?

Solve $\cos A + \cos C = \sin B \Rightarrow 2 \cos \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = \sin B$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \Rightarrow \frac{A-C}{2} = \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow A = B + C \Rightarrow A = 180^\circ - A \Rightarrow A = 90^\circ$$

$$\therefore \sin(B + C) = \sin 90^\circ = 1$$

MEx 11 $\sqrt{x} \sin \theta = \sqrt{3}$ এবং $\sqrt{x} \cos \theta = 1$ হলে ' θ ' এর মান কত হবে?

Solve $\frac{\sqrt{x} \sin \theta}{\sqrt{x} \cos \theta} = \frac{\sqrt{3}}{1} \Rightarrow \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = 60^\circ$

MEx 12 $\tan 36^\circ + \tan 9^\circ + \tan 36^\circ \tan 9^\circ = ?$

Solve আমরা জানি, $\tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1$

$$\therefore \tan \frac{36^\circ}{A} + \tan \frac{9^\circ}{B} + \tan \frac{36^\circ}{A} \cdot \tan \frac{9^\circ}{B} = 1$$

PXQ

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $A + B = \frac{\pi}{4}$ হলে $(1 + \tan A)(1 + \tan B)$ এর মান কত?

[DU-7Clg, 2023-24]

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

① Explanation $A + B = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \tan(A + B) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$

$$\Rightarrow \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = 1 \Rightarrow \tan A + \tan B = 1 - \tan A \tan B$$

$$\Rightarrow \tan A + \tan B + \tan A \tan B + 1 = 2$$

$$\Rightarrow (1 + \tan A) + (1 + \tan A) \tan B = 2$$

$$\Rightarrow (1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$$


02. যদি $\cos\theta = \frac{12}{13}$ হয় তাহলে $\tan\theta$ এর একটি মান কোনটি?

[DU-7Clg. 2023-24]

- A. $\frac{5}{12}$ B. $\frac{25}{144}$ C. $\frac{13}{12}$

Explanation $\cos\theta = \frac{12}{13}$

$$\therefore \tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{5}{12}$$



03. ΔABC এর তিনটি বাহুর অনুপাত $a : b : c = 3 : 7 : 5$ হলে B কোণের মান-

[DU-7Clg. 2022-23]

- A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

Explanation $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2} \therefore B = 120^\circ$

04. $\sin(A - 30^\circ) + \sin(A + 150^\circ) = ?$

[DU-7Clg. 2022-23]

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 0 D. 2

Explanation $\sin(A - 30^\circ) + \sin(150^\circ + A)$
 $= 2 \sin \frac{150^\circ + A + A - 30^\circ}{2} \cos \frac{150^\circ + A - A + 30^\circ}{2}$
 $= 2 \sin(60^\circ + A) \cos 90^\circ = 0$

05. যদি $\sin \alpha = 5/13$ এবং $0 < \alpha < \pi/2$ হয়, তবে $\tan \alpha$ এর মান কত?


[DU-7Clg. 2020-21]

- A. $-5/12$ B. $5/12$ C. $12/13$ D. $-12/13$

Explanation $\sin \alpha = \frac{5}{13}$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ব্যবধিতে $\tan\theta$ ধনাত্মক

$$\therefore \tan \alpha = \frac{5}{12}$$



06. $2\sin^2 15^\circ$ এর মান নিচের কোনটি?

[DU-7Clg. 2020-21]

- A. $\frac{(2-\sqrt{3})}{2}$ B. $\frac{(2-\sqrt{3})}{\sqrt{2}}$ C. $\frac{(2-\sqrt{3})}{2}$ D. $\frac{(2+\sqrt{3})}{\sqrt{2}}$

Explanation $2\sin^2 15^\circ = 1 - \cos(2 \times 15^\circ) = 1 - \cos 30^\circ$
 $= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}$

07. $\cos(120^\circ + A) + \cos(120^\circ - A) = ?$

[DU-7Clg. 2018-19]

- A. $2\cos A$ B. $\cos A$ C. $-\cos A$ D. 0

Explanation $A = 60^\circ$ ধরে, $\cos(120^\circ + 60^\circ) + \cos(120^\circ - A)$
 $= \cos 180^\circ + \cos 60^\circ = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

option C থেকে $-\cos A = -\cos 60 = -\frac{1}{2}$

08. $\cos^2(\pi/6) + \cos^2(2\pi/3) = ?$

[DU-7Clg. 2018-19]

- A. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. 2 D. 1

Explanation $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$

09. $\cos 2\theta = \frac{24}{25}$ হলে, $\tan\theta$ এর মান কোনটি?

[DU-7Clg. 2017-18]

- A. ± 7 B. $\pm \frac{7}{5}$ C. $\pm \frac{5}{7}$ D. $\pm \frac{1}{7}$

Explanation $\cos 2\theta = \frac{24}{25}$, $\frac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta} = \frac{24}{25}$

$$25 - 25\tan^2\theta = 24 + 24\tan^2\theta$$

$$\Rightarrow 49\tan^2\theta = 1; \tan\theta = \pm \frac{1}{7}$$

10. ΔABC এর বাহুগুলো 3, 4 ও 5 একক হলে, $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C =$ কত?

[DU-7Clg. 2017-18]

- A. -1 B. 1 C. 0 D. $1/2$

Explanation ΔABC এর বাহুগুলো 3, 4, 5 একক

$$\therefore 3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$\therefore \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$$

IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. $\cos^2(60^\circ + A) + \cos^2(60^\circ - A)$ এর মান-

- A. $1 - \frac{1}{2} \cos 2A$ B. $1 + \sin 2A$ C. $1 + 3\cos 2A$ D. $1 + \frac{1}{2} \cos 2A$

Explanation $\cos^2(60^\circ + A) + \cos^2(60^\circ - A)$

$A = 30^\circ$ ধরে $\cos^2(60^\circ + 30^\circ) + \cos^2(60^\circ - 30^\circ)$

$$\Rightarrow \cos^2(90^\circ) + \cos^2(30^\circ) \Rightarrow 0 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$\text{option} \rightarrow A \text{ তে } 1 - \frac{1}{2} \cos(2 \times 30^\circ) = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\text{option} \rightarrow B \text{ তে } 1 + \sin 2A = 1 + \sin(2 \times 30^\circ) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{option} \rightarrow C \text{ তে } 1 + 2\cos 2A = 1 + 3\cos(2 \times 30^\circ) = 1 + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\text{option} \rightarrow D \text{ তে } 1 + \frac{1}{2} \cos 2A = 1 + \frac{1}{2} \cos(2 \times 30^\circ) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

02. $A + B = \frac{\pi}{2}$ হলে $\cos^2 A - \cos^2 B$ এর মান-

- A. $\sin(A - B)$ B. $\sin(B - A)$ C. $\cos(B - A)$ D. $-\cos(A - B)$

Explanation $\cos^2 A - \cos^2 B = 1 - \sin^2 A - 1 + \sin^2 B$

$$= \sin^2 B - \sin^2 A = \sin(B + A) \cdot \sin(B - A)$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin(B - A) = 1 \cdot \sin(B - A) = \sin(B - A) \text{ Ans.}$$

03. $\sin(A - 30^\circ) + \sin(150^\circ + A)$ এর মান-

- A. $-\frac{1}{2} \cos A$ B. 0 C. $\cos A$ D. $\sin A$

Explanation $\sin(A - 30^\circ) + \sin(150^\circ + A)$

$$= 2 \sin \frac{150^\circ + A + A - 30^\circ}{2} \cos \frac{150^\circ + A - A + 30^\circ}{2}$$

$$= 2 \sin(60^\circ + A) \cos 90^\circ = 0$$

04. যদি $9\theta = \pi$ হয়, তবে $\cos\theta \cos 2\theta \cos 4\theta$ এর মান-

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{8}$ C. 8 D. 9

Explanation $\cos\theta \cos 2\theta \cos 4\theta = \frac{1}{2\sin\theta} (2\sin\theta \cos\theta) \cos 2\theta$

$$\cos 4\theta = \frac{1}{2.2\sin\theta} 2\sin 2\theta \cos 2\theta \cos 4\theta = \frac{1}{4\sin\theta} \sin 4\theta \cos 4\theta$$

$$= \frac{1}{8\sin\theta} \sin 8\theta = \frac{\sin(9\theta - \theta)}{8\sin\theta} = \frac{\sin(\pi - \theta)}{8\sin\theta} = \frac{\sin\theta}{8\sin\theta} = \frac{1}{8}$$

05. ΔABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ হলে $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = ?$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 0 D. -1

Explanation $A = 90^\circ$, $B = 60^\circ$ এবং $C = 30^\circ$ ধরলে

প্রদত্ত রাশিটির মান দাঁড়ায়, $\cos^2(90^\circ) + \cos^2(60^\circ) + \cos^2(30^\circ)$

$$= 0 + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

অধ্যায় ০৮

ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

(FUNCTIONS & GRAPHS OF FUNCTIONS)

কি পড়বে? কেন পড়বে?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়বে? কিসে পড়বে?

ক্রমিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	ফাংশনের মান নির্ণয়	★
02	ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয়	★★★
03	বিপরীত ফাংশন নির্ণয়	★★★

টপিক আনোচনা

FORMULA ডোমেন, রেঞ্জ এবং ফাংশন সংক্রান্ত:

- ডোমেন: প্রদত্ত শর্তানুযায়ী x এর গ্রহণযোগ্য বাস্তব মানের সেট।
- রেঞ্জ: x এর গ্রহণযোগ্য বাস্তব মানের জন্য প্রাপ্ত y এর গ্রহণযোগ্য বাস্তব মানের সেট।
- এক এক ফাংশন: A সেটের একটি উপাদানের সাথে B সেটের কেবল একটি উপাদানের সম্পর্ক।
- Note: x এর power বিজোড় হলে এক এক, x এর power জোড় হলে এক এক নয়।
- সার্বিক ফাংশন: A সেটের সবগুলো উপাদানের সাথে B সেটের সবগুলো উপাদানের কোন না কোন ভাবে সম্পর্ক থাকবে।
- Technique: ভগ্নাংশ বিশিষ্ট ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় সংক্রান্ত:
একঘাত বিশিষ্ট ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে, ডোমেন = $R - \{x \text{ এর যে মানের জন্য হর শূন্য হয়}\}$ রেঞ্জ = $R - \{\text{লবের } x \text{ এর সহগ/হরের } x \text{ এর সহগ}\}$

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সমূহের Topic	সূত্র সমূহ
ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয়	
$f(x)=ax+b$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: $D_f = R$ এর $R_f = R$
$f(x)=\frac{a}{bx+c}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: $D_f = R - \left\{-\frac{c}{b}\right\}$ এবং $R_f = R - \{0\}$
$f(x)=\frac{ax}{bx+c}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: $D_f = R - \left\{-\frac{c}{b}\right\}$ এবং $R_f = R - \left\{\frac{a}{b}\right\}$
$f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: $D_f = R - \left\{-\frac{d}{c}\right\}$ এবং $R_f = R - \left\{\frac{a}{c}\right\}$
$f(x)=\frac{x^n - a^n}{x - a}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: $D_f = R - \{a\}$ এবং $R_f = R - \{na^{n-1}\}$
$f(x)=\sqrt{x^2 - a^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন	Technique: $x \leq -a$ or $x \geq a \therefore$ রেঞ্জ $R_f = [0, \infty)$
$f(x)=\sqrt{a^2 - x^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন	Technique: $D_f - a \leq x \leq a$ বা $ x \leq a$ এবং $R_f = [0, a]$
$f(x)=\log(ax+b)$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে $\log$ এর ভেতরের রাশিটি 0 অপেক্ষা বড় হবে	Technique: ডোমেন, $ax+b > 0 \Rightarrow x > -\frac{a}{b}$ এবং রেঞ্জ $R_f = R$
$f(x)=e^x$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: $D_f = (-\infty, \infty)$ এবং $R_f = (0, \infty)$
লব দ্বিঘাত ও হর এক ঘাত বিশিষ্ট $f(x)=\frac{ax^2+b}{cx+d}$ ফাংশনের ক্ষেত্রে	Technique: রেঞ্জ = $R - \{2 \times x \text{ এর যে মানের জন্য হর শূন্য হয়}\}$
বর্গমূল যুক্ত ফাংশনের $f(x)=\sqrt{ax+b}$ ক্ষেত্রে	Technique: ডোমেন $= ax+b \geq 0$ ধরে প্রাপ্ত x এর মান, রেঞ্জ = $[0, \infty)$
বিপরীত ফাংশন নির্ণয় সংক্রান্ত	
যদি $f(x)=ax+c$ হয় তবে $f^{-1}(x)=\frac{x-c}{a}$	যদি $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ হয় তবে, $f^{-1}(x)=\frac{-dx+b}{cx-a}$
$f(x)=ax^n+c$ হলে $f^{-1}(x)=\sqrt[n]{\frac{x-c}{a}}$	যদি $f(x)=\frac{a}{bx-c}$ হয় তবে, $f^{-1}(x)=\frac{a+cx}{bx}$
$f(x)=ax^2+c$ হলে $f^{-1}(x)=\frac{\sqrt{x-c}}{\sqrt{a}}$	
সংযোজিত ফাংশন	$\text{fog}(x) = f(g(x)); \text{gof}(x) = g(f(x))$



অধ্যায়

০৯

অন্তরীকরণ (DIFFERENTIATION)



কি পড়বে? কেন পড়বে?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়বে? কিভাবে পড়বে?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিক্স থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে]
01	লব/হ্রস্ব আকৃতির ফাংশন সংক্রান্ত	★
02	'√' ফাংশন সংক্রান্ত	★★★
03	Logarithmic ও Exponential ফাংশন সংক্রান্ত সমস্যা	★★
04	Exponential Form সংক্রান্ত সমস্যাবলী	★★
05	ফাংশনের বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা (Continuity & Discontinuity of Function)	★★★
06	লগারিথম সম্পর্কিত	★★
07	পারামিট্রিক ফাংশন [Parametric Function]	★★
08	ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশনের ক্ষেত্রে অন্তরীকরণ	★
09	স্পর্শক ও অভিলম্বের ঢাল ও সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	★★



টপিক আনোচনা

Important Formula of Limit:

$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$	$\odot \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$
$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin^{-1} x} = 1$	$\odot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$	$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan^{-1} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x}{x} = 1$	$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$
$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\odot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 \pm x)^n - 1}{x} = \pm n$
$\odot \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$	

FINIX EXCLUSIVE: অভিন্ন টেকনিক (SHORTCUT SOLUTION):

FINIX SHORTCUT TRICKS & TIPS	MODEL EXAMPLE
01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{7x}$ এর মান $\frac{4}{7}$
02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{5x}$ এর মান $\frac{3}{5}$
03. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} ax}{bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{5x}$ এর মান $\frac{3}{5}$
04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{\sin 2x} = \frac{5}{2}$
05. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} ax}{bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}(2x)}{x} = 2$
06. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x} = \frac{3}{5}$
07. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2} = \frac{b^2 - a^2}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 3x}{x^2} = \frac{3^2 - 2^2}{2} = \frac{5}{2}$
08. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax - \sin bx}{\sin cx - \sin dx} = \frac{a - b}{c - d}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x - \sin 3x}{\sin 5x - \sin 2x} = \frac{8 - 3}{5 - 2} = \frac{5}{3}$
09. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{\cos cx - \cos dx} = \frac{a^2 - b^2}{c^2 - d^2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x} = \frac{9^2 - 7^2}{5^2 - 3^2} = \frac{32}{13} = \frac{1}{13}$

FINIX SHORTCUT TRICKS & TIPS

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos bx} = \frac{a^2}{b^2}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{bx^2} = \frac{a^2}{2b}$$

MODEL EXAMPLE

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{1 - \cos 3x} = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{3x^2} = \frac{7^2}{2 \cdot 3} = \frac{49}{6}$$

অধ্যায়ের শুরুত্বপূর্ণ সূত্র সমূহের Topic

বীজগণিতীয় অসীম লিমিট $x \rightarrow \infty$ হলে

সূত্র সমূহ

ভগ্নাংশের লবের সর্বোচ্চ Power < হরের সর্বোচ্চ Power. Ans: 0

ভগ্নাংশের লবের সর্বোচ্চ Power > হরের সর্বোচ্চ Power. Ans: ∞

ভগ্নাংশের হর এবং লবের সর্বোচ্চ Power সমান হলে

Ans: $\frac{\text{লবের সর্বোচ্চ Power যুক্ত } x \text{ এর সহগ}}{\text{হরের সর্বোচ্চ Power যুক্ত } x \text{ এর সহগ}}$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ এই আকারে থাকলেAns: a^x এর সহগের অনুপাত

বর্গমূল সংক্রান্ত ফাংশন

 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+x} - \sqrt{a-x}}{x}$ এই আকারের প্রশ্নেরAns: $\frac{1}{\sqrt{a}}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{c+dx}}{x}$ এই আকারের প্রশ্নেরAns: $\frac{b-d}{2\sqrt{a}}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{c-dx}}{x}$ এই আকারের প্রশ্নেরAns: $\frac{b+d}{2\sqrt{a}}$

বাইনোমিয়াল আকার সংক্রান্ত

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{b}{x}} = e^{ax \cdot \frac{b}{x}} = e^{ab}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{x}{a} \times bx} = e^{ab}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$$
 আকারে থাকলে

Ans: na^{n-1} হয়।

La Hospital' Rule

 $x \rightarrow \infty$ ছাড়া অন্য কিছু যেমন $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow 2$, $x \rightarrow \pi$ ইত্যাদি হলে শুরুতেই limit বসিয়ে দিতে হবে যেই মান পাওয়া যাবে তাই Ans.Example: $\lim_{x \rightarrow 0} (\sec x)^x = ?$ Ans: 1 x এর পরিবর্তে limit বসিয়ে সাধারণত $\frac{0}{0}$ বা $\frac{\infty}{\infty}$ এই আকৃতি আসে। এসব ক্ষেত্রে La'Hospital' Rule Apply করতে হবে।La' Hospital' Rule: লব ও হরকে x এর সাপেক্ষে Differentiate করতে হবে। অতঃপর x এর মান বসিয়ে $\frac{0}{0}$ বা $\frac{\infty}{\infty}$ আকৃতি Remove হলে যে মান পাওয়া যায় তাই Ans.Note: মান বসিয়ে $\frac{0}{0}$ বা $\frac{\infty}{\infty}$ আকৃতি Remove না হওয়া পর্যন্ত লব ও হরকে Differentiate করতে হবে।

Required Formulas for Differentiation

$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{d}{dx}(c) = 0$
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$\frac{d}{dx}(\log_e x)$ or, $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$	$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log_e a = a^x \ln a$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$
$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$	$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{d}{dx}(U \pm V) = \frac{dU}{dx} \pm \frac{dV}{dx}$	$\frac{d}{dx}(UV) = U \frac{dV}{dx} + V \frac{dU}{dx}$	$\frac{d}{dx}(UVW) = VW \frac{dU}{dx} + UW \frac{dV}{dx} + UV \frac{dW}{dx}$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{U}{V}\right) = \frac{V \frac{dU}{dx} - U \frac{dV}{dx}}{V^2}$

(Constant)^{function} এই ধরনের Problem	i. (Constant)^{function} এই ধরনের Problem Solve করার জন্য $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x / \ln a$ এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে। ii. (Exponential)^{function} এই ধরনের Problem Solve করার জন্য $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে। iii. (Function)^{Constant} এই ধরনের Problem Solve করার জন্য $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে। Note: যেকোনো ধরনের অন্তরীকরণ করতে গেলে প্রথমে প্রশ্নের x এর জায়গায় যা থাকবে তাকে x ধরে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। তারপর যাকে x ধরা হলো তার অন্তরীকরণ করতে হবে। সবশেষে দুই অন্তরীকরণ গুণ করতে হবে।
$\{f(x)\}^{g(x)}$ আকারের Problem	i. $Y = \{f(x)\}^{g(x)}$ এই আকারের Problem Solve করতে হবে, $\frac{d}{dx}\{f(x)\}^{g(x)} = \{f(x)\}^{g(x)} \frac{d}{dx}\{g(x) \ln(f(x))\}$ সূত্রের সাহায্যে ii. $\{f(x)\}^{g(x)}$ এই আকারের Problem উভয় পক্ষে $\ln$ নিয়েও Solve করা যায়।
অব্যক্ত ফাংশন [Implicit Function]	Implicit function চেনার উপায়: (সমীকরণ আকারে থাকবে এবং সমীকরণের একই পাশে একাধিক চলক বিদ্যমান থাকবে)। Technique: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x \text{ এর সাপেক্ষে Differentiate } (Y \rightarrow \text{constant})}{y \text{ এর সাপেক্ষে Differentiate } (X \rightarrow \text{constant})}$
পরামিতিক ফাংশন	Parametric Function চেনার উপায়: x ও y এর মান তৃতীয় অন্য একটি চলকের মাধ্যমে দেয়া থাকবে এবং তৃতীয় চলকটিকে বলে পরামিতি। Technique: $\frac{dy}{dx} = \frac{\text{পরামিতির সাপেক্ষে } y \text{ এর diff}}{\text{পরামিতির সাপেক্ষে } x \text{ এর diff}} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$ [θ পরামিতি]
চরম মান বা সন্ধি মান (গুরুমান ও লঘু মান)	Step-1: দেওয়া ফাংশনটিকে $y = f(x)$ ধরতে হবে। Step-2: $f'(x)$ এবং $f''(x)$ নির্ণয় করতে হবে। Step-3: $f'(x) = 0$ ধরে x এর মান (ধরি x এর মানগুলি a, b, c ইত্যাদি) নির্ণয় করতে হবে। Step-4: $x = a$ এর জন্য $f''(a)$ বের করতে হবে। যদি $f''(a) > 0$ হয় তবে $x = a$ এর জন্য $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান বা লঘুমান থাকবে এক। যদি $f''(a) < 0$ হয় তবে $x = a$ এর জন্য $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান বা গুরুমান থাকবে। Step-5: অনুরূপভাবে $x = b, c$ ইত্যাদির জন্য চরম মান নির্ণয় করতে হবে। Note: (i) $f'(x)$ ফাংশনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান থাকবে যদি $f'(x) = 0$ হয়। (ii) $f''(x) = 0$ হলে ফাংশনের কোন চরমমান থাকবে না। $f''(a) = 0$ হলে পরবর্তী পর্যায়ে অন্তরক সহগ নির্ণয় করে ফাংশনের চরম মান নির্ণয় করা যায়। (iii) কোনো বিন্দুতে ফাংশনের সর্বোচ্চ মান অপর একটি বিন্দুর সর্বনিম্ন মান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হতে পারে।

■ $y = f(x)$ একটি ফাংশন হলে অন্তরীকরণের বিভিন্ন আকার: $y_1 = \frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{d}{dx} \{f(x)\}$

■ $y = f(x)$ এর ১ম অন্তরীকরণ, $y_1 = \frac{dy}{dx} = f'(x)$; ২য় অন্তরীকরণ, $y_2 = \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x)$; ৩য় অন্তরীকরণ, $y_3 = \frac{d^3y}{dx^3} = f'''(x)$; n তম অন্তরীকরণ, $y_n = \frac{d^n y}{dx^n} = f^n(x)$

$y = x^n$ হলে $y_n = n!$ $y_m = 0$ [$m > n$] $y_m = {}^n p_m x^{n-m}$ [$m < n$]	$y = x^4$ $y_1 = 4x^3 = {}^4 p_1 x^{4-1}$ $y_2 = 4.3x^2 = {}^4 p_2 x^{4-2}$ $y_3 = 4.3.2.x = {}^4 p_3 x^{4-3}$ $y_4 = 4.3.2.1 = {}^4 p_4 x^{4-4} = 4!$ $y_5 = 0$ [$5 > 4$]	$y = \sin x$ $y_1 = \cos x$ $y_2 = -\sin x$ $y_3 = -\cos x$ $y_4 = \sin x = y$ অর্থাৎ প্রতি $4n$ তম অন্তরকের পর পুনরাবৃত্তি হয়	$y = \cos x$ $y_1 = -\sin x$ $y_2 = -\cos x$ $y_3 = \sin x$ $y_4 = \cos x = y$ অর্থাৎ প্রতি $4n$ তম অন্তরকের পর পুনরাবৃত্তি ঘটে
$y = (ax + b)^n$ $y_n = n! \times a^n$ $y_m = 0$ [$m > n$] $y_m = {}^n p_m (ax + b)^{n-m} \times a^m$ [$m < n$]	$y = \frac{1}{x}$ এর n তম অন্তরক $= \frac{(-1)^n \cdot n!}{x^{n+1}}$ $y = \frac{1}{x+a}$ এর n তম অন্তরক $= \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+a)^{n+1}}$	$y = e^{mx}$ $y_1 = m \cdot e^{mx}$ $y_2 = m^2 \cdot e^{mx}$ $y_3 = m^3 \cdot e^{mx}$ $y_n = m^n \cdot e^{mx}$	$y = a^x$ $y_1 = a^x \ln a$ $y_2 = a^x (\ln a)^2$ $y_3 = a^x (\ln a)^3$ $y_n = a^x (\ln a)^n$
$y = \sin(ax+b)$ এর n তম অন্তরক, $y_n = a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$	$y = \cos(ax+b)$ এর n তম অন্তরক, $y_n = a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$		

ME01 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} =$ এর মান কত?

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ [using L' Hospital Rule]

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{\cos 0}{2} = \frac{1}{2}$ [Again using L' Hospital Rule]

ME02 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x + 1} = ?$

Solve $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{1}{1} = 1$

ME03 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sec(x+h) - \sec x}{h}$ এর মান কত?

Solve $\frac{0}{0}$ form; তাই L' Hospital প্রয়োগ করে পাই,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sec(x+h) - \sec x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sec(x+h) \tan(x+h)}{1} = \sec x \tan x$

ME04 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$ এর মান কত?

Solve Use: Hospital Rule : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1+0} = \frac{1}{1}$

ME05 $y = \sqrt{\sin 2x}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত?

Solve $\frac{d}{dx} \sqrt{\sin 2x} = \frac{1}{2\sqrt{\sin 2x}} \cdot \frac{d}{dx} \sin 2x = \frac{\cos 2x}{\sqrt{\sin 2x}}$

ME06 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$ এর সমান কোনটি?

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} a^x \ln a = \ln a$ [La Hospitals Law] = $\ln a$

ME07 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2x}}{\ln(1-x)}$ এর মান কত?

Solve Use: Hospital Rule: $\frac{-2e^{2x}}{\frac{1}{1-x} \times 1} \Rightarrow \frac{(1-0) \times -2e^0}{-1} = 2$

ME08 5^x এর অন্তরক সহগ কত?

Solve আগে একটা সূত্র জেনে রাখ, $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

সেই আলোকে, $\frac{d}{dx}(5^x) = 5^x \ln 5$

ME09 $y = \ln x$ হলে y_n এর মান কত?

Solve $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{x^n}$

ME10 $y = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ বক্র রেখাটির $x = 2$ বিন্দুতে ঢালের মান কোনটি?

Solve $y = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$; $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4x + 4 = 3 \times 2^2 - 4 \times 2 + 4 = 8$

ME11 $y = \sec x^\circ$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান হবে-

Solve $y = \sec x^\circ = \sec \frac{x\pi}{180}$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \left(\sec \frac{x\pi}{180} \tan \frac{x\pi}{180} \right) \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{180} \sec x^\circ \tan x^\circ$

ME12 $y = x^2 \log x$ হলে $\frac{d^3 y}{dx^3}$ এর মান কত?

Solve $y_1 = 2x \log x + x$, $y_2 = 2 \log x + 2 + 1$ $\therefore y_3 = \frac{2}{x}$

ME13 $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} \right)$ এর সমান কোনটি?

Solve $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x}} = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}} = 1$
 $\therefore \frac{d}{dx}(1) = 0$

ME14 $x = \sin y$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি?

Solve $x = \sin y \Rightarrow y = \sin^{-1} x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

ME15 $y = x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}$ হলে $3(y^2 - 1) \frac{dy}{dx}$ সমান-

Solve $y^3 = x + \frac{1}{x} + 3 \left(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} \right) = x + \frac{1}{x} + 3y$
 $\Rightarrow y^3 - 3y = x + \frac{1}{x} \therefore 3 \frac{dy}{dx} (y^2 - 1) = 1 - \frac{1}{x^2}$

ME16 $\frac{d}{dx} (x^n + a^n) =$ কত?

Solve $\frac{d}{dx} (x^n + a^n) = nx^{n-1}$ [a ধ্রুবক]

ME17 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{b}{x} \right)^{\frac{x}{a}}$ এর মান কত?

Solve $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{b}{x} \right)^{\frac{x}{a}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{b}{x} \right)^{\frac{x}{b} \cdot \frac{b}{a}} = e^{\frac{b}{a}} = e$

ME18 $\frac{d}{dx} (\ln \sqrt{x})$ এর মান কত?

Solve $\frac{d}{dx} (\ln \sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2x}$

ME19 যদি $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots}}}$ হয় তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান-

Solve $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots}}} \Rightarrow y^2 = x + y$
 $\therefore 2y \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y-1}$

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x^2 + x} = ?$

[DU-7Clg. 2023-24]

- A. 1 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. -2

(B) Explanation $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x^2 + x} ; \left[\frac{0}{0} \text{ form} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x}{4x + 1}$ [L' hospital Rule]

$= \frac{2 \cos 0}{0 + 1} = 2$

02. যদি $e^{xy+1} = 5$ হয় তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত?

[DU-7Clg: 2023-24]

- A. $\frac{\ln 5}{xy}$ B. $-\frac{\ln 5}{xy}$ C. $-\frac{y}{x}$ D. $\frac{\ln 5}{x}$

Explanation $e^{xy+1} = 5 \Rightarrow \ln e^{xy+1} = \ln 5 \Rightarrow xy + 1 - \ln 5 = 0$
 $\therefore$ অন্তরীকরণ করে, $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

03. x এর সাপেক্ষে $\log_{10} x$ এর অন্তরক সহগ হলো—

[DU-7Clg: 2023-24]

- A. $\frac{1}{x}$ B. $\log_{10} e$ C. $\frac{\log_{10} e}{10}$ D. $\frac{1}{x} \log_{10} e$

Explanation $\frac{d}{dx} (\log_{10} x) = \frac{1}{x \ln 10} = \frac{1}{x \log_e 10} = \frac{1}{x} \log_{10} e$

04. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x + 1}{2x^2 - 1} = ?$

[DU-7Clg: 2023-24]

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. ∞

Explanation $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x + 1}{2x^2 - 1} = \frac{\text{লবের সর্বোচ্চ ঘাতবিশিষ্ট চলকের সহগ}}{\text{হরের সর্বোচ্চ ঘাতবিশিষ্ট চলকের সহগ}} = \frac{3}{2}$

05. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 6x}{2x^2 + 5} = ?$

[DU-7Clg: 2022-23]

- A. 0 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

Explanation $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 6x}{2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(1 + \frac{6}{x})}{x^2(2 + \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{6}{x}}{2 + \frac{5}{x^2}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}$

06. x এর কোন মানের জন্য $y = x + \frac{1}{x}$ এর ঢাল শূন্য হবে?

[DU-7Clg: 2022-23]

- A. ± 2 B. 1 C. ± 1 D. ± 3

Explanation $y = x + \frac{1}{x} = x + x^{-1}$ প্রশ্নমতে, ঢাল $\frac{dy}{dx} = 0$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

07. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \ln e$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$

[DU-7Clg: 2022-23]

- A. $-\sqrt{\frac{y}{x}}$ B. $-\sqrt{\frac{x}{y}}$ C. $\sqrt{\frac{y}{x}}$ D. $\frac{x}{y}$

Explanation $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \ln e = 1 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = 0$
 $\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\sqrt{\frac{y}{x}}$

Finix Special: $x^n + y^n = a^n$ হলে, $\frac{dy}{dx} = -\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$

08. $x^2 + x + 2 = 0$ এর মূলদ্বয় α এবং β হলে $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = ?$

[DU-7Clg: 2022-23]

- A. -2 B. -1 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Explanation $x^2 + x + 2 = 0$ এর মূলদ্বয় α, β হলে, $a = 1, b = 1$ ও $c = 2$

$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -1$ এবং $\alpha\beta = \frac{c}{a} = 2 \therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}$

09. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কত?

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. $(-2, 2)$ B. $(-2, 0)$ C. $[0, 2]$ D. $[0, \infty]$

Explanation $\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{2^2 - x^2}$

$\{\sqrt{x^2 - a^2}$ এর জন্য রেঞ্জ $R_f = [0, a]\}$ $\therefore R_f = [0, 2]$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin x}{\sin 6x} = ?$

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. $\frac{7}{6}$ B. $-\frac{7}{6}$ C. 1 D. -1

Explanation [Using L'Hospital Rule]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin x}{\sin 6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \cos 7x - \cos x}{6 \cos 6x} = \frac{7 \cdot 1 - 1}{6 \cdot 1} = 1$

11. কোন শর্তে $y = f(x)$ ফাংশনটি কোন একটি ব্যবধিতে ক্রমহাসমান হবে?

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. $\frac{dy}{dx} < 0$ B. $\frac{dy}{dx} > 0$ C. $\frac{dy}{dx} = 0$ D. $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

Explanation যদি কোনো ব্যবধিতে x বৃদ্ধির সাথে $f(x)$ ফাংশনের মান হ্রাস পায় অর্থাৎ $f'(x) < 0$ হয় তবে তাকে ক্রমহাসমান ফাংশন বলে।

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \sin \frac{x}{7}}{x} = ?$

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. 0 B. $\frac{1}{7}$ C. 1 D. 7

Explanation $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \sin \frac{x}{7}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{7}}{\frac{x}{7}} = 1$

13. $\frac{d}{dx} (\log_e x) = ?$

[DU-7Clg: 2021-22]

- A. $\frac{\log_e x}{x}$ B. $\frac{1}{x \ln x}$ C. $-\frac{\ln x}{x}$ D. $-\frac{1}{x (\ln x)^2}$

Explanation ধরি, $y = \log_e x = \frac{1}{\log_e x} = \frac{1}{\ln x}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{-1}{x (\ln x)^2}$

14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ এর মান কত?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. -e B. $1/e$ C. $2/e$ D. e

Explanation $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ (সূত্রানুসারে)

15. $x < 0$ এর কোন মানের জন্য $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ফাংশনটি সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন হবে?

[DU-7Clg: 2020-21]

- A. -5 B. -1 C. 0 D. 2

Explanation $f(x) = x + \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{2}{x^3}$

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের জন্য, $f(x) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \therefore x = \pm 1$

$\therefore x = 1$ হলে, $f''(1) = 2 \geq 0 \therefore x = 1$ বিন্দুতে লঘু মান হবে।

$\therefore x = -1$ হলে, $f''(-1) = -2 < 0 \therefore x = -1$ বিন্দুতে গুরুমান হবে।

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 6x}{2x^2 + 5}$ এর মান কত?

[DU-7Clg: 2019-20]

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

Explanation $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 6x}{2x^2 + 5}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{6}{x}\right)}{x^2 \left(2 + \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}$

Finix SUPER TRICKS:

$x \rightarrow \infty$ হলে এবং লব ও হরের সর্বোচ্চ Power সমান হলে

Ans : সর্বোচ্চ ঘাতযুক্ত x এর সহগের

অনুপাত $\therefore \frac{1}{2}$

17. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের মূলবিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত?

[DU-7Clg. 2019-20]
A. -1 B. 1 C. ∞ D. 0

Explanation $y^2 = 4x \Rightarrow y = 2\sqrt{x} = 2x^{\frac{1}{2}}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \therefore \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(0,0)} = \frac{1}{0} = \infty$

18. $\frac{d}{dx} \{\cos^{-1}(\sin x)\}$ নিচের কোনটি?

[DU-7Clg. 2019-20]
A. -1 B. 1 C. x D. $\frac{1}{x}$

Explanation $\frac{d}{dx} \{\cos^{-1}(\sin x)\}$
 $= \frac{d}{dx} \left\{ \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}(\sin x) \right\} = \frac{d}{dx} \left\{ \frac{\pi}{2} - x \right\} = 0 - 1 = -1$

19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{4x+1} = ?$

[DU-7Clg. 2018-19]
A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

Explanation $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{4x+1} = \frac{1}{2}$

20. $y = \sqrt{x}$ বক্ররেখার উপর $x = 4$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল [DU-7Clg. 2018-19]

A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

Explanation $y = \sqrt{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$x = 4$ বিন্দুতে $\left[\frac{dy}{dx}\right] = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$

21. $x = 2$ বিন্দুতে $y = x^3 - 5x^2 + 6$ এর ঢাল হবে? [DU-7Clg. 2017-18]

A. -6 B. -7 C. -8 D. -9

Explanation $y = x^3 - 5x^2 + 6$

$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 10x$; $x = 2$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = 3 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 = -8$

22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x}}{1 + \cos(2x)} = ?$

[DU-7Clg. 2017-18]
A. $\frac{e}{2}$ B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

Explanation $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x}}{1 + \cos(2x)} = \frac{e^{\tan 0}}{1 + \cos 0} = \frac{e^0}{1+1} = \frac{1}{2}$

IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{-x}$ এর মান হলো-

A. 1 B. -1 C. ∞ D. ∞

Explanation $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{-x}$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x\sqrt{1+\frac{2}{x}}}{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{2}{x}}}{-1} = -\sqrt{1} = -1$

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\tan^{-1}(3x)} = ?$

A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. 1 D. 3

Explanation $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\tan^{-1}(3x)} = \frac{1}{3}$

03. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3x+5}{3x^2+5x-6}$ এর মান-

A. $\frac{3}{5}$ B. $-\frac{5}{6}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$

Explanation $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3x+5}{3x^2+5x-6} = \frac{2}{3}$ [সর্বোচ্চ ঘাতযুক্ত x এর সহগের অনুপাত]

04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x}}{\cos x}$ এর মান-

A. e B. 1 C. $\frac{1}{e}$ D. 0

Explanation $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x}}{\cos x} = \frac{e^1}{1} = e$

05. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin x}{\sin 6x} = ?$

A. $\frac{7}{6}$ B. $-\frac{7}{6}$ C. 1 D. -1

Explanation [Using L'Hopital Rule]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin x}{\sin 6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \cos 7x - \cos x}{6 \cos 6x} = \frac{7 \cdot 1 - 1}{6 \cdot 1} = 1$

06. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = ?$

A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

Explanation $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \left[\text{Form: } \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x}$

[Using L'Hopital Rule] $\left[\text{Form: } \frac{0}{0} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{2} \left[\text{Using L'Hopital Rule} \right] = -\frac{1}{2}$

07. $f(x) = 1+x^3$ বক্ররেখাটির সাথে x -অক্ষের ছেদবিন্দুর সংখ্যা-

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Explanation $y = f(x) = 1+x^3$ বক্ররেখাকে ছেদ করলে, $1+x^3 = 0$
 $\Rightarrow x^3 = -1 \therefore x = -1, \omega, \omega^2$
 $\therefore$ বাস্তবমান একটি তাই ছেদবিন্দুও একটি।

08. $(4, 3)$ বিন্দুতে $3x^2 - 4y^2 = 12$ অধিবৃত্তের স্পর্শকের ঢালের মান-

A. -1 B. 1 C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{3}$

Explanation $\frac{dy}{dx} = \frac{6x}{8y} = \frac{3x}{4y} \therefore (4, 3)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল $= \frac{3 \cdot 4}{4 \cdot 3} = 1$

09. $x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5$ এর লঘিষ্ঠ মান-

A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

Explanation ধরি, $y = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5 \therefore \frac{dy}{dx} = 4x^3 - 12x^2 + 8x$

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মানের জন্য, $\frac{dy}{dx} = 0$

$\Rightarrow 4x^3 - 12x^2 + 8x = 0 \Rightarrow 4x(x^2 - 3x + 2) = 0 \Rightarrow x = 0, 1, 2$

আবার, $\frac{d^2y}{dx^2} = 12x^2 - 24x + 8$

$\therefore x = 1$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} = -4 < 0$; $\therefore x = 1$ হলে ফাংশনটির মান গরিষ্ঠ।

আবার, $x = 2$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} = 8 > 0 \therefore x = 2$ হলে ফাংশনটির মান লঘিষ্ঠ।

$\therefore$ ফাংশনটির লঘিষ্ঠ মান $= 2^4 - 4 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^2 + 5 = 5$

10. x কোন মানের জন্য $y = x + \frac{1}{x}$ বক্ররেখাটির ঢাল শূন্য হবে?

- A. $\pm 3/2$ B. ± 2 C. 1 D. ± 1

① Explanation দেওয়া আছে, $y = x + \frac{1}{x} \therefore \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

প্রশ্নমতে, $\frac{dy}{dx} = 0$ বা, $\frac{x^2 - 1}{x^2} = 0$ বা, $x^2 = 1$ বা, $x = \pm 1$

11. k -এর কোন মানের জন্য $y = kx(1-x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে?

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

① Explanation $y = ax - ax^2$

$\therefore \frac{dy}{dx} = a - 2ax$ এখন, মূলবিন্দু $(0, 0)$ তে $\frac{dy}{dx} = a - 2a \cdot 0 = a$

$\therefore$ মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে,

$\therefore \frac{dy}{dx} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

12. a -এর যে মানের জন্য $y = ax(1-x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে-

- A. $\sqrt{3}$ B. $1/\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}/2$ D. 1

① Explanation $y = ax - ax^2$

$\therefore \frac{dy}{dx} = a - 2ax$ এখন, মূলবিন্দু $(0, 0)$ তে $\frac{dy}{dx} = a - 2a \cdot 0 = a$

$\therefore$ মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে,

$\therefore \frac{dy}{dx} = \tan 60^\circ = \sqrt{3} \therefore a = \sqrt{3}$

PRIME TEST

01. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x}{5x^2 + 2} = ?$

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. 0

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}(2x)}{x}$ এর মান-

- A. 1 B. 0 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

03. $\lim_{x \rightarrow y} \frac{\sin x - \sin y}{x - y} = ?$

- A. $\sec y$ B. $\sec^2 y$ C. $\cos^2 y$ D. $\cos y$

04. যদি $y = e^{e^x}$ হয় তবে $\frac{dy}{dx} =$ কত?

- A. $e^{e^x} \cdot e^x$ B. $e^x \cdot \log x$ C. $e^{e^x} \cdot \log x$ D. $\log e^{e^x}$

05. $y = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$

- A. $2 \sin 2x$ B. 0 C. 1 D. $\cos 2x$

06. $y = \sqrt{\sec x}$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

- A. $\frac{y}{4} \tan x$ B. $\frac{y}{2} \tan x$ C. $\frac{y^2}{2} \tan x$ D. $\frac{y}{2} \tan^2 x$

07. যদি $x^2 - 2xy + 2y^2 = 1$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx} = ?$

- A. $\frac{x+4y}{2x}$ B. $\frac{x-2y}{x+2y}$ C. $\frac{x-y}{x-2y}$ D. $\frac{x-2y}{4y}$

08. যদি $x = \sin \theta$, $y = \cos \theta$ হয় তবে নিচের কোনটি সত্য?

- A. $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ B. $\frac{dy}{dx} = \tan \theta$ C. $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$ D. $\frac{dy}{dx} = -\cot \theta$

09. একটি ট্রেন t সেকেন্ডে $5t + \frac{1}{2}t^2$ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করে। 2 সেকেন্ড ট্রেনটির বেগ কত হবে?

- A. 15 ft/s B. 7 ft/s C. 12 ft/s D. 10 ft/s

10. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ সীমার মধ্যে $y = 1 + 2\sin x + 2\cos^2 x$ এর মান x এর কোন মানব্দের জন্য গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ হবে?

- A. $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}$ D. $0, \frac{\pi}{2}$

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	২৫ (A) (B) (C) (D)

ANS ANALYSIS

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	C	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x}{5x^2 + 2} = \frac{1}{5}$ [সর্বোচ্চ ঘাতযুক্ত x এর সহগের অনুপাত]
02	C	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 2x}{2x} \times 2 = 2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 2x}{2x} = 2 \times 1 = 2$
03	D	$\lim_{x \rightarrow y} \frac{\sin x - \sin y}{x - y}$; যেহেতু $x \rightarrow y$ তখন Ans. হবে $\sin y$ বা, $\cos y$
04	A	$y = e^{e^x} \Rightarrow \ln y = e^x \ln e = e^x \therefore \frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx} e^x \Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = e^x \therefore \frac{dy}{dx} = e^{e^x} \cdot e^x$
05	B	ধরি, $y = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} = 1 \therefore \frac{dy}{dx} = 0$
06	B	$y = \sqrt{\sec x}$ $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sec x}} \cdot \sec x \tan x = \frac{\sqrt{\sec x}}{2} \tan x = \frac{y}{2} \tan x$
07	C	$x^2 - 2xy + 2y^2 = 1 \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{2x - 2y}{-2x + 4y}$ [$\therefore$ Implicit function] $= -\frac{2(x-y)}{-2(x-2y)} = \frac{x-y}{x-2y}$
08	A	$x = \sin \theta$, $y = \cos \theta \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{y}{x}$
09	B	$s = 5t + \frac{1}{2}t^2$ বা, $\frac{ds}{dt} = 5 + t \therefore v = 5 + 2$ [$t = 2$ সে.] = 7 ft/s
10	C	$y = 1 + 2\sin x + 2\cos^2 x \therefore \frac{dy}{dx} = 2\cos x - 4\sin x \cos x$ গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ মানের জন্য $\frac{dy}{dx} = 0$ $\Rightarrow 2\cos x - 4\sin x \cos x = 0 \Rightarrow 2\cos x (1 - \sin x) = 0$ $\therefore \cos x = 0$ আবার, $\sin x = \frac{1}{2}$ বা, $x = \frac{\pi}{2}$ বা, $x = \frac{\pi}{6} \therefore x = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}$

■ মুখে মুখে করার Technique:

Step-01: সুবিধাজনক অংশকে Z ধর। মনে মনে $\frac{d}{dx}$ কর।

Step-02: দেখ অংকটিতে Complete result আছে কিনা। Complete result থাকলে তা অংক হতে বাদ দাও। না থাকলে Operator এর ভেতরে-বাইরে চিহ্ন বা সংখ্যা Input Output করে Complete result বানিয়ে নাও (অবশ্যই প্রশ্নপত্রে অংকের ডাকের মধ্যেই), তারপর তা বাদ দাও।

Step-03: অতঃপর তুমি যেভাবে Integration এর প্রাথমিক সূত্র শিখেছ সেভাবে সূত্র ফেল।

TOPIC 02 নির্দিষ্ট যোগজ

■ নির্দিষ্ট যোগজ: x স্বাধীন চলক বিশিষ্ট কোন একটি ফাংশন $f(x)$ যদি $[a, b]$ ব্যবধিতে চলমান থাকে তবে ফাংশনটির নির্দিষ্ট যোগজ বলতে X ও Y অক্ষদ্বয় এবং $f(x)$ ফাংশনটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বুঝায়। $F = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ এক্ষেত্রে, b কে উর্ধ্বসীমা ও a কে নিম্নসীমা বলে।

TOPIC 03 নির্দিষ্ট যোগজ এর প্রয়োগ

■ y এর একটি ফাংশন থাকলে ক্ষেত্রফল = $\int_a^b y dx$

■ y এর দুটি ফাংশন থাকলে ক্ষেত্রফল = $\int_a^b (y_1 - y_2) dx$ [মনে রাখতে হবে a ও b হবে x এর Value]

■ বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = a^2$ দ্বারা আবদ্ধ (i) মোট ক্ষেত্রফল = πa^2 (ii) একটি চতুর্ভাগের আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{\pi a^2}{4}$

■ উপবৃত্তের সমীকরণ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ দ্বারা আবদ্ধ (যেখানে $a > b$) (i) মোট ক্ষেত্রফল = πab (ii) একটি চতুর্ভাগের আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{\pi ab}{4}$

■ $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত ও $y = mx$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{8a^2}{3m^3}$

■ দুটি পরাবৃত্তের a সমান হলে ক্ষেত্রফল = $\frac{16}{3}a^2$

গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ?$

Solve $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \int \frac{e^x dx}{1 + (e^x)^2}$

MEx 02 $\int e^{2-3x} dx$ এর মান একটি প্রবক এবং কোনটির সমষ্টির সমান?

Solve $\int e^{2-3x} dx = \frac{e^{2-3x}}{-3} = -\frac{1}{3}e^{2-3x}$

MEx 03 $\int \sin^5 x dx = ?$

Solve $\int \sin^5 x dx = \int \sin^4 x \cdot \sin x dx$
 $= \int (\sin^2 x)^2 \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx$
 $= -\int (1 - z^2)^2 dz = -\int (1 - 2z^2 + z^4) dz$
 $= -\left(z - \frac{2}{3}z^3 + \frac{z^5}{5}\right) + c = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + c$

Let,
 $\cos x = z$
 $-\sin x dx = dz$

MEx 04 $\int \frac{dx}{4+x^2}$ এর মান কোনটি?

Solve $\int \frac{dx}{4+x^2} = \int \frac{dx}{2^2+x^2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} + c$

MEx 05 $\int 4 \sin x \cos x dx$ এর মান কোনটি?

Solve $\int 2 \times 2 \sin x \cos x dx = 2 \int \sin 2x dx = -\cos x + c$

MEx 06 $\int \frac{2x}{1+x^4} dx$ এর মান কোনটি?

Solve $\int \frac{2x}{1+(x^2)^2} dx = \tan^{-1}(x^2) + c$ [সূত্র $\frac{F'}{1+(F)^2} = \tan^{-1} x$]

MEx 07 $\int \ln x dx$ এর মান হবে-

Solve $\int \ln x dx = \ln x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int dx \right\} dx$
 $= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + c$

MEx 08 $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx = ?$

Solve $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$

$\Rightarrow \frac{1}{12} \int_1^4 \sqrt{z} dz \Rightarrow \frac{1}{12} \left[\frac{z^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^4$
 $\Rightarrow \frac{1}{12} \times \frac{2}{3} \left[4^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{7}{18}$

$\therefore 1+3x^4 = z$
 $\therefore 12x^3 dx = dz$

x	0	1
z	1	4

MEx 09 $\int 3x^2 \cos x^3 dx$ এর মান কোনটি?

Solve $\int 3x^2 \cos x^3 dx = \int \cos z dz = \sin z + c = \sin x^3 + c$

MEx 10 $\int \sqrt{1+\sin 2x} dx$ এর মান কোনটি?

Solve $\int \sqrt{1+\sin 2x} dx = \int \sqrt{(\cos x + \sin x)^2} dx$
 $= \int \cos x dx + \int \sin x dx = \sin x - \cos x + c$

MEx 11 $\int_1^6 \frac{dx}{x^3}$ এর মান কোনটি?

Solve $\int_1^6 \frac{dx}{x^3} = \left[\frac{x^{-3+1}}{-3+1} \right]_1^6 = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{x^2} \right]_1^6 = \frac{35}{72}$

MEx 12 $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ এর মান কোনটি?

Solve $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \left[\sin^{-1} x \right]_0^{1/2}$
 $= \sin^{-1} \frac{1}{2} - \sin^{-1} 0 = \frac{\pi}{6}$

12. $\int_0^2 |x-1| dx = ?$

[DU-7Clg: 2021-22]

A. 0

B. 1

C. 2


D. 3

(B) Explanation $\int_0^2 |x-1| dx$

$$= \left| \int_0^1 -(x-1) dx \right| + \left| \int_1^2 (x-1) dx \right|$$

$$= \left| \int_0^1 -x dx + \int_0^1 1 dx \right| + \left| \int_1^2 x dx - \int_1^2 1 dx \right|$$

$$= \left[-\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{2^2}{2} - 2 - \frac{1}{2} + 1 = 1$$



13. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ? + C$

[DU-7Clg: 2020-21]

A. $\tan^{-1}(e^{-x})$ B. $\tan(e^{-x})$ C. $\tan^{-1}(e^x)$ D. $\tan(e^x)$

(C) Explanation $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{1 + (e^x)^2} = \tan^{-1}(e^x) + C$

14. $y = \sin x, y = 0, x = 0$ এবং $x = \pi$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

[DU-7Clg: 2020-21]

A. 2 বর্গ একক

B. $\sqrt{2}$ বর্গ একক

C. 3 বর্গ একক

D. $\sqrt{3}$ বর্গ একক

(A) Explanation ক্ষেত্রফল $= \int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = -(-1) + 1 = 1 + 1 = 2$ বর্গ একক

15. $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx$ এর মান কত?

[DU-7Clg: 2020-21]

A. 2/7

B. 2/5

C. 1/3

D. 2/3

(D) Explanation $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (\cos 3x + 3 \cos x) dx$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{\sin 3x}{3} + 3 \sin x \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} \left(\frac{\sin 3\pi/2}{3} + 3 \sin \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{3} + 3 \right) = \frac{1}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$$

ASPECT SPECIAL: $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \frac{3-1}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$

16. $\int_1^e \ln x dx = ?$

[DU-7Clg: 2019-20]

A. 1

B. -1

C. 0

D. e

(A) Explanation $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x - x]_1^e = e \ln e - e - 1 \ln 1 + 1 = e - e - 0 + 1 = 1$

17. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ?$

[DU-7Clg: 2019-20]

A. $-\tan e^x + c$ B. $\tan e^x + c$ C. $\cot^{-1} e^x + c$ D. $\tan^{-1} e^x + c$

(D) Explanation $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{(e^x)^2 + 1}$

$$= \int \frac{dz}{z^2 + 1} = \tan^{-1}(z) + c = \tan^{-1}(e^x) + c$$

ধরি, $e^x = z$
 $e^x dx = dz$

18. $y = 2x, x$ -অক্ষ এবং $x = 2$ লাইনসমূহ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

[DU-7Clg: 2018-19]


A. 5

B. 4

C. 9

D. 30

(B) Explanation $y = 2x, x$ -অক্ষ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল



$$= \int_0^2 2x dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{2}{2} (2^2 - 0) = 4 \text{ বর্গ একক}$$

19. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = ?$

[DU-7Clg: 2018-19]

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{x}{\sqrt{2}}$

C. 1

D. $\frac{\pi}{2}$

(A) Explanation $-\int_0^1 \frac{-dx}{\sqrt{1-x}} = -2 [\sqrt{1-x}]_0^1 = -2(0 - 1) = 2$

20. $\int_0^1 \frac{x}{2-x^2} dx$ এর মান কত?

[DU-7Clg: 2017-18]

A. $\frac{1}{2} \log 2$ B. $\log 2$ C. $2 \log 2$ D. $-\frac{1}{2} \log 2$

(A) Explanation $\int_0^1 \frac{x}{2-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{-2x dx}{2-x^2}$

$$= -\frac{1}{2} [\ln(2-x^2)]_0^1 = -\frac{1}{2} [\ln 1 - \ln(2)] = -\frac{1}{2} [0 - \ln 2] = \frac{1}{2} \ln 2$$

21. $\int 2 \sin^2 \frac{x}{2} dx = \text{কত?}$

[DU-7Clg: 2017-18]

A. $x - \sin x + c$ B. $x - \cos x + c$ C. $1 - \sin x$ D. $1 + \sin x + c$

(A) Explanation $\int 2 \sin^2 \frac{x}{2} dx = \int (1 - \cos x) dx = x - \sin x + c$

22. $y = 0, x = 1$ এবং $y = x$ রেখা তিনটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল-?


[DU-7Clg: 2017-18]

A. 2 sq. units

B. 1 sq units

C. $\frac{1}{2}$ sq. unitsD. $\frac{1}{3}$ sq. units

(C) Explanation $\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} (1 - 0) = \frac{1}{2}$



IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. $\int \frac{dx}{(e^x + e^{-x})^2} = ?$

A. $\frac{1}{2(e^{2x} + 1)} + C$ B. $\frac{-1}{2(e^{2x} + 1)} + C$ C. $\frac{1}{2e^{2x}} + C$ D. $\frac{-1}{2e^{2x}} + C$

(B) Explanation $\int \frac{dx}{(e^x + e^{-x})^2} = \int \frac{dx}{\left(\frac{e^{2x} + 1}{e^x} \right)^2}$

$$= \int \frac{e^{2x} dx}{(e^{2x} + 1)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z^2} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{z} \right) + \text{ধরি, } e^{2x} + 1 = z \Rightarrow 2e^{2x} dx = dz \Rightarrow e^{2x} dx = \frac{1}{2} dz$$

$$= -\frac{1}{2(e^{2x} + 1)} + C$$

02. $\int \sqrt{e^x} dx = ?$

A. $\frac{2}{3}(e^x)^{3/2} + c$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{e^x} + c$

C. $2e^{x/2} + c$

D. $e^{x/2} + c$

Explanation $\int \sqrt{e^x} dx = \int e^{x/2} dx = \frac{e^{x/2}}{\frac{1}{2}} + c = 2e^{x/2} + c$

03. $[0, 2]$ ব্যবধিতে $y = x - 1$ এবং $y = 0$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের মোট ক্ষেত্রফল কত?

A. $\int_0^2 (x - 1) dx$

B. $\int_0^2 |x - 1| dx$


C. $2 \int_1^2 (1 - x) dx$

D. $2 \int_0^1 (x - 1) dx$

Explanation $[0, 2]$ ব্যবধিতে $y = x - 1$ এবং $y = 0$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$= -\int_0^1 y dx + \int_1^2 y dx$

$= \int_0^2 |y| dx = \int_0^2 |x - 1| dx$



$[0, 1]$ ব্যবধিতে $y(-v)$
 $(1, 2]$ ব্যবধিতে $y(+v)$

04. $\int \frac{\tan(\sin^{-1} x)}{\sqrt{1 - x^2}} dx = ?$

A. $\sec^2(\sin^{-1} x) + c$

B. $\sec(\sin^{-1} x) + c$

C. $\ln|\sec(\sin^{-1} x)| + c$

D. $\ln|\tan(\sin^{-1} x)| + c$

Explanation $\int \frac{\tan(\sin^{-1} x)}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

$= \int \tan(\sin^{-1} x) d(\sin^{-1} x) = \ln|\sec(\sin^{-1} x)| + c$

05. $y = 2$ এবং $y = |x|$ রেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল-

A. 2 sq. units

B. 4 sq. units

C. 6 sq. units

D. 8 sq. units

Explanation ক্ষেত্রফল $= \int_{-2}^2 |x| dx = \left[\frac{x|x|}{2} \right]_{-2}^2 = \left(\frac{4}{2} + \frac{4}{2} \right) = 4$ sq. units

06. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = f(x) + c$ হলে, $f(x)$ সমান-

A. $\sin x$

B. $\sin^{-1} x$

C. $\cos x$

D. $\sec^{-1} x$

Explanation Option গুলোকে অন্তরীকরণ করলে যে Option এর জন্য প্রশ্ন পাওয়া যাবে সেটিই সঠিক উত্তর। সুতরাং সঠিক উত্তর Option (D)

07. যদি $\int_0^6 f(t) dt = 8$ হয়, তবে $\int_0^3 f(2x) dx$ এর মান-

A. 0

B. 6

C. 10

D. 4

Explanation দেওয়া আছে, $\int_0^6 f(t) dt = 8$

$\Rightarrow [F(t)]_0^6 = 8 \Rightarrow F(6) - F(0) = 8$

$\therefore \int_0^3 f(2x) dx = \frac{1}{2} [F(2x)]_0^3 = \frac{1}{2} [F(6) - F(0)] = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$

08. $y = x^2$, $x = 1$, $x = 3$ এবং x -অক্ষ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল-

A. $26/3$ sq units

B. $80/3$ sq units

C. $8/3$ sq units

D. $35/3$ sq units

Explanation সীমা $x = 1$, $x = 3$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \int_1^3 y dx$

$= \int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3$

$= \frac{1}{3} (3^3 - 1^3) = \frac{26}{3}$ sq. units

09. $\int_0^x f(p) f'(p) dp = ?$

A. $\frac{1}{2} f^2(x)$

B. $\frac{1}{2} x^2$

C. $\frac{1}{2} [\{f(x)\}^2 - \{f(0)\}^2]$

D. $f(x) - f(0)$

Explanation $\int_0^x f(p) \cdot f'(p) dp$

$= \left[\frac{\{f(p)\}^2}{2} \right]_0^x$

$= \frac{1}{2} [\{f(x)\}^2 - \{f(0)\}^2]$

PRIME TEST

01. $\int x^{-1} dx$ এর মান কত?

A. $\frac{1}{0}$

B. $-\log x$

C. $\log x$

D. $\log x + C$

02. $\int e^x (x + 1) dx =$ কত?

A. $xe^x + e^x + k$

B. $xe^x + x + k$

C. $xe^x + k$

D. $\frac{x^2}{2} e^x + e^x + k$

03. $\int \cos^2 2x dx = ?$

A. $\frac{\sin^3 2x}{2} + k$

B. $\frac{2}{3} \sin^3 2x + k$

C. $4 \sin 2x \cos 2x + k$

D. $\frac{1}{8} (4x + \sin 4x) + k$

04. $\int_0^4 \sqrt{16 - x^2} dx = ?$

A. 4π

B. 16π

C. 8π

D. 2π

05. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2+4} = ?$

- A. $\tan \frac{x}{2}$ B. $\frac{\pi}{4}$
C. 2π D. 0

06. যদি $\int_0^4 f(x)dx = 6$ তবে $\int_{-1}^3 f(x+1)dx$ এর মান-

- A. 5 B. 7
C. 0 D. 6

07. $y^2 = 4ax$ এবং $y = x$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল-

- A. $\frac{4}{3}a^2$ B. $\frac{7}{3}a^2$
C. $\frac{8}{3}a^2$ D. $\frac{4}{3}$

08. $\int_0^{\pi/3} \sin 2x \sin x dx = ?$

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{1}{4}$

09. $\int x \cos x dx = f(x) + \text{cont.}$ হলে, $f(x) = ?$

- A. $x \sin x + \cos x$
B. $x \sin x - \cos x$
C. $\frac{x^2}{2} \sin x$
D. $\frac{x^2}{2} \cos x + x \sin x$

10. $\int e^x (\tan x - \ln |\cos x|) dx$ এর মান কত?

- A. $\frac{e^x}{\ln |\cos x|} + c$ B. $e^x \ln |\sec x| + c$
C. $e^x \ln |\cot x| + c$ D. কোনটিই নয়

OMR SHEET		
01. (A) (B) (C) (D)	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
	07. (A) (B) (C) (D)	৯৫ ৭০

ANS ANALYSIS

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	D	$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \log x + c$
02	C	$\int e^x(x+1)dx = xe^x + k = xe^x + k$
03	D	$\int \cos^2 2x dx = \frac{1}{2} \int 2\cos^2 2x dx$ $= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x + k$ $\therefore \int \cos^2 2x dx = \frac{1}{8} (4x + \sin 4x) + k$

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা						
04	A	$\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx$ $= \left[\frac{x\sqrt{4^2-x^2}}{2} + \frac{4^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_0^4 = \frac{4^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$						
05	B	$\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} \right]_{-2}^2$ $= \frac{1}{2} \{ \tan^{-1} 1 - \tan^{-1}(-1) \} = \frac{\pi}{4}$						
06	D	$= \int_{-1}^3 f(x+1) dx$ ধরি, $x+1 = z \Rightarrow dx = dz$ $= \int_0^4 f(z) dz = \int_0^4 f(x) dx = 6$ <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr><td>x</td><td>-1</td><td>3</td></tr> <tr><td>z</td><td>0</td><td>4</td></tr> </table>	x	-1	3	z	0	4
x	-1	3						
z	0	4						
07	C	প্রদত্ত $y^2 = 4ax$ এবং $y = x$ সমীকরণ সমাধান করে পাই, $x = 0$ এবং $x = 4a$ $\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \int_0^{4a} (2\sqrt{a} \cdot \sqrt{x} - x) dx = \left[2\sqrt{a} \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{4a}$ $= \left(\frac{4}{3} \cdot \sqrt{a} \cdot 8(\sqrt{a})^3 - \frac{16a^2}{2} \right)$ $= \frac{32}{3} a^2 - \frac{16a^2}{2} = \frac{8}{3} a^2$ বর্গএকক						
08	C	$\int_0^{\pi/3} \sin 2x \sin x dx = \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (\cos x - \cos 3x) dx$ $= \frac{1}{2} \left[\sin x - \frac{1}{3} \sin 3x \right]_0^{\pi/3}$ $= \frac{1}{2} \left[\left(\sin \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \sin \pi \right) - 0 \right]$ $= \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$						
09	A	$\int x \cos x dx = x \int \cos x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} x \int \cos x dx \right\} dx = x \sin x + \cos x + c$						
10	B	$\int e^x (\tan x - \ln \cos x) dx$ $= - \int e^x (\ln \cos x - \tan x) dx$ $= - e^x \ln \cos x + c$						

অধ্যায়

০১

বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা (REAL NUMBERS & INEQUALITIES)

কি পড়বে? কেন পড়বে?

SURVEY TABLE

কতটুকু পড়বে? কিভাবে পড়বে?

ক্রমিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়বে?]
01	মূলদ, অমূলদ সংখ্যা নির্ণয়	★★★
02	মান নির্ণয় ও পরমমানের ধর্ম সংক্রান্ত	★★
03	$(<)$ বা $(\leq)$ যুক্ত অসমতার সমাধান	★★★
04	$>$ বা $\geq$ যুক্ত অসমতার সমাধান	★★★
05	পরমমানের দুই দিকে অসমতা থাকলে সমাধান	★★
06	দ্বিঘাত অসমতার সমাধান	★★★

টপিক আনোচনা

সংখ্যা সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা

- 1871 সালে জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টর বাস্তব সংখ্যা নির্ণয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন।
- স্বাভাবিক সংখ্যার সেট: ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেটকে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট বলে। ইহাকে N দ্বারা প্রকাশ করা হয় $[\therefore N = \{1, 2, 3, \dots\}]$
- পূর্ণ সংখ্যার সেট: ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা, শূন্য এবং ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে একত্রে পূর্ণ সংখ্যার সেট বলা হয়। ইহাকে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
 $Z = \{ \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$
- মূলদ সংখ্যার সেট: কোন সংখ্যাকে সমান্তর দশমিক অথবা আবৃত দশমিক প্রকাশ করা গেলে তাকে মূলদ সংখ্যা বলে। একে Q দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
 $Q = \{ -3, -2, 5, 0, 1, 2, \dots \}$
- অমূলদ সংখ্যা সেট: কোন সংখ্যাকে সমান্তর দশমিক বা আবৃত দশমিক প্রকাশ করা না গেলে তাকে অমূলদ সংখ্যা বলে। একে Q' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
 $Q' = \{ \sqrt{2}, \sqrt{3}, e, \pi, \dots \}$
- শূন্য সহ ধনাত্মক, ঋণাত্মক সকল সংখ্যাকে একত্রে বাস্তব সংখ্যা বলে। একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- 0 একটি নিরপেক্ষ সংখ্যা।
- সংখ্যার সেটকে প্রকাশ করা হয়: $N \subset Z \subset Q \subset R$
- মূলদ-অমূলদ সংখ্যা:

মূলদ সংখ্যার বৈশিষ্ট্য: i. যে সংখ্যাকে $\frac{p}{q}$ আকারে প্রকাশ করা যায়। যেমন- $1/2, 5/7, 12/13, \dots$ ইত্যাদি

ii. সসীম / সমান্তর দশমিক, পূর্ণ দশমিক সংখ্যা। যেমন- $1.5, 2.257, 3.339, \dots$ ইত্যাদি

iii. আবৃত দশমিক সংখ্যা যেমন- $12.101101101, \dots; 5.656565, \dots$ ইত্যাদি

অমূলদ সংখ্যা চিনার উপায়: i. অসীম দশমিক (পৌনঃপুনিক নয়) ii. মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল। যেমন- $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ ইত্যাদি। (iii). π, e ইত্যাদি।

উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা: কোন সেটের সবচেয়ে বড় উপাদানটিকে ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা এবং সবচেয়ে ছোট উপাদান টিকে বৃহত্তম নিম্ন সীমা বলে।


Pro: $s = \{1, 2, 5, 7\}$ সেটের ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা এবং বৃহত্তম নিম্নসীমা কত? সমাধান: ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা = 7 এবং বৃহত্তম নিম্নসীমা = 1

- যদি x একটি বাস্তব সংখ্যা হয়, তবে x এর পরমমানকে $|x|$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তাহলে,

$$|x| = \begin{cases} x & \text{যখন } x > 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \\ -x & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

জ্যামিতিকভাবে বলা যায়, সংখ্যারের 0 এবং x এর দূরত্বই হলো x এর পরমমান।

$|5|$ হলো 0 থেকে 5 এর দূরত্ব, যা 5। অতএব, $|5| = 5$; $|-5|$ হলো 0 থেকে -5 এর দূরত্ব, যা 5। অতএব, $|-5| = 5$



অসমতা সম্পর্কিত নীতি

যোগের ধর্ম	$a, b, c \in R$ এর জন্য- যদি $a < b$ হয় তবে, $a + c < b + c$ হবে। যদি $a > b$ হয় তবে, $a + c > b + c$ হবে
গুণের ধর্ম	$a, b, c \in R$ এর জন্য যদি $a < b$ এবং $c > 0$ হয় তবে, $ac < bc$ হবে। যদি $a < b$ এবং $c < 0$ হয় তবে, $ac > bc$ হবে
ভাগের ধর্ম	$a, b, c \in R$ এর জন্য যদি $a < b$ এবং $c > 0$ হয় তবে, $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ হবে। যদি $a < b$ এবং $c < 0$ হয় তবে, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ হবে

পরমমানের ধর্ম			
$x \in \mathbb{R}$ এর জন্য	i) $ x \leq a \Rightarrow -a \leq x \leq a$	ii) $ a > b \Rightarrow a^2 > b^2$	iii) $ x \geq x$
$a, b \in \mathbb{R}$	i) $ a^2 = a^2 = -a^2 $	ii) $ ab = a b $	iii) $ abc = a b c $
	iv) $ a + b \leq a + b $	v) $\left \frac{a}{b} \right = \frac{ a }{ b } \quad (b \neq 0)$	vi) $a, b \in \mathbb{R}$ এর জন্য $ a - b \leq a - b $

পরমমান আকারে প্রকাশ

$a \leq bx + c \leq d$ হলে প্রত্যেক অংশ হতে a, b এর বীজগাণিতিক গড় বিয়োগ করতে হবে।

অর্থাৎ $a - \frac{a+d}{2} \leq bx + c - \frac{a+d}{2} \leq d - \frac{a+d}{2} \Rightarrow \frac{a-d}{2} \leq bx + k \leq \frac{d-a}{2} \left[k = c - \frac{a+d}{2} \text{ ধরে} \right] \Rightarrow -\frac{d-a}{2} \leq bx + k \leq \frac{d-a}{2} \therefore |bx + k| \leq \frac{d-a}{2}$ লিখতে হবে।

অসমতার সমাধান

Suppose: $|ax + b| \leq c$ এর সমাধান করতে হবে

Step-1 অংকের ডাকটিকে প্রথমে $-c \leq ax + b \leq +c$ আকারে লিখ

Step-2 মডুলাসের ভেতরে যে Constant সংখ্যাটি থাকে তার বিপরীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যা নিয়ে Step-1 এর তিনটি অংশের সাথেই যোগ কর।
অর্থাৎ, $-c - b \leq ax + b - b \leq c - b$ বা $-c - b \leq ax \leq c - b$ আকারে লিখ।

Step-3 x কে a মুক্ত কর। অর্থাৎ, $\frac{-c-b}{a} \leq x \leq \frac{c-b}{a}$

Step-4 x এর সামনে ঋণাত্মক চিহ্ন থাকলে (-1) দ্বারা গুন করে অসমতার চিহ্নটি উল্টে দাও। আবার ধনাত্মক চিহ্ন থাকলে কিছু করার দরকার নেই।

Suppose: $|ax + b| \geq c$ এর সমাধান করতে হবে

Step-1: অংকের ডাকটিকে প্রথমে $-c \geq ax + b \geq +c$ আকারে লিখ।

Step-2: মডুলাসের ভেতরে যে Constant সংখ্যাটি থাকে তার বিপরীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যা নিয়ে Step-1 এর তিনটি অংশের সাথেই যোগ কর।
অর্থাৎ, $-c - b \geq ax + b - b \geq c - b$ বা $-c - b \geq ax \geq c - b$ আকারে লিখ

Step-3: x কে a মুক্ত কর। অর্থাৎ, $\frac{-c-b}{a} \geq x \geq \frac{c-b}{a}$

মনে রাখবে: Less than ($\leq$ or $<$) থাকলে উত্তরে “এবং” অথবা ‘ $\cap$ ’ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

• Greater than ($\geq$ or $>$) থাকলে উত্তরে “অথবা”/ ‘ $\cup$ ’ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় • (-1) দ্বারা গুন করলে অসমতা চিহ্ন উল্টে যায়

প্রকৃতপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 3, 2.8787, $-\sqrt{2}$, $\sqrt{-2}$ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি অমূলদ?

Solve ত্রয়টি

MEx 02 $|-16+3| + |-1-4| - 3 - |-1-7| = ?$

Solve $|-16+3| + |-1-4| - 3 - |-1-7|$

$= |-13| + |-5| - 3 - |-8| = 13 + 5 - 3 - 8 = 18 - 11 = 7$

MEx 03 $|x-2| \leq 5$ এর সমাধান সেট কোনটি?

Solve $|x-2| \leq 5 \Rightarrow -5 \leq x-2 \leq 5 \Rightarrow -2+2 \leq x \leq 5+2$

$\Rightarrow -3 \leq x \leq 7 \therefore$ সমাধান সেট $= [-3, 7]$

MEx 04 $|2x-7| > 5$ অসমতার বাস্তব সংখ্যার সমাধান কি?

Solve $-5 > 2x-7 > 5 \Rightarrow 5+7 > 2x > 12$

$\Rightarrow 2 > 2x > 12 \Rightarrow 1 > x > 6 \Rightarrow x < 1$ অথবা $x > 6$

MEx 05 $4 < x < 10$ অসমতাকে পরমমান চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করলে হবে-

Solve $\frac{4+10}{2} = 7 \therefore 4-7 < x-7 < 10-7$

$\Rightarrow -3 < x-7 < 3 \Rightarrow |x-7| < 3$

MEx 06 বাস্তব সংখ্যার উপসেট $S = \{x: x^2 - 3x + 2 < 0\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ও ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা হবে-

Solve $S = \{x: x^2 - 3x + 2 < 0\}, = \{x: x^2 - 2x - x + 2 < 0\}$

$= \{x: x(x-2) - 1(x-2) < 0\} = \{x: (x-2)(x-1) < 0\} = \{x: 1 < x < 2\}$

MEx 07 $\frac{3x-2}{2x-1} > 1$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি?

Solve $\frac{3x-2}{2x-1} > 1 \Rightarrow \frac{3x-2-2x+1}{2x-1} > 0$

$\Rightarrow x-1 > 0 \Rightarrow x > 1 \Rightarrow (1, \infty)$

MEx 08 C, R, Q, Z ও N দ্বারা যথাক্রমে জটিল সংখ্যা, বাস্তব সংখ্যা, মূল সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা ও স্বাভাবিক সংখ্যার সেট বুঝানো হলে নিচের কোনটি সঠিক?

Solve $N \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. $1/2 \geq |x-1|$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি? [DU-7Clg: 2020-21]
A. $1/2 \leq x \leq \infty$ B. $-\infty < x \leq 1/2$ C. $0 \leq x < \infty$ D. $1/2 \leq x \leq 3/2$

① Explanation $|x-1| \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x-1 \leq \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow -\frac{1}{2}+1 \leq x \leq \frac{1}{2}+1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$

02. নিচের কোন অসমতাটি $|3x-4| > 2$ এর সমতুল্য? [DU-7Clg: 2019-20]

A. $\frac{2}{3} < x < 2$ B. $\frac{3}{4} < x < 2$ C. $3 < x < 6$ D. $\frac{2}{3} < x < \frac{1}{2}$

② Explanation $|3x-4| > 2 \Rightarrow -2 > 3x-4 > 2$

$\Rightarrow -2+4 > 3x-4+4 > 2+4 \Rightarrow 2 > 3x > 6 \Rightarrow \frac{2}{3} > x > 2$
 $\therefore \frac{2}{3} > x$ অথবা $x > 2$

03. p, q সহমৌলিক এবং $\frac{q}{p} \in \mathbb{N}$ হলে p এর মান কত? [DU-7Clg: 2019-20]

A. -2 B. 0 C. 1 D. 2

③ Explanation p, q সহমৌলিক হবে যদি এদের মাঝে 1 ব্যতীত কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে

$\therefore p$ এর মান 1

04. নীচের কোন অসমতাটি $|x-2| < 5$ এর সমতুল্য? [DU-7Clg. 2018-19]
A. $-5 < x < 5$ B. $-3 < x < 5$ C. $-3 < x < 7$ D. $-5 < x < 7$

Explanation: $|x-2| < 5 \Rightarrow -5 < x-2 < 5$

$$\Rightarrow -5+2 < x-2+2 < 5+2 \Rightarrow -3 < x < 7$$

05. $-7 < x < -1$ কে পরমানের সাহায্যে লিখলে দাঁড়ায়? [DU-7Clg. 2017-18]
A. $|x+3| < 4$ B. $|x+1| < 3$ C. $|x-4| < 1$ D. $|x+4| < 3$

Explanation: $-7 < x < -1 \Rightarrow -7+4 < x+4 < -1+4$

$$\Rightarrow -3 < x+4 < 3 \Rightarrow |x+4| < 3$$

IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. $-7 < x < -1$ কে পরম মানের সাহায্যে লিখলে দাঁড়ায়-

A. $|x+4| < 3$ B. $|x-4| < 3$ C. $|x+3| < 4$ D. $|x-3| < 4$

Explanation: $-7 < x < -1 \Rightarrow -7+4 < x+4 < -1+4 \Rightarrow -3 < x+4 < 3$
∴ পরম মানের সাহায্যে লিখলে দাঁড়ায় $|x+4| < 3$

02. $\left|3 - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$ অসমতাটির সমাধান সেট-

A. $\frac{2}{7} < x < \frac{2}{5}$ B. $-\frac{4}{7} < x < -\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{8} < x < \frac{1}{7}$ D. $\frac{1}{5} < x < \frac{1}{7}$

Explanation: $\left|3 - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2} \Rightarrow \left|\frac{1}{x} - 3\right| < \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} < \frac{1}{x} - 3 < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} + 3 < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} + 3 \Rightarrow \frac{5}{2} < \frac{1}{x} < \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} > x > \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{2}{7} < x < \frac{2}{5}$$

03. নীচের কোন অসমতাটি $|x-2| < 5$ এর সমতুল্য?

A. $-5 < x < 5$ B. $-3 < x < 5$ C. $-3 < x < 7$ D. $-5 < x < 7$

Explanation: $|x-2| < 5 \Rightarrow -5 < x-2 < 5$

$$\Rightarrow -5+2 < x-2+2 < 5+2 \Rightarrow -3 < x < 7$$

04. $|x^2+1| < 10$ এর সমাধান-

A. $-3 < x < 3$ B. $-3 \leq x < 3$ C. $-3 < x \leq 3$ D. $-3 \leq x \leq 3$

Explanation: $|x^2+1| < 10$ বা, $-10 < x^2+1 < 10$

$$\Rightarrow -11 < x^2 < 9 \text{ কিন্তু } -11 < x^2 \text{ এর চেয়ে } 0 \leq x^2 \text{ অধিক যুক্তিযুক্ত}$$

$$\Rightarrow 0 \leq x^2 < 9 \text{ বা, } -3 < x < 3$$

05. নীচের কোন অসমতাটি $|3x-4| > 2$ এর সমতুল্য?

A. $\frac{2}{3} < x < 2$ B. $\frac{3}{4} < x < 2$ C. $3 < x < 6$ D. $\frac{2}{3} < x < \frac{1}{2}$

Explanation: $|3x-4| > 2 \Rightarrow -2 > 3x-4 > 2$

$$\Rightarrow -2+4 > 3x-4+4 > 2+4 \Rightarrow 2 > 3x > 6 \Rightarrow \frac{2}{3} > x > 2$$

$$\therefore \frac{2}{3} > x \text{ অথবা } x > 2 \text{ Ans : Correct Answer } \frac{2}{3} > x \text{ অথবা } x > 2$$

06. অসমতা $|5-2x| \geq 4$ এর সমাধান সেট-

A. $\left[\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right]$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{9}{2}, \infty\right)$

C. $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right] \cup \left[\frac{27}{2}, \infty\right)$

Explanation: দেওয়া আছে, $|5-2x| \geq 4$

$$\Rightarrow -4 \geq 5-2x \geq 4 \Rightarrow -9 \geq -2x \geq -1$$

$$\Rightarrow \frac{9}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow x \leq \frac{1}{2} \text{ অথবা } x \geq \frac{9}{2} \Rightarrow \left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{9}{2}, \infty\right)$$

PRIME TEST

01. $|x-1| < \frac{1}{10}$ হলে $|x^2-1|$ এর মান কোনটি?

A. $\frac{1}{100}$ B. $\frac{7}{100}$ C. $\frac{14}{100}$ D. $\frac{21}{100}$

02. $|2x-7| < 5$ অসমতাটির বাস্তব সংখ্যার সমাধান কি?
A. $x > 1$ B. $x < 6$
C. $x > 1$ অথবা $x < 6$ D. $x > 1$ এবং $x < 6$

03. যদি $a, b, \in \mathbb{R}$ হয় এবং $a > 0, b > 0, a < b$ হয় তবে নিচের কোনটি সঠিক?
A. $a > b$ B. $b^{-1} > a^{-1}$ C. $b \geq a^{-1}$ D. কোনটিই নয়

04. যদি x এবং y উভয়েই ধারাবাহিক Prime number হয় এবং $x, y \leq 70$ হয়, তাহলে x এবং y এর জন্য নীচের কোন পার্থক্যটি সঠিক নয়?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

05. $-4 \leq x \leq 2$ কে পরমান চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?
A. $|x+1| \leq 3$ B. $|x+1| \leq 1$ C. $|x+1| \leq 5$ D. $|x+1| \leq 2$

06. $a, b \in \mathbb{R}$ এর জন্য কোনটি সঠিক নয়?
A. $|a| + |b| \geq |a+b|$ B. $|ab| = |a||b|$
C. $|a-c| + |c-b| > |a-b|$ D. $|a| - |b| < |a-b|$

07. বাস্তব সংখ্যার উপসেট $S = \{x: x^2 - 3x + 2 < 0\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ও ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা হবে-
A. $2 < x < 1$ B. $1 < x < 2$ C. $-3 < x < 2$ D. $2 < x < 3$

08. বাস্তব সংখ্যায় $|2x-3| \leq 1$ অসমতাটির সমাধান কোনটি?
A. $1 \leq x \leq 2$ B. $1 < x < 2$ C. $x \leq 1$ অথবা $x \geq 2$ D. $-2, x \leq 2$

09. $\{-\infty, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, \infty\}$ সংখ্যার সেটকে বলে-
A. পূর্ণ সংখ্যার সেট B. স্বাভাবিক সংখ্যার সেট
C. অমূলদ সংখ্যার সেট D. বাস্তব সংখ্যার সেট

10. $|x| = |y|$ থেকে নিচের কোনটি নির্দেশিত হয়?
A. $x = y$ B. $x = -y$ C. $\frac{x}{y} = \pm 1$ D. কোনটিই নয়

OMR SHEET	04. (A) (B) (C) (D)	08. (A) (B) (C) (D)
01. (A) (B) (C) (D)	05. (A) (B) (C) (D)	09. (A) (B) (C) (D)
02. (A) (B) (C) (D)	06. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
03. (A) (B) (C) (D)	07. (A) (B) (C) (D)	সে ৫ ৯০

ANS ANALYSIS

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
01	D	$ x-1 < \frac{1}{10}$ বা, $ x-1+2 < \frac{1}{10}+2$ বা, $ x+1 < \frac{21}{10}$ বা, $x^2-1 < \frac{1}{10} \times \frac{21}{10}$ বা, $ x^2-1 < \frac{21}{100}$
02	D	$ 2x-7 < 5 \Rightarrow -5 < 2x-7 < 5 \Rightarrow 2 < 2x < 12$ $\Rightarrow 1 < x < 6$ ∴ অসমতাটির সমাধান $= x > 1$ এবং $x < 6$
03	D	$a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b} \Rightarrow a^{-1} > b^{-1} \therefore b^{-1} < a^{-1}$
04	C	যেহেতু, 2 ব্যতীত অপর সকল মৌলিক সংখ্যা বিজোড়, সেহেতু এদের পার্থক্য 5 হতে পারে না।
05	A	$-4 \leq x \leq 2 \Rightarrow -4+1 \leq x+1 \leq 2+1$ $\Rightarrow -3 \leq x+1 \leq 3 \therefore x+1 \leq 3$
06	D	পরম মানের ধর্ম: (i) $ a + b \geq a+b $ (ii) $ ab = a b $ (iii) $ a - b \leq a-b $ (iv) $ a-c + c-b \geq a-b $
07	B	$S = \{x: x^2 - 3x + 2 < 0\} = \{x: x^2 - 2x - x + 2 < 0\}$ $= \{x: x(x-2) - 1(x-2) < 0\}$ $= \{x: (x-2)(x-1) < 0\} = \{x: 1 < x < 2\}$
08	A	$ 2x-3 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq 2x-3 \leq 1$ $\Rightarrow 2 \leq 2x \leq 4 \Rightarrow 1 \leq x \leq 2$
09	A	সরাসরি পূর্ণ সংখ্যার সেট সংজ্ঞা থেকে
10	C	$ x = y $ বা, $x = \pm y$ বা, $\frac{x}{y} = \pm 1$

দ্বিতীয় প্রথম

ଅଧ୍ୟାୟ

02

રોગાશ્રયી પ્રોગ્રામ (LINEAR PROGRAMMING)



କି ପଢ଼ବ ? କେନ ପଢ଼ବ ?

SURVEY TABLE

କଣ୍ଠଟୁକୁ ପଢ଼ତ ? କିଭାବେ ପଢ଼ତ ?



টপিক নং	বিগত বছরে যে সকল টপিকস্ থেকে প্রশ্ন এসেছে	RATINGS [কেন পড়ব?]
01	সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নকরণ	★★
02	সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নকরণ এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সংক্রান্ত	★★

ઉપક આલોચના

- **যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম:** ১৯৩৯ সালে রাশিয়ার গণিতবিদ এল.ভি ক্যান্টভিচ সর্বপ্রথম যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের মডেল তৈরি করেন। কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সমস্যাকে জটীকীয়তা ও শর্ত সাপেক্ষে একাধিক স্বাধীন চলকের রৈখিক অসমতা ও একটি অভিন্ন ফাংশানের মাধ্যমে সমাধানই হল যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম।
- যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম থেকে ৪ ধরনের প্রশ্ন হতে পারে:
- সর্বোচ্চ মান বা গুরু মান কত?
 - সর্বনিম্ন মান বা লঘুমান কত?
 - কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ বা গুরুমান পাওয়া যায়?
 - কোন বিন্দুতে সর্বনিম্ন বা লঘুমান পাওয়া যায়?

01. সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয়:

FORMULA Step-01: উপরের চার ধরনের প্রশ্নের সমাধানের জন্য অসমতা গুলোকে সমীকৃত করে লেখচিত্র অংকন করে অভিস্ট এরিয়া বের করতে হবে।

Step-02: অভিষ্ট এরিয়ার প্রান্ত বিন্দুগুলো অভিষ্ট ফাংশনে বসিয়ে প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমূহ

MEx 01 যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামে $x + 2y \leq 10$, $2x + y \geq 2$, $y \leq 3$, $x, y \geq 0$ সীমাবদ্ধতায় কোন বিন্দুতে $z = 2x + y$ এর (i) সর্বোচ্চ মান পাওয়া যাবে? (ii) সর্বোচ্চ মান কত?

Solve $x + 2y = 10$ (i)

$$2x + y = 2 \dots\dots\dots (ii)$$
$$y = 3 \dots\dots\dots (iii)$$

১নং হতে পাই $\frac{x}{10} + \frac{y}{5} = 1$

২নং হতে পাই $x + \frac{y}{2} = 1$

১নং ও ৩নং এর ছেদবিন্দু $y=3, x+6=10 \Rightarrow x=4 \therefore (4,3)$

$(1,0)$ বিন্দুতে $\Rightarrow z=2$


$(10,0)$ বিন্দুতে $\Rightarrow z = 20$

$(4,3)$ বিন্দুতে $\Rightarrow z = 11$

$(0,3)$ বিন্দুতে $\Rightarrow z = 3$

$(0,2)$ বিন্দুতে $\Rightarrow z=2$

সর্বোচ্চ মান 20 এবং (10,0) বিন্দুতে সর্বোচ্চ মান পাওয়া যাবে



IQA **IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION**

01. $x + 2y \leq 10$, $x + y \leq 6$, $x \leq 4$, $x, y \geq 0$ শর্তাধীনে $z = 2x + 3y$ এর সর্বোচ্চ মান-

A. 14

B. 15

C. 16

D. 18

Explanation $x + 2y \leq 10$.

$$\Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{y}{5} = 1$$

$$x + y \leq 6 \Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{6} = 1 \text{ এবং } x \leq 4 \Rightarrow x = 4$$

এখন, $x + y = 6$ ও $x = 4$ -এর ছেদবিন্দু $(4, 2)$

এবং $x + 2y = 10$ ও $x + y = 6$ -এর ছেদবিন্দু $(2, 4)$:

