

প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. প্রতিসাম্য : প্রাণিদেহকে কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সদৃশ সমান অংশে বিভাজন করার নিয়মকে প্রতিসাম্য বলে।

২. বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্যতা :

প্রতিসাম্যতার ধরন	উদাহরণ	প্রতিসাম্যতার ধরন	উদাহরণ
১. গোলায়	<i>Volvax</i> , <i>Radiolaria</i> , <i>Heliozoa</i>	৪. দ্বিপাক্ষীয়	প্রজাপতি, ব্যাঙ, মানুষ।
২. অরীয়	হাইড্রা, জেলিফিশ (<i>Aurelia</i>), সী অ্যানিমন (<i>Metridium</i>)	৫. অপ্রতিসাম্য	স্পঞ্জ, শামুক।
৩. দ্বিসরীয়	<i>Ctenophora</i> জাতীয় প্রাণীর দেহ।		[Ref: অজমল]

৩. সিলোম (Coelom) : প্রাণিদেহের পৌষ্টিক নালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে দেহগহ্বর বলে। জরীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত দেহগহ্বরকে সিলোম বলে। Mollusca থেকে শুরু করে Chordata পর্যন্ত প্রাণী পর্যন্ত সিলোম ধারণ করে। সিলোমের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে প্রাণীদের নিম্নোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

(ক) অ্যাসিলোমেট (Acoelomate) : যেসব প্রাণীর দেহে কোনো সিলোম থাকে না তাদের অ্যাসিলোমেট বলে। যেমন : Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertea প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণী।

(খ) অপ্রকৃত সিলোমেট বা স্যুডোসিলোমেট (Pseudocoelomate) : যেসব প্রাণীর দেহে দেহগহ্বর মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত নয় তাদের অপ্রকৃত সিলোমেট বা মিথ্যা বা ছদ্মভ্রান্ত সিলোমেট বলে। যেমন : Nematoda, Acanthocephalan, Rotifera, Ectoprocta প্রভৃতি।

(গ) প্রকৃত সিলোমেট বা ইউসিলোমেট (Eucoelomate) : যেসব প্রাণীর দেহগহ্বর মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত, পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে তাকে প্রকৃত সিলোমেট বলে। যখন প্রাণিদেহের প্রকৃত দেহগহ্বরটি রক্তপূর্ণ থাকে তখন তাকে হিমোসিল বলে এবং প্রাণীদের হিমোসিলোমেট বলে।

৪. Porifera পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
সাইকন	<i>Scypha gelatinosum</i>	বাথ স্পঞ্জ	<i>Euspongia officinalis</i>
মিঠা পানির স্পঞ্জ	<i>Spongilla lacustris</i>	লাল ছিদ্রাল স্পঞ্জ	<i>Cliona celata</i>
ক্ল্যাথ্রিরা	<i>Clathryna sp.</i>	ভেনাসফ্লাওয়ার বাক্সেট	<i>Euplectella aspergillum</i>

প্রধান বৈশিষ্ট্য : • অস্টিয়া ও অসকুলাম • নালিতন্ত্র • কোয়ানোসাইটকোষ • স্পঞ্জোসিল।

৫. Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
অ্যানিমন	<i>Metridium senile</i>	সমুদ্র পাখা	<i>Gorgonia ventalina</i>	হাইড্রা	<i>Hydra vulgaris</i>
সাগর কুসুম	<i>Metridium senile</i>	লাল প্রবাল	<i>Corallium rubrum</i>	জেলিফিশ	<i>Aurelia aurita</i>
সমুদ্র কলম	<i>Pennatula sulcata</i>	ওবেলিয়া	<i>Obelia geniculata</i>		

প্রধান বৈশিষ্ট্য : • দ্বিস্তরী • মেসোগ্রিয়া • পলিপ ও মেডুসা • সিলেন্টারন • নিডোসাইট কোষ ও নেমাটোসিস্ট।

৬. Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
যকৃৎ কৃমি	<i>Fasciola hepatica</i>	চ্যণ্ডের কৃমি	<i>Polystoma integerrimum</i>
ফিতা কৃমি	<i>Taenia solium</i>	চীনা যকৃৎ কৃমি	<i>Clonorchis sinensis</i>
কুকুরের ফিতাকৃমি	<i>Echinococcus granulosus</i>	গরুর ফিতা কৃমি	<i>Taenia saginata</i>
প্রানেরিয়া	<i>Dugesia tigrina</i>	রক্ত কৃমি	<i>Schistosoma mansoni</i>

প্রধান বৈশিষ্ট্য : • ত্রিস্তরী • অসম্পূর্ণ পৌষ্টিকতন্ত্র • শিখাকোষ • চ্যাপ্টাদেহ • হৃক বা চোষক। [Ref: আজমল + আশরাফ + মাজেদ]

৭. Nematoda পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম ও উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
গোলকৃমি	<i>Ascaris lumbricoides</i>	হৃক কৃমি	<i>Ancylostoma duodenale</i>	চাবুক কৃমি	<i>Trichinella spiralis</i>
ফাইলেরিয়া কৃমি	<i>Wuchereria bancrofti</i>	পিনের মতো কৃমি	<i>Enterobius vermicularis</i>	চোষ কৃমি	<i>Loa loa</i>

প্রধান বৈশিষ্ট্য : • দ্বিপাক্ষীয় প্রতিসম • নলাকারদেহ • পরিপাকনালি সম্পূর্ণ • বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠ

৮. Mollusca পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম	পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
আপেল শামুক	<i>Pila globosa</i>	কাইটন	<i>Chiton tuberculatus</i>	ডেন্টালিয়াম	<i>Dentalium neohexagonum</i>
অক্টোপাস	<i>Cepus vulgaris</i>	ললিগো	<i>Loligo edulis</i>	সেপিয়া	<i>Sepia aculeata</i>
কড়ি	<i>Cypraea moneta</i>	মুক্তা ঝিনুক	<i>Pinctada vulgaris</i>	ঝিনুক	<i>Lamellidens marginalis</i>
ছুইড	<i>Loligo vulgaris</i>	সমুদ্রের তীর	<i>Uroteuthis duvauceli</i>		

প্রধান বৈশিষ্ট্য : • মাংসল দেহ • ম্যান্টল • র্যাডুলা • নেক্রিডিয়া • ভিসেরাল মাস • খোলস • টিনিডিয়া

७२१

Arthropoda পৰ্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

বিশেষ বৈশিষ্ট্য : সন্ধিসূক্ত উপাঙ্গ • পুঞ্জাক্ষি • অ্যান্টেনা • মুখোপাঙ্গ • রূপান্তর • হিমোসিল Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম ও উদাহরণ .	Terriplaneta americana	রেশমপো
---	-------------------------------	---------------

প্রধান বৈশিষ্ট্য : • গম্বুসরীয় প্রতিসম • বিমোখিক তল • পানি সংবহনতন্ত্র • নালিকাপদ • মুক্ত সঁতারলাভা

Urochordata উপসর্গভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

৪ Urochordata-র শ্রেণিবিভাগ :

अग्नि- १ : Agnatha :

৪. Agnatha-র শ্রেণিবিন্যাস :

Chondrichthyes শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

Actinopterygii	<i>Pristis pectinata</i>
----------------	--------------------------

শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

Labeo rohita

Sarcopterygii শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সিলাকান্ত মাছ	<i>Latimeria chalumnae</i>	আফ্রিকান ফুসফুস মাছ	<i>Protopterus annectens</i>
অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ	<i>Neoceratodus forsteri</i>		

Amphibia শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
কুনোব্যাঙ	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	সোনা ব্যাঙ	<i>Rana tigrina</i>
জলজ টোড	<i>Pipa pipa</i>	গেছো ব্যাঙ	<i>Hyla arborea</i>
স্যালামান্ডার	<i>Salamandra maculosa</i>	পানির কুকুর	<i>Necturus maculosus</i>
সাইরেন	<i>Siren lacertina</i>	উড়ন্ত ব্যাঙ	<i>Rhacophorus reinwardtii</i>

Reptilia শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গুই সাপ	<i>Varanus bengalensis</i>	কুমির	<i>Crocodylus porosus</i>	টিকটিকি	<i>Hemidactylus frenatus</i>
কচ্ছপ	<i>Lissemys punctata</i>	গিরগিটি	<i>Calotes versicolor</i>	কচ্ছপ	<i>Trionyx gangeticus</i>
গোখরা সাপ	<i>Naja naja</i>	উড়ন্ত টিকটিকি	<i>Draco volans</i>	ঘড়িয়াল	<i>Gavialis gangeticus</i>

Aves শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
মোরগ	<i>Gallus gallus</i>	দোয়েল	<i>Copsychus saularis</i>	চড়ুই	<i>Passer domesticus</i>
প্যাঁচা	<i>Bubo bubo</i>	কবুতর	<i>Columba livia</i>	ময়ূর	<i>Pavo cristatus</i>

Mammalia শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
মানুষ	<i>Homo sapiens</i>	প্লাটিপাস	<i>Ornithorhynchus anatinus</i>	চিত্রা হরিণ	<i>Axis axis</i>
বাঘ	<i>Panthera tigris</i>	ক্যাডার	<i>Macropus rufa</i>	সিংহ	<i>Panthera leo</i>

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন সংবলিত সদস্য- নিমারটিয়ান সামুদ্রিক প্রাণিগোষ্ঠী
- *Volvox*, *Radiolaria*, *Haliozoa* প্রভৃতি- এককোষী প্রোটিস্টান জীব
- সর্বপ্রথম নামকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন- ক্যারোলাস লিনিয়াস
- ইউরোপীয়ান চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম- *Passer domesticus*
- সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করে- Schlegel, ১৮৪৪ সালে
- ফরমালিন ও অ্যালকোহল হচ্ছে সংরক্ষণের ভালো- তরল মাধ্যম
- প্রাণিজগতের ৩০টি পর্বের মধ্যে প্রধান বা মেজর পর্বের সংখ্যা হলো- ৯টি
- নেমাটোডা পর্বের প্রাণীরা- স্যুডোসিলোমেট ও অখণ্ডকায়িত
- শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত- নেমাটোডা পর্বের প্রাণীদের
- প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব- Mollusca (মলাকা)
- বিনুক, শামুক, অক্টোপাস, সেপিয়া, ললিগো- Mollusca পর্বের সদস্য
- Annelida পর্বের প্রাণীদের দেহ- কিউটিকুলে আবৃত
- Annelida পর্বের প্রাণীদের রক্ত সংবহনতন্ত্র- বদ্ধ প্রকৃতির, রক্তের বর্ণ লাল
- প্রাণিজগতে বিদ্যমান পর্বের মধ্যে কর্ডাটা জাতীয় পর্ব- ১টি
- R.H. Whittaker জীবের- ৫ রাজ্য বা জগৎ শ্রেণিবিন্যাস করেন
- Nematoda পর্বের প্রাণীদের সাধারণ নাম- সুতাকৃমি বা গোলকৃমি
- গোলকৃমির লার্ভা দশার নাম- র্যাভিডিফর্ম
- Mollusca পর্বের নামকরণ করেন- Jonston (1650)
- Annelida পর্বের নামকরণ করেন- Lamarck (1809)
- সম্পূর্ণ খণ্ডকায়ন দেখা যায়- Annelida পর্বের প্রাণীদের
- পোটালতন্ত্র বিদ্যমান- Chordata-এর সংবহনতন্ত্রে
- Amphibia শ্রেণির প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড- তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
- Aves শ্রেণির প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড- চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
- Vertebrata-র পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু- মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকান্ড গঠন করে
- Myxini শ্রেণির প্রাণীদের মুখপ্রান্তে উপস্থিত কর্ণিকার সংখ্যা- ১-১৫ জোড়া
- Cephalaspidomorphi শ্রেণিভুক্ত মাছগুলোর সাধারণ নাম- ল্যামপ্রে

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে বড় একক কোনটি?
 (A) Phylum (B) Class (C) Order (D) Family (Ans A)
02. কোনটি অপ্রতিসম প্রাণী?
 (A) ইলিশ (B) তারামাছ (C) হাইড্রা (D) অ্যামিবা (Ans D)
03. 'রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ' (Ray finned fishes) নামে পরিচিত কোন শ্রেণি?
 (A) Myxini (B) Chondrichthyes (C) Actinopterygii (D) Sarcopterygii (Ans C)
04. কোন পর্বের প্রাণীতে শিখাকোষ দেখা যায়?
 (A) Platyhelminthes (B) Cnidaria (C) Nematoda (D) Mollusca (Ans A)
05. সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড কোন সর্পীস্পে দেখতে পাওয়া যায়?
 (A) কুমির (B) টিকটিকি (C) কচ্ছপ (D) সাপ (Ans A)
06. প্রাণিজগতের ভিন্নতার কারণ কি?
 (A) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (B) আচরণগত বৈচিত্র্য (C) খাদ্যাভ্যাসগত বৈচিত্র্য (D) চলাচলগত বৈচিত্র্য (Ans A)
07. কোন পর্বে পানি সংবহনতন্ত্র দেখা যায়?
 (A) Cnidaria (B) Nematoda (C) Mollusca (D) Echinodermata (Ans D)

ঘাসফড়িং (Grasshopper) :

Arthropoda পর্বের insecta শ্রেণির Orthoptera বর্গের Caelifera উপবর্গের প্রাণীদের ঘাসফড়িং (Grasshopper) বলে। ঘাসফড়িং একধরকার পতঙ্গ (insect)। পেস্ট। এরা শাকসবজি, ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের পেস্ট হিসেবে থাকে।

৬ বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি ঘাসফড়িং প্রজাতির নাম :

<i>Acrida exaltata</i>	<i>Schistocerca gregaria</i>	<i>Schistocerca americana</i>	<i>Locusta migratoria</i>
<i>Phlaeoba infumata</i>	<i>Romalea microptera</i>	<i>Choroedocus robustus</i>	<i>Orthacris elegans</i>
<i>Chondracris rosea</i>	<i>Oxya velox</i>	<i>Oedaleus abruptus</i>	<i>Poecilocerus pictus</i>
<i>Aulacobothrus luteipes</i>	<i>Locusta danica</i>		

৬ ঘাসফড়িং-এর মুখোপাসের কাজ নিচে দেওয়া হলো :

নাম	কাজ
১. ল্যাব্রাম	খাবার ধরে রাখা, ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দেওয়া, স্বাদ গ্রহণ।
২. ম্যান্ডিবল	খাদ্য কটন করা।
৩. ম্যাক্সিলা	খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, ধরে রাখা, মুখের ভেতর প্রবেশ করানো, খাদ্য চূর্ণকরণ।
৪. ল্যাবিয়াম	খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করা ও চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করানো।
৫. হাইপোফ্যারিংজ	খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মিশাতে সাহায্য করা।

৬ ঘাসফড়িং-এর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ :

ঘাসফড়িং-এর পুরুষ প্রজননতন্ত্র	ঘাসফড়িং-এর স্ত্রী প্রজননতন্ত্র
১. শুক্রাশয়	১. ডিম্বাশয়
২. শুক্রনালি/ভাস ডিফারেন্স	২. ডিম্বনালি
৩. ফেপথ নালি	৩. যোনি
৪. সেমিনাল ভেসিকুল	৪. আনুসঙ্গিক গ্রন্থি
৫. লিঙ্গ	৫. স্ত্রী প্রজননতন্ত্র
	৬. স্পার্মাথিকা/সেমিনাল রিসেপ্টকল

৬ ওমাটিডিয়ামের বিভিন্ন অংশের কাজ :

অংশের নাম	কাজ	অংশের নাম	কাজ
১. কর্নিয়া	লেপের মতো কাজ করে	৬. র্যাবডোম	আলো গ্রহণ করে
২. কর্নিয়াজেন কোষ	কর্নিয়া তৈরি করে	৭. রেটিনাল সিথ	আলো নিয়ন্ত্রণ করে
৩. ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ	প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।	৮. ভিত্তি পর্দা	ওমাটিডিয়ামকে ধারণ করে
৪. আইরিশ রঞ্জক আবরণ	সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে	৯. দ্বায়তন্ত্র	গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে
৫. রেটিনুলার কোষ	র্যাবডোম তৈরি করে		

৬ আইশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য :

আইশের নাম	শ্রেণি	উদাহরণ
গ্ল্যাকয়েড	Chondrichthyes	<i>Hydrolagus collieri</i> (র্যাটফিশ), <i>Scoliodon laticaudus</i> (হাঙর), <i>Plesiobatis daviesi</i> (স্মিট্র), <i>Sphyrna zygaena</i> (হাতুড় মস্তকী হাঙর),
সাইক্লয়েড (গোলাকার)/ টিনয়েড (কাঁটাযুক্ত)	Actinopterygii	<i>Tenualosa ilisha</i> (ইলিশ), <i>Labeo rohita</i> (রুই), <i>Clarias batrachus</i> (মাছ), <i>Chitala chitala</i> (চিল)
গ্যানয়েড	Sarcopterygii	<i>Latimeria chalumnae</i> (সিলাকাহ), <i>Neoceratodus forsteri</i> (অস্ট্রেলিয়ান লাইফিশ), <i>Protopterus annectens</i> (আফ্রিকান লাইফিশ)

৬ রুই মাছের পাখনা : রুই মাছের পায়ুর পিছনের অংশটি হলো লেজ। লেজের শেষ প্রান্তে রয়েছে হোমোসার্কাল ধরনের পুচ্ছ পাখনা। এ পাখনার সাহায্যেই রুইমাছ পানির মধ্যে চলাফেরা করে বলে পুচ্ছ পাখনাকে চলন অঙ্গ বলে।

৬ পাখনাসমূহ (Fins) : মাছের চলনঙ্গকে পাখনা বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভেতরে অবস্থিত সমান্তরলভাবে সজ্জিত সূক্ষ্ম শল্যকর অস্ত্রকঙ্কালকে পাখনা-রশ্মি (finrays) বলে। রুই মাছে মোট পাঁচ ধরনের পাখনা দেখা যায়।

- পৃষ্ঠ পাখনায় (১টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৪-১৬টি
- বক্ষ পাখনায় (২টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৭-১৮টি/১৬-১৭টি (অলীম)
- শ্রোণি পাখনায় (২টি) পাখনারশ্মি থাকে → ৯টি
- পায়ু পাখনায় (১টি করে থাকে) পাখনারশ্মি → ৬-৭টি
- পুচ্ছ পাখনায় (১টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৯টি

৬ রুই মাছের ধমনিসমূহ যেখানে রক্ত সরবরাহ করে :

ধমনির নাম	যেখানে রক্ত সরবরাহ করে	ধমনির নাম	যেখানে রক্ত সরবরাহ করে
১. সাবক্র্যাভিয়ান	বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।	৪. রেনাল	বৃক্ক।
২. ইলিয়াক	শ্রোণি পাখনায়।	৫. প্যারাইটাল	দেহ প্রাচীরে।
৩. সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক	পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ইত্যাদি অঙ্গীয় অঙ্গদিতে।	৬. কডাল	পুচ্ছ।

[Ref: মজলুম]

Part 3

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

- অথবন্ধের টার্গামের বড়, চওড়া প্রসারিত অংশটি- প্রোনোটা
- ধমনির গোড়া ক্ষীত হয়ে গঠন করে- বাল্বাস আর্টারিওসাস
- দেহ প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে- প্যারাইটাল ধমনি
- রুই মাছের ফুলকা দেখতে সুতার মতো এবং একেকটি- হোলোব্রাঙ্ক
- আর্চের অন্তঃকিনারা প্রসারিত হয়ে গঠন করে- ফুলকা রেকার
- ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির গোড়া ক্ষীত হয়ে গঠন করে- বাল্বাস আর্টারিওসাস
- ভেন্ট্রাল অ্যাওটার প্রতি পাশ থেকে ধমনি বের হয়- ৪টি
- অঙ্কীয় মহাধমনি সৃষ্টি হয়- বাল্বাস আর্টারিওসাস থেকে
- যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলা থেকে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয়- অর্গানোজেনেসিস
- রুই মাছ Cypriniiformes বর্গের যে গোত্রভুক্ত প্রজাতি- cyprinidae
- রুই মাছের মুখের দুপাশে বারবেল দেখা যায়- ১৫ দিন পর

- (A) হালদা নদীর ময়দা ঘাট এলাকা
 (B) কাপ্তাই লেকের লং জাদু
 (C) বিলাইছড়ি এলাকা
 (D) সবগুলো
- Ans D**

- (C) 8
 (D) 9
- Ans: B**

মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি


১. গ্যাস্ট্রিক জুস/পাচকরস এর বৈশিষ্ট্য ও কাজ :

৫. গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ :	৬. গ্যাস্ট্রিক জুস/পাচকরস :
১. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।	১. ৯৯.৪৫% ই পানি।
২. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান পেপসিন এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।	২. গ্যাস্ট্রিন হরমোনের প্রভাবে নিঃসরণ হয়।
৩. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান রেনিন এনজাইম দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।	৩. একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে দৈনিক প্রায় ২ লিটার উৎপন্ন হয়।
৪. গ্যাস্ট্রিক জুস পাকস্থলির প্রাচীর সুরক্ষা করে।	৪. শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম থাকে না।
৫. কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালক্যালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।	৫. ক্ষরণ হয় ৩টি ধাপে : যথা : ম্যান্ডিবিক → গ্যাস্ট্রিক → অক্সিক

২. জিহ্বায় স্বাদকোরক-এর অবস্থান :

মুখবিবরের মেঝেতে অবস্থিত মাংসল, সংস্কারশীল ও সংবেদন অঙ্গটিকে জিহ্বা বলে। জিহ্বা আবরণী কলা, পেশি ও গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। জিহ্বার আবরণী কলায় স্বাদকোরক বা স্বাদকুঁড়ি (taste buds) এবং প্যাপিলি (papillae) থাকে। স্বাদকোরক খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে। জিহ্বায় তিনপ্রকার গ্রন্থি থাকে। যথা : শ্লেষ্মাকারী গ্রন্থি, সেরাস গ্রন্থি, এবং লসিকা গ্রন্থি। লসিকাগ্রন্থিগুলো সম্মিলিতভাবে লিম্ফয়াল টনসিল গঠন করে।

জিহ্বার কাজ : স্বাদ গ্রহণ, চর্বণ, আবাদন, গলাধঃকরণ এবং শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থ ক্ষরণ করে।



চিত্র : বিভিন্ন স্বাদকোরক

৩. খাদ্য পরিপাকের স্থান :

মানুষের পৌষ্টিক নালির অন্তর্গত মুখবিবর, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রই হলো খাদ্য পরিপাকের স্থান। মানুষের পৌষ্টিক নালির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়।

স্থানের নাম	কী ধরনের খাদ্য পরিপাক হয়	স্থানের নাম	কী ধরনের খাদ্য পরিপাক হয়
মুখবিবর	শর্করা	ক্ষুদ্রান্ত্র	স্বাধীন ধরনের খাদ্য পরিপাক হবে
পাকস্থলি	গুঁড়ু প্রোটিন ও সামান্য লিপিড (পেরিস্টাল্টিস প্রক্রিয়ায়)	বৃহদন্ত্র	ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে পাচন হয়

৪. মানুষের দন্ত সংকেত :

দন্ত সংকেত (Dental formula) : যে সংকেতের সাহায্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দাঁতের সংখ্যা, ধরন ও বিন্যাস বা অবস্থান প্রকাশ করা হয়, তাকে দন্ত সংকেত বলে। বিভিন্ন দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা দাঁতের ধরন বোঝানো হয়। মানুষের মুখবিবরে উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে বিদ্যমান শক্ত, শৃঙ্খলিত গঠনকে দাঁত (teeth) বলে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপরের নিচের চোয়ালে ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানুষের দন্ত সংকেত

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32 \text{টি}$$

সারণি : মানুষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা

প্রধান অংশ	M	P	C	I	I	C	P	M	মোট
উর্ধ্ব চোয়াল	3	2	1	2	2	1	2	3	16
নিম্ন চোয়াল	3	2	1	2	2	1	2	3	16

Note : Molar → M; Canine → C; Pre-molar → p_m

৫. লাল (Saliva) :

লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে লাল বা লালারস বলে। লালা সামান্য অম্লধর্মী (pH : 6.02-7.05); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002-1.012; ফ্রিজিং বিন্দু : 0.07-0.34°C। লালারসের বৈশিষ্ট্য :

লালারস (Saliva)	
১. কিছুটা অম্লীয় এবং অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%)।	৩. খলির প্রাচীরের সেরাস ও মিউকাস কোষ থেকে ক্ষরিত হয়।
২. সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ মিলি লাল ক্ষরণ করে।	৪. টায়ালিন ও মল্টেজ (অল্প) নামক শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম থাকে।

৬. যকৃৎ (Liver) :

যকৃৎ মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। দেহের ওজনের প্রায় ৩-৫%। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যকৃৎ ওজন প্রায় ১.৫-২.০০ কেজি। স্ট্রীলোকে এর ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম কম হয়। মানবদেহের যকৃৎটি ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে উদর-গহ্বররের উপরিভাগে পাকস্থলীর ডানদিকে অবস্থিত।

৭. যকৃৎের গঠন :

- যকৃৎ লালচে বাদামি বর্ণের ত্রিকোণাকার অঙ্গ। গ্রিসন ক্যাপসুল নামক যোজক টিস্যু দ্বারা আবৃত।
- যকৃৎ ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট নামক মেসেন্টারি দ্বারা ডান লোব ও বাম লোবে বিভক্ত।
- যকৃৎের প্রতিটি লোব অসংখ্য লোবিউল বা অ্যাসিনাস নিয়ে গঠিত। প্রতিটি লোবিউল আবার অসংখ্য হেপাটিক কোষ নিয়ে গঠিত।

(i) প্রাজমা প্রোটিন	(iii) পিত্ত	(v) জল	যকৎ সঞ্চিত হয়
(ii) কোলেস্টেরল	(iv) চর্বি	(vi) ইউরিয়া	(i) গ্রুকোজ → গ্লাইকোজেন
শর্করা বিপাকে যকতের ভূমিকা :			(ii) আয়রন
			(iii) A, D, E, K, B ₁₂ , E ₁₂
			(iv) নিকোটিনিক অ্যাসিড

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি	ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1.	<18.5 kg/m ²	শরীরের কম	4.	30.0 – 34.9 kg/m ²	হুলতার ১ম স্তর
2.	18.5 – 24.9 kg/m ²	স্বাভাবিক	5.	35.0 – 39.9 kg/m ²	হুলতার ২য় স্তর
3.	25.0 – 29.9 kg/m ²	আতিরিক্ত	6.	≥ 40.0 kg/m ²	হুলতার ৩য় স্তর

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পানি গ্রহণ আবশ্যিক- (২ - ৩) লিটার
- মানুষের পৌষ্টিক নালিতে পরিপাক সম্পন্ন হয়- আট ধাপে
- মানুষের পৌষ্টিক নালি লম্বায়- (৮ - ১০) মিটার
- মুখগহ্বরের জিহ্বার তলায় অবস্থিত- সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে অবস্থিত- আলজিহ্বা
- নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে- HCl
- "U" আকৃতির ২৫- ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশটি- ডিওডেনাম
- লালামুখির ক্ষরণ পানি ধারণ করে শতকরা- ৯৯.৫০ ভাগ
- লালামুখির ক্ষরণ ইলেকট্রোলাইট ও প্রোটিন ধারা করে শতকরা- ৫০ ভাগ
- অ্যাসিড ও বেসকে প্রশমন (বায়ার) করতে সাহায্য করে- লাল
- টায়ালিন ও মল্টোজ এনজাইম ক্ষরণ করে- সেরোস কোষ
- হিমের লৌহ অংশ যকৃতে জমা থাকে- ফেরিটিন হিসেবে
- যকৃতে প্রায়- ৫০০ ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়
- আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সে কোষগুলোর সংখ্যা- ১০ লাখ

- যকৃৎ ও পেশিতে গ্রাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে- গ্লুকোজ
- প্রাজমা মেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়- ফ্যাটি অ্যাসিড
- মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে- গবলেট কোষ
- নিম্নমাত্রার ওজন ধরা হয় BMI-এর মান- ১৮.৫ এর নিচে হলে
- BMI-এর মাত্রা ৫০-১০০ হলে এই স্থলতাকে বলে- মরবিড স্থলতা
- প্রতিবার গর্ভধারণে নারীদেহে ওজন বেড়ে যায়- ৪-৬ পাউন্ড
- নারীদেহে স্থলতার একটি প্রধান কারণ- পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম
- পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে বাধা দেয়- সিক্রেটিন
- প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও শ্বেত বস্তুর বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে- কর্টিসল
- ইমালসিফিকেশনে ভূমিকা রাখে- পিত্তরস
- ল্যাকটেজ এনজাইম কোন খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত- শর্করা
- গিসেলি ক্ষুদ্রান্ত্রে আবরণী কলায় শোষিত হয়- ব্যাপন প্রক্রিয়ায়
- কাইলোমাইক্রোনের উপাদান- প্রোটিন ও লিপিড
- খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ঘটে- বৃহদন্ত্রে

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

- কোনটি মিশ্র প্রকৃতির গ্রন্থি?
A অগ্ন্যাশয় B লালামুখি C যকৃৎ D পিটুইটারি (Ans A)
- বৃহদন্ত্রের অংশ হলো-
A ডিওডেনাম B ইলিয়াম C সিকাম D জেজুনা (Ans C)
- পাকস্থলী প্রাচীরের প্যারাটাইল কোষ থেকে নিঃসৃত হয় কোনটি?
A পেপসিনোজেন B HCl C মিউসিন D গ্যাসট্রিন (Ans B)
- দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি?
A ইনসিসর B ক্যানাইন C প্রিমোলার D মোলার (Ans C)
- ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি?
A ডিওডেনাম B সিকাম C জেজুনা D ইলিয়াম (Ans B)
- মানুষের কত জোড়া লালামুখি থাকে?
A এক জোড়া B দুই জোড়া C তিন জোড়া D চার জোড়া (Ans C)
- ল্যাকটিয়েল-এর অবস্থান কোথায়?
A যকৃতে B অগ্ন্যাশয়ে C ক্ষুদ্রান্ত্রে D পাকস্থলীতে (Ans C)
- পরিপাকে সাহায্যকারী উৎসেচক কোনটি?
A গ্রুকাগন B এড্রিন্যালিন C ইনসুলিন D সিক্রেটিন (Ans B)
- সুক্রোজ হলো-
A অগ্ন্যাশয় রস B আক্টিক রস C পিত্ত রস D গ্যাস্ট্রিক রস (Ans B)
- কোন স্তরে গবলেট কোষ থাকে?
A সেরোসা B মিউকোসা C সাব-মিউকোসা D মাসকিউলারিস মিউকোসা (Ans B)
- 'কেসিন' কোন ধরনের উপাদান?
A শর্করা B প্রোটিন C ফ্যাট D ভিটামিন (Ans B)
- ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন স্তরে গবলেট কোষ থাকে?
A সেরোসা B মিউকোসা C সাবমিউকোসা D মাসকিউলারিস মিউকোসা (Ans B)
- কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয়?
A যকৃৎ B অগ্ন্যাশয় C হৃৎপিণ্ড D ফুসফুস (Ans A)
- কোনটি শর্করা পরিপাককারী এনজাইম?
A রেনিন B টায়ালিন C প্রোরেসিন D পেপসিন (Ans B)
- গবলেট কোষ পাওয়া যায় কোন অঙ্গে?
A ফুসফুস B অত্র C অগ্ন্যাশয় D যকৃৎ (Ans B)
- মানুষের অ্যাপেনডিক্স পরিপাক নালির কোন অংশের সাথে যুক্ত?
A জেজুনা B ইলিয়াম C সিকাম D কোলন (Ans C)
- যকৃতে শর্করা জমা থাকে-
A গ্লুকোজ হিসেবে B গ্লিসারল হিসেবে C গ্রাইকোজেন হিসেবে D সেলুলোজ হিসেবে (Ans C)
- দাঁতের এনামেল গঠিত হয় কোন স্তর হতে?
A এক্টোডার্ম B এন্ডোডার্ম C মেসোডার্ম D সবগুলো (Ans A)
- অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিডারে সঞ্চিত সুগার হলো-
A গ্লুকোজ B ফুক্টোজ C গ্রাইকোজেন D সুক্রোজ (Ans C)
- কোনটি পাকস্থলী হতে নিঃসৃত হয় না?
A ট্রিপসিন B পেপসিন C HCl D কোনোটিই নয় (Ans A)
- কোন জাতীয় পদার্থের আর্দ্র বিশ্লেষণে অ্যামাইলেজ এনজাইমটি ব্যবহৃত হয়?
A স্টার্চ B চর্বি C সেলুলোজ D আমিষ (Ans A)
- প্রোটিন তৈরির কাঁচামাল হলো-
A গ্লুকোজ B ডি এন এ C আর এন এ D অ্যামাইনো অ্যাসিড (Ans D)
- লাইপেজ কোন জাতীয় খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়?
A কার্বোহাইড্রেট B প্রোটিন C লিপিড D জৈব অ্যাসিড (Ans C)
- পাকস্থলীর গ্রন্থিহীন কয়টি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত?
A তিনটি B চারটি C পাঁচটি D দুইটি (Ans C)
- লালামুখিতে বিদ্যমান এনজাইমের নাম কী?
A ট্রিপসিন B পেপসিন C লাইপেজ D লাইসোজাইম (Ans D)
- যকৃতে হিম এর লৌহ অংশ কী হিসাবে সঞ্চিত থাকে?
A ফেরাস B ফেরিক C ফেরিটিন D কোনোটিই নয় (Ans C)
- অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার কোথায় উন্মুক্ত হয়?
A পাকস্থলী B ডিওডেনাম C পিত্তথলি D ইলিয়াম (Ans B)

মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সংশ্লেষণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

রক্তকণিকা (Blood corpuscles) :

রক্ত ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলে। এগুলো হেমাটোপোয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এগুলো অন্যান্য কোষের মতো খণ্ডিত হয়ে স্ট্রোমাল কোষ না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়। রক্তকণিকা তিন ধরনের। যথা : (ক) এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা (খ) লিম্ফোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা (গ) থ্রোম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা।

মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে)	উৎসস্থল	কাজ	আয়ুষ্কাল
পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ	অস্থিমাধ্যম যকৃৎ, গ্রীহা ও থাইমাস এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জার হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক কোষ থেকে।	১. O_2 ও CO_2 বহন করে। ২. অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে। ৩. রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা রক্ষা করে। ৪. বিলিকুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদন করে।	১২০ দিন (৪ মাস)

[Ref: মাজেদা + আশরাফ]

মানবদেহে শ্বেত রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে)	উৎসস্থল	কাজ	আয়ুষ্কাল
নিউট্রোফিল	৩-৬ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে।	২-৪ দিন
ইওসিনোফিল	১০০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা	অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে।	৮-১২ দিন
বেসোফিল	২৫-২০০	লাল অস্থিমজ্জা	হেপারিন নিঃসরণ করে রক্তকে রক্ত বাহিকার ভেতর জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়।	১২-১৫ দিন
লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	গ্রীহা, যকৃৎ, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে।	সপ্তাহ থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী
মনোসাইট	৩৫০-৮০০	যকৃৎ, গ্রীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	দেহের কোনো স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখানকার লিম্ফোসাইটগুলো ফাইব্রোস্ট গঠন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করা।	২-৪ দিন

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ :

১. লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট উভয়ই প্লাজমা প্রোটিন থেকে ট্রিফেন নামক কলাকোষের পুষ্টিকারক পদার্থ ক্ষরণ করে।

২. ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নিঃসরণ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

মানবদেহে অণুচক্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে)	উৎসস্থল	কাজ	আয়ুষ্কাল
২.৫ লাখ-৫ লাখ	লাল অস্থিমজ্জা	১. রক্ততঞ্চনে সহায়তা করা। ২. হিমোস্ট্যাটিক প্রাণ তৈরি। ৩. ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কার্বন কণা, ইমিউন কমপ্লেক্স ও ভাইরাসকে ভক্ষণ করে।	৫-১০ দিন

রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা (Blood clotting) :

যে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বেঁধে দেহ থেকে অব্যাহিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা বলে। রক্ততঞ্চনে অণুচক্রিকা ও ফাইব্রিনোজেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

রক্ত জমাট বাঁধার প্রধান (চারটি) ফ্যাক্টর মনে রাখার উপায় : উপাদান ৪টি হলো : (ছন্দ) - ফুল পড়ে টুপ করে।

	ফুল	পড়ে	টুপ	করে
ছন্দ	↓	↓	↓	↓
তথ্য	ফিব্রিনোজেন	প্রোথ্রম্বিন	টিস্যু থ্রম্বোপ্লাস্টিন	Ca^{2+}

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত জমাট না বাঁধার কারণ :

১. রক্ত প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম প্রবাহমান থাকে।

২. রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর হেপারিন থাকায়।

৩. রক্তনালির এন্ডোথেলিয়াম প্রাচীর অত্যন্ত মসৃণ থাকায়।

৪. সক্রিয় কোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে যকৃৎ কর্তৃক সর্বদা অপসারিত হওয়ায়।

[Ref: আজমল]

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে প্রায়- ১৬ গ্রাম
- এরিত্রোসাইট সৃষ্টিকে বলে- এরিত্রোপোয়েসিস
- রক্তে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপন্ন করে- লোহিত রক্তকণিকা
- গ্র্যানিউলোসাইটের নিউক্লিয়াস- (২-৭টি) খণ্ডযুক্ত
- অস্থিমজ্জার যে কোষ থেকে গ্র্যানিউলোসাইট উৎপন্ন হয়- মায়োলোস্ট
- গ্র্যানিউলোসাইটের আয়ুষ্কাল মাত্র- (৪-৮) ঘণ্টা
- গ্র্যানিউলোসাইটের দানাগুলো রঞ্জিত হয়- লিইশম্যান রঞ্জকে
- শ্বেত রক্তকণিকার প্রতি মাইক্রোলিটারে নিউট্রোফিল থাকে- ৪৯০০টি
- শ্বেত রক্তকণিকার প্রতি মাইক্রোলিটারে বেসোফিল থাকে- ৩৫টি
- দেহের মোট ওজনের - প্রায় ৭-৮% রক্ত
- সর্বপ্রথম রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন- উইলিয়াম হার্ভে
- পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় প্রায় পরিমাণ- ৩ লিটার
- মানবদেহের পাম্পযন্ত্র রূপে কাজ করে- হৃৎপিণ্ড

- সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিণ্ড গড়ে স্পন্দিত হয়- ২৬০০ মিলিয়ন বার
- প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীতে হৃৎপিণ্ডের ওজন- (২০০-২৭৫) গ্রাম
- হৃৎপিণ্ডের চওড়া উর্ধ্বমুখী অংশটি- বেস
- সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা কোন প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়- বাম নিলয়
- ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলার সময় কোন শব্দের সৃষ্টি হয়- লাব সঙ্গ
- মানুষের রক্তসংবহন- দ্বি-চক্রীয় সংবহন
- অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনি রক্ত সংবহন করে কোথায়- মস্তিষ্কে
- হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে- ইসিজি
- পেসমেকারে অপরিবাহী আবরণযুক্ত তার থাকে- (১-৩) টি
- বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত- করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টি
- মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যানজাইনা বেশি দেখা যায়- ৬৫ বছর বয়সে
- হৃৎপিণ্ডে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের ফলে সৃষ্টি হয়- হার্ট অ্যাটাক
- হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম- মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

- হৃদস্পন্দনে অ্যাকটিনের সিস্টোলার সময়কাল কত?
 (A) ০.১ সে. (B) ০.৩ সে.
 (C) ০.৫ সে. (D) ০.৭ সে. **Ans (A)**
- বাইকাসপিড কপাটিকার অবস্থান কোথায়?
 (A) বাম নিলয় ও মহাধমনির মাঝে
 (B) ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে
 (C) বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে
 (D) ডান অলিন্দ ও উর্ধ্ব মহাধারার মাঝে **Ans (C)**
- মায়োফাইব্রিল কোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত?
 (A) অ্যাকটিন ও জিলাটিন (B) মায়োসিন ও ইলাস্টিন
 (C) কোলাজেন ও মায়োসিন (D) মায়োসিন ও অ্যাকটিন **Ans (D)**
- কোনটি হৃৎপিণ্ডের অংশ?
 (A) ক্যানালিকুলি (B) ইন্টারক্যালেটেড
 (C) পেশি সূত্র (D) কন্ড্রোসাইট **Ans (B)**
- নিম্ন মহাধারা ও ডান অ্যাকটিনের সংযোগস্থলে অবস্থিত কপাটিকার নাম কি?
 (A) মাইট্রাল (B) অ্যাওর্টিক
 (C) ইউস্টেশিয়ান (D) ত্রিপত্র **Ans (B)**
- কৃত্রিম পেসমেকারের ব্যাটারি কিসের তৈরি?
 (A) ক্যাডমিয়াম (B) লিথিয়াম
 (C) অ্যালুমিনিয়াম (D) ইউরেনিয়াম **Ans (B)**
- SAN থেকে AVN এ হৃদউদ্দীপনা পৌছাতে সময় লাগে কত সেকেন্ড?
 (A) ০.০৫ (B) ০.০১
 (C) ০.০৭ (D) ০.০৩ **Ans (D)**
- ২৫ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তির হৃদস্পন্দন মিনিটে ৮০ বার হলে তার কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল কত?
 (A) ০.৮৩ (B) ০.৮০
 (C) ০.৭৫ (D) ০.৭২ **Ans (C)**
- পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে কত গ্রাম লৌহ থাকে?
 (A) ১ (B) ২ (C) ৩ (D) ৪ **Ans (B)**
- নিচের কোন কোন অঙ্গে এরিত্রোসাইট ধ্বংস হয়?
 (A) যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় (B) লসিকা গ্রন্থি ও টনসিল
 (C) যকৃৎ ও প্লীহা (D) বৃক্ক ও অস্থিমজ্জা **Ans (C)**
- অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তাকারী রক্তকণিকার নাম কি?
 (A) লিফোসাইট (B) মনোসাইট
 (C) এরিত্রোসাইট (D) থ্রোম্বোসাইট **Ans (C)**
- হৃৎপিণ্ডের কোন প্রাচীর সংকোচন প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে?
 (A) পেরিকার্ডিয়াম (B) এপিকার্ডিয়াম
 (C) এন্ডোকার্ডিয়াম (D) মায়োকার্ডিয়াম **Ans (D)**
- মাইট্রাল ভাল্ব-এর অবস্থান কোথায়?
 (A) বাম নিলয় ও মহাধমনি (B) বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়
 (C) ডান অলিন্দ ও সুপিরিয়র ভেনাকভা (D) ডান অলিন্দ ও ডান নিলয় **Ans (B)**
- শ্বেত রক্তকণিকার কাজ হলো-
 (A) বিলিরুবিন উৎপন্ন (B) রক্ততঞ্চন
 (C) রক্তের সান্দ্রতা রক্ষা (D) হেপারিন উৎপন্ন **Ans (D)**
- কোনটিকে মানুষের হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার বলা হয়?
 (A) সাইনো অ্যাকট্রিয়াল নোড (SAN) (B) অ্যাকট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড (AVN)
 (C) পার্কিনজি তন্তু (D) বাডল অব হিজ **Ans (A)**
- রক্তে প্রবেশকৃত কুমির লার্ভা ও অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে কোন ধরনের রক্তকণিকা?
 (A) নিউট্রোফিল (B) মনোসাইট
 (C) ইওসিনোফিল (D) লিউকোসাইট **Ans (C)**
- ডায়াফ্রামে রক্ত সরবরাহ করে কোন ধমনি?
 (A) বৃক্কীয় (B) ফ্রেনিক
 (C) সাবক্ল্যাভিয়ান (D) ক্যারোটিড **Ans (B)**
- মানুষের হৃৎপিণ্ডে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল হলে নিচের কি ঘটবে?
 (A) সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যাবে
 (B) বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হবে
 (C) সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হবে
 (D) ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যাবে **Ans (C)**
- স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্ততঞ্চনকাল কত?
 (A) 3-5 min (B) 2-4 min
 (C) 3-4 min (D) 4-5 min **Ans (D)**
- বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এক নম্বর মরণব্যাপি কোনটি?
 (A) হৃদরোগ (B) হার্ট ডিজিস
 (C) কার্ডিওভাসকুলার ডিজিস (D) সবগুলো **Ans (D)**
- নিচের কোন পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়?
 (A) ETT (B) BNP
 (C) MRI (D) কোনোটিই নয় **Ans (B)**
- অ্যানজাইনার লক্ষণ নয় কোনটি?
 (A) উরঃফলকের পেছনে ব্যথা (B) ব্যথা ৫-১০ মিনিট স্থায়ী হয়
 (C) দম ফুরিয়ে যাওয়া (D) মাথা কিম্বিকিম করা **Ans (B)**

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System of Human) :

জীবের যে তন্ত্র দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিময় প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাকে শ্বসনতন্ত্র বলে। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের O_2 দেহে প্রবেশ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা : বায়ুগ্রহণ ও বায়ুত্যাগ অঞ্চল, বায়ু পরিবহন অঞ্চল ও শ্বসন অঞ্চল।

২. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ :

উর্ধ্ব শ্বসননালি (বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল)	১. নাসিকা (nostril), ২. নাসা গলবিল (nasopharynx), ৩. স্বরযন্ত্র (larynx)।
নিম্ন শ্বসননালি (বায়ু পরিবহন অঞ্চল)	৪. শ্বাসনালি (trachea) ৫. ব্রঙ্কি (bronchi) ৬. প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল (terminal bronchioles)
ফুসফুস (শ্বসন অঞ্চল)	৭. শ্বসন ব্রঙ্কিওল (respiratory bronchioles)
	৮. অ্যাক্সিয়াম (atrium) ৯. অ্যালভিওলাস (alveolus)
	১০. অ্যালভিওলার নালি (alveolar duct) ১১. অ্যালভিওলার থলি (alveolar sac)

(Ref: আলিম)

৩. বায়ু বিভাগ ও বায়ুর পরিমাণ নিচে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

বায়ু বিভাগ	বায়ুর পরিমাণ	বায়ু বিভাগ	বায়ুর পরিমাণ
১. টাইডাল ভলিউম (tidal volume)	500 মিলিলিটার	৪. দৌড়বিদদের বায়ু ধারণক্ষমতা	6000 মিলিলিটার
২. রেসিডুয়াল ভলিউম (residual volume) বা অবশিষ্ট ঘনমান বায়ু	1500 মিলিলিটার	৫. প্রশ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু	2-3.3 লিটার
৩. ভাইটাল ক্যাপাসিটি (vital capacity) বা বায়ু ধারণক্ষমতা	4500 মিলিলিটার	৬. নিঃশ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু	1 লিটার

৪. বিভিন্ন গ্যাসের শতকরা পরিমাণ :

গ্যাস	প্রশ্বাস বায়ু	নিঃশ্বাস বায়ু	বায়ুথলির বায়ু
অক্সিজেন	২০.৯৪%	১৬.৪%	১৪.২%
কার্বন ডাইঅক্সাইড	০.০৪%	৪.০%	৫.৫%
নাইট্রোজেন	৭৯.০২%	৭৯.৬%	৮০.৩%

৫. শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেট (Respiration Quotient or RQ) :

শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেট বলে।

৬. বিভিন্ন বয়সের মানুষের শ্বসন হার :

বয়স (বছর)	প্রতি মিনিটে শ্বসন হার	বয়স (বছর)	প্রতি মিনিটে শ্বসন হার
১ম বছর	১৪ - ৬০ বার	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১০ - ১৮ বার
২ - ৪ বছর	২৫ - ৩৫ বার	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী	১০ - ১৮ বার
৫ - ১৪ বছর	১০ - ২৫ বার		

৭. সাইনাসের নাম, অবস্থান ও প্রদাহ :

সাইনাস গহ্বরগুলো তরলে পূর্ণ হলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে সাইনুসাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে মানবদেহে চার ধরনের সাইনাস রয়েছে।

নিচে এদের নাম, অবস্থান ও প্রদাহের ধরন উল্লেখ করা হলো :

সাইনাসের নাম	অবস্থান	প্রদাহের ধরন
১. ম্যাক্সিলারি সাইনাস	ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালে)	ম্যাক্সিলারি সাইনাস সংক্রমিত হলে ম্যাক্সিলা অঞ্চলে বা গালে চাপ প্রয়োগে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়া মাথা ব্যথা ও দাঁত ব্যথা হয়।
২. ফ্রন্টাল সাইনাস	ফ্রন্টাল সাইনাস চোখের ওপরে অবস্থিত	এক্ষেত্রে ফ্রন্টাল সাইনাস গহ্বর সংক্রমিত হয়। ফলে চোখের ওপরে চাপ প্রয়োগে ব্যথা ও মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।
৩. এথময়ডাল সাইনাস	দু'চোখের মাঝখানে	দু'চোখের মাঝখানে ও পিছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এর সাথে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।
৪. স্ফেনয়ডাল সাইনাস	চোখের পেছনে	দুই চোখের পিছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়াও মাথার চূড়ায় ব্যথা বা চাপ অনুভূত হয়।

৮. ওটিটিস মিডিয়া (Otitis Media) :

কানের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে ওটিটিস (otitis) বলে। মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে ওটিটিস মিডিয়া (Otitis media) বা মধ্যকর্ণের সংক্রমণও বলে। কানের পর্দা ও অন্তঃকর্ণের মাঝে বিদ্যমান ইউস্টেশিয়ান নালিতে (eustachian tube) ওটিটিস মিডিয়া হয়।

৬. ওটিটিস মিডিয়ায় কারণ :

১. কোনো কারণে আভিনয়েড ফুলে গেলে।
 ২. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে।
 ৩. মাতৃদুগ্ধ পান না করলে বা কম করলে।
 ৪. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠাণ্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।
 ৫. প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। Respiratory syncytial virus (RSV), Influenza virus, Rhinovirus এবং Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে।
৬. বিভিন্ন প্রকার ওটিটিস মিডিয়ায় নাম ও জটিলতাসমূহ :

ওটিটিস মিডিয়ায় নাম	জটিলতা
১. স্বল্প স্থায়ী বা অ্যাকিউট ওটিটিস মিডিয়া। একে তীব্র কর্ণপ্রদাহ বলে।	১. মধ্যকর্ণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। ২. উর্ধ্ব শ্বাসনালি আক্রান্ত ইউস্টেশিয়ান নালির প্রতিবন্ধকতা।
২. দীর্ঘ স্থায়ী বা ক্রনিক ওটিটিস মিডিয়া। একে তরল জমাট কর্ণপ্রদাহ বলে।	১. কানের পর্দা ফুটো হয়ে পুঁজ বা তরল পদার্থ বের হয়। ২. শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।
৩. অ্যাডহেসিভ ওটিটিস মিডিয়া।	১. কানের পর্দা মধ্যকর্ণের কোনো স্থানে বা অস্থিতে আটকে যায়। ২. রোগী বধির হয়ে যায়।

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- মানুষের শ্বসন অঙ্গ- একজোড়া ফুসফুস
- নাকের ভেতরে ছাঁকনির মতো বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে- ভেস্টিবিউল
- নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয়- কোয়ানি
- শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়াতে তরুণাঙ্গির সংখ্যা- ১৬-২০ টি
- বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয় তার নাম- ব্রঙ্কাই
- ফুসফুসের বাইরের স্তরের নাম- প্যারাইটাল স্তর
- ফুসফুসের ভেতরের স্তরের নাম- ভিসেরাল স্তর
- ক্লোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত- অ্যালভিওলাস
- অ্যালভিওলাসে আগত জীবাণুকে ধ্বংস করে- সারফেকট্যান্ট
- ফুসফুসীয় কলা সংরক্ষণ ও বিমুক্ত করে- সেরোটোনি ও হিস্টামিন
- শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) বিনিময়ের স্থান- অ্যালভিওলাই
- লোহিত রক্ত কণিকার মাধ্যমে CO_2 পরিবাহিত হয়- $KHCO_3$ রূপে

- পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে লৌহ থাকে- ৩ গ্রাম
- শ্বাসপেশিতে স্নায়ুস্পন্দন পাঠায়- শ্বাসকেন্দ্র
- কোষে খাদ্যবস্তুর সংঘটিত হয়- জারণ ক্রিয়া
- খাদ্যের জারণ বেশি হয়- শর্করার
- কোষের সাইটোপ্লাজমের তরল অংশে সংঘটিত হয়- গ্রাইকোলাইসিস
- পাইরুভেট অক্সিডেশন সংঘটিত হয়- কোষের সাইটোপ্লাজমে
- ক্রেবস চক্র সংঘটিত হয়- মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে
- ঘনত্বের প্রতি সংবেদী কেমোরিসেপ্টরগুলো থাকে- মেডুলায়
- CO_2 রক্তের প্লাজমার সাথে যুক্ত হয়- ৫%
- ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালে) অবস্থিত- ম্যাক্সিলারি সাইনাস
- দু' চোখের মাঝখানে অবস্থিত- এথময়েড সাইনাস
- ওটিটিস মিডিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়- শিশুরা

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কোন সাইনাসের প্রদাহের কারণে গালে, দাঁতে ও মাথায় ব্যথা হয়?
 (A) ফ্রন্টাল (B) এথময়েড
 (C) ম্যাক্সিলারি (D) ফেনয়ডাল **Ans (C)**
০২. সারফেকট্যান্ট কোথায় পাওয়া যায়?
 (A) অ্যালভিওলাসে (B) ট্রাকিয়ায় (C) ব্রঙ্কাসে (D) নাসারন্ধ্রে **Ans (A)**
০৩. কোথায় সেরাস ফুইড পাওয়া যায়?
 (A) ফুসফুস (B) ব্রঙ্কাস
 (C) ট্রাকিয়া (D) অ্যালভিওলাস **Ans (A)**
০৪. কোন রোগে অ্যালভিওলাস ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়?
 (A) ব্রঙ্কাইটিস (B) এমফাইসেমা
 (C) প্রুরোসি (D) নিউমোনিয়া **Ans (B)**
০৫. কত সপ্তাহ বয়স হতে মানব জ্রুণে সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়?
 (A) ২২ (B) ২৩ (C) ২৪ (D) ২৫ **Ans (B)**
০৬. বাম ফুসফুসের লোবিওল সংখ্যা কতটি?
 (A) ৬ (B) ৭ (C) ৮ (D) ৯ **Ans (C)**
০৭. মানুষের ফুসফুসে মোট কয়টি লোব বিদ্যমান?
 (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫ **Ans (D)**
০৮. ফুসফুসের প্রদাহকে কি বলা হয়?
 (A) ওটিটিস মিডিয়া (B) সাইনুসাইটিস
 (C) এলার্জি (D) এমফাইসেমা **Ans (D)**
০৯. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে এপিগ্লটিস অবস্থিত?
 (A) শ্বাসনালি (B) স্বরযন্ত্র
 (C) গলবিল (D) ভেস্টিবিউল **Ans (B)**

১০. প্রতি ১০০ মিলি. রক্তে কতটুকু অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়?
 (A) ০.১% (B) ০.২% (C) ২.০% (D) ১০.০% **Ans (B)**
১১. ওটিটিস মিডিয়া কোন অঙ্গে দেখা যায়?
 (A) কর্ণ (B) নাক
 (C) মুখগহ্বর (D) ফুসফুস **Ans (A)**
১২. কোনটি হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন?
 (A) হিস্টিডিন (B) লিউসিন
 (C) আরজিনিন (D) ফিনাইল-অ্যালানিন **Ans (C)**
১৩. মুখমণ্ডলে হাড়ের ভেতরে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ গহ্বরের নাম কী?
 (A) সাইনাস (B) ম্যাক্সিলিন
 (C) ওটিটিস (D) ওটিটিস মিডিয়া **Ans (A)**
১৪. কোন অঙ্গে O_2 এবং CO_2 এর বিনিময়ে ঘটে?
 (A) ব্রঙ্কাস (B) ট্রাকিয়া
 (C) ব্রঙ্কিউল (D) অ্যালভিওলাস **Ans (D)**
১৫. ফুসফুসের প্রাচীরের কোষ থেকে কী নিঃসৃত হয়?
 (A) সেরাস ফুইড (B) সারফেকট্যান্ট
 (C) পেরিকার্ডিয়াল তরল (D) ভিট্রিয়াস ফুইড **Ans (B)**
১৬. ফুসফুসের সর্বমোট বায়ু ধারণক্ষমতাকে কী বলে?
 (A) রেসিডুয়াল ভলিউম (B) ভাইটাল ক্যাপাসিটি
 (C) টাইডাল ভলিউম (D) টাইডাল বায়ু **Ans (B)**
১৭. ট্রাকিয়া কী দিয়ে গঠিত?
 (A) অস্থি (B) তরুণাঙ্গি
 (C) শিরা (D) ধমনি **Ans (B)**

মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. বৃক্ক (Kidney) :

মানুষের উদর গহ্বরের পশ্চাৎ প্রাচীর সংলগ্ন মেরুদণ্ডের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক বিদ্যমান। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে যে অপ্রতিসাম্যতা হয় তাতে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্ক থেকে কিছুটা উপরে অবস্থান করে। বৃক্কের উর্ধ্ব অংশ ১১ তম ও ১২ তম পর্শ্বকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

২. বৃক্কের ভূমিকা/কাজ :

১. রক্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য অপসারণে ভূমিকা রাখে।
২. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। হরমোন এবং এনজাইম নিষ্কাশনে ভূমিকা রাখে।
৩. দেহে প্রবর্তিত প্রতিবিষ ও ভেজ পদার্থসমূহ দেহ থেকে অপসারণে ভূমিকা রাখে।
৪. রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।
৬. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
৭. যথাযথ আয়নিক কম্পোজিশন বজায় রাখে।

২. মূত্র (Urine) :

নেফ্রনের রেনাল টিউবুলসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রখলিতে জমা হতে থাকে মূত্র (Urine) বলে।

৩. মূত্রের বৈশিষ্ট্য :

১. পরিমাণ	প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্ক প্রতিদিন ০.৫-২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয় যা ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ ঘটায়।
২. বর্ণ	স্বাভাবিক মূত্র হালকা হলুদ বা খড় বর্ণের মূত্রে ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি খড় বা হালকা হলুদ বর্ণের হয়।
৩. গন্ধ	এটি ঝাঁঝালো বা অ্যারোমেটিক গন্ধবিশিষ্ট। মূত্রে ইউরিনোড (C_6H_8O) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে এরূপ গন্ধ হয়।
৪. রাসায়নিক ধর্ম	মূত্র সামান্য অম্লীয়, এর pH মান ৫.০-৬.৫
৫. আপেক্ষিক গুরুত্ব	মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮-১.০৩০

৪. মূত্রের প্রধান উপাদানগুলোর নাম ও শতকরা পরিমাণ :

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩-৫%) কঠিন পদার্থ। নিচে ছক আকারে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো দেখানো হলো :

জৈব উপাদান শতকরা হার				অজৈব উপাদান শতকরা হার			
ইউরিয়া	২	ক্রিয়েটিনিন	০.০৭	সোডিয়াম	০.৩৫	ক্লোরাইড	০.৬০
ইউরিক অ্যাসিড	০.০৫	ক্রিটোন বডি	০.০২	পটাশিয়াম	০.১৫	সালফেট	০.১৬
হিপপিউরিক অ্যাসিড	০.০৫	ক্রিয়েটিন	০.০১	অ্যামোনিয়াম	০.০৮	ফসফেট	০.২৭
				ম্যাগনেশিয়াম	০.০১	ক্যালসিয়াম	০.০৩

[Ref: আজ্ঞা]

৩. রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়া :

রক্ত ও মূত্রের বিভিন্ন কাজে একাধিক হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন (Anti Diuretic Hormone-ADH), অ্যালডোস্টেরন (aldosterone), এরিথ্রোপোয়েটিন (erythropoietin), প্রোস্টাগ্লান্ডিন (prostaglandin) এবং অ্যানজিওটেনসিন (angiotensin) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবদেহে মূত্রের ঘনত্ব, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ও রক্তের pH নিয়ন্ত্রণে হরমোনের ক্রিয়া সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ	• থাইরক্সিন হরমোন দেহকোষে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। • ADH বা ভ্যাসোপ্রেসিন সামগ্রিকভাবে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ	• এক্ষেত্রে প্যারাথাইরয়েড ও অ্যালডোস্টেরন কাজ করে।
রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ	• দেহের সোডিয়াম লবণ রক্তের pH ঠিক রাখে। • রক্তে প্রাজমার স্বাভাবিক pH ৭.৪। • মূত্রের pH ৪.৫-৮.৫ পর্যন্ত হতে পারে।

[Ref: আজ্ঞা]

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়- ৮০%
- বৃক্কের ওপরের প্রান্ত অবস্থিত- দ্বাদশ খোরাসিক কশেরুকার নিচে
- বৃক্কের নিচের প্রান্ত অবস্থিত- তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার ওপরে
- প্রথম বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা দেন- বোম্যান
- বৃক্কের কটেজ অবস্থিত- রেনাল করপাসল
- ভিসেরাল স্তরের বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষ- পোডোসাইট
- নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকায় সংঘটিত হয়- নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ
- কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে গঠন করে- ডাক্ট অব বেলিনি
- বৃক্কীয় বা রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে- হাইলামের মাধ্যমে
- ইউরেটার ও বৃক্কীয় রেনাল শিরা বৃক্ক থেকে বের হয়- হাইলামের মাধ্যমে
- বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে টুপি মতো আচ্ছাদন করে অবস্থান করে- অ্যাদ্রেনাল গ্রন্থি
- বৃক্কের বাইরে দিকের রেনাল ক্যাপসুল সংলগ্ন অংশ- রেনাল কটেজ
- রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌছায়- ইউরিয়া
- মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত প্রবাহিত হয়- ১২০০ সিসি
- রক্তের দ্রাব্য বস্তু পরিশুদ্ধ হয়- কার্যকর পরিশোধন চাপের মাধ্যমে
- প্রশাবের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে- বহুমূত্র রোগ
- দেহ তরলের অভিশ্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে- অসমোরিসেন্ট
- দেহের রক্ত ও কোষের-কলার অভিশ্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে- বৃক্ক
- রক্তের রক্তরস ও রক্তকণিকার পরিমাণ নিদিষ্ট রাখে- বৃক্ক
- দেহের পেশির কলা ও প্রোটিনের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়- ক্রিয়েটিনিন
- ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড রক্ত থেকে নিষ্কাশিত হয়- ছাঁকন পদ্ধতিতে
- রক্তের প্রাজমায় সোডিয়ামের মাত্রা স্থির রাখে- অ্যালডোস্টেরন
- অ্যাসিডিটি বেড়ে যাওয়ার কারণ- কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন CO_2
- প্রায় ৭০% কিডনি বিকলের জন্য দায়ী- ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ



১১. নিচের যে হরমোনটি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের সাথে জড়িত-
 (A) সোমটোট্রপিক হরমোন (B) ইনসুলিন
 (C) ADH (D) টেস্টোস্টেরন **Ans C**
১২. যে রোগে মূত্র বিলিরুবিন পাওয়া যায়-
 (A) ডায়াবেটিস (B) জডিস
 (C) হাইপোগ্লাইসেমিয়া (D) নেফ্রাইটিস **Ans B**
১৩. জনকজন নীড়িয়ে থাকলে মূত্রের যে উপাদানটি বেড়ে যেতে পারে-
 (A) ইউরিয়া (B) গ্লুকোজ
 (C) প্রোটিন (D) ক্রিটোন বডি **Ans C**
১৪. একজন স্বাভাবিক মানুষের মূত্রের pH কত?
 (A) 4.5 (B) 6.0
 (C) 7.0 (D) 8.5 **Ans B**
১৫. বেশি নিম্নত কোন রাসায়নিক পদার্থ বৃক্কের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়?
 (A) সিক্রেটিন (B) গ্লুকাগন
 (C) কোলেসিস্টোকাইনিন (D) মায়োগ্লোবিন **Ans D**
১৬. ডায়ালাইসিস কত প্রকার?
 (A) ২ (B) ৩
 (C) ৪ (D) ৫ **Ans A**
১৭. কোন পদার্থের কারণে মূত্রের রং খড়ের মতো হয়?
 (A) ইউরিয়া (B) অ্যামোনিয়া
 (C) ক্রিয়েটিনিন (D) ইউরোক্রেম **Ans D**
১৮. ইউরিয়া প্রধানত কোথায় তৈরি হয়?
 (A) পাকস্থলীতে (B) যকৃতে
 (C) অগ্ন্যাশয়ে (D) হৃদ্রাশ্রে **Ans B**
১৯. গ্রোমেরুলাস ফিল্ট্রেটের অধিকাংশ পুনঃশোষিত হয় কোন অংশে?
 (A) নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা (B) হেনলির লুপ
 (C) দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা (D) সংগ্রাহক নালিকা **Ans A**
২০. নিচের কোনটি ডাইইউরেটিকস পদার্থ নয়?
 (A) চা (B) কফি
 (C) মূড়ি (D) লবণাক্ত পানি **Ans C**
২১. হেনলির লুপে কত % পানি পুনঃশোষিত হয়?
 (A) ১৫% (B) ৫০%
 (C) ৭০% (D) ৮০% **Ans C**
২২. মূত্রের উপাদান নয় কোনটি?
 (A) ক্রিয়েটিনিন (B) ইউরিক অ্যাসিড
 (C) বিলিরুবিন (D) ইউরোক্রেম **Ans C**
২৩. মূত্রের রচনাতন্ত্রের সাহায্যে দেহের প্রায় কত শতাংশ রচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়?
 (A) ৭০ (B) ৮০
 (C) ৯০ (D) ১০০ **Ans B**
২৪. দেহ কোষের অঙ্গপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিব্যবহিক চাপের সমতাকে কী বলে?
 (A) রচন (B) সমঅভিব্যবহন
 (C) অসমোরেগুলেশন (D) ফিলট্রেশন **Ans C**
২৫. যে পদার্থের জন্য মূত্রের স্বাদালো গন্ধ হয়-
 (A) বিলিরুবিন (B) বিলিভার্ডিন
 (C) অ্যামোনিয়া (D) ইউরোক্রেম **Ans C**
১৬. $2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ উপস্থিতি বিক্রিয়া কোথায় ঘটে?
 (A) অরনিথিন চক্র (B) ডি-স্ট্রামিনেশন প্রক্রিয়ায়
 (C) ক্রেবস চক্র (D) গ্রাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় **Ans A**
১৭. গ্রোমেরুলাস ফিল্ট্রেটে কোনটি অনুপস্থিত?
 (A) প্রোটিন (B) গ্লুকোজ
 (C) অরন (D) ইউরিয়া **Ans A**
১৮. মূত্রথলি হতে মূত্র পরিবহনের কাজ করে কোনটি?
 (A) ওভিডাক্ট (B) ইউরেথ্রা
 (C) ইউরেটার (D) ভাস ডিফারেন্স **Ans B**
১৯. মানুষের রচনাতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রে সাধারণ নালিটির নাম কি?
 (A) শুক্রনালি (B) ইউরেথ্রা
 (C) ক্রেপণ নালি (D) সেমিনাল ভেসিকল **Ans B**
২০. ডায়ালাইসিস পদ্ধতি যে অঙ্গের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়-
 (A) হৃৎপিণ্ড (B) ফুসফুস
 (C) বৃক্ক (D) মস্তিষ্ক **Ans C**
২১. ম্যালপিজিয়ান বডি কোন অঙ্গে পাওয়া যায়?
 (A) বৃক্ক (B) ফুসফুস
 (C) যকৃৎ (D) অগ্ন্যাশয় **Ans A**
২২. রেনাল করপাসলে কোন ধরনের কোষ থাকে?
 (A) নিডোসাইট (B) লিফোসাইট
 (C) পোডোসাইট (D) অস্টিওসাইট **Ans C**
২৩. পোডোসাইট কোষ কোথায় পাওয়া যায়?
 (A) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় (B) হেনলির লুপে
 (C) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় (D) বোম্বাস ক্যাপসুলে **Ans D**
২৪. মূত্রের রং খড় বর্ণ হওয়ার জন্য দায়ী বস্তু হলো-
 (A) অ্যামোনিয়া (B) বিলিরুবিন
 (C) ইউরোক্রেম (D) ক্রিটোন বডিস **Ans C**
২৫. গ্রোমেরুলাস-এর অবস্থান বৃক্কের কোথায়?
 (A) পেলভিসে (B) হাইলামে
 (C) বোম্বাস ক্যাপসুলে (D) হেনলির লুপে **Ans C**
২৬. ডায়ালাইসিস কত প্রকার?
 (A) ২ (B) ৩
 (C) ৪ (D) ৫ **Ans A**
২৭. নেফ্রনের কোন অংশে অধিকাংশ পুনঃশোষণ ঘটে?
 (A) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় (B) হেনলির লুপে
 (C) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় (D) সংগ্রাহক নালিকায় **Ans A**
২৮. কোন জাতীয় খাদ্যের বিপাকের ফলে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়?
 (A) প্রোটিন (B) কার্বোহাইড্রেট
 (C) লিপিড (D) প্রোটিন ও লিপিড **Ans A**
২৯. নেফ্রনের কোনটি কটেজ্ঞে অবস্থান করে না?
 (A) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা (B) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা
 (C) রেনাল করপাসল (D) হেনলির লুপ **Ans D**
৩০. নেফ্রনের কোন অংশে আক্সিফিলট্রেশন হয়?
 (A) গ্রোমেরুলাস (B) হেনলির লুপ
 (C) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা (D) মূত্র থলি **Ans A**

মানব শারীরতত্ত্ব : চলন ও অঙ্গচালনা

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. পরিণত মানব কহানের অকীর কহান অহিসমূহের তালিকা :

কল্পিত মানব কঙ্কালের অক্ষীয় কঙ্কাল অহিসমূহের তালিকা :

অক্ষীয় কঙ্কাল (৮০টি)		মোট সংখ্যা		
অন্যান্য অংশ		বিন্যাস ও সংখ্যা		
করোটিক (২৯টি)	করোটিকা	১. ফ্রন্টাল অস্থি.....	১টি	৮টি
		২. প্যারাইটাল অস্থি	২টি	
		৩. টেম্পোরাল অস্থি	২টি	
		৪. অক্সিপিতাল অস্থি	১টি	
		৫. স্ফেনয়েড অস্থি	১টি	
		৬. ইথময়েড অস্থি	১টি	
	মুখমস্তনীয় অস্থি	১. ম্যাক্সিলা	২টি	১৪টি
		২. ম্যাক্সিবল	১টি	
		৩. জাইগোম্যাক্সিটিক অস্থি ...	২টি	
		৪. ন্যাসাল অস্থি	২টি	
৫. ন্যাক্রিমাল অস্থি		২টি		
৬. ইনফিরিওর ন্যাসাল কল্লা ...		২টি		
৭. ভোমার		১টি		
কর্ণাঙ্ঘ্রি	১. মেলিয়াস	২টি	৬টি	
	২. ইনকাস	২টি		
	৩. স্টেপিস	২টি		
হাইওয়েড	১. কটাইডি	১টি	১টি	
	মেরুদণ্ড	১. সারভাইকাল	৭টি	২৬টি
২. থোরাসিক		১২টি		
৩. লাম্বার		৫টি		
৪. স্যাক্রাল ... (৫টি মিলে ১টি)		১টি		
৫. কক্সিজ ... (৪টি মিলে ১টি)		১টি		
বকশিঙ্ঘর	১. স্টার্নাম	১টি	২৫টি	
	২. পর্ককা (প্রতিপাশে ১২টি) ১২ x ২	২৪টি		

১. **উপাসীয় কঙ্কাল (Appendicular Skeleton) :** উপাসীয় কঙ্কাল দুটি অংশের অঙ্গিমূহ নিয়ে গঠিত। যথা- (ক) উপাঙ্গের অঙ্গিমূহ (Bones of upper part) : বক্ষ-অঙ্গিক্র (Pectoral girdle) ও তার সাথে যুক্ত বাহ্যের অঙ্গিমূহ। এই অংশ দেহের উভয় পাশে ৩২টি করে মোট ৬৪টি অঙ্গি থাকে। (খ) নিম্নাঙ্গের অঙ্গিমূহ (Bones of lower part) : শোণি-অঙ্গিক্র (Pelvic girdle) ও তার সাথে যুক্ত পা এর অঙ্গিমূহ। এই অংশে দেহের উভয় পাশে ৩১টি করে মোট ৬২টি অঙ্গি থাকে। নিচে পরিণত মানব কঙ্কালের উপাসীয় কঙ্কাল অঙ্গিমূহের তালিকা তৈরি করা হলো :

উপাধীয় কক্ষাল (১২৬টি)				
বক-অস্থিচক্র	১. স্কাপুলা ... ২. ক্ল্যাভিকল }	প্রতিপাশে ২টি	১টি ১টি	৪টি
বাহ	১. হিউমেরাস ... ২. রেডিয়াস ... ৩. অলনা ... ৪. কার্পাল ... ৫. মেটাকার্পাল.. ৬. ফ্যালানগেস	প্রতিপাশে ৩০টি	১টি ১টি ১টি ৮টি ৫টি ১৪টি	৬০টি
শ্রোণি-অস্থিচক্র	১. ইলিয়াম ... ২. ইচ্চিয়াম ... ৩. পিউবিস ... (প্রতিপাশের অস্থিগুলো মিলিত হয়ে একটি করে হিপ বোন গঠন করে। সে হিসেবে দুপাশে দুটি হিপ বোন থাকে)		১টি ১টি ১টি	২টি

উপাদায়ী কঙ্কাল (১২৬টি)

পা	১. ফিমার ... ২. টিবিয়া ... ৩. ফিবুলা ... ৪. প্যাটেলা ... ৫. টার্সাল ... ৬. মেটাটার্সাল ... ৭. ফ্যালাংগেস ...	১টি ১টি ১টি ১টি ৭টি ৫টি ১৪টি	৬০টি
		মোট	১২৬টি

ক. কশেরুকা (Vertebra) :

মেরুদণ্ডের সাংগঠিক একক হলো কশেরুকা। মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের কশেরুকার গঠন বিভিন্নরকম। তবে এদের সকলের গঠন প্রকৃতি একটি মৌলিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি আদর্শ কশেরুকা সেন্ট্রাম বা ভার্টিব্রাল বডি এবং আর্চ নিয়ে গঠিত। আর্চের অংশগুলো হলো : i. পেডিকল ii. ট্রান্সভার্স প্রসেস iii. স্পাইন iv. আর্টিকুলার প্রসেস v. স্পাইনাস প্রসেস।

ক. কশেরুকা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য :

অঞ্চলের নাম	কশেরুকার নাম	কশেরুকার সংখ্যা	অস্থি সংখ্যা
১. গ্রীবাদেশ	গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা (Cervical vertebrae)	০৭	০৭
২. বক্ষদেশ	বক্ষদেশীয় কশেরুকা (Thoracic vertebrae)	১২	১২
৩. উদরদেশ/কটদেশ	উদরদেশীয়/কটদেশীয় (Lumber vertebrae)	০৫	০৫
৪. শ্রোণিদেশ	শ্রোণিদেশীয় কশেরুকা (Sacral vertebrae)	০৫	০১
৫. পুচ্ছদেশ/কক্সিস	পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা (Coccygeal vertebrae)	৩-৫ (গড়ে ৪)	০১
	মোট	৩৩টি	২৬টি

খ. হিউমেরাস (Humerus) :

উর্ধ্ববাহুর প্রথম অস্থিকে হিউমেরাস বলে। এটি উর্ধ্ব বাহুর সবচেয়ে বৃহৎ ও লম্বা অস্থি। হিউমেরাস একটি লম্বা শ্যাফট বা মূলদেহ এবং প্রক্সিমাল ও ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত। নিচে হিউমেরাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো :

বৈশিষ্ট্য :

১. এটি একটি বৃহৎ, লম্বা, দণ্ডাকার অস্থি।	৪. মাঝখানে 'অ্যানাটমিক গ্রীবা' নামে একটি খাঁজ আছে।
২. ফ্রোনেলের মধ্যভাগে ডেলটয়েড রিজ রয়েছে।	৫. যে সরু অংশ থেকে হিউমেরাসের মূলদেহ গঠিত হয় তাকে 'সার্জিক্যাল গ্রীবা' বলে।
৩. এটি লম্বা, নলাকার অস্থি; উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে গোল মস্তক।	

গ. বিভিন্ন প্রকার তরুণাঙ্গি কেসব হুনে পাওয়া যায় :

তরুণাঙ্গির নাম	যে স্থানে পাওয়া যায়
দক্ষ তরুণাঙ্গি	নাক, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, পর্ভকার প্রান্তভাগ, অস্থিসন্ধিহীন, জগীয় কঙ্কাল, ব্যাঙ ও হাঙরের জুগে বা পরিণত দেহে।
ইতিহৃৎক বা পীততন্তুময় তরুণাঙ্গি	বহিঃকর্ণ বা পিনা, নাসিকার অগ্রভাগ, আলজিহরা (Epiglottis), ইউস্টেশিয়ান নালি।
দ্রুত তন্তুময় তরুণাঙ্গি	কশেরুকাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান, অস্থি ও টেন্ডনের সংযোগস্থল, গ্লেনয়েড গহ্বর।
সূক্ষ্ম বা ক্যালসিনাইট তরুণাঙ্গি	হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকের তরুণাঙ্গি।

ঘ. অনৈচ্ছিক বা মসৃণ পেশি (Involuntary or Smooth muscle) :

এসব পেশি কলার সংকোচন ও প্রসারণ প্রণালীর ইচ্ছাবিহীন নয় বরং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। এসব পেশির মায়োফাইব্রিলে স্ট্রেকটা থাকে না বলে এদের মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশি বলে।

১. অনৈচ্ছিক পেশির বৈশিষ্ট্য :

১. অবস্থান : পৌষ্টিক নালি, রক্তনালি, রেচননালি, শ্বাসনালি, জনননালি, মূত্রনালি, জরায়ু।
২. প্রকৃতি : অনৈচ্ছিক।
৩. পেশিতন্তু : মাকু আকৃতির ও শাখাবিহীন।
৪. নিউক্লিয়াস : ১টি, কেন্দ্রে থাকে।
৫. সংকোচন ক্ষমতা : মৃদু ও দীর্ঘস্থায়ী।
৬. কাজ : বিভিন্ন নালিতে বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

ঙ. হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle) :

মেরুদণ্ড প্রণালীর (মানুষ) হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠনে অংশগ্রহণকারী এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশিকে হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি বলে। এ পেশি বেচ্ছায় সংকোচনশীল নয়, কিন্তু নিজে নিজে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপেশি চিহ্নিত কিন্তু অনৈচ্ছিক।

১. হৃৎপেশির অবস্থান : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তরে (মায়োকার্ডিয়াম) এ পেশি অবস্থিত। মায়োকার্ডিয়ামের বাইরের দিকে এপিকার্ডিয়াম ও ভেতরের দিকে এন্ডোকার্ডিয়াম নামক বোজক কলা নির্মিত আবরণ থাকে।

২. হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য : হৃৎপিণ্ড গঠিত হয় হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা। নিচে হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. কোষগুলো প্রায় ১০০ μm লম্বা এবং ১২ - ১৫ μm প্রস্থ।
২. এদের কোষপ্রাচীর বা সারকোলেমা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা পাতলা।
৩. প্রতিটি কোষের কেন্দ্রভাগে কোষের একমাত্র নিউক্লিয়াসটি অবস্থান করে।
৪. হৃৎপেশির কাজ : হৃৎপিণ্ডের অবিরাম সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিদেহের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ পেশি কখনো অবসাদগ্রস্ত হয় না।

চৈহক বা অমসৃণ পেশি (Voluntary or Non-smooth muscle) :

নবদেহের যেসব পেশি মানুষের ইচ্ছেমতো সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে তাদের চৈহক পেশি বলে। এসব পেশি কঙ্কালের সাথে আটকে থাকে বলে এদের কঙ্কাল শিও বলে। এই পেশিকে সাধারণত মাংস বলা হয়।

অবস্থান : বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগস্থলে, চোখ, জিহ্বা, গলবিলসহ হাতে-পায়ে এ ধরনের পেশি অবস্থান করে।

চৈহক পেশি সম্পর্কিত তথ্য :

- চৈহক পেশি ক্রান্তরীয় আবরণে আবৃত।
- প্রতিটি পেশিতন্তু সারকোলেমা নামক আবরণে ঢাকা থাকে।
- সাইটোপ্লাজমকে সারকোপ্লাজম বলে।
- সারকোপ্লাজমে অসংখ্য পেশিতন্তু বা মায়োফাইব্রিল থাকে।

আবরণ ৩টি হলো :

১. সর্বভেতরের আবরণ → এন্ডোমাইসিয়াম
২. মাঝের আবরণ → পেরিমাইসিয়াম
৩. সর্ব বাহিরের আবরণ → এপিমাইসিয়াম

লক্ষ্যে দে প্রতিটি মায়োফাইব্রিলে কালো ও সাদা দু'প্রকার ব্যান্ড থাকে। ব্যান্ডগুলো হলো :

১. গাঢ় ব্যান্ড → অ্যানাইসোট্রপিক (Anisotropic) বা A-ব্যান্ড।
২. হালকা ব্যান্ড → আইসোট্রপিক (Isotropic) বা I-ব্যান্ড।

প্রতিটি I-ব্যান্ডের মাঝে Z রেখার মধ্যবর্তী স্থানকে সারকোমিয়ার বলে।

মানবদেহে বিদ্যমান 656 টি চৈহক পেশি সমন্বিতভাবে প্রধান চারটি কাজ সম্পন্ন করে। [Ref: আজমল+আলীম+মেহনাদ]

পেশিতন্তু ও কঙ্কালতন্ত্রজনিত সমস্যাসমূহ :

রোগের নাম	যে কারণে হয়	সমস্যাসমূহ
মায়োসথেমিয়া গ্রেভিস	স্ব-অনাক্রম্যতা (Autoimmune) বিদ্রোহিত হলে।	শ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী পেশিসমূহের নিদ্রিত্যতা, চোখের পেশির নিদ্রিত্যতা।
টিটেনি	প্যারাথরমোন হরমোনের ক্রিয়া হ্রাস পেলে।	পেশির প্রসারণশীলতা ও সংকোচনশীলতা ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়।
মাসকুলার ডিস্ট্রফি	বংশগত কারণে ডিসট্রোফিন (dystrophin) নামক প্রোটিনের অভাবজনিত কারণে।	পেশির কার্যকারিতা হ্রাস পায়, মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, হাঁটুতে অসুবিধা হয়, দেহের ভারসাম্য রক্ষা বিদ্রোহিত হয়, ক্রমাগত দেহের বিভিন্ন পেশি নিদ্রিত্য হয়।
রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস	IgM নামক রিউমাটয়েড ফ্যাক্টরের কারণে।	সাইনোভিয়াল জয়েন্টের সাইনোভিয়াল পর্দার প্রদাহ, অস্থিসন্ধিতে ঘর্ষণজনিত ক্ষয়।
অস্টিওআর্থ্রাইটিস	ধ্বংসাত্মক অস্থিসন্ধি রোগ।	সাধারণত মেরুদণ্ড, হাঁটু, হাত ইত্যাদি জয়েন্টে আক্রান্ত।
গাউটি আর্থ্রাইটিস বা গুঁটে বাত	রক্তে অত্যধিক ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে।	আক্রান্ত অস্থিসন্ধিগুলি ফুলে ওঠে, লালভা রঙের হয়।
অস্টিওপোরোসিস	অস্থিভঙ্গের জন্য, ক্যালসিটোনিন, প্যারাথরমোন এর অতিরিক্ত ক্ষরণ।	অস্থিসন্ধিজনিত ব্যথা।

অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙা (Fractures of Bone) :

আকস্মিক কোনো কিছুর চাপে বা আঘাতের কারণে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি বা হাড় (bone) ভেঙে গেলে বা অস্থিতে ফাটল ধরলে তাকে বলা হয় অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙা (fracture of bone)। সংক্ষেপে, যেকোনো কারণে হাড় ফেটে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়াই হলো অস্থিভঙ্গ বা ফ্রাকচার। চিকিৎসকেরা একে FRX বা Fx সংকেত দ্বারা প্রকাশ করেন।

অস্থিভঙ্গের লক্ষণ বা উপসর্গ :

১. ক্ষতস্থানে বা ইনজুরির জায়গায় ব্যথা হয়।
২. ইনজুরির জায়গা বা ক্ষতস্থান ফোলা থাকে।
৩. হাত, পা কিংবা অস্থিসন্ধি বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

হাড়ভাঙার প্রকারভেদ :

অস্থিভঙ্গ (৩ প্রকার) যথা : • সাধারণ/বন্ধ অস্থিভঙ্গ • যৌগিক/উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ • জটিল/চাপা অস্থিভঙ্গ

সাইনোভিয়াল বা সচল অস্থিসন্ধি (Synovial or Freely Movable Joints) :

সাইনোভিয়াল গহ্বর সমন্বিত অস্থিসন্ধিকে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে। এরকম অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থি দুটি একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দিয়ে পৃথক থাকে। এটি সচল প্রকৃতির সন্ধি। আমাদের অধিকাংশ সন্ধি এই রকমের।

বিভিন্ন প্রকার অস্থিসন্ধির নাম ও উদাহরণ :

অস্থি সন্ধির নাম	উদাহরণ
গ্রাইডিং বা প্লেন জয়েন্ট (Gliding or plane Joint)	কারপাল ও টারসাল অস্থিসন্ধি
হিঞ্জ জয়েন্ট (Hinge Joint)	কনুই সন্ধি, হাঁটু সন্ধি, গোড়ালি সন্ধি।
পিভট জয়েন্ট (Pivot Joint)	অ্যাটলাস ও অ্যাক্সিসের সন্ধি।
কন্ডাইলয়েড বা ইলিপসয়েড জয়েন্ট (Condylloid or Ellipsoid Joint)	মেটাকারপাল ও ফ্যাল্যাঙ্গেসের সন্ধি।
স্যাডল জয়েন্ট (Saddle Joint)	বৃদ্ধা আঙুলের কারপাল ও মেটাকারপাল অস্থিসন্ধি।
বল ও সকেট জয়েন্ট (Ball and Socket Joint)	সোন্ডার জয়েন্ট ও হিপ জয়েন্ট।
অচল অস্থিসন্ধি	করোইডিকা ও চোয়ালের অস্থিসন্ধি।
সচল অস্থিসন্ধি	তন্তুময় অস্থিসন্ধি, কোমলাস্থিময় অস্থিসন্ধি ও সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি।
সাইনোভিয়াল বা ভাই আর্থ্রোসিস/গহ্বরযুক্ত অস্থি সন্ধি	আঙ্কুকার্পাল, আঙ্কুটার্সাল, কনুই এর সন্ধি ও হাঁটুর অস্থিসন্ধি।
সিন-আর্থ্রোসিস/ফাইব্রাস/তন্তুময় অস্থিসন্ধি	করোইটার অস্থিগুলোর মধ্যবর্তী সুচার স্যাক্রাম ও ইলিয়ামের মধ্যবর্তী সন্ধি, শ্রোণি চক্রের মধ্যবর্তী অস্থিসন্ধি, দাঁত ও চোয়ালের কোটরের মধ্যবর্তী অস্থিসন্ধি।

Part 2

At a glance [Most Important Information]

মানবদেহের ভারবহনকারী শক্ত কাঠামো- কঙ্কালতন্ত্র
কঙ্কালতন্ত্রের ওপর আচ্ছাদন থাকে- পেশিতন্ত্রের
তৃতীয় মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়- কঙ্কালতন্ত্র
পেশি ও অস্থির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে- টেনডন
করাটির মস্তিষ্ক আবৃত করে রাখে- ক্র্যাটিকা
কশেরুকার বৃহত্তম ও সম্মুখস্থ স্থূল অংশ- সেন্ট্রাম বা আর্ট্রিওল বডি
সরল কশেরুকার ছিদ্র সম্মিলিতভাবে নির্মাণ করে- আর্ট্রিওল ক্যানেল
হটলিক f এর মতো বাঁকা অস্থি- ক্র্যাডিকল
ইলিয়াম, ইশিয়াম ও পিউবিস অস্থি নিয়ে গঠিত- শ্রোণি-অস্থিচক্র
ইলিয়ামের ডানার কিনারাকে বলে- ইলিয়াক ফ্রন্ট (ক্রেস্ট)
ফিমারের প্রান্তে অবস্থিত ত্রিকোণাকার অস্থির নাম- প্যাটেল্লা
অস্থির জৈব অংশটি গঠিত- কোলাজেন ও অসিমিউকয়েড দ্বারা
অস্থির অজৈব অংশটিতে রয়েছে- ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট
অপরিণত অস্থি উৎপাদনকারী কোষ- অস্টিওব্লাস্ট

- পেশি টিস্যুতে পানির পরিমাণ- ৭৫%
- প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের জন্য দায়ী- পেশি
- অনৈচ্ছিক পেশিতে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা- ১টি
- পুরোবাহুর উর্ধ্ববাহুর ওপর ভাঁজ হতে সহায়তা করে- কনড্রিন পেশি
- নিম্ন চোয়ালকে ওপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে- লিভার পেশি
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট পেশি- চক্ষুর সিলিয়ারি
- সর্বাধিক শক্তিশালী পেশি- নিতম্বের গুটিয়াস ম্যাস্কিউলস
- পা-কে দেহ অক্ষের দিকে নিয়ে আসে- অ্যাডাক্টর লংগাস পেশি
- নিচের চোয়াল ওপরে তুলে মুখ বন্ধ করতে সাহায্য করে- মাস্টিয়েটর পেশি
- আঘাত পাওয়া জায়গা উঠতে রাখতে হবে - ৬ - ১০ ইঞ্চি
- সাধারণ অস্থিভঙ্গ সেরে যায়- ৮ সপ্তাহের মধ্যে
- শ্রোণিচক্রের দুটি পিউবিক অস্থির সংযোগস্থল- তরুণাঙ্গের অস্থিসন্ধি
- অস্থির প্রান্ত বেগিত থাকে- আর্টিকুলার তরুণাঙ্গ দিয়ে
- খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মচকাই- গোড়ালি

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

- মানুষের হাতের কার্পাল অস্থির সংখ্যা কয়টি?
 (A) ৬টি (B) ৭টি
 (C) ৮টি (D) ৯টি
Ans C
- মানব আঙ্গুলের অস্থিগুলোকে বলা হয়-
 (A) ফ্যালান্স (B) মেটাকারপাল
 (C) মেটাকারপাল (D) ফ্যালান্স
Ans A
- কোনটি অক্ষীয় কঙ্কাল নয়?
 (A) করাটি (B) মেরুদণ্ড
 (C) বক্ষ-পিঞ্জর (D) শ্রোণিচক্র
Ans D
- কোন তৃতীয় স্তর থেকে কঙ্কালতন্ত্র গঠিত হয়?
 (A) মেসোডার্ম (B) এন্ডোডার্ম
 (C) এন্ডোডার্ম (D) কোনোটিই নয়
Ans A
- করাটির যে অংশ মস্তিষ্কে আবৃত করে রাখে-
 (A) ক্র্যাটিকা (B) Calvarium
 (C) Cranium (D) সবগুলো
Ans D
- মানুষের বক্ষ অস্থিচক্র কতটি অস্থি নিয়ে গঠিত?
 (A) ১ জোড়া (B) ২ জোড়া
 (C) ১২ জোড়া (D) ৮ জোড়া
Ans B
- মানব কঙ্কালতন্ত্রে তৃতীয় শ্রেণির লিভার কোন অঙ্গে কার্যকরী?
 (A) হাতের কনুই সঞ্চালনে (B) পায়ের গোড়ালি সঞ্চালনে
 (C) মানুষের মাথা সঞ্চালনে (D) মানুষের কোমর সঞ্চালনে
Ans A
- মানবদেহের দীর্ঘতম অস্থি কোনটি?
 (A) হিউমেরাস (B) ফিমার
 (C) স্টেপিস (D) প্যাটেল্লা
Ans B
- স্কলের এটলাস ও এক্সিসের মধ্যবর্তী অস্থিসন্ধি নিচের কোনটি?
 (A) পনফেসিস (B) কজা
 (C) কীলক (D) স্যাডেল
Ans C
- অস্থি কেন্দ্রীয় অক্ষের ডানকোণ বরাবর অস্থির ভাঙন ঘটলে তা-
 (A) সরল অনুপ্রস্থ ভাঙন (B) সরল তীর্থক ভাঙন
 (C) সরল সর্পিলা ভাঙন (D) সরল সুষ্প ভাঙন
Ans A
- সর্বোচ্চ মাধ্যম অনুসারে মানবদেহে কত প্রকারের অস্থিসন্ধি দেখা যায়?
 (A) ১ (B) ৩
 (C) ৪ (D) ৫
Ans B

- অস্থিতে কোনটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
 (A) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (B) ক্যালিয়াম ক্রোমাইড
 (C) ক্যালসিয়াম ফসফেট (D) ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট
Ans C
- অস্থির মজ্জাগতরকে ঘিরে অস্থি যে একক গঠন দেখা যায় তাকে কি বলে?
 (A) পেরিস্টিয়াম (B) এন্ডোস্টিয়াম
 (C) হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (D) কনড্রিন
Ans C
- স্বয়ংক্রিয় কোন কোমলাস্থি দেখা যায়?
 (A) হ্যালাসিন (B) পীত তন্ত্রময়
 (C) শ্বেত তন্ত্রময় (D) ক্যালসিফারেন্ট
Ans A
- উপরের চোয়াল যে ধরনের অস্থি?
 (A) খাটো বা ক্ষুদ্র অস্থি (B) অনিয়ত অস্থি
 (C) চাপা অস্থি (D) বায়ুপূর্ণ অস্থি
Ans D
- শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাঙ্গ থাকে?
 (A) হ্যালাসিন (B) পীত তন্ত্রময়
 (C) শ্বেত তন্ত্রময় (D) চুনময়
Ans A
- কোনটি নিম্নবাহুর অস্থি?
 (A) হিউমেরাস (B) রেডিয়াস
 (C) আলনা (D) ফিমার
Ans D
- দুই কশেরুকার মাঝে কোন ধরনের তরুণাঙ্গ থাকে?
 (A) ক্যালসিফাইড (B) শ্বেত তন্ত্রময়
 (C) পীত তন্ত্রময় (D) হ্যালাসিন
Ans B
- পেরিস্টিয়ামবিশিষ্ট দৃঢ় সংযোজক কলাটির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
 (A) স্থিতিস্থাপক (B) ভরসম্মান নালি বিন্যাস
 (C) কনড্রোসাইট বিদ্যমান (D) মিউকোপ্রোটিনযুক্ত
Ans B
- কোন তরুণাঙ্গের ম্যাট্রিক্সে গ্রুচর CaCO_3 জমা থাকে?
 (A) ঘন তরুণাঙ্গ (B) পীত তন্ত্রময় তরুণাঙ্গ
 (C) শ্বেত তন্ত্রময় তরুণাঙ্গ (D) চুনময় তরুণাঙ্গ
Ans D
- সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের গঠনগত উপাদান কোনটি?
 (A) স্যাকারাইড (B) পলিস্যাকারাইড
 (C) মিউকোপলিস্যাকারাইড (D) পেপসিন
Ans C

১. নিউরন (Neuron) :

কোষসহ ও সব ধরনের প্রবাহক নিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে নিউরন বলে।

২. নিউরনের প্রকারভেদ :

নিউরন (Neuron)		
(ক) গঠন অনুসারে	(খ) কাজের প্রকৃতি অনুসারে	(গ) সংবেদন পরিবহনের দিক অনুসারে
i. একমুখী (apolar)	i. সংবেদী/সংজ্ঞাবহ (sensory)	i. অন্তর্গামী (afferent neuron)
ii. এক মেরুযুক্ত (unipolar)	ii. চেষ্টীয়/আজ্ঞাবহ (motor)	ii. বহির্গামী (efferent neuron)
iii. দ্বিমেরুযুক্ত (bipolar)	iii. মিশ্র/সমন্বয়ক (mixed/adjustor)	iii. আন্তঃনিউরন (inter neuron)
iv. বহুমেরুযুক্ত (multipolar)		
v. ছদ্মমেরুযুক্ত (pseudo-unipolar)		

৩. অধিক্রমের সংখ্যানুযায়ী :

নাম	উদাহরণ	নাম	উদাহরণ
অমেরু	অ্যাড্রেনাল মেডুলার ক্রোমোফিন নিউরন।	দ্বিমেরু	চোখের রেটিনার স্নায়ু, অন্তর্কর্ণ ও অলফ্যাক্টরি স্নায়ু।
একমেরু	স্পাইনাল কর্ড ও সর্বত্র বর্ধনশীল স্নায়ুকোষ।	বহুমেরু	মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কার্ডের অধিকাংশ নিউরন।
স্বচ্ছ-মেরু	স্পাইনাল কর্ড।		

৪. কাজের ওপর ভিত্তি করে :

নাম	বর্ণনা
সংজ্ঞাবাহী	এরা বিভিন্ন সংবেদ গ্রাহক অঙ্গ (ত্বক, চোখ, নাক, জিহ্বা, কান) থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে।
আজ্ঞাবাহী	এরা কেন্দ্রীয় স্নায়ু উদ্দীপনা ইফেক্টর অঙ্গে (পেশি, গ্রন্থি) প্রেরণ করে।
আন্তঃসংযোগী	এরা সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। অধিকাংশ আন্তঃসংযোগী নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থিত।

নিউরনের কাজ : নিউরনের প্রধান কাজ হলো স্নায়ুসম্পদন পরিবহন করা। সংজ্ঞাবহ নিউরন স্নায়ু-আবেগকে রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং চেষ্টীয় নিউরন প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টর অঙ্গে বহন করে।

৫. নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters) : যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা গ্রন্থিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে। যেমন : ইপিনেফ্রাইন, ডোপামিন, সেরোটোনি, অ্যাসেটাইলকোলিন, অ্যাড্রিনোসিন। এ পদার্থ প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের ডেসিকলে জমা থাকে এবং প্রয়োজনে সিন্যাপটিক ক্রাফটে মুক্ত হয়।

৬. নিউরোট্রান্সমিটারের প্রকারভেদ :

• কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার	ডোপামিন, GABA, গ্লাইসিন, গুটামেট প্রভৃতি।
• প্রাণীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার	অ্যাসিটাইল কোলিন, অ্যাড্রেনালিন, নর অ্যাড্রেনালিন, হিস্টামিন প্রভৃতি।

৭. মস্তিষ্ক (Brain) :

করোটি দ্বারা সুরক্ষিত মেনিনজেসপর্দা বেষ্টিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে ক্ষীত অংশ দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বা এনসেফালন (brain or encephalon) বলে। ক্রমীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ ক্ষীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ১৫০০ সিসি ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি এবং গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) নিউরন এবং ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) নিউরোগ্লিয়া কোষ থাকে।

৮. মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ :

মস্তিষ্কের অংশ	প্রধান কাজ
সেরেব্রাম	• অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ শক্তির নিয়ন্ত্রণ • সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ • ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ • চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনী • বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ
থ্যালামাস	• সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন • ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ • চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা, আবেগ কেন্দ্র • ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা
হাইপোথ্যালামাস	• স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র • দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ • ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন
সেরেবেলাম	• ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ • দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখা • চলাফেরার দিক নির্ধারণ
মেডুলা অবলংগাটা	• সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি • ৯ম, ১০ম ও ১১শ করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল • হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, গলাধঃকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সংকোচন ও লালাক্ষরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
পনস	• সেরেবেলাম, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যকার রিলে স্টেশন • স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ

[Ref: আজমল]

করোটিক ন্নায়ু (Cranial nerve) :

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় স্ট্রট যেসব প্রাণীয় ন্নায়ুসমূহ করোটিক বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাদের করোটিক ন্নায়ু বলে। মানুষের করোটিক ন্নায়ু ১২ জোড়া। এদের সম্মুখ অংশ থেকে পরপর রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা সূচিত করা হয়।

৬ মানুষের করোটিক ন্নায়ুর নাম, উৎস, শাখা, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ :

ন্নায়ুর নাম ও প্রকৃতি	উৎস	শাখা (যদি থাকে)	বিস্তার	কাজ
i. অলফ্যাক্টরি (সংবেদী)	অগ্রমস্তিষ্কের অক্ষীয়দেশ	-	নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি	ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানো
ii. অপটিক (সংবেদী)	অগ্রমস্তিষ্কের অক্ষীয়দেশ	-	রেটিনা	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানো
iii. অকুলোমোটর (চেষ্টীয়)	মধ্যমস্তিষ্কের অক্ষীয়দেশ	-	অক্ষিগোলকের পেশি, উর্ধ্ব নেত্রপল্লব উত্তোলনকারী পেশি ও পিউপিল সংকোচনকারী পেশি	অক্ষিগোলকের সম্ভালন
iv. ট্রিকলিয়ার (চেষ্টীয়)	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	-	চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি	অক্ষিগোলকের সম্ভালন
v. ট্রাইজেমিনাল	মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ	অপথ্যালমিক (সংবেদী)	অক্ষিপল্লব, নাসিকার মিউকাস	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ
		ম্যাক্সিলারি (সংবেদী)	অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ
		ম্যান্ডিবুলার (মিশ্র)	মুখবিবরের অক্ষীয়দেশের পেশি	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সম্ভালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন
vi. আবডুসেস (চেষ্টীয়)	মেডুলা অবলংগাটার অক্ষীয়দেশ	-	বহিঃরেক্টাস নামক চক্ষুপেশি	অক্ষিগোলকের সম্ভালন
vii. ফ্যাসিয়াল	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	প্যালেটাইন (সংবেদী)	মুখবিবরের ছাদ	ছাদ গ্রহণ
		হায়োম্যান্ডিবুলার (মিশ্র)	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	চর্বণ, গ্রীবা সম্ভালন
viii. অডিটরি (অ্যাকাউস্টিক)/সংবেদী	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	-	অন্তঃকর্ণ	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা
ix. গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (মিশ্র)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	-	জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দা	হাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সম্ভালন
x. ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	ল্যারিঞ্জিয়াল (মিশ্র)	স্বরযন্ত্র	হাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সম্ভালন
		কার্ডিয়াক (মিশ্র)	হৃৎপিণ্ড	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ
		গ্যাস্ট্রিক (মিশ্র)	পাকস্থলি	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ
		পালমোনারি (মিশ্র)	ফুসফুস	সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ
xi. স্পাইনল অ্যাক্সেসরি (চেষ্টীয়)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	-	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	মাথা ও কাঁধের সম্ভালন
xii. হাইপোগ্লোসাল (চেষ্টীয়)	মেডুলা অবলংগাটার অক্ষীয়দেশ	-	জিহ্বা ও গ্রীবা	জিহ্বার বিচলন

[Ref: আজমল]

চোখ (Eye) :

চোখ মানুষের আলোকসংবেদী অঙ্গ বা দর্শনেন্দ্রিয়। মাথার সম্মুখদিকে দুপাশে দুটি চোখ বিদ্যমান। করোটিক অপটিক ক্যাপসুলে (optic capsule) প্রতিটি চোখ কপালো থাকে। মানুষের প্রতিটি চোখে চক্ষু পল্লব, চক্ষুপেশি, চক্ষুহুই এবং চক্ষু গোলক থাকে।

৬ চোখের বিভিন্ন অংশের কাজ :

চোখের অংশ	প্রধান কাজ	চোখের অংশ	প্রধান কাজ
বৃত কোষ	- মৃদু আলো শোষণ করে।	অক্সবিন্দু	- অক্সবিন্দুতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
কোন কোষ	- উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণ করে।	সিলিয়ারি বডি	- লেন্সের উপযোগে সহায়তা করে।
রেটিনা	- বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	কনজাংক্টিভা	- কর্নিয়াকে রক্ষা করে।
পিউপিল	- এর মাধ্যমে চোখে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে।	নেত্রপল্লব	- চোখে ধুলোবালি প্রবেশে বাঁধা দেয়।
লেন্স	- আলোর প্রতিসরণ ঘটায়। - আলোকরশ্মিকে রেটিনার ওপর কেন্দ্রীভূত করে।	অ্যাকুয়াস হিউমার	- লেন্সের পুষ্টি জোগায়। - বিবর্ধক মাধ্যমরূপে কাজ করে।
অগ্রহুই	- অগ্রস্রবণ করে চোখকে অর্ধ রাখা অর্থাৎ শুষ্কতা হতে রক্ষা করা। - চোখের মধ্যে প্রতিটি ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করা।	ভিট্রিয়াস হিউমার	- রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে। - অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।
কোরয়েড	- অক্ষিগোলকে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিফলন রোধ করে। - অক্ষিগোলকের পুষ্টি প্রদান করে।	স্কেরা	- অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। - চোখকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
ফেবিয়া সেন্ট্রালিস	- বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এখানেই সবচেয়ে ভালো হয়।	আইরিশ	- পিউপিলের ছিদ্র ছোট-বড় করে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।
কর্নিয়া	- প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে। - আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে।		

কান (Ear) :

কান মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ। মানুষের কানের সংখ্যা দুটি।

৬ অবস্থান : মানুষের মস্তিষ্কের প্রতি পার্শ্বে চোখের পিছনে একটি করে কান অবস্থিত। কানের সূক্ষ্ম অঙ্গসমূহ মাথার করোটির টেম্পোরাল (temporal) হাড়ের ভেতরে

শক্তি কোটরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

৬ কানের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ :

কানের অংশ	কাজ	কানের অংশ	কাজ
১. কান	শ্রবণ ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।	৮. কুপুলা	ভারসাম্য রক্ষা করে।
২. ইউট্রিকুলাস	ভারসাম্য অঙ্গ।	৯. অর্গান অব কর্টি	শব্দ-গ্রাহক যন্ত্ররূপে কাজ করে।
৩. স্যাকুলাস	শ্রবণ অঙ্গ।	১০. ভেস্টিবুলার যন্ত্র	ভারসাম্য রক্ষা করে।
৪. কর্ণাছি, ম্যালিয়াস, ইনকাস ও টেপিস	শব্দতরঙ্গ বহিকর্ষণ থেকে অঙ্ককর্ষণে প্রেরণ করে।	১১. টিমপেনিক পর্দা (বা কর্ণপটহ)	শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।
৫. বহিঃ আউটারি মিটাস (বা কর্ণকুহর)	কর্ণপটহ পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ প্রেরণ করে।	১২. পিনা (বা কর্ণছত্র)	শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কর্ণকুহরে প্রবেশে সাহায্য করে।
৬. ককলিয়া	শ্রবণ অনুভূতি গ্রহণ করে ও মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।	১৩. ইউস্টেশিয়ান নালি	মধ্যকর্ণ ও গলবিলুহ বায়ুচাপের সমতা বজায় রাখে।
৭. অর্ধবৃত্তাকার নালি	ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে		

প্রধান অঙ্কক্ষর গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও কাজ :

এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি	নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ	কম নিঃসরণের প্রভাব	বেশি নিঃসরণের প্রভাব
পিটুইটারি (অবস্থান-মস্তিষ্ক)	উচ্চভাগ	সোমোট্রোপিক হরমোন (STH)	বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।	বামনত্ব (উচ্চতা ৩-৪ ফুটের বেশি হয় না)
		থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH)	থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।	বামনাকৃতি হয়
		অ্যাড্রেনোকোর্টিকোট্রোপিক হরমোন (ACTH)	অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।	দৈত্যাকৃতি, এক্রোমেগালি (উচ্চতা ৭-৮ ফুট হয়)
		ফলিকুল উদ্দীপক হরমোন (FH)	জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্য নিয়ন্ত্রণ।	দৈত্যাকার ধারণ করে (অনেক লম্বা হয়)
	মধ্যভাগ	প্রোল্যাকটিন হরমোন (PH)	মাতৃদেহে দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ।	-
		মেলানোসাইট উদ্দীপক হরমোন (MSH)	মেলানোফোর কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ত্বকের রং নিয়ন্ত্রণ করা।	-
থাইরয়েড (অবস্থান-শ্বাসনালিতে)	নিম্নভাগ	অ্যান্টিভাইউরেটিক হরমোন (ADH)	রেনাল টিউবুলে পানি শোষণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তবাহিকার প্রাচীর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা।	-
		অক্সিটোসিন	জরায়ু-সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা।	-
থাইরয়েড (অবস্থান-শ্বাসনালিতে)	থাইরক্সিন	বিপাক ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন লক্ষণ	মিক্সিডিমা ও ক্রিটিনিজম হয়	থাইরোটিক্সিকোসিস রোগ হয়
		ট্রাইআয়োডো-থাইরোনিন	প্রকাশে সহায়তা করা।	গলগণ্ড হয় (Goitre)
প্যারাথাইরয়েড (অবস্থান-শ্বাসনালিতে)	প্যারাথরমোন	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।	টিটেনি রোগ হয়	এক্সোপ্যাথলমিক গায়টার (চক্ষু ক্ষীণ হয়)
থাইমাস (অবস্থান-শ্বাসনালির মূলদেশে)	থাইমোসিন	লিম্ফোসাইট প্রস্তুতি ও অ্যান্টিবডি গঠন।	-	অস্থি ক্ষয় ও বৃক্ক পাথর হয়
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (অবস্থান-অগ্ন্যাশয়)	ইনসুলিন	রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে তাকে কমানো; গ্রাইকোজেন সংশ্লেষ বা গ্রাইকোজেনেসিসে সহায়তা।	হাইপোগ্লাইসেমিয়া	হাইপারগ্লাইসেমিয়া
	গ্রুকাগন	রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে তা বাড়ানো, গ্রাইকোজেনোলাইসিসে সহায়তা।	হাইপোগ্লাইসেমিয়া	হাইপারগ্লাইসেমিয়া
অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল (অবস্থান-প্রতিটি বৃক্কের উপর থাকে)	কর্টেক্স	গ্রুকোকর্টিকয়েড	শর্করা ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ।	এডিসন রোগ (Addison's disease)
		মিনারেলোকর্টিকয়েড	খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।	কুশিং সিনড্রোম (Cushing syndrome)
		যৌন কর্টিকয়েড	যৌনাস্রের বৃদ্ধি এবং যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা।	হাইপার অ্যাড্রেনোস্টেরনিজম
	মেডুলা	অ্যাড্রেনালিন	জরুরিকালীন অবস্থায় দেহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সহায়তা। এর প্রভাবে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, দেহের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ।	হাইপার হতে পারে
		নর-অ্যাড্রেনালিন	এর ক্রিয়া অ্যাড্রেনালিনের বিপরীত।	হৃৎস্পন্দন, যকৃৎ ও বৃক্কের কার্যকারিতা অনিয়ন্ত্রিত হয়

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System) : যে তন্ত্রের মাধ্যমে পুরুষের দেহে শুক্রাণু উৎপাদন, সঞ্চয়, পরিবহন এবং স্থলন ঘটে তাকে পুরুষ প্রজননতন্ত্র বলে। শুক্রাণু উৎপাদনের কাজে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে মুখ্য জননাস্র এবং শুক্রাণু সঞ্চয়, পরিবহন ও স্থলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে আনুষঙ্গিক (accessory) জননাস্র বলে। পুরুষের মুখ্য (primary) জননাস্রের নাম শুক্রাশয় (testis)।

৬. পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ :

অঙ্গযোনি			বহিঃযোনি	জননগ্রন্থি
(i) শুক্রাশয়	(ii) এপিডিডাইমিস	(v) ফ্রেপণ নালি	(i) স্ট্রেটাম/অণ্ডথলি	(i) প্রোস্টেট গ্রন্থি (১টি)
(iii) ভাস ডিফারেন্স	(iv) সেমিনাল ভেসিকল		(ii) শিশ্ন/পুরুষাঙ্গ	(ii) বাল্ভোইউরেথ্রাল বা কাওপার এর গ্রন্থি

[Ref: আভুল]

২. স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female Reproductive System) : স্ত্রীদেহের যে তন্ত্রে ডিম্বাণু উৎপাদন, নিষেক ক্রিয়া সম্পাদন, জগ্ন সংস্থাপন ও জগ্নের বিকাশ সম্পন্ন হয় তাকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বলে।

৬. স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহের নাম ও কাজ :

প্রকার	অংশসমূহ	প্রধান কাজ
মুখ্য জননাস্র	ডিম্বাশয়	ডিম্বাণু উৎপাদন এবং ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন স্রাব।
গৌণ বা আনুষঙ্গিক জননাস্র	ডিম্বনালি	ডিম্বাশয় থেকে পতিত ডিম্বাণু গ্রহণ, নিষেক স্থান সৃষ্টি ও নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে পৌঁছানো।
	জরায়ু	জগ্নের রোপণ, বিকাশ, রক্ষণাবেক্ষণ; অমরা গঠন; প্রাসেটা গঠনে অংশগ্রহণ করা; প্রসবে সাহায্য করা।
	যোনি	যৌনমিলনে সাহায্যকরণ ও প্রসব পথ হিসেবে কাজ করে।
বহিঃজননাস্র	ভলভা (লেবিয়া মেজরা, লেবিয়া মাইনরা)	যৌনপথকে ঢেকে রাখে।
	ক্লাইটোরিস	উত্তেজনা প্রদান করে।
	ভেস্টিবিউল গ্রন্থি, বার্থোলিন গ্রন্থি	যৌনপথকে পিচ্ছিল রাখে।

৩. বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা :

পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
GH	GH	ADH	ADH	অ্যাড্রোজেন	প্রোজেস্টেরন
FSH	FSH	-	LH	টেস্টোস্টেরন	ইস্ট্রোজেন

৪. জরীয় স্তরের পরিণতি (Fate of germ layers) :

বহুকোষী প্রাণীর জগ্নের পরিস্ফুটন চলাকালে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক যে সকল কোষস্তর সৃষ্টি হয় তাদের জরীয় স্তর (germ layers) বলে। এই সকল স্তর থেকে জগ্নে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয় অর্থাৎ এরাই জগ্নের গঠন ও বিকাশের যাবতীয় উপাদানের উৎস। তিনটি জরীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো-

জরীয় স্তর	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে যে অংশ গঠিত হয়	
এক্টোডার্ম	১. ত্বকের এপিডার্মাল অংশ এবং ত্বকীয় গ্রন্থি, চুল, পালক, নখ, ক্ষুর, আঁশ এবং শিং। ২. চোখ ও অন্তঃকর্ণ। ৩. ঠোঁট, জিহবার আবরণ ও পায়ুর আবরণ।	৪. দাঁতের এনামেলসহ মৌখিক গহ্বর। ৫. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু পেশি।
মেসোডার্ম	১. অধিকাংশ পেশি, মেদকলা ও অন্যান্য যোজক কলা। ২. ডার্মিস, নটোকর্ড, মেরুদণ্ড, শিং এবং দাঁতের ডেন্টিন। ৩. কঙ্কালতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকাতন্ত্র। ৪. রেচন-জননতন্ত্রের অধিকাংশ।	৫. সিলোমিক এপিথেলিয়াম, মেসেন্টারি। ৬. পাকস্থলি, বৃক্কের কটেক্স। ৭. ইউস্টেশিয়ান নালি ও মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)।
এন্ডোডার্ম	১. পরিপাক নালির অন্তঃআবরণ। ২. শ্বসনতন্ত্র (ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া ও ফুসফুস)। ৩. মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)।	৪. প্রজননতন্ত্র, রেচননালি, মূত্রথলি ও মূত্রনালির আবরণ। ৫. টনসিল, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

[Ref: আভুল]

১. অমরা বা প্রাসেন্টা (Placenta) :

জন্ম ও মাতৃদেহে বিভিন্ন বস্তু বিনিময়ের নিমিত্তে জগকলা ও মাতৃকলা মিলে যে বিশেষ অঙ্গ গঠন করে তাকে অমরা বা প্রাসেন্টা (placenta) বলে।

৬. অমরার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আদান-প্রদান :

মাতা → ফিটাস	ফিটাস → মাতা
O ₂ , গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, বিভিন্ন ধরনের আয়ন, অ্যালকোহল, নিকোটিন, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি।	CO ₂ , ইউরিয়া, অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ।

৬. অমরার কাজ :

- মাতৃদেহ হতে জগে পুষ্টি সরবরাহ করে।
- জগের সুরক্ষা প্রদান করে।
- হরমোন ক্ষরণ ও কিছু রোগের বিরুদ্ধে জগদেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা ইত্যাদি অমরার কাজ।
- জগ থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে।

[Ref: আজমল + মাজেনা + আলীম]

২. এক নজরে কতিপয় যৌনবাহিত রোগ :

রোগের নাম	জীবাণুর নাম	রোগের সংক্রমণ	রোগের লক্ষণ	রোগের শনাক্তকরণ	রোগের চিকিৎসা
সিফিলিস	<i>Treponema pallidum</i>	- মুখ - পায়ুপথ - যোনাঙ্গ	ক্যান্ডার সৃষ্টি	- TPHA Test - VDRL Test - FTA Abs	অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন
গনোরিয়া	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	- জনননালি - মুখ - যোনি - গলা - জরায়ু - পায়ুপথ	অপথ্যালমিয়া নিওন্যাটারাম		অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন/ সিপ্রোফ্লক্সাসিন
এইডস	HIV	অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস	- HIV অ্যান্টিবডি টেস্ট - RNA Test - p24 প্রোটিন টেস্ট - ওয়েস্টার্ন ব্লট (Western Blot) টেস্ট	HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy)

[Ref: আজমল]

Part 2

At a glance [Most Important Information]

- প্রত্যেক শুক্রাণুর ভেতরে সেমিনিফেরাস নালিকার সংখ্যা- ১০০০টি
- সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রাণু পরিবহন করে- ভাস ডিকারেশন
- সচল শুক্রাণুর শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে- ফ্লক্টোজ
- সেমিনাল ভেসিকলের ক্ষরণসহ শুক্রাণুকে ইউরেথ্রায় পৌছায়- ফ্লেক্সনালি
- শুক্রাণুকে চাপজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে- প্রেনেটাম
- ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে- ডিম্বাশয়
- ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রাপ্তে অসংখ্য আঙুলের মতো প্রবর্ধনযুক্ত অংশ- ফিমব্রি
- লেবিয়া মাইনোরা উন্মুক্ত হয়- বার্ধোলিন গ্রন্থি
- যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে যে গ্রন্থির ক্ষরণ- বার্ধোলিন
- ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর গায়ে স্থাপিত হওয়ার প্রক্রিয়া- ইমপ্ল্যান্টেশন।
- কৈশোর এবং সাবালকত্ব প্রাপ্তির অন্তর্বর্তীকালীন সময়- বয়ঃসন্ধিকাল
- পূর্ণবয়স্ক নারীর রজঃচক্রের সূত্রপাত ঘটে- ১২-১৫ বছরে
- জাইগোটের পর্যায়ক্রমিক মাইটোসিস বিভাজনকে বলে- ক্রিভেজ

- জাইগোট থেকে জন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া- এমব্রায়োজেনেসিস
- ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে বলা হয়- ব্লাস্টোডার্ম
- আর্কেন্টেরন যে ছিদ্রপথে বাইরে মুক্ত হয়- ব্লাস্টোপোর
- মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের উৎপত্তি শুরু হয় গর্তকালীন- ৩য় সপ্তাহে
- জরায়ুতে ফিটাস অবস্থান করে- ৩৮ সপ্তাহ
- গর্ভাবস্থায় প্রোজেস্টেরনের মাত্রা হঠাৎ করেই কমে যায়- ৩৮তম সপ্তাহে
- ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়াম থেকে উৎপন্ন হরমোন- প্রোজেস্টেরন
- রজঃচক্রের ৭-১৪তম দিনে কোন হরমোন ক্ষরিত হয়- ইস্ট্রোজেন
- ডিম্বপাতের পর ফলিকলের পরিণতি- কর্পাস লুটিয়াম
- যৌন মিলনের পর ডায়াফ্রামকে যোনিতে রাখতে হয়- ৬ ঘণ্টা
- পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর অংশ কেটে বেঁধে দেওয়ার পদ্ধতি- ভ্যাসেকটমি
- নারীর জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বাণু হ্রাসের করা হয়- সাধারণত ২-৩ দিনের মধ্যে
- সাধারণত রজঃচক্রকালে ক্ষরিত হয়- প্রোজেস্টেরন হরমোন

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মরুতার ভেতর তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হওয়ার দশকে বশে -

- (A) ক্রিভেজ (B) ব্লাস্টুলা
(C) আর্কেটেরন (D) Differentiation

(Ans B)

02. নারীর বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোন হরমোনের ভূমিকা নেই?

- (A) গ্রোথ হরমোন (B) অ্যান্ড্রোজেন
(C) ইস্ট্রোজেন (D) ভ্যাসোপ্রেসিন

(Ans B)

03. জাইগোট থেকে জ্রণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয়-

- (A) স্পার্মাটোজেনেসিস (B) উওজেনেসিস
(C) এমব্রায়োজেনেসিস (D) কোনোটিই নয়

(Ans C)

04. গ্যাস্ট্রুলার ভেতরের গহ্বরকে বলা হয়-

- (A) ব্লাস্টোসিল (B) সিলোম
(C) আর্কেটেরন (D) কোনোটিই নয়

(Ans C)

05. নিষেকের ফলে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড কোষকে বলা হয়-

- (A) জার্মপোর (B) জাইগোট
(C) সিনগ্যামি (D) কোনোটিই নয়

(Ans B)

06. কোন যৌনরোগের কারণে পুরুষে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি ঘটে?

- (A) গনোরিয়া (B) সিলিফিস
(C) মাস্পস (D) এইডস

(Ans A)

07. পুরুষের বীৰ্য ত্যাগের অক্ষমতার কারণ নয় কোনটি?

- (A) স্কেরোসিস (B) ডায়াবেটিস
(C) যক্ষ্মা (D) স্পাইনাল ইনজুরি

(Ans C)

08. তিনটি জরীয় স্তর গঠিত হয় কোন ধাপে?

- (A) নিষেক (B) ক্রিভেজ
(C) গ্যাস্ট্রুলেশন (D) অর্গানোজেনেসিস

(Ans C)

09. মাতৃদেহ ও জরায়র মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায় শ্বসনে সাহায্য করে কোনটি?

- (A) অ্যামনিওন (B) কর্পাস লুটিয়াম
(C) জার্মল্যোর (D) অমরা

(Ans D)

10. কোনটি পুরুষের জন্ম নিরোধক পদ্ধতি?

- (A) ডায়াপ্যাম (B) টিউবেকটমি
(C) ইমপ্রাট (D) ভ্যাসেকটমি

(Ans D)

11. পুংজননস্ত্রের অংশ কোনটি?

- (A) ইপিডিডাইমিস (B) ফেলোপিয়ান টিউব
(C) ডিম্বাশয় (D) জরায়ু

(Ans A)

12. কোন রোগের কারণে মানুষের শেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T_H লিম্ফোসাইট ধ্বংস হয়?

- (A) এইডস (B) গনোরিয়া
(C) সিলিফিস (D) ট্রাইসোমি

(Ans A)

13. জরায়ুর সংকোচন ঘটায় কোন হরমোন?

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) রিলাক্সিন
(C) প্রজেষ্টেরন (D) প্রোটাইজ

(Ans A)

14. Test tube baby করা হয় কখন?

- (A) ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে গেলে
(B) স্বামীর কার্যকর শুক্রাণু না থাকলে
(C) নারীতে অপরিণত ডিম্বপাত হলে
(D) ডিম্বনালি পর্যন্ত শুক্রাণু যেতে অসমর্থ হলে

15. ইমপ্রাটেশন কোথায় হয়?

- (A) অমরায় (B) ডিম্বনালিতে
(C) জরায়ুতে (D) ডিম্বাশয়ে

16. নিচের কোনটি বহিঃজরীয় আবরণী?

- (A) করোনা রেডিয়েটা (B) জোনা পেলুসিডা
(C) ভাইটেলাইনমেমব্রেন (D) অ্যালানটয়েস

17. জ্রণ বিকাশের সঠিক স্থান কোনটি?

- (A) ডিম্বাশয় (B) অমরা
(C) ডিম্বনালি (D) জরায়ু

18. আর্কেটেরন কোথায় দেখা যায়?

- (A) ব্লাস্টুলায় (B) জাইগোটে
(C) মরুলায় (D) গ্যাস্ট্রুলায়

19. কোনটি মেসোডার্ম স্তর হতে উৎপন্ন হয়?

- (A) পাকস্থলী ও রক্তনালি (B) হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক
(C) জনন অঙ্গ ও যোজক কলা (D) চুল ও ফুসফুস

20. ১০ টি প্রাইমারি উওসাইট ও ১০টি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে কতটি ডিম্ব ও শুক্রাণু তৈরি হবে?

- (A) ১০ ও ১০ (B) ১০ ও ২০
(C) ১০ ও ৪০ (D) ৪০ ও ৪০

21. রক্তচক্রের কততম দিনে ওভুলেশন বা ডিম্বপাত ঘটে?

- (A) ১২ (B) ১৪
(C) ২৮ (D) ৩৭

22. মানুষের নিষেক সংঘটিত হয় কোন অঙ্গে?

- (A) ফেলোপিয়ান নালি (B) ডিম্বাশয়
(C) যোনি (D) জরায়ু

23. রক্তচক্রের ৭-১৪ তম দিনে কোন হরমোন স্রবিত হয়?

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) FSH
(C) LH (D) GTH

24. জাইগোটের বিভাজনকে কি বলে?

- (A) ব্লাস্টুলেশন (B) গ্যাস্ট্রুলেশন
(C) ক্রিভেজ (D) মরুলেশন

25. প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয় কোথা থেকে?

- (A) সিলোম (B) জরায়ু
(C) খণ্ডক (D) নটোকর্ড

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. মানবদেহের লিম্ফয়েড অঙ্গ ও এদের অবস্থান :

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
আডিনয়েড গ্রন্থি	নাসিকা নালির পেছনে	লসিকানালি	দেহের সর্বত্র বিস্তৃত	লসিকা গ্রন্থি	দেহের সর্বত্র বিস্তৃত
অ্যাপেনডিক্স	বৃহদন্ত্র	পেয়ার প্যাচ	ক্ষুদ্রান্ত্র	সেরুমিনাস গ্রন্থি	কানের ভেতর
রক্তনালিসমূহ	দেহের সর্বত্র বিস্তৃত	প্লীহা	উদর গহ্বর	টনসিল	গলার পেছনে
অস্থিমজ্জা	অস্থিগহ্বর	থাইমাস	শ্বাসনালির পেছনে	ষ্বেদ গ্রন্থি	ত্বকের উপরিভাগ

[Ref: আশরাফ + মাজেদা + আলীম]

২. অ্যান্টিবডি (Antibody) :

অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে যে প্রোটিনধর্মী বস্তু সংশ্লেষিত হয়ে উক্ত অ্যান্টিজেনের সংঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণিদেহে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে তাকে অ্যান্টিবডি (Antibody) বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin) বলে।

৩. অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ :

অ্যান্টিবডির নাম	শতকরা পরিমাণ	ভারী শৃঙ্খল	অবস্থান
IgG	৭৫-৮০	γ (গামা)	দেহের সকল তরল পদার্থ যেমন : রক্ত, লসিকা, অস্ত্র ও টিস্যু তরল ইত্যাদি।
IgA	১০-১৫	α (আলফা)	অশ্রু, লালা, পরিপাক রস, রক্ত, লসিকা, নাক, কান, চোখ, শ্বাসনালি, পরিপাক নালি ইত্যাদি।
IgM	৫-১০	μ (মিউ)	রক্ত, লসিকা, B কোষের উপরিতল ইত্যাদি।
IgE	০.১	ϵ (এপসিলন)	মাস্টকোষ, বেসোফিল, ফুসফুস, ত্বক, মিউকাস আবরণী ইত্যাদি।
IgD	০.২	δ (ডেলটা)	রক্ত, লসিকা, B কোষের উপরিতল ইত্যাদি।

৪. অ্যান্টিবডির প্রধান কাজ :

- এরা কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে।
- ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করতে সহায়তা করে।
- দেহে অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান নষ্ট করতে সহায়তা করে।
- গর্ভকালীন সময়ে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- অপসোনাইজেশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।
- কিছু অ্যান্টিবডি দেহে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের অনুপ্রবেশে বাধা দান করে।

৫. অ্যান্টিজেন (Antigen) : যেসব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন (Immunogen) বলে।

হাদেরিয় অণুজীব বিজ্ঞানী Ladislass Deutsch (1903) সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন।

৬. অ্যান্টিজেনের সাধারণ ধর্ম :

রাসায়নিক প্রকৃতি	অ্যান্টিজেন প্রধানত প্রোটিন। কিন্তু অ্যান্টিজেন পলিস্যাকারাইড ও লাইপোপ্রোটিন জাতীয় হয়।
বহিরাগত ধর্ম	বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অ্যান্টিজেন সাধারণত বহিরাগত হয়।
আণবিক ভর	বিশেষ অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর ১০,০০০ ডাল্টনের বেশি। সর্বাপেক্ষা ভালো অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর মোটামুটি ১,০০,০০০ ডাল্টন হওয়া প্রয়োজন। ইনসুলিনের আণবিক ভর ৫০০০ D।
প্রজাতি নির্দিষ্টতা	একই প্রজাতির অন্তর্গত সব প্রাণীর কলাতে প্রজাতি নির্দিষ্টতা অ্যান্টিজেন থাকে।

৭. টিকা বা ভ্যাকসিন (Vaccine) :

কোনো রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে অথবা নিষ্ক্রিয় জীবাণুমাত্রা দেহে প্রবেশ করিয়ে যে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তাকে ভ্যাকসিন (Vaccine) বা টিকা বলে। নিচে বিভিন্ন প্রকার ভ্যাকসিন চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হলো :

ভ্যাকসিন (উৎপাদনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে)				
নিষ্ক্রিয়	শক্তি হ্রাস	টক্সোয়েড	সাবইউনিট	কনজুগেট
- ইনফ্লুয়েঞ্জা - কলেরা - হেপাটাইটিস A	- হাম - পানিবসন্ত - মাম্পস	- টিটেনাস - ডিপথেরিয়া	- হেপাটাইটিস B - হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস - কোভিড-১৯	হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ B ভ্যাকসিন

৬. জীবাণুঘটিত কয়েকটি রোগের ভ্যাকসিন, তাদের জীবাণু ও প্রকৃতি :

জীবাণুঘটিত রোগ	জীবাণুর ধরন	ভ্যাকসিনের প্রকৃতি	জীবাণুঘটিত রোগ	জীবাণুর ধরন	ভ্যাকসিনের প্রকৃতি
১. হাম	ভাইরাস	মিজলস ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)	৮. যক্ষ্মা	ব্যাকটেরিয়া	BCG (শর্তহীনপ্রাপ্ত জীবাণু)
২. পীতজ্বর	ভাইরাস	পীতজ্বর ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)	৯. টিটেনাস	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
৩. কবোলা	ভাইরাস	কবোলা ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)	১০. ইনফুয়েন্জা	ভাইরাস	ইনফুয়েন্জা ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)
৪. মাম্পস	ভাইরাস	মাম্পস ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)	১১. প্রুপ	ব্যাকটেরিয়া	প্রুপ ভ্যাকসিন (হাসপ্রাপ্ত জীবাণু)
৫. টাইফয়েড	ব্যাকটেরিয়া	টাইফয়েড ভ্যাকসিন (হাসপ্রাপ্ত জীবাণু)	১২. জলাতন্দ্র	ভাইরাস	জলাতন্দ্র ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)
৬. কলেরা	ব্যাকটেরিয়া	কলেরা ভ্যাকসিন (মৃত অণুজীব)	১৩. পোলিওমায়োলাইটিস	ভাইরাস	পোলিও ভ্যাকসিন (নিষ্ক্রিয় ভাইরাস)
৭. ডিপথেরিয়া	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড			

Part 2

At a glance [Most Important Information]

ইমিউনিটি দুর্বল হলে দেওয়া হয়- ভ্যাক্সিন/টিকা

গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন- ড. এডওয়ার্ড জেনার

প্রথম ইমিউনোলজি সম্পর্কে ধারণা দেন- এডওয়ার্ড জেনার

Father of Immunology- এডওয়ার্ড জেনার

লসিকা গ্রন্থির পরিমাণ বেশি- ঘাড়ে, বগলে ও কঁচকিতে

ঘামছাি ও ঘেন্দ্রাছাি থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিক উপস্থিত থাকে- তুকে

অশ্রু ও লালায় রয়েছে- লাইসোজাইম এনজাইম

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ অস্ত্র- জ্বর

দেহের মোট শ্বেত-রক্তকণিকার ৪ শতাংশ- মনোসাইট

- পরিণত মনোসাইটকে বলে- ম্যাক্রোফেজ
- অণুজীব একটি ব্যাকটেরিয়াম ভক্ষণ সম্পন্ন করতে পারে- ০.০১ সেকেন্ড
- বৃকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুসেহে স্থানান্তরিত হয়- IgA
- IgM পাওয়া যায়- রক্ত ও লসিকায়
- B-কোষ, মাস্টকোষ ও বেসোফিলে পাওয়া যায়- IgE
- অস্ত্র ও মলে যে IgA পাওয়া যায় তাকে বলে- ক্যাম্পোঅ্যান্টিবডি
- যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে অধঃক্ষিপ্ত করে তাকে বলে- প্রেসিপিটিন
- গুটিবসন্তের টিকা তৈরি করা হয়- Vaccinia ভাইরাস দিয়ে
- জিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়- ডিপথেরিয়ার টিকা

Part 3

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কত সালে সর্বপ্রথম অ্যান্টিবডি শব্দটি ব্যবহৃত হয়?

- (A) ১৭৭৮ সাল (B) ১৮৭৭ সাল
(C) ১৭৭৭ সাল (D) ১৮৮৭ সাল

(Ans B)

০২. অ্যান্টিবডির বড় ভারী শিকলে কতটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে?

- (A) ৪৪০ (B) ২২০ (C) ৫১০ (D) ৩৬০

(Ans A)

০৩. প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে কতটি অক্সিজেনযুক্ত ডাইসালফাইড বন্ড রয়েছে?

- (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫

(Ans B)

০৪. নিচের কোনটিতে ইমিউনোগ্লোবুলিন A (IgA) উপস্থিত?

- (A) অশ্রু (B) পরিপাক রস (C) শ্বসন তরল রক্ত (D) সবগুলো

(Ans D)

০৫. কোন প্রতিরক্ষা স্তরের মাধ্যমে কলোষ্ট্রাম মায়ের দেহ হতে শিশুর দেহে প্রবেশ করে?

- (A) প্রাকৃতিক সক্রিয় প্রতিরক্ষা (B) কৃত্রিম সক্রিয় প্রতিরক্ষা
(C) প্রাকৃতিক অক্রিয় প্রতিরক্ষা (D) কৃত্রিম অক্রিয় প্রতিরক্ষা

(Ans C)

০৬. বমি কোন ধরনের অনাক্রম্যতা?

- (A) বংশগতীয় (B) রস সংশ্লিষ্ট (C) যান্ত্রিক (D) কোষভিত্তিক

(Ans C)

০৭. হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে কোন অ্যান্টিবডি?

- (A) Ig G (B) Ig D (C) Ig A (D) Ig E

(Ans D)

০৮. কোন অঙ্গটি মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত?

- (A) তুকে (B) পরিপাক গ্রন্থি (C) রক্ত (D) অ্যান্টিবডি

(Ans A)

০৯. WHO যে ছয়টি রোগের টিকা দেয় তাহলো-

- (A) যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, পোলিও, হাম
(B) কলেরা, যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হাম
(C) টিটেনাস, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, কলেরা, পোলিও, হাম
(D) হেপাটাইটিস-বি, কলেরা, যক্ষ্মা, টিটেনাস, পোলিও, হাম

(Ans A)

১০. স্মৃতিকোষ কোন ধরনের রক্তকণিকা?

- (A) লিম্ফোসাইট (B) মনোসাইট (C) নিউট্রোফিল (D) ম্যাক্রোফেজ

(Ans A)

১১. স্মৃতিকোষ কোন কোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে?

- (A) মনোসাইট (B) বেসোফিল
(C) ইওসিনোফিল (D) লিম্ফোসাইট

(Ans D)

১২. দেহের প্রধান সৈনিক হিসেবে কাজ করে কোনটি?

- (A) অ্যান্টিজেন (B) অ্যান্টিবডি (C) প্রোটিন (D) গ্লোবুলিন

(Ans B)

১৩. ভারী চেইনের পার্থক্যের ভিত্তিতে অ্যান্টিবডি কত প্রকার?

- (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫

(Ans C)

১৪. জ্বর ও প্রদাহ কোন প্রতিরক্ষা স্তরে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ?

- (A) প্রথম স্তর (B) দ্বিতীয় স্তর
(C) তৃতীয় স্তর (D) কোনোটিই নয়

(Ans B)

১৫. কমপ্লিমেন্টে কতটি প্রোটিন অনু থাকে?

- (A) ২০ (B) ৩০ (C) ৪০ (D) ৫০

(Ans A)

১৬. গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত-

- (A) আবরণী কলা (B) যোজক কলা
(C) পেশি কলা (D) দ্রাব্য কলা

(Ans A)

১৭. ইমিউনোগ্লোবুলিন কোন জাতীয় পদার্থ?

- (A) কার্বোহাইড্রেট (B) প্রোটিন (C) গ্রাইকোলজেন (D) স্নেহ

(Ans B)

১৮. নিচের কোনটিতে লাইসোজাইম এনজাইম অনুপস্থিত?

- (A) লালা (B) পাচকরস (C) অশ্রু (D) ঘন

(Ans D)

১৯. লালাহিত এনজাইমের ক্রিয়ায় নিম্নের কোন জীবাণু বিনষ্ট হয়?

- (A) Staphylococcus (B) Streptococcus
(C) Bacillus (D) সবগুলো

(Ans D)

২০. মানুষের অক্ষত তুকে বাসকারী ব্যাকটেরিয়া কোনটি?

- (A) Bacillus (B) Fasciola hepatica
(C) Streptococcus (D) Staphylococcus aureus

(Ans D)

২১. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

- (A) ফ্যাগোসাইট (B) নিউট্রোফিল (C) লিম্ফোসাইট (D) সবগুলো

(Ans D)

২২. নিচের কোনটি মানব প্রতিরক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত ইমিউনোগ্লোবুলিন নয়?

- (A) Ig G (B) Ig A (C) Ig C (D) Ig D

(Ans C)

২৩. দেহে প্রবর্তিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ কাজ করে?

- (A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫

(Ans B)

২৪. মানবদেহে কত ধরনের প্রোটিন প্রতিরক্ষক হিসেবে কাজ করে?

- (A) ৩ (B) ২ (C) ৪ (D) ৫

(Ans D)

২৫. কোন বিজ্ঞানী ম্যাক্রোফেজ আবিষ্কার করেন?

- (A) জেনার (B) মেকনিকত
(C) লুই পাস্তুর (D) কোনোটিই নয়

(Ans C)

জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. মেডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণের সূত্র (Law of Segregation):

মনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে পৃথক হয়ে যায়। একে জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র (Law of Purity of Gametes) বা মনোহাইব্রিড ক্রসের সূত্র (Law of Monohybrid Cross) সূত্রও বলা হয়।

১ম সূত্র: Law of segregation পৃথকীকরণ সূত্র জননকোষ শুদ্ধকোষ সূত্র এক সংকর ক্রস সূত্র মনো হাইব্রিড ক্রস সূত্র

২. মেডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment):

দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ন করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1 জনু) শুধু প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী সময় গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়। একে ডাইহাইব্রিড ক্রসের সূত্র (Law of di hybrid cross) সূত্রও বলা হয়।

২য় সূত্র: Law of independent assortment স্বাধীনভাবে সংকরায়নের সূত্র ডাইহাইব্রিড সূত্র

৩. মেডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ:

১৯০০ সালে মেডেলের সূত্র পুনরাবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পর হতেই বিভিন্ন বংশগতিক পরীক্ষায় মেডেলীয় অনুপাতের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. মেডেলের সূত্রের আপাত ব্যতিক্রম ২. মেডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম

১. মেডেলের সূত্রের আপাত ব্যতিক্রম:

মেডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম (আপাত)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ১ম সূত্র | ২য় সূত্র |
| ১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা → ১ : ২ : ১ | ১. পরিপূরক → ৯ : ৭ |
| ২. লিখাল বা মারণ জিন → ২ : ১ | ২. এপিষ্ট্যাসিস → ১৩ : ৩ |
| ৩. সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা → ১ : ২ : ১ | ৩. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস → ৯ : ৭ |
| ৪. অতিপ্রকটতা (over dominance) | |

২. মেডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম → লিংকেজ, মাল্টিপল অ্যালিল, পলিজিন, প্লিওট্রপি ইত্যাদি। [Ref: আজমল + আলীম + আশরাফ]

৪. লিখাল জিন বা মারণ জিন বা মারণ জিন (Lethal Gene):

কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিখাল জিন বলে। এটি জীবের জিন বা DNA এর কোনো অংশের মিউটেশনের কারণে ঘটে থাকে।

৫. লিখাল জিনের বৈশিষ্ট্য:

- এক প্রকার মিউট্যান্ট জিন যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।
- প্রচ্ছন্ন লিখাল জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- প্রকট লিখাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- জাইগোট বা জগ্ন অবস্থায় জীব মারা যায়।

৬. লিখাল জিনের উদাহরণ:

- ক্রীপার মুরগি
- পাবিহীন বাছুর
- মানুষে ইনফ্যান্টাইল অ্যামারটিক ইডিওসি
- হিমোফিলিয়া
- মানুষে জন্মগত ইকথিওসিস
- মানুষে ব্র্যাকিফ্যালাজি
- মানুষে থ্যালাসেমিয়া

৫. লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Principle of Sex determination):

যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলি অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination) বলে। আবার, যেসব ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমোসোম বা হেটারোজোম (sex chromosome or heterosome) বা অ্যালোসোম বলে। যেমন: মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে মাত্র এক জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম। এদের X ও Y বা O দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৬. সেক্স ক্রোমোসোম পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ:

ধরন	হেটারোজাইগাস	স্ত্রী	পুরুষ	যেসব প্রাণীতে ঘটে		
XX-XY	পুরুষ	X ও Y	X	XX	XY	Drosophila, মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী
XX-XO	পুরুষ	X ও O	X	XX	XO	ঘাসফড়িং, গান্ধিপোকা, তেলাপোকা ইত্যাদি
ZZ-ZW	স্ত্রী	Z	Z ও W	ZW	ZZ	পাখি, প্রজাপতি ও কিছু মাছ
ZZ-ZO	স্ত্রী	Z	Z ও O	ZO	ZZ	কিছু মথ ও প্রজাপতি

[Ref: আলীম]

৬. সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder):

সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (Sex-linked gene) বলে। সেক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট 'X' ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিংকড জিন (Sex-linked gene) বলে। সেক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের ক্রমবিন্যাসিত অস্বাভাবিকতা বা রোগ সৃষ্টি হয় তাদের একত্রে লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা বা সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (sex-linked disorder) বলে।

৬ মানুষের কয়েকটি সেরা লিংকড ডিসঅর্ডার (লিঙ্ক জড়িত অস্বাভাবিকতা) :

১. লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা	২. হিমোফিলিয়া	৩. ডুশিনি মাসকুলার ডিসট্রফি	৪. রাতকানা	৫. ফ্রাজাইল X সিনড্রোম
৬. হিমোফিলিয়া	৭. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	৮. মাসকুলার ডিসট্রফি	৯. স্প্যাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া	
১০. টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন	১১. এক্টোডার্মাল ডিসপ্লাসিয়া	১২. বর্ণান্ধতা	১৩. অপটিক অ্যাট্রফি	
১৪. জুভেনাইল গ্রুকোমা	১৫. হোয়াইট ফোরলক	১৬. মায়োপিয়া	১৭. হাইপারট্রাইকোসিস	

১ ABO রক্ত গ্রুপ (ABO-Blood group) :

লোহিত রক্তকণিকার প্রাজন্মিকভাবে কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে ABO রক্ত গ্রুপ বা সংক্ষেপে রক্তগ্রুপ (blood group) বলা হয়।

৬ ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

রক্ত গ্রুপ	RBC -র অ্যান্টিজেন	প্রাজন্মিক অ্যান্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে
A	অ্যান্টিজেন-A	অ্যান্টিবডি-b	A, AB	A, O
B	অ্যান্টিজেন-B	অ্যান্টিবডি-a	B, AB	B, O
AB	অ্যান্টিজেন-A ও B	নেই	AB	A, AB, B, O
O	নেই	অ্যান্টিবডি-a ও b	A, B, AB, O	O

২ ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale) :

ভূতাত্ত্বিক সময় বলতে পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরো সময়কে বোঝায়। ভূতাত্ত্বিক সময় বা ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা (টাইম স্কেল) ব্যবহার করে ভূবিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সংঘটিত সকল ঘটনা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের গবেষণা করে থাকেন। বিজ্ঞানীরা এই সময়কে বিভিন্ন সীমায় বিভক্ত করেছেন এবং প্রতিটি সীমার পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন যুগান্তকারী ঘটনার মাধ্যমে এই সীমাগুলো নির্ণয় করা হয়েছে।

৬ ভূতাত্ত্বিক মহাকালগুলোর নাম এবং প্রতিটি মহাকালের প্রধান প্রধান প্রাণীগুলোর নাম :

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale)					
মহাকাল (Eras)	কাল (Period)	ইপোক (Epoch)	বছর পূর্বে	প্রধান প্রাণী	মন্তব্য
সিনোজেনিক (Cenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	রিসেন্ট (Recent)	২৫ হাজার	আধুনিক মানুষ ও সভ্যতার উদ্ভব।	
		প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	১০ লক্ষ	মানুষের প্রথম সামাজিক জীবন; বহু স্তন্যপায়ী লুপ্ত।	
		প্লিওসিন (Pliocene)	২ কোটি	মানুষের উদ্ভব।	
	টারশিয়ারি (Tertiary)	মায়োসিন (Miocene)	সাতো ৩ কোটি	স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য	স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of Mammals)
		ওলিগোসিন (Oligocene)	সাতো ৪ কোটি	নানা প্রকার স্তন্যপায়ী।	
		ইওসিন (Eocene)	সাতো ৬ কোটি	আদি স্তন্যপায়ী লুপ্ত; অমরায়ুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	সাতো ৭ কোটি	আদিম স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
মেসোজেনিক (Mesozoic)	ক্রিটাসিয়াস (Cretaceous)		সাতো ১৩ কোটি	ডাইনোসরের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, বর্তমান পাখির উদ্ভব; আদি স্তন্যপায়ী।	সরীসৃপের যুগ (Age of Reptiles)
	জুরাসিক (Jurassic)		সাতো ১৬ কোটি	বিভিন্ন রকম ডাইনোসর; দাঁতযুক্ত প্রথম পাখি।	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		সাতো ২২ কোটি	ডাইনোসরের উদ্ভব; স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের প্রাধান্য।	
প্যালিওজেনিক (Paleozoic)	পার্মিয়ান (Permian)		২৪ কোটি	বর্তমান পতঙ্গ; বহু আদি প্রাণী লুপ্ত; হুলে প্রাণীর আবির্ভাব।	উভচর, মাছ ও অসংকদী প্রাণীদের যুগ (Age of Amphibia, Fishes and Invertebrates)
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		২৯ কোটি	পতঙ্গ, কষ্টকভূক প্রাণী, হাঙর, আদি সরীসৃপ।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		সাতো ৩৭ কোটি	বহু প্রজাতির মাছ; উভচরের আবির্ভাব	
	সিলুরিয়ান (Silurian)		সাতো ৪২ কোটি	কাঁকড়া, বিছা, মাছ।	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		সাতো ৫০ কোটি	প্রবাল; মাছের উদ্ভব।	
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		সাতো ৫৮ কোটি	অমেরুদণ্ডী; ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি।	
প্রোটেরোজেনিক (Proterozoic)			২৫০ কোটি	আদ্যপ্রাণী	
আর্কিওজেনিক (Archeozoic)			৪০০ কোটি	কোনো জীবাত্ম নেই	

একটি জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়- মেডেলের প্রথম সূত্র
 কোন জীবের জিনোটাইপ নির্ধারণ করা যায়- টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে
 একটিতে সকল হলুদ বর্ণের ইঁদুরের প্রকৃতি- হোমোজাইগাস
 ৩০% এর বেশি জীব মারা যায়- সেমিলিথাল জিনের প্রভাবে
 ৩০% এর কম সংখ্যক জীব মারা যায়- সাবভাইটাল জিনের প্রভাবে
 মানুষ হিমোফিলিয়া রোগ সৃষ্টিকারী লিথাল জিন- সেমিলিথাল ধরনের
 একটি এপিষ্ট্যাটাসিসের ওপর পরীক্ষা করেন- বেটসন ও পানেট
 মানুষের সের-লিংকড জিন পাওয়া যায়- ৬০টি
 মানুষের Y জিন নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য- কানের লোম
 মানুষের তিস্ট্রফি বেশি হয়- ছেলে শিশুদের
 প্রথমতম তিস্ট্রফি- ভুশেনি মাসকুলার ডিস্ট্রফি
 দুইটি মাসকুলার তিস্ট্রফি রোগ দেখা যায়- পঞ্চাশ হাজারে মাত্র একজন

- মাসকুলার ডিস্ট্রফির জন্য দায়ী জিন- ডিসট্রফিন জিন
- হিমোফিলিয়া A হওয়ার প্রবণতা- ৮০%
- মানবদেহে অ্যান্টিজেন রয়েছে- ৪০০ ধরনের
- অ্যাথুটিনোজেন/আইসোঅ্যাথুটিনোজেন বলা হয়- অ্যান্টিজেনকে
- জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়- অ্যান্টিজেন
- ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে- অ্যান্টিজেন
- Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট জটিলতা- রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা
- মেডেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন যে রক্তে থাকে তাকে বলে- Rh⁺ রক্ত
- প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে- পপুলেশন পর্যায়ে
- বছরে ৬০০ বার প্রজনন ঘটতে সক্ষম- প্যারামেসিয়াম
- নয়া-ডারউইনবাদের প্রধান প্রবক্তা- অগাস্ট ভাইজম্যান
- ভাইজম্যান জার্মান প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রকাশ করেন- ১৮৯৫ সালে

- কোন ধরনের প্রাণী থেকে পাখির উদ্ভব হয়েছে?
 (A) উভয় (B) সরীসৃপ
 (C) মল্য (D) স্তন্যপায়ী **(Ans B)**
- গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ কোন মহাসাগরে অবস্থিত?
 (A) আটলান্টিক (B) প্রশান্ত
 (C) এটলান্টিকা (D) উত্তর আমেরিকা **(Ans B)**
- অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম- উক্তিটি কার?
 (A) ল্যামার্ক (B) ডারউইন
 (C) হেক্সেল (D) দ্য ভিস **(Ans B)**
- কোনটি জীবিত?
 (A) মেরিকহিপ্সাস (B) মেসোহিপ্সাস
 (C) ইকুয়াস (D) ইয়োহিপ্সাস **(Ans C)**
- নয়া-ডারউইনবাদের প্রধান প্রবক্তা কে ছিলেন?
 (A) হাবল (B) হেক্সেল
 (C) ল্যামার্ক (D) অগাস্ট ভাইজম্যান **(Ans D)**
- কোন যুগে মানুষের উদ্ভব হয়েছে?
 (A) ইওনিন (B) অলিগেনিন
 (C) মায়োসিন (D) প্লিওসিন **(Ans D)**
- নিচের কোন রোগের কারণে হাই স্কুলের একজন ছাত্র চলনশক্তিহীন হয়ে যেতে পারে?
 (A) এক্সোডার্মাল ডিসপ্রেসিয়া (B) মায়োপিয়া
 (C) মাসকুলার ডিসট্রফি (D) হিমোফিলিয়া **(Ans C)**
- সমপ্রকটতার ক্রিয়ায় F₂ জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত কত?
 (A) ১ : ২ : ১ (B) ২ : ১
 (C) ১ : ১ (D) ৩ : ১ **(Ans A)**
- কোনটি মেডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রমের উদাহরণ?
 (A) অসম্পূর্ণ প্রকটতা (B) প্রকট এপিষ্ট্যাটাসিস
 (C) এপিষ্ট্যাটাসিস (D) পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স **(Ans A)**
- দেখ প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাটাসিস এর ফিনোটাইপিক অনুপাত হলো-
 (A) ৯ : ৭ (B) ১৩ : ৩
 (C) ৯ : ৩ : ৩ : ১ (D) ১ : ২ : ১ **(Ans A)**
- নিচের কোনটি মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রমের উদাহরণ?
 (A) অসম্পূর্ণ প্রকটতা (B) সমপ্রকটতা
 (C) এপিষ্ট্যাটাসিস (D) লিথাল জিন **(Ans C)**

- বাবা ও মা উভয়ের রক্ত্রুপ AB হলে সন্তানের রক্ত্রুপ AB হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?
 (A) ২৫% (B) ৫০%
 (C) ৭৫% (D) ১০০% **(Ans B)**
- নিলা বর্ণাঙ্ক X^CX^C তার বাবা ও মায়ের জিনোটাইপ কি হবে?
 (A) XY এবং X^CX (B) XY এবং X^CX^C
 (C) X^CY এবং X^CX^C (D) X^CY এবং XX **(Ans C)**
- প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের প্রবর্তক কে?
 (A) জাঁ ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক (B) চার্লস রবার্ট ডারউইন
 (C) নিকোলাস টিন বার্জেন (D) আইভান প্যাভলভ **(Ans B)**
- সমপ্রকটতার অনুপাত কোনটি?
 (A) ৯ : ৭ (B) ২ : ১
 (C) ১৩ : ৩ (D) ১ : ২ : ১ **(Ans D)**
- অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি কার মতবাদ?
 (A) ডারউইন (B) ল্যামার্ক
 (C) হাবল (D) মেডেল **(Ans B)**
- ল্যামার্কবাদের মূল বিষয়বস্তু কোনটি-
 (A) স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জীবদেহে পরিবর্তন সূচিত হয়
 (B) ধারাবাহিক পরিবর্তনগুলো বংশানুসরণযোগ্য
 (C) অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্যই বংশানুসরণযোগ্য
 (D) জীবন সংগ্রামে পরাজিত জীব বিলুপ্ত হয় **(Ans C)**
- নিচের কোনটি সমসংস্থ অঙ্গ নয়?
 (A) পাখির ডানা ও পতঙ্গের ডানা (B) ঘোড়ার অগ্রপদ ও মানুষের হাত
 (C) পাখির ডানা ও ঘোড়ার অগ্রপদ (D) মানুষের হাত ও সীলের ফ্লিগার **(Ans A)**
- AaBH জিনোটাইপধারী জীব থেকে কয় ধরনের গ্যামেট তৈরি হতে পারে?
 (A) ১ (B) ২
 (C) ৩ (D) ৪ **(Ans D)**
- মেডেলের প্রথম সূত্রকে কি বলে?
 (A) ক্রোমোসোম তত্ত্ব (B) পৃথকীকরণের সূত্র
 (C) পেনজেনেসিস তত্ত্ব (D) স্বাধীন সম্ভারণের সূত্র **(Ans B)**

প্রাণীর আচরণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. সহজাত আচরণ (Innate Behaviour) :

অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় (reflex action) সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট (Species specific), শিক্ষণবিহীন ও বংশগত আচরণই হলো সহজাত আচরণ। যেমন : পাখির বাসা বাঁধা, মাকড়সার জাল বোনা, মৌমাছির চাক তৈরি, শিশুর স্তন পান, ছাগল বা গরুর বাচ্চা জন্মের পর ছোট্টাছুটি ইত্যাদি।

৬ সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য :

- ১। সহজাত আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট।
- ২। সহজাত আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত।
- ৩। জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না।
- ৪। সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।
- ৫। অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে সহজাত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে।

৬ বিভিন্ন ধরনের সহজাত আচরণ :

নাম	উদাহরণ
বিবাদসুলভ/ আক্রমণাত্মক/ বিগ্রহ/ লড়াই (Fighting behaviour)	মাছ, পাখি ও স্তন্যপায়ী
যুগলবন্দি ও মৈথুন আচরণ (Courtship & Mating behaviour)	পতঙ্গ ও পাখি
অপত্য লালন বা বাৎসল্য আচরণ (Parental care behaviour)	মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী
অভিপ্রয়াণ আচরণ (Migratory behaviour)	স্যামন, ইগল, হেরিং, ইলিশ মাছ, পাখি
সঞ্চয় আচরণ (Hoarding behaviour)	পিপড়া, মৌমাছি, কাঠবিড়ানী, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর
খাদ্য অন্বেষণ ও সংরক্ষণ (Food seeking and hoarding of food)	কীটপতঙ্গ, পাখি ও স্তন্যপায়ী
সূপ্ত আচরণ (Latent behaviour)	ব্যাঙ, সরীসৃপ → শীতনিদ্রা দেখা যায়; টিকটিকি, গিরিগিটি → গ্রীষ্মনিদ্রা দেখা যায়

২. চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস :

উদ্দীপনার প্রভাবে কোনো বাহ্যিক লক্ষ্য সংক্রান্ত বা গতিপথ সংক্রান্ত (directional) জীবদেহের সামগ্রিক চলনই হলো ট্যাক্সিস।

৬ ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য :

- এটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না।
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয়।
- দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ দেহ জড়িত থাকে।
- দিকমুখী চলন সরাসরি উদ্দীপনা শক্তির সমানুপাতিক।
- এটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া।
- খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।

৬ ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ :

☞ দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে :

ট্যাক্সিসের নাম	ধরন
ধনাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।
ঋণাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্দীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

[Ref: আজমল]

☞ ট্যাক্সিসের দিকমুখিতার ভিত্তিতে :

ট্যাক্সিসের নাম	ধরন	ট্যাক্সিসের নাম	ধরন
১. ক্রাইনোট্যাক্সিস	• যেসব প্রাণীতে এ ট্যাক্সিস ঘটে সেসব প্রাণীতে কোনো জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে না। • এদের সংবেদগ্রাহী কোষগুলো দেহের সমুখ অংশে অবস্থান করে। • ব্লোফ্লাই (Blowfly) ও বাটারফ্লাই (Butterfly) এর লার্ভায় এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।	২. মেনোট্যাক্সিস	প্রাণীর দিকমুখিতা থাকে কৌণিক ধরনের। উদাহরণ : সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিঁপড়ার চলন।
		৩. নেমোট্যাক্সিস	এটি প্রাণীর স্মৃতিমূলক সাড়া দান।
		৪. টেলোট্যাক্সিস	এটি হচ্ছে শক্তিশালী উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দান।
		৫. ট্রোপোট্যাক্সিস	• এক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদাঙ্গ উপস্থিত থাকে। • মাছের উকুনে এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

[Ref: আজমল]

বাংলাদেশে তিন প্রজাতির মৌমাছি			ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি
(i) <i>Apis indica</i>	(ii) <i>Apis dorsata</i>	(iii) <i>Apis florea</i>	(i) <i>Apis mellifera</i> (ii) <i>Apis adamsoni</i>

```

graph TD
    A[মৌমাছি কলোনি] --> B[রানি (Queen) : ১টি]
    A --> C[কর্মী (Worker) : কয়েক হাজার]
    A --> D[পুরুষ মৌমাছি (Drone) : কয়েকশত]

```

মৌমাছির নাম	কাজ	মৌমাছির নাম	কাজ
রানি মৌমাছি	- ডিম পাড়া। - কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা। - ফেরোমনের (Oxydecenoic acid) সাহায্যে মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংঘবদ্ধ রাখা। - এরা অবিরাম বাচ্চা উৎপাদন করে কলোনির আকৃতি সমৃদ্ধ করে।	কর্মী মৌমাছি	- মৌচাক পাহারা দেওয়া ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করা। - মৌচাকের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা। - রানির পরিচর্যা করা। - ক্রডের বিভিন্ন সদস্যদের যত্ন নেওয়া, খাদ্য প্রদান করা, মোম উৎপাদন ও চাক গঠন করা। - খাদ্যের অনুসন্ধান। - নেকটার, পানি, রেণু ইত্যাদির সাহায্যে মধু সৃষ্টি করা। - পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য কর্মী মৌমাছিকে হত্যা করা। - প্রোপোলিস উৎপাদন করা।
পুরুষ মৌমাছি	- সঙ্গম উভয়নে অংশগ্রহণ করা। - প্রজাতির বংশ রক্ষা করা। - কলোনির তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে।		

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. প্যাভলভকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় কত সালে?

- (A) ১৯০৪ (B) ১৯৪০ (C) ১৯৪৪ (D) ১৯১৪ (Ans A)

02. *Archaeopteryx* কে কোন কোন প্রাণীর সংযোগকারী যোগসূত্র বলা হয়?

- (A) উভচর ও পাখি (B) উভচর ও সরীসৃপ
(C) সরীসৃপ ও পাখি (D) পাখি ও স্তন্যপায়ী (Ans C)

03. ইথোলজির জনক কে?

- (A) কনরাড লরেঞ্জ (B) আই পি প্যাভলভ
(C) নিকো টিনবার্জেন (D) কার্ল ফন ভ্রিস (Ans C)

04. জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে কোন প্রাণী?

- (A) ব্যাঙ (B) মৌমাছি
(C) স্টিকলব্যাক (D) টুনটুনি (Ans C)

05. অপত্য লালন কোন ধরনের আচরণ?

- (A) সহজাত (B) সামাজিক
(C) প্রতিবর্তী (D) শিখন (Ans A)

06. কেঁচোর সবসময় ভিজা মাটির দিকে গমন কোন ধরনের ট্যাক্সিস?

- (A) হাইড্রোট্যাক্সিস (B) জিওট্যাক্সিস
(C) ফটোট্যাক্সিস (D) জ্যাকব ক্রাইন (Ans A)

07. রানি মৌমাছির দেহ হতে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?

- (A) এস্ট্রোজেন (B) প্রোজেস্টেরন
(C) টেস্টোস্টেরন (D) ফেরোমন (Ans D)

08. প্যাভলভ কোন ধরনের শিখনের পরীক্ষা করেন?

- (A) সাপেক্ষণ (B) অনুকরণ
(C) পরীক্ষালব্ধ (D) সৃষ্ট (Ans A)

09. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে যে ট্যাক্সিস ঘটে তা হলো-

- (A) রিওট্যাক্সিস (B) কেমোট্যাক্সিস
(C) হাইড্রোট্যাক্সিস (D) জিওট্যাক্সিস (Ans D)

10. মাকড়সার সিঁদ্ধ গ্রন্থিতা থেকে কি নিঃসৃত হয়?

- (A) সেরাটেনিন (B) হিস্টামিন
(C) ক্রোরোথ্রোটিন (D) অ্যালবুমিন (Ans C)

11. কোনটি প্রাণীর দৈহিক স্পর্শজনিত ট্যাক্সিস?

- (A) থিগমোট্যাক্সিস (B) অ্যারোট্যাক্সিস
(C) রিওট্যাক্সিস (D) মেনোট্যাক্সিস (Ans A)

12. মৌচাকে মৌমাছির আচরণ কি ধরনের?

- (A) সহজাত (B) সামাজিক
(C) শিখন (D) প্রতিবর্তী (Ans B)

13. প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাখি সঠিকভাবে ঘরে ফেরা হলো-

- (A) মেনোট্যাক্সিস (B) নেমোট্যাক্সিস
(C) টেলোট্যাক্সিস (D) জিওট্যাক্সিস (Ans B)

14. শব্দের প্রতি সাড়া দান কোন ধরনের ট্যাক্সিস?

- (A) ফটোট্যাক্সিস (B) থিগমোট্যাক্সিস
(C) ফনোট্যাক্সিস (D) রিওট্যাক্সিস (Ans C)

15. রাজকীয় জেলি তৈরি করা কোন মৌমাছির কাজ?

- (A) রানি (B) ড্রোন
(C) কর্মী (D) কর্মী ও ড্রোন উভয়ের (Ans C)

16. প্রজনন ঋতুতে কার্প মাছের হালদায় আগমন কোন ধরনের আচরণ?

- (A) হাইড্রোট্যাক্সিস (B) জিওট্যাক্সিস
(C) রিওট্যাক্সিস (D) কেমোট্যাক্সিস (Ans C)

17. প্রবাহমান পানি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সচল প্রাণীতে যে ট্যাক্সিস ঘটে, তার নাম কি?

- (A) জিওট্যাক্সিস (B) থিগমোট্যাক্সিস
(C) অ্যারোট্যাক্সিস (D) রিওট্যাক্সিস (Ans D)

18. প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাকে কি বলে?

- (A) Ethology (B) Taxonomy
(C) Ecology (D) Embryology (Ans A)

19. আলোর প্রতি সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া হলো-

- (A) Chemotaxis (B) Thigmotaxis
(C) Rheotaxis (D) Phototaxis (Ans D)

20. আগুন কারো হাত পুড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত সরিয়ে নিবে। এটা কোন ধরনের আচরণ?

- (A) স্বভাবজাত (B) প্রতিবর্ত ক্রিয়া
(C) শিখন (D) ট্যাক্সিস (Ans B)

21. ক্ষুধার্ত প্রাণী অন্যকে খাবার খেতে দেখলে তার লালা ক্ষরণ হয়, এটি-

- (A) সহজাত আচরণ (B) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া
(C) অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (D) শিখন আচরণ (Ans B)

22. প্রাণিদেহের ক্ষেত্রে অ্যালট্রাইজম হলো-

- (A) পরার্থপরতা (B) স্বার্থপরতা
(C) অস্বাভাবিকতা (D) অর্জিত গুণ (Ans A)

23. কোন অঞ্চল থেকে সবচেয়ে বেশি পাখি শীতকালে বাংলাদেশে আসে?

- (A) অস্ট্রেলিয়া (B) ইন্দোনেশিয়া
(C) ভিয়েতনাম (D) হিমালয়ের পাদদেশ (Ans D)

24. ট্যাক্সিসের দিকমুখী চলন উদ্দীপনা শক্তির-

- (A) সমানুপাতিক (B) ব্যস্তানুপাতিক
(C) সমান (D) বিপরীত (Ans A)

25. উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেওয়ার সরলতম ধরন কোনটি?

- (A) ট্যাক্সিস (B) রিফ্লেক্স
(C) ইনসটিংক্টিভ (D) সবগুলো (Ans B)