

Part 2

গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ হলে, $A+B$ ও $A-B$ নির্ণয় কর।

Sol: $A+B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 1+3 & -2+0 & 2+2 \\ 4-7 & 5+1 & 6+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ -3 & 6 & 14 \end{bmatrix}$
 আবার, $A-B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 1-3 & -2-0 & 2-2 \\ 4-(-7) & 5-1 & 6-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 11 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

02. যদি $R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $R^{-1} = ?$

Sol: এখানে $R^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ $\therefore \text{Adj}(R) = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$,
 আবার, $|R| = (4-6) = -2$
 $\therefore R^{-1} = \frac{\text{Adj}(R)}{|R|} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

03. যদি $\begin{bmatrix} x-y & 1 \\ 7 & x+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $(x, y) = ?$

Sol: ম্যাট্রিক্সের সমান হওয়াতে $x-y=8$ এবং $x+y=2$
 $\therefore 2x=10 \Rightarrow x=5$
 আবার, $x-y=8 \Rightarrow y=-3 \therefore (x, y) = (5, -3)$

04. $\begin{pmatrix} \alpha+2 & 2 \\ 8 & \alpha-4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে যদি α এর মান কত?

Sol: $\therefore \begin{vmatrix} \alpha+2 & 2 \\ 8 & \alpha-4 \end{vmatrix} = 0$
 $\Rightarrow (\alpha+2)(\alpha-4) - 16 = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 4\alpha + 2\alpha - 8 - 16 = 0$
 $\Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 24 = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 6\alpha + 4\alpha - 24 = 0$
 $\Rightarrow \alpha(\alpha-6) + 4(\alpha-6) = 0 \Rightarrow (\alpha-6)(\alpha+4) = 0 \therefore \alpha = -4, 6$

05. $M = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 5 & b & 6 \\ -4 & 8 & -5 \end{bmatrix}$ এর Trace, মুখ্যকর্ণ, মুখ্যপদ, মাধ্যমিক কর্ণ,

মাধ্যমিক পদ কত?

(i) Trace-এর মান 1 হলে $b = ?$

(ii) মুখ্যপদের মান -20 হলে, $b = ?$

(iii) মাধ্যমিক পদের মান 8 হলে $b = ?$

Sol: Trace $= 2 + b - 5 = b - 3$

(i) শর্তমতে, $b-3=1 \Rightarrow b=4$

(ii) মুখ্যকর্ণ 2, $b, -5$ দিয়ে অংকিত কর্ণ।

মুখ্যপদ $= 2 \times b(-5) = -10b$;

শর্তমতে, $-10b = -20 \Rightarrow b=2$

(iii) মাধ্যমিক কর্ণ -4, $b, -1$ দিয়ে অংকিত কর্ণ।

মাধ্যমিক পদ $= (-4)b(-1) = 4b$;

শর্তমতে, $4b = 8 \Rightarrow b=2$

06. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix}$ হলে, 5 এর অনুরাশি কত?

Sol: 5 উপাদানটি ২য় কলাম ও ২য় সারিতে অবস্থিত বলে ২য় সারি ও ২য় কলাম বাদ দিয়ে বাকীদের দ্বারা গঠিত নির্ণায়ক হল অনুরাশি।

$= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 9 - 21 = -12$

07. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ হয় তবে দেখাও যে, $A^2 + 3A - 10I =$

যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Sol: $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}$
 $\therefore A^2 + 3A - 10I = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 9 & -22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$

08. $\begin{bmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & z+x \\ 1 & z & x+y \end{bmatrix}$ নির্ণায়কটির মান নির্ণয় কর।

Sol: $\begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & z+x \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & x+y+z \\ 1 & y & x+y+z \\ 1 & z & x+y+z \end{vmatrix} [c_3 = c_2 + c_1]$
 $= (x+y+z) \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & z & 1 \end{vmatrix} = (x+y+z) \times 0 = 0$

09. x এর মান বের কর: $\begin{vmatrix} x+4 & 3 & 3 \\ 3 & x+4 & 5 \\ 5 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$

Sol: $\begin{vmatrix} x+1 & 3 & 3 \\ -x-1 & x+4 & 5 \\ 0 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0 [c_1' = c_1 - c_2]$

$\Rightarrow (x+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & x+4 & 5 \\ 0 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & x+7 & 8 \\ 0 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0 [r_2' = r_1 + r_2]$

$\Rightarrow (x+1) \{(x+7)(x+1) - 40\} = 0$

$\Rightarrow (x+1)(x+11)(x-3) = 0 \therefore x = -1, -11, 3$

10. যদি $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ এবং $C = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ হয়, তবে দেখাও

$(AB)C = A(BC)$.

Sol:

$AB = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-0 & 6-2 & 9-10 \\ 1-0 & 2-2 & 3-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & -7 \end{pmatrix}$

$BC = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-6+0 \\ 0-3+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$

বামপক্ষ $= (AB)C = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-12-0 \\ 2-0-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix}$

ডানপক্ষ $= A(BC) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12+6 \\ -4+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\therefore (AB)C = A(BC)$ (দেখানো হলো)

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. A একটি 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং $\det(-2A) = 4$ হয়, তবে $\det A =$ কত?
 (A) 8 (B) $\frac{1}{2}$ (C) -2 (D) $-\frac{1}{2}$ (Ans D)

02. যদি $\begin{bmatrix} 2 & x \\ y-1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3+y \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ তবে $(x, y) =$?
 (A) (8, 5) (B) (-6, 3) (C) (-8, 5) (D) (6, 3) (Ans A)

03. A ও B একটি 2×2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং $\det(A) = 3$, $\det(B) = -8$ হয়, তবে $\det(\frac{1}{2}AB^T A^{-1}) =$ কত?
 (A) -4 (B) $-\frac{1}{16}$ (C) -2 (D) -1 (Ans C)

04. A, B, C ম্যাট্রিক্সগুলোর মাত্রা যথাক্রমে 4×5 , 5×4 এবং 4×2 হলে, $(A^T + B)C$ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হবে -
 (A) 5×4 (B) 4×2 (C) 5×2 (D) 2×5 (Ans C)

05. $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস কোনটি?
 (A) $\frac{9}{8}$ (B) $\frac{8}{9}$ (C) 8 (D) 9 (Ans A)

06. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & a \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস (Trace) এর মান 8 হলে, a এর মান কোনটি?
 (A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 4 (Ans B)

07. $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ এবং $B = (2 \ 3 \ 4)$ হলে, AB কত?
 (A) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ (C) (20) (D) AB অসম্ভব (Ans A)

08. নিচের কোনটি শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স?
 (A) $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 8 & -4 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ (Ans C)

09. $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ হলে, $P^2 =$ কত?
 (A) $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 9 & 25 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -10 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -9 & 28 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -9 & -16 \end{bmatrix}$ (Ans C)

10. $[1 \ 3] \begin{bmatrix} y & x \\ 5 & x \end{bmatrix} = [12 \ 4]$ হলে $(x, y) =$ কত?
 (A) (-3, 1) (B) $(\frac{1}{3}, 11)$ (C) $(-\frac{1}{3}, 11)$ (D) (1, -3) (Ans D)

11. যদি $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ হয়, তবে B^{-1} নিচের কোনটি?
 (A) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ (Ans B)

12. $\begin{bmatrix} a+4 & 5 \\ -4 & a-5 \end{bmatrix}$ ব্যতিক্রমী হলে a এর মান কত?
 (A) 0, 1 (B) 1 (C) 0, 9 (D) 0, -1 (Ans A)

13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ এবং $\lambda A = \begin{bmatrix} 0 & 3a \\ 2b & 24 \end{bmatrix}$ হলে $(\lambda, a, b) =$ কত?
 (A) (-6, -4, -8) (B) (-6, 4, -9) (C) (-6, -4, 9) (D) (-6, -4, -9) (Ans D)

14. x এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} 2 & 4 & x \\ 4 & 7 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে?
 (A) -6 (B) 2 (C) 6 (D) 7 (Ans C)

15. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ হলে $A + 2B =$ কত?
 (A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (Ans A)

16. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$ হলে $(A + B)$ ম্যাট্রিক্সটি কি ধরনের ম্যাট্রিক্স?
 (A) অভেদক (B) বিপ্রতিসম (C) স্কেলার (D) সমঘাতি (Ans C)

17. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ হলে $(AB)C$ ম্যাট্রিক্সটির ক্রম কত?
 (A) 2×1 (B) 1×2 (C) 2×2 (D) 3×2 (Ans A)

18. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$ হলে $A^2 - 2I$ এর ম্যাট্রিক্সটি কোনটি?
 (A) $\begin{bmatrix} 3 & -12 \\ -12 & 27 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ -12 & 27 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 12 & 27 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 3 & -12 \\ 12 & 27 \end{bmatrix}$ (Ans A)

19. $A = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ হলে $\text{adj} A =$ কত?
 (A) $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ (Ans A)

20. $2A + B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $A - B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ হলে A = কত?
 (A) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (Ans A)

21. কোনটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স?
 (A) $\begin{bmatrix} 6 & 6 \\ -5 & -5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 4 & 12 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (Ans A)

22. নিচের কোনটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স?
 (A) $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ (Ans D)

23. নিচের কোনটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স?
 (A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ (Ans B)

24. $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 8 & -9 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 8 & -x \\ 2 & y & -9 \\ 1 & z & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 13 & 7 \\ 8 & 8 & -18 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ হলে x, y ও z এর মান কত?
 (A) -7, -18, 5 (B) 0, 0, 0 (C) 0, 0, 2 (D) 7, -8, 0 (Ans B)


25. $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $A - B = \begin{bmatrix} 5 &$

Part 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

(i) $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$; [যেহেতু, $\theta = 90^\circ$]

$$\hat{i}.\hat{i} = \hat{j}.\hat{j} = \hat{k}.\hat{k} = 1; \quad [\text{যেহেতু, } \theta = 0^\circ]$$


$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0 \quad [\text{যেহেতু, } \theta = 0^\circ]$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}; [\text{যেহেতু, } \theta = 90^\circ]$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}.$$

$$\bar{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \quad \bar{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

i. A ভেক্টরের মান, $|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

ii. B এর মান, $|\vec{B}| = B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$

iii. $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$

$$\bar{A} - \bar{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j} + (A_z - B_z)\hat{k}$$

যদি $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ এবং $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$ হয়, তবে

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

যদি $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ এবং $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$ হয়, তবে

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i} (A_y B_z - B_y A_z) - \hat{j} (A_x B_z - A_z B_x) + \hat{k} (A_x B_y - A_y B_x)$$

□ (i) $\vec{a}$ ভেক্টরের উপর $\vec{b}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ, $b \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$

(ii) $\vec{b}$ ভেক্টরের উপর $\vec{a}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ, $a \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$.

□ $\bar{a}$ ভেক্টর বরাবর একক ভেক্টর, $\hat{a} = \frac{\bar{a}}{|\bar{a}|}$

□ (i) $\vec{a}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b}$ ভেক্টরের উপাংশ = $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \hat{a}$.

(যে ভেক্টর বরাবর বলবে তাহা নিচে হবে)

(ii) $\vec{b}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{a}$ ভেক্টরের উপাংশ = $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \hat{b}$

□ দুটি ভেক্টর লম্ব হওয়ার শর্ত: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

□ দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত: $\vec{a} \times \vec{b} = 0$.

□ দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, $\theta = \cos^{-1} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

□ A(a) এবং B(b) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজকরেখাংশ $R(\bar{r})$ বিন্দুতে m:n অনুপাতে
 অন্তর্বিভক্ত করলে $R(\bar{r})$ -এর অবস্থান ভেক্টর $= \frac{n\bar{a} + m\bar{b}}{m+n}$

□ A(a) এবং B(b) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজকরেখাংশ R(r) বিন্দুতে m:n অনুপাতে
বহিঃবিভক্ত করলে R(r)-এর অবস্থান ভেক্টর = $\frac{n\bar{a} - m\bar{b}}{m - n}$

□ A(a) এবং B(b) ভেক্টরদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু R(r) -এর অবস্থান ভেক্টর $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$

□ A (a), B (b), C (c) $\triangle ABC$ এর শীর্ষ বিন্দু হলে এর ভরকেন্দ্র G $\left(\frac{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}}{3}\right)$ হবে।

Part 2

গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. $P(1, 1, 1)$ এবং $Q(3, 2, -1)$ দুইটি বিন্দু হলে, $\overline{PQ}$ ভেক্টর এর সমান্তরালে একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

Sol: $\overrightarrow{PQ} = (3-1)\hat{i} + (2-1)\hat{j} + (-1-1)\hat{k} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{4+1+4} = 3$$

$$\begin{aligned} \overline{\text{PQ}} \text{ ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর} &= \frac{\overline{\text{PQ}}}{|\text{PQ}|} \\ &= \frac{2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{3} \\ &= \frac{2\hat{i}}{3} + \frac{\hat{j}}{3} - \frac{2\hat{k}}{3} \end{aligned}$$

02. $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$ হলে, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ এবং $\vec{a} \times \vec{b}$ এর মান কত?

Sol : $\vec{a} \cdot \vec{b} = (2.1) + (-3.2) + (1.5)$
 $= 2 - 6 + 5 = 1$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-15-2) - \hat{j}(10-1) + \hat{k}(4+3)$$

$$= -17\hat{i} - 9\hat{j} + 7\hat{k}$$

03. $5\hat{i} - 3\hat{j} + n\hat{k}$ এবং $2\hat{i} + m\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে $(m, n) = ?$

Sol: যেহেতু ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল, অতএব শর্তমতে $\frac{5}{2} = \frac{-3}{m} = \frac{n}{-1}$

$$\Rightarrow 5m = -6 \Rightarrow m = -\frac{6}{5} \text{ এবং } \frac{5}{2} = \frac{n}{-1}$$

$$\Rightarrow 2n = -5 \Rightarrow n = -\frac{5}{2} \therefore (m, n) = \left(-\frac{6}{5}, -\frac{5}{2}\right)$$

04. $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $2\hat{i} + m\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, m এর মান কত?

Sol: $(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) \cdot (2\hat{i} + m\hat{j} - 4\hat{k}) = 0 \Rightarrow (1 \cdot 2) + (2 \cdot m) + (3 \cdot -4) = 0$
 $\Rightarrow 2 + 2m - 12 = 0 \Rightarrow 2m = 10 \Rightarrow m = 5$

05. $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$ হলে, $\vec{a}$ এর উপর $\vec{b}$ এর অভিক্ষেপ কত? $\vec{b}$ এর উপর $\vec{a}$ এর অভিক্ষেপ কত?

Sol: $\vec{a} \cdot \vec{b} = (2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}) \cdot (\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}) = 1$

$$|\vec{a}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (1)^2} = \sqrt{14}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (5)^2} = \sqrt{30}$$

$$\text{এখন, } \vec{a} \text{ এর উপর } \vec{b} \text{ এর অভিক্ষেপ} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{14}}$$

$$\text{আবার, } \vec{b} \text{ এর উপর } \vec{a} \text{ এর অভিক্ষেপ} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{30}}$$

06. $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b} = 5\hat{i} - 6\hat{j} + 7\hat{k}$ ভেক্টরের উপাংশ কত?

Sol: $\vec{a}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b}$ ভেক্টরের উপাংশ

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \hat{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{a}|} \vec{a} = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$

$$= \frac{(\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}) \cdot (5\hat{i} - 6\hat{j} + 7\hat{k})}{\left\{ \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} \right\}^2} (\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$$

$$= \frac{5 - 18 - 14}{1 + 9 + 4} (\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}) = \frac{-27}{14} (\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$$

07. $\vec{P} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ কোন ভেক্টর সমতলে দুটি ভেক্টর হলে $\vec{PQ}$ ভেক্টরের সমান্তরালে একক ভেক্টর কি হবে?

Sol: এখানে, $\vec{PQ} = (3 - 1)\hat{i} + (2 - 1)\hat{j} + (-1 - 1)\hat{k} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

$$\therefore \vec{PQ} \text{ ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর} = \frac{2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}}{3}$$

08. $\vec{A} = 2\hat{i} + \hat{j}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু হলে, ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Sol: সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $= |\vec{A} \times \vec{B}|$

$$\text{এখন } \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(5 - 0) - \hat{j}(10 - 0) + \hat{k}(-2 - 3) = 5\hat{i} - 10\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = |\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{5^2 + (-10)^2 + (-5)^2} = \sqrt{150} = 5\sqrt{6}$$

09. ধ্রুবক a এর মান নির্ণয় কর, যেন $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}$ এ তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকে।

Sol: শর্তমতে, $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & a \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow 2(-2a + 12) - 1(3a - 4) - 1(-9 + 2) = 0$$

$$\Rightarrow -4a + 24 - 3a + 4 + 7 = 0 \Rightarrow a = 5$$

10. $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরটি y অক্ষের সাথে যে কোণ তৈরি করে তা নির্ণয় কর।

Sol: $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} \right)$
 $= \cos^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{9}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-1}{3} \right)$



For Practic

01. $\vec{P} = 5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{Q} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ নির্ণয় কর।

$$\text{Ans: } \frac{3}{\sqrt{38}}$$

02. $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি সমতলীয় হলে a এর মান কত?

$$\text{Ans: } 5$$

03. $3\hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$ এবং $4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ এর মান কত?

$$\text{Ans: } -6$$

04. $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ হলে $\vec{A} \cdot \vec{B} = ?$

$$\text{Ans: } -3$$

05. যদি $\vec{AB} = 2\hat{i} + \hat{j}$ এবং $\vec{AC} = 3\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$ হয়, তবে $\vec{AB}$ ও $\vec{AC}$ কে সন্নিহিত বাহু ধরে অঙ্কিত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত?

$$\text{Ans: } 5\sqrt{6}$$

Part 3

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. $\vec{P} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ হলে $|\vec{PQ}|$ এর মান কত?

- (A) $\sqrt{17}$ (B) $\sqrt{33}$
 (C) 0 (D) 33

(Ans: A)

02. α এর মান কত হলে $\alpha\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $2\alpha\hat{i} - \alpha\hat{j} - 4\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে?

- (A) -2, 1 (B) 2, -1 (C) 2, 1 (D) -2, -1

(Ans: A)

03. $\vec{a} = 2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{b} = \lambda\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ এর মান 4 একক হলে, λ এর মান বের কর।

- (A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 4

(Ans: C)

04. $a\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k}$ ভেক্টরটি একক ভেক্টর হলে a এর মান কত?

- (A) $\pm \frac{6}{5}$ (B) $\pm \frac{4}{3}$
 (C) $\pm \frac{\sqrt{23}}{6}$ (D) $\pm \frac{23}{6}$

(Ans: C)

05. $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় কোন সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করলে, তার ক্ষেত্রফল কত হবে?

- (A) $3\sqrt{3}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $5\sqrt{5}$ (D) $3\sqrt{5}$

(Ans: B)

06. যদি $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - \lambda\hat{j} + 10\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হয় তবে λ এর মান কত?
 (A) -13 (B) -12 (C) 12 (D) 13 (Ans: D)

07. $\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $-\hat{i} + \hat{j} + a\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হলে ধ্রুবক a এর মান কত?
 (A) -2 (B) -1 (C) 0 (D) 2 (Ans: B)

08. $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরটি Z অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তা হলো-
 (A) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$ (B) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{9}\right)$
 (C) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (D) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (Ans: C)

09. $\vec{a} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ এর অংশক কত?
 (A) $\frac{3}{21}\hat{a}$ (B) $-\frac{3}{21}\hat{a}$ (C) $-\frac{3}{\sqrt{21}}\hat{a}$ (D) $\frac{3}{\sqrt{21}}\hat{a}$ (Ans: D)

10. $\vec{P} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = -\hat{i} + \hat{j} - 6\hat{k}$ হলে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর লব্ধি ভেক্টর কোনটি?
 (A) $-2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ (B) $2\hat{i} + 3\hat{j} - 8\hat{k}$
 (C) $4\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ (D) $4\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$ (Ans: B)

11. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{j} - 2\hat{k}$ হলে, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ এর মান কত?
 (A) -2 (B) 2 (C) 4 (D) 8 (Ans: A)

12. $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ হলে $\vec{B} \times \vec{A}$ নিচের কোনটি?
 (A) $\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ (B) $3\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$
 (C) $-\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ (D) $-\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ (Ans: A)

13. $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ হলে $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মান কত?
 (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{9}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) $\sqrt{17}$ (Ans: C)

14. $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = -3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ হলে তাদের অন্তর্গত কোণ কোনটি?
 (A) $\cos^{-1}\left(\frac{-6}{\sqrt{42}}\right)$ (B) $\cos^{-1}\left(\frac{6}{\sqrt{42}}\right)$
 (C) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{42}}\right)$ (D) $\cos^{-1}\left(\frac{-4}{\sqrt{42}}\right)$ (Ans: D)

15. $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{b} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ হলে $\vec{a}$ এর অভিক্ষেপ কত?
 (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{8}{7}$ (C) $\frac{20}{3}$ (D) $\frac{20}{7}$ (Ans: B)

16. $\vec{P} = \sqrt{2}\hat{i} + a\hat{j}$ এবং $\vec{Q} = \hat{i} + \sqrt{2}\hat{j}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে a এর মান কত হবে?
 (A) -2 (B) -1 (C) $\sqrt{2}$ (D) 2 (Ans: D)

17. $\hat{i} + \lambda\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ এর মান কোনটি?
 (A) -6 (B) -2 (C) 0 (D) 2 (Ans: D)

18. $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{3}\hat{j} + \hat{k}$ এর মান কোনটি?
 (A) $\frac{7}{6}$ (B) $\frac{49}{36}$ (C) $\frac{11}{6}$ (D) $\sqrt{\frac{11}{6}}$ (Ans: A)

19. $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর হলে-
 i. $\vec{A}$ ভেক্টরের মান $\sqrt{3}$
 ii. $\vec{A}$ ভেক্টরের উপর ভেক্টরের $\vec{B}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ $\frac{8}{\sqrt{3}}$
 iii. ভেক্টর দুটির অন্তর্গত কোণ $\cos^{-1}\frac{8}{\sqrt{66}}$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (A) i ও ii (B) i ও iii (C) ii ও iii (D) i, ii ও iii (Ans: D)

20. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুটি কোনো সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করে। সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
 (A) 30 (B) 15 (C) $\frac{1}{2}\sqrt{30}$ (D) $\sqrt{30}$ (Ans: D)

21. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুটি কোনো সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করে। সামান্তরিকের কর্ণের সমান্তরাল একক ভেক্টর কোনটি?
 (A) $\frac{1}{26}(5\hat{j} + \hat{k})$ (B) $\frac{1}{\sqrt{26}}(5\hat{j} + \hat{k})$
 (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + 2\hat{j})$ (D) $\frac{1}{\sqrt{11}}(-\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$ (Ans: B)

সরলরেখা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ: কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কোন বিন্দুর অবস্থানকে (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় (r, θ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। r কে ব্যাসার্ধ ভেক্টর (Radius Vector) এবং θ কে ভেক্টোরিয়াল কোণ বলে।

□ পোলার স্থানাঙ্ক ও কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক:

কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) হলে, আমরা পাই,

$$x = r \cos \theta \text{ এবং } y = r \sin \theta \therefore r = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ এবং } \tan \theta = \frac{y}{x}$$

□ **সম্ভারপথ:** কোন সমতলে যদি একটি বিন্দু এক বা একাধিক প্রদত্ত শর্ত মেনে চলে, তবে বিন্দুটি যে পথে চলতে থাকে তাকে বিন্দুটির সম্ভারপথ বলে এবং ঐ বিন্দুকে চলমান বিন্দু বলে।

বিন্দুকে চলমান বিন্দু বলে।
 $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে-

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} \quad \text{এবং} \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$

➤ $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে $C(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত করলে-

$$x = \frac{m_1 x_2 - m_2 x_1}{m_1 - m_2} \text{ এবং } y = \frac{m_1 y_2 - m_2 y_1}{m_1 - m_2}$$

➤ $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ বিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের।

$$\triangleright \text{ভরকেন্দ্র} = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

$$\triangleright \text{অঙ্ককেন্দ্র} = \left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c} \right)$$

যেখানে a, b, c ΔABC এর বাহুত্রয়।

সরলরেখা $a(x - \alpha) + b(y - \beta) = 0$

$$\text{দূরত্ব} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

সরলরেখাটির সমীকরণ, $bx + ay - 2ab = 0$

Part 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণ: $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এই সমীকরণটি বিভিন্ন শর্তে বিভিন্ন রেখা প্রকাশ করে শর্তগুলো নিম্নরূপ-

i. $\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0$ হলে জোড়া সরলরেখা।

ii. $a = b$ এবং $h = 0$ হলে বৃত্ত

বৃত্তের কতিপয় সাধারণ সমীকরণ:

(a) $x^2 + y^2 = a^2$; কেন্দ্র $(0, 0)$, ব্যাসার্ধ $= a$

(b) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$; কেন্দ্র (h, k) , ব্যাসার্ধ r

i) বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করলে, $r = |k|$

ii) বৃত্তটি y-অক্ষকে স্পর্শ করলে, $r = |h|$

iii) উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে, $r = h = k$

এবং এক্ষেত্রে বৃত্তের সমীকরণ- $x^2 + y^2 - 2h(x + y) + h^2 = 0$

(c) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$;

বৃত্তের কেন্দ্র $(-g, -f)$, ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

(x_1, y_1) বিন্দু $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের-

i. বাইরে হলে $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$

ii. ভিতরে হলে $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$

iii. পরিধিতে হলে $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$



দুটি বৃত্ত, $S_1 = x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$ এবং

$S_2 = x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$ এর ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ

$S_1 + k(S_2 - S_1) = 0$ [k একটি ধ্রুবক]

বা, $x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 + k\{2(g_2 - g_1)x + 2(f_2 - f_1)y + (c_2 - c_1)\} = 0$

একটি বৃত্ত $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$,

এবং $ax + by + c = 0$ এর ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c + k(ax + by + c) = 0$

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের

(a) x-অক্ষের ছেদাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c}$

(b) y-অক্ষের ছেদাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$

(c) বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করলে, $g^2 = c$ [স্পর্শ বিন্দু $(-g, 0)$]

(d) বৃত্তটি y-অক্ষকে স্পর্শ করলে, $f^2 = c$ [স্পর্শ বিন্দু $(0, -f)$]

(e) উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে, $g^2 = f^2 = c$

(f) মূলবিন্দু দিয়ে গেলে, $c = 0$

(x_1, y_1) ও (x_2, y_2) কোন বৃত্তের একই ব্যাসের দুইটি প্রান্তবিন্দু হলে বৃত্তের সমীকরণ, $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

Part 2

গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. $(x - y + 2)^2 + (2kx + 1)(3y - 2) = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করলে $k = ?$

Sol: আমরা জানি, বৃত্তে xy সংবলিত কোন পদ থাকে না। তাই এক্ষেত্রে xy সংবলিত পদের সহগ শূন্য হবে। অর্থাৎ $-2xy + 6kxy = 0$

বা, $k = \frac{1}{3}$

02. বৃত্তের কেন্দ্র $(2, 4)$ এবং ব্যাসার্ধ 3 হলে সমীকরণ কী?

Sol: সমীকরণ, $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 3^2$

বা, $x^2 - 4x + 4 + y^2 - 8y + 16 = 9$

বা, $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 11 = 0$

03. $x^2 + y^2 + 4x + 5y + 3 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

Sol: বৃত্তটির সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 4x + 5y + 3 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2 \times 2x + 2 \times \frac{5}{2}y + 3 = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র $\left(-2, -\frac{5}{2}\right)$ এবং

ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{2^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 3} = \sqrt{4 + \frac{25}{4} - 3} = \sqrt{\frac{29}{4}}$

04. $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 16 = 0$ বৃত্তটি কোন অক্ষকে স্পর্শ করে? এবং স্পর্শবিন্দু নির্ণয় কর।

Sol: এখানে $g = -4$ এবং $f = 3, c = 16$

যেহেতু $g^2 = (-4)^2 = 16 = c$, অতএব বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে।

আবার স্পর্শবিন্দু $= (-g, 0) = (-(-4), 0) = (4, 0)$

05. $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 2 = 0$ বৃত্তটির x-অক্ষ এবং y-অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ নির্ণয় কর।

Sol: বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 1 = 0$

অতএব $g = -1, f = 2$ এবং $c = -1$

তাহলে x অক্ষ থেকে কর্তিত অংশ $= 2\sqrt{(-1)^2 - (-1)}$
 $= 2\sqrt{1 + 1} = 2\sqrt{2}$

এবং y অক্ষ থেকে কর্তিত অংশ $= 2\sqrt{2^2 - (-1)} = 2\sqrt{5}$


06. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 10, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(6, 2)$; এর যে জ্যাটি $(3, 1)$ বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয় তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

Sol: $OA = 10, OC = \sqrt{(6 - 3)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{10}$

$AC = \sqrt{10^2 - 10} = 3\sqrt{10}$

$AB = 2AC = 6\sqrt{10}$

Or. $d = \sqrt{(6 - 3)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{10}$



07. $(2, 4)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 4x + 8y + 4 = 0$ বৃত্তের সাপেক্ষে কোণের অবস্থান করে?

Sol: প্রদত্ত বৃত্ত, $x^2 + y^2 + 4x + 8y + 4 = 0$

এখন $(2, 4)$ বিন্দুতে $2^2 + 4^2 + 4 \times 2 + 8 \times 4 + 4$

$= 4 + 16 + 8 + 32 + 4 = 64 > 0$

সুতরাং বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত।

জ্যা এর দৈর্ঘ্য $= 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{10^2 - (\sqrt{10})^2} = 6\sqrt{10}$

05. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (4, 3) যা $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?
 (A) 2 (B) 5
 (C) 8 (D) 3 (Ans: A)

06. (3, -1) বিন্দুগামী বৃত্তটি $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?
 (A) 3 (B) $\sqrt{61}$
 (C) $3\sqrt{10}$ (D) $9\sqrt{2}$ (Ans: A)

07. $x + y = 4$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দু কত?
 (A) (1, 3) (B) (3, 1)
 (C) (3, 2) (D) (2, 5) (Ans: B)

08. $x^2 + y^2 - 4x + 8y + m = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ 2 হলে m এর মান কত?
 (A) 0 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (Ans: C)

09. (-4, 3) বিন্দুতে $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?
 (A) $-2x + 3y = 5$ (B) $-4x + 3y = 5$
 (C) $-2x + 3y = 25$ (D) $-4x + 3y = 25$ (Ans: B)

10. (1, -2) বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 3 = 0$ বৃত্তের কোথায় অবস্থিত?
 (A) ভেতরে (B) বাইরে
 (C) উপরে (D) কেন্দ্রে (Ans: B)

11. (4, 2) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসের একটি প্রান্তবিন্দু (5, 2) হলে অপর প্রান্তবিন্দু স্থানাঙ্ক কত?
 (A) (3, 2) (B) (2, 3)
 (C) (-2, 3) (D) (-3, 2) (Ans: A)

12. (1, 2) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত এবং $x^2 + y^2 + 4x + 4 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত?
 (A) $\sqrt{12}$ (B) 12
 (C) $\sqrt{13}$ (D) 13 (Ans: C)

13. $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) = 10$ বৃত্তের 2 ভূজবিশিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের একটি সমীকরণ কত?
 (A) $x - 2y + 10 = 0$ (B) $x + 2y - 10 = 0$
 (C) $x + 2y + 10 = 0$ (D) $2x - y - 10 = 0$ (Ans: B)

14. (3, 4) কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $x^2 + y^2 = 144$ বৃত্তকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?
 (A) 17 (B) 12
 (C) 7 (D) 6 (Ans: C)

15. মূলবিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে যথাক্রমে 3 ও 5 একক অংশ কর্তন করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?
 (A) $x^2 + y^2 - 3x - 5y = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 3x + 5y = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 3x - 5y = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 3x + 5y = 0$ (Ans: A)

16. মূলবিন্দুতে কোনো বৃত্তের কেন্দ্র অবস্থিত হলে এবং এটি x-অক্ষকে ($\pm 2, 0$) বিন্দুতে ছেদ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কোনটি হবে?
 (A) -2 (B) ± 2
 (C) 2 (D) 4 (Ans: C)

17. একটি বৃত্ত $x = 0, y = 0$ এবং $x = b$ রেখাদ্বয়কে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?
 (A) $\frac{b}{2}$ (B) b (C) $\frac{b}{4}$ (D) $\frac{b^2}{4}$ (Ans: A)

18. $x^2 + y^2 - 2x + 3y = 0$ বৃত্ত এবং $x - y = 1$ সরলরেখার ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?
 (A) $x^2 + y^2 - x + 2y - 1 = 0$
 (B) $x^2 + y^2 - 3x + 4y + 1 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 2x + 3y + k(x - y - 1) = 0$
 (D) $x^2 + y^2 - x + y - 1 = 0$ (Ans: C)

19. (2, 2) এবং (3, 3) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?
 (A) $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 6 = 0$
 (B) $x^2 + y^2 - 5x + 5y + 12 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 5x - 5y - 12 = 0$
 (D) $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 12 = 0$ (Ans: D)

20. কোন বৃত্তের দুটি সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ $2x + 3y + 2 = 0$ এবং $4x + 6y + 8 = 0$ হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?
 (A) $\frac{1}{2\sqrt{13}}$ (B) $\frac{3}{2\sqrt{13}}$
 (C) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ (Ans: D)

21. $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তের (0, 2) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ
 (A) $x = 0$ (B) $x = 2$
 (C) $y = 0$ (D) $y = 2$ (Ans: D)

22. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 1 = 0$ বৃত্ত দ্বারা y অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কত?
 (A) $2\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{5}$
 (C) $2\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{2}$ (Ans: D)

23. $x^2 + y^2 = 20$ বৃত্তের (2, 4) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?
 (A) $x + 2y - 10 = 0$ (B) $2x + y - 10 = 0$
 (C) $2x - y + 10 = 0$ (D) $2x - y - 10 = 0$ (Ans: D)

24. $x^2 + y^2 = 2$ বৃত্তের (4, 2) বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক?
 (A) $4\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{2}$
 (C) $2\sqrt{3}$ (D) $2\sqrt{5}$ (Ans: B)

25. একটি বৃত্ত (3, 5) ও (4, 6) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং এর কেন্দ্র x-অক্ষের উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?
 (A) $x^2 + y^2 - 4y + 11 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 3y + 9 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 5y = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 18x + 20 = 0$ (Ans: D)

26. $x^2 + y^2 + 4x + 5y + 6 = 0$ এবং $2x^2 + 2y^2 + 4y + 6 = 0$ বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ কোনটি?
 (A) $4x + 3y + 3 = 0$ (B) $4x - 3y - 3 = 0$
 (C) $3x - 4y + 3 = 0$ (D) $4x + y = 0$ (Ans: A)

27. $x^2 + y^2 + 8x - 3y + 7 = 0$ এবং $3x^2 + 3y^2 + 12y + 15 = 0$ বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ কোনটি?
 (A) $8x - 7y + 2 = 0$ (B) $4x - 3y + 2 = 0$
 (C) $8x + 7y + 2 = 0$ (D) $7x - 8y + 2 = 0$ (Ans: A)

28. (-2, 3) বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 8x - 10y + c = 0$ বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে এর মান কত?
 (A) -1 (B) -12
 (C) 1 (D) 12 (Ans: C)

29. $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত একক?
 (A) $\sqrt{34}$ (B) 9
 (C) 25 (D) 34 (Ans: A)

30. $r = 2a \cos \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?
 (A) (-a, 0) (B) (a, 0)
 (C) (0, a) (D) (0, -a) (Ans: B)

31. $x + y = 4$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। স্পর্শ বিন্দু কোনটি?
 (A) (1, 1) (B) (3, 1)
 (C) (3, 2) (D) (2, 5) (Ans: B)

01. EQUATION শব্দটি হতে সবগুলো অক্ষর নিয়ে স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে অথবা একত্রে না রেখে বিন্যাস নির্ণয় কর।

Sol: i. স্বরবর্ণগুলো একত্রে নিয়ে বিন্যাস = $(8-5+1)! \times 5!$
 $= 4! \times 5! = 2880$

ii. স্বরবর্ণগুলো একত্রে না রেখে বিন্যাস = $8! - (8-5+1)! \times 5!$
 $= 37440$

02. ALGEBRA শব্দটির অক্ষরগুলো থেকে প্রত্যেকবার তিনটি করে অক্ষর নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায়?

Sol: শব্দটিতে মোট অক্ষর = 7টি, A = 2টি, প্রতিবারে নিতে হবে = 3টি

(i) 2টি A থেকে 1টি A এবং অন্য 5টি অক্ষর

অর্থাৎ মোট ভিন্ন অক্ষর = $5 + 1 = 6$ টি হতে প্রতিবারে 3টি নিয়ে পাই,
 $\therefore$ বিন্যাস = ${}^6P_3 = 120$

(ii) প্রতি বারে 2টি A নিয়ে এবং বাকী অক্ষর 5টি থেকে 1টি নিয়ে

বিন্যাস = ${}^5P_1 \times \frac{3!}{2!} = 15$

$\therefore$ মোট শব্দ = $120 + 15 = 135$

03. EQUATION শব্দটি হতে প্রতিবারে 5টি বর্ণ নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায় যাতে (i) n তৃতীয় স্থানে থাকবে,

(ii) t প্রথমে এবং n শেষে থাকবে

(iii) t ও n প্রথমে বা শেষে থাকবে।

Sol: (i) 5টি স্থানের মধ্যে 1টি n জন্য fixed রেখে, অবশিষ্ট 4টি স্থানে অবশিষ্ট 7টি বর্ণ সাজানো যায় = ${}^7P_4 = 840$ উপায়ে।

(ii) t প্রথমে এবং n শেষে রেখে সাজানো যায় = ${}^6P_3 = 120$ উপায়ে।

(iii) t ও n প্রথমে বা শেষে রেখে সাজানো যায় = ${}^2P_2 \times {}^6P_3 = 240$ উপায়ে।

04. DIRECTOR শব্দটির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন না করে বর্ণগুলোকে কতভাবে সাজানো যাবে?

Sol: DIRECTOR শব্দটিতে মোট বর্ণ সংখ্যা = 8টি যার মধ্যে স্বরবর্ণ 3টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ 5টি (যার মধ্যে r আছে 2টি)।

আপেক্ষিক অবস্থায় পরিবর্তন না করে সাজানোর উপায় = $\frac{5!}{2!} \times 3! = 360$

05. 12 জন লোক একটি গোলটেবিলে বৈঠক করবেন; কত উপায়ে আসন গ্রহণ করবেন?

Sol: $\therefore$ বিন্যাস সংখ্যা = 11!

06. 15 জন শিক্ষক কতভাবে চক্রাকারে বসতে পারবেন?

Sol: নির্ণয় উপায় = $(n-1)! = (15-1)! = 14!$

07. 5টি চিঠি 3টি বাস্তব ফেলার উপায় কত?

Sol: নির্ণয় উপায় = 3^5

08. যে কোন অংকে যে কোন সংখ্যক বার নিয়ে 1, 2, 3, 4, 5, 6 অঙ্কগুলো দ্বারা 4 অঙ্কের বেশি নয় এমন কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়?

Sol: সংখ্যা গঠন করা যায় = $6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 = \frac{6(6^4-1)}{6-1} = 1554$

09. 1, 2, 3, 4, 5, 6 অঙ্কগুলো প্রত্যেক সংখ্যায় কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করে 5000 ও 6000 এর মধ্যবর্তী কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যেতে পারে?

Sol: 5000 ও 6000 এর মধ্যবর্তী সংখ্যা পাওয়ার জন্য 1ম সংখ্যাটি 5 দ্বারা শুরু হবে। বাকী (6-1) বা 5টি অঙ্ক থেকে 3টি অঙ্ক দ্বারা (যেহেতু সংখ্যাটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট হবে) গঠিত মোট সংখ্যাই নির্ণয় সংখ্যা অর্থাৎ

${}^5P_3 = \frac{5!}{(5-3)!} = 60$

10. ঢাকা হতে চট্টগ্রামে প্রতিদিন 6টি ট্রেন যাতায়াত করে। একজন ব্যক্তি কতগুলো এক ট্রেনে ঢাকা হতে চট্টগ্রামে গিয়ে অপর ট্রেনে ফিরে আসতে পারে।

Sol: এক ট্রেনে ঢাকা হতে চট্টগ্রামে গিয়ে অপর ট্রেনে ফিরে আসার উপায় = $n \times (n-1) = 6 \times 5 = 30$ টি

11. ${}^nC_2 = \frac{2}{5} \times {}^nC_4$ হলে n এর মান নির্ণয় কর:

Sol: ${}^nC_2 = \frac{2}{5} \times {}^nC_4 \Rightarrow 5 \cdot {}^nC_2 = 2 \times {}^nC_4$

$$\Rightarrow \frac{5n!}{2!(n-2)!} = \frac{2n!}{4!(n-4)!}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{2(n-2)(n-3)(n-4)!} = \frac{2}{24(n-4)!}$$

$$\Rightarrow (n-2)(n-3) = 30$$

$$\Rightarrow n^2 - 5n + 6 - 30 = 0 \Rightarrow n^2 - 5n - 24 = 0$$

$$\Rightarrow (n-8)(n+3) = 0 \therefore n = 8 [n \neq -3]$$

12. ${}^nP_r = 240$ ও ${}^nC_r = 120$ হলে n ও r এর মান নির্ণয় কর।

Sol: ${}^nP_r = 240 \Rightarrow {}^nC_r \times r! = 240 \Rightarrow 120 \times r! = 240$
 $\Rightarrow r! = 2! \therefore r = 2$

আবার, ${}^nP_r = 240$

$$\Rightarrow \frac{n!}{(n-2)!} = 240 \Rightarrow n(n-1) = 240 \Rightarrow n^2 - n - 240 = 0$$

$$\Rightarrow (n-16)(n+15) = 0 \therefore n = 16 [\therefore n \neq -15]$$

নির্ণয় মান: $n = 16, r = 2$

13. 20টি বাছ বিশিষ্ট একটি সমতল ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুগুলো সংযোজন করে কতগুলো a) সরলরেখা b) ত্রিভুজ c) চতুর্ভুজ d) কর্ণ পাওয়া যাবে?

Sol: a) একটি সরলরেখার জন্য বিন্দুর প্রয়োজন 2টি

$$\therefore \text{সরলরেখার সংখ্যা} = {}^{20}C_2 = 190$$

$$\text{b) ত্রিভুজ সংখ্যা} = {}^{20}C_3 = 1140$$

$$\text{c) চতুর্ভুজ সংখ্যা} = {}^{20}C_4 = 4845$$

$$\text{d) কর্ণের সংখ্যা} = {}^{20}C_2 - 20 = 170$$

14. দু'জন লোকের যথাক্রমে 10 খানা ও 12 খানা পুস্তক আছে। কত রকমে এগুলোকে বিনিময় করা যেতে পারে a) যদি একখানার পরিবর্তে একখানা b) দুইখানার পরিবর্তে দুইখানা পুস্তক দেয়া হয়।

Sol: প্রথম ব্যক্তি 10 খানা হতে 1খানা বাছাই করবে = ${}^{10}C_1$ উপায়ে

২য় ব্যক্তি 12 খানা হতে 1খানা বাছাই করবে = ${}^{12}C_1$ উপায়ে

$$\text{a) নির্ণয় বিনিময়ের উপায়} = {}^{10}C_1 \times {}^{12}C_1 = 120$$

$$\text{b) নির্ণয় বিনিময়ের উপায়} = {}^{10}C_2 \times {}^{12}C_2 = 2970$$

15. EQUATION শব্দটি হতে প্রতিবারে 5টি অক্ষর নিয়ে কত ভাবে বাছাই করা যায় যাতে ব্যঞ্জনবর্ণ তিনটি সর্বদাই থাকবে?

Sol: মোট 8টি হতে ব্যঞ্জনবর্ণ 3টি ও 5টি হতে 3টি বাদ দেই,

$$\therefore \text{বাছাই করার উপায়} = {}^{8-3}C_{5-3} = {}^5C_2 = 10$$

16. EQUATION শব্দটি হতে প্রতিবারে 5টি বর্ণ নিয়ে সমাবেশ নির্ণয় কর যাতে Q, N থাকবে কিন্তু E, T থাকবে না।

Sol: E, T কে মোট সংখ্যা হতে বাদ দেই অর্থাৎ বর্ণ থাকে 6টি, অতঃপর 6টি হতে 5টি নিব যাতে 2টি (Q, N) থাকবে, তাই 6টি হতে 2টি ও 5টি হতে দুটি বাদ দেই। $\therefore$ নির্ণয় সমাবেশ = ${}^{6-2}C_{5-2} = {}^4C_3 = 4$

17. একটি ধলিতে 1টাকার 2টি, 5টাকার 3টি এবং 2টাকার 5টি মুদ্রা আছে, এক বা একাধিক মুদ্রা কতভাবে তোলা সম্ভব?

Sol: নির্ণয় উপায় = $(2+1)(3+1)(5+1)2^0 - 1 = 71$

- JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
18. একটি কলেজের অধ্যাপকের 3টি খালি পদের জন্য 10 জন প্রার্থী আছেন।
খালি পদের চেয়ে বেশি নয় এরূপ যে কোন সংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচিত করা
যেতে পারে, কত প্রকারে প্রার্থী নির্বাচন করা যায়?

Sol: নির্ণয় উপায় = $^{10}C_1 + ^{10}C_2 + ^{10}C_3 = 175$

19. 6 জন ভদ্রলোক ও 4জন ভদ্রমহিলা থেকে 4 সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি
কতভাবে গঠন করা যাবে যাতে -

- a) সর্বদাই/ঠিক 2জন মহিলা b) বড় জোড় 2জন মহিলা
c) অন্তত 2 জন মহিলা থাকবে?

Sol: a. নির্ণয় উপায় সংখ্যা = $^4C_2 \times ^6C_2 = 90$

® ভদ্রমহিলা(4) ভদ্রলোক(6) সমাবেশ সংখ্যা

- i) 0 4 $^4C_0 \times ^6C_4 = 15$
ii) 1 3 $^4C_1 \times ^6C_3 = 80$
iii) 2 2 $^4C_2 \times ^6C_2 = 90$

মোট সংখ্যা = 185

© ভদ্রমহিলা (4) ভদ্রলোক(6) সমাবেশ সংখ্যা

- i) 4 0 $^4C_4 \times ^6C_0 = 1$
ii) 3 1 $^4C_3 \times ^6C_1 = 24$
iii) 2 2 $^4C_2 \times ^6C_2 = 90$

মোট সংখ্যা = 115

20. PROFESSOR শব্দটির অক্ষরগুলো হতে প্রতিবারে 4টি করে বর্ণ নিয়ে
কতভাবে বাছাই করা যাবে?

Sol: PROFESSOR শব্দটিতে মোট বর্ণ 9টি, o আছে 2টি, r আছে 2টি, s
আছে 2টি, অবশিষ্ট তিনটি ভিন্ন, মোট ভিন্ন বর্ণ = 6টি।

নিম্নোক্ত উপায়ে বাছাই করা যায়-

i) 3জোড়া হতে 2জোড়া এরূপ ক্ষেত্রে সমাবেশ = $^3C_2 = 3$

ii) 3জোড়া হতে 1জোড়া ও 5টি হতে 2টি = $^3C_1 \times ^5C_2 = 30$

[3জোড়া হতে 1জোড়া নিলে 2জোড়া থাকে অর্থাৎ 2টি ভিন্ন বর্ণ থাকে এই
দুটি ও ভিন্ন 3টি মোট 5টি বিভিন্ন]

iii) সবগুলোই ভিন্ন = $^6C_4 = 15$

∴ মোট বাছাই সংখ্যা = $3 + 30 + 15 = 48$

21. THESIS শব্দটি হতে প্রতিবারে 4টি করে অক্ষর নিয়ে কতভাবে বাছাই করা যাবে?

Sol: THESIS শব্দটি S আছে দুটি বাকি 4টি ভিন্ন, নিম্নোক্ত উপায়ে বাছাই করা
যাবে-

i) 2টি S ও অপর দুটি ভিন্ন এরূপ বাছাই সংখ্যা = $1 \times ^4C_2 = 6$

ii) 1টি S ও অপর তিনটি ভিন্ন এরূপ বাছাই সংখ্যা = $1 \times ^4C_3 = 4$

iii) S বাদে সবগুলোই ভিন্ন এরূপ বাছাই সংখ্যা = $^4C_4 = 1$

মোট বাছাই সংখ্যা = 11

22. 52 খানা তাস কতভাবে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া যাবে a) দুটি ভাগে/দলে

b) দুজন ব্যক্তির মধ্যে c) 4টি দলে d) 4 ব্যক্তির মধ্যে?

Sol: a) দুটি দলে ভাগ করার উপায় = $\frac{52!}{2! (26!)^2}$

b) দুজন ব্যক্তির মধ্যে = $\frac{52!}{(26!)^2}$

c) সমান 4টি দলে ভাগ করার উপায় = $\frac{52!}{4! (13!)^4}$

d) চারজন ব্যক্তির মধ্যে সমান ভাগে = $\frac{52!}{(13!)^4}$

23. টেলিফোন ডায়ালে 0 থেকে 9 পর্যন্ত লেখা থাকে। যদি কলকাতার শহরের টেলিফোন
নম্বরগুলো 6 অঙ্ক বিশিষ্ট হয়, তাহলে ঐ শহরের মোট সংযোগ দেয়া যাবে?

Sol: $10^n \rightarrow n = 6$; $10^6 = 1000000$ টি সংযোগ দেয়া যাবে।

24. EXAMINATION শব্দটি হতে প্রতিবারে 4টি বর্ণ নিয়ে কতভাবে শব্দ গঠন
করা যাবে?

Sol: EXAMINATION শব্দটিতে, মোট বর্ণ = 11টি EX(AA)

M(H)(NN)TO

A আছে 2টি, I আছে 2টি, N আছে 2টি, বাকি 5টি ভিন্ন

নির্বাচনের ভিত্তি	সমাবেশ	বিন্যাস
3 জোড়া হতে 2 জোড়া	$^1C_2 = 3$	$3 \times \frac{4!}{2!2!} = 18$
3 জোড়া হতে 1 জোড়া ও বাকি দুটি ভিন্ন	$^3C_1 \times ^7C_2 = 63$	$63 \times \frac{4!}{2!} = 756$
সবগুলোই ভিন্ন (3 জোড়ার 3টি ও ভিন্ন 5টি)	$^8C_4 = 70$	$70 \times 4! = 1680$
	মোট = 136	মোট = 2454

For Practice

01. 6 টি চিঠি 6 টি ভুল ঠিকানায় পোস্ট করার উপায় বের কর। Ans: 265
02. 1, 2, 4, 6, 8 অঙ্কগুলো হতে প্রতিবারে সবগুলো নিয়ে যে সংখ্যাগুলো গঠন
করা যায় তাদের যোগফল কত? Ans: 5599944
03. দিনাজপুর পার্বতীপুর রেলপথে 6টি স্টেশন আছে। শোভন শ্রেণীর মোট কত
প্রকারের টিকেট ছাপতে হবে যাতে যে কোন এক স্টেশন হতে অপর স্টেশনে
যাওয়া যায়? Ans: 30
04. যে কোন অঙ্ককে যে কোন সংখ্যক বার নিয়ে 1 হতে 9 পর্যন্ত অঙ্কগুলো দ্বারা
সর্বোচ্চ তিন অঙ্ক কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়? Ans: 819
05. একটি পদে 3 জন প্রার্থী এবং 5 জন লোকের ভোটে নির্বাচিত হবে। কত
প্রকারে ভোট দেয়া যেতে পারে? Ans: 243
06. 15 জন শিক্ষক কতভাবে চক্রাকারে বসতে পারেন? Ans: 14!
07. COMPOSER শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায়। যখন স্বরবর্ণ ও
ব্যঞ্জনবর্ণের আপেক্ষিক অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। Ans: 360
08. SECOND শব্দটির অক্ষরগুলো থেকে তিন অক্ষর বিশিষ্ট কতগুলো শব্দ গঠন
করা যায় যাতে স্বরবর্ণ সর্বদা মধ্যম স্থান দখল করে। Ans: 24
09. DEPRESSION শব্দটির অক্ষরগুলোকে কতভাবে সাজানো যাবে যাতে
স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকবে? Ans: 30240
10. দেখাও যে, AMERICA শব্দটির বর্ণগুলোর বিন্যাস সংখ্যা, CALCUTTA
শব্দটির বর্ণগুলোর বিন্যাস সংখ্যার 21 গুণ।
11. 10টি বইয়ের মধ্যে 4টি বই কত প্রকারে বাছাই করা যায়, যাতে নির্দিষ্ট 2টি
বই সর্বদা বাদ থাকে? Ans: 70
12. NAMITA শব্দটির অক্ষরগুলো হতে প্রতিবার চারটি করে নিয়ে কত ভাবে
বাছাই করা যায়? Ans: 11
13. রংপুর শহরে টেলিফোন নম্বর 72,73 বা 76 দিয়ে শুরু এবং 6 অঙ্ক বিশিষ্ট
হলে মোট সম্ভাব্য সংযোগ সংখ্যা কত? Ans: 3×10^4
14. EXPRESSION শব্দটির অক্ষরগুলো হতে প্রত্যেকবার 4টি অক্ষর নিয়ে
সমাবেশ ও বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় কর। Ans: 2190
15. DETERMINANT শব্দটির অক্ষরগুলো হতে প্রত্যেকবার 6টি অক্ষর নিয়ে
সমাবেশ ও বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় কর। Ans: 179,66150
16. GOVERNMENT শব্দ থেকে বর্ণ নিয়ে 5 বর্ণের কতগুলো শব্দ গঠন করা
যায় যাতে দুইটি n সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকে? Ans: 4380
17. EQUATION শব্দটির বর্ণগুলো থেকে 2টি স্বরবর্ণ ও 1টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে
কতগুলো শব্দ গঠন করা যাবে যেখানে স্বরবর্ণগুলোর ক্রম পরিবর্তন হবে না? Ans: 90

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

- [illegible]

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Part 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

□ ত্রিকোণমিতিক কোণ পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি:

- ষাটমূলক পদ্ধতি (Sexagesimal System)
- শতমূলক পদ্ধতি (Centesimal System)
- বৃত্তীয় পদ্ধতি (Circular System)

□ বৃত্তীয় ও ষাটমূলক পদ্ধতির কোণের রূপান্তর:


$$\pi^c = 180^\circ \Rightarrow 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{2 \times 90^\circ}{\pi} = \frac{2}{\pi} \text{ এক সমকোণ}$$

$$\text{আবার, } 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান} = \frac{\pi^c}{180}$$

□ চাপের সাথে ব্যাসার্ধ ও উৎপন্ন কোণের সম্পর্ক:

r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোন বৃত্তে যে কোন চাপ s যদি কেন্দ্রে θ কোণ উৎপন্ন করে তবে এদের মাকের সম্পর্কটি নিম্নের সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, $s = r\theta$, যেখানে θ অবশ্যই রেডিয়ানে প্রকাশ করতে হবে।

□ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল: $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$



□ ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান নির্ণয়:

θ	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞
$\cot \theta$	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	∞	0
$\sec \theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞	-1	∞
$\csc \theta$	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1	∞	-1

Part 2

গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. $16^\circ 36' 46''$ কে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে প্রকাশ কর/রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

Sol: $16^\circ 36' 46'' = (16 + \frac{36}{60} + \frac{46}{60 \times 60}) = 16.6127$ ডিগ্রি

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান} \therefore 16.6127^\circ = \frac{\pi}{180} \times 16.6127 = 0.28995 \text{ রেডিয়ান}$$

02. কোন বৃত্তের চাপ 5 মিটার এবং চাপ দ্বারা উৎপন্ন কোণ $36^\circ 45'$ হলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?

Sol: আমরা জানি, $s = r\theta$

$$\begin{aligned} \theta &= 36^\circ 45' = 36^\circ + \left(\frac{45}{60}\right)^\circ \\ &= 36.75^\circ \\ &= \left(36.75 \times \frac{\pi}{180}\right)^c \end{aligned}$$

$$\Rightarrow r = \frac{s}{\theta} = \frac{5}{(0.641409)^c} \Rightarrow r = 7.8 \text{ মি.}$$

03. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. এবং একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 40° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Sol: $\theta = 40^\circ = 40 \times \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{9}$ রেডিয়ান।

$$\therefore \text{বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{2\pi}{9} = 8.73 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

04. ঘড়িতে সময় 2টা 30 মিনিট হলে, ঘন্টা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?

Sol: $\theta = \left| \frac{11}{2} \times 30 - 30 \times 2 \right| = 105^\circ$

05. $\sin(3x + 5)$ এর পর্যায় কাল কত?

Sol: $\sin(3x + 5)$ ফাংশনটির x এর সহগ 3

$$\text{এবং } \sin x \text{ এর পর্যায় } 2\pi \therefore \sin(3x + 5) \text{ মৌলিক} = \frac{2\pi}{3}$$

06. $y = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{2}$ ফাংশনটির পর্যায়কাল কত?

Sol: $\sin \frac{x}{3}$ এর পর্যায় $= \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$; $\cos \frac{x}{2}$ এর পর্যায় $= \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$

$$\therefore 6\pi \text{ ও } 4\pi \text{ এর ল.সা.গু} = 12\pi \therefore \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{2} \text{ এর পর্যায়} = 12\pi$$

07. যদি $\cot \theta = \frac{12}{5}$ এবং $(\pi < \theta < \frac{3\pi}{2})$ হয়, তবে $\sec \theta$ এর মান বের কর।

Sol: $\cot \theta = \frac{12}{5} \Rightarrow \tan \theta = \frac{5}{12} \Rightarrow \tan^2 \theta = \frac{25}{144}$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta - 1 = \frac{25}{144}$$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta = 1 + \frac{25}{144} \Rightarrow \sec^2 \theta = \frac{169}{144}$$

$$\Rightarrow \sec \theta = \pm \frac{13}{12} \because \pi < \theta < \frac{3\pi}{2} \text{ অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্ভাগ}$$

$$\text{তৃতীয় চতুর্ভাগে, } \sec \theta, \text{ ঋণাত্মক} \therefore \sec \theta = -\frac{13}{12} \text{ (Ans.)}$$



For Practice

01. $\frac{1}{2} \cos \frac{2\theta}{3}$ এর পর্যায় কত?

Ans: $\frac{3\pi}{2}$

02. বিকাল ৪টার সময় ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে ছোট কোণটির পরিমাণ কত?

Ans: 120°

03. একটি বৃত্তচাপ 20 m ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার?

Ans: 209.3

04. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 12 সেমি এবং বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য 14 সেমি। বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় কর।

Ans: 66.85° (প্রায়)

05. $(a^2 - b^2) \sin \theta + 2ab \cos \theta = a^2 + b^2$ হলে, দেখাও যে, $\tan \theta = \frac{a^2 - b^2}{2ab}$

06. $\tan \theta = \frac{4}{5}$ হলে, $\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta}$ এর মান কত?

Ans: $\frac{5}{14}$

07. 54° কোণকে এমন তিনটি অংশে ভাগ কর যেন রেডিয়ানে প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় কোণটির অন্তর $\frac{\pi}{10}$ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোণ দুইটির যোগফল 27°

Ans: $27^\circ, 9^\circ, 18^\circ$

08. $\sin \theta + 16 \csc \theta = 8$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sin^2 \theta + \csc^2 \theta = 2$

Part 3

অধ্যয়নভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. $\cot A = \frac{12}{5}$ হলে, $\sin A + \cos A$ এর মান কত?

- (A) $\frac{13}{17}$ (B) $-\frac{13}{17}$ (C) $\frac{17}{13}$ (D) $-\frac{7}{13}$ (Ans C)

02. ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ হলে, $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = ?$

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 0 (D) -1 (Ans B)

03. $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হলে, $\sec \theta$ এর মান কত?

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (Ans C)

04. $\sin \theta = \frac{3}{5}$ হলে, $\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$ এর মান কত?

- (A) -7 (B) 7 (C) $\frac{4}{7}$ (D) $-\frac{1}{7}$ (Ans B)

05. $\sin^2 A + \sin^4 A = 1$ হলে নিচের কোনটি সত্য?

- (A) $\tan^2 A + \tan^4 A = 1$ (B) $\tan^3 A - \tan^2 A = 1$
(C) $\tan^3 A + \tan^2 A = 1$ (D) $\tan^4 A - \tan^2 A = 1$ (Ans D)

06. $\sqrt{3}\sin \theta + \cos \theta$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

- (A) $\sqrt{3} + 1$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3} - 1$ (Ans B)

07. $y = \tan^2 x$ ফাংশনের পিরিয়ড -

- (A) π (B) $\frac{\pi}{2}$
(C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{8}$ (Ans A)

08. $\sin(4x + 1)$ এর পর্যায় কত?

- (A) 4π (B) π (C) 2π (D) $\frac{\pi}{2}$ (Ans D)

09. $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$ এর পর্যায় কোনটি?

- (A) 6π (B) 3π (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{6}$ (Ans A)

10. $\sin 2\theta$ এর রেঞ্জ কোনটি?

- (A) $(-1, 1)$ (B) $[-2, 2]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $(-2, 2)$ (Ans C)

11. $\sin 3x$ এর পর্যায় কত?

- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) 3π (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) 2π (Ans A)

12. $f(x) = \sin x$ ফাংশনের-

- i. ডোমেন = R
ii. রেঞ্জ = $[-1, 1]$
iii. লেখচিত্র y-অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম
নিচের কোনটি সঠিক?
(A) i ও ii (B) ii ও iii (C) i ও iii (D) i, ii ও iii (Ans A)

13. $\tan 2x$ এর মৌলিক পর্যায় কত?

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{3\pi}{2}$ (C) π (D) 2π (Ans A)

14. $\sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় কত?

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) 2π (C) 4π (D) 8π (Ans D)

15. $\cot x = \frac{5}{4}$ এবং $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ হলে $\sin x$ এর মান কত?

- (A) $-\frac{\sqrt{41}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{41}}{4}$ (C) $-\frac{4}{\sqrt{41}}$ (D) $\frac{5}{\sqrt{41}}$ (Ans C)

16. $f(x) = \sin x$ ফাংশনটি নিচের কোন বিন্দুতে ক্রমবর্ধমান?

- (A) $x = \frac{\pi}{4}$ (B) $x = \frac{\pi}{2}$ (C) π (D) $\frac{5\pi}{4}$ (Ans A)

17. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এবং $\sin \theta = \frac{3}{5}$ হলে-

- i. $\cos \theta = \frac{2}{5}$ ii. $\tan^2 \theta = \frac{9}{16}$ iii. $\sec \theta \cdot \tan \theta = \frac{15}{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(A) i ও ii (B) ii ও iii (C) i ও iii (D) i, ii ও iii (Ans B)

18. $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি?

- (A) $[-1, 1)$ (B) $(-1, 1]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $(-1, 1)$ (Ans C)

19. $\cot \theta = \frac{12}{5}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে $\sin \theta$ এর মান কত?

- (A) $\frac{5}{13}$ (B) $-\frac{5}{13}$ (C) $\frac{12}{13}$ (D) $-\frac{12}{13}$ (Ans B)

গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়

৭

সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Part 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

□ $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, $\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec} \theta$
 $\cos(-\theta) = \cos \theta$, $\sec(-\theta) = \sec \theta$
 $\tan(-\theta) = -\tan \theta$, $\cot(-\theta) = -\cot \theta$

01. ত্রিভুজের sine সূত্র: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 02. ত্রিভুজের cosine সূত্র: (i) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$$(ii) \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$(iii) \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

03. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল:

$$(i) \Delta = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{abc}{4R}$$

$$\text{যেখানে, পরিব্যাসার্ধ } R = \frac{abc}{4\Delta}$$

$$(ii) \Delta = \frac{1}{4} (2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 - a^4 - b^4 - c^4)^{1/2}$$

$$(iii) \text{ত্রিভুজের অন্তঃব্যাসার্ধ } r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow r = \frac{2\Delta}{a+b+c} \Rightarrow rs = \Delta \text{ (iv) } \Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

20. $\frac{\cos 9^\circ + \sin 9^\circ}{\cos 9^\circ - \sin 9^\circ} = \text{কত?}$

- (A) $\tan 45^\circ$ (B) $\tan 54^\circ$ (C) $\tan 42^\circ$ (D) $\tan 24^\circ$ (Ans: B)

21. যদি $\tan A = \frac{3}{11}$ এবং $\tan B = \frac{5}{23}$ হয় তবে $\tan(A+B)$ এর মান কত?

- (A) $\frac{25}{238}$ (B) $\frac{24}{236}$ (C) $\frac{62}{118}$ (D) $\frac{62}{119}$ (Ans: D)

22. $\triangle ABC$ তে, $\cos A + \cos C = \sin B$ হলে, $\angle C$ এর মান কত?

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$ (Ans: A)

23. $\sin \theta - \sqrt{1 + \sin 2\theta}$ এর মান কত?

- (A) $-\sin \theta$ (B) $-\cos \theta$ (C) $\sin \theta$ (D) $\cos \theta$ (Ans: B)

24. $\operatorname{cosec}(105^\circ)$ এর মান কত?

- (A) $\frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$ (B) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ (C) $\frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ (Ans: C)

25. $\cot \theta = 3$ হলে $\sin 4\theta$ এর মান কত?

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{23}{25}$ (D) $\frac{24}{25}$ (Ans: D)

26. $\tan A + \tan B + \tan A \cdot \tan B = 1$ হলে, $A + B$ এর মান কত?

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{8}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{3}$ (Ans: C)

27. $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ এর মান কোনটি?

- (A) $\cos 2\theta$ (B) $\sin 2\theta$
(C) $\cos^2 \theta$ (D) $-\sin^2 \theta$ (Ans: A)

28. যদি $\sin \theta = \frac{4}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, তবে $\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)}$ = কত?

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) -3 (D) -6 (Ans: B)

29. $\cos A = \frac{1}{2}$ এবং $\sin B = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হলে, $\sin(A+B) \cdot \sin(A-B)$ = কত?

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) 1 (Ans: A)

30. $\frac{1 + \tan 25^\circ}{1 - \tan 25^\circ}$ এর মান কত?

- (A) $\tan 50^\circ$ (B) $\tan 70^\circ$ (C) $\cot 50^\circ$ (D) $\cot 70^\circ$ (Ans: B)

গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়

৮

ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

Part 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

□ ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় (Short Technic):

Technic-01 $f(x) = c$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে, $D_f = R$ এবং $R_f = \{c\}$

Technic-02 $f(x) = ax + b$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে $D_f = R$ এবং $R_f = R$

Technic-03 $f(x) = ax^2 + bx + c$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে, $D_f = R$

$R_f = \left[c - \frac{b^2}{4a}, \infty \right)$ যখন $a > 0$; $(-\infty, c - \frac{b^2}{4a}]$ যখন, $a < 0$

Technic-04 $f(x) = \frac{a}{bx + c}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে

$D_f = R - \left\{ -\frac{c}{b} \right\}$ এবং $R_f = R - \{0\}$

Technic-05 $f(x) = \frac{ax}{bx + c}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে

$D_f = R - \left\{ -\frac{c}{b} \right\}$ এবং $R_f = R - \left\{ \frac{a}{b} \right\}$

Technic-06 $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে

$D_f = R - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ এবং $R_f = R - \left\{ \frac{a}{c} \right\}$

Technic-07 $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে

$D_f = R - \{a\}$ এবং $R_f = R - \{2a\}$

Technic-08 $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x + a}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে

$D_f = R - \{-a\}$ এবং $R_f = R - \{-2a\}$

Technic-09 $\frac{x - a}{x^2 - a^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে,

$D_f = R - \{-a, a\}$; $R_f = R - \left\{ 0, \frac{1}{2a} \right\}$

Technic-10 লব দ্বিঘাত এবং হর একঘাত এরূপ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে:

$f(x) = \frac{ax^2 + b}{cx + d}$ ফাংশনের

ডোমেন = $R - \{x \text{ এর যে মানের জন্য হর শূন্য হয় সেই মান}\}$

$\therefore$ ডোমেন, $D_f = R - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ এবং

রেঞ্জ = $R - \{x \text{ এর যে মানের জন্য হর শূন্য হয় সেই মানকে দ্বিগুণ করত}$

হবে} $\therefore$ রেঞ্জ, $R_f = R - \left\{ -\frac{2d}{c} \right\}$

Technic-11 $f(x) = \frac{x^n - a^n}{x - a^{n-1}}$, ডোমেন = $R - \{A\}$ এবং রেঞ্জ = $\{na^{n-1}\}$

Technic-12 $f(x) = \sqrt{ax + b}$, $a > 0$ আকৃতির ক্ষেত্রে, $D_f = \{x \in R : x \geq -\frac{b}{a}\}$ এবং $R_f = \{y \in R : y \geq 0\}$

Technic-13 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{ax + b}}$, $a \neq 0$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে,

$D_f = \{x \in R : x > -\frac{b}{a}\}$, $a > 0$ এবং $R_f = \{y \in R : y < 0\}$

Technic-14 $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন $x \leq -a$ or $x \geq a$ এবং $R_f = [0, \infty)$

Technic-15 $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন $-a \leq x \leq a$ বা $|x| \leq a$ এবং $R_f = [0, a]$

Technic-16 $f(x) = \log(a + bx)$ আকৃতির ফাংশনের ক্ষেত্রে $\log$ এর ভেতরের রাশিটি শূন্য অপেক্ষা বড় হবে।

$\therefore$ ডোমেন, $D_f : x > -\frac{a}{b}$ বা $(-\frac{a}{b}, \infty)$ এবং রেঞ্জ $R_f = R$

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

10. यदि $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ फलन $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ द्वारा सङ्कायित है

अध्याय

६

অন্তরীকরণ

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

[illegible]

01. $\frac{d}{dx}(c) = 0$ 02. $\frac{d}{dx} cf(x) = c \frac{d}{dx} f(x)$
02. (a) $\frac{d}{dx}(cx^n) = c \frac{d}{dx}(x^n) = cnx^{n-1}$
- (b) $\frac{d}{dx}\left(\frac{c}{x^n}\right) = -c \frac{n}{x^{n+1}}$ (c) $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
03. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ 04. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
05. $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ 06. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$
07. $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$ 08. $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$
09. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ 10. $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$ 12. $\frac{d}{dx}(e^{nx}) = ne^{nx}$
13. $\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$ 14. $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$
15. $\frac{d}{dx}(uvw) = vw \frac{du}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + uv \frac{dw}{dx}$
16. $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$ 17. $\frac{d}{dx}(u^v) = u^v \frac{d}{dx}(\ln u)$
18. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$ 19. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
20. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 21. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$
22. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$ 23. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
24. $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ 24. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
25. $\frac{d}{dx}(\sin mx) = m \cos mx$
26. যদি $f(x, y) = 0$ হয় যা অব্যক্ত ফাংশন তাহলে,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = \frac{y \text{ ধ্রুব রেখে } x \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ}}{x \text{ ধ্রুব রেখে } y \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ}}$$

□ মূল নিয়মে অন্তরীকরণ:

$$y = f(x) \text{ হলে, } \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{যে কোন বিন্দুতে } x = a \text{ হলে, } f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

□ প্রথম অন্তরক সাধারণত x এর একটি ফাংশন x এর এই নতুন ফাংশনের অন্তরকে $f(x)$ এর দ্বিতীয় অন্তরক বলা হয়।

দ্বিতীয় অন্তরকে $\frac{d^2y}{dx^2}$, $f''(x)$, y_2 বা y'' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

□ অনুরূপভাবে $f(x)$ এর n তম অন্তরক $\frac{d^ny}{dx^n}$, $f^{(n)}(x)$ বা y_n প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কতগুলো বিশেষ ফাংশনের n তম অন্তরক :

$$(i) y = x^n \quad \therefore y_n = n! \quad \therefore y_{n+1} = 0, y_{n+2} = 0$$

$$(ii) y = (ax + b)^m \quad \therefore y_n = \frac{m!}{(m-n)!} a^n (ax+b)^{m-n} [\therefore m > n]$$

$$m = n \text{ হলে, } y_n = n! a^n, \quad m < n \text{ হলে, } y_n = 0$$

$$(iii) y = e^{ax} \quad \therefore y_n = a^n e^{ax}$$

$$(iv) y = a^{mx} \text{ হলে } y_n = (m \ln a)^n a^{mx}$$

$$(v) y = \frac{1}{x+a} \quad \therefore y_n = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

$$(vi) y = \ln(x+a) \quad \therefore y_n = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x+a)^n}$$

$$(vii) y = \ln(ax+b) \quad \therefore y_n = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)! a^n}{(ax+b)^n}$$

$$(viii) y = \sin(ax+b) \quad \therefore y_n = a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$$

$$(ix) y = \cos(ax+b) \quad \therefore y_n = a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$$

$$(x) y = x^n \ln x \text{ হলে, } y_{n+1} = \frac{n!}{x}$$

➤ $y = f(x)$ বক্ররেখার উপরস্থ (x, y) বিন্দুতে অংকিত স্পর্শকের ঢাল $\frac{dy}{dx} = \tan \theta$ যা ঐ বিন্দুতে অন্তরকের মান নির্দেশ করে।

➤ স্পর্শক x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করলে $\frac{dy}{dx} = 1$ হবে।

➤ অক্ষদ্বয়ের সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করলে $\frac{dy}{dx} = \pm 1$ ।

➤ স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল হলে, অর্থাৎ y অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{dy}{dx} = 0$ হবে।

➤ স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব বা y অক্ষের সমান্তরাল হলে, $\frac{dx}{dy} = 0$ হবে।

□ $y = f(x)$ বক্ররেখার উপরস্থ $p(x_1, y_1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $(y - y_1) = f'(x)(x - x_1)$

➤ $p(x_1, y_1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ, $f'(x)(y - y_1) + (x - x_1) = 0$

□ গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয়ের নিয়ম: মনে করি, $y = f(x)$ একটি ফাংশন।

(i) গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় করার জন্য $\frac{dy}{dx}$ বের করে $\frac{dy}{dx} = 0$ বসাতে হবে এবং এখান থেকে x এর মানগুলি নির্ণয় করতে হবে। এ সমস্ত মানগুলোকে সংকটবিন্দু/সন্ধিবিন্দু (critical point) বলে।

(ii) $\frac{d^2y}{dx^2}$ নির্ণয় করে তাতে x এর মানগুলো বসাতে হবে। এ থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। যদি $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ হয় তবে x এর ঐ মানের জন্য $f(x)$ ফাংশনের লঘুমান পাওয়া যাবে। এবং যদি $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ হয় তবে x এর ঐ মানের জন্য $f(x)$ ফাংশনের গুরুমান পাওয়া যাবে।

(iii) x এর মানগুলো $y = f(x)$ এ বসিয়ে গুরুমান এবং লঘুমান নির্ণয় করা যাবে।

□ ম্যাকলরিনের উপপাদ্য সংক্রান্ত তথ্য: $f(x)$ যদি x এর এমন একটি ফাংশন হয়, যাকে x এর ধনাত্মক পূর্ণসাংখ্যিক, ক্রমবর্ধমান শক্তির একটি অসীম সিরিজে বিস্তৃত করা যায় এবং যদি ঐ বিস্তৃতির প্রতিটি পদ যেকোন সংখ্যকবার অন্তরীকরণযোগ্য হয়, তাহলে,

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \frac{x^3}{3!} f'''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots$$

গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

$$\therefore y_2 = 4^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{2} + 4x\right) \therefore y_2 = 16 \cos(\pi + 4x)$$

$$\Rightarrow y_2 = e^x (\sin x + \cos x) + e^x (\cos x - \sin x) \\ = e^x (\sin x + \cos x + \cos x - \sin x) = 2e^x \cdot \cos x$$
$$= -2 \frac{1}{\cos^3 x} \cdot \sin x = -2 \frac{\sin x}{\cos^3 x}$$
$$\Rightarrow y_2 = \frac{x^2 \frac{d}{dx}(1 - \ln x) - (1 - \ln x) \frac{d}{dx} x^2}{x^4} = \frac{x^2 \left(-\frac{1}{x}\right) - (1 - \ln x) 2x}{x^4}$$

অভিলম্বের সমীকরণ, $(y-4) = -\frac{1}{4}(x-2) \Rightarrow x+4y-18=0$

$\therefore$ বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক $(3, 1)$ এবং $(2, 4)$

$$\therefore \text{সর্বনিম্ন মান} = \frac{e}{\ln e} = \frac{e}{1} = e \text{ Ans.}$$
$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y}{x} - \ln y}{\frac{x-y \ln x}{y}} = \frac{y-x \ln y}{x} = \frac{y}{x} \cdot \frac{(x \ln y - y)}{(y \ln x - x)} \quad (\text{Ans.})$$

Ans: $\frac{3}{4}$

04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-3x}}{x} = ?$

Ans: $\frac{5}{2}$

05. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x} = ?$

Ans: 0

06. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} = ?$

Ans: $\frac{1}{2}(b^2 - a^2)$

07. মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: a^x

Ans: $a^x \ln a$

08. $y = x \tan^{-1} x$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

Ans: $x \cdot \frac{1}{1+x^2} + \tan^{-1} x$

09. $y = \left(\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}\right)^2$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত?

Ans: $2 \tan x \sec^2 x$

10. $y = \sin^2 [\ln(\sec x)]$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

Ans: $\sin 2[\ln(\sec x)] \tan x$

11. $x = a \sec^3 \theta$, $y = a \tan^3 \theta$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

Ans: $\sin \theta$

12. $x^2 - xy + y^2 = 3$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

Ans: $\frac{2x-y}{x-2y}$

13. $y = \sqrt{(\sin x) + \sqrt{(\sin x) + \sqrt{(\sin x) + \dots \infty}}}$ হলে, দেখাও যে,
 $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2y-1}$

14. $y = 5^x$ হলে, $y_n = ?$

Ans: $y_n = 5^x (\log_e 5)^n$

15. $y = \tan x + \sec x$ হলে, দেখাও যে, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\cos x}{(1 - \sin x)^2}$

16. $y = e^x \cos x$ হলে, $y_2 = ?$

Ans: $-2 e^x \sin x$

17. $y = x^2 \ln x$ হলে, $\frac{d^3 y}{dx^3} = ?$

Ans: $\frac{2}{x}$

18. $\frac{1}{x}$ এর n তম অন্তরক কত?

Ans: $\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

19. $y = \frac{e^x}{x+1}$ হলে, $y_2 = ?$

Ans: $\frac{e^x(1+x^2)}{(x+1)^3}$

20. $y = \sqrt{4+3 \sin x}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $2y \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 = 4$

21. $3x^2 - 7y^2 + 4xy - 8x = 0$ বক্ররেখাটির $(-1, 1)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক

ঢাল-

Ans: $-\frac{5}{9}$

22. $3x^2 + 7y^2 + 4xy - 8x = 0$ বক্ররেখাটির $(-1, 1)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক

ঢাল-

Ans: 1

23. $y = 4x^2$ পরাবৃত্তের $(-1, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

Ans: $8x + y + 4 = 0$ (স্পর্শক); $8y - x - 33 = 0$ (অভিলম্ব)

24. $y = x(1-x)$ বক্ররেখার যে বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল তার স্থানাঙ্ক

নির্ণয় কর।

Ans: $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$

25. $f(x) = x \ln x$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

Ans: $-\frac{1}{e}$

26. $x = 1$ বিন্দুতে $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ ফাংশনটির প্রকৃতি নির্ণয় কর।

Ans: ক্রমহাসমান

27. t সময়ে কোন কণার দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = t^3 - 12t^2 + 6t + 8$ যখন

কণাটির ত্বরণ শূন্য তখন এর বেগ কত?

Ans: -42

28. $]0, 4[$ ব্যবধিতে $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ ফাংশনের জন্য ল্যাম্বার্টের গড় মান উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই কর।

Part 3

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 2^x - 5^x + 1}{x \tan x} = ?$

(A) $\ln 5$ (B) $\ln 5(\ln 2)$ (C) $\ln 2$ (D) $\ln 10$ (Ans: B)

02. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \sin 2x}{x^2 + 5} = ?$

(A) 0 (B) 3 (C) 1 (D) 4 (Ans: B)

03. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^{10} - 1024}{x^5 - 32} = ?$

(A) 0 (B) 64 (C) 2 (D) 32 (Ans: B)

04. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(5+x) - \ln(5-x)}{x} = ?$

(A) $\frac{5}{7}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) 1 (D) 5 (Ans: B)

05. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\tan^{-1}(3x)} = ?$

(A) 0 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 1 (D) 3 (Ans: B)

06. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 5}{3x^2 + 5x - 6}$ এর মান -

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $-\frac{5}{6}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $-\frac{2}{3}$ (Ans: C)

07. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x}}{\cos x}$ এর মান -

(A) e (B) 1 (C) $\frac{1}{e}$ (D) 0 (Ans: A)

08. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin x}{\sin 6x} = ?$

(A) $\frac{7}{6}$ (B) $-\frac{7}{6}$ (C) 1 (D) -1 (Ans: C)

09. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ফাংশনটি $x = 0$ তে-

(A) অসীম (B) অবিচ্ছেদ্য (C) বিচ্ছেদ্য (D) কোনোটিই নয় (Ans: C)

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$ এর মান কত?

(A) 1 (B) -1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$ (Ans: D)

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)^2}{x} = ?$

(A) 1 (B) 2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 0 (Ans: D)

12. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}$ সমান কত?

(A) π (B) ∞ (C) 1 (D) 0 (Ans: C)

13. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sec x)^x =$ কোনটি?

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) অসংজ্ঞায়িত (Ans: B)

14. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$ এর মান -

(A) 12 (B) 21 (C) 14 (D) 15 (Ans: A)

[illegible]

For Practice

01. $\int \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = ?$

Ans: $\frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + 2x^{\frac{1}{2}} + c$

02. $\int \frac{\tan^{-1} x \, dx}{1+x^2} = ?$

Ans: $\frac{(\tan^{-1} x)^2}{2} + c$

03. $\int \sin^2 x \cos 2x \, dx = ?$

Ans: $\frac{1}{4} \left(\sin 2x - x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) + c$

04. $\int \frac{1}{9-4x^2} \, dx = ?$

Ans: $\frac{1}{12} \ln \frac{3+2x}{3-2x} + c$

05. $\int x^2 \cos x^3 \, dx = ?$

Ans: $\frac{1}{3} \sin x^3 + c$

06. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ?$

Ans: $\tan^{-1}(e^x) + c$

07. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx = ?$

Ans: $\ln \frac{5}{4}$

08. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \cos 2x} = ?$

Ans: $\frac{1}{2}$

09. $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = ?$

Ans: $\frac{\pi}{2} - 1$

10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (\sin x + \cos x) \, dx$

Ans: $e^{\pi/2}$

11. $\int_0^5 \sqrt{25-x^2} \, dx = ?$

Ans: $\frac{25\pi}{4}$

12. $\int_0^1 x^3 (1-x)^5 \, dx = ?$

Ans: $\frac{1}{420}$

13. যদি $f(x) = -f(-x)$ হয়, তবে $\int_{-a}^a f(x) \, dx =$ কত?

Ans: 0

14. যদি $\int_0^{2\pi} h(x) \, dx = 6\pi$ হয়, তবে $\int_0^{\pi} h(2x) \, dx = ?$

Ans: 3π

15. $\int_{-5}^5 |x-5| \, dx$ এর মান কত?

Ans: 50

16. x এর মান কত হলে, $F(x) = \int_0^x \frac{t-4}{9-t^2} \, dt$ ফাংশনটির মান বৃহত্তম হবে? Ans: 3

17. যদি $\int_0^1 h(x) \, dx = 5$ হয়, তবে $\int_1^3 [h(x) + kx^2] \, dx = 31$ হলে, k এর মান কত? Ans: 3

18. $\int_{-5}^5 |x+2| \, dx$ এর মান কত? Ans: 29

19. $x^2 + y^2 = 1$ এবং $y^2 = 1-x$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Ans: $2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{4}{3} \right)$

20. $x = y^2$ এবং $y = x-2$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। Ans: $\frac{9}{2}$

21. দেখাও যে, $y^2 = 4x$ পরাবৃত্ত এবং $y = 2x-4$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 9 বর্গ একক।

22. $x^2 + y^2 = 1$ এবং $y^2 = 1-x$ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। Ans: $\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$

23. $y^2 = 16x$ এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। Ans: $\frac{128}{3}$

24. $y = x$, $y = 0$ রেখা দ্বারা এবং $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্ত দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? Ans: 2π sq. units

25. $y^2 = 16x$ এবং $y = 4x$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? Ans: $\frac{2}{3}$ unit²

26. $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? Ans: $\frac{16a^2}{3}$

27. $y = 4x - x^2$ বক্ররেখা এবং x অক্ষ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? Ans: $\frac{32}{3}$ বর্গ একক

28. $y = x^2$ বক্ররেখা, x অক্ষ এবং $x = 1$, $x = 7$ রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? Ans: $\frac{342}{3}$

Part 3

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{\tan x}} = ?$

- Ⓐ $\tan x + c$
Ⓒ $\sqrt{\sin x} + c$

- Ⓑ $2\sqrt{\tan x} + c$
Ⓓ $2\sqrt{\sin x} + c$

(Ans: B)

2. $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx =$ কত?

- Ⓐ $\ln |e^x - e^{-x}| + c$
Ⓒ $\ln |e^{-x} - e^x| + c$

- Ⓑ $\ln |e^x + e^{-x}| + c$
Ⓓ $\ln |e^{2x}| + c$

(Ans: B)

3. $\int e^x (\tan x + \sec^2 x) \, dx =$ কত?

- Ⓐ $e^x \tan x + c$
Ⓒ $-e^x \tan x + c$

- Ⓑ $e^x \sec^2 x + c$
Ⓓ $-e^x \sec^2 x + c$

(Ans: A)

4. $\int \frac{x^2}{x^2-4} \, dx =$ কত?

- Ⓐ $\ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

- Ⓑ $\ln \left| \frac{x+2}{x-2} \right| - 5x + c$

- Ⓒ $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

- Ⓓ $2x + \ln \left| \frac{x+2}{x-2} \right| + c$

(Ans: C)

05. $\int 11^z \, dz =$ কত?

- Ⓐ $z 11^{z+1} + c$
Ⓒ $z 11^{z-1} + c$

- Ⓑ $\frac{11^z}{\ln 11} + c$
Ⓓ $\frac{z}{11} + c$

(Ans: B)

06. $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1+x^2}$ হয় তবে y এর মান কোনটি?

- Ⓐ $\cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} + c$
Ⓒ $\frac{-1}{1+x^2} + c$

- Ⓑ $\sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} + c$
Ⓓ $2 \tan^{-1} x + c$

(Ans: D)

07. $\int \frac{dx}{1 + \cos 2x} =$ কত?

- Ⓐ $\sec \frac{x}{2} + C$
Ⓒ $\sec x + C$

- Ⓑ $\frac{1}{2} \tan x + C$
Ⓓ $\tan x + C$

(Ans: B)

08. $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \text{কত?}$

- (A) $-2\sin \sqrt{x}$
(C) $\sin \sqrt{x} + c$

- (B) $-\sin \sqrt{x} + c$
(D) $2\sin \sqrt{x} + c$

(Ans D)

09. $\int \sin x^c dx = \text{কত?}$

- (A) $\cos x^c + c$

- (C) $-\frac{180}{\pi} \cos \frac{\pi x}{180} + c$

- (B) $-\cos x + c$

- (D) $\frac{180}{\pi} \cos \frac{\pi x}{180} + c$

(Ans C)

10. $\int \frac{\ln(\sec^{-1} x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx = f(x) + c$ হলে, $f(x)$ এর মান কত?

- (A) $\frac{(\sec^{-1} x)^2}{2}$

- (C) $\ln|\sec^{-1} x| - 1$

- (B) $\sec^{-1} x [\ln|\sec^{-1} x| - 1]$

- (D) $\frac{1}{\sec^{-1} x} - x$

(Ans B)

11. $\int e^x (\sin x + \cos x) dx = \text{কত?}$

- (A) $-e^x \sin x + c$
(C) $e^x \sin x + c$

- (B) $-e^x \cos x + c$
(D) $e^x \cos x + c$

(Ans C)

12. $\int x^3 e^x dx = f(x) + c$ হয় তবে $f(x) = \text{কত?}$

- (A) $\frac{1}{3} e^x (3x^2 - 6x + 6)$

- (C) $e^x (x^4 - 5x^3 + 3x^2 - 6x + 6)$

- (B) $\frac{1}{3} e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)$

- (D) $e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)$

(Ans D)

13. $\frac{x-3}{(1-2x)(1+x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1+x}$ হলে, A ও B এর মান কত হবে?

- (A) $\frac{5}{3}, \frac{4}{3}$

- (C) $\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}$

- (B) $-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}$

- (D) $-\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}$

(Ans D)

14. $\int \frac{dx}{2x^2 + x + 1} = \text{কত?}$

- (A) $\frac{2}{\sqrt{7}} \tan^{-1} \frac{4x+1}{\sqrt{7}} + c$

- (C) $\tan^{-1} \frac{x+1}{2} + c$

- (B) $\frac{2}{\sqrt{7}} \ln \frac{4x+1}{\sqrt{7}} + c$

- (D) $\frac{2}{\sqrt{7}} \tan^{-1} \frac{4x+1}{7} + c$

(Ans A)

15. $\int x e^{x^2} dx = \text{কত?}$

- (A) $e^{x^2} + c$

- (C) $\frac{1}{2} e^{x^2} + c$

- (B) $\frac{1}{2} e^x + c$

- (D) $e^x + c$

(Ans C)

16. $\int \frac{(\sec^{-1} x)^5}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \text{কত?}$

- (A) $\frac{1}{5} (\sec^{-1} x)^5 + c$

- (C) $\frac{1}{4} (\sec^{-1} x)^4 + c$

- (B) $\frac{1}{6} (\sec^{-1} x)^6 + c$

- (D) $(\sec^{-1} x)^6 + c$

(Ans B)

17. $\int \frac{dx}{1-\sin x}$ এর মান কত?

- (A) $\tan x + \sec x + c$
(C) $-\tan x + \sec x + c$

- (B) $\tan x - \sec x + c$

- (D) $-\tan x - \sec x + c$

(Ans A)

18. $\int \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \text{কত?}$

- (A) $\sin^{-1} 2x + c$

- (C) $-\sin^{-1} 2x + c$

- (B) $\cos^{-1} 2x + c$

- (D) $-\cos^{-1} 2x + c$

(Ans A)

19. $\int \sqrt{e^x} dx = ?$

- (A) $\frac{2}{3} (e^x)^{3/2} + c$

- (C) $2e^{x/2} + c$

- (B) $\frac{1}{2} \sqrt{e^x} + c$

- (D) $e^{x/2} + c$

(Ans C)

20. $\int \frac{\tan(\sin^{-1} x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = ?$

- (A) $\sec^2(\sin^{-1} x) + c$

- (C) $\ln |\sec(\sin^{-1} x)| + c$

- (B) $\sec(\sin^{-1} x) + c$

- (D) $\ln |\tan(\sin^{-1} x)| + c$

(Ans C)

21. $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx = ?$

- (A) $\frac{x}{(x+1)^2} + C$

- (C) $\frac{x}{x+1} + C$

- (B) $\frac{e^x}{(x+1)^2} + C$

- (D) $\frac{e^x}{x+1} + C$

(Ans D)

22. $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx = f(x) + c$; $f(x) = ?$

- (A) $\sin(xe^x)$

- (C) $\cot(xe^x)$

- (B) $\tan(xe^x)$

- (D) $\sec(xe^x)$

(Ans B)

23. $\int xe^x dx = ?$

- (A) $xe^x - e^x$

- (C) e^x

- (B) xe^x

- (D) $xe^x + e^x$

(Ans A)

24. $\int x \cos x dx = f(x) + c$ হয় তবে $f(x) = ?$

- (A) $x \sin x + \cos x$

- (C) $\frac{x^2}{2} \sin x$

- (B) $x \sin x - \cos x$

- (D) $\frac{x^2}{2} \cos x + x \sin x$

(Ans A)

25. $\int e^{2x} dx$ এর মান কত?

- (A) $\frac{1}{2} e^{2x} + c$

- (C) $\frac{1}{2} e^x + c$

- (B) $e^{2x} + c$

- (D) $2e^{2x} + c$

(Ans A)

26. $\int \frac{\cos(\frac{1}{x})}{x^2} dx = \text{কোনটি?}$

- (A) $\cos(\frac{1}{x}) + C$

- (C) $-\sin(\frac{1}{x}) + C$

- (B) $\sin(\frac{1}{x}) + C$

- (D) $\cos(\frac{1}{x^2}) + C$

(Ans C)

27. $\int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ এর মান কোনটি?

- (A) $2e^{-1}$

- (C) $2(e-1)$

- (B) $\frac{2}{e} - 1$

- (D) $1 - \frac{1}{e}$

(Ans C)

28. $\int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$ এর মান কোনটি?

- (A) $\frac{\pi}{32}$

- (C) $\frac{\pi^2}{32}$

- (B) $\frac{\pi}{16}$

- (D) $\frac{\pi^2}{16}$

(Ans C)

29. $\int_1^2 |x+1| dx$ এর মান কোনটি হবে?

- (A) -1

- (B) 0

- (C) 1

- (D) 2

(Ans D)